

بالقزمية والبطيخية والقرمية والنباتية
والبريطانية واللاتينية واليونانية

المؤاد والمأرد

إدوار غَالِبُ الموسوعة


٣٤٢٠ صفحة • ٣١٤٦٤ مادة
٦٩٦٢ رسمًا • ٢٤ لوحة ملونة

في علوم الطبيعة

تبحث في الزراعة والنبات والحَيوان والجيولوجيا



دارالمشرق بيروت



متنظرات ،
دار المنشورات ش.م.م
ص.ب. ٩٤٦ - بيروت ، لبنان

الطبعة الأولى :
المكتبة الشرقية - ساحة التجارة
ص.ب. ١٩٨٦ - بيروت ، لبنان

الموسى وعنه في علوم الطبيعة

الرسوم :

جورج ديب

جورج غنطوس

جان قريطاي

جهاد جبر

سليم غصن

المجموعة : ISBN 2-7214-2148-4

المجلد الثاني : ISBN 2-7214-2550-6

يحتوي هذا المجلد من

الموسيقى العربية في العراق الحديث

١٠٢٠٨ مواد

٢٢٧٧ رسماً

٨ لوحات ملونة

الأدوار غالباً

مهندس زراعي

الموسوعة في علوم الطبيعة

تبحث في الزراعة والنبات والحيوان والطير والسمك والحشرات والفقاريات
والبحر والشجر والأرض والحيوانية والنباتية والمصطلحات العلمية على اختلافها
أخصها الفيزياء والكيمياء والرياضة والبيولوجية والطب والحقائق
وتتألف من أربعة مجلدات يحتوي آخرها على مسارد للأصطلاحات باللغات :
الألمانية ، الإنكليزية ، الإيطالية ، الفرنسية ، اللاتينية ، واليونانية

طبعة ثانية محدّدة

المجلد الثاني

من الرء إلى الفء



السرعوييات . مستطيلة الجثة ، قصيرة القوائم ، غبراء الصفحة العليا من قفن الرأس الى الذنب ، سوداء الصفحة السفلى من الرأس الى الذنب . اذنانها صغيرة مستديرة . حلبيها كثيف وليليط . اطرافها طويلة حادة || مسرحها من الغروب الى الفجر . قوتها السبل والفسار والجردان والحيات والمصاير والدويبات والثآليل ويظهر بعض الانحجار . له نومان ، يليان .

١١١٦١ - راتيل أبو كعب *

Mellivora leuconota, Ratelus capensis (S). Ratel du Cap (F). Ratel of Cap (E).
نوع من الراتيل موطنه افريقية الشرقية والجنوبية . طوله نحو ٨٥ سم . ذنبه ٢٨ سم . اما ارتفاعه فنحو ٢٥ سم . يألف الجبال والاراجح والبراري على السواء ويتسلق الاشجار بقدرة .

١١١٦٢ - راتيل أبو كيم * ، شُصْرُ ، لُصْلُوص

Mellivora indica, Ratelus indicus (S). Ratel de l'Inde (F). Indian ratel (E).
نوع من الراتيل موطنه الهند وبلاد فارس وبنارها . طوله نحو ٨٠ سم . ذنبه ١٢ سم . اما ارتفاعه فنحو ٢٤ سم . يألف الجبال والاراجح ، يرغب في المناطق الكثيرة الغصبا والبراري .

١١١٦٣ - راتيل *

Pléiotrope (F). Pléiotropic (E).
صفة الجين الوراثي الذي يحق جمع السيات المتباينة .

١١١٦٤ - راتينج

Résine (F). Resin (E).
ونهم من قال راتينج . مواد ثلاثية صلبة لزجة تنفصها بعض النباتات لا سيما الصنوبريات والبطيانيات .

١١١٥٣ - واهك
قال ابو حنيفة : « شجرة ترتفع على ساق ثم تنفرع لها ورق ملوح احمرى » . وقال غيره : « شجرة جبلية كانها عظملة ولها زهرة بيضاء لينة كانها تفلن » . ج . راد .

١١١٥٤ - رايض

الرايض نيم لير من كوكبة التنين مركزة على اللسان .

١١١٥٥ - رايض حرارة

Thermostat (F). Thermostat (E).
جهاز آلي يستخدم في تكييف الحرارة المطلوبة وتثبيت استمرارها على درجة معينة .

١١١٥٦ - رايضة
Lieuse (F). Binder (E).
اداة آلية تجمع قيرط الزرع وتربطها .

١١١٥٧ - رايضة ٥ ، خافضة
Phytophage (F).
Plant-eating (E).
هي كل حشرة قوتها النبات .

١١١٥٨ - رايبة
Colline (F). Hill (E).
ما ارتفع من الارض وكان دون الجبل .

١١١٥٩ - رايبة ليراعي
Rente convenancière (F).
Fidly rent (E).
هو الذي ينشأ على ارض زراعية ولا يجوز لمستعته ان يسترده ولكنه يجوز للمدين بعد التحرر منه بالتخلي عن الارض .

١١١٦٠ - راتيل ، اكيل المتسل

Mellivora, Ratel (S). Ratel (F).
جنس حيوانات راسية بطيئة الحركة ، كسولة من فصيلة



راتيل ابو كعب



راتيل ابو كيم

١١١٧٦ - رَادِع ، كَاشِف

Réactif (F).

Reactif, Reagent (E).

كل مادة كيميائية يساعد انفصالها على الكشف عن حقيقة الجسم للألوان معروفة.



راتون غاسل

١١١٧٧ - رَاكُون

Safran (F). Saffron (E).

هو الزعفران ، أعلاه .

١١١٧٨ - رَادِيُوم

Radium

عنصر معنوي نادر الوجود اكتشف عام ١٨٩٩ بمقرور عام ١٩٠٤ على يد العلماء بيار وباري كوري وبيرون .
لونه ابيض فضي يضيء في الظلام . اشتد فسقورية بريقها فستحي . يتفكك بسرعة اذا تعرض للهواء || يوزن (بوز-RA) وزنه الذري ٢٢٦,٠٥ وقته ٨٨ يتصهر في ٩٦٠° س .
يتميز بنشاطه الاشعاعي العظيم وخاصيته في ايجاد الانسجة الحية التي يستخدمها الطب في معالجة الاجزاء المصابة من الجسم || يوجد في بعض انواع الفحم المستخرجة من مناجم بوهيميا وفي الكونفوز والولايات المتحدة وكندا .

١١١٧٩ - وَكْرُ الْجِلْدُخ *، صَمْبَكَةُ زَبَاه *

Xanthochrous hispida, Polyporus hispida (S).
Polypore hispida (F). Hardwood (E).

فطر من السميات يركب بعض الاشجار الحرجية والزراعية اعصها الدلب والصرة والثلث والتوت والجوز والتفاح .
اروسه مستديرة قطرها سم ١٠ . وهي مقنطرة الجلب القائم على الجذع . لونها اصفر يتقارب ثم يحل محل وينتهي بالسمرة . لهاها اسفنجي التركيب ، غزير العصاره ، اصفر اللون في اول عهد ثم يحل محل عند اذناكه وخلو من العصاره || يوفياته صفراء ، يضيء الشكل ، قياسها ٥x٧ ميكرون || مشيجه يدخل من الاجزاء اليابسة فيتمركز بين القشرة والخشب اليابس ثم ينش في الشكير والخشب ويمتد حتى القلب || يكافئ بتفتيل وتطهير الجروح اليابسة ويطلق جروح الجلود والاضطراب بأحد المصابين الخاصة او الشكير .



رَار الجذع

١١١٨٠ - وَكْرُ الصَّنَوْبَر *، صَمْبَكَةُ الصَّنَوْبَر *

Xanthochrous pini, Polyporus pini (S). Pourriture rouge du pin, Polypore des pins (F).

فطر من السميات يركب الصنوبر العسر الذي صار حرج لا تتحلب الراتنج || مشيجه يدخل أولاً إلى قلب الجذع حيث يتركز ثم ينتشر من الداخل إلى الخارج ومن مركز انطلاقه إلى أعلى وأسفل بذات المساحة التي تراوح من التمر إلى القرن فيطرب الخشب كما يبدو في الرسم بعد ان يغير عروقه || اما الفطر فاروسه قنفسية الشكل ، جانبيه الانكاز عديمة الاغاريب المستديرة . قطرها نحو ٥ سم . لونها ال صفرة الشهاب . لهاها فليبي ناشف التسج حطلي اللون الزاقي || يوفياته شفافة تبغية المواج يضيء الشكل قياسها ٥x٦ ميكرون || يكافئ بتطهير جروح الحز عند نهاية الانحلال وبانتزاع الفطور قبل ادراكها .



رَار الصنوبر

١١١٨١ - وَكْرُ الكَشْمِش *، صَمْبَكَةُ الكَشْمِش *

Xanthochrous ribis (S). Polypore du roseillier (F).

فطر من السميات يركب سوق الكشمش عند سطح التربة فيسقط اللحاء والتشكير دون ان يتعداهما إلى الخشب . اروسه قيعية الشكل فائقة الحلاقة المنخفضة لتضدية ، لونها اصعب حطلي ثم يميل إلى الجفوة . لهاه اصفر نحاسي



رَار الكشمش

١١١٧٥ - رَاتِنَج الصَّنَوْبَر

Barras

عصاره صمغية راتنجية تزيل من حز سوق الصنوبر البحري .

١١١٦٦ - رَاتِنَجِي

Résineux (F). Resinous (E).

اسم شامل يطلق على كل شجرة راتنجية العصاره اعصها الاجار الفصيلة الصنوبرية .

١١١٦٧ - رَاتُون ، رَاكُون

Procyon (S).

Raton (F). Racocon (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة الراتونيات . موطنها البلاد الابريكية . تشبه الدب والفرد . اصولها لبدة صغيرة . انها تقيم نحو اربعة جراء تربها نحو الحول || له نصان الراتون الفاسل والراتون المنفي .

١١١٦٨ - رَاتُون غَاسِل *

Procyon lotor (S).

Raton laveur (F). Mapach (E).

نوع من الراتون . عروقه اربعة مقنطرة من المكسيك إلى السكا . طوله من ٨٠ إلى ٩٠ سم . ارتفاعه من ٣٢ إلى ٣٦ سم . ثوبه المتقلب إلى الطحلة اللبراه يطولوا مواج اصفر || يالفت فطوط السميرات والانهار يعيش في البر واللاه وعلى الاشجار . لا يأكل شيئاً إلا بعد غله بللاه . قوته الثار والحبوب والجلود واللبير والاسماك .

١١١٦٩ - رَاتُون مَتَحِي *

Procyon cancrivorus (S).

Raton crabier (F). Agouara, Crab-eater (E).

نوع من الراتون . موطنه امريكا الجنوبية . طوله نحو ٧٥ سم . ارتفاعه ٣٢ . ثوبه ال السمرة يطو جسمه فطوط ييض حازية . لا يندل اكله . قوته الثار والجلود لكنه يرغب في بعض انواع السرطان اعصها المنع .

١١١٧٠ - رَاتُونِيَات

Procyonidae (S).

Procyonidae, Ratons (F). Procyoni, Racocons (E).

فصيلة حيوانات من الثدييات للولاس القراضم . تأتي بين السنوريات والذئبات . اجناسها خمسة : البساري والبندا والراتون والكوكاي ولكنكاجو ، جميعها امر يكية المولن .

١١١٧١ - رَاجِيجِيَّة

Probabilisme (F).

Probabilism (E).

الراجعية مذهب فلسفي اجتاعي يقول بأهمية السلوك وفقاً لرأي الراجح .

١١١٧٢ - رَاح ، رَاف ، وَهِيَق

Vin (F). Wine (E).

هي الخمر ، شراب . كسولي يحصل من اختيار صير المنب .

١١١٧٣ - وَاحِدَةُ الْأَمْسَد

هو صليح الاسد ، اعلاه .

١١١٧٤ - رَاكِيق

Mellipage (F).

Mellipagous (E).

نعت تصريفي يطلق على الطيور والحشرات التي ترتشف رحيق الازهار . ج رواحق .

١١١٧٥ - رَاكِص

Coureuse (femelle) (F).

Brooding-hen (E).

اتن الطير في زين حفسها البيض . ويقال ارض المائر وارضت لتداجية على يفضها فهي مرغم .

١١١٩١ - رأس الثعبان Rastaban (F).
Dragon's Head (E).
رأس الثعبان ويسمى أيضاً رأس التنين نجم ثير من الموائد وهي أربعة انجم مركزها على رأس التنين .

١١١٩٢ - رأس الجاني Ras Algehi
رأس الجاني ويسمى أيضاً كلب الراعي ، نجم ثير من كوكبة الجاني مركزه على الرأس .

١١١٩٣ - رأس الحشش رأس الحشش هو الكرشن ، اطلبه .

١١١٩٤ - رأس الدفوري رأس الدفوري هو القطريون الاسمر ، اطلبه .

١١١٩٥ - رأس الشيخ رأس الشيخ هو الاقسن ، اطلبه .

١١١٩٦ - رأس العصفور رأس العصفور *
Clinopodium vulgare, Melissa clinopodium (S).
Clinopode, Grand basilic sauvage (F). Wild basil,
Horse-thyme (E). Gemeiner wirebeldost (D).
Basilisco salvatico, Clinopodia (I).

نبات عشبي بري طلي معمر من فصيلة الشفويات ينبت في ضباب ورماد مناطق حوض البحر المتوسط . ساقه فراء مشرحة كثيفة الزغب . أوراقه لائقة متعاقبة صغيرة . القند . تصلها كثير المروق والشرابين ، مزغب الفسفة ، ششن اللبس . ازهاره ابطية الاركاناز ، غصية التجميع ، مهدبة الكأس والتصل وهي بيضاء اللون ليلكية المواج . يقال ان أوراقه وازهاره طيبة تفيد المعدة .

١١١٩٧ - رأس الفول Algol
رأس الفول نجم ثير من كوكبة سيابس .

١١١٩٨ - رأس النسل Chaintre, Fourrière,
Tournière (F). Balk, Headland (E).
المكان في اول الحقل وآخره حيث تنشل سكة المهرات وتعود الدواب .

١١١٩٩ - رأس الهر رأس الهر هو الجليج ، اطلبه .

١١٢٠٠ - رأس مال ، وسمكال Capital
هو مجموع الثروة المخصصة .

١١٢٠١ - رأس مال الشركة ، وسمكال الشركة Capital social (F). Registered capital (E).
هو مجموع المبالغ المدفوعة أو الاموال المقننة الى الشركة .

١١٢٠٢ - رأسب Précipité (F). Precipitate (E).
عكر او دودي يحصل في بعض السوائل ويذهب سفلاً من جواره استعمال بعض المواد الكيماوية .

١١٢٠٣ - رأسبة Diluvium
غرين جيولوجي قدم تجمع في الحقبة الرابعة أو قبلها بتأثير مياه الانهر والليبار والمناج .

١١٢٠٤ - رأسمالية Capitalat, Capitalisme (F).
Capitalism (E).
هي سيادة الراسماليين والراسماليين وهي من النظم الاقتصادية السائرة الى الاستغلال وذلك لان معظم العالم يدين بالتروسيه ويستسلم الى سلطان الدولة .

مكون من طبقتين تفصلها اقباً خشابة ليفية صلبة سواد اللون . الطبقة العليا استنجية التركيب حشة والسفل فليزية جاملة || يوفاته حطبة مستديرة قطرها ٢ الى ٥ ميكرون || يكافح بانتزاع الفطور قبل ادراكها ويظهر اللماء والشكر بعد تنظيفه . ومن الصنوبري اجتناب زامة الكشش في الاثرية القوية الانتماج .

١١١٨٢ - رازيانج هو الشيار ، اطلبه .

١١١٨٣ - رازيانج كبير * ، برهيكية Hippomararum (S). Hippomaratre (F). Rosemary frankincense (E). Languedockische nussdole (D).
Ipomaratro (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الحلييات . انواعه عديدة منبها الاراضي الملساء . أوراقها خرقية مخززية . ازهارها صفر . عرفها مستحب الرائحة تفوح من اللبس .

١١١٨٤ - رازيانج * ، مشغيل ، إسانة Enanthe (S). Enanthe (F). Water drapwort (E).
Pferdesaat (D). Enanto (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الحلييات . انواعه نحو ٣٠ جميعها متقية او مائية . أوراقها مشرحة التصل . ازهارها مزاجية بيضاء اللون || يستخرج من جذور بعض انواعها عصارة صفراء اللون سامة يميته . أشهر انواعه الرازيانة المائية .

١١١٨٥ - رازيانج مائية * ، مشغيل مائي ، إسانة متقية Enanthe phellandrium (S). Phellandre, Fenouil d'eau, Cigué aquatique (F). Water hemlock, Horsebane (E). Echte pferdesaat (D). Felendrio, Filpendula, Cicuta aquatica (I).

نوع من الرازيانة يعيش في المناطق وعلى ضفاف الأنهار . يملو نحو المتر . سمه ناتج ميت . يستعمل في بعض المستحضرات الطبية .

١١١٨٦ - رأس Tête (F). Head (E).
عصر من اعضاء الجسم الحيواني يتكون من علية عظمية لا قياسية الشكل تدعى الجسمة تحوى المخ والخيخ والانتخا للمستطيل . خلافاً انسجة عضلية يلفها الجلد الذي يكمو الشعر . ويمرر الرأس على فتحتين القم والالنت وهما طريقا التنفس والاكل وعلى اعضاء الحس وهي العينان والاذنان والالنت واللسان .

١١١٨٧ - رأس الأسد Razas
رأس الاسد نجم ثير من كوكبة الاسد الاصفر .

١١١٨٨ - رأس الأفعى رأس الأفعى هو الاحيون ، اطلبه .

١١١٨٩ - رأس التنين رأس التنين هو البيفران ، اطلبه .

١١١٩٠ - رأس التولم المونخر Pollux
نجم ثير من برج الثورين ، يبعد عن الارض نحو ٣٢ سنة ضوئية .



رازيانج كبير



رازيانج



رازيانج مائية



رأس العصفور



رأسن حامي



رأسن طبي



رأسن من السج



رأسن كبير الزهر



رأسن



رأسية الخلدائق

١١٢٠٥ - **رأسن** * *Inula* (S), *Aunée*, *Inula* (F), *Inula* (E), *Alant* (D), *Enula* (I).
جنس نباتات حشوية معمرة من فصيلة المركبات الابتوبية الزهر . انواعها عديدة مظهرها بري وبصفتها رئيسية . اوراقها متشابهة لا قياسية الانتساب . الهاربا عطرية روئية صفراء القرس || اعرف انواعها بظهرها يتبع.

١١٢٠٦ - **رأسن البركاشيت** * هو البرنوبذ ، اطبله .
١١٢٠٧ - **رأسن حشامي** * *Inula ensifolia* (S).
Aunée ensiforme (F).
حشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . ساقها زخيدة اللحاء ، متباعدة الاوراق السنانية الضيقة ، تفصلها خلي البشرة خاني العروق المتوازية . وريشاتها الزهرية متباعدة ، قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم . قناباتها الخارجية مستطيلة حسامية الشكل || انزهاره يستمر من تموز الى آب .

١١٢١٥ - **رأسيات** * *Céphalés* (F), *Cephalate* (E).
قسم من الرغويات يشمل رأسيات الارجل ومعديات الارجل ومجنحات الارجل .

١١٢١٦ - **رأسيات الأرجل** * *Céphalopodes* (F), *Cephalopods* (E).
صف حيوانات من الرغويات .

١١٢١٧ - **رأسية ، قيفالانثوس** * *Cephalanthus* (S), *Céphalanthe* (F).
جنس نباتات برية وريشينة من فصيلة القويات . حديث رأسية لان تنويرها انبثالي ويستدير كالرأس . انواعها عديدة جميعها شجيرات تملو من مترين الى ثلاثة امتار . تكثر في المواقع الرطبة ويمل غشاق الجبورات والمنتقع ، انزهارها فريدة طرية متقبلة . اوراقها مستطيلة متعقة . انزهارها نورية للتجسيم ، كبيرة الحجم ، يبيض اللون || اشهر انواعها رأسية الخلدائق .

١١٢١٨ - **رأسية الحدائق ، قيفالانثوس غربي** * *Cephalanthus occidentalis* (S), *Céphalanthe occidentale*, *Bols à boutons* (F), *Burton-bush*, *Globe flower bush* (E), *Amerikanische kopfbäume* (D), *Cefalanto*, *Legno da bottone* (I).
هو النوع الزراعي الرئيسي ، يمل نحو ٣ امتار . اوراقه بيضية ، مستطيلة ، ذلقة الزام الانخير . انزهاره حطرة نوبيا الى الابيض يملو موج اصفر || انزهاره يستمر من تموز الى آب .

١١٢١٩ - **رأسية** * *Rachis*.
الرائدة هي محور البصلة والحفرة والمنفرد والاوراق المركبة وغيرها . ومن اسمائها الزند والنتق .

١١٢٢٠ - **رأسية** * *Filire* (F), *Filiter* (E).
اداة تصفى بها السوائل من ماء وغيره .

١١٢٢١ - **رأسية السدي** * هي بلغة التجليل ، اطبلها .
١١٢٢٢ - **رأسين** * *Commensal*.
نعت ترميى يطلق على كل حشرة تلازم غيرها وتعيش على حسابها .

١١٢٢٣ - **رأسيدكة ، صجلة ، مقرباب** * *Télescope* (F), *Telescope* (E).
جهاز خاص برصد الاجرام البعيدة .

١١٢٢٤ - **رأس** * *Berger* (F), *Shepherd* (E).
هو من ولي أسر القطيع .

١١٢٢٥ - **رأجي** * *Erral*.
لراجي نجم من كوكبية يقاس مركزه على الرجل اليسرى .

١١٢٠٨ - **رأسن دقيق** هو الطيون ، اطبله .
١١٢٠٩ - **رأسن طبي ، جناح رومي ، زنجبيل شامي ، قسطن شامي** * *Inula helenium*, *L. campana*, *Corvartia helenium* (S), *Aunée grande*, *Elecampane*, *Gil de cheval* (F), *Common inula*, *Elecampane*, *Horse-silder* (E), *Echter alant*, *Alantaster* (D), *Enula elenio*, *Enula campana*, *Occhio di cavallo* (I).
حشبة طرية برية معمرة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها حاشنة كبيرة اللد ، السفلية منها تطول نحو ٨٠ سم . والعلوية تطول من ١٥ الى ٢٥ . نصلها انزبط المنفسحة السفلى المملدة اللون . جذعها حديد الفروع ، وريشاتها الزهرية كبيرة القند ، قطرها نحو ٧ سم . انزهاره يستمر من ايار الى ايلول .

١١٢١٠ - **رأسن عتيق المسح** * *Inula oculus-christi* (S), *Aunée oeil du Christ* (F).
حشبة سبروتية معمرة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها متعقة ، سنانية . نصلها خلي البشرة باهت الخضار الاطل . علق انزهارها كبير القند ، وريشاتها متعقة قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم . || انزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١١٢١١ - **رأسن عيدي** * *Inula glandulosa* (S), *Aunée glandulose* (F).
حشبة معمرة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ساقها زغبية اللحاء تنتهي بزهره روئية واحدة ، قناباتها غزيرة الشكل . اوراقها صغيرة القند ، لينة ، خيفة . نصلها خلي البشرة على صفحتي . حذاره يثمر التند البهنية الطاهرة . انزهاره يستمر من تموز الى آب .

١١٢١٢ - **رأسن كبير الزهر** * *Inula grandiflora* (S), *Aunée à grande fleur* (F).
حشبة سبروتية معمرة تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها لاطلة تطول نحو ١٠ سم . وريشاتها الزهرية كبيرة القند ، قطرها يراوح من ٦ الى ١٠ سم . لسيناتها وبقالية اللون . انزهاره يستمر طرول شهر حزيران .

١١٢١٣ - **رأسون ، قارة البحر** * *Novacula* (S), *Rason*, *Rasoir*, *Rat de mer* (F), *Razor-fish* (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزانف وفصيلة الكوسيات . انواعه المروفة قليلة العدد . اطبلها بحار البلاد الحارة .

١١٢٢٩ - راقوش *
Platycephalus (S).
Platycephale (F). Flathead (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الراميات يركب الرأس
أنواعه المعروفة ٣٠ أسطفاها بحار البلاد الحارة . جميعها
منزلية الشكل ، مفلطحة الرأس ، مستطيلة الزعانف الظهرية
والبطنية ، صغيرة الفلوس الخشنة . منشفة الانثوب .
تسرح في السمق ، تألف المناطق الرملية حيث يطيب لها
الاستقرار والاعتدال بانتظار الافتناس .

١١٢٣٠ - راقوش *
Ramularia *
جنس فطور مجهرى من فصيلة الراميات يركب الصل
على صفحتيه فيوشه يقع غنطلة الانوان ينقلب فيها الايض
والاعمل والاسمر || مشجبه شديدة الرقة والمليوية ، داخل
وتخلوي الانتشاب . جربه الكنيدي قصيرة ، شفافة ،
غمية التجميع ، كنانة مستطيلة ، قليلة التشعب ،
اسطوانية ، مؤنثة . ويغاث غنطلة الانوان والاشكال تنقلب
فيها الاسطالة || انواعه كثيرة البد اعرفها ما يتبع .

١١٢٣١ - راقوش الإيجاس *
Ramularia magnusiana (S).
فطر مجهرى يركب ثمار الاجاس والتفاح المغنوط .
مظهره الخارجي يقع قطرها براوح من ١ الى ٦ م . تملو
بشرة الشرة فتسقطها بفساء مشجبي التركيب ، خلي الشكل
يبدو ابيض اللون ثم يتحول الى الوردي وينتهي بالاسمر .
اضراره لا تسمى البشره . يذرك بالتوبة وباجتناب الحارة
والرطوبة .

١١٢٣٢ - راقوش البسفنج *
Ramularia lactea (S).
فطر مجهرى يركب اوراق البسفنج . مظهره الخارجي
يقع شبه مستوية قطرها نحو ٥ م . تملو نصل الاوراق
وتد قصيب الحائلي والازهار . تبدو صفراء اللون ثم تتحول
الى الابيض ثموتها حالات تلية || يسحب بها السنج
وتجمع الاوراق وذبول الازهار || يكافح منه ظهوره
بانتعاض الاوراق المؤنثة وينضج الثبات باسء الفوطير
المركزة على النعاس .

١١٢٣٣ - راقوش الدويكيات *
Ramularia primulae (S).
فطر مجهرى يركب اوراق الدويكيات واعصها زهرة الربيع .
مظهره الخارجي يقع مستوية او مقرنة الزوايا تملو النصل
على صفحتيه فتبدو على العليا صفراء اللون ثم تتحول الى
الاحمر وتكون على السفل خلية بفساء || يكافح منه
ظهوره باستهلاك مركبات النعاس .

١١٢٣٤ - راقوش الشوندر *
Ramularia beticola (S).
فطر مجهرى يركب اوراق الشوندر في اواخر الصيف .
مظهره الخارجي يقع صغيرة مقرنة الزوايا قطرها من ٢ الى
٣ م . توشم النصل على صفحتيه . تبدو مستطيلة الزوائد
حراء الاخر لم خلية بفساء || اضراره زعيمة لا تستوجب
المكانسة .

١١٢٣٥ - راقوش الهيشر *
Ramularia cynarae (S).
فطر مجهرى يركب اوراق الهيشر والاراضي شوكي والقرطم
والكرزنت || مظهره الخارجي يقع قسيحة مقرنة الزوايا
تملو النصل على صفحتيه فتبدو على العليا صفراء اللون وحل
السفل بيضاء خلية كثيفة الزئب || اضراره زعيمة
لا تستوجب المكانسة .

١١٢٢٦ - راعي ، ليريس ، عاشر
Eros, Amor (F). *Eros* (E).
الراعي كوكب سيار يتبع النظام الشمسي . مركزه بين
الارض والمريخ . دورته حول الشمس تستمر نحو ٦٤٢
يوماً .

١١٢٢٧ - راعي الجوزاء
راعي الجوزاء كوكب .

١١٢٢٨ - راعي المحور
راعي المحور نجم ثير من كوكبة حور وسية مركزه على
رأس المحور .

١١٢٢٩ - راعي الشتاء
le Bouvier (F).
راعي الشتاء كوكبة نجم شالية المقيع تسمى هواء ، اطلها .

١١٢٣٠ - راعي النعائم
راعي النعائم كوكب .

١١٢٣١ - راعيكة
Phagocyte (F). *Phagocyte* (E).
هي القاعة ، اطلها . والراعي ج . وراعي وضع اليانجي .

١١٢٣٢ - راعين *
Prémonitoire (F).
Premonitory (E).
نعت تعريفي يطلق على المراض او الامراض التي تستبق
نغوب المرض . او على العلامات التي تلو بقرير ونوع
المواد .

١١٢٣٣ - واليد هو الجدول ، ج رواند .

١١٢٣٤ - رايكة ، علكة ، ميخل
Levier (F).
Lever (E).
قصيب صلب يتحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز
يستعمل لرفع الانتقال والصنور وما اشبه || والرايكة
انواع منها التي تقع نقطة ارتكازها بين القوة والمقاومة .
وبها التي تقع فيها المقاومة بين القوة ومغور الارتكاز .
وبها التي تقع فيها القوة بين المقاومة ومغور الارتكاز .

١١٢٣٥ - رايكا
Raphia (F). *Raffia* (E).
جنس نخيل غليظ الجذع ، مستطيل السعف ، كبير الضية
الندفلية ، سرشني الجار . انواعه صبة ، موطنها افريقية
وامريكية الجنوبية ويندغسخر || اعرف انواعه واشهرها يتبع .

١١٢٣٦ - رايكا الخمر *
Raphia vinifera (S).
نوع من الرايا الصنابية . ثمارها سكرية المادة مربية
الاختار يصطنع منها شراب كحول يدهى نبيذ النخل .

١١٢٣٧ - رايكا الرباط
Raphia ruffa (S).
نوع من الرايا الزراعية الصنابية . سفعها يطول نحو
٢٠ م . الياف سفعها خفيفة متينة ناعمة عيكة تستعمل
في عدة صناعات . وهي ايضاً شائعة الاستعمال كرباط
زراعي تشد به للمخاض وغيرها .

١١٢٣٨ - راقص
Hercula (F). *Herculus* (E).
هو الجاني ، كوكبة نجم شالية المقيع .



رايا الحمر



راقود



راقوش الاجاس



راقوش البسفنج



راقوش الدويكيات



راقوش الشوندر



راقوش الهيشر

٨ الى ١٥ سم. ازهارها قليلة العدد ، كبيرة الحجم ،
بنفسجية اللون ، صفر المآبر || تنموها صيني .



رام

١١٢٥٧ - **راموس أسود** *
Podontus star (F), *Podontus star* (E).

نوع من الراموس . حشرة من مفصليات الاجنحة تختلفات
الاجزاء وعضلة الحسوليات . موطنها يمتد من الشرق الاقصى
الى اوروبا . الحشرة الجبلانة تعيش على الازهار . البرقة
دائمة قوتها المواد الخشبية المنحلة ، يكثر وسوحها في جلوج
واضغان الانجار الشجرة || جسمه اعليجي الشكل ،
محبب الصفعة العليا ، يطول من ١١ الى ١٢ سم. عيانه
بارزتان . زبانه غيظيان . غشاء لاحفان . ثوبه الى
السواد الاسفع الحواج .



راستي

١١٢٥٨ - **راكي** * ، **قشب سيام**

Bozhmeria nivea, *Urtica nivea*, *U. utilis*, *U. tenacissima* (F), *Ramie argentée*, *Ortie argentée*, *O. de China*, *Chanvre de Saïgon* (F), *Ramee grass*, *China grass* (E), *Rame*, *Chinanesse* (D), *Ortie de lino*, *Canapa di Siam* (I).

نبات حشبي لبني صناعي معمر من فصيلة القرعيات .
يطول من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوريته ضخمة ، كثيرة
الفروع الكثيفة الانتشاج . اوراته ممتدة بنفسية
اعليجية ، تصلها نقي الصفعة السفلى ، يطول نحو
١٥ سم . عتقه احمر اللون خالي البشرة || ازهارها متفرقة
اسطوانية . الباقه ممتدة قائمة الاستمال في صناعة الاوراق
التقدي .



راموس اسود

١١٢٥٩ - **واكيمات** *
Myoporaceae (F), *Myoporaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الحلقين . اجناسها وانواعها نحو
٥٠ اسمائها تمتد من الشرق الاوسط الى اليابان || جمع
نباتاتها ثمرات وحببات . اوراتها ممتدة في سطم الانواع
ومتقابلة في بعضها . تصالها شقيقة ، مستطيلة . لزجة .
ازهارها ابطة الانتشاج وطرية ، غنية التجميع او فردية .
ثمارها غنية رباعية البزور || تصال اوراتها ولحاء سيقانها
وانفادها ملينة بالجيوب الراتنجية الغنية بالادعانة السطرية
الحسية العرف || اشهر اجناسها الرام .



رامي

١١٢٦٠ - **واكيج** هو التاربييل المروف ، اعطيه .

١١٢٦١ - **واكين** *
Ranina (F), *Ranina* (E).

جنس دويبات مجرمة من القشرية وعضلة القرانبات .
انواعها المروفة قليلة العدد اسمائها البحر الاخر والمحيط
الهندي || اجناسها مبطلة مستعدة الحجم ، تطول من ٥
الى ٧ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ سم . دروسها قليلة
الاجيداب . قوائمها قصيرة ، غليظة ، مبرحة الاطراف .
ملاقطها صلبة ، كلابية الشكل || اشهر انواعها الزانين
المسنن .

١١٢٦٢ - **واكين سنسن** *
Ranina dentata (F), *Ranina dentata* (F).

نوع من الزانين يكثر وجوده في المحيط الهندي . يعيش
قرب الشط . دونه جنوي الكون ، اسفع الحواج ، سنن
الحافة الامامية .



زانين

١١٢٦٦ - **راكون** هو الزانين ، اعطيه .

١١٢٦٧ - **واكل** *
Autruchon (F), *Young ostrich* (E).
هو الحقل اي ولد النعام الحولي يحي رالة ، ج مثال
ورثالة .

١١٢٦٨ - **وام** *
Myoporum (F), *Myopora* (F).
جنس نباتات حشبية معمرة من فصيلة الراميات انواعه
نحو ٢٠ معظمها بري وبعضها تربي . اوراته متعاقبة
مستطيلة التصل الضيق . ازهارها نوري التجميع اعلي
الارتكاز . ازهارها بيض او حر . ثمارها غنية رباعية
البزور .

١١٢٦٩ - **وامكة** الرامة : مستقيم يجمع فيه الماء .

١١٢٧٠ - **واميج** *
Leurre (F), *Trap* (E).
الرامج : ملوحي تصاد به الجوارح كالسقوط ونحوها .

١١٢٧١ - **وايس** ، **دجوي** *
Nocturna (F), *Nocturnal* (E).

كل دابة مسرحها الليل هي راس . وقد كثر اسناد
الرواس الى طير الليل .

١١٢٧٢ - **وايقي** *
Appellat (F), *Decoy-bird* (E).
الراقي : الطائر الذي ينصبه الصياد لينع عليه البازي
فيمصده .

١١٢٧٣ - **واصيل** *
Sillicole (F), *Sillicle* (E).
نمت تمرني يطل على النباتات التي تعيش ونحو في الرمل .

١١٢٧٤ - **واشمدي** *
Ramondia (F), *Ramondia* (E).

جنس نباتات حشبية برية وتربيتية معمرة من فصيلة
الجسريبات . ممتدة التعريف على اسم العلامة راستي
(١٧٥٣-١٨٢٧) || انواعها المروفة اربعة ، اسمائها
الشرق الاوسط وبعض مناطق اوروبا الجنوبية والغربية .
جميعها سبروتية ، فريقة ، عادمة الساق ، قرصية الاوراق
الخشنة المزينة الصال . ازهارها قليلة العدد ترتكز على
شراخ دقيق يطول من ٥ الى ١٥ سم .

١١٢٧٥ - **واشمدي اسفع** * ، **واشمدي صروي** *
Ramondia serbica, *Jankaea ferruginea* (S).
Ramondie de Serbie, *Jankaea ferruginea* (F).

نوع من الرامندي ، حشبة سبروتية ، فريقة ، معمرة .
منبتها العلوي ينش مناطق البلاد المعتدلة الحرارة اعصها
سربيا || اوراتها ممتدة تطول نحو ٣ سم . تصالها خلية
الصفحة العليا البحرية اللون ، صفاء الصفعة السفلى .
شراخها الزهري يطول من ٧ الى ١٢ سم . ازهارها قليلة
العدد متوسط الحجم ، صفراء اللون ، ذرية المآبر ||
تنموها صيني .

١١٢٧٦ - **واشمدي ميكوني** *
Ramondia Myconi (F), *Ramondie de Myconi* (F).

نوع من الرامندي . حشبة فريقة معمرة . منبتها المناطق
المعتدلة الحرارة من ارتفاع ٦٠٠ الى ١٦٠٠ م . من سطح
البحر || اوراتها تطول نحو ٧ سم . تصالها عشب للمسح
سنن الحافة ، زقية غير اللون على الصفعة العليا ،
اصعب على الصفعة السفلى . شراخها الزهري يطول من

١١٢٦٣ - **وَالْكَيْسِيَّاتُ** *
Raninidae (S).
Raninidae (F).
 فصيلة دوبيات بحرية من التشرديات عشاريات الاربل المتطولات . اجناسها وانواعها المروثة قليلة العدد اعطائها بحد البلاد الحارة والاشواط || اعرف اجنتها واشهرها افرانين الذي يتبر قيس الفصيلة .
 ١١٢٦٤ - **وَاهِيَّةٌ** هي البنية ، اطليا .



واهرب الثرغول واهرب اسود

١١٢٦٥ - **وَاهِيَشُ** **Ustilago** **scorzonerae (S).** **Charbon du scorzonère (F).**
 فطر مجهري طويل العمر يعيش في الانوعية والخليا ، يصيب الدبع في المواقع الرطبة حيث يطغى روشتات الازهار || مظهره الخارجي يتور بوقية لونها الى السمره تملو الروشتات ثم تنقل عن غيرات هياية شديدة السواد . يكافح باجتنب زرع الدبع في الاماكن الرطبة .



واهرب الحنطة (٢)

١١٢٦٦ - **وَاهِيَّةٌ** **Ustilago** **crameri (S).** **Charbon du millet (F).**
 فطر مجهري يصيب الدخن على اختلاف انوعه . مركب مريض الزهرة فيسبب انتفاخه واحلول مادته ثم تحوّلها الى كتلة بوقية قطرها نحو ٤ م . لونها الى السمره || اضراره تختلط باختلاف العوامل الجوية لذلك تراوح من ١٠ الى ٧٥ % || يكافح اما بتطليس البذار مدة خمس دقائق في ملوب الفرمول المحلول ٠.٢ % حيث يمكن منع الحبوب المطربة لانها لا تنقص في الماء او باستعمال املاح الفثيق او املاح النحاس واعصها كربونيت النحاس .




واهرب الدبع

١١٢٦٧ - **وَاهِيَّةٌ** **Ustilago** **maydis, U. maydis-seae, U. zeae (S).** **Charbon du maïs (F).** **Common smut of corn (E).** **Maisbrand (D).**
 فطر مجهري واسع الانتشار يصيب الذرة الصفراء في جميع اقطار العالم وفي جميع اعصائها التربة والهوائيات من الجذور الى الازهار فيؤذيها ويشوهها او يملأها ويقتطعها . مظهره الخارجي كتل سود مختلفة الاشكال والاحجام ، مركب الاضواء بعد ان تحول لوانها الى غيرات بوقية مشربة السواد يراوح قطرها من ٧ الى ١٠ ميكرون . يكافح باستعمال اللودرة الزراعية الثلاثية وذلك لان استعمال الفولتيريل يظهر البذار ولكنه لا يظهر التربة التي ياربى اليها والتي تحفنه من عام الى هاتين .



واهرب الدخن

١١٢٦٨ - **وَاهِيَّةٌ** **Ustilago** **nigra (S).** **Charbon nu noir de l'orge (F).**
 فطر مجهري يصيب سنابل الشعير ليعطيها . مظهره الخارجي كتل سود ميمونة تركب جميع اغصان الزهر حتى الراشحات التي لا تقريبا . بويضات طياله خفيفة التكاثر الرباعي العرقي || اضراره زهيدة ، يكافح بتطهير البذار وباجتنب الزرع في المواقع الرطبة .



واهرب الذرة الصفراء (١)

١١٢٦٩ - **وَاهِيَّةٌ** **Ustilago** **bromivora (S).** **Charbon des bromes (F).**
 فطر مجهري يصيب مختلف انواع الثرغول في انوعها ليعطيها . مركب الزهرة يقيض على المبيض والاشعة بعد ان يحولها الى بؤرة من النيار والبرغ كلوية الشكل سمراء اللون تجو جامدة لزجة ثم تمل تدرجيا وتتطير منه لها كالمذاب || يكافح مكافحة واهرب الدخن اذا كانت زراعتة تدخل في نطاق النباتات المليفنة .



واهرب الذرة الصفراء (٣)

١١٢٧٠ - **وَاهِيَّةٌ** **Ustilago** **tritici (S).** **Charbon du blé (F).** **Loose smut of wheat (E).** **Weizenflugbrand (D).**
 فطر مجهري طفيل واسع الانتشار يصيب الحنطة وقد شجود عليها في جميع اقطار العالم ما عدا امريكا الجنوبية التي لا تزال حنطيا سليمة || مركب سنابل الحنطة فيضبط بقى حيا او يشوها ريشها . وقد مركب عقد السلايمات واعتماد المصنف || مظهره الخارجي يتور بوقية كثيفة التجميع خفيفة البشرة الناعمة السرية الصلب التي تنقل عن غيرات كروية سود قطرها نحو ٥ ميكرون . يكافح باستعمال الفلوراك المختلفة التالية :



واهرب الشعير

١ - في الاساليب الزراعية القائمة على اجتنب للمواقع الملوثة او على تغيير البذار او على جمع وسرق جميع السنايل المصابة .



واهرب الشعير

رُاهُوبُ الشَّعِيرِ الْمُخْتَلَف - رَاوَنْد

رياسي



راهوب الشعير المغلف (١)

المشج الشفائف. فيها عيوب الاربعة والفصح وقد يصيب الحلايا || تتميز بصفتها النحلي. دعماها جولية غير انصباطية. بوفاتها لا تباينة وكثرة البند || فطورها تسبب عدة وصور، وأشهرها الرسوم القمحية والاروبية. أشهر اجناسها التكتفوره والراوبوب والسحار والشيزونه والتطويل والقمحية والفريزة .

Abelle (F). Bee (E).

١١٢٧٨ - رَاهُوبٌ

في النحلة سميت بالراوية لسكونها في طليها .

Rheum (S).

١١٢٧٥ - رَاوَنْدٌ * وَرَوَنْدٌ

Rhubarbe (F). Rhubarb (E).



راهوب الشرائن

جنس نباتات طيبة عشبية جلجورية ممررة من فصيلة البطيانيات، أنواع عديدة جميعها غنية الأوراق الكبيرة البند، نصلها خارب الصفحة المشعبة. ابرارها متشكلى يرتكز على شرايين قرصية الانتحاب. انزاعها متنوعة. ثمارها عنبية || أعرف الأنواع وأشهرها ما يج .

Rheum australe (S).

١١٢٧٦ - رَاوَنْدُ الْجَنُوبِ

Rhubarbe australe (F).

نوع من الراوند الشرقي يملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم .
أوراقه صغرية البند قليلة الشكل تطول من ١٠ الى ١٤ سم .
أزهاره حر || جذوره طيبة شائعة الاستعمال .



راهوب الشرائن المغلف

Rheum emodi (S).

١١٢٧٧ - رَاوَنْدُ حِمَالَايَا

Rhubarbe de l'Himalaya (F).

نوع من الراوند موطنه سفوح جبال حلايا . يملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم .
أوراقه كبيرة البند تطول نحو ٦٠ سم .
نصلها أخضر اللون ناعم البشرة . أزهاره وثماره حر .



راهوب الرافنليات

١١٢٧٨ - رَاوَنْدُ ذَكَرٍ ، أَطْرَاوَنْدِي

Rheum raphanistrum (S). Rhubarb raphanistrum, R. anglicum, R. des moines (F). Raphanistrum, Garden rhubarb, Pie rhubarb (E). Pontischer rhubarb, Garten rhubarb (D). Barbaro raphanistrum, Raphanistrum (I).

نوع من الراوند التريبي يملو من ١٢٠ الى ١٨٠ سم .
أوراقه قليلة الشكل تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم .
وعنتها كذلك . نصلها رغو النسيج متتابع حايل الخشار .
عُملها مأكولة || أزهاره كثيرة البند لها الى اليافى الاسفر .



راهوب المصان

١١٢٧٩ - رَاوَنْدُ رِيَسِي، رِيَسَا، رِيَسَا، رِيَسَا

Rheum ribes (S).

Rhubarbe-groseille (F). Currant fruited rhubarb, Gooseberry currant (E). Persischer rhubarb (D). Rabarbaro acido, R. polposo (I).

نوع من الراوند وموئيات زراعي ممر موطن الشرق الاوسط . يملو نحو ١٠٠ سم .
أوراقه قليلة الشكل تطول من ١٥ الى ٣٠ سم .
وتعرض من ٢٠ الى ٤٠ نصلها جلدي النسيج، لونه الى المخضرة الزرقاء، نصلها مأكولة وترب .
ثماره مأكولة لكنها حارة الطعم ويستعمل منها وين نصل الأوراق حامض اللون . كما يصنع من عصاره ثماره بعض المرببات الصحية المشهورة ويستخرج من ايضاً بدلتغير لبني كحولي يعرف بخر الرياس || عذوبة عديدة تختلف باختلاف لون البذر بين الاسود والاحمر والابيض



راوند

ورقه فور ظهوره كما يحسن اجتناب الزرع في المواتع الربية .

١١٢٧٧ - رَاهُوبُ الشَّعِيرِ الْمُخْتَلَف *

Ustilago hordei, U. jenseni (S). Charbon couvert de l'orge (F). Covered smut of barley (E). Genstenhartbrand (D).

فطر مجهرى يركب سنايل الشعير فيحول مواد الحب الى كل من الراوبوب الاسود القمحي وذلك بعد ان يعلب الراشة ويحبب الاخشية || يكاتف كثيرا من الراوبوب .

١١٢٧٨ - رَاهُوبُ الشُّوْقَانِ *

Ustilago avenae, Uredo segetum avenae, U. avenae foliicola (S). Charbon nu de l'avoine (F). Loose smut of oats (E). Haferflugbrand (D).

فطر مجهرى يركب الشوكان فيعطب الحب وقد يقضي على كامل التشكيل || يبدو بنور كروية تشكلى داخل الزرع على الحب ثم تنم الزمرة مع اغشيتها وتظهر عيوب سود مرموبة بدلا من حبب الشوكان || يكاتف بتطهير البذار اما تنقياً بكميات النحاس اوتنقىاً بمحلول القرمول او باستعمال غيرها من الفواظير الفعالة الحديثة .

١١٢٧٩ - رَاهُوبُ الشُّوْقَانِ الْمُخْتَلَف *

Ustilago levis, U. avenae levis, U. kolleri (S). Charbon couvert de l'avoine (F).

فطر مجهرى يصيب الشوكان بعد تأثير زهره ليركب المبيض وينشأ عليه ثم يتم كامل اغشية الزمرة || منظره الخاربي كمثل من البثور البولية الازمية للمكسكة القليلة التفتيح والاختلال || يكاتف باجتناب زراعته في المواتع الربية وتطهير البذار .

١١٢٨٠ - رَاهُوبُ الْقَرْنَفَلِيَّاتِ * ، رَاهُوبُ بِنَفْسِيهِ *

Ustilago violacea (S). Charbon violacé (F).

فطر مجهرى يصيب نحو ١٠٠ نوع من القرنفليات . يركب مآبر الزهر فيمنع تكون جذوات الولع بعد ان يحول المآبر الى بنور بولية لها الى البغشي الباقي .
أضراره زهيدة لا توجب للمكسكة انما يحسن قطع وسرق الانذار المصابة اجتناباً لتفتي الوسم .

١١٢٨١ - رَاهُوبُ الْمَصَانِ *

Ustilago sacchari, U. scitaminea (S). Charbon des cannes à sucre (F).

فطر مجهرى يركب نواحي المصان على اختلاف أنواعه من البري الى قصب السكر || منظره الخاربي تأثير الى التنو يقضي عذوبة عام فذليل القلب الثاني مع أوراقه الحامية ثم ظهور فتائل سود تملو الازهار وتقلل من وسمه || يكاتف بتقاطع وسرق القصبان المصابة .

١١٢٨٢ - رَاهُوبُ التَّجِيرَةِ * ، رَاهُوبُ خَيْطِي * ،

Ustilago striiformis, U. linearis, Tilletia striiformis (S). Charbon linéaire (F).

فطر مجهرى طويل الحاية يمشي نحو خمس سنوات في التربة ودل النبات المنحدر . يركب التجير على اختلاف أنواعه . منظره الخاربي خطوط خيطية فضية اللون تركب نصل الأوراق بموازة البروق تنفضي على النسيج دون الكثرة وتركب سيقان المشاكل الزهرية فتصلها .

١١٢٨٣ - رَاهُوبِيَّاتٌ *

Ustilaginaceae (S). Ustilaginacées (F). Ustilaginacées (E).

فصيلة فطور مجهرية مغلفة من رتبة الدعاميات غزيرة

١١٣٠٠ - رِيّاح
Genetta (S). Genetta (F).
Genet, Genett (E).
جنس حيوانات لاحمة من فصيلة الزباديات . أنواعه ستة
موطنها أفريقية وأروبة وللشرق الأوسط . أجسامها
مستطيلة وذئبانها أيضاً . قرانها قصيرة خاصة الأصابع ،
طويلة الاظافر المنقطة . اذنانها متوسطة القد . اذنيها مشدرة ،
تُجج ظهورها عاكس اللون وسيد الخط || تألف الجبال
والبراري . تسرح في الليل . ترتاد اجرف الاثر وضفافها .
قرتها القواضم والقصاصير واللوبيات والحشرات . الاثني
تنصع جرراً وأحد في الحقل ترصعه نحو ثلاثة اشهر || اما
أنواعها الستة فهي ما يلي .

١١٣٠١ - رِيّاح ارطط
Genetta pralina (S).
Genetta praline (F).
نوع من الرباح ، موطنه يمتد من السنغال الى الترسقال ،
طوله نحو ٨٠ سم . صوته قصير الحلب . ثوبه صابغ اللون
كتيف التنبير ، خطوط ذنبه عامة مستعرضة .

١١٣٠٢ - رِيّاح أمدا
Genetta rubiginosa (S).
Genetta rubigineuse (F).
نوع من الرباح ، موطنه افريقية الجنوبية . طوله نحو
٨٥ سم . ثوبه الى الصبهة الشهباء ، تنميره امفر . خطوط
ذنبه متفرجة .

١١٣٠٣ - رِيّاح السنغال ، جرنط
Genetta senegalensis (S). Genetta du Sénégal (F).
Pale genett (E).
نوع من الرباح ، موطنه يمتد من السنغال الى القطب .
طوله نحو ٨٥ سم . ثوبه الى الصبهة الباهجة ، تنميره لا
قياسي الشكل ، ريشته رصبة القد لا نطاسية .

١١٣٠٤ - رِيّاح الغابون ، زويّام
Genetta felina (S). Genetta féline (F).
نوع من الرباح ، موطنه الغابون والكنغو وضفاف النيل
الازرق . وهو قريب الشبه من الزباد ، طوله نحو ٨٧ سم .
ثوبه الى الصبهة الرملية . تنميره يبيغ الشكل .

١١٣٠٥ - رِيّاح دَنْقَلَة * ، كديس الزباد
Genetta tigrina (S). Genetta tigrine, Genetta de
Dongola (F).
نوع من الرباح ، موطنه أفريقية الشرقية اخصها دَنْقَلَة
والنوبة . طوله نحو ٩٠ سم . ثوبه الى الصبهة الخطية .
تنميره جوي اللون ، خطوط ذنبه مستعرضة .

١١٣٠٦ - رِيّاح شاك * ، رِيّاح شاك
Genetta vulgaris (S).
Genetta commune (F). Common genett (E).
نوع من الرباح ، موطنه الشرق الاوسط وأروبة . طوله
نحو ٩٠ سم . جسمه ٥٠ وذنبه ٤٠ اما ارتفاعه فهو
١٥ سم . ثوبه الى الصبهة الغبراء ، تنميره الى الجؤرة
السراة . خطوط ذنبه متوسطة العرض || يعيش في الجبال
والجؤرة وقرب الماء . يسرح في الليل يتسلق الاشجار ويسوم
في اللد ويسبح . يدين ويقتل العلم ، يستعاد الجراذين
والفأر .

١١٣٠٧ - رِيّاح هو القردوح السبي ، اطلبه .

١١٣٠٨ - رِيّاح أبو الهول
هو القردوح الشبوت ، اطلبه .

١١٣٠٩ - رِيّاح زَيْتُونِي هو قردوح الحيشة ، اطلبه .

والاسفر والمشيح . || والرياس يطلى الحيات ويقوي
الاعضاء ولهمم ويزيل شعث الرغبة الجنسية والحفقات
والبلوبر .

١١٢٩٠ - راولند كتيّف
Rheum compactum (S).
Rhubarbe compacte (F).
نوع نو الراوند . مهده الصين . يطو نحو ١٠٠ سم .
اوراقه كبيرة القد مفرصة . فصلها متجعج الصفحة ، جامد
التسج السيك ، سنن الحاقه ، جيل الخضار الزاهي .
انزاعه يبيض || جلوره طيبة لكنّها اقل جودة ونوعاً
من جلور الراوند الجنوبي .

١١٢٩١ - راولند ككي
Rheum palmatum (S).
Rhubarbe palmée (F).
نوع من الراوند الشرقى . يطو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم .
اوراقه كبيرة القد ، مستطيلة المتق ، كتيبة التنصل
للمفصص الملبق الخضار . خزانة الزهري وضلوح اوراقه
ومرورها الى الجؤرة || انزاعه الى البياض الاخضر .

١١٢٩٢ - راولند مخزّني ، راولند صيني
Rheum officinale (S). Rhubarb officinale (F). Rhubarb (E).
Echter rhubarbar (D). Rabarbaro, Rubarbaro (I).
نوع من الراوند وهو نبات طبي وزراعي زَيْتُونِي . يطو
من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقه كبيرة القد خماسية
التفصيص فصلها جيل الخضار الباهت سنن الحاقه .
انزاعه كتيبة التسجج خضره اللون || جلوره طيبة
مديدة المتاع . تدخل في عدة مستحضرات وتساعد الهضم
وتدر الصفراء . وهو مقو للمعدة ، منه الهضم ، يقضي
مل البوليس والاسك . ويستعمل في حروسة المسعدة
واضطرابات الهضم لا سيما عند الاطفال .

١١٢٩٣ - راولوق
Débourbeur (F). Cleanser (E).
آلة تستعمل في ترويق الحمور البيضاء وفي تنظيف السافل
من البول والمادّن من التراب .

١١٢٩٤ - رايّيب ، حكاير ، صُخْخَر ، جاكيد
Callié, Coagulé (F).
لبن راب نشتر ولا يزال ذلك اسم حتى يتّزع منه زبد .

١١٢٩٥ - رايّيب
Etandard (F). Flag (E).
بنته في الازمة شلت من ريفاتها فلت واصبحت كالراية .

١١٢٩٦ - رايّيب
Compote, Jus (F).
صارة الفاكهة المغلية المكثفة .
Stewed fruit, Juices (E).

١١٢٩٧ - رايّيب العَمَل
Patron

١١٢٩٨ - رايّيب
Usure (F). Usury (E).
الربا الاقراض بفائدة يتجاوز حقيها حق الفائدة القانونية
او حق الفائدة المتصل به عادة بين المختارسين .

١١٢٩٩ - رايّيب
Stratocumulus, Cumulostratus (S).
ضرب من التيوم وهو محاب متواصل الطبقات والارصفة
ايغى اللون او اريد .



ريّاح دنقلة



ريّاح شائع



رُباعِيَّة

11324 - رُباعِيَّة الأَزْهَار Quadriflore (F).

نمت تعريفي يطلق على التنوير الرباعي الزهر.

11325 - رُباعِيَّة الأَسَدِيَّة Tétrandre (F).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات ازدهار رباعي الاسدية.

11326 - رُباعِيَّة الأَضلاع Quadrilalé (F).

نمت تعريفي يطلق على ما هو مركب من أربع أضلاع.

11327 - رُباعِيَّة الأَوْرَاق Quadrifoliata (E).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات أوراقه رباعية التجميع.

11328 - رُباعِيَّة الأَيْدِي Quadrumane (F).

نمت تعريفي يطلق على الحيوان الرباعي الأيدي كالفرد مثلاً.

11329 - رُباعِيَّة البُرُور Tétrasperme (F).

ما كانت بذوره رباعية التجميع.

11330 - رُباعِيَّة العِثْرَة Tétraploïd (F).

النباتات الرباعية العترة هي التي يبلغ عدد نسلها أربعة أضعاف عدد وحيات العترة.

11331 - رُباعِيَّة الفُصُوص Quadrilobé (F).

من النباتات ما كانت فصوص أوراقه أو أزهاره رباعية التركيب.

11332 - رُباعِيَّة القِيعَال Quadripétale (F).

نمت تعريفي يطلق على كل زهرة رباعية القيعال أي البتلات.

11333 - رُباعِيَّة القَوَائِم Quadrupède (F).

صفة الحيوان الذي يسير على أربعة قوائم.

11334 - رُباعِيَّة المَرَشِيف Tétrastome (F).

نمت تعريفي يطلق في علم الحيوان على كل دودية مزودة بأربعة مرشيف.

11335 - رُباعِيَّة المُكَافِئ Tétravalent (F).

هو ما يلزمه أربع ذرات من الهيدروجين.

11336 - رُباعِيَّة الأَوْرِقات Quadrifoliolé (F).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات أوراقه رباعية الأورقات.

11337 - رُباعِيَّات الخَيْشِيم Tétrabranchiaux (F).

رتبة من الرخويات وأسيات الاصل. مرتباتها وضائلها وأجناسها وأنواعها كثيرة العدد معظمها الأساح من صخور الازنة الغائرة || جمع حيوانات هذه الرتبة

11310 - رُباعِيَّة * Reteporus (S).

جنس حيوانات بحرية من الضفائيل التجميعيات وظيفية الصغاريات. أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الباردة والمتعددة الحرارة || مستمراتها شبكية التركيب و بؤية الشكل أو قدسية تشبب في الصخور وتضم مئات السنين.

11311 - رُباعِيَّة Retépore (F).

هو الرائد الرباعي، اطلبه.

11312 - رُباعِيَّة Sous-cape

أداة من اللث من مستطيلة القطع مستعرضة تستعمل لتثليل حشوة السيكار.

11313 - رُباعِيَّة Accolure, Lien, Ligature (F).

ما ربط به.

11314 - رُباعِيَّة Parpaing (F).

هو الحجر المقاطب الذي يلسف كامل عرض الجدار.

11315 - رُباعِيَّة وصل Linkage (F).

التصام يحصل بين جبينين في نشبة واحدة أنتقالها الوراثي يضم صفات الاثنين.

11316 - رُباعِيَّة أمْفُتَر Ophisure serpent (F).

سكة بحرية مستطيلة كدمى رسان البرق. اطلبها.

11317 - رُباعِيَّة جَتِيَّة رُباعِيَّة Pleure (F).

الرباط الجنبى فشاء معصلي المادة و متراكب للثاني يجمع عند المفصليات ، بين التربة والزوفين من الجانبين الأيمن والأيسر .

11318 - رُباعِيَّات Amphineures (F).

الرباطيات لفة من اللقائيات البحرية . اجناسها مبطنة أو دودية الشكل ، متناسقة الجانبين مركزها السلي يأتي بين الرغويات والديدان .

11319 - رُباعِيَّات Amphineura (E).

هي الأنثوس ، اطلبه .

11320 - رُباعِيَّة Quaterné (F).

نمت تعريفي يطلق على كل ما هو رباعي الانتساب كالاوراق مثلاً.

11321 - رُباعِيَّة الأَجْزَاء Quadrifid (F).

من الاعضاء النباتية ما كان رباعي الانقسام.

11322 - رُباعِيَّة الأَجْشِيعَة Tétrapède (F).

نمت تعريفي يطلق على الحشرات الرباعية الاجنحة.

11323 - رُباعِيَّة الأَوْرِجَل Tétrapode (F).

نمت تعريفي يطلق على الحيوان الرباعي القوائم.



رَبَاعِيَّةٌ

الطهر، جالس البطن. يطول من ٣٥ إلى ٥٠ سم. ثوبها جيل الاوان. ظهرها الى الزرقاء السمجنونية. جانبها ويطبق الى الصفرة الذهبية. رأسها وأعناقها مرقوشة باللحمي. فيها ميقع بالاسود. رأسها معتدل الجرم. قصير الخيط يطول حول ذهبي اللون فوق كل عين. شقلها معتدل الانفراج. فكها معتدلان. اسنانها ثلاثية الصفوف في الفك الاعلى، وربعيات في الفك الاسفل. عيناها كيرتان مستديرتان، جاحضتان. زعنفتها الظهرية واحدة، مستطيلة الشكل. زعنفتها الذيلية حلالية التغير. لحما فاخر الصنف، مغروب فيه.

١١٣٤٦ - وَرْدَانٌ ٥
Naucrates (S).
Pilot (F). Pilot-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شالكتات الزعانف وفصيلته الاستقريات. انواعه المعروفة قليلة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة. اجسامها اعليجية الشكل. سفنها صلب القيد. زعانفها الظهرية مستطيلة تتقدمها اربعة مناسخ متعقبة الحمة. زعانفها الشرجية فارقة || أشهر انواعه الربان للبلبل.

١١٣٤٧ - وَرْدَانٌ حَبْدُولٌ ٥
Naucrates ductor (S). Pilot commun, Fanfre (F). Common Pilot-fish (E).

سمكة من الربان. اصلها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة. تتميز بمواكبتها البواصر والسنن في رحلاتها عبر البحر ذهابا وايابا من بلاد الى بلاد || جسمها اعليجي الشكل يطول نحو ٣٠ سم. رأسها معتدل الحجم، شبه مخروطي الشكل. قصير الخيط. مستدير المنظر || ثوبها الى السمرة الفضية والذهبية الممزج يبقع عند الظهر ويغير عند البطن ويمتدق ثلاثة احزمة متغايرة العرض شديدة اللسرة || لحما كامن الصنف، مأكول قل من رطب فيه.

١١٣٤٨ - وَرْدَانٌ ٥
Archives (F).
Archives, Record office (E).

هي المحفوظات الكتابية من وثائق وغيرها، وأحدثها ريدي.

١١٣٤٩ - وَرْدِيَّةٌ ٥
Caroubier (F). Carob-trees (E).

هي شجرة الخرنوب الجوي او شجرة الخرنوب المأكولة الثمار.

١١٣٥٠ - وَرْدِيَّةٌ ٥
Caroubier (F). Carob-trees (E).

هو قردوح بيوان، اعليه.

١١٣٥١ - وَرْدِيَّةٌ ٥
Profit (F).
Archives, Record office (E).

هو ما تحقق من مكسب. والربح يقسم الى قسمين : ربح اجمالي او قائم وربح صاف.

١١٣٥٢ - وَرْدِيَّةٌ ٥
Lucrum cessans (F).
Archives, Record office (E).

هو الربح المتوقف حصوله في او نفذ المتعاقد التزام لان الفائدة في تقرير التحويل عن القرض في حساب الحسنة الفضيلة التي وقفت والربح النمل الذي فلت من عدم تنفيذ الالتزام.

١١٣٥٣ - وَرْدِيَّةٌ ٥
Buphthalmum (S).
Buphthalmum, Ciel de boeuf (F).

الاسم البلي من اليونانية بمعنى عين الثور || جنس نباتات عشبية مصرية من فصيلة المركبات. انواعه عديدة بعضها زراعي تربى، اوراقه متعاقبة. ازهاره وريسية ملقحة البيلات، حشوية الغلاف القرصي. يزدهر متوترة بالكليل مذهب || أشهر انواعه ما يقع.

ورباعيات الخياشيم والكل والاذنيات، كثيرة الالوان الشكل الفكية التي تحيط بالثمرة || اصداها شبه قرصية الشكل مجعولة عديدة الجيوب او الحبر || أشهر مرتباتها وفضائلها المستويات والرتبات والمخرنات.

١١٣٣٨ - وَرْدِيَّةٌ ٥
Mitoyenna (F). Midway (E).

من الانسان الفاعلة الاسمية وهي السن التي بين الثانية والثاب.

١١٣٣٩ - وَرْدِيَّةٌ ٥
Tétramères (F).
Tetramera (E).

وربية حشرات من مخدبات الاجنحة.

١١٣٤٠ - وَرْدِيَّةٌ ٥
Tétractinellidés (F).
Tetractinellides (E).

وربية من الاسفنج السواني.

١١٣٤١ - وَرْدِيَّةٌ ٥
Brassica oleracea napus (S). Rutabaga, Navet de

Subde, Turnep (F). Swedish turnip (E).

نبات جهش زراعي علفي يحول من فصيلة الصليبيات. جهته يبيي الشكل كبير اللحم اسمر القشور اسفر الجباب الجامد || يزرع كالقث يحرق في جميع الاقضية لكنه يربى في الملقح التي تكثر فيها الربوطة الجوية ويقل فيها الاشباع الشمسي || يستعمل كعلف البقر والحيل والخنازير والتمس.

١١٣٤٢ - وَرْدِيَّةٌ ٥
Plotax (F).
Plotax (F).

هو الرتي من الاسماك البحرية الصغيرة القيد.

١١٣٤٣ - وَرْدِيَّةٌ ٥
Chrysophrys (S).
Daurade, Daurat (F). Gilt-head (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات. انواعه عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الحارة. اجسامها اعليجية الشكل، تطول من ٤٠ الى ٥٠ سم. فلوها صغيرة، زعانفها الظهرية مستطيلة شائعة. اثنائها ملقحة اللون تشبه القرصي. لحما لذينة اللحم.

١١٣٤٤ - وَرْدِيَّةٌ ٥
Chrysophrys berda (S).
Daurade rose (F). Pink dorsado (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسبوريات ورؤية شالكتات الزعانف. اصلها بعض اقاليق البحر الابيض المتوسط والحيث الاملاسي. تتميز من اسماك المهاد والتفاف. مسرحها الاغواط القرصية النور || جسمها اعليجي الشكل، طويلا يربو من ٤٠ الى ٥٠ سم. ثوبها الى الودي اللهب الممزج فلوها شحنة زرقاء في الظهر وغيرها فضية الموج في البطن. زعانفها حشوية اللون باستثناء الصدريه لانها شائعة. رأسها معتدل الجرم. قصير الخيط. شقلها معتدل الانفراج. اسنانها ثلاثية الصفوف في الفك الاعلى، وربعيات في الفك الاسفل. عيناها كيرتان، مستديرتان، جاحضتان. زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة. زعنفتها الذيلية فارقة || لحما ابيض اللون، فاخر الصنف.

١١٣٤٥ - وَرْدِيَّةٌ ٥
Chrysophrys surata (S). Daurade vulgaire, D. biluneé (F). Common Dorsado, Gilt-head, Chad (E).

نوع من الرديك. اصلها سطر اقاليق البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاملاسي. تتميز من اسماك المهاد والتفاف || جسمها شبه اعليجي الشكل، مقوس



رَبَاكٌ



رَبَاكٌ بَرْدِيَّةٌ



رَبَاكٌ مَبْدُولَةٌ



رَبَاكٌ مَبْدُولٌ

التفاح



رَبْدُ صَفْصَافِي الْوَرَقِ

الصفحة المصغرة. ازهارها بنسجية. ثمارها صغيرة كروية سوداء، اللين لا تزكّل ۥ رغب في الازفة المنسقة الانسلاج والرطوبة. ملغوم باليدخات على الرق يشمر طوال السنة. ثماره لذية اللحم.

١١٣٦١ - رُبْدِيَّاتٌ ٥
Hypodermatacées
عارة فطور مجهرية من فصيلة الحشاريات ورتبة الرتبات. تتميز ببيتسها ومنهياتها الفائرة في التسج النباتية المنساعة. نكتاتها شفعية، رباعية أو ثمانية. نكتاتها عديدة، عيطية أو صقية، فراءه الرؤوس ۥ انجاسها عديدة منها واحد يوم الاقتصاد الزراعي يحيى القلوب.

١١٣٦٢ - رُبْدِيَّ
يربض الكيش عن الفم: ترك شرابها عن حياء.

١١٣٦٣ - رُبْدِيَّ
Intestine (F). Bowels (E).
الربض هي الاساء.

١١٣٦٤ - رُبْدِيَّ
Fondation (F).
Foundation, Ground-work (E).
الربض: أساس البناء وما على الأرض من التهي.

١١٣٦٥ - رُبْط
Atelage (F). Harnessing (E).
قرن أو شد الثواب بالجرور.

١١٣٦٦ - رُبْطِيَّ
Ligature (F).
هو تثبيت اعضاء النبات أو بعضها برباط.

١١٣٦٧ - رُبْطُ الْكَرْمَةِ
Accolage ou acolement de la vigne (F). Nailing up or joining of vine (E).
هو رفع وربط مروع الكرمة بالمسايمك.

١١٣٦٨ - رُبْطُ الشَّوَارِعِ
Liaison de contentieux

١١٣٦٩ - رُبْع
الربيع نجم صير من كوكبة التنتين مركزة في وسط الموائدة.

١١٣٧٠ - رُبْعِيَّ
Eumétrique (F). Eumetrical (E).
نمت تعريض يطلق في تسميتهم القواجان على كل حيوان مربوع الجيفة متوسط للقد والوزن.

١١٣٧١ - رُبْعِيَّ
Irrigation (F).
الربيع والري واسقاه واحد.

١١٣٧٢ - رُبْعِيَّ ٥ ، قَسْدِيَّلا ٥
Phaciidiella
جنس فطور مجهرية من الرغيات. يتميز ببعيدته المنسقة المستندرة، ببنيه البيضي الشكل الوحيد الخلية وبنكاته البنفسجية الزلام الاصل ۥ لشهر انواعه ربغ التفاح.

١١٣٧٣ - رُبْعِيَّ التَّفْاحِ ٥ ، قَسْدِيَّلا دِيَسْكُولُون ٥
Phaciidiella discolor, Phacidium discolor, Phacidio-pyris furfuracea, P. malorum, Discula pyri, Fuckelia conspicua (S).
فطر مجهرى يركب التفاح والاصاص والسفرجل في انصاتها وثمارها فيؤذيها ۥ يصيب انصان واذا ان الجبار الضعيفة فيقرح ثمرورها ويصلها. مظهره الخارجى بنق فضية، منخفضة الوسط الاطصل، مرتفعة الحافة الحطية المنحدرة. وهو على الكبار عند تمام ادراكها وفي اثناء خبزها يتسج



ربغ التفاح

١١٣٥٤ - رُبْدُ صَفْصَافِي الْوَرَقِ *

Bupththalmum salicifolium (S). Bupththalmum à feuilles de saule, Cèil de bœuf à feuilles de saule (F).

نوع من الربد يملو من ٣٠ الى ١٥٠ سم. ساقه نحيلة اوراقه سنانية طولها نحو ١٠ سم. عرضها ٢ ، نصلها جلد النسيج الرقيق، ازغب البشرة على صفحتيه. ازهاره كبيرة القد فردية الارزكاز.

١١٣٥٥ - رُبْدُ ظَرْفِيَّ *

Bupththalmum speciosum, Telekia speciosa (S). Bupththalmum élégant, Cèil de bœuf élégant, Télékia élégant (F).

نوع من الربد يملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه غليظة، اوراقه قلبية الشكل ممتعة، نصلها مائل بشرة الصفحة العليا، ازغب السفل. ازهاره كبيرة القد قطرها نحو ٨ سم.

١١٣٥٦ - رُبْدُ قَاصِرِيَّ

Bupththalmum speciosissimum, Telekia speciosissima (S). Bupththalmum superbe, Cèil de bœuf superbe, Télékia superbe (F).

نوع من الربد، يملو نحو ٥٠ سم. ساقه غليظة قوية. اوراقه حاشنة كبيرة القد ميكية التصل الجليدي الازغب. ازهاره كبيرة، قطرها نحو ٦ سم.

١١٣٥٧ - رُبْدُ ثَقِيْن ٥ وَرْدُ الْحَمَارِ

Bupththalmum graveolens (S). Bupththalmum fétide, Cèil de bœuf fétide (F). Oxeeye (E). Rindsuge (D). Buftalmo, Occhio di bus (I).

نوع من الربد، يملو نحو ٨٠ سم. اوراقه مستطيلة المنح ميكية التصل الباهت المنفسار. ازهاره شاذفة البتلات، لونها الى الصفرة القابضة. يكثر في الاراضي البور للتوسط الانساج.

١١٣٥٨ - رُبْدُ ثَوْر ٥ *

Rhipidura (S). Rhipidura (F).

طائر من الجواثم سليات المتانير وفصيلة الملبابيات. موطنه ماليزيه والجزر المجاورة. يأنف النباتات وصفات مجاري الماء. قوته اللذاب والمهام ۥ جسمه صغير القد، مستطيل الذنب المردسي الشكل. ثوبه الى النضجة الطحلاء. حمراه وزوره وانفكه الى التبرية، ويميلو في حمريه من قاعده الشفق الى المنق، جيدة حايقة السيرة كما في الرأس ۥ يأنف حث في الانجار الرقيقة. حثه كالكلوب جيد الحيك بالخشيش الناعم. الاثنى تحضن بتناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات على مرتين في الحبل، القرغيم يستمر نحو ١٢ يوما.

١١٣٥٩ - رُبْدُ رُبْعِيَّ

Troupeau de ruminants sauvages (F). Drove of savage ruminants (E).

سجاعة البقر الوحشي وسائر الحيوانات الحنطرة.

١١٣٦٠ - رُبْرَقِيَّ ٥ ، أَفْأَنِيَّة ٥ ، مَعْدُ أَسْوَد ٥ ، حَيْثَبُ اللَّذْبِ

Solanum nigrum (S).
Melongèna noire, Morella noire, Amourette, Tue-chien (F). Black nighthade, Hound's-berry (E). Schwarzer nachtschatten (D). Morella, Solano nero, Solatro. ortense (I).

جنبه روية دمرة من الفصيلة الباذنجانية. ساقها غليظة، فراءه، شائكة. اوراقها كبيرة القد مسقة، نصلها مائرج

حتى اواخر ايلول . تسرح من الشروق الى نحو الساعة
الثامنة ومن العصر الى الدخنة . تساد بعد ظهورها بثلاثة
اشهر . تنجح المكن في التربة على عمق ٥ او ٦ سم .
البرقة عند بلوغها الادراك الجسموري الذي يحصل بعد
التفت بنحو ٢٦ شهراً تقو نحو ٢٠ م . ثوبا الى اليافس
الاثير . جسمها مستطيل الجرم ، مقوس الشكل ، مستصفي
الرأس الاسود ، ضلع التآخير ، سداسي الرواجب النسر
طول الاكمال الذي يستمر نحو حشرة اسابيع يقضي في
التربة على عمق نحو ٢٠ سم . داخل جراب خشن من
التراب والغاب .

١١٣٨٢ - وَيْبِيَّةٌ مُنْطَقَةٌ *

Pentodon punctatus (S). Pentodon ponctué (F).
خنافس من فصيلة الجمليات . جسمها بطول نحو ٢٢ م .
ويعرض نحو ١٤ م . رأسها مستعرض الشكل . ظهورها
محدوب . ثوبا الى السمرة اسود المواج . نمطها مجذعان
محيوط دقيقة تليو كالنقط المتتامة . ريقها كبيرة القد ،
مقوسة الشكل ، غبراء اللون ، تعيش نحو ثلاث سنوات ،
تركب جلود النباتات من اي جنس ونوع .

١١٣٨٣ - وَيْبِيَّةٌ حَسِيكَةٌ (F). Dividende (E).
هي الحصة من الربح الصحيح وقد تكون حقيقية او
صورية .

١١٣٨٤ - وَيْبِيَّةٌ الريد ، تمر نضد ثم نضج بالماء .

١١٣٨٥ - وَيْبِيَّةُ الدَّيْءِ ، رَجُلُ الطَّيْرِ ، رَجُلُ الْعَصْفُورِ
Ornithopus (S). Ornithope, Pled d'oiseau (F).
Bird's-foot (E). Vogelfuss (D). Ornithopa (I).
جنس نباتات حشوية برية وتطفو في فصيلة الطفائيات
القرعاش . انواعها ستة ترضف في الازرة الرملية والتقلية
الانفلاج . اوراقها متصافية مركبة وثرية ، وريقها
احليبية صغيرة . انهارها محورية ، زنادة ، صوبانية
التجميع ، يضاها اللون او وردية . ثمارها قرون دقيقة
اسطوانية الشكل متفاوتة الطول حوية المقعدة تشبه رجل
الطير . يزورها صغيرة شبه كروية . اشهر انواعها ما يلي .

١١٣٨٦ - وَيْبِيَّةُ اَنْ قَرَم (S). Ornithopus perpusillus (S).
Ornithopus hain (F).
نوع من الريدان البري النجسي الصغير القند . انهاره
بيض . يقال انه من النباتات الطبية يدر البول .

١١٣٨٧ - وَيْبِيَّةُ اَنْ مَرَّعَوِي *

Ornithopus sativus (S). Ornithope cultivé, Serradelle (F). Serradilla, Common bird's-foot (E). Serradella, Kleiner vogelfuss (D). Ornithopa sativa, Serradilla (I).
نوع من الريدان الكلائي ، زهر وودي اللون ، يزرع
في الحقول والمراعي . حلقه جيد الصنف رغب فيه الماشية .

١١٣٨٨ - رَيْبِيْع (F). Printemps (F). Spring (E).
فصل من فصل السنة بين الشتاء والصيف . مدته ثلاثة
اشهر من ٢١ اذار الى ٢٠ حزيران . يبتدىئ نحو زول
الشمس من برج الحمل . وفيه يستوي الليل والنهار ويتبدل
الزمان ويطب لمواء وجب الشمس وتزول التبرج وتسل
الاريدة وتنح العين ويوزع الشجر ويتلاذ الزهر في الربو
والخلل . يعدم ان ان تبلغ الشمس آخر الاجزاء حيث
يقبل الصيف .

مستدرة فنية خلية حنطية اللون تركب البشرة المحمودة
والملطوبة تسجل في اغلال الاخلايا والنساد
يقلم وصرق الاغصان والافانق للمصابة ثم تظهر الجروح
بمحلول سلفات الحديد او سلفات النحاس .

١١٣٨٩ - وَيْبِيَّةَاتٌ *

Phacidiaesae
عزارة ظهور مجهرية من فصيلة الحشا وريات وربة الزقيات .
اجناسها وانواعها عديدة تتميز بقصصها اللاقياسي الذي
يفصل من النخيرة او يلصم بها . مدنتها مستدرة
منبسطة . يوضا يضي الشكل خفاف وسيد الحلية . نكتها
بنفسجية الزام الاصل
لشهر اجناسها التي تسمى الثبات
ثلاثة : الربيع والثرية والقواوية .

١١٣٩٠ - وَيْبِيَّةٌ (F). Emprise (F). Expropriation (E).

Plotax
جنس اسماك بحرية من فصيلة السلطيات صغيرة القند
مفلطحة مستدرة زاوية الاطراف البعيدة ، تكثر في البحار
الحساسة .

١١٣٩٧ - وَيْبِلٌ * ، قَرَصُ الْعُرَابِ (S). Randa (S).
Randie (F). Ink plant, Ink-berry (E). Randie (D).
Randia (I).

جنس جنات وشجيرات برية وثرية من فصيلة الغويات .
انواعها عديدة جميعها فراء السور ، بعضها شاك . اوراقها
متقابلة او رمية لثلاثية احليبية الشكل ، متايبة النصل ،
ممتعة . انهارها فردية التجميع ابطية الارتكار . ثمارها
منية متينة ثنائية الفلق . ترضف في الاراضي الرطبة . تكثر
في المناطق وعل صفات الانهر . يستخرج من ثمارها صباغ
ازرق قاصر الصنف .

١١٣٩٨ - وَيْبُورُ الشجرة العظيمة الواسعة .

١١٣٩٩ - وَيْبِي
الشاة التي وضعت سدنتا . وقيل الرب من المخر والريوث
من الضان وجسمها وارب .

١١٣٨٠ - وَيْبِيَّةُ النَخِيلِ * (S). Phyllognatus silenus (S).
خنافس من فصيلة الجمليات . طولها نحو ٢٠ م . وعرضها
١٢ م . رأسها عرضي صلح يقرب مدب . ثوبا كستنائي
مولح لل سمرة . نمطها مستدير الطرف . تعيش بين
النخل وترضف في المناطق الرملية . ريقها تركب جلود
الكربة ويلصقها على سطح التربة .

١١٣٨١ - وَيْبِيَّةٌ حَشِيكَةٌ *

Pentodon Idiota (S). Pentodon nigaud (F). Pentodon Idiota (E).
حشرة خاضعة لمدت من فصيلة الجمليات وربة مضمات
الانحة . موطنها الشرق الاوسط . تألف المزارع والبساتين
والكروم والارواطين . خنافسها تعيش على اوراق النبات .
يرقاتها تركب الجلود الثانوية وللشجرة
الشكل . متوسط القند ، بطول من ١٨ الى ٢٠ م .
ويعرض من ١٢ الى ١٣ م . ثوبا الى السواد اللامع يعلو
خلل دقيق . رأسها مستد الجرم . قصير الخط ، ضلع
التكئين الثريين . زيانها صمغران ، صمغيا الاطراف
عنابا صغيرات بارزتان . ظهورها مستد الاحدياب
مقنوم الطرف لا يلصق كامل البطن . نمطها متتامة
التجزير الخفيف . اسرارها خاسية المنقل
اللون . تخرج الحشرة الجملانة من مكنتها في نيسان وتبقى



ريدل



رية النخيل



وية حشية



رية منقطة



ريدان مرعوي

١١٣٨٩ - رَيْمِيَّة (E). Vernal, Spring-like (F). Vernal (F).
نمت ترميز يطلق على ما يخص بالرياح.

١١٣٩٠ - رَيْمِيَّة (S). Primulacées (F). Primulacées (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدة النعالة ، تشمل عدة أجناس وأنواع ، أشهرها زهرة الربيع وبخور مريم وسحيفة الخلد.

١١٣٩١ - رَيْمِيَّة (E). Autosome (F). Autosome (E).
اسم يطلق على مجموعة الثقب الموجودة في كل حبيبة حيوانية.

١١٣٩٢ - رَيْمِيَّة (E). Sanglier (F). Wild boar (E).
الزئ هو الخنزير الوحشي. الذكور ينحى الشعر والانيث الرث. أنواعه عديدة موطنها العالم القديم ، وأمرها وأشهرها الأربعة التالية :

١١٣٩٣ - رَيْمِيَّة (E). Sus cristatus (S).
Sus cristatus (F).
نوع من الخنزير الوحشي يتميز بقرنيه الطويلة المغطاة بالاسود الممتدة من القفص إلى الكتف. ذنبه قليل الغلب. أذنه مغطاة الصفيحة الجلدية ، حليته الناعمة. جثته متوسطة القد طوله نحو ١٥٠ سم. طولها ٩٠ || موطنه الهند حتى ارتفاع ٤٥٠٠ م. ويرتدب ويصغر الجوز الأخرى || أناته تقص من ٤ إلى ٦ خنايخ مرتين في العام.

١١٣٩٤ - رَيْمِيَّة (E). Sus salvanius (S).
Sanglier main (F).
نوع من الخنزير الوحشي ، موطنه مغرب حلايا. جثته صغيرة القد طوله نحو ٦٠ سم. طولها ٣٠ ويذله ٣ سم. يعيش طمأن صغرة براوح عددا من ٥ إلى ٢٠. يألف الاسراع والادغال والمراعي الطبيعية الريفية الاضباب. أناته تقص مرة واحدة في العام من ٦ إلى ٨ خنايخ.

١١٣٩٥ - رَيْمِيَّة (E). Sus scrofa (S).
Sanglier commun (F). Common wild boar (E).
نوع من الخنزير الوحشي ، فروجه عديدة موطنها آسيا والشرق الأوسط وأروبة وجزر المتوسط وأفريقية الشمالية إلى مصر والسودان || جسده غليظ الجثة ، طوله نحو ٢٠٠ سم. طولها ١٠٠ ذنبه ٢٥. أما وزنه فيراوح بين ١٥٠ و ٢٠٠ كيلو. قوائمه صغيرة قوية ، رأسه ضخم فنتليته مستطيلة. أذنه منتصبة ، حليته كثيف التجميع يغلف ويغطي عند ثقب الظهر || يعيش جماعات مختلفة العدد. يألف البدايات والمخربق المزدردة. يسرح في الليل. أناته تقص من ٦ إلى ١٠ خنايخ مرتين في السنة.

١١٣٩٦ - رَيْمِيَّة (E). Sus vittatus (S).
Sanglier rayé (F).
نوع من الخنزير الوحشي ، فروجه عديدة ، موطنها جارا وسوترا وبورديو وألمنة الصينية. يتميز بخرو المسنج وبقرنيه السوداء التي تمتد من القفص إلى الأوتار الظهر. جثته متوسطة القد طولها نحو ١٢٠ سم. وتطول ٦٠ || يألف الاسراع والمناقع والاضباب الكثيفة اللدنة. أناته تقص من ٦ إلى ٨ خنايخ.

١١٣٩٧ - رَيْمِيَّة (F). Phytocachia (F).
الزيتية بحث من مجموعة مباحث علم النبات يخص بالتصنيف والتسمية.

١١٣٩٨ - رَيْمِيَّة (F). Lithologie (F).
العالم يتكون الجحارة.

١١٣٩٩ - رَيْمِيَّة (E). Lithologie (F). Lithology (E).
علم الجحارة وتركيبها.

١١٤٠٠ - رَيْمِيَّة (E). Ratanhia (F). Ratanhia, Krameria (S).
جس نباتات جنسية طية معمرة من المستنرات وخصلة اللبنيات. أنواعها المعروفة ٢٠ أصلها البلاد الأمريكية تكثر في بوليفيا والبيرو. سوقها فروع. أوراقها سائبة متعاقبة ، ناعما صغرة القد جلدية. أزهارها فردية التجميع محورية الأركانز يكثر فيها اللون الأحمر. ثمارها كروية ناعمة تلتف بعض البسات المستدرة || جلجورها ليفية التركيب أنيقة الانتشابه والاستداده ، نجها بجواري اللون فهي بعض المواد المقوية النعالة الجزلة النع || أشهر أنواعها ما تبع.

١١٤٠١ - رَيْمِيَّة (F). Ratanhia indica (S).
Kramérie rouge, K. de Savanille (F).

١١٤٠٢ - رَيْمِيَّة (S). Ratanhia secundiflora (S).
Kramérie grise, K. du Mexique (F).

١١٤٠٣ - رَيْمِيَّة (S). Ratanhia officinal (S).
Kramérie officinale, K. triandra (F).

١١٤٠٤ - رَيْمِيَّة (E). Ordre (F). Order (E).
هي في تصنيف الاسماء جراح الفصائل لمتشابهة.

١١٤٠٥ - رَيْمِيَّة (E). Marche de l'escalier (F).
الرتبة : الواحدة من رتبات الدرج.

١١٤٠٦ - رَيْمِيَّة (F). Retama (S). Retama (F).
جس نباتات معمرة برية ورَيْمِيَّة من فصيلة القرنيات. أنواره قليلة مبهما الشرق الأوسط. جميعها نباتات تملو من الخمرين إلى الثلاثة أمتار. سوقها فروع اسلية الشكل. فروصها الزهرية مرابطة أما الملقرة فذات أوراق صغيرة بسيطة مستطيلة التصل الحموي أو خضلة. أنوارها عتقوي التجميع ، محوري الأركانز. أزهارها صغيرة القد ، كثيرة البدد ، يضاء اللون || تنوردها يستمر من شباط إلى أواخر نيسان.

١١٤٠٧ - رَيْمِيَّة (E). Gemmage (F). Tapping (E).
استغلال أو امتصاص راتنج السنوبريات وذلك بجز سوق هذه الأشجار واتقاط ما يسيل منها من الراتنج.

١١٤٠٨ - رَيْمِيَّة (F). Cul-de-sac (F).
Blind alley (E).
كل منجم لا غير فيه وكل طريق غير ناظ.

١١٤٠٩ - رَيْمِيَّة (E). Sous-ordre (F).
Sub-ordre (E).
الرتبة في تصنيف الاحياء تأتي بعد الرتبة وقبل الفصيلة.



رت اعفر



رت مبلول



رت

الصردية الى التي الاسمر . وراجها البلغة طول دقيقة ||
طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوما يتقضي ضمن
صلبة متينة الحيك تنسجها البقرة على صلح النمل بعد
ان تطويه وتبكيه بخيط حريري متصالية .

١١٤١٧ - رتبة Ranger (F). To range (E).
رثت الدجاجة بيضا : جمته . ورتك البيض في الحامضة :
رتبه .

١١٤١٨ - رتبة الرجمة : يهاض في طرف انث الفرس .

١١٤١٩ - رتبة Rhytisma
جنس فطور مجهرية من الرنيتات وفصيلة الخشاريات
يتميز بوزيمة تنشأ وتنمو في فصل الورقة للنحار تحت
الساقة الأدمية . تحضن في داخلها الاصلان التي تضم البرغ .
بونها كيف التمة : بسيط التركيب ، خطي الشكل ،
شقات || انواعه قليلة اشهرها رتمة القيقب ورتمة
المصفاص .

١١٤٢٠ - رتبة الصمغاص Rhytisma salicinum, Melasma salicina (S). Maladie
des croutes noires du saule (F).
نظر مجهرى يصيب اوراق الصمغاص فيشوها || مظهره
الخارجي يقع بمجتمعة نائنة لا قياسية الشكل والحجم ، لونها
ال اسمر ، تركب نصل الازراق حل صفاته العليا
تتمدد النصل وتحميه وتشوهه || اغزاره طفيفة لا
تستويب للمكانفة .

١١٤٢١ - رتبة القيقب Rhytisma acerinum, Melasma acerina (S). Maladie
des croutes noires de l'érable (F). lar spot of maple
(E). Pochfleckkrankheit des ahorns (D).
نظر مجهرى يصيب القيقب في اوراقه فيضنها . مظهره
الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحجم تكثر فيها الاستدارة .
قطرها يراوح من ٧ الى ١٨ سم . تركب نصل الازراق
حل صفاتها العليا تهموز قيقبو صفراء اللون ثم سمراء
يعطيها اطراف مهدب || اغزاره عمودية الاثنى لا تستلزم
المكانفة . حل ان استمال سائل بورود مرة واحدة عند
الانواع يفيد . ومنهم من استعمل الاسمدة الازوتية لانها
تقوي مناعة الازراق وتضعف الرتمة .

١١٤٢٢ - رتبة Arthritis (F). Arthritis (E).
هي التهاب للمفصل . اعليه .

١١٤٢٣ - رتبة Trechidae (S).
Trechidae (F). Trechidae (E).
فصيلة حشرات قانصة نائمة من رتبة غدييات الاجنحة .
اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها من حشرات الانابيب
الحارة والمضلة الحرارة || جميعها صغيرة القند قلي تجاور
طول الواحدة منها ١٠ سم . رؤوسها كروية الشكل ،
صغيرة العين الناشرة ، مستطيلة الزباني الكشارية الفصل .
كرواسها قليلة الشكل . احامدها لاسقة ثنائية الاغاديد
المتطابقة المتوازية . اثارها مخيفة الالوان || تسرح في
النبات وتبيت في الليل . تنسى بسرعة ورياسة وتغير عتقة ||
قوتها ما تيسر لما من الحشرات الدنيا واليدان || اشهر
اجناسها الرتبة والسيرة والبنوس .

١١٤٢٤ - رتبة Septocylindrium
جنس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . مشجبه داخلي

١١٤١٠ - رتبة Tarentula (S).
Tarentule (F). Tarantula (E).
جنس حشرات من المناكب ينتمي الى فصيلة الخنثريات .
انواعه قليلة جميعها متوسطة القند ، قانصة ، مقفرة وسامة .

١١٤١١ - رتبة Araignée des caves (F).
دورية من المناكب تسمى شبيعة ، اعليها .

١١٤١٢ - رتبة Araneja (S). Aranéides (F).
Araneids, Spiders (E). Spinnen (D).
هي المناكب رتبة من الخنثريات عديدة الفصائل والانجاس
والانواع .

١١٤١٣ - رتبة Lygodium (S).
Lygodier, Lygodion (F). Climbing fern, Snake's
tongue fern (E). Schlingfarn, Kletterfarn (D).
Ligodia (I).
جنس نباتات سرجسية من فصيلة الرنيتات . انواعه
المعروفة ١٥ جميعها نباتات حارسة ملتفة ممرمة . يقال
انها لا تنحل من الفوائد الطبية وقد تنفع الصدر والاعماه .

١١٤١٤ - رتبة Schizesea (S).
Schizaeceae (F). Schizaeceae (E).
فصيلة من السرجس اجناسها نحو ١٦ . انواعها كثيرة
العدد جميعها رية ، منبها المناطق الحارة الرطبة . اشهر
اجناسها الرتبة .

١١٤١٥ - رتبة Laie (F). Wild sow (E).
انث الرث اي الخنزير البري .

١١٤١٦ - رتبة الأشجار الملوكة *
الأشجار الملوكة *
Lyonetia clerckella (S).
Mineuse des feuilles des arbres fruitiers (F).
Apple leaf miner (E). Obstbaum-Miniermotte,
Schlangenniniermotte (D).

حشرة من فصيلة القويديات ورتبة سرجفيات الاجنحة .
اصطلاحا تمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية .
تألت المواتع التي يكثر فيها التفاح والكرز والخوخ .
فراشتها جارية قوتها رحيق الانصار . سرتها لامة قوتها
خلابا نصل الازراق || جسمها نحيل قثيف ، يطول
نحو ٤ سم . سطحتها من ٨ الى ١٠ سم . واسها معتدل الحجم ،
شبه مكور الشكل . عيناها صغيرتان ، بارزتان . زباناها
عيطان . ملعسا قصيرة ، مرتفعة معتدل الطول . جوفها
اشهب اللون كالبطن . رواشتها صغيرة ، الاسمانيا الى
الخطبات الى الشهية الخطية . اما الاحداث فالى الشهية
الزائرة || لها ثلاثة اصيلان في الحول . تسرح في النهار
وتستكن في الليل . تبارش الاثنى متح الممكن بعد الكوم
يومين وتستمر عليه نحو خمسة ايام وتزود مبيدات في
الصفحات السفلى من نصل الازراق . يتغذى الممكن بعد
منحه بنحو ٨ ايام من اسارع دقيقة تلم النصل في تسجيته
المادي تحت البشرة وتغذله فيه انفاقا مستطيلة ، متعرجة
تتم فيها حتى نهاية الطور الاسروي اي نحو ٢٥ يوما ||
البقرة عند بلوغها الاطوار تمام تطول نحو ١٠ سم . جسمها
وشعي الشكل ، تنبي اللون ، اسمر الرأس . ملها ورواجها



رتبة



رتبة



رث



رتبة ملوكة



رتبة الصمغاص



رتبة القيقب



رَيْبَةُ الْجُدُور



رَيْبَةُ الْقَطْن



رجل



رجل

١١٤٣٥ - رَجُوجُ *
Gnetum (S). Gnèta (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة المليات. منها
البلاد الحارة. أنوعها نحو ١٥ منها الجنبات المفادة المارسة
ومنها الشجيرات الغراء المعقدة. أوراقها مستطنة، متعاقبة،
ينضج للنصل المتصم. ازهرارها سنبل التجميع اعطى الارتكاز
اشهر أنوعه الثلاثة التالية.

١١٤٣٦ - رَجُوجُ جَكَوَا
Gnetum gnemon (S).
Gnèta de Java (F).
نوع من الرجرج الزراعي. أوراقه النامية مأكولة وبلدوره
كللك.

١١٤٣٧ - رَجُوجُ طَبِي
Gnetum urens (S).
Gnèta rafraichissante (F).
نوع من الرجرج الزراعي. بلدوره مأكولة. يستخرج
من ساقه عصارة لزجة مرطبة عديدة المنافع الطبية.

١١٤٣٨ - رَجُوجُ لَسِيَجِي
Gnetum fulmiculare (S).
Gnèta textile (F).
نوع من الرجرج الزراعي الصناعي. يستخلص من ثمره
الياف صناعية لسجية.

١١٤٣٩ - رَجَعَكَة
Réceptas, Reçu (F).
Receipt, Received (E).
محور أو وصل تدون فيه بالتفصيل والبسر البضائع التي
صار استلامها.

١١٤٤٠ - رَجَعِي
Rétroactif (F). Retroactive (E).
جاء مدفوعه على الماضي.

١١٤٤١ - رَجَعِيَة
Rétroactivité (F).
Retroactivity (E).
هي رجسية الار اي نقل اثر القانون أو الحكم أو أي
عمل قانوني الى الماضي.

١١٤٤٢ - رَجَعِيَة الشَّرْط
Rétroactivité de la condition (F). Retroactivity of
condition (E).
هي نقل أثر الشرط الى يوم العقد القانوني فإذا حل الشرط
المؤقت حدث أثره منذ يوم تحرير العقد وإذا كان الشرط
فائضا اختبر العقد كان لم يكن قط.

١١٤٤٣ - رَجَل
Pied (F). Foot (E).
هي القائمة وتسمى الحافر في الخيل والخلف في الابل والخلف
في البقر والسان.

١١٤٤٤ - رَجَل، رَجَلَة
Multitude, Troupe (F).
Multitude, Troop (E).
سرب أو جماعة الجراد وما اشبه، ج أربال.

١١٤٤٥ - رَجَل الْأَرْتَب
هو نقل البر، اطلبه.

١١٤٤٦ - رَجَل الْأَسَد
هو القديان الجلي، اطلبه.

١١٤٤٧ - رَجَل الْإَوْدَة
راج أئينة.

١١٤٤٨ - رَجَل الْجَبَّار الْيُسْرِي
Rigel Elgebar (F). Rigel (E).
نجم نير من كوكبة الجبار أي الجزء. مركزة على القدم
اليسرى. ويدعى أيضاً رجل الجزء اليسرى. يجد من
الأرض نحو ٦١٠ سنة ضوئية.

الانتشاب، جربه الكيفية مهمة التوضيح، شديدة
التصر. ككائنه قلايدية، مؤثرة، ضمية التجميع. أنوعه
نحو ٢٥ جميعها لا مؤذية أضرها رَيْبَةُ الْجُدُور ورَيْبَةُ
القطن.

١١٤٤٥ - رَيْبَةُ الْجُدُور *
Septocylindrium radiculum (S).

نظر مجهرى يركب أوراق القطن دون أن يؤذيها ||
الغاريبي لطخ مستطيلة طولها نحو ١٠ م. لعن النصل
على صفحتي أعليا. تبهر غشاء اللين ثم تنحرف الى السمرة
وتبقى حل حالها ولونها حتى آخر عهدا.

١١٤٤٦ - رَيْبَةُ الْقَطْن *
Septocylindrium areola (S).

نظر مجهرى يركب أوراق القطن دون أن يؤذيها ||
الغاريبي لطخ مستطيلة طولها نحو ١٠ م. لعن النصل
على صفحتي أعليا. تبهر غشاء اللين ثم تنحرف الى السمرة
وتبقى حل حالها ولونها حتى آخر عهدا.

١١٤٤٧ - رَجَكَة، سَيْسُولُوجِيَة
Séismologie, Sismologie (F). Seismologie (E).

الرجاجية أو السيسولوجية علم يبحث في الزلازل والاضرابات
الارضية.

١١٤٤٨ - رَجَاع
Retour (F). Return (E).
وقت الرجاء أو زمن الرجاء هو زمن رجوع الطير بعد
فصلها.

١١٤٤٩ - رَجَاكَة
Stabulation (F). Stalling (E).
الرجانة والرجن هي تربية الدواجن في المرباط والاصطبلات
ولمراح لا في المراعي.

١١٤٤٠ - رَجَمَان *
Madrépore (F). Madrepore (E).
نوع من الرجانة، مهدد عمار البلاد الحارة وأستوائية.
ركبته معدة رجسية التركيب كثيرة الفروع والشعاب
والانفاق.

١١٤٤١ - رَجَمَانَة *
Madréporaires (F).
نوع من المرجانيات الزهرية وهي حيوانات بحرية من صف
المحفلات تتميز بالفراغات الجصية المتراكمة وبنائها
الكبيرة المنقشة التي تصنع كالشعاب.

١١٤٤٢ - رَجَمَانِي *
Madréporique (F).
Madreporeic (E).

نعت تمردي في يطلق على الحشاش والصخور البحرية
الشعرة والمنقشة كدائع الريان.

١١٤٤٣ - رَجَمَانِيَة *
Rajanie (F).

جنس نباتات جنبية عارفة من فصيلة النيصتوريات.
أنوعها المعروفة ستة أصلا منها أمريكية الوسطى والأنتيل.
أندورها عشقوية. سوقها لينة ملتفة. أوراقها مستطنة
متعاقبة قليلة النصل. ازهرارها ثنائية المسكن. ازهرارها
سنبل التجميع، اعطى الارتكاز. ثمارها تعلق بعض
الزور للفيقة الفردية الجناح. عاقلها ديماسية لياينة
مأكولة تستعمل استعمال الانعام أي البطاطا الصيفية.

١١٤٤٤ - رَجَمَة
رجب النخلة: نبي تمها دكاناً تمتد عليه لصفها. ووضع
الشوك حوطا لئلا يمل إليها اسد.

١١٤٦٠ - رجل القط المزمري

Antennaria plantaginifolia (S). Pied-de-chat à feuilles de plantain (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تملو نحو ٤٠ سم. وراكبها قليلة، مستطيلة، كاسية التوازي. أوراقها ضيقة، نصلها لساني الشكل خلي البشرة ثلاثي الفلوع. وريساتها الزهرية بيض وخضر || أزهارها يستمر من نيسان إلى تموز.

١١٤٦١ - رجل البقرة اطاب كالية المروج.

١١٤٦٢ - رجل المعزى * حشيشة المعزى

Aegopodium podagraria (S). *Aegopode podagraria*, *Egopode aux gouteux*, *Herbe aux gouteux*, *H. de St Gérard*, *Pied de chèvre* (F). *Goat-weed*, *Bishop's weed* (E). *Gemeiner giersch*, *Podagrakaut* (D). *Egopodo podagraria* (I).

نبات عشبي يري طبي معمر من فصيلة الخيميات ينبت في الأماكن الظليلة، منافه الطيبة عديدة ومهشة || ساقه غليظة سواه تملو من ٣ إلى ٨٠ سم. أوراقه كبيرة، مركبة، سداسية، وريقاته ثلاثية التجميع، بيضيه الشكل، سنة النصل الباهت الخضار.

١١٤٦٣ - رجل قنطورس

نجم نير من كوكبة قنطورس.

١١٤٦٤ - رجلته هي البقلة الحماق، اطابها.

١١٤٦٥ - رجلكتات

Portulacaceae (S). *Portulacacées* (F). *Portulacaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القنات. اجناسها وانواعها عديدة. اشهر نباتاتها الرجل.

١١٤٦٦ - رجلى

Stabular (F). *To stall* (E).

رجل ورجل الداية : حبسها في مرابضها على اللط.

١١٤٦٧ - رجلى هي الرجالة، راجمها.

١١٤٦٨ - رجلى هو الايلولة، اطابها.

١١٤٦٩ - رجلى

Coralliphila (S). *Coralliphile* (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربيل وفصيلة الرخويات. انواعها المعروفة قليلة البدن نحو سم. اصطنها بحار البلاد الحارة اغصنها البحر الاحمر. تميش لاصقة بمذائع المرجان والبرجان || اصداها صغيرة مشوة شبه بيضيه الشكل مقطوعة القاعدة تبدو كالجلب الرميعة. اعقابها عازنة ومثللة.

١١٤٧٠ - رجليات

Coralliphilidae (S). *Coralliphilidés* (F). *Coralliphilidae* (E).

فصيلة من الرخويات مديات الاربيل. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها يعيش على مذائع البرجان والمرجان في بحار المناطق الحارة || اصداها خشنة، مشوة، متباينة الاشكال للخواصية وقليلة القليلة، قصيرة الخوازة الصغيرة || اعرف اجناسها واشهرها البرجوة والسحيفة.

١١٤٤٩ - رجل الجبار البني

نجم نير من كوكبة الجبار مركزه على القدم البني. ويدهى ايضاً رجل الجوزاء البني.

١١٤٥٠ - رجل الحتام هو الكتمان الصباني، اطابه.

١١٤٥١ - رجل الذئبة

Arctopus (S). *Oursine*, *Pied d'ours* (F). *Bears paw* (E). *Bärenfuss* (D). *Piè d'orso* (I).

نبات عشبي يري من الخيميات. ساقه منتصبه تنتهي بضمه من الاوراق الكبيرة اللد يملوها الازهار الصيراني التجميع. اوراقه مثقبة كبيرة، نصلها طلي المسام، خاوش الصفة للهارية الخددة. ازهاره بيض.

١١٤٥٢ - رجل الذئب هي الفدية، اطابها.

١١٤٥٣ - رجل العنقاء راجع غريق نجس.

١١٤٥٤ - رجل الثرب المداد

هو الخوازن المداد، اطابه.

١١٤٥٥ - رجل القبرة اطاب عائق الحائق.

١١٤٥٦ - رجل القط، رجل الهر، أنثينكوت

Antennaria (S). *Antennaire*, *Pied-de-chat*, *Haplidula* (F). *Cat's-foot*, *Cat's-ear* (E). *Echterkatzentpflöchen*, *Chatza-däpli* (D). *Piede di gatto*, *Zamba di gatto* (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات الانيوية الزهر. انواعها عديدة معظمها يري ويضها زراعي كزيتي. سيقانها زبابة. اوراقها متعاقبة، نصلها خلي الصلصة السفلى، ازهارها انبوية لا لسين لها. قوتيجاتها صفر. وريساتها بلون القناب || اعرف انواعها واشهرها الاربية القنابة.

١١٤٥٧ - رجل القط الأمريكي

Antennaria microphylla (S). *Pied-de-chat microphyllé* (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تملو نحو ٢٠ سم. وراكبها قصيرة كاسية التوازي، ساقها كثيفة الزغب اللبد. اوراقها السفلى ضيقة التجميع خلية النصل. وريساتها الزهرية كثيرة العدد، نورية التجميع، يضاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران إلى آب.

١١٤٥٨ - رجل القط الجبلي

Antennaria alpina (S). *Pied-de-chat alpestre* (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تملو نحو ١٠ سم. وراكبها دقيقة كاسية. اوراقها السفلى اعليجية سلمية تطول نحو ٣ سم. نصلها خلي البشرة. وريساتها الزهرية إلى الخضار الاامر. قناباتها مديبة الحافة المسنة || ازهارها يستمر من نيسان إلى آب.

١١٤٥٩ - رجل القط الشائع

Antennaria dioica (S). *Pied-de-chat commun* (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تملو من ١٠ إلى ٤٠ سم. شعروها مديبة. ساقها منتصبه كثيفة الزغب اللثني. وراكبها مستطيلة كاسية. اوراقها صغيرة تطول نحو ٢ سم. نصلها خلي البشرة. وريساتها الزهرية يضاء اللون. ودية او قلبية || ازهارها يستمر من نيسان إلى حزيران.



رجل القط الشائع



رجل المعزى

١١٤٧٦ - رُحَاشِي، مَغَشَرِي

Mellières, Nectarifère (F). Melliferous (E).
هو كل نبات من أي فصيلة كان سوت أزهاره رحيقاً
تجبرسه النحل || والنباتات الرحيقية عديدة الخلبا في
(نبات رحيق).

١١٤٧٧ - مَعرِثَة

Métrite (F). Metritis (E).
التهاب الرحم عقب الولادة.

١١٤٧٨ - سَحْلَرِي

Sécholr à fruits (F).
Drying-room (E).

هو الموضع الذي تجفف فيه البَاز - راجع سحرين.

١١٤٧٩ - رَحْبِيَة

الأرض الواسعة السريعة للنبات. ج. رحاب.



رجوم ثنائي التجديع

١١٤٨٠ - رَحْبَة

Elaps (S). Elaps (F).

جنس حيات خفيفة سامة من فصيلة الرحيات. أنواعها
المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد الاستوائية
والحارة من أفريقيا إلى الهند وأمريكا وأستراليا || أجسامها
شبه اسطوانية الشكل، مستطيلة، قليلة الضخامة، تغلظ
من ١٠٠ إلى ١٤٠ سم. رؤوسها صغيرة، بيضبة الشوكة.
أنوارها ملونة، مظلمة مطروق. أطوارها سوداء اللون تحرقها
خطوط بيضاء || أحرقت أنواعها الرسة المرجانية Elaps
corallinus (S). ثوبها إلى الحرة المرجانية السفاء
المواج يملؤها أطوار سود.

١١٤٨١ - رَحْل

Scénites (F).

نمت تعريفي يطلق على الجماعات غير المستقرة في مكان
سكن واحد.

١١٤٨٢ - رَحْل و رَحْلَة

هو الأشخاص، الطلبة.

١١٤٨٣ - رَحْل و رَحْلَة

Bkt (F). Pack-saddle (E).
مركب الدواب يختص عادة بالابل والبغال والحير.

١١٤٨٤ - رَحِم

Matrice, Uterus (F).

Womb, Uterus (E).

جزء من أعضاء التناسل في الحيوانات العليا يدعى عضو
الحمل يتصل بالهبل والفرج بواسطة قناة الرحم. وهو
عضو التركيب مبطن بشدة غاملي وظيفة الاحتفاظ
بالبيض المخصبة التي تتحول إلى جنين.

١١٤٨٥ - رَحْمِيَّات

Hystericaceae (S).
Hystericaceae (F). Hystericaceae (E).

فصيلة الغنطور الرحمية. أجسامها وأنوارها كثيرة العدد
مظلمة من الغنطور المجهرية.

١١٤٨٦ - رَحَاشَة

Protopterus (S).
Protoptera (F). Protopterus (E).

سكة نهوية وحيدة الجنس والنوع من رنطوجات التنفس
وفصيلة الرحاشيات. موطنها مستنقعات أفريقية الاستوائية ||
جسمها مستطيل النحيط يطول نحو ٧٥ سم. رأسها شبه
عزوطي الشكل. حناها صغيرتان ماصتان. زعنفتها
الظهورية مستطيلة - قاطبة - تتصل بالظهرية عند طرف
الذيل. زعانفها الصدرية والظهرية غصية، مستطيلة
عذبة الشكل. ثوبها إلى الشبهة السوداء يملؤها توشم

١١٤٧١ - رُحَبِيَّات

Argiopidae (S). Argiopidae (F). Argiopidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات. أجسامها وأنوارها
كبيرة العدد الذي يتجاوز الألف || أطوارها البلاد الحارة
والمعتدلة الحارة من المالحين القديم والجديد || أجسامها
متباينة القد منها الصغيرة والوسلى والكبيرة جميعها ثنائية
الرؤيا سداسية المثلثان بمجرى الشياش بصفات حادة
مهيئة نحو الداخل || أنوارها مختلفة الألوان والزراركي
جميعها ناصعة كبيرة الشح. عكادها كروية كثار الرمان
علوية الفتحة، تحببها بين الحجازة وعلى النباتات العذلة
اغصانها الشائكة.

١١٤٧٢ - رُحْبِيَة، رَحْبِيَة

Regain (F).
Second crop, New lease (E).

هو الكلأ الناتج من الحشة الثانية. وهو الأوراق الناتجة
عن القروع كما في التبع.

١١٤٧٣ - رُحْبِيَة، رُحْبِيَة

Pédicelle (F).
Pedical (E).

هو الزئاد الصغير سائل الزمرة. وهو أيضاً الملاق القروعي
المركب كما في المتجدد.

١١٤٧٤ - رُحْبِيَة

Rhagium (S).
Rhagie (F). Rhagium (E).

جنس حشرات من عثميات الاجنحة وفصيلة القرنيات.
أنواعها المعروفة منه || أجسامها متوسطة القد، أطوارها
تتأرجح من ١٦ إلى ٢٦ سم. أنوارها مختلفة الألوان يلغنها
خل دقيق ضفير تكثر فيه الشبهة || تسرح في النهار.
تظهر في أوائل الربيع وتبقى حتى أواسط الصيف. مرتما
الأعداد الخرجية || رقاتها صغيرة، غليظة، سمراء اللون،
تمتدش على الجلود اليابسة إن قامت أو مقنونة وانغصا
جلود التنوب والشرين والسرور والسنديان والكمستان.

١١٤٧٥ - رُحْبِيَة ثنائي التجديع

Rhagium bifasciatum (S). Rhagie bifasciá (F).

Rhagium bifasciatum (E).

حشرة خاضعة من فصيلة القرنيات ورتبة مفدمات الاجنحة.
تألف الأرحام والفراشات. غنافها تتنقى من جميع أجزاء
النبات. رقاتها غاشية تركب جلود الأشجار اليابسة
ويجودها وأغصانها || جسمها متوسط القد يطول من ١٧
إلى ٢٠ سم. ثوبها إلى السمرة الخفيفة تشبه سمرة في الرأس
والكوكيل وأعلى الظهران. غناها يجتاحت بطنين من البقع
الخمر. رأسها شبه مربع الجرم. حناها كبيرتان.
زبانها كيران، مستطقان إلى الوراء. ظهرها مستدير
المؤخر للاسفل. غناها كفيقتا الحمل الضفير. أرسافها
رباعية البعل الظاهرة || جبلها ثلاثي الحلق. تظهر الحشرة
المجاعة في أواسط الربيع وتبقى حتى أواخر الصيف.
تسرح في النهار. تساد يمد ظهورها بثلاثة أسابيع. تمتع
الحكن في صدور الجلود وشقوقها || البقرة عند بلوغها
الادراك تمام تطول نحو ٢٢ سم. جسمها حدي التركيب و
مستطلل الجرم، عديم الروابج، سحلي اللون و اشقر
المواج، اسمر الرأس و سمير الحلب الدقيق || طور
الاكامل الذي يستمر من ٤٥ إلى ٥٥ يوم يتغذى في طور
الترية ضمن صلبة من المواد النباتية والمعضوية للمجونة
بالرأل.



رحه



رحاشة

Rhinanthus major (S). - رَحَامَة كَبِير *
Rhinanthe à grandes fleurs (F). Rattle (E). Grasse klapper (D). Corona di re (I).

نوع من الرخاخ السريع النمو يكثر بين الزروع فيلونها وبقياسها الذلاء. أزهارها كبيرة لونها صفراء اللون || أبادته واجبة ثم يستعمل أحد العواشب الخيرية .

Hippoglossus (S). - رَحَاش *
Flétan (F). Halibut (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من المسامك وقصيلة المفلطحات. أنواعه المحروقة عديدة أعطانها بحار البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || جميعها كبيرة اللد ، أهليجية الشكل ، دقيقة الصفح الصغير . زعانفها الظهرية والبطنية قاسية تمتد من العنق إلى الذنب . زعانفها الشرجية مسطوية الأطراف || أحرقت أنواعه وأشهرها الرخاشة المبلولة .

11499 - رَحَامَة صَبْرَة *
Hippoglossus vulgaris (S). Flétan commun, Flétan halibut (F). Common Halibut (E).

سمكة من الرخاش . طولها نحو ٢٠٠ سم. نوبها إلى السرة الخفيفة يطولها موج أصفر تشوبه بعض الخضرة || أعطانها بحار البلاد الباردة والمعتدلة نحو المعتدلة . ويوجدوا في المتوسط محصور ببعض المناطق أعصها الممتدة من جبل طارق إلى بحار اليونان والبحر الأسود || لحمها لذيق العلم مرغوب فيه .

11500 - رَحَامَة وَرَقَر *
Marbre (F). Marble (E).
جسم حجري صلب تعريفه الكيماوي مركب كربونات الكالسيوم التليطور . ألوانه عديدة يكثر فيها الأبيض الحليبي . وهو من الأحجار التي استخدمها الإنسان في البناء والنحت منذ أقدم العصور .

11501 - رَحَامَة *
الرياحي والرياضة ضرب من الخلفة غبراء الخضرة لها زهرة بيضاء نفية وطا عرق أبيض تحفره الحشرات وبجوارها الأبيض كله يأكل ذلك العرق خللاته . وطيبه (أبو حنيفة) || وقيل ثبت تجلده السامة ، وهي بقلة غبراء تقرب إلى البيضاء وهي حلوة لها أصل أبيض كأنه المنقر ، إذا انتزع صلب لبناً (السان) .

11502 - رَحَامَة *
الرياحي والرياضة : هي الاجازة ، اطلبها .

11503 - رَحَامَة فَكَل *
Passavant (F). Parme (E).
جواز ينقل الكحول أو بعض المستنوعات والغلات .

11504 - رَحَامَة *
Mou (F). Soft (E).
نمت وصفي . القلين خشب رخش لين .

11505 - رَحَامَة *
الرياح والريضة : الزبد الرقيق .

11506 - رَحَامَة ، رَحَامَة ، رَحَامَة *
Agnelle (F).
الأنثى من ولد الضأن . ج. رخال .

11507 - رَحَامَة ، عَقَاب وَرَق *
Hallæus leucocephalus (S). Pygæus leucocephalus, Alge à tête blanche (F). White headed eagle (E).
طائر من الشباط ينتمي إلى عمارة العقبان وقصيلة الصقريات .

اسد || تعيش في الاممال حتى الفصل ثم تنفخ في الطي وتستنكح الى ان تعود المياه فتسرع للمستنكح || لحمها متوسط الصف ، مأكول .

11487 - رَحَاشِيَات *
Protopteridae, Lepidoisrenidae (S). Lepidoisrenidae (F). Protopteridae, Lepidoisrenidae (E).

نصيلة اسماك نهرية من مزدوجيات التنفس . اجناسها وأنواعها المحروقة قليلة العدد . جميعها من اسماك مناطق المناطق الاستوائية والحارة || أحرقت اجناسها وأشهرها الرخاشة والذفانة .

11488 - رَحَامَة *
Cabestan (F). Capetan (E).
آلة لرفع الاثقال العظيمة .

11489 - رَحَامَة *
Meule (F). Millstone (E).
حجر الطحن . ج. أرطه ورشي وأرشي . وهي من الوسائل ابتدائية للمستخدمة لطحن الحبوب أو جرشها . تتكون من حجرين مستديرين يرفان بشي الرشي يثبت في وسط الحجر الأسفل منها وتد . يدور حول الحجر العلوي .
11490 - رَحَامَة *
في الاسبانج ، اطلبها .

11491 - رَحَامَات *
Elapidae (S).

Elapidae (F). Elapidae (E).
نصيلة حيات عديمة من لماسيات الاتحادية . أنواعها المحروقة نحو ٧٠ تنضم إلى بقية اجناس . أعطانها البلاد الاستوائية والحارة . اجناسها مسطوية تقريبية الشبه بالرخاش . رؤوسها صغيرة شبه بيضة الثورون . ألوانها ملونة يكثر فيها التطويق وبعضها يحمل من خطين أو حلقة خطوط قاسية || جميع أنواعها سامة وبعضها شديد الاذى || أشهر اجناسها واسمها الرسة والبنانج .

11492 - رَحَامَة ، مَعْقَر الزَهَر *
Nectar
غصارة سكرية لزجة مختلفة التركيب تفرزها غد خد خاصة في الزهر لجبرها النحل .

11493 - رَحَامَة *
Aepyornis (S). Rock (F).
طائر صليب عظيم اللد كان في جزائر الهند وانقرض وقد مر كل بعض رؤته في متحف . يقال ان طول الرفة يراوح من ٣٠ الى ٤٢ سم .

11494 - رَحَامَة *
Vent faible (F). Weak wind (E).
الرياح اللينة التي تتدفق الصالح .

11495 - رَحَامَة *
Rhinanthus (S). Rhinanth (F).
جنس نباتات عشبية برية هشة من فصيلة الخنازيريات . أنواعه قليلة . سورها منصبة لينة . أوراقها كاملة ساذجة متعاقبة . نصلها ستاني الصفصمة ، سنن الحافة . أزهارها فردية || أبليّة الاوتكار ، صفراء اللون غالباً .

11496 - رَحَامَة عَرَف الذب *
Rhinanthus criste-galli (S). Rhinante crête-de-coq, Cocrête, Croquette (F). Cock's-comb, Rattle grass, Yellow rattle (E). Klapper, Gelberklapperkraut (D). Cauterelle, Pidocchio dei prati (I).

نوع من الرخاخ الوردي يكثر بين الزروع فيصيح من النباتات الغارة لانه يسبق الزروع في ازدهار الناصر النذائي . يقضى عليه باستعمال اسد العواشب .



رشي



رخاخ عرف الذب



رخاخ كبير



رَحَامَة مبدلة



رخام

موطه العالم يحوب جميع القنارات ، يكثر في أمريكا . طوله نحو ٨٠ سم . والانيق ٩٠ سم . ثوبه الى السرة السفاه . بطنه مشط بالابيض . رأسه وبعقه وذنبه بيض . متقارب وغالبه صفر || قوته الاسماك والطير والقواضم والاناام كالغيم والماعز وما اشبه .

١١٥٠٨ - رَحْمَة * شوَحْكَة Percnopterus (S).
Pernoptère, Alimoche, Vautour d'Egypte, Poule des Pharaons (F). Egyptian vulture, Pharaoh's hen (E).
طائر من الكواكس وحيد الجنس والنوع ينتمي الى فصيلة السريات وهو اصفر اللون جنة وأوسها انتشاراً . طوله نحو ٦٠ سم . وبعقه ١٦٠ . ثوبه انير الابن . رأسه ازغب الريش الاصفر يبدو كالاصلم . عنقه اغفر اصفر . منسره اسمر . ريشه وردي اللون تلوها ماجة وبدا . قوادم سقطه سود . مناكبه رصاصية ، أباهره طحل . عينه قزوينية || موطنه بلاد حوض البحر المتوسط والبحر الاحمر والخليج الفارسي . نظامه الحياتي جماعي . اسرابه كثيرة العدد تعيش قرب المدن والساكن وتراقب القوافل قوته الجيف والقائمة . يصيد القواضم والصائير عندما يهده الجوع || ينش عنه في صعد الصخور النائية اناء تبيض ٣ فئات تحضنها نحو ٣٠ بيضاً || اما كنية الرخفة فأم جدران وأم رسالة وأم عبيبة وأم قيس وأم كير .

١١٥٠٩ - رَحْمَات ، لَيْسَات Malacozoa (F). Malacozoa (E).
شعبة حيوانات تشمل ذوات الصلغتين والمعدنيات والرقاسيات .

١١٥١٠ - رَحْمَاتِيَّان * Phaleris cristatella (S).
Starkeet auklet (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من حارة البهيات فضيلة البطريقيات . اصطناع المناطق القطبية الاسيوية والامريكية . يلجأ في الشتاء نحو الصين وكوريا وكندا . ملجأه الحياتي ينزح في جماعات اسراب لا يهجم لها عدد . قوته الحشرات جامعي . جماعته اسراب لا يهجم لها عدد . قوته الحشرات والحوام والفاصيص والاسماك الصغيرة والقشريات || جسمه صغير القد بطول نحو ٢٥ سم . متقاده صغير الجسم ، احر اللون ، شبه غروبي الشكل . حلقه عينه صلبة اللون . جناحه قصيران ، ذلثان ، لا حفا . ذنبه غروبي الشكل ، شديد التقعر . ريشه دقيقان . ثوبه العلوي الى السرة المرحضة بالاسود طليعا زركسة يهده . ثوبه السفلي الى الريدة الزرقاء المالح . زوره ابيض . رأسه متوج بقرعة صغيرة من الريش اللينق الناعم . كلمة عينه يهده اللون تحت حتى النكت . ريشه الى السرة الزرقاء || الانثى ابيض قدما من الذكر وتكمل بنفس الثوب || موطنه كل نقرة على حضور المهادج او فيها . الانثى تحضن بمناوبة الذكر بيضة واحدة اصفر من بيضة المهادج . الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع . الصغير يدمو على سطح الميم بده التفت باسبور .

١١٥١١ - رَحْمَة * Ptilonorynchus violaceus (S). Ptilonorynchus violaceus (F).
طائر من فصيلة الرخمييات . موطنه استراليا . يألف الاذغال والاصراج الكثيفة الاشجار || جسمه متوسط القد ، بطول نحو ٣٠ سم . ثوب الذكر الى الزرقاء السوداء الصفاه المالح . جناحه وذنبه الى السواد الفصحي . حلقه عينه زرقاء اما اطرافها فاحمر . متقاده ازرق اللون ، اصفر الملقط . ريشه الى الحمراء . ظهر الانثى اخضر اللون .

جناحاه وذنبها الى الصفرة العابقة . يعلها الى الخضار الاصفر يملو توشم هلال الشكل عند اطراف الريش || قوته الطار لا يركب منها ابناً كانت . وأعضها اللين والذراق والمشمش والموز والبرقال ثم البزور وبيض الحشرات || يذئ عنه في الانجار الداسية ويقع بالقرب منه ، على بعد بضعة امتار ، مسرعا يزينه بمختلف الاشياء الملونة تنوسطه مدة من القفصان المحبوبة تعمله الانثى كلما دعت الحاجة الطبيعية الى الكوم || اما الاشياء الملونة التي يزخرف بها المسرح فهي الرياش الجميلة والاصناف الملونة وبيض الحصى وكسر الزجاج ... || الانثى تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في الحول وتنش في كل مرة من بيضتين الى ثلاث بيضات ترعها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوما .

١١٥١٢ - رَحْمَة * حي حريط البادية ، اطلبه .

١١٥١٣ - رَحْمَاتِيَّات * Ptilonorynchidae (S). Ptilonorynchidae (F). Ptilonorynchidae (E).
فصيلة طير من الجواثم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اصطناعها بعض مناطق استراليا وفيهها الجديده اجسامها متوسطة القد ، جميلة الالوان المتفاضة . تتميز بالمسارح المزينة والمزخرفة التي تقيها بالقرب من عشائها . اهرق انواعها وانهرها الرخم .

١١٥١٤ - رَد Rendement (F). Produce (E).
الرء هو الانتاج أو الرعي . يقال شبة كثيرة الرء .

١١٥١٥ - رَد Recusation (F). Challenge (E).
حق ينص عنه القانون وبين اسبابه يمنع اسد للمناحين اللجوء الى طلب رد التقاضي ورد الحكم ورد الخير ورد الشهود .

١١٥١٦ - رَد ، اِرْجَاع Restitucion
اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل ارتكاب السرة .

١١٥١٧ - رَد المبيع Rédhibition (F).
Annoulement of sale (E).
هو نسخ البيع الذي يبيزه القانون في حالات خاصة عددة قوامها غني بمجمل المبيع قاهر قبل للاستلام او بعد من استماله .

١١٥١٨ - رَد كع الكيش الرءاع الفصم الالية . رج ع .

١١٥١٩ - رَد كَسَة Cynonycteris (S).
Cynonycteris (F).
جنس حيوانات من فصيلة البطريقيات . انواعها ٩ ثلاثة منها اسويية وستة افريقية . جميعها ثائرة ، متوسطة القد قصرة الذنب ، صوية اللون ، تعيش جماعات صغيرة متفرقة يراوح عددها من ١٠ الى ٦٠ || مسرعا بيهد المرى قابله يلع نحو ٥٠ كم . || اقلبيها فصح الارباب . ينشد من اسية الى افريقية || اشهر انواعها ما ينتج .

١١٥٢٠ - رَد كَسَة حَنْطَلَة Cynonycteris straminea (S). Cynonycteris pallid (F).
رداسة صغيرة القد ، طولها نحو ١٥ سم . وبعقه ٤٠ كوما حنكي اللون ، يعلها زاهر اللؤلؤ ، وأسها وعنقه وظهورها الى السرة . موطنها بينة من صغار الى الحليبة والفاوين . تألف الاشجار الحرجية . قوتها الطار .



رخة



رخيلان



رخيم

الخاتمة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة البلد اعطائها بحار البلاد المصلحة الحرارة . جميع انواعها تسره في المياه العذبة حيث تمكث نحو ١٥ اسبوعاً ثم تعود الى البحر || المهر انواعها الرندانة .

11٥٢٧ - رَدَج (F). To grind (E).
الردج الترمير بالاحتكاك المتبادل بين قطعتين .

11٥٢٨ - رَدَج (F).
الردج : ما يخرج من بطن المهر او السخلة قبل الأكل .
مثل القي من الصبي .

11٥٢٩ - رَدَجِي (F).
Marchand ambulant de légumes
هو البقال المتجول .

11٥٣٠ - رَدْع (F). Mud (E).
Bourbe
وحل المناقع والاهوار .

11٥٣١ - رَدَف (F). Tribe (E).
Tridu
الردف في تصنيف الحيوان يأتي تحت الفصيلة وفوق العارة والجلس .

11٥٣٢ - رَدَف، كَمَل، قَطَن (F).
Croupe, Buttocks (E).
حزب الدابة وفيرها .

11٥٣٣ - رَدَف، ذَكَب (F).
Deneb
الردف او الذنب نجم نير من كوكبة الدجاجة . مركزه حل الذنب . يبعد عن الارض نحو ٤٠٠ سنة ضوئية .

11٥٣٤ - رَدْفِيل أَزْرَق النَّعْس (F).
Rhodophyllus lividus (S).
Rhodophyllus livide (F).
نظر جعالي شديد الازرق وقد يمت من فصيلة النفاذيريات . يوجد في المراعي الجبلية . يعيش على الدبال . ساقه ضخمة معتدلة الارتفاع ، غبراء اللون . تكتمه كبيرة القد . قلنسوة الشكل ، حذبة ، لونها الى الزرقة الضاربة الى السواد . قطرها نحو ١٢ سم . اطراسها ليلكية اللون .

11٥٣٥ - رَدَم (F).
Terrassement (F).
Earth work, Embankement (E).
ما يوضع في المنخفض من تراب وصخور لرفع مستواه .

11٥٣٦ - رَدْمِي (F).
Rudéral (F). Ruderal (E).
نمت تعريفية يطلق على كل نبات يعيش بين الانقاض والاردم .

11٥٣٧ - رَدَن، رَدَن (F).
Rayonne (F).
Rayon, Artificial silk (E).
سند نسيجي يشتق من البوليورز ، يستعمل استعمال الحرير ويصير الحرير النثاني .

11٥٣٨ - رَدَن، حَكْل (F).
Dévidage (F).
Winding, Reeling off (E).
هو استخلاص خيوط الشرائق أو المرادن وما اشبه .

11٥٣٩ - رَدَن (F). Wrinkled (E).
Ridé
نمت وصفي يطلق على كل ما هو مضفر ويحدث من الجلود والتشوير والجلود وما شاكلها .

11٥٢١ - رَدْمَة صَحْرَاء (F).
Cynonycteris amplexicauda (S). Cynonycteris fauve (F).
رَدْمَة صَحْرَاء القد ، طولها نحو ٢٠ سم . ثوبها الى الصخرة . موطنها يمتد من الخليج الفارسي الى الهند والهند الصينية والفلبين || تألف الكهوف القريبة من تشايلي . مسرجها من النسق الى القبر . قوتها الحار والرعويات البحرية .

11٥٢٢ - رَدْمَة مَصْرِيَّة (F).
Cynonycteris aegyptiacus (S). Cynonycteris d'Egypte (F).
رَدْمَة مَصْرِيَّة القد ، مستطيلة البسطة . طولها نحو ١٦ سم وبسطها ١٠٠ سم . ثوبها الى الوردية البتراء ، ظهرها اغمي . بطنها . جوانبها صفراء للمواج || موطنها مصر وجولدها من الحبيبة الى مصرية . تألف الاشجار والكهوف والكهوف الخرية || قوتها الحار .

11٥٢٣ - رَدَاغ (F).
Terrain bourbeux (F).
Muddy ground (E).
تربة كثرت فيها نسبة الروغ .

11٥٢٤ - رَدَالَة السِّنْدِيَان (F).
Mythimna acetosellae (S).
Mythimna acetosella (F). Mythimna acetosellae (E).
حشرة من فصيلة النشويات ورتبة حشرنيات الاجنحة . موطنها يقطن مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارية قوتها يحرق الازهار . مرتبها غاضلة قوتها اوراق السنديان || جسمها معتدل القد بطول نحو ١٨ م . بطنها نحو ٤٢ م . رأسها صغير الحجم . ضيقها كيرتان . زباناها خيطيان . مرتبها مستطيل . جوشها اصفر اللون صفاتي المواج . بطنها الى الصخرة الحنطية المواج || وشناها الامنيان الى الصخرة الحنطية بطولها ثلاث بقع عنابية لامتوازية الحجم . وشناها الحنطيان الى الحنطية الاكعب || لها جيل واحد في الحول . تظهر القراشة في تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بستة اسابيع وتمتد المكان على الصفحات السفلى من اتصال الاوراق || السرعة تطول نحو ٤٥ م . جسمها اسطواني الشكل . مشدود القشار . ثوبها الى الطحلة الرداء بطولها رشفة يضاء وسط ثوبي اسود وشناها جانبيان اسفرا . ملاقي سكهما الى السواد النحسي . رأسها ورواجها سود . منها الى الطحلة الغبراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتعق في التربة ضمن جلاب من العين .

11٥٢٥ - رَدَالَة (F).
Osmerus eperlanus (S).
Eperlan (F). Smelt, Sparling (E).
سمكة بحرية نهريه من فصيلة الردانيات . اعطائها منجم بحار المناطق المعتدلة الحرارة . تقرب من الشطوط في فصل الربيع وتنتقل الى الاغوار والابهار حيث تسره ثم تعود الى البحر || جسمها شبه اعطليبي الشكل بطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . رأسها مخروطي الشوذن . فيها واسم الشدة الذي ينتهي خلف مؤخرة العين . زعنفتها الذيلية ثاقرة . ظهرها الى الخفاش الالامى البحري المواج ايظلاها ويطها الى الوردية الفضية || لحمها مأكول ، متوسط الصفت .

11٥٢٦ - رَدَالِيَّات (F).
Osmeridae (S).
Osmeridae (F). Osmeridae (E).
فصيلة اسماك بحرية نهريه من كائلات النظام مفتوحات



رَدْمَة السِّنْدِيَان



رَدْمَة



رَدْفِيل أَزْرَق النَّعْس



ردسة

فروعها منتصبه فناء ، أوراتها سنانية ، طولها نحو ٧ سم . وتعرض ٤ ، نصلها جلدي الصفحة ، ثلاثي البروق ، ذات الزام الاخير . ازهارها غمرار اللون . ثمارها الى السواد اللامع || ازهارها يستمر من نيسان الى تموز .

١١٥٤٥ - رَدُولِي الصَّيْنِ (S). *Coriaria terminalis* Redoul à fleurs terminales (F).

جنية معمرة ، رفة ، صغيرة القند ، طولها نحو ٧ سم . ساقها غمرار فناء . فروعها وأوراقها زياد اللحاء . أوراتها بيضية الشكل ، نصلها خاسي البروق ، جامد التنجيج ، ذرب الزام الاخير ، مدبب المقصبة ، خلي الصفحة السفلي . ازهارها تاجية صفراء اللون . ثمارها الى الصفرة الزائجة . ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١١٥٤٦ - رَدُولِي الهِنْدِ (S). *Coriaria nepalensis* Redoul du Népal (F).

جنية سبروتية معمرة ، طولها نحو ثلاثة أمتار . ساقها غمرار فناء . أوراتها بيضية الشكل . نصلها جامد الصفحة . خاسي البروق ، مدبب المقصبة || ازهارها وثمارها مستطيلة اللون . ازهارها يستمر طوال شهر ايار .

١١٥٤٧ - رَدُولِي الياباني (S). *Coriaria japonica* Redoul du Japon (F).

جنية سبروتية معمرة طولها نحو ١٠٠ سم . ساقها غمرار . أوراتها احليجية مستطيلة ذرية . ازهارها وريدة اللون . ثمارها تمر بمختلف مراحل الاخر الى ان تنضج ، منه الادراك ، بالحسرة السوداء اللامعة || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١١٥٤٨ - رَدُولِيَّات (S). *Coriariaceae* (F). *Coriariaceae* (E).

فصلية نباتية من ذوات الفلقتين تحمل جنساً واحداً بجميع بعض الانواع البرية والبريتية .

١١٥٤٩ - رَدُولِيَّ (S). *Raprise*

حالة كل نبات بعد غرسه اي رده الى التربة لتجابه دورته الحياتية .

١١٥٥٠ - رَدُولِيَّ (S). *Alternaria*

جنس تطور مجهرية من هارة زراحيات فضيلة للحيات . كائناته جلمودية الشكل ، حليية او خمجية الطرف ، مكوتة من عدة بويغات مستديرة او مرقطة الجوانب ، غليظة الوسط ، مستدقة القطب || انواعها المؤذية عديدة اعرفها ما يتبع .

١١٥٥١ - رَدُولِيَّ (S). *البَاذِجَانِيَّات* (S). *البَاذِجَانِيَّات* (F).

Alternaria solani, AL. daud., *Macrosporium solani* (S). *Alternaria des solanées*, Taches noires des feuilles de pomme de terre (F). Early blight of potato (E). *Dörrfleckenkrankheit der Karoffeln* (D).

فطر مجهرى يتغلف حل اوراق بعض النباتات الباذجانية اعصها البطاطا والبننور . مظهره الخاضع ، حل البطاطا ، يقع بكثرة سمراء اللون ، تركب نصل الاوراق . تبوء صغيرة الحجم ثم تنقسم فيلج قطرها نحو ١٠ سم . نسب ذليل التنصل ثم يبلد . وهو حل البننور بلع لا تباينة الشكل والحجم ، سمراء اللون ، ربادية اللون ، عديفة المالات للتاجية الشفراء الخضر . قطرها براوح من ١٠ الى ١٠ سم . تركب التنصل فتقويه وقد تصيب الثمار عند

١١٥٥٠ - رَدُولِيَّ (S). *Rhodanthe* (F).

عشبة حولية برية وزراعية تربيتية من فصيلة المركبات . ساقها غمرار طولها نحو ٣٠ سم . فروعها دقيقة . أوراتها سافنة ، سنانية التنصل ، مستديرة الاذيتان . ازهارها وريسية قطرها نحو ٤ سم . قوصها اصفر اللون ، قناباتها وريدة او حمرار || ثمرورها يستمر من اواسط الصيف الى اواسط الخريف .

١١٥٥١ - رَدُولِيَّ مَعْتَمِدَة (S).

Reduvius personatus (S). *Réduve masqué* (F). حشرة قاضنة من فصيلة الرَدُولِيَّات . جسمها متوسط القند ، مبشر الحلب ، يطول نحو ١٧ م . رأسها شبه بلوطي الشكل ، متكاثف الحلب . عظمها شديد النشاط . عينها صغيرتان . زباناها مستطيلتان ، مهدبان . عنقها انبوي . تكسها عذب القسم الامامي ، مقعر الخلفي . حديقها مزالية و صغيرة . طوارها لاسف . قناباتها تجنبة الانفاذ و كثيفة الحلب || قوفا الى البني يطول مواج براوح من الحظي الى الاصفر || مسرها دجوي . تمحص دم الحشرات والذباب والحمام . وريقاتها قاضنة و قوتها قوت الحشرة الجملانة .

١١٥٥٢ - رَدُولِيَّات (S). *Reduviidae* (F). *Reduviidae*, *Assassin bugs* (E). *Raubwanzen* (D).

فصلية حشرات قاضنة من رتبة غمظانات الاجنحة وطبقة نصليات الجناح . اسماها واجناسها وانواعها كثيرة العدد ، تتجاوز الانث ، منتشرة في معظم اقطار العالم اعصها الاثام المنشرة نحو الحارة || اجسامها صغيرة او متوسطة . رؤوسها صغيرة . اعناقها واناسة . انسلها نطقة مجهرية بحجة ذرية تتركب منها بعض السموم المفردة ، حويجا جانية ، صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشارية مستطيلة و ثلاثية الفصل . قناباتها نطقة ، والزوج الامامي حيد بعض الاجناس مجهر ، كا في البرصية ، للاعصاف || جميعها قاضنة تقضي على الكثير من الحشرات الفضارة ومنها البعوض والسكيت والذباب والبق .. مسرها دجوي يمنة من غروب الشمس الى الفجر .

١١٥٥٣ - رَدُولِيَّ (S). *Coriaria* (F). *Redoul* (F).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الرَدُولِيَّات . انواعها ١٠ ساقها غمرار فناء . أوراتها منتفة و متعاقبة ، سنانية الشكل نصلها جلدي الصفحة ، ثلاثي او خاسي البروق || ازهارها عتقوي التجميع . ازهارها صغيرة القند عادمة التويج و غشائية الفصل والاسدية و خاصة الببات والكرايل المنبسطة التبيسية الشكل || جميع اعضائه النباتية من فروع دقيقة واقنان وحاء واوراق وازهار تحوي مادة قلووية جمالية تدعى كوريارين (*Coriazine*) . تستعمل في دغ الحلود القاضرة التبيسية || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

١١٥٥٤ - رَدُولِيَّ (S). *Coriaria myrtifolia* (S). *Redoul à feuilles de myrte* Corroyère, *Herbe aux cancéurs* (F). *Myrtle leaved tanner's tree*, *Myrtle leaved sumach* (E). *Myrtenblättriger garbartsrauch* (D). *Coriaria a foglie di mirto* (I).

جنية سبروتية مبذولة معمرة غزيرة المواد الباذجانية طولها نحو ٣٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها غمرار رباعية التضلع ،



ردول آسي الورق



ردول البايان



ردولة البانجانيات

ادراكها فخرح البشرة وتغور في اللب الذي يتصل ويغمر .
يكافئ عنه ظهوره اما ينضج لثبات يورده الخلول
١ ٪ او يتغيره باكسدة النحاس المركز ٤ ٪ .

Cladode

١١٥٥٧ - رَدِيْقَةُ

ورقة كاذبة او شبه ورقة تكون في سوق بعض النباتات
كما في السنتورج . ج رقائق .

Radiola (S).

١١٥٥٨ - رَدِيْقَةُ

Radiole (F). Radiola (E).

جنس نباتات عشبية سولية بورية من فصيلة الكتانيات .
انواعها المبرقة قليلة السند منها جبل حوض البحر
الابيض المتوسط ٥ ٥ سورها قراء متشعبة . اوراقها متعاقبة ،
شبه بيضية النصال . ازهارها علوي التجميع . ازهارها
صغيرة يضاء اللون ٥ اشهر انواعها الرديولة الكتانية
(R. linoides) .
توسرها صيني .

Pluie fine (F). Thin rain (E).

١١٥٥٩ - رَدَاذُ

هو المطر الضئيل . قال الاصمعي اخف المطر واضعفه
الطلل ثم الرذاذ .

Hygrométrie (F). Hygrometry (E).

١١٥٦٠ - رَوَاغَةُ

علم يبحث في قياس الرطوبة الجوية .

Balancier (F).

١١٥٦١ - رَوَانُ

Balancer, Poisers (E).

الوزان ويعدى رقائق الموازن ، عضو دقيق صغير ، شبه
ديويي الشكل ، ينشأ في الحرساد اي في الحلقة الصدرية
الثالثة ، عنه الحشرات من ذوات الجناحين . رها وزانان
أيمن وأيسر تتصلها الحشرة في توصيه طويانها وتسدده .

Hypsométrie (F). Hypsometry (E).

١١٥٦٢ - رَوَانَاةُ

علم تحديد الارتفاعات .

Atelopodidae (S).

١١٥٦٣ - رَوَانِيَّاتُ

Atelopodidés (F). Atelopodidae (E).

فصيلة حيوانات درداء قاذبة من لمة الخديشيات وبرتية
السقونيات ورتية البتراوات اي عديمات الذنب ٥ اجناسها
وانواعها عديدة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية . جسمها
صغيرة أقد تشبه بحسوة سطح ضلعي قوسها الصدري
في مركز ثلاثها ٥ اشهر اجناسها الرزان والرندودة
والدهودويات والكلولة ...

١١٥٦٤ - رَزَحُ ، رَزَاخُ ، رَزَاخُ ، رَزَاخُ

Echalassage, Pisselage (F). Fropping (E).

غرز المزارع والسمايك بجانب النباتات لعدم سوتها او
نومها .

Rangée d'arbres (F).

١١٥٦٥ - رَزْدَقُ

Tidy of trees (E). الصف او السطر من الاجبار المشجرة .

Plantation en lignes (F).

١١٥٦٦ - رَزْدَقَةُ

Planting in ranges (F).

هي الزراعة بالسطر ترتكز على الامداد المتسارية والخلوط
المتوازية .

١١٥٥٢ - رَدِيْقَةُ الْبُرْتَقَالِ *

Alternaria citri (S). Black rot des oranges (F).

فطر مجهرى يصيب البرتقال في مجامع اللوحة يغير المروق
والفرايين الداخلية التي تسبب احرار القشرة ثم اضرارها
وتصلبها الى ان يقضي عليها الففن من الداخل فتشقق
او تحط وتيس ٥ اشهر زهيدة لا تستوجب العناية
لانها لا تتجاوز ٣ او ٤ ٪ .

١١٥٥٣ - رَدِيْقَةُ التَّبَعِ *

Alternaria tenuis, Al. longipes (S). Maladie du plant de tabac (F).

فطر مجهرى يتطفل على عدة نباتات اخضها التبغ عندما
يكون في المثلث ٥ مظهره الخارجي ذبيل يمل بالاوراق
والسوق ينقع ظهور اورقة خلية سمره اللون تركب السوق
والاوراق قطعها وتعطفها بمادة عطية لزجة تقضي عليها
وتتبا ٥ يكافئ اولاً بتطهير البذار قبل استعماله في
مواقع كانت موبوءة . والتطهير يكون اما بنقع البذور
مدة ١٥ دقيقة في نترات النحاس المخلول ١ ٪ او بتغيرها
باصلاح الزئبق . ويمن من استعمل يكرز نباتات النحاس
بمدل غرام واحد لكل كيلو زر ٥ ثانياً باقتلاع وحرق
الشقق الموصية وتغير او نفع الشقق الباقية باحد
الطواير المركزة على التخلص او على بعض المواد الكيماوية
الثابتة الاتصال حالياً .

١١٥٥٤ - رَدِيْقَةُ الشَّامِ *

Alternaria nigrescens (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق الشام فيقضي عليها .
مظهره الخارجي يقع فسيمة لا قياسية الشكل تركب الارواق
فنادوما يتقضي على نحو البتة . وقد يصيب البذر فيرشها
يقع خلية ردياة اللون يطوها موانع رتي تفرح القشور
وتعطفها ٥ ينشأ كثيراً في المواقع الرطبة الحارة ٥ يكافئ
عنه ظهوره باستعمال المركب التالي :

سلفات النحاس ١٠٠٠ غرام
كلس ١٥٠٠ غرام
كلورور الامونيوم ٣٥٠ غرام
ماء ١٠٠٠ لتر

١١٥٥٥ - رَدِيْقَةُ الْقُرْنَبَلِ *

Alternaria dianthi (S).

فطر مجهرى يتطفل على القرنفل قريب زين ازهاره فيقضي .
مظهره الخارجي يقع رتيمة مستديرة او بيضية الشكل تركب
الاوراق والسوق ثم تنتشر فيبلغ قطرها نحو ١٠ م وطولها
نحو ١٥ م . تسبب بياس واصدام البشرة وانفلاق الطبقة
الاحدية التي ينشأها الفطر ٥ يكافئ عنه ظهور الرزم
بائل اكسيكلورور النحاس المخلول ١ ٪ .

١١٥٥٦ - رَدِيْقَةُ الْمَلْفُوفِ *

Alternaria oleracea, Al. brassicae (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق الملفوف وغيره من النباتات
الزراعية والبردية كالفضيل والشتور والحرة والقرنفل ...
مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة سوداء اللون ، عطية
الحالة ٥ سفراء اشكال تركب الارواق البائلة الخارجية
قطعها ويستمر اذاها على الملفوف المغرور ٥ يكافئ
بأستعمال سائل يورده المخلول ١ ٪ كما يحسن حفظ الملفوف



رَدِيْقَةُ الْبُرْتَقَالِ



رَدِيْقَةُ التَّبَعِ



رَدِيْقَةُ الشَّامِ



رَدِيْقَةُ الْقُرْنَبَلِ (١)



رَدِيْقَةُ الْقُرْنَبَلِ (٢)



رَدِيْقَةُ الْمَلْفُوفِ

١١٥٦٧ - زُرْع

Hygrometricité, Hygroscopicité (F). Hygrometry, Hygroscopicity (E).

قابلية الجسم الطبيعية لامتصاص الرطوبة وهي أيضاً نسبة الرطوبة للغرور استيعابها.

١١٥٦٨ - وَزْم ، حَتْم

Bottlage, Emballage (F). Tying up in bundles, Packing (E).

هو شد الشيء بعد جمعه وضعه . وهو تغليف الشيء بعد صفه بترتيب .

١١٥٦٩ - وَزْمَة ، ضَمَة ، وَزِم

Botte (F). Bunch, Bundle (E).

ما حزم من البقل .

١١٥٧٠ - وَزْمَة زُرَاعِيَّة

في التقويم الزراعي ، الملهب .

١١٥٧١ - وَزْمَة

Mare (F). Pool (E).

هي المستنقع الصغير مغضى الماء رقيقه . ج زران .

١١٥٧٢ - زُرْوَان

Chloridium (S).

جنس فطور مجهرية من الفطريات وفصيلة اللحميات . مشبه غزير المادة . جبهه الكيفية مشبهة . كئله مستطيلة او كروية || انواعه عديدة معظمها بيضاء تعيش على الاخشاب اليابسة ومنها طفيلية تركب الاوراق . امرها زروان الخرز .

١١٥٧٣ - زُرْوَان المُرَّز

Chloridium musae (S).

فطر مجهرى يركب اوراق اللوز فيوش التصل في يلاته الامر يبيض البقع الصغيرة المستديرة السمره اللزج ثم تتكثر وتنتشر فتصير كامل التصل الذي يابل ويبيض .

يمكنه عند ظهوره باستعمال سائل يورود المخلوط من ٨ و ١٢ ٪ .

١١٥٧٤ - زُرُودَة

Rhysodes (S).

Rhysode (F). Rhysodes (E).

جنس حشرات من مفدمات الاجنحة وفصيلة الزرديات . انزاعه المرفوعة نحو ٣٠ مشترية في معظم اسفاح البلاد الحارة من المائلين القدم والجدي . تعيش في الغابات وفي البراري الدفلة . جميعها مقترنة || اجسامها مستطيلة الشكل وهدبة الصغيرة العليا ، طولها من ٨ الى ١٢ م . وروها صغيرة . عيونها ناضرة ، قرنها الاستشعارية قنادية مركبة من ١١ فصلة . قوائمها قصيرة . احمدها لاسفة ، مخدة ، مقطوعة الاطراف . انولها شبيهة الاالوان تكثر فيها السمره الكستنية والسمره الجلاوية والسمره الزرقونية .

١١٥٧٥ - زُرُودِيَّات

Rhysodidae (S).

Rhysodidae (F). Rhysodidae (E).

فصيلة حشرات من مفدمات الاجنحة . اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة العدد اصلاها معظم مناطق البلاد الحارة من المائلين القدم والجدي || جميع اجناسها مقترنة ، صغيرة القد ، ضلعية التأثير ، قائمة الاطواب || اشهر اجناسها الزرد .

١١٥٧٦ - زُرَيْع

Rhexia (S).

Rhexie, Quadretta (F). Rhexia, Meadow beauty (E).

Rhexie, Ankerblume (D). Raxis (I).

جنس نباتات عشبية ريشية من فصيلة الميكانيات . انواعه

عديدة بعضها ترابي والآخر بري وسهلي . سوقها متعصبة مريكة الفلوع . اورثها متعصبة قصيرة المتق . نصلها اعليسي الشكل ، بارز المروق ، خلى البشرة . انزاعها ضكوي او ثوري التجميع ، هامى الارتكاز . انزاعها خاسية البتلات ، الوانها من الاصفر الى الاحمر .

١١٥٧٧ - زُرَيْع

Hydrophile (S). Hydrophil (E).

الزريع والرف لله واحد . تمت تعريفه بطلق على النباتات الشجرة على الماء وحل الاشياء التي تنصص الماء .

١١٥٧٨ - زُرَيْكَل

Razikal

عاشوب ، يرتكز على كلورات الصودا ، ينقص على جميع النباتات الضارة بما فيها النجيليات || يستعمل مخلوط ٢ ٪ بمعدل لتر ونصف اللتر لتر المربع الواحد .

١١٥٧٩ - زُرَيْن

Digitaria sanguinalis (S).

Digitaria sanguine (F).

نبات شبي جنسوري بري ممر من الفطريات النجيليات . يكتر في الارربة الرطبة والمروية . وهو مبلول في جميع البلاد الحارة والمعتدلة . يتجر من النباتات الضارة الكثيرة الاخرى .

١١٥٨٠ - زُرْس

Base

ج زرس .

١١٥٨١ - زُرْس

Mineral (F). Ore (E).

الزرس هو المعدن . ج زرسا .

١١٥٨٢ - زُرْسَة ثَنَائِيَّة البَيْع

Rhizopagus bipustulatus (S).

Rhizopage biponctué, R. bipustulé (F).

Rhizopagus bipustulatus (E).

حشرة وائمة وقائمة من فصيلة الرساحيات ودية مفدمات الاجنحة . تألف الاجراج . خنافسها تعيش على سحق الانزاع وظلمها . يرقاتها تعيش في سراديب الحشرات الخاشية ساحة ورامعا لاقتراضها || جسمها صغير القد بطول من ٣ الى ٤ م . ثوبا الى السواد الفضي يعلو في مؤخر كل حمة بقية صغيرة حمراء . واسها مستطيل الجسم . عيونها صغيرة . زياناها صغيران ، صفيا الاطراف . ظهراها مقطوع الطرف الاثلاث . اساعها خاسية المغل عند الااناث رباعيتها في الزوج الخلفي عند الذكور || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الحشرة الجلاوية في ابرائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها ياسوجين . تمتع المكان تحت القشور وبيها || البرقة بعد بلوغها الاذراك تمام طولها نحو ٦ م . جسمها شبه مردفي الشكل ، سداسي الرواجب ، اغبر اللون ، اسمر الفواصل والراس وظرف التسرح || طول الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينقص في آخر نفق ويته البرقة ضمن صلبة خاوية انشاء المركب من النفايا الحشوية والمضوية المسجوبة بالريال .

١١٥٨٣ - زُرْسَاحِيَّات

Rhizopagidae (S).

Rhizopagidae (F). Rhizopagidae (E).

فصيلة حشرات وائمة وقائمة من مفدمات الاجنحة . اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة العدد مشترية في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة . تعيش على الانزاع وتحت طاء الانجار . يرقاتها قائمة تسعى وراء البطرشيات



زور



زرب



زرس



زرسَة ثَنَائِيَّة البَيْع

القوم ، أنواعها المرفوعة عديدة معظمها من اسماك بحار البلاد المتدلة الحاررة . مسرحها اساطم الاقفاط والمجاهد و اجسامها شبه اهليجية الشكل ، مبططة الجرم ، تطول من ٤٥ الى ٧٠ سم . زعانفها الظهرية والبطنية منفصلة لا تتصل بالذيلية . اثنائها تختلط مع الانواع لكنها لا تتخلو من الرقعة . لحومها جيدة الصنف ، مستحبة العلم . أشهر أنواعها وأعزها الثلاثة التالية :

١١٥٨٩ - رُسَامَة صِنَاعِيَّة

Platessa cynoglossus (S). *Pile cynoglosse* (F).
Cynoglossum plaice (E).

سمكة من الرغاف . أعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي . مسرحها اساطم الاقفاط و اجسامها متاني الشكل ، قريب الشبه بلسان الكلب ، يطول نحو ٥٠ سم . ثوبها الى الزبد الحطية تطورها رقعة منسوبة للتوزيع تتخللها بقع قاتمة . لحومها فاخر الصنف .

١١٥٩٠ - رُسَامَة شَائِكَة

Platessa vulgaris, *Pleuronectes platessa* (S).
Pile franche, *Carrelet* (F). *Common plaice* (E).

سمكة من الرغاف . أعطانها البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال . مسرحها اساطم الاقفاط والنفق و اجسامها شبه اهليجي الشكل ، مبطط الجرم ، يطول نحو ٧٠ سم . حينها على الصفة البني . ثوبها في الصفة البني الى الخضار الحطلي المزاج يعطو تجميع اسمر وتبيج يرتقالي . صفحاتها اليسرى الى السفلى تراوح من الزبدية المزاج الى الحطلي الاخر المزاج . وتتميز بصف من الثوب الصغيرة يحته من العينين الى الزعنفة الصدرية . لحومها جيد الصنف ، مرغوبة فيه .

١١٥٩١ - رُسَامَة صَغِيرَة الرَّأْس

Platessa microcephala (S). *Pile microcephale* (F).
Microcephalus plaice (E).

سمكة من الرغاف . أعطانها المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط . مسرحها اساطم الاقفاط والمجاهد و اجسامها شبه اهليجي الشكل ، مبطط الجرم ، يطول نحو ٤٠ سم . تتميز بصغر الرأس . ثوبها الى الخضار الحطلي الاسمر المزاج تطوره رقعة بيضاء لانسوية للتوزيع . لحومها جيد الصنف ، مرغوبة فيه .

١١٥٩٢ - رُسَامَات

Attacidae, *Saturnidae* (S). *Attacidae*, *Saturnidae* (E).

فصيلة حشرات من حشرنيات الاجنسة . اجناسها المرفوعة نحو ١٠٠ وأنواعها نحو ١٢٠٠ منشرة في معظم أقطار العالم . اجسامها كبيرة القد أو متوسطة . اثنائها متباينة الالوان الجسدية . قرنها الاستشعارية مطبقة مزبوجة عند الذكور ، صلبة عند الاناث . عظامها الفكية قصيرة وبراشفها كذلك . عينها بسيطة . قوائمها الالامية عادمة الغالب . ارساغ ذكورها وصيدة الملقاة . يرقاقها خاضعة ، جرداء القشار ، زيا الحصائم المستطيلة الملب . رباط خادراتها شرجي السلك تتدل به .

١١٥٩٣ - رُسَامَة الْإِحْصَاء

راجع ابر الوشي اللي .

١١٥٩٤ - رُسَامَة

Croquis (F). *First sketch* (E).

هي الرسم الاعادي .

اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، مستعرضة الرؤوس . قرنها الاستشعارية صغيرة مركبة من ١١ فصلة . كواهلها واغدادها مستطيلة . جراثيمها ذبضية . ارساتها خضابية المقل عند الاناث ، رباعيتها في الزوج الحلفي عند الذكور . أشهر اجناسها الرسامة .

١١٥٨٨ - رُسَامَس

Rhizostoma (S). *Rhizostoma* (F). *Rhizostoma* (E).

جنس حيوانات بحرية من قراصيات البحر الموصيات بصفة الرساميات . انواعها المرفوعة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم . جميعها كبيرة القد و قمية التركيب ، قلنسوية المظلة الشفوية ، عادمة الالياف الحاررية . ملافلها الفمية رباعية الازواج ، وتدية الشكل ، محجمة الاطراف . تتوم على سطح الماء . اثنائها تراوح بين الابيض والناحبي والارزق . اعداب شففتها شائكة تلهب الجله ان لاسه . بينها انواع تقلق برشاش ناضط يطلع كثرات النار .

أشهر أنواعه :

Rhizostoma cuvieri (S)

Rhizostoma pulmo (S)

١١٥٨٥ - رُسَامِيَّات

Rhizostomidae (S). *Rhizostomidae* (F). *Rhizostomidae* (E).

فصيلة مدوس من قراصيات البحر . اجناسها وانواعها المرفوعة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم . أشهر اجناسها الرسام .

١١٥٨٦ - رُسَامَع

Heptanchus (S). *Heptanche* (F). *Heptanchus* (E).

جنس اسماك بحرية مرلودة مفترسة من فصيلة الجيلويات وثية الاشدق . انواعها المرفوعة ثلاثة أعطانها بحار البلاد المتدلة الحاررة . جميعها كبيرة القد . قريية الشبه بالقرش . اجسامها وشوية . رؤوسها شبه مخروطية الشكل . افواهها سفلية الارتكاز ، متاخرة عن المقاطع ، اعكالمها المخشوية فلوچ سباعية الازواج . أشهر انواعها الرعاة السمراء .

١١٥٨٧ - رُسَامَة سَمَكَة

Heptanchus cinereus (S).

Heptanche cendré, *H. gris*, *Cendré*, *Mouge gris*, *Parion* (F). *Grey Heptanchus* (E).

سمكة بحرية مرلودة مفترسة من الرساع . أعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تتميز من اسماك البية . مسرحها الاقفاط والمجاهد . اعدابها شرة لكنها تبعد عن الانسان . جسمها رشي الشكل يطول من ٣٠٠ الى ٣٥٠ سم . مسكها متوسط الخشونة ، قليل الثوب المشبة . ثوبها الى الزبدية تطوره مابة زرقاء مع اقترابه من شبح الظهور ويغير ويبيض عند البطن . رأسها مخروطي الشكل . لها سفلى الارتكاز . شففتها معدلة الانفراج . اسنانها كبيرة . ذرية . عينها مستديرتان . ناشرتان . شوارها الجفني يحتل مركز الزعنفة الخشوية . تصاد من ابل مسكها وزيتها واسانها . لحومها كامن الصنف .

١١٥٨٨ - رُسَام

Platessa (S). *Pile* (F). *Plaice* (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من الملساوات وفصيلة جانبيات



رُسَام



رُسَامَة مَرَاء



رُسَامَة شَائِكَة

وفصيلة الرسيات . انواعها المعروفة قليلة البند اعطائها معظم بحار العالم . معظم انواعها يعيش على الصخر وتلقم الآخر على الحث الاخر || اصدانها صغيرة لاجسية الشكل للذي يختلف مع النوع . معطنها بعين القواعد ، خاسي الدورة الخلزونية اوسباجيا .

١١٦٠١ - رَسْمَةُ الْغَابِ

Prostemma guttula (S). *Prostemma des bois* (F).
حشرة خاضعة من فصيلة البنيديات ودية مخففات الاجنحة . جسمها شبه المثلثي الشكل بطول نحو ١٢ م . || رأسها صغيره ، ازرق اللون . خطها معتدل القه ، طليق . عيناها صغيرتان ، فائزتان . زباناتها دقيقان ، مستطيلان . كوسنها ازرق اللون ، على الحلب اللطيق . حجبتيها صغيره ، سوداء . حجبتيها صغيرتان . ظهورها لينة ، احر اللون تملوه رقة بيضاء وبمراه . يطبقها الى الزرقه السوداء المواج . قوامها حجر ، كثيفة الحلب || تألف الغابات . مرتتها الاششاب البرية .



رسان برق

١١٦٠٢ - رَسْمِيل

Aristella (S). *Aristelle* (F).
نبات عشبي يري رموي حولي من التيجليات يكثر بين الزروع وفي الارض اللخسة .



رَسْمِيل

١١٦٠٣ - رَسْمُ

Paturon (F). *Pastern* (E).
جزء قائمة الفرس بين الحبيب والأظرة .

١١٦٠٤ - رَسْمُ

Tarse (F). *Tarsus* (E).
جزء من ريبيل الطائر والخرشة يقع بين الساق والخاب .

١١٦٠٥ - رَسْمَكاس

Rascasse blanche (F).
سمكة بحرية كدس كورب احشن ، اطبا .

١١٦٠٦ - رَسْمَكاس احمر

Rascasse rouge (F).
سمكة بحرية كدس جلاخ ربي ، اطبا .

١١٦٠٧ - رَسْمَكاس اسمر

Rascasse brune (F).
سمكة بحرية كدس جلاخ حجري ، اطبا .

١١٦٠٨ - رَسْمُ و رَسْمُ

Hormones
مواد عضوية ققرزها بعض اعضاء الجسم الحيواني فتقثر في سائر الاضداد التي تنتقل اليها بواسطة الدم || وهي في النباتات مواد ضوية تقتر في التندو الخولي والنسوي . والرسلم هو الحليب ، اطبا .

١١٦٠٩ - رَسْمُ

Lever d'un plan (F).
To make a plan (E).
وضع غطط الشيء .

١١٦١٠ - رَسْمُ

Droit (F). *Right* (E).
لقطة تجديدية تطلق بالمى الخالي حل المصرايب غير المباشرة او غير الملقرة . وهي تستعمل في صيغ عديدة اخصها :

Droit de litence رسم الاجازة
Droit de consommation رسم الاستهلاك
Droit de poste رسم البريد
Droit de transmission رسم التحويل
Droit de transcription رسم التسجيل
Droit d'enregistrement رسم التقييد
Droit de douane رسم الجمرك



رَسْمُ

١١٥٩٥ - رَسَان ، اَنْطُور

Ophisurus (S). *Ophisure* (F). *Ophisurus* (E).
جنس اسماك بحرية يوصف من مفتوحات المثانة وفصيلة الزبانيات . انواعها المعروفة خمسة ، اعطائها بحار البلاد

الحارة والمعتدلة الحرارة منها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي والمحيط الهادي || جميعها انقليسية الشكل ، مستطيلة الجسم المبط . جلودها عادية السه . رؤوسها اسطوانية . اعطائها ذقة . اشدانها كبيرة . اسنانها كثيرة البند ، صغيرة الحجم ، ذرية || اعراف انواعها واشهرها رسان البرق .

١١٥٩٦ - رَسَان البرق ، رَسْمِيل البَحْر

Ophisurus serpens (S). *Ophisurus serpent* (F). *Ophisurus serpens* (E).
سمكة بحرية يوصف من الرسان . اعطائها البحر الابيض المتوسط . تكثر من اسماك الماحد والتفاف البعيدة القور ||

جسمها خيق مستطيل يبدو كأنه ابوي الشكل . طولها من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . جلدها ملس البشرة ، عادم السه . ثوبا فتالي اللون ، ظهرها وجانباها الى الصفرة المظية يملؤها مزاج حسلي ، يطبا الى البياض الغني التني المواج . رأسها اميق خضابا من ظهرها وتتقل بالاسود وهو اسفني الشكل ، ذات اسنم للقرن الحاد . زعنفتها الصدرية صغيرة ، شفاقة ، مقدافية الشكل ، وها زعنفتان على ورسى . الزعنفة الظهرية خط شديد السرة ، قليل المرض الذي لا يتجاوز ٥ م . يحد من اوائل الظهر الى طرف الذنب . يقابله خط مماثله طوليا وعرضا وخضابا ، يحد من قاعدة السنق الى طرف الذنب . اما الزعانف الحوضية والذيلية فلا وجود لها || جلدها كاعن قل من يربغ فيه .

١١٥٩٧ - رَسَانِيَّات

Ophisuridae (S). *Ophisuridæ* (F). *Ophisuridae* (E).
فصيلة اسماك بحرية يوصف من القطاموات مفتوحات المثانة .

انواعها المعروفة عشرة تنقسم الى جنسين الرسان والشفيق || اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . معطنها من اسماك اللجاج . صرورها التفاف البعيدة القور || اجسامها مستطيلة مسفوفة . جلودها مائنة ، عادية السه . رؤوسها اسطوانية . اعطائها ذقة مستطيلة . زعانفها الظهرية والشرجية قليلة البند تمتد حتى اطراف الذنب . زعانفها الحوضية والذيلية متصلة || جلودها غسولة الصفات او كاعنة قل من يربغ فيها .

١١٥٩٨ - رَسْم

Sédiment (F). *Sediment, Deposit* (E).
الرسب حكر السوائل واغلاها عندما تستقر في القاع .

١١٥٩٩ - رَسْمَة

Arum arizarum, *Arizarum vulgare* (S). *Gouet à capuchon* (F). *Friar's cow* (E). *Kappenzehrurwurz*, *Kohlzehrurwurz* (D). *Arizzaro*, *Glilio* (I).
نبات عشبي ثريبي مفر من سبط الرسيات وفصيلة اللقائسيات . ينبت صفيولة يفيقة الشكل . اوراقه سنائية ، شرمانه ارسوي الطرف يملو من ٢٠ الى ٥٠ سم .

١١٦٠٠ - رَسْمَة

Rissoia (S). *Rissoire* (F). *Rissoia* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرضويات مضيئات الاربل

Rissolidae (S). ١١٦١٩ - **رُسيَّات** *
Rissolidés (F). Rissolidae (F).
 فصيلة دويبات بحرية من الرنغويات مديات الأرجل
 أمميات الحياشيم . أجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد
 مبرزة في منظر بحار العالم || أصدافها صغيرة اللد ، بطيئة ،
 تمشي على الثبوت البحرية أعضاها الخشبات || أعرف
 أجناسها وأشهرها الرسة .

Epigone (F). Epigone (E). ١١٦٢٠ - **رُسيَّسة** *
 الرسيصة مذاعة الاجينة عند الطلاب والكبديات .

Sipunculus (S). Siponcle (F). ١١٦٢١ - **رُسيَّع** *
 جنس ديدان بحرية من فصيلة الرسييحات . أنواعها المعروفة
 عديدة منتشرة في جميع بحار العالم . أجسامها شبه أسطوانية
 الشكل تطول من ٨ إلى ٢٠ سم . وهي سرسة عادمة السكم
 والمناعس . أفواهها مستطيلة ، مخروطية ، جمجمة ||
 أعرف أنواعها وأشهرها الرسيع الانمط .

Sipunculus nudus (S). Siponcle nu (F). ١١٦٢٢ - **رُسيَّع أممط** *
 نوع من الرسيع . يعيش في جميع بحار البلاد المتحدة الحرارة .
 يتحرر وجوده في البحر الأبيض المتوسط . طوله نحو ١٦ سم .
 ثوبه إلى الشقعة السوداء الموج .

Sipunculidae (S). ١١٦٢٣ - **رُسيَّعيات** *
Sipunculidés (F). Sipunculidae (F).
 فصيلة ديدان بحرية من الجفريات . أجناسها وأنواعها
 عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || أشهر أجناسها الرسيع .

Métacarse (F). Metatarsus (E). ١١٦٢٤ - **رُسيَّع** *
 هو في الحشرات فصلة الرسيع الاول .

Esquisse (F). ١١٦٢٥ - **رُسيَّمة** *
Sketch, Rough (E).
 الرسمة الرسم الاعدادي او التخطيط الاعدادي او المسودة .

Bassinage (F). Sprinkling (E). ١١٦٢٦ - **رُش** * **نُفْح** *
 هو الاسقاء بالريذا كما بالرشة .

Faon (F). Fawn (E). ١١٦٢٧ - **رُشَاء** ، **رُشَاء** *
 ولد الظبية الذي قد تحرك ورش . ج أرشاء .

Tige rampante des cucurbitacées (F). Creeping
 stem of cucurbitaceous (E). ١١٦٢٨ - **رُشَاء** *
 حبل أي ساق نباتات البصلية القرعية . ج أرشية . يقال
 أرشية البطيخ والتملين والحنظل .

١١٦٢٩ - رُشَاء *
 الرشاء مجموعة كواكب كثيرة صغار من برج الحوت .
 وهي على صورة السمكة يقال لها بطن الحوت . وفي سرها
 كوكب نير يدعى عقد الحليتين ينزله القمر آخر ليلة
 من الشهر .

Droit de tonnage رسم الجمولة
Droit de sortie رسم الخروج
Droit d'entrée رسم الدخول
Droit d'octroi رسم الدخولية
Droit de timbre رسم النسخة
Droit de quai رسم الرصيف
Droit de garantie رسم الضمان
Droit de navigation رسم الملاحة
Droit ad valorem رسم بحسب السعر
Droit gradué رسم تدريجي
Droit progressif رسم تصاعدي
Droit fixe رسم ثابت
Droit de passeport رسم جواز السفر
Droit au comptant رسم فوري
Droit constaté رسم محقق
Droit proportionnel رسم نسبي
Droit de circulation رسم نقل البضائع
Droit de mutation رسم نقل الملكية

Eristatura (S). ١١٦١١ - **رَسْمُور** *
Eristatura (F). Eristatura (E).
 جنس طير من كليات القدم وفصيلة البليات . أنواعه
 المعروفة ستة . جميعها مستطيلة الجسم ، مخروطية الذنب
 المتصل الجح ، قصيرة العنق والمقعد المستدير الطرف .
 شكلها بين الناق والفاس . أثوابها تتباينة الألوان المزخرفة
 والمبهجة || أعرف أنواعه وأشهرها الرسمور النحري .

١١٦١٢ - رَسْمُور كُدُرَجِي *
Eristatura leucocephala (S).
Eristatura leucocephala, Canard faisane,
C. cuivré (F). Pintail duck (E).

نوع من الرسمور . أخطانه تمتد من أواسط القارة الاسيوية
 إلى أطراف أروية الجنوبية والشرقية يحوي جبراتها وانهارها
 كل سنة في ذهابه وإيابه للمصيف والمشتى || جسمه كبير
 اللد . ثوبه إلى الصبغة الصفراء الملهمة بالأسود والاشترق
 والابيض . رأسه مستدلل الجسم ، ابيض اللون تملو بقعة
 سوداء . منقاده حنطي اللون ، اسود القاعدة . ويصله إلى
 الصفار الزيتي || الأنثى تبيض من ٨ إلى ١٠ بيضات
 تحضنها نحو أربعة أسابيع بينا الذكر يؤمن لها التذاه .

١١٦١٣ - رَسْمَلَكَة * هي التأنيل ، راجعه .
١١٦١٤ - رَسُو * هو الأرطى ، راجعها .
١١٦١٥ - رَسُوِي *
Sédimentaire (F). Sedimentary (E).

نمت تحريفي يطلق على ما هو مركب من رسوب .
١١٦١٦ - رُسُوِيَّة *
Stoicisme (F). Stoicism (E).
 الرسوخية او فلسفة زينون ، مذهب فلسفي يقول بثبات
 الجنان وبثبات الخلق والعزم .

١١٦١٧ - رَسُوْل القَبِيْث * هو الزنزان ، أطليه .
١١٦١٨ - رُسَيَّات *
Arées (F).
 سبط من فصيلة القلقاسيات ، أشهر أجناسه الرسة .



رسمور تدريجي



رسيع لمد

١١٦٣٠ - رَشَاة

قيل فيها : شجرة تسمى فوق القامة ورقها كورق كورك المروح ولا ثمرة لها ولا يأكلها شيء . وقيل أيضاً : شجيرة تشبه الزنبرة وهي مثل الجيفة ولها قضبان كثيرة المقد وهي مرة جداً شديدة الخضرة لزجة تنبت بالتيانح منسجمة على الأرض ورقها لطيفة ممددة والناس يطبخونها وهي غير بقلة تنبت بنبج . ج . رشأ ورشأ .

١١٦٣١ - رَشَاح

مادة فعالة توجد في بعض النباتات الطبية ، استعملها يسبب بعض الافراتازات المائلة من مفرقة او مدرة البول او مسهلة .

١١٦٣٢ - رَشَاد * ، حَرْف

Lepidium sativum, Nasturtium (S). Cresson alénois, Passerage cultivé, Nasitor, Cressonnette (F). Garden cress, Tongue-grass (E). Gartenkresse, Krassa (D). Carconcello, Crescione, Agretto (I). بقلة حولية من فصيلة الصليبيات ، اوراقها حريفة مأكولة لا تخلو من الفوائد الصحية ، تروى في الأتربة القليلة والمتوسطة الاندماج الممكن سقايتها كلما دعت الحاجة .

١١٦٣٣ - رَشَاد البَحَر هو القفيلة ، اطليه .

١١٦٣٤ - رَشَاد بَرِّي ، لُغَاء هو حرف الماء ، اطليه .

١١٦٣٥ - رَشَال ، مَطْفَرَة Jet d'eau (F). Waterspout (E). ثقب أو جهاز يطرر منه الماء .

١١٦٣٦ - رَشَاشَة *

Aspergillum (S). Aspergille, Arrosoir (F). Aspergillum (E). جنس حيوانات بحرية من الرضويات فضيحية الخياشيم وفصيلة المتشويات || أنواعها الغالبة المتحصرة توجد في بيئات الطبقة الثالثة . اما الانواع الماصرة فأصلها بحار البلاد الحارة . تعيش في رمال الشواطئ الملوثة بالماء وتنتشر فيها محوياً ضمن البوب كلسي المادة ينتهي بنشأ مستدير الشكل عديد الثغوب الدقيقة كثغوب المرشة .

١١٦٣٧ - رَشَاكَة *

Hydrocyon (S). سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من ملتصقات المثانة وفصيلة المراقنات . موطنها الأنهار الأفريقية انحصرت النيل والنيجر . طولها يراوح من ٨٥ الى ١٠٥ سم . ظهورها أخضر اللون . بطنا وجوانها فضية . لحمها لذيق الطعم . لكنها كثيرة السمك .

١١٦٣٨ - رَشِيْبَة

Coque de la noix de coco (F). Shell of cocco-nut (E). قشرة النارجيل افرغت من لبها ويستخدم بها .

١١٦٣٩ - رَشُح ، مَصْلُوب ، قُشْعُ ، لُشْع ، لُشَح ، رَشَل Suintement (F). Oozing, Sweating (E). هو الماء ينضخ بقلّة من البواع الجانج .

١١٦٤٠ - رَشْدِيْة هي القلتناق ، اطليه .

١١٦٤١ - رَشْك

Bélier (F). الرشك دويبة من العقارب تدعى عقرب اكه . اطليه .

١١٦٤٢ - وَكَم اول ما يظهر من اللبث .

١١٦٤٣ - وَكُوفَة

Commensalism (F). Commensalism (E). حالة الحليقات الحية التي تعيش وتتغذى مع غيرها .

١١٦٤٤ - وَشِيح *

Actinolema (S). Actinoleme (F). جنس اشباح حولية برية من فصيلة الحليقات . انواعها المروعة قليلة العدد منها بعض اصقاع الشرق الاذن || سوطها فرعاء تملو من ٤٥ الى ٧٥ سم . اوراقها متعاقبة السفلى سنائية التصال عامة للكتنين . العليا ريشية الشكل ، ثلاثية الانياب . ازهارها صوباني التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها صفيرة اللد لونها الى الصفار الباهت .

١١٦٤٥ - وَشِيْكَة هي البرية ، اطليا .

١١٦٤٦ - وَكَم هو الجريئة ، اطليا .

١١٦٤٧ - وَص ، طَب Damage (F). Ramming (E). هو رس للتراب أو طيه وقد يتم بواسطة الملاعة أو المساحة أو المطبة .

١١٦٤٨ - وَص البَصَاح Arrimage (F). Stowage (E). ايداع البضائع وستفها في حيز السفينة .

١١٦٤٩ - وَصَاد *

Tityra (S). Tityra Bécarde (F). Tityra (E). جنس طير من الجوارم مليات المتأثير وفصيلة القطنيات . انواعها المروعة نحو ٣٠ منتشرة في مختلف مناطق امريكا الجنوبية . تألف النيات ويقيم على قنن الانجار تترصد الحشرات لاقتراضها || اجسامها رمية تطلو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوائها مخلفة الالوان تكثر فيها الشقشة والذهبة والسواد والياض . تتميز بتقنيها الفصيلة وبأذنانها المقعرة || قوتها الحشرات على اختلاف انواعها وبعض التار المتينة البرية .

١١٦٥٠ - وَصَاص

Plomb (F). Lead (E). معدن سنجاني اللون ، ثقيل الوزن ، شديد اللزوجة . سريع التأكسد في الهواء الرطب . رمزه (Pb) . ثقله النوعي ١١٣٥٠ ، وزنه الاتوني ٢٠٦,٩١ ، ينصهر في ٣٢٤° م . ويغل بعد الاحرار بين ١٦٥٠ و ١٨٠٠° م . وهو لا يوجد سراً نقياً في الطبيعة الا نادراً . عاماته الطبيعية عديدة الاشكال والتركيب تعرف بالجاليب . اهم البلاد المنتجة لخامات الرصاصات المتحدة والمكسيك واسبانيا وكندا || وهو كثير الاستعمال الصناعي اما بعض من استلحه على السمكة السامة لانها سامة .

١١٦٥١ - وَصَاصِيَّات

Plombaginaceae (S). Plombaginacées (F). Plombaginacées (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدات القتالة . انواعها المروعة زهاء ٢٠٠ منها تها تها وتطوّر بحار المناطق الحارة والمعتدة . معظمها عشبي وبعضها لني . اوراقها متعاقبة . ازهارها سنبل التجميع ، هامي الارتكاز .



رشاد



رَشَاة



رَشَاة



رَشَاة

١١٦٦٢ - رَصِيفٌ، وَحَاف Banc (F).

ج ارضفة ووصف . Bench, Layer bed (E).

١١٦٦٣ - رَصِين

هو الحبار من القرد المقدسة ، اطلبه .

١١٦٦٤ - رَصِينَات Semnophthecidae (S).

Semnophthécidés (F). Semnophthecidae (E).

هي الحباريات فصيلة قرد من سفليات النخريين تشل أربعة اجناس : الحبار والحورب والزريك والقطروب .

١١٦٦٥ - رَصَصٌ ، كَدَه Talure (F). Graze (E).

حورص آلية تكل بالأجبار في هياكلها الخشبية تقسب حطب اللحاء وتصمينه .

١١٦٦٦ - رَضَاء Consentement (F). Consent (E).

هو أحزاب المرء من قبوله الترابط مع غيره بمقد قانوني طوعاً وإختياراً ۥ وهو أيضاً أحزاب المرء من الموافقة على عمل الغير سواء كانت هذه الموافقة منطقياً بها ام مسكوتاً عنها .

١١٦٦٧ - رُضَاب قطع الثلج والبرد .

١١٦٦٨ - رَضَاع ، رُضَاع Allaitement (F).

Nursing, Suckling (E).
التغذية بالحليب من الولادة الى القطام .

١١٦٦٩ - رُضَاعَة Biberon (F). Bottle (E).

قنينة أو جهاز خاص عديد الزنات وضع لارضاع اولااد الحيوانات عند تملر الرضاع الطبيعي .

١١٦٧٠ - رُضَاعَة الْبَكْر هي أم الحيات ، اطلبها .

١١٦٧١ - رُضَامٌ ، مَنَارَةٌ ، مَنَارَةٌ ، فَتَاحٌ ، زَرْيَعَة Emblavement, Emblavure (F). Wheat-sowing (E).

هو الحقل الذي كرب وصد وبدل وأثير أي دفن بذر .

١١٦٧٢ - رُضَامَة Acronychia (S).

Acronychie (F).

جنس شجيرات وينبات برية ومرتبعة من فصيلة السذابيات .
انواعها المعروفة قليلة العدد ، منظرها لطيف . مهدها يتد من الهند الى ماليزية وأستراليا ۥ سوقها فراء . اوراقها متناقية و متعقة ، شبه بيضيه الشكل ، جلدية الاتصال .
ازهارها خضراء ، قصيرة التويجات و رباعية التركيب .
مبيضا وباعى الفصوص . ثمارها صغيرة ، جلدية السؤدة ، لا تكمل .

أعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :

١١٦٧٣ - رُضَامَة رَائِصِيَّة

Acronychia resinosa (S). Acronychie résineuse (F).

مهدها الهند حيث يستعملون جنورها دلكتاً في معالجة داء المفاصل .

١١٦٧٤ - رُضَامَة عَطْرَة

Acronychia odorata (S). Acronychie odorante (F).

مهدها الكوششن حيث يستعملون براعمها كإدام .

١١٦٥٢ - رُصَاصِيَّةٌ ، حَتِيصَّةُ الْأَسْتَان Plumbago (S). Plombagine, Denteleire (F). Lead-

wort (E).

جنس نباتات عشبية ليفية برية طيبة من فصيلة الرصاصيات .
انواعها عديدة تألفت الشطوط البحرية . سوقها فراء .
اوراقها متناقية لمطوية صغيرة للقد . ازهارها رصاصية اللون . تربتها وسيد الثمالة والقلل الخيطي . يتلها خماسية اللق .
انديتها وسماتها وصادع كمارها خماسية التركيب .
اشهر انواعها واعرفها ما يلي .

١١٦٥٣ - رُصَاصِيَّةُ أُرُوبِيَّة

Plumbago europaea (S). Denteleire d'Europe, Malherbe (F). Toothwort, European leadwort (E). Europäische bleiwurz (D). Dentellaria, Lappoline (J).

بجلة معمرة ، تملر من ٣ الى ١٢٠ سم . فروصها مقبلية ،
اوراقها متعقة ، اذنية . تملها جامد السنج ، مسن الحافة ، عابق أخضار . ازهارها مستترفة لونها الى اليفسجي .
ازهارها يستمر من آب الى تشرين .

١١٦٥٤ - رُصَاصِيَّةُ الرَّاس Plumbago capensis (S).

Denteleire du Cap (F).

بجلة معمرة تملر من المتر الى المترين . ساقها ليفية سرعية
سرخشية اللحاء . فروصها متعقة . اوراقها لمطوية ، تملها
سرخشي الصفحة السفلى . ازهارها صغيرة للقد لونها الى
الزرق الباهت ۥ ازهارها يستمر في الصيف والخريف .

١١٦٥٥ - رُصَاصِيَّةُ زُرْكَاء Plumbago corulea (S).

Denteleire bleue (F). Blue leadwort (E).

بجلة معمرة ، تملر نحو المتر . فروصها منقطعة . اوراقها
ضيقة ، ذلقة . ازهارها خضراء ، لينة ، كثيفة التجميع ،
زرقاء اللون ۥ ازهارها صيفي .

١١٦٥٦ - رُصَاصِيَّةُ صَغِيرَةِ الزَّهَر

Plumbago micrantha (S). Denteleire à petites fleurs (F).

عشبة سولية تملر نحو ٦٠ سم . مهدها سيري . تدرج
لترين . ازهارها اربوانية صغيرة للقد ۥ ازهارها صيفي .

١١٦٥٧ - رُصَدٌ جَوِّي

Observations météorologiques (F). Meteorological observations (E).

الرصد الجوي هو ضبط العوامل الجوية المختلفة أهمها الحرارة ،
والضغط ، ولسية الرطوبة وكتبتها وقياس المطر ، واتجاه
الرياح وسرعته ، وسمدة الاشامس والسدم الخ .

١١٦٥٨ - رُصَع Larves des abeilles (F).

Larva of bees (E).

هو النحل في طوره البرقي الذي يتد من نف المي الى نهاية الزق .

١١٦٥٩ - رُصَع

الرصد هو مفاد الطائر (من كراع) ويقال راص الطائر
انتاء : سائدا (التاج) ۥ والراصع هو البق ، اطلبه .

١١٦٦٠ - رُصَن نبات طبي يدعى الخلدية و راجمها .

١١٦٦١ - رُصِيد

Solde (F).

Balance (between debit and credit) (E).

هو ما بقي من دين بعد سسم المبالغ المفقطة .



رصاصية أوروبية



رصاصية

مستقلة الاطراف. ازهارها حشوكي التجميع هجين القروح.
ازهارها حدية ، يضاء اللون ، قرمزية الاطراف ||
تنويرها خريفي .

١١٦٨٢ - رُضَمٌ

رضع ثلثة : كمرها . والرضيع هو النوى المروض .

١١٦٨٣ - رُضَمٌ

الرضع شجر قزماء الايل . الواحدة رزمة (السان) .

١١٦٨٤ - رُضَمَةٌ * ، دَاخِصَةٌ Rotule (F).

النظم المدور للتحرك في رأس الفكرة . ج. رصف ورضفات.

١١٦٨٥ - رُضَمٌ ، كَرَوِيَّةٌ ، رُزَجٌ Emblaver (F).
To sow with wheat etc. (E).

حرث التربة وعلها ويلوها .

١١٦٨٦ - رُضَمَةٌ Pierre non taillée (F).
Unparced stone (E).

هي الحجر المستخرج من القلح قبل تقطيعه . وهي الدبشة
الصالحة لبناء . ج. رصام ورضم .

١١٦٨٧ - رُطْبَاسٌ * Aramus (S).
Courlan, Courtiri (F). Courlan (E).

جنس طير من طول الساق وفضيلة التفليات. انواحه
المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم اقطار العالم . جميعها
متوسطة القند ريشة القوم ضلابة المناقيد الجالسة المستطيلة .
اولها متماكية الالوان التي تتراوح من الاصهب الصيني
الى الخفي الاسمر يطوها ترشح زيتوني واسود . حينها
حور الاحداق . متابعها الى الصغار الاخضر الملاج .
ايساغها جثوية || قوتها الحشرات والمصائير الصغيرة
ويضيها وبزور النباتات النجيلية .

١١٦٨٨ - رُطْبَامٌ Constipation
هو الاسك عارض سببه اختلال في الجهاز الهضمي .

١١٦٨٩ - رُطْبَامَةٌ * ، لُفَّةٌ سَوْدَاةٌ * Centrolophus niger (S). Centrolophe nègre (F).
Centrolophus niger (E).

سكة بحرية بيوض من الاستقريات شائكات الزعانف .
اصطادها معظم اقالييم البحر الايفس المتوسط وبعض مناطق
البحر الاطلسي || جسها وشي الشكل يطول من ٣٠ الى
٦٠ سم . حراشها صغيرة معينة . ثوبها الى الخضار
الالمر الزيتي الملاج . يمتد وتنشد سمرة في الظهر وتقل
في البطن . رأسها مستد الجرم ، متنفخ الارتكاز ،
قصير الطعم المستدير . عينها كبرتات جاحظتان . زعنفتها
الظهورية مستطيلة قاطبة عدية . زعنفتها الشرجية مستطيلة
قليلة العرض . زعنفتها الذيلية فائقة || لحمها مأكول يراوح
بين الجيد والوسط .

١١٦٩٠ - رُطْبٌ Dattes mûres (F).
Mature dates (E).

نضج البسر قبل ان يصر . الواحدة رطبة . ج. أرطاب
ورطاب .

١١٦٩١ - رُطْبَةٌ

هي القصة وهي نقل الروج . اطلها .

١١٦٩٥ - رُضَمَةٌ غَارِيَّةُ الْوَرَقِ *

Acronychia laurifolia (S).
Acronychia à feuilles de laurier (F).

مهدا جابا . لحاء جلوعها مرة المذاق ، حارة ، تستعمل
في معالجة الاسهال والجفاف .

١١٦٩٦ - رُضَمَةٌ * Echeveria (S).
Echéverie (F). Echeveria (E).

جنس نبات عشبية معمرة من فصيلة الخلدات .
اوراقها ضمية التجميع تتوسطها الشرايع الزهرية . ازهارها
خاسية البلات النافذة الاكثار || قزوح للزئين ضمن
البوت وفي الحدائق .
انواعها المعروفة متوسطة البد ، ازهرها التالية :

١١٦٩٧ - رُضَمَةٌ بَهِيَّةٌ * Echeveria fulgens (S).
Echéverie éclatante (F).

نوع من الرضية . مهدا بعض اقالييم امريكية الوسطى
والكسيك . شرايعها يرتفع من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها
ضمية التجميع تطول نحو ١٠ سم . وتعرض من ٣ الى ٤ سم .
نصالحا بحرية الخضار ، مثالية الحار . ازهارها حشوكي
التجميع . ازهارها صفر القواعد وانزام الاول ، مرجانية
لامعة في البقي || تنويرها يستمر من تشرين الثاني الى
نيسان .

١١٦٩٨ - رُضَمَةٌ جَبَّارَةٌ *

Echeveria gigantea (S). Echéverie géante (F).

نوع من الرضية . مهدا الكسيك . شرايعها يرتفع نحو
٢٠٠ سم . اوراقها صفانية الشكل تطول من ٢٠ الى ٤٥ سم .
وتعرض من ١٢ الى ١٥ سم . نصالحا بحرية الخضار ،
خلية البشرة . ازهارها عقودي التجميع . ازهارها عاجية
الون مرقونة بالاسمر || تنويرها خريفي .

١١٦٩٩ - رُضَمَةٌ حَسَاكِدَةٌ *

Echeveria secunda (S). Echéverie unilicérale (F).

نوع من الرضية . مهدا امريكية الجنوبية . شرايعها يرتفع
نحو ٣٠ سم . اوراقها اسيلينية الشكل تطول نحو ٤ سم .
وتعرض نحو ٢ سم . ازهارها عقودي التجميع ، حادة
الارتكاز ، مقوس الشكل . ازهارها مستدة اللحم ، لونها
الى الصفرة الحمراء الملاج || تنويرها يستمر من نيسان
الى ايار .

١١٦٩٠ - رُضَمَةٌ قَرْمِزِيَّةٌ *

Echeveria coccinea (S). Echéverie écarlate (F).

نوع من الرضية . مهدا الكسيك . شرايعها يرتفع من
٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها مساوية الشكل ، خلية النصل ،
ضمية التجميع ، تطول نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٣ سم .
ازهارها عقودي . بلات ازهارها قرمزية اللون من الملاج ،
صفراء اللون من الداخل ، قطرها نحو ٢ سم . || تنويرها
صيفي .

١١٦٩١ - رُضَمَةٌ مَحْدَبَةٌ الْأَزْهَارِ *

Echeveria gibbiflora (S).
Echéverie à fleurs gibbeuses (F).

نوع من الرضية . مهدا بعض مناطق الكسيك . شرايعها
يرتفع من ٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها تطول من ١٥ الى
٢٥ سم . وتعرض من ٧ الى ١٥ سم . نصالحا بحرية الخضار ،



رُضَمَةٌ



رُضَمَةٌ



رُطْبَاسٌ



رُطْبَامَةٌ

الزواحي. ازهرها عقودي التجميع يرتكز حل زناد يرتفع نحو ٢٠ سم. ازهارها قرمزية اللون. قطر الزهرة يراوح من ٢٠ الى ٢٥ سم. || تنويرها شتوي.

١١٧٠٢ - رَطِيَّةٌ مُشَقَّقَةٌ

Gasteria maculata (S). *Gastérie tachetée* (F).
نوع من الرطية. ساقها قصيرة ترتفع من ١٢ الى ١٧ سم. اوراقها لحمية، مشققة، متصببة، تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٥ سم. نصلها محذوب المسفة العليا، بتفصيلي القرن يملو تبييج ابيض. ازهرها عقودي التجميع يرتكز حل زناد يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها مرجانية اللون. قطر الزهرة يراوح من ٢ الى ٣ سم. || تنويرها شتوي.

١١٧٠٣ - رَطِيَّةٌ مُشَابِلَةٌ

Gasteria verrucosa (S). *Gastérie verruqueuse* (F).
نوع من الرطية. ساقها مقرة. اوراقها لحمية ثنائية الصف. تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض نحو ١ سم. نصلها متأليل البشرة على الصفيحتين العليا والسفلى. لون الاوراق الى الخضار القاتم والتأليل الى البياض الاخضر. ازهرها عقودي التجميع يرتكز حل زناد يرتفع نحو ٢٥ سم. ازهارها يبيض الانتشاب والزمام الاول والثاني، وريدة الزمام الثالث، خضر الزمام الرابع. قطر الزهرة يراوح من ٢ الى ٣ سم. || تنويرها شتوي.

١١٧٠٤ - رَعَادٌ هو الجبارى الاروية، اطلها.

١١٧٠٥ - رَعَادَات
Tropéidées (S). *Torpédidées, Torpédinidées* (F). *Torpéidées* (E).
فصيلة اسماك من رتبة الاشلاق، اجناسها واوراقها عديدة اشهرها الرعادة.

١١٧٠٦ - رَعَادَةٌ
Torpedo (S). *Torpille* (F). *Torpedo* (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الرعادات، واوراقها عديدة تكثر في بحار البلاد الحارة جميعها مكهية. اذا مسها الانسان خذرت يده وعفده حتى يرتد ما دام السلك حيا.

١١٧٠٧ - رَعَادَةُ التِيل هي فترة التيل، اطلها.

١١٧٠٨ - رَعَادَةٌ مَسْدُولَةٌ

Torpedo marmorata (S). *Torpille commune, T. marbrée* (F). *Cramp-fish, Numb-fish* (E).
سكة بحرية سرلود مغفرة من فصيلة الرعادات وورقة الاشلاق. اصلاها البحر الابيض المتوسط وبعض اقلام المحيط الاطلسي وبحر الشمال. تعتبر من اسماك الجبال. مسرحها اساطل الكثاف. تتميز بجهاز خطي خاص يتألف من الرأس من الجانبين والوراء مركب من مئات الموشير المسلم الزوايا والاضلاع تعمل كنوايع كهربائية يحيط تفريغها بياض المتر وقرودا نحو المئة في الثانية. اذا مسها الانسان تخدر وارتمد || جسمها قريب الشبه بالشفتين، يطول نحو ١٠٠ سم. مسكها مائل القشار. ثوبها الملوي الى الخططي الاصفر يملو موج وردي عند الذكر وخضه يتبع مستديرة زرقاء اللون، يضاء الطوق. يتبع الاثني بحرية القرن، غراء الطوق، فيها سفلى الاركان. شفاط متدل الانفراج. اسنانها متتابعة الصفوف البيدة. نباحها لفرقان جانبين. عينها صغيرتان، سطعيتان. زعانفها الظهرية اثنتان

١١٦٩٢ - رَطَلٌ
Soupeur (F).
رفع الشيء يده تقديراً لوزنه. *To weigh in one's hand* (E).

١١٦٩٣ - رَطَلٌ
سدة من الموازين القديمة قدرها اثنتا عشرة أوقية. وهو بالنسبة الى الموازين المتريّة، المتصلة حالياً في معظم البلاد العربية، يساوي ٥٠٠ غ.

١١٦٩٤ - رُطُوبَةٌ
Humidité (F). *Humidity* (E).
حالة كل جسم أو شيء رطب يحوي بعض الماء.

١١٦٩٥ - رُطُوبَةٌ لَيْسِيَّةٌ
Humidité relative (F). *Relative humidity* (E).

١١٦٩٦ - رُطُوبَةٌ نَوْعِيَّةٌ
Humidité spécifique (F). *Specific humidity* (E).

١١٦٩٧ - رَطِيَّةٌ
Gasteria (S). *Gastérie* (F). *Gasteria* (E).

جنس نباتات لحمية معمرة صغيرة القد من فصيلة الزنبقيات. منها بعض مناطق افريقية الجنوبية. سوقها صلبة أو جعدة أو متعصبة. اوراقها لحمية، قرصية مشققة. ازهارها متباينة الالوان || تزورح لزين ضمن البيوت وفي الحدائق التي لا تخشى البرد. قريبا في الارربة المتوسطة الانساج الوارفة العناصر الغذائية من عضوية ومعنوية. ازهارها كثيرة البعد اشهرها انالية.

١١٦٩٨ - رَطِيَّةٌ أَيْفُكَةٌ
Gasteria pulchra (S). *Gastérie gracieuse* (F).

نوع من الرطية. ساقها موقعة تملو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها لحمية، ماسلة، مطلة الزوايا، تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. لونها الى الخضار الالوس يملو تبييج ابيض واجر. ازهرها عقودي التجميع يرتكز حل زناد يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها قرمزية اللون || تنويرها شتوي.

١١٦٩٩ - رَطِيَّةٌ سَوْدَاكَةٌ
Gasteria nigricans (S). *Gastérie noiretre* (F).

نوع من الرطية. ساقها جعدة. اوراقها لحمية مشققة، شكلها يشكّل اللسان تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٤ سم. لونها الى الخضار الالوس السابق تملو رقة يضاء. ازهرها عقودي التجميع. زنادها يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. ازهارها الى الحمرة الزنجفيرة السوداء الموج || تنويرها شتوي.

١١٧٠٠ - رَطِيَّةٌ كَطْرَكَةٌ

Gasteria carinata (S). *Gastérie carénée* (F).
نوع من الرطية. ساقها مقرة. اوراقها مشققة لبدة. نصلها لحمية، محرمة الشكل، مطلة الاصلح الكطرة، تطول من ١٢ الى ١٥ سم. وتملو بعض التصل الفقية. لونها الى الخضار الالوس المنقط بالابيض. ازهرها عقودي معتدل الانتشاب، زناده يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها حراء القرن خرية الموج || تنويرها شتوي.

١١٧٠١ - رَطِيَّةٌ لَامِيَّةٌ
Gasteria nitida (S). *Gastérie luisante* (F).

نوع من الرطية. ساقها مقرة. اوراقها مشققة تطول من ٢٠ الى ٢٢ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. صفحاتها العليا مقعرة ماسلة. صفحاتها السفلى مربعة. لونها الى الخضار



١١٧١٣ - وَحَاشَاتُكَ

Odonata (S), Odonates (F), Wasserjungfern (D).

رَبَّةٌ حشرات من الرعيسات . اجسامها مستطيلة . وذوها كبيرة . عينها مركبة بارزة . قرونها الاستشعارية قصيرة ودقيقة . اجنحتها غشائية شبكية ، جرابها دقيقة . فصائلها وابنائها وانواعها عديدة تقسم الى مرتين : الرعاشات الكبيرة والرعاشات الصغيرة .

١١٧١٤ - وَحَاشَاتُكَ صَغِيرَةٌ

Zygoptera (S), Zygoptères, Damselflies (E), Gleichflügelige Libellen (D).

مرتبة من الرعاشات اجسامها نحيلة مستطيلة . حرايرها تنفس بخارها دقيقة مركزها في مؤخر البطن . اشهر فصائلها التبعيات .

١١٧١٥ - وَحَاشَاتُكَ كَبِيرَةٌ

Anisoptera (S), Anisoptères, Libellules (F), Anisoptera, Dragonflies (E), Ungleichflügelige Libellen (D).

مرتبة من الرعاشات تتميز باجسامها المستطيلة وذووها الكبيرة المستعصية . تنفس بخارها دقيقة مركزها جدار المستقيم الداخلي . اشهر فصائلها البمبويات والسرمايات .

١١٧١٦ - وَحَاشَةُ الثِيلِ

Epitaxis, Saignement de nez (F), Epitaxis, Bleeding at the nose (E).

هو النزف الانفي أي خروج الدم من الأنف . اسبابه عديدة اغصها الصب اللقي وضربة الشمس .

١١٧١٨ - زُحَامٌ، سَكَاوَةٌ، وَحَالٌ

Morve (F), Snoot, Glanders (E).

مرض معد يسبب ذوات الحفارف وقد ينتقل الى الانسان فيكون قتالا له .

١١٧١٩ - زُحَامَةٌ، وَحَامِيٌّ، شَجَرَةُ الْمَسَافِرِ

Ravenala (S), Ravenal, Ravenala, Urnula, Arbre du voyageur (F).

جس اجنار برية وزراعية من فصيلة الموزيات . تشبه اللوز وتنتحل مما . مهدا مدسكرو وما حولها من جزر المحيط الهادي . جلجها منتصب . اورانها حالية . مروحية الارتكازة ، تغزل من ٣ الى ٤ امدار وتعرض نحو المشرق . ازهارها عتقويبة التجميع . ازهارها يفس . ثمراها كامبر سميكة الشفوف تملف حدة بزور يفسية الشكل غنية بالمواد للشفوية المأكولة بعد طهيها واطبخها . تشورها صناعية يستخرج منها دهن نباتي لا يابس به . اما سيب تشبها بشجرة المسافر فيسود الى اقنيات اورانها الخاصة التي تحفظ للماء زلالا باردا يروي حلقن اللطائف .

١١٧٢٠ - وَحَيْلٌ

Anémomètre (F), Anemometer (E).

جهاز قياس سرعة الريح وضغطها .

١١٧٢٢ - وَحَيْلَةٌ

الرعيلة : ريع لا تدري معها لعم استقارها .

١١٧٢٣ - وَحْشٌ

Balaustes

زهر الزمان البري . واحدة رضة .

زعتنها الذيلية مجذافية الشكل . شوارها الجني يتحرك بين الزعتنين الحوشتين . مسكها جيد الصنف . شائع الاستعمال الصناعي . لحمها بين المتوسط والكائن ، قل من يربط فيه .

١١٧٢٠ - وَحَاشٌ

Stomias (S), Stomias (F), Stomias (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الرعاشيات . انواعه المعروفة حتى الآن خمسة ، اربعة منها مسرعا المحيط الاطلسي والهادي ونوع واحد يقطن في البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك الثنائات والباحاج التي لا تقترب من سطح الماء ابدًا . اجسامها مستطيلة الشكل مضغوطة كالانقليس ، وذوها عظيمة . غاطسها فلسة . اشداها كبيرة فاغرة . اسنانها متباددة ، مستطيلة و حبيطة و سادة . تحل في فكوكها السفلى علبة او طبقات متغارة الاشكال . زعانفها الظهرية والشرجية طرية الارتكاز متعاقبة . زعانفها الاخرى متباددة الارتكاز والاحجام . حرايرها سداسية او خمسية الاصلح . الزواجا قائم يكرر فيها الكسني الجوزي المولج والرعاشي الارزقة المولج والاحضر الالامس الاسود المولج . تتميز بما تحمله من ثمول مضطية مبشرة على كامل سطح الجسم وفي اماكن معينة اغصها الصفحة السفل من الفك والظفر والذنب . اعرف انواعه واشهرها الرعشة الأصلية .

١١٧١٠ - وَحَاشَةُ أَصْلِيَّةٌ

Stomias boa (S), Stomias boa (F), Stomias boa (E).

نوع من الرعاش . سمكة بحرية بيضاء . اصطلها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك الجبهة . مسرعا الغلاف التي يراوح عتها بين ٢٥ و ١٠٠ م . . اجسامها قريبة الشبه بالانقليس ، بطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . توجها الى الرعاشي الارزقة المولج تميق رفته عند تيج الظفر وتحت وتتحول الى شبيهة في البطن . واسها قلاب ، مستطيل الشكل . اطس الخلف . فيها واسع الشدة الكبير . اسنانها متباددة ، حبيطة و ذرية . فكها السفلي يحمل حدة سوطية الشكل . منها كيرتان ، علوتان . زعتنها الظهرية واحدة ، بعيدة عن الرأس ، قريبة من الذنب . زعتنها الذيلية مزوانية الشكل . اجهازها السموي يتألف من بعض الثمول المبشرة على سطح الجسم ومن صف من الثمول الصغيرة المتسارية الابداء يطرقه السطح السفلي من الجسم بجانب الفك . لحمها متوسط الصنف ، كبير المادة الزرقية .

١١٧١١ - وَحَاشِيَّاتٌ

Stomiatidae (S), Stomiatidae (F), Stomiatidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من مقفوعات المائات . اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من اسماك الاغواط والباحاج . اصطلها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدة الحرارة . اجسامها قريبة الشبه باجسام الانقليس . وذوها قليلة ، عظيمة ، فلسة ، متباعدة الاشكال . اشداها كبيرة . اسنانها متباددة و مقوسة ، سادة الاطراف . الزواجا تراوح من الرعدة الرعاشية المولج الى الرعدة الكسنية تنصلها اجزاء مضطية مبشرة على كامل سطح الجسم .

١١٧١٢ - وَحَاشٌ

Tremblade, Tremblante (F), Quivering, Trembling (E).

مرض عصبي او ميكروبي يسبب القنآن .



رَكَاسَةُ أَصْلِيَّةٌ



رَضَاةٌ

اريجونية يقطبها غط ابيض . كانوا وما زالوا يستعملون جذعها في بعض المستحضرات الطبية .

١١٧٣٨ - رَعْتُس * Nosodendron (S).

Nosodendron (F). Nosodendron (E).
جنس حشرات من فصيلة الرعنويات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم حراج العالم || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل ، تطول من ٤ الى ٧ م . رؤوسها مستعرضة ، قليلة الفشور ، مستطيلة الاطعام . عينها صغيرة . تأثيرها وملابسها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف . كواسلها قصيرة وعريضة ، اغدادها لاحقة تملؤها حزم من الحلب العقيق الاصفر لطامي الخطوط الغاطية . قوائمها نشيطة . اثرها وسيدة اللون الفاتح يكثر فيها الاسود والكستني || تألف الحراج الكثيفة الاشجار . تعيش على العصارة الصديدية التي تترشح من جروح السوق والافصان ، يرقاتها دامتة .

١١٧٣٩ - رَعْتُسِيَّات * Nosodendridae (S).

Nosodendridae (F). Nosodendridae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم حراج العالم || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل ، تطول من ٣ الى ٨ م . رؤوسها مستعرضة القعن ، قليلة البروز . عينها صغيرة . تأثيرها وملابسها نظامية . قرونها الاستشعارية قصيرة ، دبوسية الاطراف ، خماسية الفصل . كواسلها قصيرة وعريضة . اغدادها لاحقة تملؤها حزم من الحلب و نظائمه الصفوف ، صفراء اللون . قوائمها نشيطة . اسرارها خماسية القمل || تألف الغابات والحراج الكثيفة الاشجار . تعيش على العصارة النباتية التي تترشح من جروح الافصان والسوق وحل المواد المنحلة . يرقاتها دامتة || اشهر اجناسها العرعرس .

١١٧٤٠ - رَعُوف Pluies fines (F). Drizzle (E).

الامطار الخفاف .

١١٧٤١ - رَعِي ، سَم ، سَوَم ، سَرَج Paire (F).
To graze, To feed, To tend (E).

اخرج الماشية وسرحها لتأكل .

١١٧٤٢ - رَعِي الْإِبِل * Echinops sphaerocephalus (S).

Echinops commune (S). Echinops commune, Boulette commune (F). Globe thistle (E). Riesen-kugeldistel, Kugeldistel (D). Echinops commune, Cardo pallirola (I).

ومن اسماءه مرابولا شائعة ، شوك الجبال الشائع ، ستاني . نبات عشبي بري من فصيلة المركبات الانبوية الزهر . يطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . ساقه وفروعه وارواقه غدية لزجة . اوراقه عريضة البلق قليلة الشوك . ورياساته الزهرية مذكورة ، قطرها من ٤ الى ٨ سم . لونها الى الزرقاء الباهتة .

١١٧٤٣ - رَعِي الحَمَام Verbena (S).

Verveine (F). Vervain (E).
جنس نباتات برية وريزية من فصيلة الساجيات . انواعها كثيرة العدد . ساقها مفصصة ، عشبية او خشبية . اوراقها متعاقبة ، كاملة او مفروسة ، لالحة ، حامضة او معتقة واذينية . اثمارها سنبل او نوري التجميع ، اعلاها صغيرة القند ، عديدة الالوان ، عطرية المرق || احرف واشهر انواعه التي زيناها ما يتبع .

١١٧٤٤ - رَعْنَة Caruncle (F). Caruncle (E).

زائدة لحمية تكون على رأس أو عنق أو مقار بعض الطيور كما في البليك الحلي . ج رعاث .

١١٧٤٥ - رَعْنَبُون Barbillon (F).

Little barbel, Wattle (E).
زائدة لحمية مسطرفة تشبه الزنمة تكون تحت فمك البليك ، وما يشبهون .

١١٧٤٦ - رَعْنَاع Pulcaria (S). Pulcaire (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ جميعها نباتات عشبية حولية وعولة ، اوراقها لينة ، حامضة ، معتقية . اثمارها رويسية صفراء اللون . اشهرها رماع ايوب

١١٧٤٧ - رَعْنَاع أَيُوب * Pulcaria dysenterica (S).

Pulcaire dysentérique, Herbe de St Roch, Inule des prés (F). Common fleabane (E). Grosse föhkrut (D). Pulcarias svedens, Inula pratensis (I).

نوع من الرماع البري مشهور بمناقته الطبية . يصلح فساد المدة ويقضي على الزحار .

١١٧٤٨ - رَعْنَعَة * Temed النبات النائي واحش به .

١١٧٤٩ - رَعَص Secouer (F). To shake (E).

رض الريح الشجرة : سركها .

١١٧٥٠ - رَعَل Abeille mâle (F).

Masculine bee, Drone (E).
هو ذكر النحل ، ويصلي اليمسور .

١١٧٥١ - رَعَل Troupeau de solipèdes (F).

Soliped drove (E).
الرجل ج ابدال هو القطيع من الخيل والحمر الوحشية .

١١٧٥٢ - رَعَل Bourgeonner, Débourner (F).

To bud (E).
رمل الشجر والكرم : خرجت رملته اي برأعه وزماته .

١١٧٥٣ - رَعْنَة Brouillie (F).

Sprigs, Small-wood (E).
الطرف النفس لتاني من الكرم . ج رعل . والرمله هي نخلة النقل وقيل التامة .

١١٧٥٤ - رَعْنُول * هو الطرخون ، اطالبه .

١١٧٥٥ - رَعْم Graisse (F). Grease (E).

الرم هو الشحم .

١١٧٥٦ - رَعْن ، رَعْنَة شمسة * Insolation (F).

Insolation, Sun-stroke (E).
عارض يصيب الحيوان وهو ضرب من الاحتقان الدماغى سببه تأثير الشمس في جمجمة الحيوان .

١١٧٥٧ - رَعْنَة ، رَعْنَة كَبِير * Danaë isurus, D. racemosa (S).

Danaë, Fragon à grappes, Laurier d'Alexandrie (F). Alexandrian gree laurel (E). Echtes münsterbauben (D). Pugnapto a grappolo (I).

جنية برية وريزية تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ودائها مستطيلة . اثمارها عقودية التجميع غضراء اللون . غمارها



رماع ايوب



رعنا



رعوس



رعي الابل

١١٧٤٤ - رعي الحَمَام الأُرْسِي

Verbena arnoides (S). Vervaine-erinus (F).

حشبة حولية ، تملحو نحو ١٥ سم . ساقها فروع . فروعها انفية الانتشاب . أزهارها ثلاثية التفريش ، نصلها خلي البشرة على صفحتيه . أزهارها صغيرة القند لا حار مهذب لها . لوها إلى الزرة الزاهية ٥ أزهارها يستمر من تموز إلى آب .

١١٧٤٥ - رعي الحَمَام الأُمْرِي

Verbena bonariensis (S). Vervaine de Buenos-Aires (F).

حشبة معمرة ، تملحو من ٥٠ إلى ١٢٠ سم . ساقها منتصبة زغبية . أزوارها لاطنة . نصلها غشن للملس على صفحتيه . أزوارها مستطيلة زباه التبرج ، لوها إلى الزرة الباهة . أزوارها يستمر من تموز إلى آب .

١١٧٤٦ - رعي الحَمَام الطُوقِيُونِي

Verbena teuroides (S). Vervaine germandrée (F).

حشبة معمرة ، تملحو نحو ٣٠ سم . ساقها فروع . فروعها مغربية الانتشاب ، انفية . أزوارها قصيرة المدق اذنية . نصلها مستطيل الشكل ، ذلق البقعة ، سنن الحافة غشن المروق ، خلي الصفحة السفلى . أزوارها يمش ثم تنصرف إلى الوردي . عرفها ليلي ٥ أزوارها سني .

١١٧٤٧ - رعي الحَمَام الكَبِيرِي

Verbena sulfurea (S). Vervaine jaune-soufre (F).

حشبة حولية ، تملحو نحو ٦٠ سم . ساقها فروع . فروعها ضيقة الانتشاب . أزوارها قدية التفريش خلية البصل ، ملطف الاطراف . أزوارها خلية التبرج ، كبريتية اللون . أزوارها سني .

١١٧٤٨ - رعي الحَمَام الكَنَدِي

Verbena canadensis (S). Vervaine du Canada (F).

حشبة حولية ، تملحو نحو ٣٠ سم . ساقها فروع . أزوارها مستعرضة برفضة تملحو من ٣ إلى ٥ سم . أزوارها قصيرة مستعرضة ، قليلة البرف الليلي ، لوها يختلف مع فروعها فيها الأزرق والبنسجي والأرجواني ٥ أزوارها يستمر من تموز إلى آب .

١١٧٤٩ - رعي الحَمَام الحَزَلِي ، بَارُوسْتَارِيُون ، حَشْبَةُ الأُجَام

Verbena officinalis (S). Vervaine officinale, Herbe sacrée (F). Vervain, Holy-herb, Pigeon's-grass (E). Echtes elsenkraut (D). Verbena officinale, Colombaria (I).

حشبة معمرة ، تملحو من ٣٠ إلى ٧٠ سم . ساقها فروع . فروعها منتصبة . أزوارها احليجية مفرصة . نصلها أثرب الصفحة السفلى . أزوارها صغيرة القند ودية اللون ويحوي مروج اخضر ٥ وهي من الاعشاب الكثيرة المنافع السحية . يستخرج منها بالتقطير مطور فاخرة الصنف مزينة الاستعمال ٥ كانت ولا تزال تستعمل لدى الجبل ولزيادة القوة الحليجية ٥ أزوارها سني .

١١٧٥٠ - رعي الحَمَام الحُطَطِي

Verbena venosa (S). Vervaine venée (F).

حشبة معمرة ، تملحو نحو ٥٠ سم . ساقها منتصبة زباه اللباد . أزوارها لاطنة نصف حاشية . نصلها غشن الصفحة العليا ٥ خلف السفلى خلي المروق . أزوارها فولجة العرف لوها إلى الليلي الأزرق ٥ أزوارها يستمر من حزيران إلى آب .

١١٧٥١ - رعي الحَمَام

جنس بطور مجهرية من فصيلة الرعيثيات . انواعه قليلة تنطلق على بعض النباتات فتنبها ٥ أشهر انواعه الثلاثة التالية .

١١٧٥٢ - رعي الحَمَام القُرْبِيُون

Endophyllum euphorbiae-silvestris (S).

نوع من الرعيث يركب التولمي حيث تنطلق رائحة مشائه وتمنع النبات عن الاضرار . يتم عن ريشه رائحة عطرية ذكية وتقلص في غشار الورق . اما ذمائه فتركب الاوراق على صفحتها السفلى ٥ يكالغ بمركبات النحاس عند ظهور عوارض الوبس .

١١٧٥٣ - رعي الحَمَام التُوكُودِيْن

Endophyllum valerianae (S).

نوع قليل الانتشار يتطفل على السروق والاوراق ليؤذيها ويمنع الانرار ٥ يكالغ باستعمال اسد مركبات النحاس نفساً على الاوراق عند ظهور عوارض الوبس .

١١٧٥٤ - رعي حَمَامِ العَالَمِ

Endophyllum sempervivi (S).

نوع من الرعيث يركب لحاء الجلعن فيمنطقها بيشوره الكروية الصغيرة البرتقالية اللون ثم يقرسها ويصطبها وقد يسبب يباسها ويؤذي ٥ يكالغ بفتح النباتات المنصبة ويتطهر التربة .

١١٧٥٥ - رعي حَمَامِ العَالَمِ

Endophylacées (S). Endophylacées (E).

فصيلة بطور مجهرية من رتبة الحمايات تنبها ٥ مشائها المتضاربة المتتابة ضمن نصات بعضها المسقلان . لاس بويافها دعاني الشكل التيدي الانفصال ٥ اجنلها الاقتصادية قليلة . عرفها الرعيث .

١١٧٥٦ - رعي حَمَامِ العَالَمِ

Odonoptera (S). Odonoptera (E).

طبقة مشرات قارضة مجنسة مستطيلة الاجسام . رؤسها كبيرة القند و حوتها بارزة . فروعها الاستعمارية شديدة القصر . رؤسها مستطيلة و غشائية و كثيرة العروق الخشكية . أثولها عديدة الاوان ٥ نصلاتها واجسها وانواعها كثيرة القند تضم إلى ريتين : العراشات والجعلليات ومن نصلاتها المشهورة : النتيات واليسوسيات .

١١٧٥٧ - رعي حَمَامِ العَالَمِ

Bélemet (F). Bélemet (E).

صوت ذوات الخف .

١١٧٥٨ - رعي حَمَامِ العَالَمِ

Procellaria (S). Pétrel (F). Pétrel (E).

جنس بطور مائية من كفيات تتقدم بفصيلة الرغائيات . انواعه المرفوقة حمة جميعها متوسطة القند تشبه ترائق البواجر في سفرها ايام لا تتقاط بقايا المطيع ٥ اجسامها تملحو من ٤٠ إلى ٥٠ سم . اجنلها مستطيلة ذائفة الاطراف . اذناها قصيرة . مناقيلها ضليعة و متوسطة القند و لمطولية الصفحة العليا و غدة السلق و صبيحة المناس الدرية . غنايتها وحيدة القرفة . ارضائها كاهية . شترة اصابعها كاملة تمتد حتى الخالب ٥ قوتها التفريشات ويشت الحيتان والاسماك . مسرعا بجار البلاد الحارة والباردة . توم على الماء وتحوم فوقه ولا تقرب البر الا في زمن السقاء



رعي الحام الطوقيون



رعي الحام الكندي



رعي الحام الفزني



رعي حَمَامِ العَالَمِ

Epinephèle
Jurtina, Maniola Jurtina (S). Epinéphèle
Jurtina, Myrtil (F). Epinephèle Jurtina (E).

حشرة من فصيلة الهاميات ورتبة حرشفيات الاجنحة .
موطنها بحث من الشرق الاقصى الى اوروبا . فراشها جارية
قوتها مفر الاضرار . سرقتها خاضعة قوتها صفت التبعيليات ||
جسمها متوسط لثقل يطول نحو ١٧ م . بسطها تراوح من
٥ الى ٥٠ م . رأسها صغير الحجم . صيها كيرتان .
زيانها صولجانيان . جوشها كسني اللون صناعي الموج عند
الانثى ، اسمره عند الذكر . بطنها كبد الخمل القصير
يتصل بثوب الجوش عند الشقين . ورأسها كسنية ،
سمره الموج عند الذكر ، حنطته عند الانثى ، الزوج
الانثى من الذكر غصب بتقطة بيضاء المركز حنطية
الجولاب || لها جبل واحد في الحول . تظهر الفراشة في
ايار . تسرح في النهار تماثل بعد ظهورها بشرة اسابع
وتتمسك المكان لطعام السفل من تصال الاوراق ||
السرقة تطول نحو ٣٥ م . جسمها اسطواني الشكل ، مائل
التقار . قوتها الى الريدة الصفراء الموج يملوها ثلاثة خطوط
منها خط ثوبي وخطان جانبيان جميعها الى الخضار الماي .
رأسها اسود . شرجها مجهز بزايدة صغيرة مفلقة . مدنها
ورواجها الى الطحلة || طور الاكمال الذي يستمر نحو
ثلاثة اسابيع يتقضي في التربة بين الجلالة ونحتها .

Terre sablonneuse (F).
Sandy soil (E).

Trachée-artère (F).
Windpipe (E).

Prémonition (F).
Premonition (E).

Desiderata

Procellariidae (S).
Procellariidae (F). Procellariidae (E).

فصيلة طيور مائية من كليات القدم مستطيلات الاجنح .
اجناسها وانواعها قليلة البدن ، اسطها معطر بحار العالم .
لا تقترب من اليابسة الا في زمن الكرم والترحيم واخضتها ||
اجسامها كبيرة ، شديدة اللط . تتميز بانحسبها
المستطيلة ، اللافسة ، الذرية . مناقبها غليظة ، رافعة
الاذنك العليا ، حنجرة المناس . غناياتها انبوبية الشكل .
اقدامها غالية من الاصابع الخلفية الا في بعض الاجناس
المجهزة بزوائد قرنية شديدة الصغر || اجناسها خمسة :
الزرافة والقطرس والجلم وبلط والماء والتدروم .

Artère mammaire (F).
Mammary artery (E).

Artère mammaire (F).
Mammary artery (E).

Ansérine (F). Goose-foot (E).

والخضن . انثاها تخمن بيضة واحدة نحو خمسة اسابيع .
الذكور تزين الغذاء .
اعرف انواعه :

Procellaria glacialis (S). Pétrel glaciel, Fulmar (F).

Procellaria capensis (S).
Pétrel du Cap (F).

Procellaria hamata (S). Pétrel hamta (F).

Perméable (F).
Permeable (E).

اروس رغب تغاغل الماء الكثير ولا تسيل الا من مطر كثير .

Perméabilité (F).
Permeability (E).

صفة الاروس الرغب وهي قابلة نفوذ السوائل والنازات
في التربة وفي غيرها من الاجسام .

Ereos (S).
Ereô (F). Ereos (E).

جنس حشرات مائية قانصة من غديات الاجنح وفصيلة
المكروليات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع
مناطق العالم باستثناء الاصاوغ الباردة . تعيش في البحيرات
والمناقع والاموار ويجاري الماء القليلة الانسياب . قوتها كل
ما تيسر لها من مواد عضوية حية كانت او ميتة ||
اجسامها متوسطة القد ، احليجية الشكل ، مستدلة
الاصدياب ، مجاذبة الجرايز الخلفية ، حنجرة الامامية
عند الذكور || يرقاتها مائية قانصة مؤفة . لا تمف عن
سره السمك .

Epinephèle tithonus, Maniola tithonus (S).

Epinéphèle tithon, Tithon (F). Epinephèle
tithonus (E).

حشرة من فصيلة الهاميات ورتبة حرشفيات الاجنحة .
موطنها جميع المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط
الى اوروبا . فراشها جارية قوتها مفر الاضرار . سرقتها
خاضعة قوتها صفت التبعيليات ||
جسمها متوسط لثقل
يطول نحو ١٧ م . بسطها نحو ٤٠ م . رأسها صغير الحجم .
صيها كيرتان . زيانها صولجانيان مستطيلان . حرشفها
دقيق الحجم . جوشها كسني اللون عند الذكر ، حنطية
عند الانثى . بطنها كبد الخمل يتصل بثوب الجوش عند
الشقين . ورأسها ، عند الشقين ، الى الشفرة يملوها
تبقيح حنطي وتنتيط اسود وتبيض اسمر وتتمسك الحول ||
لها جبل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح
في النهار . تماثل بعد ظهورها بنحو حشرة اسابع وتتمسك
المكان لطعام السفل من تصال الاوراق ||
السرقة تطول نحو ٣٥ م . جسمها اسطواني الشكل ، مائل
التقار . قوتها الى الريدة الصفراء الموج يملوها ثلاثة خطوط
منها خط ثوبي وخطان جانبيان جميعها الى الخضار الماي .
رأسها اسود . شرجها مجهز بزايدة مفلقة الى ثلثين ||
طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في
التربة تحت الجلالة ضمن غلاف عضوي للمادة .



رُغَاءُ بَيْرِن



رُغَاءُ جَرْتِنَا

Rhyssa (S).

Rhyssa (F). Rhyssa (E).



رغل

١١٧٨١ - رُغَيْسَة *

جنس حشرات من غشائيات الاجنحة المحصورة الاشرافيات الحشرات وفصيلة التنسيبات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع انحاء العالم || اجسامها دقيقة مستطيلة . اطولها الكاملة ، من الرأس الى طرف المرنز ، تراوح من ٨ الى ١٦ سم . اوائها مبيانية اللونان كثر فيها الذهبية الخضبة بالاصفر || تتميز باسنانها الاجسام والزباني واقوام والممرزات . ممرزاتها خشيعة تحترق الفكر والحشب تعتبر من الحشرات المفيدة لانها تلتهم الكن في بطون ويرقات الحشرات الحاشية تقتضي عليها .

١١٧٨٢ - رُغَيْسَة * هـ مِرْزُورَم Mesoderme (F).

Mesoderme (E).

الرغيلة في علم النبات الغلاف النشائي الذي يملأ الجباب وتلغسه القشرة || وهي في علم الحيوان (الزورلوجية) انشاء الاسوط بين البشريين الخالجية والداخلية .

١١٧٨٣ - رُفَاجَة سَمَرَا * هـ

Apotomus latigens (S). Apotome brun (F).

Apotomus latigens (E).



رغيف أنثى

حشرة قاصصة من فصيلة الرنائجيات ورتبة غدييات الاجنحة . موطنها بعض الاقاليم المعتدلة الحارة من حوض البحر الابيض المتوسط . تألف المواقع الرملية التي لا تخلو من العشب . غناصها تعيش على الحوام والحشرات الدنيا والديدان القلبية . يرقاتها تعيش في اولى عهدها على المواد المضوية ثم على ما تستطيع اقتراض من الحشرات والحوام || جسمها صغير القند يطول من ٥ الى ٦ سم . قوائمها الى السرة البنية السفاه . رأسها صغير الجرم ، مستطيل الخيط ، زباناها ديقان ، مستطيلان . عيناه صغيرتان . ظهورها ثنائي التنعبد القندي القاطب . ارسافها خشيعة القمل || الاثني اسفر قفأ من الذكر واجت ثوباً منه وقصر زباناها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر الربيع ويتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند ادراكها انتم تطول نحو ١٠ سم . جسمها اسطواني الشكل ، تبي اللون ، اسمر الخيد ، اخير اللدب ، اسود الرأس والشرج || طول الاكمال يستمر نحو ٣٥ يوماً وينتهي بظهور الحشرة الجملانة في اواسط حزيران .



رغية

١١٧٨٤ - رُفَاجِيَّات * هـ Apotomidae (S).

Apotomidae (F). Apotomidae (E).

فصيلة حشرات قاصصة ثلثة من رتبة غدييات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة معظمها من حشرات المناطق الحارة || جميعها صغيرة القند قلما يتجاوز طول الواحدة منها ١٠ سم . رؤوسها اسطوانية الجرم ، مستطيلة الزباني المغارية الفصل . كواسلها كاسية الشكل . اجسامها خلية القشعار . اعوامها ثمانية الاغابيد القاطبة الخنازيرة || تسرح في النهار وتبيت في الليل . تسى بسرعة وشرقة وتطير بشفة . قوتها ما تيسر لها من الحوام والحشرات الدنيا والديدان || اشهر اجناسها الرفاجية .



رُفَاجَة ممراد

١١٧٨٥ - رُفَادَة الرزادة هي غشب السقف .

١١٧٨٦ - رُفَادَة Comprese (F). Comprese (E).

هي الصبية المظهره المديدة الطول التي تقسم بها الجرم .

١١٧٧٧ - رُغْل * قَرْمُوتِيَّة Vernonia (S).

Vernonia (F). Vernonia (E).

جنس نباتات عشبية جلوسورية طيبة معمرة من فصيلة المركبات معقودة التعريف على اسم البوتاني فزون || انواعها المعروفة عديدة . اصطناعها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || سيقانها خضراء خالية المصارة تركت على جذائير غليظة . اورقها متعاقبة صغيرة ضيقة التصل الجالده . ازهارها فردية ، طريقة الازنكاز ، ويلبب نفسها اللون الابيض . يزورها صغيرة ، مزوانية الشكل ، خفدة . ممرها || جلوسورها دافئة الحسى ، رقيقة ومارة شديدة . اورقها وانواعها تستعمل استعمال الناي .

١١٧٧٦ - رُغْلَة Agneau, Chevreau (F).

Lamb, Small goat (E).

صغير النعجة او المُر لا يزال يرغل امه .

١١٧٧٧ - رُغْنَة Erg (F). Erg (E).

الرغنة اسم يطلق على كل منطقة صحرانية تشاه الكتيان المتحركة . اما المناطق الصخرية المرتفعة التباد تسمى حادة .

١١٧٧٨ - رُغْنِيَّات * هـ فُتَحَامَة

Rhagonycha (S). Rhagonyche (F).

جنس حشرات من فصيلة الدواحيات ورتبة غدييات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٦٠ اصطناعها الشرق الاوسط واروبة . جميعها مستطيلة الشكل ، صغيرة القند . اطولها تراوح من ٧ الى ١٨ سم . اوائها غليظة اللونان يكثر فيها الاصفر والالتهيب الغبار بالاحمر او الازرق او الالاسد || تسرح في النهار . تظهر في اواسط الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . ممرها الاعمار || يرقاتها تآرية مقترنة تقضي على معظم الاساريع وتعقبها بنشاط .

١١٧٧٩ - رُغْنِيَّات شَفْح * هـ

Rhagonycha fulva (S). Rhagonyche rous,

Rhagonyche rous (F). Rhagonycha fulva (E).

حشرة واشعة غاشلة من فصيلة الدواحيات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف المواقع التي تكثر فيها الازهار واغصانها الازهار البرية . غناصها تعيش على بتلات الازهار ورسيقها . يرقاتها تعيش على المواد المضوية وعلى ما تقتريه من الحشرات الدنيا || جسمها صغير القند يطول من ٧ الى ١٠ سم . قوائمها الى الثلثة القصيرة يمتد من اطراف الظهران . رأسها صغير الجرم . زباناها عيطيان . عيناه صغيرتان . ظهورها لا يلبس كامل البطن . بطنها اسفر اللون ، معظمه اللطف . ارسافها خشيعة القمل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتعيش حتى اواسط تموز . تسرح في النهار . تسانه بعد ظهورها البرقة عند بلوغها الادراك انتم تطول نحو ١٨ سم . جسمها مبطل الجرم ، اسمر اللون ، حنطي المراج ، سداسي الزواجب اسمر ، مستطيل الرأس الجلوي ، ضليخ القشعر ، مدبب الطرف || طول الاكمال الذي يستمر نحو ٥٥ يوماً ينتهي في الترية .

١١٧٨٠ - رُغْوَة السَحْر Magnésie(F). Magnésie(E).

هي سيليكات المغنيزيوم الطبيعي يستعمل في عدة صناعات دقيقة .

١١٧٩٨ - رَقْلَانِيَّات * Melanconiales

مرتبة تطور مجهرية من رتبة الزويجات تتميز بكتلتها لإنثاء في السقولة. فيها عضون الجوانب يكتشف جمل دقيق قصير. اجناسها عديدة تجمعها فصيلة واحدة تدعى الرقليات.

١١٧٩٩ - رَقْلَة * Melanconis

جنس تطور مجهرية من الرقليات يتميز بيضه الشفاف الثنائي الخلية. له نوع واحد هم الاقتصاد الزرامي ينسب رقة الكسنة.

١١٨٠٠ - رَقْلَة الكَسَنَة * Melanconis modonisi

Melanconis modonisi, M. pernicioso, Fusilcocum perniciosum, Coryneum modonulm, C. perniciosum, C. kunzei castanea (S).

نظر مجهرى ينسب اعضاء الكسنة فيؤذيها ويسبب اضرارها في بقع متخففة مسطحة مدية الرأس والسطح بارزة الحافة تركيب لحاء الاغصان ضمنت خلايا وتقل الاوعية وتعزل سير النسج وتبادل. وقد تقضي عليه عندما تطرق النصف فتنابل الاوراق وتبنيها الانثاء والانثاء والنصف. يكافح بقطع وسرق الاغصان المبرورة ثم تطهير الجروح بمحلول سلفات الحديد او سلفات النحاس.

١١٨٠١ - رَقْلِيَّات * Melanconidae

Melanconidae, Mélanconididae (F). Melanconidae, Melanconididae (E).

فصيلة تطور مجهرية من الرقليات ورتبة الزويجات تتميز بوسيلة جنية جلدية تقوم على جرما احسان غليظة طليقة. يوزعها غروطي او اسطوي الشكل، ثنائي الخلية، شعبي الوترية المتفرعة. اجناسها المؤدية ١٦ البستلوزيه، البروسيبوره، الرقة، البستلوم، البستلوكسة، السبجة، السيليبسوره، البستلوسبوروم، الشبيمة، الكريبتوسبوروم، الكورينوم (الرقة)، الصوف، الليبرتلا، المرسونية، الميكسوسبوروم والنيوسبور.

١١٨٠٢ - رَقْل Mammite

Mammitis, Mastitis (E). نوع من الالتهاب وهو مرض يصيب الضرع فيؤذي.

١١٨٠٣ - رَقْلَاء Consorts

الشركاء في المصير، اصحاب المصلحة الواحدة.

١١٨٠٤ - رَقْل Penne

Feather of the tail or wing (E). كل ريشة غليظة طويلة من ريش ذنب الطائر وجناحه. ج. رقال.

١١٨٠٥ - رَقْلِيَّات Rafflesiaceae

Rafflesiaceae (F). Rafflesiaceae (E). فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة، عديمات السامات، منخفضة الميضي. اجناسها وانواعها قليلة جميعها اصحاب استوائية الميضي طفيلية ترتكز وتقوم على مشرة ليفية تنشب في لحاء حوائلها.

١١٨٠٦ - رَقْلِيَّة Rafflesia

Rafflesia (F). Rafflesia (E). جنس نباتات مشبية طفيلية من فصيلة الرقليات. انواعها ثلاثة، سوقها قصيرة مدادة. اوراقها حوشية. ازهارها لحمية كبيرة للقد، قطرها نحو المتر. وزنها ٧ كيلو. بتلاتها رباعية بيضاء اللون، قرمها احمر قرميدي تفوح منها رائحة كريهة لا يقربها شيء.

١١٧٩٧ - رَقَال Emasculation des fleurs (F).

Emasculation of flowers (E). اقتطاع منك الزهر منعا لتايده منها.

١١٧٩٨ - رَقَال، صَبَاب السَمَك Céryle

Céryle, Kingfisher (E).

جنس طير من الرقليات، انواعه ١٤، موطنها الماء. يتكرر ويصيدها في المناطق الحارة والمعتدلة. تتميز بمتانتها القوة المسطحة، واجنحتها المتوسطة القد، باذنانها القرمزية المستديرة وياصافها القصيرة. الالوان متعددة الاالوان لكنها دين القردى ورفقا وزها. انثاء تدر في صعوخ المستور. تبيض ٧ بيضات تحضنها وحدها من ١٤ الى ١٦ يوما. اعرف واشهر انواعها ما يلي.

١١٧٩٩ - رَقَال السَّال Ceryle alcyon

Céryle-alcyon (F).

طائر من الرقالات، طوله يراوح من ٢٩ الى ٣٠ سم. ثوبه رمادي اللون ازرق المواج. صدره مشوح بالازرق. يلمه ابيض حاجي. جنتاه مرتويات بالابيض. ذنبه خفيث الرقعة الماجية. قوته الاسماك والقشريات والفضفاد والوزغ والجنادب والجراد.

١١٧٩٠ - رَقَال شامع Ceryle rudis

Céryle rudis (S). Céryle-pile, Pied Kingfisher (E).

طائر من الرقالات، طوله نحو ٢٧ سم. رأسه قنبري الريش المسطح. ثوبه ابيض الظواهر، ابيض البوائن والصدر والبطن. عنقه وصدره مطوقان بقلادتين نصفيين لونها ادم السرة النحسية. موطنه آسية الغربية وافريقية الشرقية والشمالية. يأنف الشطوط البحرية ويرب الزهر ويجاري الماء. قوته الاسماك الصغيرة والقشريات والفضفاد والحشرات اعصها الجنادب والجراد.

١١٧٩١ - رَقَش Pelie

(F). Shovel (E). اداة يستعمل لجرف التراب ونحو.

١١٧٩٢ - رَقْع Mainlevée

Mainlevée (F). Rapture, With drawal (E).

هو رفع حيز او ابطال مفعوله من مقاري او مقاومة نسج في تقيية.

١١٧٩٣ - رَقْع، تَشَل Détarrage

Détarrage (F). Disinterring (E).

اخراج الشيء من التربة كالحراث في آخر التلم واروية الشجرة والجذور المقطوعة الخ.

١١٧٩٤ - رَقْع الاختتام Levée de scellés

Levée de scellés (F). Take of seals (E).

عمل يقوم به القاضي المختص فيفتح الاعتام التي اصفاها به ان يتحقق من صلاحيتها.

١١٧٩٥ - رَقْع الصَرَائِب Dégrèvement

Dégrèvement (F). Reduction, Allowance (E).

هو ان رفع الضريبة او تخفيض من المكلف.

١١٧٩٦ - رَقْع اليد، كَفَّ اليد Dessaisissement

Dessaisissement (F). Parting with (E).

هو الامتناع او المنع من ادارة مال او عين.

١١٧٩٧ - رَقْع

هو تبن النرة.



رقال شامع



رقة الكسنة

Non rustique (F). No rustic (E). **١١٨١٥ - رَفَنَة**
نمت تجريبي يطلن على النباتات المطلوبة التي تستعمل
التخصيص في التربة والمناخ والموقع.

١١٨١٦ - رَفُونَج هو أصل كرب النحل.

١١٨١٧ - رَفُول * Parodia, Sifflet (F).

طائر من الجوارث سفيات المناقير وصغيرة الفروسيات. موطنه
جنوب الهندية. يألف النباتات قوة الحشرات والاساريع
والقنيدان والجار النقية واليزور البرية || جسم صغير
لقد يطول من ١٨ إلى ٢٠ سم. ثوب الذكر إلى السواد
الحلي الاحمر اللامع. زوره وصدره والقسم الاسفل من
عصره الى الصغار النحاسي الاسمر. وأسه متوج بست
رفات دقيقة مستطيلة تتجهى بست مخطات صغيرة نحاسية
اللون. الاثني حادة الرقاع وثوبها اسطوي الى الشحنة
السراء. زورها وصدرها وبقها الى كشبة الصهباء.



رفناء الخدائق

١١٨١٨ - رَفِيخ Turgide (F). Turgid, Swollen (E).

نمت تجريبي يطلن على اعضاء الحيوان والنبات التي تتورم
نلقائيا أو مرضا فبهم وكأنها رافضة.

١١٨١٩ - رَفِيل هو نصارية القرعيات، الملباء.

١١٨٢٠ - رَفِيدَة Fleure (F). Fleure (E).

الرَفِيدَة وتسمى الرباط الجنبى، فشاء يصح بين الترجمة
والقوة أي الزوفين عند الحشرات.



رَفِيل

١١٨٢١ - رَفِيدِيَّات * Raphididae (S). Raphididae (F). Raphididae (E).

فصيلة حشرات مفترسة من رتبة شبيكات الجناح. اجسامها
المعروفة قليلة العدد، اما الانواعها فنحو ٨٥ منتشرة في
معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة
القد، شبه اطيالية الشكل، تطول من ١٠ الى ٢٠ م.
بسطة اجسامها تراوح من ١٢ الى ٣٠ م. رؤوسها ناعمة.
جهازها التنسي نظامي. انزاعها مستعمر. جاجها مستعزل.
تأثيرها قليلة للتد، بمجزة بلسانها قوية. ملاسها مركبة،
الفكية رباعية الاجزاء. الشفوية ثلاثية. قرونها
الاستشعارية قصيرة ونحيلة. عيونها جانبية. زانها صغيرة،
ثلاثية. كراسلها مستطيلة. اجسامها شبه مثالثة. يظفرها
عشارية السكم. مرازات انثائها مستطيلة. بسطة || تألف
الحراج والنباتات. جميعها رافجة و لامة في دورها البري
والخمرى || أشهر اجسامها الرَفِيدَة والبنقة والافنولة والاسنة.



رَفِيلَة

١١٨٢٢ - رَفِيلَة * Brenthos (S).

جنس حشرات مرسية خاشية من فمليات الاجنحة وفصيلة
الرفليات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق
الحارة من المابين القديم والحديث || اجسامها غرضية
الشكل، مستطيلة. رؤوسها المقدم. عظامها خارقة
اللون، منتقاة المقدم. قرونها الاستشعارية خيطية،
محبة، تتشعب حته طرف الخيط، قبل انقائه || قوتها
المواد الحشوية. تألف النباتات وتعيش تحت لحاء الانجار
القابلة والميتة.

Œufs des rapaces (F). **١١٨٠٧ - رَفَن**
Eggs of rapacious birds (E).

الرفن : بيض كواسر الطير اخصها العقبان. الواحدة رَفَنَة.

١١٨٠٨ - رَفَنَاءَة * Erianthus (S). Erianthe (F).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة النجيليات.
انواعها المعروفة نحو ٢٠ منها واحد زراعي تربي.

١١٨٠٩ - رَفَنَاءَة الحَدَائِق * Erianthus ravennae (S). Erianthe de Ravenna, Canne de Ravenna (F). Plum-grass, Ravenna-grass (E). Woll-zucker, Ravenna seidengrass (D). Erba ravenna (I).

نوع من الرفناء وهي عشبة ثريضية معمرة، تمل من المتر
الى المترين. ساقها ليفية. اوراقها جامدة، صلبة،
ذالقة، بتفسيج للون. انزاعها حركوي التجميع هري
الشكل يمل نحو ٦٠ سم. انزاعها ثوبه بتفسيج م
تتحرف الى الازيف || ترغب في التربة الكسبية الثقيلة
الرطوبة.

١١٨١٠ - رَفَنِي * Ové (F). Ovace (E).

نمت وصي يطلن على كل شيء شكله شكل الرفنة أي
البضبة.

١١٨١١ - رَفَنِيَّة Rafala (S). Rafalia (F).

جنس نباتات مفردة التعريف على اسم العلامة اليوناني
الديمكري « رَفَن » . انواعها ٢٢ جميعها معمرة، بعضها
بري وبعضها تربي. مهدا افرقيته الجنوبية، منها
الجبنة والجبلة. وهي تنتمي الى فصيلة القرقيات الغرافية.
اوراقها بسطة كاملة. نصلها وسيد العرق. انزاعها
لا قياسه التجميع والارتكاز. كوروسها خامية التخصيص
الاستشعاري و ترميها فراشة الشكل، وايابها مستعرة،
يتلب فيها اللون الاصفر. ثمادها سفلية جالسة. زورها
مستطيلة مغلطة || تتكاثر بالبر والمقل. ترغب في
التربة الدبالية الثقيلة الانسجام، الوارفة النعس الضوي
المحمل || أشهر انواعها الرَفَنِيَّة الثلاثة التالية.

١١٨١٢ - رَفَنِيَّة [إطليجية] Rafalia elliptica (S).

نوع من الرفنية وهي جبنة صغيرة تمل من ٤٠ الى ١٠٠
سم. فرونها مراكبة شمشية. اوراقها اطيالية الشكل
تطول من ٥ الى ٨ سم. نصلها بحري اللون ذلق الزام
الاخضر. انزاعها محورية الارتكاز، فردية أو ثلاثية التجميع
صفراء اللون || انزاعها يستمر من اواخر ايار الى
اوائل تموز.

١١٨١٣ - رَفَنِيَّة ثلاثية الأركان Rafalia triflora (S).

نوع من الرفنية وهي جبنة ثنائية الشكل تمل من ٦٠
الى ١٢٠ سم. فرونها ممشية فارفة. اوراقها بيضيه
الشكل مستعرة للقاعدة، مدبية الطرف. نصلها بحري
اللون، عاكب المراج يطول من ٥ الى ٨ سم. انزاعها صفراء
اللون محورية الارتكاز، فردية أو ثلاثية التجميع || انزاعها
يستمر من اوائل سبيران الى اواسط تموز.

١١٨١٤ - رَفَنِيَّة مَهْرَكَة Rafalia angulata (S).

نوع من الرفنية وهي بجلة معمرة تمل من ٣٠ الى ٦٠ سم.
فرونها مقربة الزوايا، فارغة، ممشية. اوراقها غرضية
الشكل تطول من ٢ الى ٤ سم. نصلها بحري اللون مديب
المقمة. انزاعها الى الصغار الكبيرتي || انزاعها يستمر
طوال شهر ايار.

11831 - رقائق، مضحل Haut-fond (F).
Shoal, Shallow (E).
سهل قليل النور.

11832 - رقائق Funaria (F).
Funaire (F). Funaria (E).

جنس طحالب من فصيلة المرصيات. أنواع المروعة قليلة العدد منتها البلاد المتعددة الحارة من العالم القديم. جميعها من الطحالب الشطئية الحولية التي تعيش في التربة. بعضها دقيقة قصيرة تنتهي بإكياس البروغ الحولية الشكل. حراشفها متراكبة تملأ أسافل السوق. يكثر وجودها قرب مشاعر الغصم.

11833 - رقائق Cartographie (F).
Chartography, Mapping (E).

الرقطة فن رسم الخرائط الجغرافية.

11834 - رقائق حقلية Cartographie pédologique (F).
Soil Mapping (E).

فرع من الرقطة يختص بوضع الخرائط الحقلية.

11835 - رقائق Cartographique (F).
Chartographical (E).

نمت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالرقطة.

11836 - رقائق Trichilia (S).
Trichille (F).

جنس أشجار ومجترات برية وزراعية من فصيلة الأذريشيات. ازهره الممرقة زهاء 112، أصنافها البلاد الحارة والاستوائية بعضها جالسة. أصنافها منفردة الانتساب. أوراقها مركبة وترية يكثر فيها التثليث. أزهارها حشوية التجميع محوري وطرفي الارتكاز. الأزهار كبيرة القدر غفلت الأوان لا تليق الانتظام البتلي. أشهر أنواعها ما يتبع.

11837 - رقائق Trichilia hirta (S).
Trichille bois de fer (F).
Bastard Iron wood (E).

نوع من الرقاق، شجيرة تملأ نحو 4 أمتار، أوراقها مركبة خاسية، وريقاتها لإقياسية الشكل، نصلها أزغب الصفحة السفلى. أزهاره حشوية التجميع، خلية البشرة، حاجية اللون. غشبه شديد الصلابة، اسم اللؤلؤ، فاجر الصفص. أزهاره يستمر طوال شهر سزيان.

11838 - رقائق Trichilia glabra (S).

نوع من الرقاق، شجيرة تملأ نحو 6 أمتار. أوراقها مركبة ثلاثية. وريقاتها لثائية يضيئة الشكل مغشوة القاعدة مدببة الطرف. نصلها جامد الصفحة جميل الخضار اللامع. أزهاره حشوية التجميع منتظمة الشكل، لونها الأبيض الساجي. أزهاره يستمر طوال شهر سزيان.

11839 - رقائق Trichilia spondiodes (S).
Trichilia tendra (F).
Whiten butter wood (E).

نوع من الرقاق، شجيرة تملأ نحو 6 أمتار، غشها أخضر اللون، قليل الصلابة، سهل الانطاف. أوراقها مركبة لا قياسية التجميع، وريقاتها تعد 7 أو 9 أو 11 وهي اعليجية الشكل مدببة الطرف. نصلها جامد الصفحة اللامعة، جميل الخضار الزاهي. أزهاره صفراء اللون، تبليء الملوحي، كثيفة التجميع، محورية وطرفية الارتكاز. ازهره يستمر طوال شهر سزيان.

11839 - رقائق Brenthidae (S).
Branchides (F). Brenthidae (E).

فصيلة حشرات سوية الشكل من غديات الاجنحة. اجناسها وأزواجها كثيرة العدد معظمها غشيب وبعضها يعيش برقة النمل في جلوج الأشجار القديمة النشرة. أصنافها البلاد الحارة والاستوائية. أشهر اجناسها الرقطة.

11844 - رقائق Raffinose, Mélitose (F).
Raffinose, Melitose (E).

سكر من السكر، يوجد خاصة في ثفل الشؤنر وفي الجزر وقد يستخلص من بعض أنواع الأوكالبتوس. بلوراته أبوية الشكل لا قياسية الرصف.

11845 - رقائق Chelys (S).
Chélyde (F). Chelys (E).

جنس سلاحف من فصيلة الرقيات. أنواعها عديدة، جميعها مقترنة، كبيرة القد، طولها يراوح من المتر إلى المترين. رؤوسها مفلطحة، أجنحتها مستطيلة سفينة الجلد. ذنبها قليل الاحتداد، قعره هربي الشكل بين التخذيد. قوتها الإمساك والقتل والصفاد والطير والوزغ والحيات وهي من السلاحف البدوية التي ترسح في الليل. تعيش في المياه العذبة وعل غشاف الأنهر.

11846 - رقائق Contrôle (F).
Control (E).

11847 - رقائق Crithagra (S).
Crithagre (F).

جنس طير من الجوامع غروطيات المتأثير وضليسة الشرشوريات. أنواعه المروعة نحو 40 أصنافها معظم المناطق الحارة من البلاد الإفريقية. ملجئها الحياتي جماعي. أسرابها مفردة العدد. تألف النباتات والبراري والحقول المزدودة. قوتها الحبوب والبروز والحشرات الصغيرة حل اختلاطها. أجسامها صغيرة القد قلبية الشكل بالوردي، طولها من 13 إلى 16 سم. أثوابها مزودة وبيضة يكثر فيها الأصفر والأخضر والأشهب. مناقبها غروطية، قوية. اجنحتها كبيرة. أذناها مقعرة الأطراف. أعرف أنواعها وأشهرها رقائق الحبيسة.

11848 - رقائق Crithagra abyssinica (S).
Crithagre d'Abyssinie (F).

طائر من الرقاق. موطنه بعض مناطق الحبيسة. تألف الثابت والبراري. ملجئها الحياتي جماعي. سره يد 100 من زوج. قوته الحشرات والحبوب والبروز. جسمه صغير القد بطول نحو 16 سم. رأسه إلى الخضر الأصفر. رداؤه وذنبه إلى الشبه السمر. صفده وزودو إلى الصفرة. جناحه إلى الشبه يملأها تدبج أخضر. يطلع إلى البريدة الصنائية الملوحي. ذنبه مقعر الطرف. إلى الأصفر قدماً من الذكر وأقل تزويقاً منه في يدين في الإجماع ويركز منه عند تصالب الأناث. الإناث تحضن بمناوبة الذكر من 3 إلى 5 بيضات على ثلاث أو أربع مرات في الحول.

11849 - رقائق Commerce des céréales (F).
Corn-trade (E).

هي التجارة بالمحاصيل الزراعية.

11850 - رقائق Hibernation
فقدور الحياة وانكادها بعض الوقت في النبات وفي بعض الحيوانات والموبيات. وهناك أيضاً الرقاد الصيفي المعروف بالعمود الصيفي، الحليه.



رق



رقاق الحبيسة



رقائق

صنيرة غرطوية . اضطهادها ذلقة ، مستدلة انفرج اللشق . زعانفها الظهرية والشرجية قاطبة تمتد حتى الذيل . الصدرة مستعرضة . الحوضية مخرمة . لأذليها نازقة ، حلالية الشكل . لحوبها مأكولة متوسطة الصنف .



رقاع عامل

١١٨٤٦ - **ورقالبات** °
Malacanthidae (F). Malacanthidae (E).

فصلة اسماك بحرية بيوضة من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها الممرقة قليلة المدد اعطائها مجار البلاد الحارة || اجسامها مسطلة ، مستطيلة ، غشبية ، تقطرن من ١٨ الى ٢٦ سم . تتميز بسفنها الشديد الصغر المهدب ، وبروصها الصغيرة القرطوية الشكل . لأذليها الى المسطلة السراة . القفصية الموج || اشهر اجناسها الرقالة .



رقالة

١١٨٤٧ - **ورقان** الرقان : الحناء والزعفران .

١١٨٤٨ - **وركة**
Fascia (F). Faggot (E).

الرقية والصناعة والكيش : اخشاب وانصان واشباب توضع في مجاري الماء لاضراس الحيل الطبعي والتحويل بعض الماء الى مجرى آخر .

١١٨٤٩ - **ورقشة**
Mallure (F). Speckles (E).

رقشة مستديرة تحالف للثلث المساة تكون حل اجنبية البلير .



رقشة الاجاص

١١٨٥٠ - **ورقشة** ° ، **كورنيوم** ° ، **عردكة** °
Coryneum

جنس فطور مجهرية من فصيلة الرقبات . انواعها عديدة منها مؤذية وبعضها شديد الاتي || ويثبت كتيبة محصورة للنشا ، حمية او عسوية الشكل ، كالثاء كروية او شمية مسطلة ، شحمية الاقراص ، مقوورة . لونها الى الصبغة الخفيفة || احرف واسم انواعها ما يلي .

١١٨٥١ - **ورقشة الاجاص** ° ، **كورنيوم الاجاص** °
Coryneum folliculorum (S).

فطر مجهري يركب اوراق الاجاص والنفاج وقد يصيب الثمار والافانث || مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل تبدو سمراء اللون ثم لفضية تنفوخ بالنفاج المتناثرة التي تبس وتتسرخ || وهو حل الثمار بثور مبكرة مسطحة السطح تركب البشرة وتنفو في لبب تنفخه || يكاثف كثير من الفطور المؤذية .



رقشة الوريات (١)

١١٨٥٢ - **ورقشة الوريات** ° ، **كورنيوم الوريات** °
Coryneum baiernickii (S). Cribra des amygdalées (F). Blight of stone fruits (E). Dörrfleckenkrankheit des steinobstes (D).

فطر مجهري يصيب اكثر الوريات منها اللوز والكرز والقدراون والشمش والخوخ || مظهره الخارجي يقع صنيرة لونها الى الحمرة ، الحاربا اسمر الزبدب ، تطوا يراروح ٣ الى ٥ سم . تركب فصل الاوراق فتنبل للفسح المتناثرة وتسبب يأسها وانحاثها ونحوا || وهو حل الانفاد والافانث بثور شملوية قروية ، تركب السواد فتنفخها وتتسرخ مير للفسح في الاربعة || وهو حل الثمار بثور صنيرة مستديرة مقروسة السطح ، كيفية التسجيع ، لونها الى الجلوة ثم تنحرف الى الاسمر . تركب البشرة فتنبها وتنطسب سطح اللب || اضراها لا قياسية القوع والتناثج لانها متوقفة بعمول شئ تعود الى البرية والموقع والانتاج والاقليم || يكاثف باستمال سائل بوردو او غيره من الفطوار الحديثة .



رقشة الوريات (٢)

١١٨٤٠ - **ورقاع عطر**
Trichilia odorata (S).

نوع من الرقاق ، شجرته تملو من ٥ الى ٨ امتار . اوراقه مركبة خماسية . ورقبها احليجية الشكل ، تنفخها جبل الغفار يطول من ٦ الى ١٥ سم . ازهارها طرفية الارتكاز ، مستطيلة الذليبات ، صفراء اللون ، عطرية العرف المستحب . ازهارها يستمر من اوائل حزيران الى اواسط تموز .

١١٨٤١ - **ورقاع مهورع** ، **خشب المسك**
Trichilia emetica (S). Trichilia musquée (F). Roka tree of Arabia (E).

نوع من الرقاق ، منته الجزيرة العربية ، شجرته تملو من ٤ الى ٦ امتار . اوراقه مركبة ثلاثية . ازهاره ليكنية اللون كيفية التسجيع ، طرفية وبجورية الارتكاز . خشب شديد الصلابة فاخر الصنف حطر الرائحة يدعى خشب المسك || ازهاره وشماره طيبة مقبلة .

١١٨٤٢ - **ورقاع آخمر الرأس**
Melanerpes erythrocephalus (S).

Melanerpe à tête rouge (F).
طائر من فصيلة النقرانيات . موطنه بعض مناطق امريكا الشمالية . جسمه يطول نحو ٢٥ سم . يسطه نحو ٣٨ سم . لونه رقع الاوان . رأسه وعنته الى الحمرة الشملة . ظهره وجناحه وذنبه الى السواد العابق . اباروه ويطه وزناكه الى البياض الاخير . حدة عينه كسنتية اللون . متفاده وساقاه الى الزرقة اسفاره || اخلاعه رضية لكث كثير الحذر . قوته الحشرات واسارهم ولا ينف من الثمار البرية والثرامية كالنابيل والصم والكرز والنفاج والين ... يثخن عده في تجاريف الاجمار المنفرة . الاثن تبيض من ٤ الى ٧ بيضات تحضنها وحدها دون الذكر الذي يلين لها البناء .

١١٨٤٣ - **ورقاع تامل** °
Melanerpes formicivorus (S).

Melanerpe fourmilier (F).
نوع آخمر من الرقاق . موطنه بعض المناطق الامريكية اغصنها المكسك وكرونية || جسمه يطول نحو ٢٤ سم . يسطه نحو ٢٧ سم . ثوبه الى السواد اللامع يطو تفتيز ابيض في الجناحين والصدر والاطلين . رأسه الى الحمرة الشملة . منته مسطحة بقلادة كبريتية الصفار . حدة عينه صفراء . متفاده وساقاه الى السواد الاسمر || اخلاعه رضية ، قليل الحذر ، لا ينفى الاثراب من الانسان . قوته الحشرات حل اخلاها واصغها اتسل . يتنيز يتنخرن البيلوط في تجاريف الاجمار ليثبن بذلك خذيرة فصل الشتاء والثلج || يثخن عده في نيسان في تجاريف الاجمار بين اوراق البروك . الاثن تبيض من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها وسدها دون الذكر الذي يكون لما البناء .

١١٨٤٤ - **ورقاعة** °
Uranomécrite (F).

Uranometry (E).
الرقاعة تبيان نجوم الرقيق كليا او جزئيا مع تحديد عاورها الصادية .

١١٨٤٥ - **ورقالة** °
Malacanthus (S).

Malacanth (F).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الرقاليات . انواعها الممرقة ثلاثة موطنها مجار البلاد الحارة || اجسامها شبه رضية الشكل تطول من ٢٢ الى ٢٦ سم . رؤسها

بغية الشوزن ، قاعدتها اي وابطالها العتيق اضعيق من سنيتها اي طرفها .

١١٨٦٧- ركيبي هو البليطخ ، اطلبه .

١١٨٦٨- ركيبات Chelydae (S). Chelydés (E).

فصيلة حيوانات زاحفة بيوضة من رتبة السلاسل ، اجناسها وانواعها عديدة ، جميعها قازية مقترمة دجوية المسرح . تألف اليه الطلية الراكدة . دقائقها ملحوبة الذبل والزعفر . ذيلها يضيي الشكل نائي الغتر الارسوي القالب || اشهر اجناسها الفرق .

١١٨٦٩- ركيبي

هو الناظر من الحيات الخبيثة . ج رقب وربيقات .

١١٨٧٠- ركيبي الشمس راجع هليوتوب .

١١٨٧١- ركيبي خداع

Tarbophis trompaur (F). سية من البواغيات تدعى فاخر مأكرك ، اطلبه .

١١٨٧٢- ركيبيكة Marcotte (F), Laver (E).

النصن الذي يمسك ويرقد .

١١٨٧٣- ركيبيكة Diagramas (S). Diagramme (F).

جنس اسماك بحرية من كاملات العظام شاككات الزعانف وفصيلة القرشيات . انواعها المعروفة عديدة جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة || اجسامها اطيالية الشكل ، متصلة التبطيط ، تعطي من ١٨ الى ٢٨ سم . اثوابها تراوح من البقرة الى الريدية والطحلة جميعها فضية الموانج مرقونة بالاسمر من الرأس الى الذيل . كثافة نقشها تختلف مع الانواع . تتميز بيمينها الكبيرة الجاحضة ، بظهورها المخضرة المنحصر وزعانفها الظهرية المستطيلة الشاككة التقسم الاسامي || لحومها متوسطة الصنفت ، مأكولة .

١١٨٧٤- ركيبات الصدف

Leptostracés, Phyllocaracés (F). رتبة من القشريات العليا . فصائلها واجناسها وانواعها قليلة العدد . جميعها صخرية القد قريبة الشبه بالاربيان الصغير . حيوان مزنة . ارجلها الصدرية متساوية ثنائية المخادف || اشهر اجناسها البتلانة .

١١٨٧٥- ركيبات المتالير Tenulirostra (S). Ténulirostres (F).

مرتبة من الطيور الجوارح عديدة الفصائل والاجناس والانواع . اشهر فصائلها المدهديات والنتولات .

١١٨٧٦- ركيبي هي الجريجر ، اطلبه .

١١٨٧٧- ركاشة مُحَرَّزة

Colydium crenatum (S). Colydie crénelée (F). Colydidium crenatum (E).

حشرة دائمة قرباية من فصيلة الركايات ورتبة مفصلات الاجنحة . تألف الاحراج والحدائق والجنان . عتاضها وريقاتها تميز تحت لاه الانجار في سرايب الحشرات

١١٨٥٣- ركاشة الورديات * كورينيوم الورديات Coryneum microstictum (S).

فطر مجهري واسع الانتشار يركب بعض نباتات الفصيلة الوردية اعمها اللورد والمليق والزعزور والقشب || مظهره الخارجي لطيف مستطيلة ينفسجيه او سمر اللون تركب السوق الخفية والقضبان النامية قشيب جفاف وتنضج البشيرة واللحاء التي لا تلتئ ان تلوى || يكافح باقتطاع وحرق الاعضاء الموصولة وينضج النبات ، يمد تطهير جرحه ، يسهل القواطير الفعالة القرية المتناولة .

١١٨٥٤- ركشعة Panachure (F). Streak (E).

يقع يبيض في خضرة النبات .

١١٨٥٥- رقع سمكة بحرية وهرية من اللانس .

١١٨٥٦- ركشعة Fougeraie (F).

Fern-patch, Fernery (E). مكان يكثر فيه الخنشار والسررس والديشار وما اشبه .

١١٨٥٧- ركشعة خمره Pie-rouge (F).

نمت وصني يعبر عن شكل غاصر من اثواب البشر . فايقرة الرقواء الخمره هي ذات الثوب الاحمر عليه يقع يبيض .

١١٨٥٨- ركشعة صدقاء Pie-noire

البقرة الرقواء السوداء هي ذات الثوب الاسود عليه يقع يبيض .

١١٨٥٩- ركشعة Grain, Texture

رقعة التهي اسله الحكمي للموسر . وتستعمل خاصة في التصيير من صنف الخشب . فتقول عن غيب الجوز صلب الرقعة الناعمة وعن الازديست اصطف الرقعة .

١١٨٦٠- ركشعة

الرقعة : شجرة عطية ، ساقها كالدبل ورقها كورق النقر ونورها كالتين . ج رقع (السان) .

١١٨٦١- ركشعة Palmerier élevé (F).

Raised palm-tree (E). الرقعة : النخلة الطويلة التي تقوت اليه . ج رقل وركال .

١١٨٦٢- ركشعة

قال ابو حنيفة : الرقعة من اسرار البقول . وقيل : انها من المشب العظام تنبت مستطحة غصنة كبارا وهي من اول المشب غربيما ، تنبت في السهل (السان) ربما كان الخبازي .

١١٨٦٣- ركشعة Parterre (F). Flower-bed (E).

جزء من حديقة غصص لزراعة الزهور .

١١٨٦٤- ركشع Hachurer


عسلط الرزم ونحوه يخطوط متوازية اليماد فارقة .

١١٨٦٥- ركشع Œufs des vautours (F).

Eggs of vultures (E). هو يبيض للنسور حل اختلاف اجناسها وانواعها .

١١٨٦٦- ركشعي Obovale, Obové, -

Obovoide (F). Ob-ovoïd (E). نمت تعريفه يطلق ، في علم النبات ، عل كل ورقة



رقشة الورديات -



رقيش



ركاشة عرزة

١١٨٨٤ - **رَكَاة** (F). Fixisme (F).
الركاة نظرية بيولوجية تقول باستقرار الأنواع الحيوانية ونباتية الحية على حالتها .

١١٨٨٥ - **رَكَبَ الجَسَلُ** هي الاثنية البيضاء، اطلبها .
١١٨٨٦ - **رَكَبَان**
ركبان النمل: سوابقه التي تخرج من البطن في أوله .

١١٨٨٧ - **رَكِيَّة** (E). Genou (F).
ضفوف الربل الامامية بين الساق والذراع .

١١٨٨٨ - **رَكْبَة ذات الكَرْسِي** Rochbah
ركبة ذات الكرسي نجم نير من كوكبة ذات الكرسي .

١١٨٨٩ - **رَكُح** (F). Flanc de montagne (F).
Nank of mountain (E).
ناحية الجبل . ج ركوح وركاح .

١١٨٩٠ - **رَكْحَة** (F). Cour de ferme (F).
Farm-yard (E)
ساحة دار المزرعة . ج ركح .

١١٨٩١ - **رَكْوَر** (F). Doser (F).
To put the right quantity (E).
حدد نسبة المادة الفعالة إلى سائر أجزاء المركب . أو
حدد كمية المادة الفعالة الجائر تقويها واستعمالها في مئة
أو ألف جزء من المادة .

١١٨٩٢ - **رَكْوَرَة** (F). Rejet, Rejeton (F).
Shoot, Sprout (E).
النسيلة النابتة على ابروة الشجرة أو على جلعها .

١١٨٩٣ - **رَكْصِيَّة** (F). Rhexia (S). Rhexie (F).
جنس نباتات حولية وسمرة ، بيرة وفريزية من فصيلة
المستويات . انواعها المعروفة سبعة بعضها عشبي حولي
والآخر جنبي معمر || سيقانها متصبغة مربعة الزوايا .
اوراقها متفابلة لائنة . نساها أهليلجية الشكل ، نافرة
العروق والاصباغ . خلية البشرة ، خلية انقسام اللبس .
ازهارها حنكولي التجميع ، طرفي الاذنكاز . ازهارها
خاصة البتلات ، كثيرة الابدية للمسيلة المنقطة .
الذاتنا تتراوح من الاصفر الى الاحمر الابيضاني || تزود
في الحدائق . ترطب في الاقربة المصالة الانتاج .

١١٨٩٤ - **رَكش، رَكاش** (E). Binage (F). Ploughing (E).
كري التربة لتفكيك تماسكها حول النبات . ولينغ تبخير
رطوبتها ولتنشيط انفعالات الحمار وعمل الميكروبات
الحوائية .

١١٨٩٥ - **رَكَل** هو الكركرات المعروف ، اطلبه .

١١٨٩٦ - **رَكْلَة** (F). Botte de légumes (F).
Bundel of greens (E).
الحزمة من البقل .

١١٨٩٧ - **رَكْلَة** (F). Artefact, Artifact (E).
الركلة البوئل الصناعي الذي يصنع في الحجيرة الحيوانية أو
الخلفية النباتية بعد ساجلتها بالثابت التي تقضي على الحياة
وقد تشبه بعض النظم العالم الاسيانية .

الخافشة قوتها طرامم الحشرات والموارد النباتية الخسلة ||
جسمها صغير القند يطول من ٤ الى ٥ سم . ثوبها الى السواد
الفحمي باستثناء الغمدين فاتنها الى الجفوة تفرقها عند
متصفها جلد سواد . رأسها كبير الجرم . عينها بارزتان .
زباناها غليظان ، صفيا الاطراف . فكها غليظان .
ظهرانا قليل الاخدباب مستدير المؤخر اللامع . غمدان
متساويتا التحزير انقلب . ارساغها رباعية البقل || لها
جبل واحد في الجوف . تظهر الحشرة الجبلية في اوائل
الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في الليل وتستكن
في النهار || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٦
الى ٧ سم . جسمها سحكي التركيب ، محذوب الظهر ،
مبطط للبدن ، سداسي الرؤوب ، عظمي اللون ، اسمر
الحواسل والرأس ، مذهب السكم من الجانبين || طور
الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في آخر
نصف وجبة البرقة ضمن صالحة غاوية الفناء .

١١٨٩٨ - **رَكَايَات** (S). Colydiidae (S).
Colydiidae (F). Colydiidae (E).
نصيلة حشرات دامتة قرضاية من وثبة لمهايات الاجنحة .

اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار
العالم . تعيش تحت لحاء الاجار في سراديب الحشرات
الخافشة . قوتها طرامم الحشرات وبرازها والمواد النباتية
المتحللة || اجسامها صغيرة القند ، مستطيلة الشكل ،
مستدرة الرؤوس ، مهيأة الزوايا المشاوية الفصل .
كواشها واحدا تلتك الانتظار لما تحصل به من نقوش
جرامزها مستعدة . ارساغها رباعية البقل || اشهر اجناسها
الركاسة والديتية .

١١٨٩٩ - **رَكَال** و **رَكَة** (F). Latérite (F).
Latérite (E).
نوع من التراب الصلصالي الاحمر اللون يكثر وجوده في
المناطق الاستوائية الرطبة . يتميز بوفرة ما يحويه من
الاولوين والأكاسيد الحديدية . وهو عند جفافه ، أو في المواقع
العامة الرطوبة ، شديد الاندماج قليل الخير والانتارة .

١١٩٠٠ - **رَكَلِي** و **رَكْصِي** (F). Latéritique (F).
Latéritic (E).
صفة الركال أي التراب الصلصالي الاحمر اللون الشديد
الاندماج .

١١٩٠١ - **رَكَام** و **رَكْمِي** و **مَكْمَر** Cumulo-nimbus
غيوم تندر بالمعاصرة أو بالمر القريب مظهرها كحل
ملبدة متراكبة سمراء اللون منخفضة الارتفاع تصل الى
اعطار غزيرة .

١١٩٠٢ - **رَكَام، رَمَلٌ مَحَارِي** (F). Falun, Trez (F).
Shell-marl (E).
رواسب بحرية للملش صدفية المنصر الرئيسي تحوي نحو
٦٠ ٪ من كربونات الكلس و ٢٠ ٪ من الرمل تستعمل
كمصالحات كلسية تغيد التربة والزراعة .

١١٩٠٣ - **رَكَامَة** (F). Agglomérat (F).
Agglomerate (E).
الركامة الاختلاط الطبيعي لفزازات شئ .



رَكَام



رَكْبَة

11910 - ركيمة Sympodita (F).

الركيمة القسم القاعدي من زوائد الفشريات يتكون من فصلتين تتهيأ بمقلدين بمفصلين .

11911 - ركيمة Sympodiqua (F).
Sympodial (E).

نمت تعريفي يطلق على كل عضو شكله الخارجي مماثل للركيمة .

11912 - ركيمة Nesocia (S).
Nésocia, Nesokia (F), Nesokia (E).

جنس جردان كبيرة القد أربابها وبادية عابقة . أخطاها قصيرة مقطوعة . أذناها مستديرة . أذناها مستطيلة حرشية الجلد . أربابها مستعرضة . أطرافها قوية . خفخفتها تقيه قباج الخيزير . أركابها أنفاق مستطيلة يتخللها دهاليز وسرجر جانبية || أنواحه سبعة موطنها الشرق . أعرفها ركين سرنديب وركين البنغال .

11913 - ركين البنغال Nesocia bengalensis (S).
Nésocie du Bengale, Nesokia, Rat du Bengale, Kok (F), Indian nesokia, Neki (E).

نوع من الركين موطنه البنغال وسوارها . طوله نحو ٥٠ سم . يعيش قرب الماء بمنزله نحو ٢٠ كيلو من غلظ الجيوب يدغها إلى الشتاء || أثناء تقص من ٨ إلى ١٤ درسة .

11914 - ركين سرنديب Nesocia bandicota (S).
Nésocie bandicot, Rat bandicot, Rat perchal (F).
Nesokia bandicooteo (E).

نوع من الركين موطنه سرنديب وبلاد وجنوب الهند . طوله يراوح من ٧٠ إلى ٧٥ سم . ظهره أبيض اللون . بطنه أشعث . قوائمها سود . أطرافه طويلة || أثناء تقص من ٨ إلى ١٢ درسة .

11915 - ركيمة Fibrista (F).

نمت تعريفي يطلق على من يقر نظرية الركانة .

11916 - ركيمة Rollulus (S). Rouloul (F).

جنس طير من عارة الحجليات وفضيلة الطيوريات قريب الشبه من الجبل لكنه أشعث جسمًا وأطرافًا سافًا . ثوبه إلى الصبغة الباردة يملو تأذير وقشيم || أنواحه أربعة موطنها الهند وسوارها حتى ملقه .

11917 - ركة Brouter (F). To browse (E).

رم الحيوان الثبات : تناوله بفمه فأكله . وفي الحديث : « البقر ترم من كل شجر » .

11918 - ركانات Brachynidae (S).
Brachynidae (F). Brachynidae (E).

فصيلة حشرات نافعة من رتبة عذبات الإجنسة . أجناسها وأنواعها كثيرة العدد تعيش تحت الحجارة وفي أنفاق تحفرها في التربة الجسيمة لأنها تفضلها على غيرها . تحمل في مؤخر بطنها جرابين كبيرين ينتفخان على التفرج تقذف منها سائل ينفرج في الهواء لونه إلى الطلعة الفداء يضيء في الظلام لانه لا يحل من التسفوف .

11919 - ركانة Brachynus (S).
Brachyne, Bombardier (F). Brachynous, Bomber (E).

جنس عناس وأجنحة ناهمة من فصيلة الركانات . أنواحه

11898 - مكتوبة Recluzia (S).

Recluzie (F). Recluzia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل واصله الجنسينيات . أنواحه المعروفة قليلة العدد منتشرة في مطر بحار البلاد الحارة . جميعها عينة مقترنة . ملجها الحياقي جاعي . أسرابها وقرقر البدن || أصدافها رقيقة و صغرة القد . بطينة و عازلة الإصقاب ، بحرية اللون أو زرقاء .

11899 - ركنيس و ركنيس Agrégat (F). Aggregat (E).

مجموعة مواد مختلفة متشعبة

11901 - ركن و ركن Empotar (F). To pot (E).

فرس في مركب أو في أصيص .

11902 - ركب Stolon

رثه هوأى يرتفع على الأرض ويتبرز له جلور عند المفصل تنقيه من أمه فإذا فصل أصبح نباتًا مستقلًا .

11903 - ركني Stolonifère (F). Stoloniferous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات له ركب أو يتكاثر بركبه .

11904 - ركني يوم Rhacoditum

جنس فلور مجهرية من النباتات . أنواحه قليلة جميعها ربة فائقة تلتصق بالخصيف والاشخاب في المراتع الظليلة البرية || مظهرها الخارجي نواص خلي و عنكبوتي الشكل ، كيف التجميع ، أسمر اللون ينشج جوانب قمر الدنان والبراميل والمواقع البرية من الآلية .

11905 - ركنين Racumin 57

مسروق سام يرتكز على مادة الكوبرين يستعمل القضاء على الجرذان والفتران . واستناله قد يكون أما ذرًا في المراتع المطروقة من هذه البورويات أو طمسًا يضاف على يعض المواد التي ترفع فيها هذه البورويات اخصها الخبز المنقوع والبطاطا المسلوقة وبقايا السمك واللحم .

11906 - ركيبة و ركيبة Andropogon annulatus (S). Andropogon annulatre (F). Blue grass (E). Blatgrass, Blatgrass (D). Barbans (I).

نبات عشبي بري حولي مرعوي وعلقي من فصيلة النجيليات . أروعته قرصية متراصة الأشطاء . أولاته عصفية النصل متصبغة . سنابلها كثيفة الزغب والحمل . يحسن اقتطاعه للعلف قبل الإنبال .

11907 - ركيمة Puits (F). Well (E).

عي البئر ذات الماء .

11908 - ركيمة Pileotis (F). Piles (E).

مجموعة أوتاد تنرز في قمر الماء لتدعيم أسس بناء .

11909 - ركيمة Sympode (F).

Sympode, Sympodium (E).

نمت تعريفي يطلق على كل جلع أو جذور متراكب للسلك المتلاصقة المتزايدة ستة يمد ستة .



ركوب



ركيب



ركيزة



ركين البنغال



ركول



رَمَّالَة حَمْرَاء الرُّس

والزرايع والسليتيوم || اما نسب هذه الناصر فلا قياسية لانها تختلف من نبات الى آخر وبين سائر اعضاء النبات الواسط || اما من الناحية الزراعية الاقتصادية ويوجه عام فتوسط ما يحويه الرمد من مختلف الناصر الغذائية الرئيسية يمكن تلخيصه كما يلي :

نوع الرمد	حشوري	بوتاس	كلس
اشخاب للمحاصيل	٣٥ %	١٥ %	٣٥ %
اشخاب الصنوبريات	٣٥ %	٦ %	٥٥ %
سوق التوتوغ	٣ %	١٥-٣٠ %	٥٠-٢٥ %

١١٩٢٦ - رَمَّالَة حَمْرَاء الرُّس : هي فريون القنجر ، اطليه .



رَمَّال

Rhynchocytus (S).
Rhynchocrypta (F).

طائر وسيد الجنس والنوع من الجواثم فضيلة الطراحيات . موطنه جزر الزايح . تألف النباتات زخفاف مجاري الماء . ملته الحياي جماعي . جماعته قليلة تعدد . قوته الحرام والحشرات والديدان والثمار الننية والبزور || جسمه صغير القند يطول نحو ١٨ سم . رأسه متوج بفتحة لينة مرندة الى الورا . جناحاه محتلا الطول . ذنبه مقطوع الطرف . رأسه الى الشبهة القروية المولج متعقة بالايض . رداؤه وجناحاه وذنبه الى الخضار الاسفع . زوره وسدو الى الشبهة . يطن الى النشفة || يطن حش في الاشجار الرقية . الاثي تحفن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات .

١١٩٢٧ - رَمَّالَة حَمْرَاء الرُّس :

نحو ١٦٥ منتشرة في جميع المالم . تعيش تحت الانتفاض والحجارة تقترس الحشرات الضارة وتقاتل عن نفسها بفسه فسفوري تغلقه من غلتي شربها فينجر عن رائحة كريمة منتنة .

١١٩٢٨ - رَمَّالَة حَمْرَاء الرُّس : لَدَدَاثِ اقتر

الرُّس :
Brachynus creptans (S).
Brachyne creptans (F). Cracking brachynous (E).
حشرة ناعمة من الرمات . تألف الاراضي الجصية الجبلية . طويلا نحو ٩ م . رأسها يتقدم جوشنها الى الخسة . عمداها ويطنها زرق . مولج ثوبا الى الخسة المابقة . قريبا الاروق وبعض مرشقيات الاجنحة .

١١٩٢٩ - رَمَّالَة حَمْرَاء الرُّس :

Pteridophora (S).
Pteridophore (F).
جنس طير من الجواثم نباتات المتأثير فضيلة القروسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها وامرغها رباح البرقي (P. Alberti) . قدره قدر السمعة ثوبه الى الصبهة يسر . ويزرق في الرأس والظهر والجناح والذنب ويغير ويغير في الصدر والبطن والاذنيك . يتميز بريشين لونها الى الزرقعة الجميلة السعداء المولج تنشيان عند صدغي الرأس طول الواحد منها نصف طول الجسم .

١١٩٣٠ - رَمَّالَة حَمْرَاء الرُّس :

Poisson-pique (F).
سمكة بحرية تدمي عذابة ، اطليا .

١١٩٣١ - رَمَّالَة حَمْرَاء الرُّس :

Polyodon (S).
Spatulaire (F). Polyodon (E).
جنس اسماء نيرة من اللامعات فضيلة الراسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اصطلها انهر وبجيرات المناطق الشمالية || اجسامها كبيرة ، مستطيلة ، شبه وشية الشكل ، تقول من ٣ الى ٦ امتار . مسوكها مرفوعة بشمل عطية التركيب ، نجية الشكل . رؤوسها حليلة مجهزة بزوائد غضروفية تمتد كالرسم فوق القف . افواهها كبيرة ، مستعرة الاشداق || تصاد من اجل صمترها ابله الصنف اما لحومها فيقتل قل من يرغب فيها .

١١٩٣٢ - رَمَّالَة حَمْرَاء الرُّس :

Polyodontidae.
Spatularitidae (S). Polyodontidae, Spatularitidae (F).
فضيلة اسماء نيرة من اللامعات الجناحيات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اصطلها انهر وبجيرات المناطق الشمالية || اجسامها مستطيلة شبه وشية الشكل . مسوكها متعقة . رؤوسها مجهزة بزوائد غضروفية تمتد كالرسم فوق القف || اشهر اجناسها الرماحة .

١١٩٣٣ - رَمَّالَة حَمْرَاء الرُّس :

Cendre végétale (F).
Vegetable ashes (E).
هو ما يبقى بعد حرق المواد النباتية . تركيبه المتصنعي يقسم الى فئتين : فئة الناصر الرئيسية التي تشمل البوتاسيوم والصوديوم والكلسيوم والمغنيزيوم والحديد والتفسفور والكبريت والسليسيوم والكلور . فئة الناصر الثانوية التي تشمل البرور والمغنيزيوم والنحاس والزنك والكويت والنيكل والباريوم والسترونيوم والزرنيخ والليثيوم واليتان والراساس والسيزيوم والراديم والكروم والماناديوم والباريليوم والتاليوم والفضة والليسيوم واليود والبروم

١١٩٣٤ - رَمَّالَة حَمْرَاء الرُّس :

Emballonura (S).
Emballonure (F).
جنس خفافيش من حمارة الرامات . انواعه اربعة جميعها صغيرة القند مستطيلة الرأس القرطسية ، مجمدة اللفة . موطنها الملايو . تسرح من اللق الى القنجر . قوتها الحشرات . تعيش جوامات قليلة العدد . تألف الاشجار الحرجية والمناور .

١١٩٣٥ - رَمَّالَة حَمْرَاء الرُّس :

Emballonuridae (F).
Emballonurina (E).
حمارة من فصيلة الراسيات . اجناسها سبعة تتميز باذانها المنفصلة عن النشا الجدي || اما اجناسها فهي : النحاس والنموس والراس والشفقان والينوم والتضوف والتكثير .

١١٩٣٦ - رَمَّالَة حَمْرَاء الرُّس :

Emballonuridae (S).
Emballonuridae (F).
فصيلة من الخفافيش . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، تنجسها عازرا الرامات والمجيرات .

١١٩٣٧ - رَمَّالَة حَمْرَاء الرُّس :

Arène (F). Arène (E).
الرمافة ميدان في وسط ملعب او نحو كان يستعمل . عند اللاعبين من يوزان ورومان وغيرهم . كتمرك للعب كرة القدم والمجالة والمصارعة .

١١٩٣٨ - رَمَّالَة حَمْرَاء الرُّس :

Arénicole (F).
Arenicolous (E).
نمت تعريفه يطلق حل كل حشرة تعيش في الرمال كالهيدان وغيرها .



رَمَّال



رَمَّال

١١٩٢٢ - رَمَالَةُ التَّمْرِشُط *

Ammodytes cicorellus (S).
Ammodyte cicorella, Cicorella, Equille de la Méditerranée (F). Sand-cel, Sand-lance (E).

سمكة بحرية من فصيلة الرماليات ، اعطانها معظم شطوط البحر الابيض المتوسط ، تعيش متنمة في الرمال والاصوال || جسمها شبه رملي الشكل ، مستدق المقدم والمؤخر . طولها يراوح من ١٥ الى ١٨ سم . رأسها صغير الحجم . عظمها مخروطي الشكل . فكها السفلي يتقدم العلوي . زعنفتها الظهرية مستطيلة الشكل ، لامتساوية العرض ، تقطب الظهر والقمم . الاكبر من الذنب || قوتها الى التزقة الخضراء يطولها في جانبها جده مستطيلة للزقاة اللون ويطلو الشرج بقية نحاسية || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .



رَمَالَةُ التَّمْرِشُط

١١٩٢٤ - رَمَالِيَّات *
Ammodytidae (S). *Ammodytidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من العظميات شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها معظم شطوط بحر العالم || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . اعطانها ذقنة تتميز باستطالة الفك السفلي والزعانف الظهرية والشرجية ويطولها من الزعانف الخرسية . حراشفها شديدة الصغر تكن في المسك || تعيش معظم حياتها متنمة في الرمال والاصوال ولا تقترب من الشطوط الا في فصل الصيف وانغروف اي في زمن التسرقة حيث تلتقي برمها في الرمال فيلتصق بجها || اشهر اجناسها الرمالاة والتسوق .



رمان

١١٩٢٥ - رَمَام الرمان : البقل حين يثقل .

١١٩٢٦ - رَمَام *
Punica granatum (S). *Grenadier cultivé* (F). *Pomegranate-tree* Carthaginian apple (E). *Echter granatbaum* (D). *Granato*, *Melagrano*, *Pomo punico* (I)

شجرة مثمرة من الرمانيات . شروها عديدة معظمها مأكول ، الثمار ويضعها حاضن اللحم شديد الحسوة يستعمل استعمال الحامض . يقال ان مهدها كان بلاد فارس وقد عمت زراعتها حوض البحر المتوسط وهي منتشرة في امريكا من الابريستين الى التشلي والمكسيك والبريزون وكليفورنيا . وقد عرفها قدماء المصريين في عهد الفرعون رمسيس وارهاني ثم انتشع الاسم الفيني « من » والاسم العربي « رمان » || ثم الاسم العربي « رمان » || تلو من ٣ الى ٤ امار . ساقها حلساء . اوراقها عديمة القسائل ، فرونها منتصبة . عتيا اسفر اللون ليد الزقة صلب المود . اوراقها متقابلة عابئة ، فصلها رعي الشكل مائل البيرة . ازهارها غنوية ، كاسها صلب القلعة خماسي التتميمص . قوتها خاصي التلات الاربرانية . اسديها عديدة . مبيضا متعدد البريقات . ثمارها كروية مخمة مكللة باستان الكاس ، تقودها صلبة متينة تبدو خضراء اللون ثم تصفر الى الحمر مع اقترابها من الادراك ، تطف زود صغيرة تسمى الفرند يحيط بها بل مائل شفاف لثمنه غشوة رقيقة ملونة . ينمو الرمان في معتدل اقاليم حوض البحر المتوسط . يرغب في الاراضي المتوسطة الانتماج المبكية النود المسكن رجا عند الانتقاء لانه يفضل الرطوبة على الجفاف || يتكاثر بالبذر والتغليل والتبريد والتطعيم || ازهار جملة الشكل والون تفرق باسم جلتار ، رعي طية ، قابضة ، طاردة للديدان انحصا النود الوحيدة || ثماره للمأكولة للذبة



رمان بري



رمانة



رنبوسة

العلم ويستخلص من ثماره الحامضة عصير يصب شراب الرمان || قوتها ازهار صباغية خضها احر . تقود ثماره ولها مائه وقوف جلوه قابضة وتستعمل في البذابة .

١١٩٢٧ - رَمَام الأَشْهَار
Androsæma (F). *Androsæmum* (E).

نبات زهره مراكب الصفرة والحمره . حبه يشبه حب السباق يتادى به ينفع داء المفاصل ، اطلب هيقوريقون .

١١٩٢٨ - رَمَام السَعَالِي

هو الخشخاش الابيض ، اطلبه .

١١٩٢٩ - رَمَام بَرِّي *
Balaustion (S). *Balaustion* (E).

Balaustion, *Grenadier sauvage* (F). *Wild pomegranate tree* (E). *Balausto*, *Melagrano salvatico* (I). شجرة برية مثمرة من فصيلة الرمانيات ، ساقها شائكة ، اوراقها كثيرة القسائل ، فرونها منتصبة ، لثة شائكة ، اوراقها كاملة ، متقابلة ، سنانية النصل ، عابئة . ازهارها مزدوجة التركيب ، مفرية لدعي الرث . ثمارها كروية صغيرة طعرا نحو ٤ سم . زودا حازمة مرة لا تكلل || ازهارها وثمارها صناعية تستعمل في الصباغة واللبانة .

١١٩٤٠ - رَمَانَة *
Grenade (F). *Pomegranate* (E).

ثمرة الرمان تختلف باختلاف الظروف . منها غزيرة المصارة ، طرية الفرند ومنها صلبة الفرند ، متوصلة او قليلة المصارة . ويضعها لذلك العلم والكنهة او حاضن او حاضن او مز || عصارة الرمان تروي غليل النمل وتقيد الناقين ، تحليلها الكياري

% ١٦,١٤	مواد سكرية
% ١٧,٥٢	مواد استخلاصية
% ٠,٣٠	مواد دهنية
% ٠,٥٢	بروتينين
% ٠,١٧	حواض
% ٠,٧٣	رصاص

وقد جاءه من الامام علي قوله : « اذا اكثرت الرمانة تكلوها بشمسها فانه دباغ للعدة وما من حبة منها تقوم في جوف رجل الا انارت عليه واخرست شيطان الرنوسة » .

١١٩٤١ - رَمَالِيَّات *
Punicaceae (S). *Punicaceae* (E).

فصيلة نباتية قليلة الاجناس والانواع كانوا يعتبرونها في الماضي سبطا من الاسباط || اشهر اجناسها الرمان .

١١٩٤٢ - رَمْبُوسَة *
Rhombus maximus, *Scophthalmus maximus* (S). *Turbot* (F). *Breet* (E).

نوع من سمك الترس . سمكة يرضى من فصيلة الرمبوسيات وربية المسارات . اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال . تعتبر من اسماك اساطير القنات || جسمها شبه مستدير الشكل ، مبط الجرم ، يطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم . ويرض من ٦٠ الى ٩٠ سم . تتميز بالاستلقاء على الجانب الايمن لما يحمل عتيا في الصفحة اليسرى من الرأس اي عكس ما تستل به اسماك فصيلة المغلطح . جلدها غشن القشار مثير التعل . صفحتها البني ينضج اللون تملوها رقة سمراء . صفحتها اليسرى الى الصبغة يطولها قوش اسود ورقة حمراء وصفر . زعانفها الى الصفرة تملوها رقة سمراء . رأسها مبط الجرم ، واسع الشفق ، فكها الاسفل يتقدم الاعل .

11962 - رَمَكَة Jument poulinière (F).
Brood-mare (E).
هي الفرس تمتد للتلد وليست من عتاق الحمل كالخمر.

11963 - رَمَل الرمل: التقليل من المطر. والرمل: خطوط في قوائم البقرة الرشيطة مخالطة لسائر ألوانها.

11964 - رَمَل Sable (F). Sand (E).
مادة معدنية دقيقة الجرم نتجت عن تفتت الصخور الكلسية والصوانية وصوت بمثل المرو || والرمل أنواع، أشهرها رمل البحر والرمل والرمل ثم التلحيق والشن والصواني والآخر ثم الرمل النعساني.

11965 - رَمَل المَقَانَة، حَصَى المَقَانَة Gravelle, Cystite calculeuse (F). Gravel, Calculous cystitis (E).
شائبة صدرها تكون بلورات من بولاء الصودي في المانة. تصيب خاصة الكولاجين للمريضة السمين.

11966 - رَمَل المتاعج هو المتاعج هو المتاعج، اطلبه.

11967 - رَمَل تخاري هو الركام، اطلبه.

11968 - رَمَلَة الرماء من التناج السوداء القوائم رساها ابيض. وأما التناج البيضاء فهي الرماء.

11969 - رَمَلِيَّ Sablonnaux (F). Sandy (E).
كثير الرمل.

11970 - رَمَلِيَّة هي الارابيا، اطلبها.

11971 - رَمَلِيَّ Ramalina (S).
Ramalina (F). Ramalina (E).

جنس حزاز ينتمي الى فصيلة الرماليات. انواعه المعروفة ثلاثة منتشرة في معظم اسواق العالم. مشاهير غسقية، متشعبة، مشرشرة. كونها الى الحفاز البحري الباهت. اما الانواع الثلاثة فهي:

11972 - رَمَلِيَّ الأشنَة

Ramaline orseille (F).
ينمو ويتكاثر على الصخور في المواقع الظليلة. ويستخدم كاد صبغية حراء.

11973 - رَمَلِيَّ الصُّخُور

Ramaline des rochers (F).
ينمو ويتكاثر على صخور التمام والحضاب البحرية المرص.

11974 - رَمَلِيَّ المُرَّان Ramaline du frêne (F).
ينمو ويتكاثر على لحاء المران ومعظم الاشجار الحرجية والتريينية والزراعية.

11975 - رَمَلِيَّات Ramalinaceae (S).
Ramalinaceae (F). Ramalinaceae (E).

فصيلة من الحزاز الذي يعيش ويتكاثر على لحاء الاشجار او على الصخور وليس في التربة. مشاهير غسقية، شبه جلدية، لينة، معتدلة النساكة || اجناسها المعروفة قليلة العدد أشهرها الرملين الذي يعتبر قبس الفصيلة.

Silicium	٢٨,٠٦	Si	س	سيليسيوم
Sodium	٢٣,٠٠	Na	ص	صوديوم
	٣١,٠٢	P	فر	فسفور
Phosphore (F). Phosphorus (E).				
Argent (F)	١٠٧,٨٨	Ag	ف	فضة
Silver (E).				
Fluor	١٩,٠٠	F	فل	فلور
Etain (F).	١١٨,٧٠	Sn	ق	قصدير
Tin (E).				
Soufre (F).	٣٢,٠٦	S	كب	كبريت
Sulphur (E).				
Cadmium	١١٢,٤١	Cd	كد	كاديوم
	١٢,٠١	Ci	ك	كربون
Carbone (F). Carbon (E).				
Chroma (F).	٥٢,٠١	Cr	كر	كروم
Chromium (E).				
Calcium	٤٠,٠٨	Ca	كا	كلسيوم
Chlore (F).	٣٥,٤٦	Cl	كل	كلور
Chlorine (E).				
Cobalt	٥٨,٩٤	Co	كا	كوبلت
Magnesium	٢٤,٣٢	Mg	م	مغنيزيوم
	٥٤,٩٣	Mn	م	منغنيز
Manganèse (F). Manganese (E).				
Cuivre (F).	٦٣,٥٧	Cu	نح	نحاس
Copper (E).				
Nickel	٥٨,٩٩	Ni	ني	نيكل
Iode (F).	١٢٦,٩٢	I	ي	يود
Iodine (E).				
Bouquet de fleurs (F).				
Bunch of flowers (E).				
Mise bas des carnassiers (F).				
Cub (E).				

11957 - رَشَش Bouquet de fleurs (F).
الفاضة، أي الباقة من الزهر.

11958 - رَمَص Mise bas des carnassiers (F).
وضع السباح.

11959 - رَمَصِيَّة الرصية: آخر المرد وذلك حين تحترق الارض لان اول المرد الرصية ثم السقية ثم الدنية ثم الرصية (السان).

11960 - رَمَصِيَّيل °، يَجِجَة

Rhamphocèle, Tife (F).
جنس طير من فصيلة التترييات. انواعه المعروفة ستة. موطنها المناطق الحارة من البرازيل والبلاد المجاورة. تألفت الادغال والحراج الميشرة الاشجار. نظامها الحياتي جامي. اسرارها متوافقة الممد تكثر فيها القلة || اجناسها صغيرة القف. متشعبة غسقية الشكل صغيرة. اجناسها معتدلة الحجم. اذنانها متوسطة القد. مقطوعة الاطراف. ارساها دقيقة. اقربها جملة الاوان يكثر فيها الاخر القرمزي || جميع انواعها تعيش على البنود وبمضي التار السنية || تدل اشغالها في الادغال على ارتفاع ٤ او ٥ اقدام من سطح التربة. اناها تقص من ٤ الى ٥ يضا متحضرها بمنوبة للذكور نحو ١٤ يوما.

11961 - رَمَكَة

الرَمَكَة هي لون الرمد في الجبال. يقال في لونه رَمَكَة. والاركام من الجبال ما كان لونه الرَمَكَة، قال أبو حنيفة هو الذي اشتهت كتبه حتى دخلها سواد والافى رَمَكَة. ج رَمَك.



ورمفيل



رملين



رموس ثنائي اللون

خلى القشار يطول من ٤ الى ٥ سم. قروها متضارب الاوان، اسود الرأس والكوسل، اصفر الظهران، اسمر السكة الشريية والجرايز. رأسها مستد الجرم، غروطي الخلف. فكاهما قويان. عيناه صغيرتان. زباناها عيطيلان مقياسان. ظهرها سنانى الشكل لا يلبس كامل البطن. لها جبل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجمالنة في ايار وتميش حتى آب. تسرح في النهار. تسافد في تموز. تمتع الككن لسطاً مربية الشكل تحت لحاء الاشجار اليابسة وبحت الجلالة. البرقة حدة بلونها الكلال الجسودي تطول نحو ٨ سم. جسمها شبه مروني الشكل، مبطط الجرم سداسي الراجب، حنطلي اللون، اسمر الفواج، يمتد في الرأس والشرج. طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوماً يتغشى طليقاً من كل فلاف تحت اللحاء او تحت الجلالة.

١١٩٨٢ - رموسية
جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة اشغاشيات مشهورة باسم سلبج، اطليها.



رموس مصفد

١١٩٨٣ - رموسية
جنس طير من فصيلة القرقنيات. انواعه المعروفة ستة اطاحتها المناطق المحددة الحارة من العالم القديم. اجسامها صغيرة القد، منقايها غززية الشكل. اجنتها قصيرة، متطلة الانفرج. اذنانها متباعدة خطوية. ارفعها قوية حشوية. قوتها الحشرات وبرقاتها ويصبتها وما اصطاحت اليه مبيلاً من البزور البرية خاصة في فصل الشتاء. اعرف انواعه واشهرها الريز المكمل.

١١٩٨٤ - رموسية مكشك
Agathis pandulini (S). Rénis pandulini (F).
طائر من الريز. صغير القد، طوله نحو ١٣ سم. رأسه وعنته وصوله الى الصبهة الرادية. بطنه وايضاً الى التبياض الاخير. ظهره الى الصبهة الزبداء. قوده واباهه سود الصفة. ييش الخالية الصنائية الفواج. كلمة حيه سوداء تمتد من قاعدة المنقاد الى الازن. اطناها تمتد من الشرة الاوسط الى اربعة. يأنف المنافع وضفان مجاري الماء. قوته الحشرات والديدان ويوزر النباتات البرية. ييش عشه في الاذغال والمائل والمغاص. الاثى تقع نحو ٦ بيضات متحففا بمناوة الذكر نحو ١٣ يوماً.



رموس مكشك

١١٩٨٥ - رموسية
يقطل آخر من اين بري..

١١٩٨٦ - رموسية
Prionurus (S). Prionurus (F).
جنس اسماك بحرية عاشية من شاكات الزعانف. انواعها المعروفة قليلة العدد. اطاحتها تمتد من بحار اليابان الى امريكا الجنوبية. اجسامها اطليبية الشكل، مبططة تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. رؤوسها مستدلة القد، غصورة الانضمام الصيرة النائرة. ميرتها صغيرة رقيقة الاثران. زباناها الظهرية مستطيلة، قليلة العرض. زباناها الخلفية تتألف من خمس حصاد رضة شمع. الشريية تقابل الظهرية والذيلية مقمرة. الواليس اترجح من السرة الحطية الى السرة السوداء يطويها في جوازنها لطخ قاطبة صفراء اللون او شقراء او سمراء. قوتها الاضباب البحرية. نحوها متوسطة الصنف، مأكولة.



رموسية

١١٩٨٧ - رموسية
Macroscopic (F).
هو ما يرى بالعين المجردة.

١١٩٨٦ - رموسية
Rhamnusium (S). Rhamnusium (F). Rhamnusium (E).
جنس حشرات من عمديات الاجنحة وصيلة القرقنيات. انواعه المعروفة قليلة العدد. اطاحتها تمتد من اليابان الى اربعة. اجسامها متوسطة القد، تطول من ١٥ الى ٢٢ سم. اولها ثنائية اللون. تسرح في النهار. تظهر في اواخر ايار ويقي حتى اواسد ايلول. عرتها الاثران الحرجية. يرقاتها عاشية تركب الحور والودار والريزون والقنديل.. تفتخر اللحاء وتسردب الشكير.

١١٩٨٧ - رموسية ثنائي اللون
Rhamnusium bicolor (S). Rhamnusium bicolor (F). Rhamnusium bicolor (E).

حشرة خاضعة خالصة من فصيلة القرقنيات وربة مندوات الاجنحة. تألف الحقائق والجانن والاسياجات الحية وضفان مجاري الماء. غناصها غاشلة تفتدي من جمع اجزاء النبات. يرقاتها عاشية تركب الجلود والاغصان تنقلها حتى الشكير وقد تفضل الحور والصقعات والذب على غيرها. جسمها متوسط القد ايضاً الشكل يطول من ١٦ الى ٢٢ سم. ثورها ثنائي اللون، رأسها وكوسلها وبطنها يبرازهما الى اخر القريدي، ظهرها الى الازنة يطولها موج ينحسفي من الذكر. رأسها مستد الجرم. حينها كيرتان جاسفتان. زباناها كيرتان مقوسان. فكاهما ضليخان. ظهرها مستدير الكرف للانشاء، متتابع التميزر العمدي المتطابق، ارسافها رباعية الشكل الظاهرة الاثى اكبر قدماً من الذكر واقتصر زباناها منه وابتد ثوبا. جبلها ثلاثي الحول. تظهر الحشرة الجمالنة في ايار وتميش حتى آب. تسرح في النهار. تسافد بظهرها باسبريوم. ترو المكن تحت قشور الجفوع والاغصان. البرقة حدة الادراك الكمن تطول نحو ٢٢ سم. جسمها اسطواني الشكل، عادم الراجب، اسمر اللون، اسود الرأس، ميمش الحلب الفديق. طور الاكمال الذي يستمر من ٥٥ الى ٥٥ يوماً يتغشى في آخر نفق استفرته البرقة ضمن صلجة خاوية من المواد النباتية المعجورة بالريال.

١١٩٨٨ - رموسية
Bonduc (Frute).
هو شجر البندق الحدي، جسمه حجم البندق المعروف اما يقل عنه استدارة. يتغلل عن لياپ جامد حاجي اللون يحمي بعض الاعدان القائمة. وهو يتبر من المغرويات ويستعمل في الهند كدافع للحميات ضد نهش الاناعي.

١١٩٨٩ - رموسية
Saprophyte.
جهاز لباني اولي نظري او جزئي ييش على الفضويات البالية.

١١٩٩٠ - رموسية
Saprophytism (F).
حالة الاجسام الضاحية التي تعيش على المواد الضوية المتحللة.

١١٩٩١ - رموسية مصفدة
Stenalia testacea (S). Stenalia testacea (F).
حشرة واغمة خاضعة دامت من فصيلة الرديليات وربة مندوات الاجنحة. تألف البراري والاخراج اللغلة. غناصها تعيش على ازهار واوراق الصيرليات. يرقاتها تعيش على المواد النباتية المتحللة. جسمها صغير القد.

١١٩٨٨ - وِكَلَز * Oryzore (F).

اجناسها وانواعها الماصرة المروقة قليلة العدد . جميعها من علم بحار امريكة الجنوبية والوسطى || اجسامها معتدلة القد . اصداؤها لاسمة معتدلة البنية يكثر فيها الشكل الاعلياني || تعيش لاصقة بالصخور المنصورة . لفيها قليل الغزارة || اعرف اجناسها واشهرها الرنجة .

Oryzivorous (E).

نمت ترميمي يطل على كل حيوان او طير قوته الارز .

١١٩٨٩ - وِكَن Atraponga a trois coroncules (F).

طائر يدهى اربتنا ثلاثي النحاس ، اطلبه .

١١٩٩٠ - وِكَن Rangifer (S).

Renne (F). Reindeer (E).

اجناسها

جنس حيوانات لينة بجرة من فصيلة الايليات . اسطانيها البلاد الباردة . قوتها الاعشاب والاوراق وزينات الاجمار ذوايبها ولحالب والفقوس || تعيش جماعات ، اجلها يده من ٢٥ الى ٥٠٠ ثغر . تجوب معظم الاصقاع الشمالية في طلب القوت || اناتها تنفع من ينفور الى ينفورين . لها نومان : الرنة الشائمة والرنة الاسريكية .



رنة شائمة

١١٩٩١ - وِكَن امريكية Rangifer tarandus caribou (S).

Renne américain, Caribou (F). American reindeer, Caribou (E).

نوع من الرنة ، موطنها امريكة الشمالية ، ضروبها اربعة اجسامها كبيرة القد تملر من ١٢٥ الى ١٤٠ سم . وزنها يراوح بين ١٧٥ و ٢٠٠ كيلو . انثاها الى السرة يملوها مراح اصعب || تسبح بصورية . لا يمكن استعمالها كالرنة الشائمة .

١١٩٩٢ - وِكَن شائعة Rangifer tarandus (S).

Renne commun (F). Common reindeer (E).

نوع من الرنة ، موطنها البلاد الباردة المنطقة من الترويع الى اقاصي سيبيريا . جسمها كبير القد يملو نحو ١٢٥ سم . راسها غليظ مستطيل . قوتها كيرة متشعبة تطلو نحو ١١٥ سم . متعها قصير . اذناها معتدلتان . صيانتها كيرتاز . قوتها قوية . انطائها صلبة فائرة تحكها من السير على الثلج . ذنها قصير طوله نحو ١٤ سم . ثوبها الى السرة يمتد مع اقترابه من ثوب الظهر ، يطلو ويبيض مع البلى وعند داخل القوائم || تسبح بسهولة وتستعمل اسنابل البقر والابل .



رنجة الكشمش

١١٩٩٣ - وِكَن Rangia (S).

Rangia (F). Rangia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرضويات صفحيات الخياشيم وفضيلة الرنجات . انواعها المروقة قليلة العدد اسطانيها اعول ومصابا اثير امريكة الوسطى والجنوبية || اصداؤها شبه يضيئة اللون ، متصلة القد والاحدياب متساوية المصاويح ، لامتناهية الانضلال . لونها من الخارج الى البياض المندس والخطوط بالكسني والجروي ، لونها من الداخل الى البياض القلوي اللامع || طوبها مأكولة جيدة الصنف .



رنجة الورود

١١٩٩٤ - وِكَن جسيئات Protorthoptères (F).

Protorthoptera (E).

رنة سحرات متقرصة من طبقة مستقيبات الجناح . اساطيفها تمود الى الخفتين . الكروية والبرية من الاباج الارل || الاسم العلمي يرمز الى انها من اسلاف مستقيبات الجناح . ترتيبها الرضوي البسيط يدل على ذلك .

١١٩٩٥ - وِكَن جسيئات Rangidae (S).

Rangidae (F). Rangidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرضويات صفحيات الخياشيم .

١١٩٩٦ - وِكَن Rhynchosa (S).

Rhynchosa (F).

جنس نباتات عشبية معمرة بيرة من فصيلة القرنيات القرارية . انواعها المروقة نحو ٧٠ جميعها من ثوب المناطق الحارة والاسوائية || صفيها مدادة او عارشة كبيرة الخواطر . اوراقها رفيعة متعاقية . انزعارها عضوي التجميع ، ابطي وطرفه الارتكاز . انزعارها صفراء اللون او حمراء .

١١٩٩٧ - وِكَن Botryosphaeria

جنس فطور مجهرية من الرضويات يتميز بوليمته الغائرة تحت البشرة في نسج اللحاء . اصنافها غليظة مختلفة الاشكال . يوده بسيط التركيب والتجميع ، يضي او اهلبياني الشكل . اشهر انواعها الملوثة رنجة الكشمش ورنجة الورود .

١١٩٩٨ - وِكَن الكشمش Botryosphaeria ribis,

الكشمش Macrophoma, Dithiorhella mali (S). Black-rot du groseillier (F).

فطر مجهرى يسبب الكشمش وبض النباتات الاخرى كالوز والفتح والاجاص والكرية والجزر والبرسقال والحامض واليوسى || مظهره الخارجي في الكشمش يقع صغيرة ممتدة تسبب جفاف القشرة وذبول على التوالي ثم تمتد زولا الى اللند فالفنص فالجذع || وهو في الحشويات وسم يسبب صرع الفروع والساق يده ان يسلط النار ببقعه المنفية التي تبدو مهباء اللون ثم يبرأ . وهو على الفتح يقع قرحية انثا الى السرة تركب الانثا والانثا فتصلب اقسام اللحاء المصابة وتسبب افساد يكافئ بقطع وسرق الاعضاء المصابة فور ظهور الوسم او الذبول ثم تطهر الجروح بملوب سلفات الحديد او سلفات النحاس .

١١٩٩٩ - وِكَن Botryosphaeria dothidea (S).

فطر مجهرى يسبب الورود في فروع فيلوجا || مظهره الخارجي قروح بجنية جامدة بارزة مبرقعة تملر سطح القشرة وتشوه وتنور في النبال فتصلب الشكير والالواف الحشوية || يكافئ بالقطع والحرق ثم التطهير بملوب سلفات الحديد .

١٢٠٠٠ - وِكَن هو النار ، واحدته رندة .

١٢٠٠١ - وِكَن Renne (F). Reindeer (E).

حيوان لين بجتر من فصيلة الايليات يدهى رنة ، اطلبه .

١٢٠٠٢ - وِكَن Rendzine

اربة تميزت ببيود بعض البقايا الجصية المحجرة في مقاطعها الحمضية . لشكلها والوانها عديدة يكثر فيها الاحمر والاصفر والاحمر والالوان .

١٢٠٠٣ - وِكَن Calla, Choucalie, Calle (F).

Calla, Trumpet lily (E). Schweinewurz (D). Calla (I). نبات عشبي بري بلمووري معم من سبط الرنيات



رئس السَّاقِع



رئس لَزْرَق



رئس الكَرَّة



رئسيت حَمْرِي



رئسيت مَلْهَب



رئف المُلْك



رئفوت

عيناها كيرتان فاشرتان . زبانا دقيقان ، صقيان .
ظهورها مثل الاحدياب مقطوع الطرف المنقش نحو
الاسفل . غدها متناوبة التحيز ، كثيف الجبل ||
لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل
الربيع وتبقى حتى اواسط الصيف . تسانه به ظهورها
باسموم وتنتع للكن ميعاديا في سوق البازار القليلة في
تقريب تخليجها عنكما || البقرة عند الادراك تمام طول
نحو ١٢ سم . جسمها دقيق الجرم مقوس الشكل ، تبي
اللون ، وردي المياج ، اسود الرأس والشرج ، حاد
الرواجب ، تملو ثلاثة خطوط من النقط السود || طور
الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتقضي ضمن
جراب من التراب والمواد العضوية للمصيبة بالريال .

١٢٠١١ - رُئف

Poinciana (S). Poinciana, Poincilliana, Poinciade, Poincia (F). Poinciana (E). Poinciana (D). Poinciana (I).

جلس شجيرات برية ورؤينية من فصيلة الزقريات ، انواعه
قليلة بعضها شاك . اوراقها مركبة وريشة . ازهارها
معدودة التجميع جميلة الشكل صفراء اللون مزخرفة بالاحمر .
اشهر انواعه الزرقية الزرق الجليل ورئف الملوك .

١٢٠١٢ - رُئف الملوك ، وَهَرَّة الجَنْجَة

Poinciana regia, Delonix regia (S). Poinciana superba, Flamboyante, Fleur de paon (F). Royal poinciana, Peacock flower (E). Poinciana (D). Poinciana regia (I).

شجيرة زرقية من الزرق تملو من ٣٠٠ الى ٤٠٠ سم .
ساقها وفروعها شاككة . اوراقها عابلة ، انزهارها هري
الشكل . ازهارها كبيرة القد ، صيرها فواح مستحب
لونها احمر برتقالي . اسديتها نارية اللون تملو نحو ٢٠ سم .

١٢٠١٣ - رُئف جَمِيل

Poinciana elata (S). Poinciana élevée (F). Raised poinciana (E).

شجيرة زرقية من الزرق تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم .
ازهارها جميلة الشكل كبيرة القد نارية اللون مزخرفة بالاحمر .
ترقب في الازرة الخفيفة والصلصة الانساج . تحمي الرطوبة
المستحكمة .

١٢٠١٤ - رُئفَكَه

Poule couveuse (F). Brooding-hen (E).

هي الدباجة الحاضنة للبرقعة عند العانة بالقرعة .

١٢٠١٥ - رُئفُوت

Rhynchotus (S). Rhynchote, Tinamon (F).

طائر من فصيلة الزقونيات طوله نحو ٤٢ سم . رأسه
صغير القد . منقاره مستطيل . منقه دقيق وطويل . ريش
ظهوره وجانبه الى العنبة تعلوها خطوط سود معترضة .
انثى متوسطة القد تنبلس الارض . يملو اشهل الريش .
يملو برصة فائقة . يألف الاصراج والنباتات والارواح .
قوته البازار والحبوب والحشرات والاعشاب || الانثى تبني
من ٧ الى ٩ بيضات تحضنها وسعها نحو ٤ اسابيع . يقال
انها تحضن ثلاث مرات في السنة .

١٢٠١٦ - رُئفُونِيَّات

Crypturidae, Tinamidae (S). Crypturidae, Tinamidae (F). Crypturidae, Tinamidae (E).

فصيلة طير من القرواكس ، اجنسها وانواعه عديدة .
مهدها امريكية الجنوبية ، جسمها صغيرة القد مستطيلة
قصيرة القوائم || قوتها الحبوب والبازار والاعشاب والحشرات .

ونصيلة الغلغاسيات . انوله قليلة . اوراقه قرسية الانتساب
زنادية متعسبة . زرعانه الزهري فرائخي النضادة . ثماره
عينية الشكل متراكبة لبدة .

١٢٠١٤ - رُئس السَّاقِع

Callis palustris (S). Caille des marais, Choualtes des marais (F). Bog-
arum, Water dragons (E). Aronstab, Echte schwe-
weinewurz (D). Dragontas, Piede di vitello
palustre (I).

لوح من الرئس يعيش في المنافع وعلى ضفاف السيورات .
جذموه مداد . اوراقه قلبية الشكل طويلة الزناد المنصب .
شراعه يملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . شرماته ابيض الزهر
يملو نحو ٧ سم . ثماره عينية متراكبة متراصة مرجانية
اللون .

١٢٠١٥ - رُئسِيَّات

Callées (F). Calla (E).

سبط من فصيلة الغلغاسيات .

١٢٠١٦ - رُئسِيَّت

Rhynchites (S). Rhynchite (F). Rhynchite (E). Rhynchite (D). Rhynchite (I).

جلس حشرات من فصيلة السويات . انواعه عديدة تعيش
على الاشجار الليرة والحرجية . انولها زاهية الالوان .
اجسامها صغيرة القد ، ريقاتها غزاة تلتهم الارواح وتختص
الصارة . اشهرها ما يتبع .

١٢٠١٧ - رُئسِيَّت لَزْرَق

Rhynchites caruleus (S). Rhynchite bleu, R. coupe-
bourgeois (F). Apple twig beetle (E). Zweige-
tacher (D).

حشرة صغيرة القد من السويات ، طولها نحو ٣ سم . لونها
ازرق لامع . عسلها وفوقها سود . تركب الاشجار لليرة
اخضها الاجاس والفتاح . تقتسم مع ريقاتها البرام
الزرقية تنقصي عليها .

١٢٠١٨ - رُئسِيَّت الكَرْمَة

Byctiscus betules (S). Rhynchite de la vigne, Cig-
rier, Urbes (F). Pear leaf roller (E). Rabenstecher,
Zigarrenmacher, Zigarrenwickler (D).

حشرة من السويات صغيرة القد طولها من ٦ الى ٨ سم .
لونها اسفح يملو مياج زرجدي . تمتع الانثى مكها على
ورق الكرمة فيفتح عن يرقات صغيرة دقيقة مستطيلة
تقتل الارواح وتعيش في داخلها .

١٢٠١٩ - رُئسِيَّت حَمْرِي

Rhynchites bacchus (S). Rhynchite bacchus (F). Rhynchites bacchus (E). Purpurroter Apfelfrucht-
stecher (D).

حشرة من السويات طولها براوح من ٥ الى ٦ سم . فويها
قربزي اللون يملو مياج بنسفي . تركب جميع الاجبار
الليرة . تلتب البرام الزرقية لامتصاص صارتها ثم تمتع
مكها الذي يتفتح عن يرقات تدمل البازر وتعلها .

١٢٠٢٠ - رُئسِيَّت مَلْهَب

Rhynchites auratus (S). Rhynchite doré (F). Rhynchites auratus (E).

حشرة غاضلة ثائرة من فصيلة السويات ورؤية سفلات
الاجنسة . تألف الجبان . غنائفها تلتهم برام الخوخ
والفلس وتلتد الازمار والورابي القليلة . ريقاتها تعيش
في البازر وداخل ميعاتها || جسمها صغير القد يملو من
٧ الى ٩ سم . فويها الى انضمار النضامي يملو مياج ابرواني
ورئف اشقر . راسها كثيف الحمل ينتهي بملك مستطيل .

Melanospora (S).

جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات .
أصنافها رديئة ، بديئة ، بسيطة ، منفردة ، مستديرة ،
عابقة اللون || تكاثفها دبوسية الشكل لا تكاثر لها ،
سرمية الانصلاج || برفها وحيدة الخلية أسمر اللون .
أنواعها المؤذية ثلاثة وهي ما يلي .

١٢٠٢٦ - زؤفة الزئاب

Melanospora stysanophora, Stysan stemonites, Dematophora glomerata (S).

فطر مجهرى يركب جلود الكروية والجلاطيا ويثيرها من
النباتات المائية || يعيش ويتكاثر في بيئة مشبعة
الرطوبة || منظره الخاريجي يتبع حطية خلية مهددة لزجة
الملمس تركب الجلود فتصلبها || يكافح بتحفيز الرتبة .

١٢٠٢٧ - زؤفة الزئج

Melanospora damnosus, Sphaeroderma damnosus (S).

فطر مجهرى يصيب القمح والشعير والشرهان || يركب
سلاسلات القصب وأحمد الأصنف فيرشها بفتح قسيمة
خلية حطية تقيم النمو وتؤذي الاسبال || أضراره زهيدة
محدودة إلا إذا وافقها العوامل الطبيعية وأصاحها بنجاف
التربة والجو .

١٢٠٢٨ - زؤفة الحليتين

Melanospora asparagi (S).

فطر مجهرى يصيب الحليتين فيؤذيها وقد يصيب يباسه .
يركب السويق في أي وقت كان فيشل أحامها الحوية
ويصيب أنصاف رؤوسها وأغرفاتها نحو الأرض ثم جفافها
قبل اكتمال دورتها الحياتية || يكاثف منه بدء ظهوره
بامتثال أحد الفطالير الفعالة غير المركزة على التحساس .

١٢٠٢٩ - زؤاب هو قودج شوت ، اطليه .

١٢٠٣٠ - زؤام ما لا يصيد من الطير .

Impondérable (F).

Imponderable (E). الرجل ما كان غير قابل الوزن .

Impondérabilité (F).

Imponderability (E). الرجل عدم قابلية الوزن .

Tilletia

هو النخريه جنس فطور مجهرية .

Tilletiaceas (F).

Tilletiaceae (E). هي الفطريات فصيلة فطور مجهرية .

Seratus

هو السديم نوع من الفيرم ، اطليه .

Rohdea (S).

Rohdea (F). Rohdea (E).

تبات عشبي ، جلسموري ، سبروتي ، عمره ، وحيد
الجنس والنوع من فصيلة الزئقيات . هذه بعض مناطق
البيان || أوزانها جلدية الانتشاب ، اعليجية الشكل ،
تعطون من ٧ الى ٩ سم . تعالها عادمة الزغب ، مستقلة
المروق . أزرارها سنبل التجميع ، يرتفع نحو ٣ سم .

١٢٠٣٦ - زؤفة

تدثر في أنفوس تحضره بين الإدغال الكثيفة الشائكة .
أشهر أجناسها الزئقوت .

Rhynchichthys (S).

Rhynchichthys (F).

سمكة بحرية يبيض من شائكات الزعانف وفصيلة المتقنيات .
أصنافها المحيط اطفي واليسر الآخر || جسمها متوسط
القد ، بطول نحو ٢٤ سم . رأسها كبير الجرم . خطمها
مدب الطرف . فكها الأمامي يتقدم الأسفل . شفتها وحيد
الانفرج . ميناها كبيرتان ، جاحضتان . زعنفتها الخلفية
قارئة . أسفانها مسننة الحمار شائكة . ثوبها الى الرمكة
القضية المولج يمتد في الظهر ويژهو في الجانبين ويغير
في البعن || لحمها جيد المصنف ، مرغوب فيه .

Clupea (S).

Hareng (F). Herring (E).

جنس اسماء بحرية من فصيلة السابوقيات ، أنزاعه نحو
٩٠ ، موطنها بحار المال أخصها بحار المناطق الحارة .
نظامها الحياتي جاسي . سرها يد نحو مليون سمكة . تجرب
البحار في المياه الأتلية حيث تكثر القشريات التي تركز
عليها قوتها . وقد تدخل مصبات الأنهر || أعرف أنواعه
الرؤكة الشائعة وزؤكة البحر الاسدي .

١٢٠١٨ - رؤكة

١٢٠١٩ - رؤكة البحر الأسود

Clupea pontica (S). Hareng de la mer Noire (F).

Pontica herring (E).

نوع من الرؤكة ، موطنها البحر الاسدي ، ظهرها الى
الزؤقة الرصاصية . جانبها الى الزؤقة البحرية القضية
المولج تعلموا خطوط دقيقة مستطيلة عابقة ، بطها فصي
اللؤلؤ والمولج . سرها نحو نصف مليون . تصاد وتؤكل .

Clupea harengus (S).

Hareng commun (F). Common herring (E).

نوع من الرؤكة ، ظهرها الى الزؤقة ، جانبها ويطها
فضية المولج . تكثر في المحيط الاطلسي . نادرة في المتوسط .
سرها من الملايون الى الملايونين . تصاد وتؤكل .

١٢٠٢١ - رؤكة نبات دقيق (اللسان) .

Renanthera (S).

Renanthera (F).

جنس نباتات أمية من فصيلة السبليات . أنواعها
المروقة خسة . أصنافها تمتد من الهند الى ماليزية . يكثر
ويجوها في القنات والاراحل الظليلة الرطبة وقد انتشرت
زراعتها التزيينية المركبة عند معظم الشعوب التي تمتد
بالانحدار || أوزانها مزدوجة التصنيف ، جلدية التصلب
المستطيلة الضيقة . أزرارها كبيرة ، خاسية البتلات
المستطيلة ، شفافية التجميد الذي يبدو كالنقش . ألوانها
الى الحمر منها القرمزي والاريجوني والاحمر الزاهي والاديس
والودي .

Echaduge (F). Lime-wash (E).

لغج الحر يصيب لزوع من حنطة وشعير يد أضراره
يقصر حيه .

Altitude

١٢٠٢٤ - زؤفة

رداء كل شيء : ارتفاعه عن سطح البحر ومستواه . ومنها
خطوط الرداء (Courbes de niveau) .



زئيق



زؤكة



زئقية



رداء الزئاب



رداء الزؤج



رداء الحليتين



زؤفة

Rhyacophila (S).
Glossosoma (S).
Agapetus (S).

ويقوم على شراخ غليظ يرتفع نحو ٤ سم. أزهارها صفيرة ،
لبدة ، حراء اللون || تنورها يستمر من أيار إلى حزيران.
تزدج قترتين ضمن البيوت وفي المصاري وفي الحدائق
الدافئة .

Brouillard épais (F). Dens fog (E). رُهْنَل
صباب رقيق جرار رذاذ كثائي ينشئ المناطق الجبلية .

Rhodens amarus (S). رُهْنْدَس *
Bouvière (F).

سمكة ثورية من فصلات المائة وفضيلة الشبليات .
أصلها بعض أنهر الشرق الأدنى وأروية || جسمها صغير
لقد يطول من ١٢ إلى ١٥ سم. رأسها صغير الحجم ،
قصير الخيل . لكنها الأمل يتقدم الأسفل ، زعنفتها الظهرية
عريضة شبه هرمية الشكل . زعنفتها الذيلية عريضة ، مقعرة .
لونها إلى الشبهة السمراء الفضية الملوحة ، تميز في الظهر
وتبيض في البطن || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .



رهنس

Rehmannia elata (S). رُهْنَالِيَّة سَامِيَّة
Rehmannia elatode (F).
عشبة معمرة مهدبا البرق الأصفر على اسم العلامة الردي جروفت
١٥٥ سم . أوراقها أهليلجية ذلقة الزلم الأخرى . نصلها
شعبي التستين ، أسنانه مدنية حادة . أزهارها كبيرة اللقد
تطول نحو ٨ سم . وردية اللون ينموا مرابع أربواي
يقيم مع آثارها من قاعدة الزهرة || أنزهارها صبي .

Macronyx (S). رُهْنْدَك
Macronyx, Aiovette éperonnée, Sentinelle (F).
جنس طير من فصيلة القربيات . أنواعه قليلة أصلها
البلاد الأفريقية . تتميز باستطالة ذوارها . أجسامها
صغيرة اللقد ، ألوانها إلى الوردية ، ظهورها خافتة ، ورشها
اغبر الإفرات . يطير إلى الصبية . أزوارها مطوقة بالأسود
حواجب بعضها يرتقالية اللون || أناتها تدن في الإذغال
تبيض من ٣ إلى ٤ بيضات ، لونها إلى الأزرق يملوا يتقيج
جلوي || قوتها الحشرات والبرور البرية .

Rehmannia glutinosa (S). Rehmannia visquosa (F).
عشبة معمرة مهدبا الصين وآلبان تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم.
ساقها غدية لينة . أوراقها خلية النمل ، جزوية الصفحة
السفل ، غضراء العليا . أزهارها سفراء اللون موشمة بالأحمر
أطرافها وردية ، حثارها أبيض || أنزهارها يستمر من
نيسان إلى حزيران .

Pyrrhuloxia (S). رُهْنْدَن * رُهْنْدُون
Pyrrhuloxia (F).
جنس طير يهدن في مشقة من فصيلة القربيات . أنواعه
قليلة تعيش معظم حياتها على الأرض . أصلها البلاد
الأفريقية . جسمها صغيرة اللقد . أجسامها تطول من ١٣
إلى ١٥ سم . منقورها غرولية قصيرة . ورومها سود
حاسرها أبيض ، ظهورها إلى السرة القليلة ، يملوا سود ،
غوافها إلى القيرة ، أجنتها إلى السرة الوردية . أنذاتها
مبلقة || أناتها تحضن من مرتين إلى ثلاث مرات في السنة .
تدن في التربة بين الإذغال . سفنتها ثلاث بيضات ، لونها
إلى الخضراء ، تملوا رقة سفراء . ج رعدان .

Rehmannia angulata (S). Rehmannia à grains anguleux (F).
عشبة معمرة مهدبا الصين . تملو من ٦٥ إلى ٩٠ سم .
أوراقها السفل متقاربة . نصلها لا تقاسي التفتيل ، حلي
البيضة . أزهارها تطول من ٦ إلى ٧ سم . لونها إلى الحمرة ،
قاعها بتعسجية ، أطرافها أربواي موشمة بالأبيض .
ذورها سادة الأزوايا منضلة .

١٢٠٤١ - رُهْنَرَكَة هي الشغين البقر ، أطليه .

Hypothèque (F). Mortgage (E). رُهْن
حق عيني على عقار تأسيباً لدين .

Assise (F). Foundation, Basis (E). رُهْنَس
المرق الأسفل من الحائط .

١٢٠٥١ - رُهْن إِنْكَافِي
Hypothèque conventionnelle (F). Conventional mortgage (E).
هو الرهن العقاري الذي ينمذ بقراضي الدائن والدائن .

Pressurage (F). Pressing (E). رُهْنَس
شدة العصر لاستخلاص المستطاع من المادة المقصودة .

Nantissement (F). رُهْن الْحَيَاة
Cover mortgage (E).
هو عقد ضمان عيني يفتي بمقتضاه المدين أو غيره مع إلى
الدائن ضماناً لديه حيازة مال ثابت أو متحول ويحول حقاً
عيني على هذا المال .

١٢٠٤٢ - رُهْنَطِي طائر يقال له عبر السرة .

Antichrèse (F). رُهْن حِيَاةَ الْبَقَارِ
Mortgage de revenus (E).
عقد بيع وشع اليد على عقار المدين استيفاء قنواك والمال
المطلوب .

Rhyacophilidae (S). رُهْنَكُوْفِيلِيَّات *
Rhyacophilidae (F). Rhyacophilidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة جملويات الاجنحة . أجسامها
وأنوارها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض جبال البلاد
المعتدلة الحرارة || أجسامها متوسطة اللقد سفراء اللون .
أجنتها الأمامية مقببة أو مزعقة ، أما الخلفية لشفاة
مهدبة الختار الخلفي . قوائمها الأمامية مجعزة بمنس
ظنيري الارتفاع || أساريها تمش في المياه الزاكية أما
طليقة أو ملسطة بجلايب شبه النوية الشكل .
أشهر أجناسها :



رهدن

١٢٠٦٦ - رَوَاكِينٌ في الدواجن .

١٢٠٦٧ - رَوَادٌ * ، وَهُوَ الْجَنَّةُ

Tetrapteryx paradisae (S).

Tétraptéryx, Grue de paradis (F).

طائر من طوال الساق وقصيلة الكركيات . أطيانه تشمل البلاد الأفريقية وبعض المناطق الآسيوية يجوها في طلب المرقع والمصيف والمشتى . يذبح حشه ويغضن بيضه في أفريقيا الجنوبية || جسمه كبير القند أخف القوام مستطيل الذنب غرزي المنقاد . ثوبه إلى الوردية الصنائية المواج باستثناء خط أبيض يمتد من قاعدة الفك الأسفل إلى عبر الزور والمنتق ، إلى أعالي الجرشن || ويثبه مهذل مرغوب فيه .

Pis de la brebis (F).

Dug of ewe (E).

١٢٠٦٨ - رَوَاشِح

في ثمل الشاة خاصة .

١٢٠٦٩ - رَوَالِيد اشخاب السقف وسواد البحر .

١٢٠٧٠ - رَوَاكِيصٌ ، عَوَادٌ

Coureurs, Ratées (F).

Ratées (E).

أحد قسمي الطير يشمل أربع فصائل النعاميات والشبنيات والرفقويات والكويويات . أما القسم الثاني فيشمل الجرشيات .

Bave des bestiaux (F).

Slaver of cattle (E).

١٢٠٧١ - رَوَالٌ

لحاب الدواب ، وقيل لحاب الخيل خاصة .

Biennius pholis (S).

Pholis lisse (F), Shanny (E).

١٢٠٧٢ - رَوَالَّةُ *

سمكة بحرية من فصيلة الجرشيات . أطيانها بعض بحار البلاد الحارة والمتعددة الحرارة || شكلها متوسط القند يطول نحو ٢٧ سم . رأسها مستطيل الشكل ، قصير الخطم ، صغير الشدق . عيناها صغيرتان ماصحتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة تمتد من الرأس إلى الذيل . الشرجية ضيقة مستطيلة . الصدريتان مرويستان . الحوضيتان صغيرتان دقيقتان . الذيلية مقطوعة || ثوبها العلوي إلى البطحلة السراء يعلوها مواج يراوح من الأخضر إلى الأزرق . يعلها إلى البيضاء الغابر || لحما مأكول ، جيد الصنف .

Oiseaux nocturnes (F).

Nightly birds (E).

١٢٠٧٣ - رَوَاكِس

في الطيور التي تسرح في الليل .

Argentine vulgaire (F).

١٢٠٧٤ - رَوْبَاصٌ

سمكة بحرية تنحى فبس فصي ، أطيانها .

Cailté (F), Curd (E).

١٢٠٧٥ - رَوْبَكَةٌ

خيرة تلقى في الحليب ليروب .

١٢٠٧٦ - رَوْبَكَةٌ في التلك ، أطيانها .

١٢٠٧٧ - رَوْبِيكَانٌ هو الأريبان ، أطيانها .

Rupple (S).

Rupple, Rupelle (F).

١٢٠٧٨ - رَوْبِيكَةٌ

جنس نباتات مائية من فصيلة عراش الماء . أنواعها المعروفة قليلة العدد مهددا الماء الاجاج في مناطق البلاد الحارة والمتعددة الحرارة . أوراقها غنية الرباط كأوراق النجيليات .

١٢٠٥١ - رَهْنٌ قَصَافِي Hypothèque judiciaire (F).

Judiciary mortgage (E).

هو الرهن القائم مل حكم المحكمة أو المحكمين عدليا بالصيغة التنفيذية .

١٢٠٥٥ - رَهْوٌ هو الكركي ، أطيانها .

١٢٠٥٦ - رَهْوٌ Grue (F), the Crane, Grus (E).

الزهر كوكبية نجوم جنوبية الموقع . نجوها متوسطة العدد ، كاشنة المربة .

١٢٠٥٧ - رَهْوُ الْجَنَّةِ Grue de paradis (F).

طائر من طوال الساق يسمى رواد ، أطيانها .

Phacaceae (S).

Phacacées (F), Phacaceae (E).

١٢٠٥٨ - رَهْوَكِيَّاتٌ

فصيلة من الطحالب تنتمي إلى رتبة السبقيات .

١٢٠٥٩ - رَهْوَمٌ Mouton maigre (F), Lean sheep (E).

تعريف وصفي يطلق على اللحم الملهوالة .

Amble

١٢٠٦٠ - رَهْوَكَةٌ

في المشلية ، ضرب من سير التراب .

Alutacé (F).

١٢٠٦١ - رَهْيِدٌ

هو التعقيب أبقين الحيك في كويل الحشرة ونمذها .

Merenders (S).

Mérendars (F).

١٢٠٦٢ - رَهْيِدَةٌ *

نبات طبي دوسي من فصيلة السورنجانيات ، جبل المحدث قريب القبة السورجانيان . درفصتها فيه غروبية الشكل . أوراقها من ٥ إلى ٥ ، نصالها سنائية تطول من ١٠ إلى ١٥ سم . تكون منتصب في أول مهدها ثم تلثف التربة . زهرتها كبيرة وحيدة بنفسجية اللون مدامية البلات تقوم على شراخ مصب يرتفع من ٧ إلى ١٢ سم . تنويرها يشتر نحو ثلاثة أسابيع ابتداء من أواخر آب || غواصها الطلية ونمذها لا تختلف من غواص السورجانيان ونمذها .

١٢٠٦٣ - رَهْيَكَةٌ * ، دَهْيَكَا ، رَهْوُ

Labao rohita (S), Rohita (F), Rohita (E).

ديبرا وروهو من اسمائها الحديثة . نوع من اللبس سمكة نهرية يمرض تنتمي إلى فصيلة الشبويات . أطيانها أكثر انهر المحدث انحصا أنهار السنه وبيمرانية || جسمها كبير القند يطول من ٦٥ إلى ١٠٠ سم . رأسها مستطيل الجسم . مقطوم الخطم . فكها الامل يتقدم الأسفل . عيناها كروائيه ، مستديرتان ، نازدتان . زعنفتها الظهرية واحدة شراعية الشكل . الصدريه سفلية الارتكاز . الذيلية نازقة . قوفا إلى الخضار الاسمر كشته سمرة مع الاقتراب من ثبح الظهر وتثقف عند البطن || لحما متوسط الصنف ، مأكول .

Callicacées (F).

Callicaceae (E).

١٢٠٦٤ - رَهْيَكِيَّاتٌ

عارة فلور مجهرية من فصيلة الخشاريات ورثة الزقيات . اجتماعها وانواعها قليلة تختلف على الطحالب والحزاز . ومنها جنس واحد يتفصل على النباتات العليا يدعى قصاصة .

١٢٠٦٥ - رَهْيَقٌ هو الفراح .



رهيدة



رهيلة



رَوَادٌ



رَوَالٌ

نعالها يحيط مستطيلة متشابكة ترتكز على اصلاح جذعة .
تتمثل في المسلكة والاحواض كرتع للاسماك انماجية .



روئية مستطيلة

١٢٠٧٩ - روتية Robinia (S). Robinier (F).

جنس اشجار وخجرات حرجية وزريرية من فصيلة القرنريات القرابية . انواعه عديدة بعضها منتصب شاككة ، اوراقها مركبة ريشية ورتية التجميع . انزهارها عقودية الشكل ، ابلي الاكازان || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

١٢٠٨٠ - روتية مستطيلة شاككة شجرة الجبراد ، سنط كاذب Robinia pseudacacia (S).
Robinier faux-acacia, Faux-acacia (F). False acacia, Locust tree, Locust scacia (E). Gemeine schenkezie, Gewöhnlichekaskie (D). Robinia, Falsa acacia, Falsa gaggia (I).

اعرف واشهر انواع الروئية : قزوبه مدينة متباينة الحجم والشكل واركان الاثمار . اثمارها تملو من ١٥ الى ٢٥ م . وريقات اوراقها لا تقل عن ٧ ولا تتفوق ١٩ . انزهارها عقودية كبيرة تملو نحو ٢٠ سم . ازهارها عريفة الزائفة عديدة الالوان يكثر فيها الالبيش .



روت ابش

١٢٠٨٨ - روت الوردة Robinia (S). Robinier (F).

شجرة من الروئية تملو من ١٥ الى ١٥ م . ساقها ووردها قليلة الشوك . نواحيها غنية بالحام الزائفة اعدادها حر . اوراقها كبيرة القند . وريقاتها من ١٣ الى ٢١ م . نصليا انزب الصفحة السفلى . عقودها الزيري منتصب الشكل يعمل من ١٥ الى ١٥ م زهرة ودية اللون يطولها مواج ينفسجي .



روت الخرق

١٢٠٨٩ - روتون Roténone (F). Rotenone (E).

مادة فائلة تستخرج من بطور بعض النباتات القرزية انحصار اللوريس والحوراء والبقرة || وهي مادة شديدة السمية ذيفانها يقتضي حل جميع الحشرات وكل منظم الاجسام الصغيرة . اما لا يؤثر في الانسان والحيران الناجين . مما جعل استعمالها في مكافحة الحشرات ينتشر بسرعة ممتدة .



روت الزنابق

١٢٠٩٠ - روتوت Crotin (F).

Dung of horses, mules, etc. (E).
سرجين الخيل وكل ذي سافر . امامة تسميه وفكك . وهو من الاسمسة المضوية الشاملة الاحتمال . فيه بنوع خاص الاتربة المنسجة لانه يخفف من تملك ذراتها ويعدو بالحارة الناتجة من تخميره وبالناسر البندائية التي يحولها || راجع منوط ما يحول الغرث من عناصر في مادة سعاد .



روت الوردة

١٢٠٩١ - روتة Bac des rapaces (F).

Bill of rapacious birds (E).
الروية : منقار كواس الطير . روية العناب : منقارها .

١٢٠٩٢ - روتة Casio (S).

Casio (F). Casio (E).

جنس اسماك بحرية من شاككات الزمانف وفصيلة القرانجات . انواعه المعروفة نحو عشرة . اصلاها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة قلقة ، اطياليسية الشكل ، متدلة التجميع ، تملو من ١٥ الى ٢٠ م . زانفها المنطوية مستطيلة ريفية القند ، شاككة القسم الامامي . زانفها الذيلية قاركة . الزانف تختلف مع الانواع ، تكثر فيها الزرقه وشفتاها والركبة الكفية والطحلة الرصاصية || جميعها جيدة الصنف ، مأكولة .



روت

١٢٠٨٢ - روتية وردية Robinia hispida (S).

Robinier rose, Acacia rose (F).

شجرة تملو من القرن الى الثلاثة امتار . ساقها قليلة الشوك . قزوبها كثيفة الغلب للشوك الاحمر اللون . وريقات اوراقها تملو من ٩ الى ١١ م روية مستطيلة لتصل الماس البشرة . عقودها الزيري يعمل من ٥ الى ٨ انزهار ، لوها الى الوردي المشع بالاحمر . قزوبها مبطة مهدبة القشور .

١٢٠٨٣ - روتية وردية Robinia hispida (S).

Robinier rose, Acacia rose (F).

شجرة تملو من القرن الى الثلاثة امتار . ساقها قليلة الشوك . قزوبها كثيفة الغلب للشوك الاحمر اللون . وريقات اوراقها تملو من ٧ الى ١١ م نصليا مالى البشرة . انزهارها ودية اللون . عقودها الزيري يعمل من ٧ الى ٩ انزهار عريفة الزائفة .

١٢٠٨٤ - روتوت Coniothyrium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . بكديتها كروية او مغنطية ، محصورة للثأا ، سطحية الانتشار . سطحا لحمي او متصلب الانسجة . شفيراته متشابكة . بوزانته يفضية او اطياليسية ، صغيرة ، وحيدة الخلية ، سمرال اللون || انواعه عديدة منها حيودة لا تؤذي ومنها ضارة تركب الاغصان والارواق || اعرف انواعه المؤذية ما يتبع .

١٢٠٨٥ - روت ابش Coniothyrium diploidiella (S).

Coltre, Maledie de la grêle (F). White rot, Livid rot (E).

نظر مجهرى يركب حبوب العنب التي اصابها البرد .

١٢٠٩١ - رَوْتَل عَكِيْقِيَّة

Russula sardonis (S). *Russule sardoine* (F).

نوع من الرَوْتَل الكاعن الصنف. يوجد في حراج الصنوبر. ساقه معتدلة الارتفاع. اُرسوت كبيرة، قطرها نحو ١٠ سم. لونها يتغير مع العمر، يبدو اصفر ثم ينحرف الى الرمادي ويتغير بالبنفسجي المتغيري المواج.

١٢٠٩٢ - رَوْتَل مَأْكُول *
Russula vesca (S).

Russule comestible (F).

نوع من الرَوْتَل المأكول. يكثر ويوجد في الغابات الظليلة. ساقه قصيرة. اُرسوت قلنسوية الشكل، قطرها نحو ٨ سم. لونها الى الحمرة المائية المواج.

١٢٠٩٣ - رَوْتَل مَدْمُتِي *
Russula sanguinea (S).

Russule sanguine (F).

نوع من الرَوْتَل الكاعن الصنف. يوجد في حراج الصنوبر. ساقه معتدلة الارتفاع، وردية اللون. اُرسوت الى الحمرة البسوية، قطرها نحو ٧ سم.

١٢٠٩٤ - رَوْتَل مَذْهَب *
Russula aurata (S).

Russule dorée (F).

نوع من الرَوْتَل المأكول. يكثر ويوجد في حراج السندبان والمخلول. ساقه معتدلة الارتفاع. اُرسوت فارشة، مقعرة الوسط، صفراء اللون، ذخية المواج.

١٢٠٩٥ - رَوْتَل مَقِيَّتِي *
Russula ametica (S).

Russule émetique (F).

نوع من الرَوْتَل الكاعن الصنف. يوجد في الغابات. ساقه يبيض اللون. اُرسوت فارشة، برتقالية اللون، قطرها نحو ٨ سم. طعمه حريف المذاق مقتي.

١٢٠٩٦ - رَوْتَل مَكْلُوح *
Russula adusta (S).

Russule brulée (F).

نوع من الرَوْتَل المأكول. يكثر ويوجد في حراج السندبان. ساقه قصيرة. اُرسوت فارشة مقعرة الوسط، صفراء اللون، كأنها ملغوسة، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٢ سم.

١٢٠٩٧ - رَوْتَل قَرِيه *
Russula integra (S).

Russule intégrè (F).

نوع من الرَوْتَل الكاعن الصنف. يوجد في حراج الصنوبريات. ساقه قصيرة، يبيض اللون. اُرسوت مقعرة الوسط قطرها من ٥ الى ٧ سم. لونها الى الكستني الاصفر المواج.

١٢٠٩٨ - رَوْتَل هَشَّ *
Russula fragilis (S).

Russule fragile (F).

نوع من الرَوْتَل الكاعن الصنف. يوجد في الغابات. اُرسوت مقعرة، هشة، سريسة الطبع، قطرها من ٣ الى ٥ سم. لونها الى الوردي الالفج المواج. طعمها حامز المذاق.

١٢٠٩٩ - رَوَحَاء *، رِيه، تَنْدُو، تَعَاكَة أَمْرِيكِيَّة
Rhea (S). *Nandou* (F). *Nanou* (L).

جنس طير من فصيلة النعاميات. انواعه ثلاثة، موطنها امريكا الجنوبية. تتميز بدم قدمها حل البوران. يبلغ متوسط ارتفاعها نحو ١٦٥ سم. الذكر اصغر واربع من الانثى || ريشها مهذل ناعم. عنقها مستطيل القبة شال

١٢٠٩٣ - رَوْتَل *
Russula (S). *Russule* (F).

جنس تطور كاملة التركيب، من فصيلة الفانوقريات. انواعه المعروفة كثيرة للعدد اعطائها معظم اقالم المناطق المعتدلة الحرارة. يعيش حسل المواد النباتية المنحلة في الغابات والحراج. اطرافه قرحة، متساوية، يبيض اللون او صفراء. يذوق ابيض اللون او اصفر. بعض انواعه لذيق الطعم مأكول والبعض الاخر كاعن الصنف غير مرغوب فيه.

١٢٠٩٤ - رَوْتَل أَحْمَرِ اصْفَر *
Russula cyanoxantha (S).

Russule vorta et jaune (F).

نوع من الرَوْتَل المأكول، يكثر ويوجد في الحراج الكثيفة الانجار. اُرسوت شبه مقعرة الشكل، رقيقة الاطراف، لونها الى الخضار الاصفر البنفسجي المواج.

١٢٠٩٥ - رَوْتَل أَحْمَر *
Russula foetens (S).

Russule fétide (F).

نوع من الرَوْتَل الكاعن الصنف. يوجد في الغابات. ساقه خفيفة، معتدلة الارتفاع. اُرسوت شبه قلنسوية الشكل، مغطاة الحافة، لزجة الملمس، كرحبة الرائحة، لونها الى السرة الصفراء المواج، قطرها نحو ١٥ سم.

١٢٠٩٦ - رَوْتَل اصْفَر قَاتِع *
Russula claroflava (S).

Russule jaune clair (F).

نوع من الرَوْتَل الكاعن الصنف. يكثر في المواتع الرطبة قرب ضفاف مجاري الماء. اُرسوت لزجة الملمس، صفراء اللون، قطرها نحو ٨ سم. ساقه يبيض. طعمه بلحاك البندق.

١٢٠٩٧ - رَوْتَل المتابع *
Russula paludosa (S).

Russule des marais (F).

نوع من الرَوْتَل الكاعن الصنف. يكثر في المناطق. اُرسوت لزجة، فارشة، قطرها نحو ١٣ سم. لونها الى الغيرة البنفسجية المواج.

١٢٠٩٨ - رَوْتَل زَاهِد *
Russula conobrina (S).

Russule sobre (F).

نوع من الرَوْتَل الكاعن الصنف. يوجد في حراج الصنوبر. اُرسوت لزجة، فارشة، قطرها نحو ٨ سم. لونها الى الرمادي الاسمر. رائحتها كرحبة. مذاقها حامز.

١٢٠٩٩ - رَوْتَل سَمَنْجُونِي *
Russula azurea (S).

Russule azurée (F).

نوع من الرَوْتَل الكاعن الصنف. يوجد في الغابات. اُرسوت مقعرة الوسط، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الزرقاء السمجونية. اطرافها يبيض اللون. ساقه الى الطحلة البحرية.

١٢١٠٠ - رَوْتَل شَدِيد السَمَرَة *
Russula nigricans (S).

Russule noirissante (F).

نوع من الرَوْتَل المأكول. يكثر ويوجد في المناطق الحرجية الظليلة. اُرسوت كبيرة فارشة، قطرها نحو ١٢ سم. لونها الى السرة اللاتمة. ساقه قصيرة.



رَوْتَل أَحْمَرِ اصْفَر



رَوْتَل شَدِيد السَمَرَة



رَوْتَل مَأْكُول



رَوْتَل مَذْهَب



رَوْتَل مَقِيَّتِي



رَوَحَاء

١٢١١٨ - رُوزَالِيَّةِيَّةُ الشُّفَّاحِ* ، سَخِ الشُّفَّاحِ*
Rosellinia lardipoda (S). Pourridié du pommier (F).
 فطر مجهرى يصيب جلور التفاح فيؤذيها. مظهره الخارجي
 عفن أبيض ثم اسفر ركب جلور التفاح فيصطب جرادتها
 ويصيب أخلافاً || اما اوراق التفاح للمسابة قدت
 منكشفة التصل ، قامة اللون ، قليلة الحيوية || يكالغ
 باستعمال التعطيش والتطهير .



رودن

١٢١١٩ - رُوزَالِيَّةِيَّةُ الثُّوتِ* ، سَخِ الثُّوتِ*
Rosellinia aquila, R. lysinidea, Sphaeria aquila,
 Trichosporium fuscum, Sporotrichum fuscum (S).
 Pourridié du mûrier (F).



رُوزَالِيَّةِيَّةُ الْبِنِ



رُوزَالِيَّةِيَّةُ الشُّفَّاحِ



رُوزَالِيَّةِيَّةُ الثُّوتِ



رُوزَالِيَّةِيَّةُ السَّنْدِيَانِ



رُوزَالِيَّةِيَّةُ الْكَكَوِ



رُوزَالِيَّةِيَّةُ الْكَرْمَةِ



رُوزِيَّةُ مُجَمَّع

رُوزِيَّةُ مُجَمَّع

من الریش . رأسها صغير مبسط ، مقارها مفلطح . تألف
 البراري الشاسعة الأطراف والحضاب القليلة الانجار .
 قنبا الاشباب والخضرات . تعيش جهامات قليلة العدد ،
 تتألف من ٦ أو ٧ اثاث يقودها ذكر واحد || الاث
 تعيش نحو ٢٠ يضة . انصومها صاحي الشكل تنلفه
 بالحشيش الناعم . الاكر وحده يحسن البيض من الغروب
 الى الشروق .

Spiritualisme (S).

Spiritualism (E).

الروسانية مذهب الغائلين بان النفس غير حيوية .

١٢١١١ - رُوزُوعِيَّاتُ*
Melogrammatocées (F).

عارة فطور مجهرية من فصيلة الخشريات وروية الزيات
 تتميز ببيوتها سدادة تبدو غائبة في التنسج ثم بارزة .
 اصحابا سمية . رطبها يختلف التجميع || لها بكتان
 مؤذيان هما الالندوسية والرتقية .

١٢١١٢ - رُودَجَّةُ*
Rodage (F). Grinding (E).

الرودية القيام بملية الررج .

١٢١١٣ - رُودَكَةُ*
Ontogénese, Ontogenie (F).

Ontogenesis, Ontogeny (E).

الرودية علم نشو الافراد وتطويع .

١٢١١٤ - رُودَنُ*
Fusus (S).

Fusaeus, Fusus (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مليات الازيل
 وفصيلة البنتينات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ٦٠
 منتشرة في جميع بجان البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . اما
 انواعها المنقرضة ومدها نحو ٥٠٠ قطعها من متحجرات
 الحفنة الجيرية || اصداها شبه رشيعة الشكل ، بحيلة
 الاالوان والزخرفة ، حلزونة ، مستطيلة البقعة التي تبدو
 كالزئراب . اطوالها تراوح من ٥ الى ١٦ سم . || جميعها
 منقرضة وقد تلقت اصداها غيرها من الرخويات .

١٢١١٥ - رُودُنُ هو السنديان للزند ، اطلبه .

١٢١١٦ - رُوزَالِيَّةِيَّةُ* ، سَخِ
Rosellinia

جنس فطور مجهرية من السفانيات وفصيلة البشيات
 تتميز باصاها المنفصنة السود التي تنشأ في وسط فية
 الفطر . وبها وسيد الغلية امر اللون تحضت ككات مستطيلة
 تصطب التكات الدقيقة . معها يرتكز في اهل التعلول
 الحفرسي الشكل . اشهر انواعه ستة تلي .

١٢١١٧ - رُوزَالِيَّةِيَّةُ الْبِنِ* ، سَخِ الْبِنِ*
Rosellinia bunodes (S). Pourridié du caïster (F).

فطر مجهرى يعيش ويتكاثر في البلاد الحارة . يصيب
 البن والشاي والكاكور والحشويات || مظهره الخارجي
 ككتل من اللون الاسود المهدب بالاحمر . وهو ركب الجالرج
 المنصورة في آثاب فيصطب اللحاء والفكر وقد يدخل
 حتى القلب فيضيبه بلون زيتي يحل الى السرة . اما في
 الجلود فانه مبسط الجراة ويقضي عليها || يكالغ
 باستعمال الانجار الزبوية وبطهور التربة بالكلس
 الحراق وسلفات الحديد .

١٢١٢٣ - رُوزِيَّةُ مُجَمَّعُ*
Rozites caperea (S). *Rozites ridé* (F).

فطر مأكل من فصيلة الفاروقيات . يوجد في غابات

الادراك التام تطول من ١٨ الى ٢٢ سم. فوجا الى البياض الاخير تملو ماية طحله. رأسها الى اليرقة السوداء. فكاها ذريان غليمان. وواجبا قصيرة سمراء اللون. شربها ثنائي السرك.

١٢١٣٠ - رُوشَن * .

Aile d'insecte (F).

Wing of insect (E).

هو جناح الحشرة وقد استند بالتخصص الى حشرات رتبة حشرات الانجسة. اشكاله عديدة تختلف باختلاف الفصائل والانجناس والانواع.

١٢١٣١ - رُوشَن غِيصِي * .

Elytre (F).

Elytron, Wing-shard (E).

هو الظهران العلوي للنمدي الذي يلفف الجناح في بعض الحشرات.

١٢١٣٢ - رُوشَنَة ، هَكَن

Parasitisme (F).

Parasitism (E).

حالة الكائن الحي الذي يعيش ظاهريا على غيره من الكائنات الحية.

١٢١٣٣ - رُوشَنَة

Parc (F). Park (E).

حديقة واسعة فيها الشب والماء. فاذا كانت في اعالي البراق والغلاف فهي سلق وان كانت في الرطالات فهي روضة وروبية. ج. روض.

١٢١٣٤ - رُوشَب *

Ancillaria (S).

Ancillaire (F).

الواحدة وروبية. جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل ولصيلة الطحريات. انواعه المعروفة قليلة الملمد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تعيش على رمال الشطوط العميقة || اصداؤها مائية ، تعيش على اعليجية ، ذلقة الاعتقاب الملهنة ، فصاحتها قليلة التميز الطولي النحيل الخطوط. الوانها زاهية ، احاطها انبوية دقيقة مستطيلة .

١٢١٣٥ - رُوشِي

Corne (F). Horn (E).

الروق : القرن . « كاثور يحمي أنفه برقه » . والاروق ذو الروق اي القرن .

١٢١٣٦ - رُوشَش * ، عَصْفُور مَاسِي *

Pardalotes punctatus (S).

Pardalote punctué, Oiseau-diamant (F).

طائر من الجوارثم منيات المنافير ينتمي الى فصيلة الصرديات. موطنه بعض مناطق استرالية. يألف الغابات وأحراج الأوكاليبتوس. ملجئه الحياتي جماعي. جماعته متوسطة العدد. قوة الحشرات والبيزور || جسمه صغير القد ، مكدم الشكل ، يطول نحو ٩ سم. قصير المنقاد والجناح والذنب. ثوبه الملوي الى الخضار الالامس تملو رشفة يعضا فضية اللون تتلاخ كانها قطع من المنس. حاجباه وزوره ومصدرة ويهله الى البياض الناصي. متقاد شديد السمرة. وصفاه واصابعه الى السمرة المحطية || يذئن اقصوصه في الجانف الشديد الانحدار. اقصوصه نفق يطول نحو ٦٠ سم. ينتهي بمجرة قطرها نحو ١٥ سم. يبطها بالياث الاوكاليبتوس وبعض اشغاث الناعمة. الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات. التفرغ يستمر نحو اسبوعين .

الصنوبر ، يعيش على المواد النباتية المنحلة . ساقه مستدلة الشخانة والارتفاع ، خيرا اللون يملوها موج تبي ، طوقها مجدة القزول . نكتة صيرانية الشكل ، صفراء اللون ، ذبعية الملاج ، مجدة الحافة ، قطرها نحو ١٥ سم. اغراسها الى الصفار الباهت || لحية جيدة الصنف ، مأكولة .

Cachet (F). Seal (E).

١٢١٣٤ - رُوشَم

Rochea (S).

Rochéa (F). Rochea (E).

جنس نباتات بحلية معمة من فصيلة الخلدات. معقودة التفرع على اسم اليوناني « لاروش » || انواعها المعروفة خمسة مهدا افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعتها التريينية في معظم البلاد المعتدلة الحرارة || سوقها منتصب تنتمي بقسة من الازهار المستطيلة الخماسية البتلات . اوراقها متفابلة لحية النصال الخمرية الشكل . ثمارها جرابية ، خالية الفلق ، عديدة البزور || اشهر انواعها التريينية القريزية والباسيمية .

١٢١٣٥ - رُوشَن قَرْمِيزِي *

Rochea coccinea (S). Rochéa écarlate (F).

نوع من الروشة التريينية الشائعة الزراعة . يملها تملو من ٥٥ الى ١٠٠ سم. فستبا الزهرية كبيرة القد ، متكوية التجميع . ازهارها قرمزية اللون ، فواحة المرف الطري المنتصب || تنويرها يستمر من اواسط حزيران الى اواخر تموز .

١٢١٣٦ - رُوشَن ياسَمِينِي *

Rochea

jasminea (S). Rochéa à fleurs de jasmin (F).

نوع من الروشة التريينية الملهولة عند معظم الزرايين . يملها تملو من ٣٥ الى ٦٠ سم. فستبا الزهرية متكوية التجميع ، متوسطة الحجم . ازهارها الى الصفار الاخضر الملوحي ، شكلها كقرب الشبه بالياسمين . عرفها طري مستحب || تنويرها يستمر من اواسط نيسان الى اواخر ايار .

Levee des semis (F).

Sprouted sowing (E).

١٢١٣٨ - رُوشَم

اول ما يظهر من الزرع .

١٢١٣٩ - رُوشَك أَزْهَب *

Cylindronotus lanipes (S). Cylindronote

lanéux (F). Cylindronotus lanipes (E).

حشرة خاضعة دامت من فصيلة النيشيات ورتبة مفدمات الانجسة . تألف المراقم المشجرة . خنافسها تعيش على اوراق النبات وعلى المواد النباتية المنحلة . يرقاتها غاشية تعيش تحت لحاء الاجار اليابسة || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٥ سم. فوجا الى الخضار الالامس الاسفع الملاج . رأسها مستد الجرم . صغبرتان بارزتان . زباناها مستطيلان حديقان . ظهرها ذلق الطرف ، بالغ التحزير النمدي . اصنافها خاضعة القفل في التريين الامامي والوسطي ، ورباعيتها في الزوج الخلفي . وهي مهدبة ، مستطيلة الملب في الزوج الامامي ما دما الى تسبها بالروشك الازغب || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الملهنة في اوائل ايار وتعيش حتى اواسط الصيف . تسرح في التباير . تساقط في حزيران وتفرق المسكن تحت لحاء الاجار وقشورها || البرقة عند بلوغها



روشة قرمزية



روشك أزغب



روشن



روشن نمدي



روشب



روش

١٢١٦١ - رَيْبَس

هو الرأوند الرياسي نبات طبي مشهور ، اطلبه .

١٢١٦٢ - رَيْبَقَة * ، شَجَر الصَّابُون (S). Sapindus

Savonnier, Arbre à savon, Riba (F). Soap-nut tree, Soap-berry tree (E). Seifenbaum, Seifenbeere (D). Saponaria, Sapotiglia, Noce saponaria (I).

جنس شجر من فصيلة الصابونيات ، أنواعه المعروفة ١١ منها البلاد الحارة . أوراقها متعاقبة ، مركبة ، عابلة . أزهارها عتقودي ، أزهارها رباعية أو خماسية البتلات ، ثمانية الأضلاع . ثمارها غنية ثلاثية التخصيص مأكولة في بعض الأنواع || أوراقها وأوراقها وثمارها غنية بمادة الصابونين (Saponine) التي ترغو في الماء وتنظف كالصابون .

Vent (F). Wind (E).

١٢١٦٣ - رَيْبَح

الريح نسب الهواء . ج رباح وأرياح . وقد أطلق عليها أسماء مختلفة تعود إلى مصدر مهمها . ذلك فالرياح أربع منها الجنوب وهي الثقيلة . والشمال وهي الخفيفة والحلواء . والساوية وهي الثقيلة . والدهور وهي الغربية . وبين الرياح الأربع أربع أخرى وهي الأربعة بين السبا والجنوب والساوية بين الجنوب والدهور ، والجرياء بين الدهور والشمال والحليف بين الشمال والساوية . وأزادوا تاسعة يقال لها الكدياء وهي التي تدور بالمكان فلا يمتنع لها مهب . اطلب حشفق الرياح || وتنقسم الرياح بالنسبة إلى سرعتها وضغطها وتأثيرها إلى تسع كما هو موضع في الجدول المقابل .

١٢١٦٤ - رَيْبَحَان هو الأس المسكي ، اطلبه .

١٢١٦٥ - رَيْبَحَان أَبْيَض هو ذئب الشيخ ، راجحه .

١٢١٦٦ - رَيْبَحَان الْأَرْض

هو الفيصوم وهو بقلة الدزال أيضاً ، اطلبها .

١٢١٦٧ - رَيْبَحَان الْكَافُور * (S). Camphorosma

Camphorosme, Camphrée (F). Stinking ground-pine (E). Kamferkraut (D). Canforata (I).

نبات عشبي بري طبي من فصيلة السريقيات مهددة الشرق الأوسط وأروية الجنوبية . خواصه وبنائه الطبية عديدة . رائحته تشبه الكافور . يستخرج منه مادة زيتية فعالة مقوية تشبه الباه وقد تستعمل كمادة وسطية ومدرية البول .

١٢١٦٨ - رَيْبَحَان بَرِّي * ، رَيْبَحَان قَرْشَلِي ، قَرْشَلِيَّاتُكَ ، أصابع القنبان

Calamintha acinos (S). Calament acinos, Acinos, Basilic sauvage (F). Acinos, Basil thyme, Wild basil (E). Feldwürrze, Wilde basilic (D). Timo campestre, T. salvatica (I).

نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الشفويات . ينمو من ٢٠ إلى ٣٥ سم . ساقه قصيرة فراء . فروعه خشوشة متعاقبة . أوراقها متعاقبة منعقة بيضية الشكل . نصلها أزرق البشرة في صفتها . أزهارها بيضاء يملأها موالج وردية . أوراقها وأزهارها عطرية العرف المسحب || ينبت في تركيب بعض العقاقير الصحية وهو مفاد للتشنج .

١٢١٦٩ - رَيْبَحَان دَاوُود هو المردقوش ، اطلبه .

١٢١٧٠ - رَيْبَحَان سَلْبِيَّان هو حب الريبان ، راجحه

١٢١٧١ - رَيْبَحَانِيَّات * (F). Phragmosporées

Phragmosporae (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الطليحات ، تتميز ببوغاتها

١٢١٥٢ - رَيْبَسَات ، مَقْدَمَات Primates

رتبة من الثدييات تشمل ثلاث مراتب : البشرىات والقرديات والليموريات .

١٢١٥٣ - رَيْبِي Irrigation

الري من الجبهة العلوية هو السياسة المالية التي تهدف إلى الانتفاع من المياه على أكل وبه يمكن . وهو من لائحة السلية وضع ودرس الأصول والوسائل اللازمة لتسقية الارض وأحياء بورها .

اسم الريح يقابلها بالفرنسي	تأثيرها	سرعتها في الثانية بالانوار على المتر للريح	ضغطها بالكيلو
نسب ، ريدة Vent très faible	تيز الورق	٢	٠,٥٠٠
رياحا Vent frais	تنش الصاليج	٤	١,٩٦٠
زفافة Vent vif	تنش الفروع	٦	٤,٤٠٠
ساعة Vent fort	تحرك الشجر	٨	٧,٨٤٠
موجم Très fort	تنسف الورق	١٣	٢٠,٧٠٠
عاصفة Tempête	تهدم بعض الاصقان والبروق	٢١	٥٤,٠٠٠
زعرع Forte tempête	تكسر أو تنقل الشجر	٢٨	١٠٣,٠٠٠
زبعة Ouragan	تهدم بعض الابنية	٣٤	١٤١,٠٠٠
إعصار Cyclone	تغرب كل شيء	٤٠	١٩٦,٠٠٠

١٢١٥٤ - رَيْبَح Ecluse (F). Lock, Sluice (E).

حوض يحكم البناء يمتدح بحري المياه اللاسوسية السطح ، له قداسان مدققي وسيجي . رفع القداس المدققي يسمح بدخول المركب إلى الحوض ورفع المسيجي يسمح بخروجه من الحوض .

١٢١٥٥ - رَيْبَحِين Plantes aromatiques (F).

Aromatic plants (E).

النباتات العطرية الفواحة العرف . الواحدة ريحانة .

١٢١٥٦ - رَيْبَحِيَّات Mathématiques (F).

Mathematics (E).

اصلاح يطلق على مجموعة من العلوم الحاسبة والمهندسية تشمل فقه الرياضة البحتة التي تنس بالحساب والجبر والهندسة وحساب التكامل والتفاضل ... وثقة الرياضة التليلية التي تنس بالآليات وعلوم الفلك والبسميات الخ ...

١٢١٥٧ - رَيْبَاح Abondance de récoltes (F).

Abundance of harvest (E).

هو غصب للحاصل الزراعية .

١٢١٥٨ - رَيْبَال Salive des insectes (F).

Saliva of insects (E).

الريال والريلة هو لعاب الحشرات .

١٢١٥٩ - رَيْبَانَة Euchlaena mexicana (S).

Reana, Téosinte (F). Teosinte (E). Teosintegras (D). Teosinte (I).

نبات عشبي كلابي من فصيلة النجيليات مهدد المكسيك وقد تمت زراعته جميع مرابي البلاد المتلفة الخرازة .

١٢١٦٠ - رَيْبَب Protobe (F). Protobe (E).

الريب اسم يطلق على كل كائن حي متناهي الصغر والبقعة لا يشاهد تحت عسة المظهر المادي .





رديريوس

٣. م. رؤوسها شبه مكورة. عيونها صغيرة، بارزة. تكسرها ضليقة. ملابسها الفكية كبيرة. قرونها الاستشرابية صولجانية الشكل. كولاسها مكورة. اغلامها قصيرة. تلحف نصف البطن. قوتها نفيطة. انثاها وصيدة اليرق الجوي، أو الكسني أو الاسود || جميعها مقترنة أو دامتة. تسرح في الليل.

١٢١٨١ - ريشي Penné (F). Pinnate (E).

نعت تعريفي يطلق على الاعضاء الحيوانية والنباتية الشبيهة بالريش.

١٢١٨٢ - ريشيات الأحشاك، صكيجيات

Mysticetes (F).

الأحشاك

مرقية حيوانات بحرية ولوده ثوب من ربة الحويات || تشمل الحيتان المأدة الانسان، الريشة الصانع الحكية || انواعها المعروفة لا تتجاوز العشرين جميعها ثلاث فصائل: الباليات والغاليات والمركوليات.



رسة ثلاثة الاصابع

١٢١٨٣ - ريش Rendement, Revenu (F).

Produce, Revenu (E).

الريع هو ما تله عينا أو نقدا ساسة معلومة من الارض.

١٢١٨٤ - ريش هو برج الحام، ج رياج وأرباع.



ريشاج

١٢١٨٥ - ريش Rhyphus (S).

Rhyphus (F). Rhyphus (E).

جنس حشرات من ذوات الجناحين غليطيات القرون ونصيلة القمصيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار الشرق الاوسط واروپة. تألف اليراري والحدائق والمنازل || اجسامها صغيرة اسطوانية الشكل. رؤوسها مكورة. عيونها بارزة. قرونها والاستشرابية غليطة. مرقية التركيب. قوائمها مستطيلة. دراشتها مستطيلة شفافة. انثاها تختلف مع الانواع تكثر فيها السرة والشبهة والكهبة.

Rural, Agreste (F).

Rural, Rustic (E).

نعت وصفي يطلق على معظم الاشياء المختصة بالريف، كفواك الاعمال والصناعات والمكان الريفي.

١٢١٨٧ - ريشة Rivina (S). Rivina, Rivinie (F).

Rought plant, Carpenter's herb, Blood-berry (E).

Rivinie (D). Rivina, Erba da legnaioli (I).

جنس شجيرات ونشبات برية وريسية من فصيلة الكليات. انواعها ثمانية. اوراقها مستطيلة متعاقبة. نصلها مائل للبرشة، متراوح الصفحة، حايق الخضار. ازهارها متعدي التجميع، ابيض الزرني. ازهارها صغيرة لينة وخامسة البتلات البيضاء. ثمارها ثنوية، وصيدة السبعة، قمرية اللون.

١٢١٨٨ - ريكونا Ricotia (S). Ricotia (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اصلاها بعض المناطق اعراض متعاقبة، ثنائية أو ثلاثية التجميع الريفي. ازهارها صغيرة، مفرشة البتلات، وودية اللون أو بيضاء دنتة. اشهر انواعها:

R. lunaria (S)

ويكونيا قمرية

R. linata (S)

ويكونيا عوجاء



ريشية

الزورقة الصديدة الحلايا. اجناسها المشهورة: المنسة، الزغبارة، الزحاح، الزنة، الزنينة، السرتوة، المنجة، الشيفة، الصرباب، الفرير، الناسورة.

Vent très faible (F).

Very weak wind (E).

هو التسم يتبر به اوراق النبات بجفة.

١٢١٧٣ - ريزورلوك هو الجبل الصيني، اعطيه.

١٢١٧٤ - ريزوروكس Rhizoctonia (S). Rhizoctone (F).

جنس فطور مجهرية من الفنجيات. ونياته ثولولية جميعها متجج كيف يتكاثر على الاعضاء النباتية الديماسية. فيه قليل التشعب عديد الفواصل والفواصل الاسطوانية. انزاهه قليلة العدد والادخ.

١٢١٧٥ - ريزورم هو الجنفور، اعطيه.

١٢١٧٦ - ريزوميس Rhizomys (S).

Rhizomys, Rat des bambous (F).

جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الخلدات. انواعها ستة اجسامها اسطوانية. طولا يراوح من ١٨ الى ٥٠ سم. اذنيها دقيقة متصلة القذ تطول من ٧ الى ١٢ سم. رؤوسها غليظة شبه مستديرة. عيونها خريزية الشكل. اذناها جعدة ملساء المقرفة. انثاها تراوح من الامهات المالكسني الجزري. انثاها تضع في الصيف من جريون الى اربعة. قوتها الجنفور والحروب والحماء تسرح في الليل لالتقاطها. تألف الاتفاق التي تخملا في التربة على اعماق مختلفة تراوح بين ٢٠ و ٥٠ سم.

١٢١٧٧ - ريشة ثلاثية الاصابع Rissa tridactyla (S). Rissa tridactyla (F).

طائر من كثيات القدم ونصيلة الثروسيات. يعتبر من القواطع لأنه يبغي فصل الشتاء والبرد على شطوط البحر الابيض المتوسط ويغني فصل الصيف في المناطق القطبية. جسمه معتدل القذ يطول نحو ٣٧ سم. جناحاه كبيران، وذئنان ولسانان. ذنبه معتدل الحجم. معطوم الطرف. قدسه ثلاثية الاصابع. سظانه لا يكتشف كامل الاصابع. ثوبه متراكب البياض والشبهة الزرقاء الملوحة. جناحاه موشحان بالابيض والاسود.

١٢١٧٨ - ريش Plumes (F). Feathers (E).

انابيب ظفرية للمادة يملؤها الزغب واللبب والشعاع تثبت في معظم مناطق جلد الطائر. فانثاها انها موصلة ودينة الحرارة قوتي الطائر شر التفتيات الجوية وانها تخفف للثقل النعني تقسده على الانتقال في الجو. للوحدة وديشة والجمع ريش ورياش وارياش.

١٢١٧٩ - ريشين Sinécure (F). Sinécure (E).

مركز اجتماعي أو لقب يدر على صاحبه مالال البرير ولا يوجبه المبادلة بأي عمل أو وظيفة.

١٢١٨٠ - ريشين Reichenbachia (S).

Reichenbachie (F).

جنس حشرات من فصيلة البليسانيات ودية عذيات الاجنحة. انواعها المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم مرج البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى

١٢١٩٢ - رِيْشُودَرْمَة • Rhinoderma (S).

Rhinoderma (F). Rhinoderma (E).

جنس ضفادع من فصيلة الرنانيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد مهددا أمريكة الاستوائية والوسطى || أجسامها صغيرة القذ ، طول من ٤ الى ٥ سم . عند الذكور ، ومن ٥ الى ٧ سم . عند الاناث . رؤوسها محرمة تنتهي بقذ حمية في مقدم الخطم . فكوكها السفلى عادية الانسان . اصابع قوائمها الخلفية مقيدة بمخاطب ضعيف لا يتجاوز الزام الاول . جلودها ماعة مبعثرة الثوبل . اثوابها الى الحفار الاسمر يملو موج اصفر ورقشة جوية لاقياية الشكل ولقده || ذكورها مجهزة بجيوب فية تحلل مركز البيلة الصوتية وتحت حتى مستوى البطن ، تؤدي مهمة التقيق وضمن الدليل الذي لا يتجاوز عدده ١٥ دحيلة يأخذها الذكر بطرف لسانه عند التسررة ويدخلها في الجيب فتبقى الى ما بعد التفق حتى يتم التطوير البطني ، تفسرج الصفار من افواه ابائها كاملة المدة تسرح حيث تشاء || تعيش من ١٥ الى ١٢ سنة . تسرح في الليل وتبيت في النهار . قوتها الحشرات والديدان .

١٢١٩٣ - رِيْه •

هي الروحاء ، طائر من النعاميات ، اطلقها .

١٢١٩٤ - رِيْهَقَان • هو الزعفران المزروع ، اطلقه .

Gazelle blanche (F).

White gazelle (E).

راجع ريم . ج آرام . قال الاصمعي : الأرام الظباء الأبيض الخالصة الأبيض وهي تسكن الريل . وهذا النوع من الظباء يقال انه ضالها لانه أكثر شمها وحما || اما البيري فيقول : الرم ولد الظبي والجميع آرام ويستشهد بقول الشاعر بها البير والأرام يحين خلفه واطلاؤها يهمن من كل جهن والريم ايضا هو الجبل الصغير .

١٢١٩٥ - رِيْنِكْسُورِيُوم • Rhynchosporium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . مشيجه أدمي الانتشار . وليته سطحية فارشة ، ككائنه صنية مركبة ، لا قياية الشكل والحجم || انواعه قليلة ، اعرفها رينكسوريوم الشيلم .

١٢١٩٦ - رِيْنِكْسُورِيُوم الشِيلَم •

Rhynchosporium secalis


فطر مجهري يصيب عصف بعض النجيليات اغصها الشيلم || مظهره الخارجي يقع مستطيلة ميمرة او كتيقة التجميع ، تبدو صنية ثم تنتشر فيبلغ طولها نحو ٢٥ م . تركب نصال واعناد العصف ، لوها آل الزرة يملوها موج اغبر ثم ينحرف الى الاغبر الرصاصي وينتهي بالنتي تحقه هالات واطارات شاحبة وفحمة || يصيب يباس العصف وضف الاسبال وتحمل الحب .



رينكسوريوم الشيلم (١)



رينكسوريوم الشيلم (٢)



١٢١٩٥ - زاج

Affermer (F). To farm (E).

زارع فلان : عامله على الارض بمحض انتاجها . اطلب مزارعة .

Sulfate, Vitriol (F).

Sulphate, Vitriol (E).

اسم شامل يستعمل للدلالة على بعض الاملاح اخصها سلفات الحديد والنحاس والرصاص الخ ...

Agriculteur (F). زرايع ، مزارع .

Agriculturist (E).

« هو الذي يستغل ارضه مستخدماً عمالا او فلاحين » تحفيد الامير مصطفى الشهابي .

Vitriol blanc (F).

White vitriol (E).

هو سلفات الزنك من الاملاح المزدوجة التابعة الى سلسلة الاملاح المنفردة .

١٢١٩٦ - زاج ابيض

Corvus coronae (S).

Corneille, Corbeau-corneille (F), Carrion crow (E), Rabenkrähe (D).

طائر من الغربان متوسط الجثة طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه الى السواد الاسفع البنفسجي الملاج . موطنه الشرق الاوسط واروبه وافريقية الشمالية . يصير من الطيور الضارة لانه كثير الاذى . فوته الديدان والحشرات والجرب واليدار البتاني والبار الخ . || ينش في الانهار الرقيقة . الاثنى تحضن وحدها من ٤ الى ٦ بيضات لزنها الى الزرقاء المحمرة يملونها توشم اسمر .

Vitriol vert (F).

Green vitriol (E).

هو سلفات الحديد من الاملاح المزدوجة التابعة لسلسلة الاملاح المنفردة او سلسلة الاملاح البشبية .

Vitriol bleu (F).

Blue vitriol (E).

هو سلفات النحاس من الاملاح المزدوجة التابعة لسلسلة الاملاح المنفردة .

١٢١٩٨ - زاج ازرق

Autrucherie (F).

Ostrich-farm (E).

المكان المخصص لتربية الترح أي النعام .

١٢١٩٩ - زاجوجية

١٢٢٠٧ - زائف

يقال زائف عليها فزانت له اي مكته من مفادها وهذا في الطيور الجوارح (الجانح) || وزائف الدبك : نشر جناحيه وذنبه وبجها على الارض .

Procombant (F), Procumbent (E).

نعت تمرني يطلق على النبات الذي يزحف على الارض .

Jonchère (F), Sprinkling (E).

الاجعة ذات الماء والخلفاء والقصب .

Gésier (F), Gizzard (E).

هي الحوصلة وقد صار تخصيها بغير الماء والمائع .

Hippobosque (F), Hippobosca (E).

هي الشفراء ذباب يقع على الابل والدواب والكلاب .

١٢٢٠٨ - زايي

هو ذكر الصدى ومنهم من قال الدبك : ج زواي . قال ثوبه بن الحبير صاحب ليل الاغلبية :

« ولو ان ليل الاغلبية سلت

على ودوني صندك وصفناك

لسمت تسليم البشاشة او زفا

الها صدى من جانب القبر صائح



زاغ

١٢٢٠٩ - زائفة - هي الطوم ، اطلبه .

١٢٢١٠ - زام : التراب من كل شيء .
Quart (F). Quarter (E).١٢٢١١ - زان ياباني (S). *Fagus japonica*
Hêtre japonais (F). Japanese beech (E).نوع من الزان يملو من ١٥ الى ٢٠ م. اوراقه تقطو
من ٨ الى ١٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٨ سم. نصلها
محدد الصفحة ، مسن الحافة ، كثير المروق التي
يرارب عدد ازواجها من ١١ الى ١٤ || اغلفة زائنه
في المواقع الجبلية الربطة .١٢٢١٨ - زائفة *
Faine, Fêne (F).
Beechnut, Beechnast (E). ثمرة الزان ج زائنه .١٢٢١٩ - زانفيل ، زانفيل (F). *Xanthophylle*
Xanthophyll, Xanthophyll (E). شجاع اصفر يرسد في اوراق التبان .١٢٢٢٠ - زاوية
Angle هي الانفرج الحاصل من تلاقي خطين مستقيمين يرفان
بفسلي الزاوية . اما نقطة التلاقي فتدعى رأس الزاوية .
وتقسم الزوايا الى ثلاثة انواع . كل زاوية قائمة يبلغ
مقدارها ٩٠° تدعى حادة وكل زاوية اصغر من
الجالسة تدعى حادة وكل زاوية اكبر من الجالسة تدعى
منفرجة .

١٢٢٢١ - زاوية الاحتكاك

Angle de frottement, A. de friction (F). Rubbing
angle, Friction angle (E).١٢٢٢٢ - زاوية الإنشباب (F). *Angle d'insersion*
Insertion angle (E).١٢٢٢٣ - زاوية الإنحراف (F). *Angle d'inclinaison*
Inclination or slope or dip angle (E).١٢٢٢٤ - زاوية الانخفاض
Angle de dépression (F). Depression angle (E).١٢٢٢٥ - زاوية الإنكسار ، زاوية السقوط
Angle d'incidence (F). Incidence angle (E).١٢٢٢٦ - زاوية القذف (F). *Angle de projection*
Projection angle (E).١٢٢٢٧ - زاوية جالسة ، زاوية قائمة
Angle droit (F). Right angle (E).١٢٢٢٨ - زاوية حادة
Angle aigu (F).
Acute angle (E).١٢٢٢٩ - زاوية حرجة
Angle limite (F).
Limit angle (E).١٢٢٣٠ - زاوية زوجية
Angle dièdre (F).
Dihedral angle (E).١٢٢٣١ - زاوية قلبية
Angle apsisal (F).
Apsidal angle (E).١٢٢١١ - زاميس *
Schizophyllum commune فطر من الفاريفوريات يركب اغصان وجلوع بعض النباتات
الحرجية والمثيرة منها التكرز والمشيوش والخرفه وقد شوهد
على سوق الثوت وعلى ثمار التطلع الناضجة الساقطة .
يركب القشور الخشبية او المغطوة من لفحة الشمس
فيتركز عليها ويرتد بمشجبه حتى التكثير فيفسد الجبال
النسي يمد ان يفتحي حل الاوية || مظهره الخارجي
ما يميز في هذا الرسم ، وهو كثيف التجميع ، تحيل
النكهة الدقيقة السريعة الطيب || يكلف باستصاكه
ويظهر الجرح وظلي بالمستطك .١٢٢١٢ - زامور
Naucrotus ductor (S).
Naucrote (F). Pilot fish (E). سمكة بحرية من الشيميات طوطا نحو ٦٠ سم. ثوبا
الى الزرقه الغصراء يملوا موج فضي وسطه خطوط سود
قابلة مستعرضة .١٢٢١٣ - زامية *
Zamia (S).
Zamia, Zamier (F). Jamaica sago tree (E).
Zapfenpalmaria (D). Zamia (I). جنس نباتات غطية الجذع والاوراق من فصيلة السيكاسيات
يوجد بالبلاد الاسرائيلية || انواعها المعروفة
٣٠ . جلدها غليظة وقصيرة . صلها كثيف التجميع ،
مستطيل الجريد ، محين الزمان الاخير || بعضها زبني
وبعضها زراعي يستخرج من ثماره مادة نشوية مأكولة
تدعى بالسافر (Sagou) .١٢٢١٤ - زان (F). *Fagus* (S). *Hêtre* (F). *Beech tree* (E).
Bucha, *Buchbaum* (D). *Faggio* (I). جنس اشجار وشجيرات برية حرجية من فصيلة الفقيديات
انواعه نحو ١٥ صنفا مستصبة جالسة . اوراقه معتقة
معتاقية . نصلها يفتي الشكل ، مذهب المقصعة ، يارب
المروق ، محد الصفحة ، مسن الحافة . ازهاره الذكورية
دولية التجميع . ثماره زور حرجية الشكل حادة الزوايا
تدعى زانة . اغصانها صلبة قوية مرنة صناعية شائعة
الاستعمال . ماء اشجارها دابة || بزوره غليظة . اغلفة
بزوره تحوي بعض المواد الجعالية الضارة كؤذي الحيل
والحبر وتسن الفم والمخاض والختارير .١٢٢١٥ - زان امريكي
Fagus ferruginea (S).
Hêtre américain (F). American beech (E). نوع من الزان يملو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقه تقطو
من ٦ الى ١٥ سم. وتعرض من ٣ الى ٩ سم. نصلها
محدد الصفحة ، منشاري الحافة ، كثير المروق التي
يرارب عدد ازواجها من ١١ الى ١٧ || وهو من الاشجار
السريعة النمو النسي . يرب في المواقع المختلة الرطاب .١٢٢١٦ - زان معزوف ، زان شائع
Fagus sylvatica (S). Hêtre commun, Fau, Fauce,
Fayard, Foyard, Fouteau (F). European beech, Com-
mon beech (E). Echte buche, Buche boom, Rot-
buche (D). Faggio comune (I). اشهر انواع الزان واعما انتشارا . فروبه عديدة منها
الابشواني والكثير الورق والمناج والمشي والمستداني
الحرجي ... جميعها من الاشجار الكبيرة الحجم تملو

زام



زامية



زان معروف



زانة



زائفة الجلود



زائفة الذرة



زائفة حنظل



زائفة حدادة



زب البحر



زبابة شائعة



زبابة قزرة



زبابة مقدسة

١٢٢٤٨ - زَاوِيَةٌ هَدَامَةٌ *

Pseudomonas destructans (S).

طول البكتيرية نحو ٨ م.ي. تركب بعض النباتات أخصها
القت قنصب أسفرار الأوراق ويذوبها . يعقبها ارتقاء
الجلود ثم اسمرارها وكرامية وانها .

١٢٢٤٩ - زَاوِيَةٌ هُوَ السَّوَالِي ، اطلة .

Penis

١٢٢٥٠ - زَاوِيَةٌ ، عَوَفٌ ، قَنَصِيْبٌ

ذكر الحيوان .

١٢٢٥١ - زَاوِيَةُ الْأَرْضِ هُوَ الطَّرْتُوسُ ، اطلة .

Aktinos (S).

١٢٢٥٢ - زَاوِيَةُ الْبَحْرِ *

Actinia, Anémone de mer, Ortie de mer (F).
Actinia, Sea-anemone (E).

جنس حيوانات دنيا من البويضات السيات البحرية .
انواعه عديدة مختلفة الأشكال والأحجام يعلب فيها الساق
الانبرية والظرف الألف المذهب أثار . جميعها
لحية زائفة سريعة الانقياض والانتشار ، مغرية
للسم ، زائفة الاكلان اللامة من الوردى الى القرمزي
والاصفر والازرق البشجي . يربد منها في المياه
النباتية . تعيش حل السمور للسمرة بلالة . قوتها ما وصل
اليها من هرام وحشرات مائة . وهي آكلة يقال انها
مستحبة الطعم .

١٢٢٥٣ - زَاوِيَةُ الْكَوْمِ هُوَ الْفُلُوسُ ، اطلة .

Sorex, Crocidura (S).

١٢٢٥٤ - زَاوِيَةٌ

Musaraigna (F). Shrew (E). Woldspitzmaus (D).

جمع زباب . جنس حيوانات صغيرة الله من الزبابت
أحافار . أنواعها نحو ٤٠٠ صولها العالم . أجسامها
رقيقة مستطيلة خلية الور . وروها واسطعها لاذقة .
أذنانها مستديرة . قوائمها قصيرة . أطرافها حادة . أذنانها
دقيقة ، مستطيلة ، حلية الشعر || من ميزاتها انها تحمل
في عرسها يسمى قوائمها الخلفية غدد مسكية فواحة
الرائحة || اناتها تقف من ٤ الى ٦ اداس رفسها
من شهرين الى ٣ اشهر || اشهر انواعها ما يلي .

١٢٢٥٥ - زَاوِيَةٌ شَائِعَةٌ *

Sorex araneus, S. vulgaris (S). Musaraigne commune, Musette (F). Common shrew (E).

نوع من الزباب ثوبا الى الريادي الاشهر يقيم على
اقرابه من ثوب الظهور ويبيض عند البطن . طولها الكمال
من ١٢ الى ١٣ سم . علوها نحو ٣ سم . تألف الجبال
والسهول والاداية والحقول . قوتها الحشرات والديدان
والبراكن والحلزون وفأر الزرع .

١٢٢٥٦ - زَاوِيَةٌ قُزْرَةٌ *

Sorex pygmaeus, S. minutus (S). Musaraigne pygmée, M. naina (F). Pygmy shrew (E).

نوع من الزباب ثوبا الى السمرة الصبابة . طولها اثير
الون . طولها من ٨ الى ٩ سم . || تألف الارحاج
والنبات الكثيفة . قوتها الوبز والحشرات على اختلافها .

١٢٢٥٧ - زَاوِيَةٌ مُعَدَّسَةٌ *

Sorex religiosus, Crocidura religiosa, Suncus sacer (S). Musaraigne sacrée (F). Sacred shrew (E).

نوع من الزباب ، ثوبا الى السمرة البنية يقيم على
الظهور ويفر عن البطن . طولها يراوح من ١٥ الى

Equerre (F).

Square, Knee-piece (E).

الزائرة المثلثة وشك المساح واحد .

Angle plan (F).

Plane angle (E).

١٢٢٣٣ - زَاوِيَةٌ مُسْتَوِيَةٌ

١٢٢٣٤ - زَاوِيَةٌ مُنْحَنِيَّةٌ انْطِظَنٌ

Angle curviline (F). Curvilinear angle (E).

Angle obtus (F).

Obtuse angle (E).

١٢٢٣٥ - زَاوِيَةٌ مُنْقَرِجَةٌ

Radian

١٢٢٣٦ - زَاوِيَةٌ تُصَنَّفُ الْقَطْرُ

Angles alternes (F). Alternating angles (E).

Angles alternes (F).

Alternate angles (E).

١٢٢٣٨ - زَاوِيَتَانِ مُتَقَامَتَانِ

Angles complémentaires (F). Complementary angles (E).

Angles opposés (F). Opposite angles (E).

Opposite angles (E).

١٢٢٤٠ - زَاوِيَتَانِ مُتَقَابِلَتَانِ

Angles correspondants (F). Correspondent angles (E).

Angles adjacents (F). Adjacent angles (E).

Adjacent angles (E).

١٢٢٤٢ - زَاوِيَةٌ ، قَائِيَةٌ

Excédant (F).

Exceeding (E).

١٢٢٤٣ - زَاوِيَةٌ

Appendice (F). Appendix (E).

كل عضو زائد في الجسم الحيواني وانها .

Pseudomonas (S).

١٢٢٤٤ - زَاوِيَةٌ *

زائفة ج زائفة . جنس بكتريات من فصيلة القضيبيات .
انواعه عديدة تتميز بآركاتها الاسطوانية ، بغطايا المهدين
وباعداها المتحركة || انواعها للذوية قليلة تخص منها .

١٢٢٤٥ - زَاوِيَةُ الْجُدُرِ *

Pseudomonas radicolis (S).

طول البكتيرية نحو ٤ م.ي. اذانها غليظة سوية .
تركب جلود النباتات تنسجها . مظهرها الخارجي
درينات صنية سماء اللون ميمر على الجلود والوروش .
تكتلص بتطير البدار والرتبة .

١٢٢٤٦ - زَاوِيَةُ الدَّرَكَةِ *

Pseudomonas stewarti (S).

طول البكتيرية ٢ م.ي. اذانها خيطة . تصيب القدر في
زين ازهاره تركب الأوراق وتذبلها وتقضي على النبات .
تكتلص بتطير البدار والرتبة .

١٢٢٤٧ - زَاوِيَةُ حَسَكِيَّةٌ * ، عَصَبٌ أَسْوَدٌ

Pseudomonas campestris (S).

طول البكتيرية نحو ٥ م.ي. تصيب الفلوف ولقت
والخردل وغيرها من السليبيات . تركب . أصاب
الأوراق تنسج اسمرارها ثم اسودادها وتصبب الجلود
تفقس مكاكها ثم تمسها || يحسن اجتباب تخفيض
النبات لانه السبب الوحيد في انتفاله وبطشه . يكافح
بتطير التربة .

١٢٢٦٤ - **زَيَادَة سَوْدَاة ***
Arctitis (S).
Arctitide, Binturong (F). Arctitis, Binturong (E).
جنس حيوانات لبونة من الزبديات . موطنها الهند
اجسامها مستطيلة . قوائمها قصيرة . ورووسها مستقيمة .
أذنها بيضاء اللون الاسود . يراوح طول اجسامها من
٧٠ الى ٨٥ سم . وذنبها من ٩٥ الى ١٠٥ سم . || تألف
الاجراج الكثيفة . تتسلق الاشجار . تسرح في الليل .
قوتها الحيوان والطيور والسلم والحشرات والثمار .

١٢٢٦٥ - **زَيَادَة مَلَكَّة *** و **س**
Viverricula malaccensis (S). Civette de Malacca,
Petite civette de l'Inde, Rasse (F). Rasse civet cat (E).
نوع من الزيادة تملو نحو ٤٠ سم . طولها ٦٠ سم . وذنبها
٤٠ . ثوبها الى الصبغة اليرداء يملو تخطيط متعرج
اسود . فيج ظهرها اسود يكتنفه غطاء حايان . رأسها
اسمر . صفوها مطوق بالابيض || موطنها يمتد من
ملقه الى الهند . تألف الاجراج والادغال . تتسلق
الاشجار بسرعة || قوتها الحيوان والطيور والثمار وبعض
الجنود . تأكل الموز بشهية .

١٢٢٦٦ - **زَيَايَات**
Viverridae (S).
Viverridae (F). Viverridae (E).
فصيلة حيوانات لاحة مفترسة اجنتها ١٦ اشهورا
الزيادة والرياح والنس . اما انواعها فكثيرة العدد .
موطنها المناطق الحارة من العالم القديم . اجسامها مستطيلة
دقيقة . قوائمها قصيرة . اذنها طويلة . جلته . رائحة
امانتها نجحة . ورووسها زائفة . اعطائها ذق . صيرتها
صغيرة . اذنها مشوطة الحبيب || تتميز بفندھا ميوهيا
التي تفرز دهن الزباد المسكي اللزج في اجرة خاصة
مركزها بين السرم وملفتي الفخذين || مسرحتها في
الليل . قوتها ما استطاعت اليه سبيلا من الحيوان والطيور
والافاعي والورع والاسماك .

١٢٢٦٧ - **زَيَاكَا ، فَلَكَ**
Cotyledon (F).
Cotyledon (E).
هي الخوصة حين تخرج من القزاة .

١٢٢٦٨ - **زَيَاكَا**
Taille de la vigne (F).
Pruning of vine (E).
هي تسريع الكريمة اي تسحيلها . يقال زبر او يبرز
الكريمة .

١٢٢٦٩ - **زَيَاكَا**
Cane (F). Female duck (E).
هي البطية وتسمى زبابة لانها تكثر الزيت اي الصياح .

١٢٢٧٠ - **زَيَاكَا** ما تحمله النملة فيها .

١٢٢٧١ - **زَيَاكَا * ، زَيَاكِي**
Antenne (F).
Antenna (E).
ما تزين به الحشرة وما زبانيان . اطلب قرن استشعاري .
اشكاله كثيرة العدد اعماها ما جاء في الرسم .

١٢٢٧٢ - **زَيَاكَا ، زَيَاكَا الْعَصْرَب**
الزبان او زبانيا القرب منزل من منزل القمر البهانية .
وما كوكبان نيران مقترنان في قرني " برج القرب " و
معتزمان بين اثنال والجنوب بينهما قيد روح ينلما القمر
في الجلة السابعة عشرة || يقب الزبان يدعى البهين .

١٦ سم . موطنها البلاد الحارة . تألف السهول والحقول
المزدهرة قوتها النويبات والحشرات .

١٢٢٥٨ - **زَيَايَات**
Soricidae (S). Soricidae (F).
Soricidae, Shrews (E).
فصيلة حيوانات من رتبة الحشرات . انواعها نحو ١٧٠
موطنها العالم القديم . اجسامها صغيرة القد تشبه القار
والجرذان . اثارها رمادية . اعطائها ذق . اذنها
مستقيمة . قوائمها قصيرة . اظفارها حادة . اذنها دقيقة .
تألف الجبال والمساب والنياني . قوتها الحشرات
على اعطائها والمصابير والاسماك .

١٢٢٥٩ - **زَيَاد ، زَيَادِي ، صَحَاة**
Pallenis spinosa (S). Pallénis, Petit mugue (F). Star-
wort (E). Dorniges goldauge (D). Pallenis (I).
نبات حشبي بري طوي شاك من فصيلة المركبات .
منته حوض البحر المتوسط . ازهاره حلوية اللون مشرة
يحمرها التحل . فولاده الطيبة مهمة يقال انه ينفع الصدر
ويقوي للعدة .

١٢٢٦٠ - **زَيَادَة ، صَيَّوَر الزَيَاد**
Viverra (S).
Civette (F). Civet cat (E).
جنس حيوانات من فصيلة الزبديات . انواعها خمسة
تتميز باجسامها المستطيلة . اونها مخففة الالوان
يكثر لونها التنيير والتخطيط || اناثها تضع من ثلاثة الى
اربعة جراء ترضعها نحو ٨ اسابيع .

١٢٢٦١ - **زَيَادَة افريقية ***
Viverra civetta (S).
Civette d'Afrique (F). African civet cat (E).
نوع من الزيادة تملو نحو ٣٠ سم . طولها ٧٥ سم .
وذنبها ٤٠ . رأسها مكور الشكل . ذلقوها مدب .
اذناها قصيرتان قوائمها مشوطة القد قوية . ثوبها الى
الصبغة الاسمر يملو تخطيط وتيج اسود وشك نصي
يقطب النيج من القطن الى طرف الذنب || موطنها افريقية
الشرقية والنيالية . تألف الجبال والادغال والنياني .
تسرح في الليل . قوتها ما تستطيع اقتناصه من الحيوان والطيور .

١٢٢٦٢ - **زَيَادَة التَحَل**
Paradoxurus (S).
Paradoxure, Musang, Marto des palmiers (F).
Palm civet cat (E).
جنس حيوانات لبونة من الزبديات . موطنها البنغال
وسريليب والهند الصينية . انواعها عديدة . اجسامها
مستطيلة . طولها يراوح من ٥٠ الى ٦٥ سم . اذنها
من ٤٠ الى ٥٥ سم . وطولها من ٢٥ الى ٣٥ سم . اثارها
مرقطة || تألف الاجراج وتتسلق الاشجار . قوتها الحيوان
والطيور والثمار على اختلاف اجنتها وانواعها || اناثها
تضع اربعة جراء ترضعها نحو ٨ اسابيع || زبناها
مصبين الرائحة الكريمة .

١٢٢٦٣ - **زَيَادَة الهند ***
Viverra zibetha (S).
Civette de l'Inde, Zibeth (F). Indian civet cat,
Zibeth (E).
نوع من الزيادة تملو نحو ٤٠ سم . طولها ٨٠ وذنبها
٤٥ سم . موطنها الهند والصين وبنورما . ثوبها الى
الصبغة الصفراء يملو تنيير مجوي . فيج ظهرها اسود
الون . سواده يمتد من القطن الى طرف الذنب || تألف
الاجراج والادغال والسهول والحقول . تسرح في الليل .
قوتها الحيوان والطيور والافاعي والضفادع والحشرات والبيض
والثمار .



زيادة افريقية



زيادة التحل



زيادة الهند



زيادة سواده



زيادة ملقة



زيان

Colombophilie (F).
Pigeon-faucyng (E).

١٢٣٠٩ - زُجَالَة •

الزجالة فن تربية الحمام الزاجل وترويضه على المنزل.

١٢٣١٠ - زُجَر • Latilus (S). Latle (F).
جنس اسماك بحرية من شقائق الزعنفت وضفيلسة البهاريات. انواعه المعروفة خمسة: اعطائها بحار المناطق الحارة من العالم القديم جميعها كبيرة القد طويلا براوح من ٧٠ الى ١٢٠ سم. وورسها غليظة مقبوضة الخطم. عيونها كبيرة مستديرة جاحظة. زعانفها الظهرية مستطيلة. حراشيفها صغيرة. انوثها بخلفة الابوان غضبية المزاج. ج زجور .

١٢٣١١ - زُجُل Retournement des œufs (F).
Retournement of eggs (E).

هو تقليب البيض. زاجلت الدجاجة: قليت البيض في ايام الحضان لانها ان لم تراجل مدر البيض. وهو ما يجب الالتباه له في الحاضنات الآلية ليسلم البيض من الملد.

١٢٣١٢ - زُجُم ، زُجُمُ الماء Hydrochelidon (S).
Hirondelle d'eau, Guifette (F). Sea-swallow (E).

جنس طير من كفات القدم. انواعه قليلة تشبه الخرشوف الا انها اطول جناحا ورصا. تألف هجرات ومناقع المناطق المعتدلة. تكثر في شرطي البحر المتوسط. قوتها الحشرات والحوام والاسماك الصغيرة. تدثر في الاجنار والنباتات المائية. اناثها تبغض وتغضن ثلاث بيضات نحو اسبوعين || اشهر انواعه الزجج الاسود.

١٢٣١٣ - زُجُمُ اسود Hydrochelidon nigra (S).
Guifette noire (F). Black sea-swallow, Black tern (E).

نوع من الزجج. رأسه وصفه وسدره الى السواد الغامس. ظهره احمر اللون. جناحه وذيله الى الورد القزواء المزاج. يطنه وباطن جناحيه وانتيكه الى البياض الناصع. منقاره وساقاه حر.

١٢٣١٤ - زُجَار Enterotoxemies
مرض معد خفيف يصيب الحيوآن في امعائه فيفذي.

١٢٣١٥ - زُحَّافَات Reptiles (F). Reptilla (E).
الزحافات توكلف الصف الثالث من قسم الفقاريات. مركزها المرتبي يأتي بين الطير والضفديعيات. علمها يدعى زحفنة. اجسامها مسطحة اما بسفدت متباعدة الاشكال والياكة والمادة، واما بصفتها قرنية، متقاوية الشفاعة شديدة الصلابة. تنفسها رئوي. اجهزتها النورية والمصبية والمغصية والتناسلية كاملة. قحفها يتصل بالعصود الفقري بواسطة لقمة قذالية، اوسطية وبيطة. بعضها مجهز بأربع قوائم يستعين بها للارتفاع ولبعضها مرقال مدبج القوائم. كانت فصائلها واجناسها في الايام الغابرة كثيرة العدد وقد بلغت اوجها في الايام الثاني حيث وصل عدد ردها الى ١٩. اما الآن وقلانواع الممارسة تقدر بنحو ٩٧٥ تنقسم في اربع رتب فقط. وهي مخطومات البروس والسلاحف والسحاسيات والشفنجات.

١٠ مخطومات البروس Rhynchocéphales (F).
رتبة من الزحافات يمدد ظهرها الى الايام الثاني. وقد

١٢٢٩٦ - زُيْلِينَ • سَمُور سَمِيرِيَّة Mustela zibellina (S). Zibeline, Marre zibeline (F).
Sable (E).

حيوان مفترس من السموريات. موطنه الاساقع الباردة يكثر في سبيرة. طوله نحو ٤٥ سم. وذيله ٢٢ ثوبه جل الور الثام الطويل. ظهره الى السمرة السوداء عنقه وابيلا الى الصبغة الصنابية. خده الى الوردية. غطه اسود. اذناه الى السمرة، حناهما اريد. زوره وصدره ويطنه الى الصبغة الصفراء المزاج. قوته فاعرة. يالفت الاحراج الكثيفة ويجاري الماء. يسرح في الليل. قوته الحيوآن والطيور والسك والبار.

١٢٢٩٧ - زُيْد • • • • • زُيْدُون Zapus, Meriones (S). Zapode, Mérones (F).

جنس حيوانات ليونة قاضية من فصيلة البريبيات. انواعه عديدة جميعها صغيرة القصد طول من ٧ الى ١٠ سم. واذنابها من ١٢ الى ١٥ سم. جرائزها الخلفية مستطيلة تمكها من التفز الطويل. انوثها الى الصبغة السمراء. اذناها اسود. اياطها صفر. يملوها توشم اسود. بطونها ليش || تألف الاذغال والطراف الغابات والقباني والجلال والادوية والحقول والمراعي. تسرح في الليل. اجسامها انفاق دخاليز تنفخها على عن ٥٠ سم. قوتها المواد النباتية حل اختلافها من البذر الى الحب ومن الادراق والبراعم الى الثمار ومن العشب والجلود الى لحاء الاشجار.

١٢٢٩٨ - زُيْب • • • • • هَتَجَه Raisin soc (F). Raisin (E).
هو السب الزيب له طريقة تجفيف خاصة تمكته من الاحتفاظ ببعض اللدانة.

١٢٢٩٩ - زُيْب بَرِّي هو المائق الجلي، اطلبه.

١٢٣٠٠ - زُيْبَة Fourmillère (F).
Ant-hill, Ant's nest (E).

هي المنلة اي قرية التل || وهي الزاية لا يملوها ماء.

١٢٣٠١ - زُيْبَة ك • • • • •
هي الاذريون وهي القوشان الغزني، اطلبها.

١٢٣٠٢ - زُيْبَرِيَّة • • • • •
هي السمر الامرط، اطلبه.

١٢٣٠٣ - زُيْبَل Cuellolir (F). Fruit-basket (E).
قوة اي وءاء ما توضع فيه الثبا عند قطفها.

١٢٣٠٤ - زُج • • • • •
الزج هو التمام. الواحدة زجاء وازج للذكر.

١٢٣٠٥ - زُجَانَج Verre (F). Glass (E).
مادة صلبة شفافة سهلة الانكسار تصنع من الرمل والقل.

١٢٣٠٦ - زُجَاك • • • • •
هو حب القرنفل.

١٢٣٠٧ - زُجَاجِي • • • • • شَكَاك Hysolde (F).
Hysold (E).
صفة ما هو شفاف كالزجاج.

١٢٣٠٨ - زُجَال Colombophile,
Pétreonique (F). Pigeon faucyng (E).

الزجال من تعامل تربية الحمام الزاجل وترويضه.



زيبين



زيبود



زجور



زجج اسود

Solénoglyphes	أَبُوِيَّات الإِخَادِيد	انقرضت ولم يبق منها سوى النوع المعروف بالهيميرية أو السغنون الذي يعتبر أقدم الزحافات المعاصرة لانه مثال الخنثى الاول.	
Opisthoglyphes	خلفيات الإخاديد		
Aglyphes	حديبات الإخاديد		
Opotérodontes	سُرَافِجات الإِسان	٢٥ السلاحف	
	اما فصائلها فهي :	رتبة من الزحافات . أنواعها المعاصرة المعروفة ٢٣٥ تجمع الى ١٢ فصيلة . أجسامها مبطنة ملحوة . رؤسها مكرونة صغيرة . أعناقها متوسطة الطول . فكوكها عادية الا انسان لكنها مجهزة بتصلال قشرية حادة الاطراف . قوتها غليظة . ظهورها مغطى بذيالك . بطونها قشرية الكتف المعروف بالزيف . وزنها هذا سداسي القر يخرج منها الرأس والذنب والقوائم الاربع أما فصائلها فهي : بالنسبة الى التصنيف الحديث : ما يلي :	
Typhlopidae	تفلسيات	Trionychidae	قرسيات
Leptotyphlopidae	دسائيات	Kinosternidae	جنتائيات
Bufo	بوفائيات	Dermatemydidae	حسانائيات
Ilysiidae	حسبيات	Palomédusidae	حفاصيات
Uroplattidae	غفرقيات	Emydidae	حسبيات
Xenopeltidae	خديائيات	Platysternidae	غشائيات
Colubridae	حنثيات	Chelydridae	دلهائيات
Amblycephalidae	مسلحات	Carettochelydidae	دوربيات
Viperidae	أفيئات	Chélidae	رقيات
		Testudinidae	سلحشيات
		Dermochelidae	قشقيات
		Chelonidae	جلثيات
		Crocodylians	٢٥ الفصائيات
			رتبة من الزحافات تشمل فصيلة واحدة تضم ٢١ نوعاً تجمع الى ٦ اجناس . اكثريتها الساحقة من علم المناطق الاستوائية والحارة . معظمها يعيش في مياه الانهر والبحيرات وبعضها يغمرس مياه البحر كالتسلح البحري والتسلح الذي الخلف . تتميز التاسيح بأجسامها المستطيلة الخشنة ، يملؤها الغنية الصلبة القاسية ، بقوة فكوكها الكبيرة المجهزة باسان ذرية ، يصغر حينها الجاحقة ، وارتفاع مناعتها الطرفية الانزكان ، وبذاتها الضلعية المستطيلة .
			اما اجناسها الستة فهي :
Iguanidae	عيدونيات	Crocodile du Nil	تسلح النيل
Agamidae	حرذونيات	Crocodile marin	تسلح بحري
Chamaeleontidae	حرابونيات	Crocodile à museau effilé	تسلح ذلق الخلف
Gekkonidae	وزغيات	Gavial	تسلح الهند ، أذوم
Xylopoidea	سليليات	Alligator	تسلح امريكي ، ألبغاتور
Xantusiidae	تنطوسيات	Calman	تسلح كيان ، كيان
Lacertidae	مقلبات ، حبابيات	Squamates	٥ السهليات
Telidae	تيديات		رتبة من الزحافات وقد قسموها الى مرتبتين أو ريتين :
Scincidae	مقلوريات		مرتبة الحيات ومرتبة السطائيات .
Angeidae	حنثقيات		أ - مرتبة الحيات - الحيات حيوانات زسافة مرقاة متوافقة الاخلاق والجمود والاثواب . أنواعها المعروفة نحو ٢٧٠٠ تنتمي الى ٢٥٠ جنساً تجمعها تسع فصائل تضم الى خمس فئات .
Anelliidae	قشقيات		الفئات الخمس هي :
Hélodermatidae	فاغرات		أمانيات الإخاديد
Varanidae	ورليات		
Amphisbénidae	تفراقيات		
Gerrhosauridae	سبروريات		
Lépidés	سدرقيات		
Zonuridae	غشائيات		
Xenosauridae	دولسات		
Analytropidae	عكائيات		
Dibamidae	نوقصيات		
Chilopodes	١٣٣١٦ - زحاف		
	رتبة دوبيات تعرف بلغوية الارجل .		
Dictyosporées (F).	١٣٣١٧ - زحافيات		
Dictyosporée (E).	عارة تطور بجهرية من فصيلة الطحنيات . تتميز ببويديتها القراصدية الشكل . اجناسها خمسة : الباريجة ، الرديفة ، الزنبورة ، الكونيزيسوم والمكروسيوروم .		
		Protéglyphes	

خليفة ، محبة الأطراف || حولها كاعنة الصنف قل من يرغب فيها .

١٢٣٢٦ - زُحْمُولُك *
Loranthhe sauvage (F).
Wild loranthus (E).

نوع من الخصال وصيلة الثنيات ، وهو نبات طفيف يركب اغصان الاشجار الحرجية فينبث فيها ويقنات من عصارتها ، ج زحاميك .

١٢٣٢٧ - زُحْمَيْكَة *

Zoonomie (F). Zoonomy (E).
مجموعة من الشرائع الطبية التي ترضى حياة الحيوان .

١٢٣٢٨ - زُحْمَيْسِي *

Zoonomique (F). Zoonomic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل شريعة طبيعية تتحكم بحياة الحيوان .

١٢٣٢٩ - زُحْمَة
Agneux (F). Lams (E).
الزينة : اولاد الفم لانها ترخ أي تساق وتنفذ من ورائها .

١٢٣٣٠ - زُحْمُوط
Glaire (F). Glair (E).
الخطا السائل عند الموائج من الايل والخليل والشاء والبقر .

١٢٣٣١ - زُحْمُوط * ، زُحْمَيْمَان
Gagea (S).
Gagée (F). Gagea (E). Goldstern (D). Gagea (I).
جنس نباتات يصلية من فصيلة الزنبقيات . انواعها المعروفة ٢٠ معظمها بري وبعضها زراعي تربى ، اطرافها غنية مستطيلة . ازهارها صفراء اللون طويلة المتق متعددة يسمنها شراخ اجوف مستطيل .

١٢٣٣٢ - زُحْمُوف راجع ابنة يوم .

١٢٣٣٣ - زُحْمُوفِيَّات
Ephemeridae (S).
Ephéméridés (F). Ephemeridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة المرجسيات وطبقة البويات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها تحلج الاجسام المستطيلة ، دقيقة الايل والذبات .

١٢٣٣٤ - زُحْلُوب النَفْس *

Incurvaria muscallela (S). Mineuse des feuilles du chêne (F). Incurvaria muscallela (E).
حشرة من فصيلة الزغوليات حوشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى بعض مناطق اوروبا وافريقية الشمالية . فرائشها حبيطة تعيش على غزونها الاسمانى . سرقتها لانحة ثم غاصلة ، تلغ اوراق الفص والسديان ثم تهجرها الى الاغصان البنية || جسمها صغير قصيف بطول ٤ الى ٥ م . يسحبها قراوح من ١٢ الى ١٤ م . رأسها مستطيل الجرم حنطى اللون . عينها كبيرتان . زباناها خيطيان . ملاسها صفيرة . مرشها جعدة . جوشها الى الخنطى ويطأها كذلك || وراشها كبيرة . ورشها الاسمانى الى النى المايق تملو بقجتان تليها اللون . ورشها الخلفيان الى الخنطى القاتع . اهدالها الى الخنطى الاصفر || لها جيل واحد في الحول . تظهر اقراصا في القسم الثاني من الربيع . تسرح في النهار وتبيت في الليل || السرعة تثقب بشرة النصل وتلفه وتعيش على خلايا الرن السرفة تثقب بشرة النصل وتلفه وتعيش على خلايا الرن

١٢٣٣٨ - زُحْف
Reptation (F). Creeping (E).
الزحف الانتقال على الارض ديبيا كما تقفل الزحافات من ثابنين وعطاء وغيرها .

١٢٣٣٩ - زُحْفَن *
Erpétologiste (F).
Herpetologist (E).
الزحفن مواليدى اختصاصه درس الزواحف .

١٢٣٤٠ - زُحْفَنَة *
Erpétologie.
Herpétologie (F). Herpetology (E).
الزحفنة او علم الزواحف جزء من علم التاريخ الطبي .

١٢٣٤١ - زُحْفَنِي *
Erpétologique (F).
Herpetologic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالزحفنة .

١٢٣٤٢ - زُحْلُك
Saturne (F). Saturn (E).
كوكب من مجموعة النظام الشمسي ، وهو من الجنس . سرعة دورته الانتاقية في الفضاء نحو ٣٤٧٠ كيلومتر بالساعة . دورته المحورية الفلكية حول الشمس تستغرق ٢٩ سنة و١٦٧ يوما || والجنون يدعونه شيخ النجوم ويسمونه النسر الاكبر لانه في النصفه فوق المريخ واضافوا اليه الخراب والهلاك والم والم .

١٢٣٤٣ - زُحْلَة
الزحلة : دابة تمشي في حيرها من قبل اسبا (السان) .

١٢٣٤٤ - زُحْلُوبَة مَبْجَعَة *
Tomoxia biguttata (S). Tomoxie à 2 taches (F).
Tomoxia biguttata (E).
حشرة وائمة غاصلة دامت من فصيلة المزدليات ورتبة مفصلات الاجنحة . تألف البراري التي تكثر فيها نباتات الفصيلة السبوية . غناصها تعيش على بتلات الازهار واوراق النبات . يرقاتها تعيش على المواد النباتية الصافرة نحو الانخلال || جسمها صغير القد بطول من ٥ الى ٧ م .

توهمها الى الكسفي القائم تملو في اواسط الفلوراء بقجة يفساه وزرقاء ، رأسها مستعرض الجرم . زباناها خيطيان . عينها صغيرتان مساحتان . ظهرها غيب المزهر لا يلحف كامل الطيل . يطها بردي الشكل ينهي بسم ذلق || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى آب . تسرح في النهار . تساق في تموز . تنجح للمكن تحت ماء الاشجار اليابسة والاعشاب المقطوعة || البقرة عنه يولوها الإدراك التام تطول نحو ١٢ م . جسمها شبه رشي الشكل ، سداسي القرواب ، مستطيل الرأس ، ضلع التاشير ، احمل اللون ، اسمر المواج يسود ويحمر في الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوما ينقضي طليقا في التربة .

١٢٣٤٥ - زُحْلُوق *

Rhypticus (S). Savonnier (F).
زحلق وزحلقه جنس اسماك بحرية من شابات الزعانف وفصيلة القرفيات . انواعها المعروفة قليلة العدد . اصطلها بحار البلاد الحارة والامترائية || اجسامها الجليجية الشكل . مسكها مدام السهف ، تام المس . عينا كبيرة ، نائمة ، جاسقة ، ريمة الاركاناز . زعانفها الظهرية مستطيلة ، شاذكة المنحس الاسمانية . زعانفها القليلة



زحلوقة مبقعة



زحلق



زحموك



زحوط



زحلوب النفس

١٢٣٤٢ - زُرُّ الْبَرَجَاد Metépimère (F).

Metépimerium (E). هو في الحشرات المعضو التحيل البقيق الذي يوصل البرسد بالبرجاد.

١٢٣٤٣ - زُرُّ الْجَوْشَن Epimère (F). Epimerium (E).

هو في الحشرات عضو صغير يعمل كصلة وصل بين غوش الجوشن وسائر أقسامه.

١٢٣٤٤ - زُرُّ الْوَرْد هو الحقيق ، راجعه .

١٢٣٤٥ - زُرُّ حَمِيصِي هو الخلد ، اطلبها .

١٢٣٤٦ - زُرُّ دَهَبِي هو الخوذان الحريف ، راجعه .

١٢٣٤٧ - زُرُّ كَرِي Elanion (F). Elanus (E).

جنس طير من عمارة الحدأ فضيلة الصقريات ، أنواعه سبعة جميعها من كواسر المناطق الحارة . مناسرها غليظة شديدة الانحناف ، سواقلها طويلة ، أفتابها قصيرة . غالبها قوية . أظفارها سادة . أريائها رحلة متعدهة الا لارائن يذب في ظهورها الأزرق الاسمر وفي بطونها الازيض الافرير || جميعها يابسة المزاج ، شديدة الجناح ، سرية الطيران لا تهاب شيئاً . انهزها الزرق والكليشي .

١٢٣٤٨ - زُرُّع Planteur (F). Planter (E).

هو الذي يمارس زرع الأرض .

١٢٣٤٩ - زُرَاعَة Agriculture

هي فن زراعة الأرض وتربيتها الشامل هي فن استئثار النباتات الزراعية والحيوانات اللازمة على أكل وبه اقتصادي .

١٢٣٥٠ - زُرَاعَة ، زُرْع Culture (F).

Culture, Cultivation, Husbandry, Tillage (E).

هي السمل الزراعي المخصص .

١٢٣٥١ - زُرَاعَة الْأَشْجَار الْمُشْمِرَة

Fructiculture (F). Orchardng, Fruit-growing (E).

هي التي تسمى بإنتاج ثمار الفواكه .

١٢٣٥٢ - زُرَاعَة الْبُرْجَايْ

زُرَاعَة يَذْكُرِيَة Culture de porte-graines (F).

وسم من قال زراعة التقاري والهيات والمزرات .

هي كل زراعة تهدف الى انتاج البذار راجع بحدرة .

١٢٣٥٣ - زُرَاعَة الْبَسَاكِين ، يَسْمَعْتَة Horticulture

تخصيص زراعي غاية استئثار النباتات البستنية دون سواها .

١٢٣٥٤ - زُرَاعَة التَّرَاوِيْق ، سَرَقَجَة

Mosaiculture

تخصيص زراعي يرتكز على ترويب الحدائق وفقاً لأشكال هتلمية لمبها لين النبات البور الرقيي .

١٢٣٥٥ - زُرَاعَة الْحَرَاَج ، حَرَاَجَة Sylviculture (F).

Sylviculture, Forestry (E).

هي علم التصريج يبحث في استنبات وقرس واستئثار الأشجار الحربية .

١٢٣٥٦ - زُرَاعَة الْخَضَار ، زُرَاعَة الْبُقُول

Culture maraichère, C. potagère (F). Pot-herbe cultivation (E).

تخصيص زراعي غاية انتاج البقول .

نحو ثلاثة أسابيع ثم تخرج من التلق وتعدل بمخيط حريري المادة حتى سطح التربة حيث تنوجه نحو الاشباب البرية . والسرقة عند بلوغها الادراك تمام تعلق نحو ٨ م . جسمها مستطيل الشكل ، مبط الجرم ، اسمر اللون ، ميمش الحلب ، اسود الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٤ اسبوعاً ينتهي طلياً ضمن جراب السرعة في الجلالة أو بين الأوراق التي تلاس التربة .

١٢٣٥٥ - زُخْرُوفَات Incurvaritidae (S).

Incurvaritidae (F). Incurvaritidae (E).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشنيات الاجنحة . انزاعها المرفوعة نحو ٣٠٠ منشرة في جميع أصقاع العالم . تسرح في التبار وتبيت في الليل ، طرايتها متدل المرفوعة والحرم || اجسامها صغيرة ، منزلية الشكل ، رؤوسها مستطلة . عيونها كبيرة ، نافذة . قرونها الاستشعارية غليظة ، شديدة الطول . ملابسها صغيرة ، قصيرة ، جالسة . مرافئها جداج . بطونها كثيفة التملل القصير . حذلتها لا يوجد لها . ورائحتها ذللة الاطراف الخارجية . فلانيتها قولانها الخلفية وراجعة للناخس || اساريها مبطلة ، زباد القشار . لاهمة في اول عهدها ثم خاضلة تعيش داخل جراب مبطل تأوي اليه ويخرج عند الانتفاخ || خادوتها طليقة تتصور ، في طور الاكمال ، ضمن جراب السرعة || اشهر اجناسها الزعلوب والأديلة والتنفوده .

١٢٣٥٦ - زُدَاع Turnera (S). Turnère (F).

جنس نباتات طيبة عشبية عشوية من فصيلة الزديعات . انواعه نحو ٩٠ منبها المناطق الحارة والامتوائية . جميعها سريعة النمو . اوراقها متعاقبة ، منقطة ، احليجية ، ذللة . ازهارها ابيلة الزكاز فوية التجميع || اوراقها طيبة تنقد القلب وتنشط الباه || اشهر انواعه الزداع السابق .

١٢٣٥٧ - زُدَاع شَابِي ، دَمِيَانَة

Turnera aphrodisiaca (S). Turnère aphrodisiaca, Daminana (F).

جنية زراعية طيبة مهدا البلاد الحارة . ساقها فرفرا زغبية اللحاء ميميرة المسام الندية الشكل التحنية للمادة . اوراقها منقطة ، متعاقبة ، احليجية الشكل . نصلها جامد اللون ، كثير البرق ؟ صفحته العليا كثيفة المسام الندية || يستخرج من اوراقه زفرهه زيوت طيارة ويولد دمية ورائتيها صامريها الفعالة شديدة الريح على الاضواء التناسلية . ثليلها شايخ منط . كثيرها مؤذ .

١٢٣٥٨ - زُدَاعِيَات Turneraeaceae (S).

Turneraceae (F). Turneraceae (E).

فصيلة نباتية من ذرات الفلقين . اجناسها وانواعها مبددة جميعها عشوية أو شبية . ازهارها شتوية خاسية التركيب . ثمارها حقية ثلاثية المصارع . بذورها دقيقة سمره اللون || اعرف انبليها وانهرها الزداع .

١٢٣٥٩ - زُدَب Part, Portion

هو التصيب والحصة . ج ازداب .

١٢٣٦٠ - زُدَوَاك هو الجدار المقيد . اطلبه .

١٢٣٦١ - زُرْ Bouton floral (F). Floral bud (E).

هو كرم الزهرة قبل انبلاجه .



زداع شايخ

وثوب اللهد || موطنها فياني افريقية وإدغالها . قوتها الشب وورق بعض انواع الميموزا والسنت والوكوية . تعيش جماعات محدودة صغيرة المبد أجملها يتألف من ثقل وثلاث أو أربع أنثى وثلاثة أو أربعة صغار .

١٣٣٠ - زَرَالَة Caméopard, Girafe (F). Caméopardus (E).

الزرافة كوكبة نجوم شمالية الموق مركزها بين كوكبة حملك الاعنة وكوكبة الدب الاصفر || عدد نجومها ١٩ جميعها من المرتبة الخامسة والسابعة .

١٣٣١ - زَرَالِيَّات Giraffidae, Camelopardalidae (S). Giraffidae, Camelopardalidae (F). Giraffidae, Camelopardalidae (E).

فصيلة حيوانات مجترمة من ذوات الظلف تشمل في الزمن الحاضر جنس الزرافة الوحيد النوع .

١٣٣٢ - زَرَالَة * Fistularia (S). Fistularia (F), Fistularia (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الزرافيات، أنواعها المعروفة ثلاثة موطنها ببحار البلاد الحارة من البحر الاحمر الى بحر الصين || أجسامها ضيقة ، مستطيلة ، لزجة ، حادة الحراشف . رؤوسها صغيرة ، انبوية الاعظام الطويلة . زعانفها الذيلية غارقة تنشب في وسط كل منها عذبة مستطيلة دقيقة تشبه سوط الخيوي || لحومها كاعنة الصنف وبعضها جعالي للمادة مؤثر .

١٣٣٣ - زَرَالِيَّات * Fistulariidae (S). Fistulariidae, Fistulariidae (F), Fistulariidae (E).

فصيلة اسماك بحرية يربطها من شائكات الزعانف ، اجناسها وانواعها المعروفة قليلة المبد موطنها معظم ببحار البلاد الحارة || تتميز باجسامها الضيقة المستطيلة وباعظامها الانبوية . عجزها صغيرة نائضة . زعانفها الظهرية غليظة الزناكار قريبة من الذيل || اعراف اجناسها واشهرها الزرافة والصيلة .

١٣٣٤ - زَرَاوَنْد * Aristolochia (S). Aristolochia (F). Worm-killer, Birthwort (E). Osterfuzel, Hohlwurz (D). Aristolochia (I).

جنس نباتات عشبية ليبية عارضة مسمرة من فصيلة الزرافنديات . انباضها عديدة منها البرية والبرية والطيبة . اوراقها متناقبة قليلة الشكل ونبتها ثنائية أو ثلاثية التخصيص ابرارها كبيرة اللد ، غريبة الشكل ، مختلفة الالوان . جذور الانواع الطيبة كافورية الرائحة تشتمل كمرة وفي مدرة القطن ، تسهل الولادة ، تفيد من الربو ، تنفي الفروع وتجلو الاسنان . ويستخرج منها جوهر جعالي قد يدعى زرافنتين قليلة مقو جزيل النفع ، كثير سم زعاف .

١٣٣٥ - زَرَاوَنْد أرغَب، مَسْمَقَار، مَسْمَقَارَان Aristolochia tomentosa (S). Aristolochia tomentosa (F).

نوع من الزرافنة ساقه مدادة عارضة زينة تطول من ٥ الى ١٠ امتار اوراقها قليلة ذلقة الزام الاخير . نصلها خالى البثرة . انجازه كبيرة اللد ، قليلة التحسين . صفحتها الخارجية صفراء اللون اما الداخلية فينفسجية .

١٣٣٦ - زَرَاوَة الزُهور Floriculture

تخصيص يتناول زراعة وتهد لنباتات الزهرية والبرية .

١٣٣٧ - زَرَاوَة الشجر Arboriculture

تخصيص في الزرافة يتناول استنار الانجار دون سواها .

١٣٣٨ - زَرَاوَة الكرْم Viticulture (F).

تخصيص في الزرافة يتناول الكرمة .

١٣٣٩ - زَرَاوَة الكرْم Trufficulture (F).

تخصيص في الزرافة يبحث في استنبات واستنار الكرْم .

١٣٤٠ - زَرَاوَة المَسْتَدَات Culture en espalier (F). Espalier-culture (E).

تخصيص في الاساليب الزراعية التشكيلية للنبات في قيادة وتمهد الانجار للشرة المرتكزة على المستدات .

١٣٤١ - زَرَاوَة بَا كُورِيَة Culture forcée (F).

كل زراعة تستن اوانها المألوف ان بالوسيلة او بالبرية .

١٣٤٢ - زَرَاوَة بَعْلِيَة Dry farming

كل زراعة لا يتهداها ريل بل تقوم على اسقاء المطر .

١٣٤٣ - زَرَاوَة حَدِيْثَة Néo-culture (F).

كل زراعة ترتكز على الاساليب التقنية الحديثة .

١٣٤٤ - زَرَاوَة كَهْرَبِيْة Electroculture

هي الزرافة القائمة على الاستفادة من الكهرباء في سيل الانتاج الباكر وربما تحمين الانتاج .

١٣٤٥ - زَرَاوَة لَاحِبَة Culture intensive (F). Intensive cultivation (E).

زراعة تقديمية تهدف الى الحصول على اكبر انتاج ممكن في بقعة معينة من الارض .

١٣٤٦ - زَرَاوَة مِيكَانِيْكِيَة Culture mécanique (F). Mechanical cultivation (E).

هي الزرافة القائمة على استعمال الآليات .

١٣٤٧ - زَرَاوَة زُرَاعِيّ Agricole, Agronomie (F).

صفة كل ما يتنسب الى الزراعة او يتصل بها .

١٣٤٨ - زَرَاوَة Girafa camelopardalis (S).

الزرافة حيوان لبون مجتر من ذوات الظلف وفصيلة الزرافيات الخالية من الجهاز الصوتي || والزرافة ربيدة الجنس والنوع جسمها حليم البير ، ارتفاعها الكامل من ظلفها حتى نفرة رأسها يفوق ستة امتار ٢٢٥ سم . وهي قصيرة الرجلين طويلة الذين والعتق منحدرة الظهر ، لها قرنان عظيميان منقلبان صغيران يتوسطها تنوء بارز . ثوبها الى الصفرة يملؤها بقع بجوي متتابع النبتين لا تقياس الشكل والحجم . وقد قيل في وصفها لها رأس القرس وجسمه وعتق الجمل وراسلانه ، آذان الثور ، ذنب الحمار ، قوائم الهامة



زرافة



زرافة



زرافة

leuse, Noctuelle colorée (F). *Brotilomia metaculosa* (E).

حشرة بحيلة الألوان المتداخلة من فصيلة النسيات ورتبة حشرغيات الاجنحة. موطنها بعض اقالي حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق المتاخمة. فرشاها واضحة قربها رقيق الازهار. سرتها غاسلة تركب الكثير من النباتات البرية والزينة اغصانها الوردة والبنفسج || جسمها مستطال الجسم بطول من ١٢ الى ١٥ سم. يسلطها قزاح من ٢٨ الى ٤٢ سم. رأسها مستطال الخصر كبير الخطر حنطي اللون كاسر الموج. عينها كبيرتان ، فاشزان . زباناها غليظان ، مستطيلان . ملامها صفيرة. مرشها مستطيل ، جوشها حنطي اللون وعلها ايضا || رواشها مزونة ويغنية وبغزة الخنجر الحاربي || الاثني اكبر قدام من الذاكر واغلظ بطناً منه || لها ثلاثة اجنال في الجول. تظهر فراشة الجبل الاول في اذار وفراشة الجبل الثاني في حزيران وفراشة الجبل الثالث في ايلول. تدر من القروب الى فحة القيل ومن القجر العميق الى القروق || تباشر الشكل تنلفها مادة غروية لاصقة تلتصق على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرعة عند بلوغها الازراق بطول نحو ٤٠ سم. ثوبها يتأرجح بين الاخضر والاحمر يملو خط ثوبي زاهر تتوصله لؤلؤ سود ويملو ايضا غطان جانبيان قاطبان . رأسها الى الحنطي يملو مزيج اخضر . مدنها ورواجها الى الحنطي الاسمر || طرد الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في التربة ضمن جراب من الحبلين .



زربة ذبقة

١٢٣٨٦ - زُرُونْد * ، شاي المكسك

Chenopodium ambrosioides (S). *Chénopode fausse-ambrosia*, Ambrosia, Thé du Mexique, Thé de Sibézia, Thé des féuties (F). Mexican tea, Wormseed, Mexican goose-foot (E). *Mexikanisches tee-kraut*, *Teegeschuss* (D). Ambrosia, Thé du Mexico (I).

نوع من الاثنية وهو نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة السرمقيات. يملو من ٣٠ الى ٨٠ سم. اوراقه مستطيلة الشكل ، نصلها ازغب البشرة مشمع الصفعة المنددة. ازهاره صفيرة القند تاجية الاوتكار || اوراقه عطرية معية تستعمل لاصبال الشاي .

١٢٣٨٧ - زُرُونْد * *Sarment* (F). Vine-shoot (E). في السرح ، قصب الكرمه .

١٢٣٨٨ - زُرْد * هو حار الزرد ، اطبخه .

١٢٣٨٩ - زُرْدَاك *Vestibule* الجزء الداخلي من القرح يبتدئ بعد حاجز الكية ويتنهي عند عتق الرحم .

١٢٣٩٠ - زُرْدَاك * هي فلك زرده ، اطبخه .

١٢٣٩١ - زُرْدِي * ، مَجَرَز *Zébré* (F). *Striped* (E). ثمت وسني يبر عن الخطوط للمزينة الاثنياسية اللون والقرص التي تملو اقواب الحيوان كما هو الحال في حار الزرد .

١٢٣٩٢ - زُرُونْد ، زُرُونْد ، بَلَسْمَان *Sturnus* (S). *Etourneau* (F). *Starling* (E).

جنس طير من فصيلة الزرورويات . انواعه ستة منها



زربج

١٢٣٩٦ - زُرُونْد مُسَبَّي ، اُوسْتُولُوحيّة مُسَبَّيّة ، لُوف عَطْرِي

Aristolochia serpentaria (S). *Aristolochie serpentinaire* (F). *Virginia snake-root* (E).

نوع من الزراند الطبي . ماله متصبه تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقه قليلة القفاضة ، اعطليجية اقزام الثاني والثالث ، ستانية الاخير ، ثنائية التقويس ، صفيرة القند . جلوه طيبة عطرية غنية بالزراندين .

١٢٣٩٧ - زُرُونْد دَالِم الخُصْرَة ، سُوْرَبَات *Aristolochia sempervirens* (S). *Aristolochie toujours verte* (F)

نوع من الزراند ساقه مدادة قليلة التحريش تطول نحو ١٥٠ سم. اوراقه عرة قليلة الشكل مستطيلة مدبة اقزام الاخير . نصلها مائل البشرة ، لامع الخضار الزاهي . ازهاره الى الصفرة المضملة بالاحمر .

١٢٣٩٨ - زُرُونْد سِيْفُو ، مَسَهْقُوْرَة

Aristolochia macrophylla (S). *Aristolochie alphon(F)*.

نوع من الزراند ساقه مدادة عارضة تطول من ١٠ الى ١٥ امتار . اوراقه قليلة الشكل يملوها بعض ازغب . ازهاره كبيرة مقوسة لونها الى الخضار الحنطي يملو تحطيط ابيض .

١٢٣٩٩ - زُرُونْد صِيْثِي

Aristolochia moupinensis (S). *Aristolochie de Moupin*, A. de Chine (F).

نوع من الزراند مهله الصين. ساقه مدادة عارضة تطول من ٨ الى ٨ امتار . اوراقه متصبية النصل اعناقها هدبة الزغب . ازهاره صفير يملوها من الداخل يتقبح احمر .

١٢٣٩٠ - زُرُونْد مَهْدَب

Aristolochia fimbriata (S). *Aristolochie frangée* (F).

نوع من الزراند ماله متصبه تملو نحو مترين . اوراقه مستديرة شبه مقطوعة . ازهاره مهدبة الخنجر صفحتها الخارجية قسقية اللون اما الداخلية لمخططة .

١٢٣٩١ - زُرُونْدِي اَبِيْض

هو الهبنارية الثنائية النصل . اطبخها .

١٢٣٩٢ - زُرُونْد بَات *Aristolochiaceae* (S). *Aristolochiacées* (E).

فصيلة نباتات مدادة عارضة او متصبه . اجناسها وانواعها كثيرة البلد مهدبة البلاد الحارة . اوراقها متعاقبة مشقة . ازهارها ابيلة الاوتكار ، فردية التجميع ، كبيرة القند . ثمارها كسابر سداسية القلق . منها انواع طيبة حميدة النتج .

١٢٣٩٣ - زُرُونْدِيْن ، اُوسْتُولُوحيْن

Aristolochina (F). *Aristolochines* (E).

جور جمالي فضاء مر العلم يستخرج من جذور بعض انواع الزراند اغصانها :

Aristolochia serpentaria

Aristolochia clematidis

١٢٣٩٤ - زُرْبِي * ، زُرْب *Parage* (F). *Folding* (E).

قليلة اللحم واللماز .

١٢٣٩٥ - زُرْبِيَة دَكِيكَة * ، عَسَمِيَّة مَلُونَة

Brotilomia meticulosa (S). *Brotilomie méticu-*

Bernage (F). ١٢٤٠٢ - زُرْزُور الرِّعَاوِيَّة
هو الزرور المكون من خليط من البذار يستعمل كملف
اخضر .

Drogail ١٢٤٠٣ - زُرْزُور العَصْرِ ، زُرْزُور الصَّغِير
هو زرع الحبوب قبل المطر . والعصر أول سقاية يسقاها
الزرور من المطر .

Semences (F). Seeds (E). ١٢٤٠٤ - زُرْزُفَة
هو الحب الممد الزرع . راجع بذار . يقال اعطي زُرْزُفَة
ازرع بها ارضي || والزُرْزُفَة : فرخ القبعية .

Glèbe, Sol (F). ١٢٤٠٥ - زُرْزُفَة ، مَشَاوَرَة
Glebe, Soil (E). الارض التي تزرع .

Sole (F). Break, Field (E). ١٢٤٠٦ - زُرْزُفَة ، عَمْرَمَة
كل زُرْزُفَة من الزراعات التي تتعاقب في ذات المكان .

Cárdaline (F). Carélin (E). ١٢٤٠٧ - زُرْزُفَة
هو عنصر الخبز الموصوف في النخالة ويقال له سبورين .

Frisolén, Bouques (F). ١٢٤٠٨ - زُرْزُفَة *
Leaf drop attack (E). مسماء المهندس عادل ابو النصر «مرض يجهد اوراق البطاطاء
منهم من قال «مرض يجهد اوراق البطاطاء» || وهو

ضرب من مروج البطاطا يهود الى يورس لا يصيب الفرة
فيحور شكلها الطبيعي من الاستدارة الى الاستطالة
ومن البيضي الى المردني بعد ان يزيد حتى غور المونيات .
اما النباتات المسابية فتبدو تحيلة الفروع المزدعة ،
صغيرة الاوراق المنكسفة المنحنية بالاخضر والباقي والياض
والاصفر ثم يتجدد نصلها وتلونى اطرافه وصله نحو
الارض || اضراره متفاوتة التقدير لانها تعود الى طاعة
اليورس ويعدى انتشاره || يكلف بانتصاب البذار
السلبي وباختناط الارربة الفقيرة لان فقر التربة مع شدة
الحرارة تشتتاه كثيراً .

Sternite ١٢٤٠٩ - زُرْزُفَة *
حلقة من حلقات بدن الحشرة الذي يتحرك من عدة
زرائين .

Elanus melanopterus (S). Elanion mélanoptère (F). ١٢٤١٠ - زُرْزُفَة * ، زُرْزُفَة الشَّرَق
Black-winged kite (E).
طائر من الزرائين ينتمي الى عمارة الحداء وفضيلة
الصقريات . موطن الشرق الاوسط وافريقية ، يكثر في
مصر وسورية . رأسه وسنقه اسود . ظهره وذنبه الى
الرمادي الازرق . بطنه ابيض . منزه اسود . عناء
قمرزيتان . نحاله الى الصغار المرتقالي || يدفن عث
في الانجار الرقيقة . قوته القوامس والجراد وخنثف
الحشرات .

Colombine (F). ١٢٤١١ - زُرْزُفَة الحَمَام
Columbine (E).
سماد عقوي في بالازويت ويسائر العناصر الغذائية .
يعتبر من الاسفة المعارية .

١٢٤١٢ - زُرْزُفَة الطَّيْر هو البستية ، اطله .

١٢٤١٣ - زُرْزُفَة هي الزبور الصغير ، اطله .

القطاوع والارابه . تمش جماعت . قوتها الحشرات
ويبيض البذار . تتميز بريشها الاسود اللامع المرط ،
باستطالة اجنتها ويقصر اذنائها || عث في الانجار .
انثا تحض سمها من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في
السنة || اشهر انواعها ما يتبع .

١٢٣٩٢ - زُرْزُور أُرْجَوَانِي
Sturnus purpuraceus (S). Etourneau pourpre (F).
طائر من الزرور موطنه ايران والافغان ، ريشه ارجماني
متشع بالابيض . طوله نحو ٢٠ سم . سره قليل المد .
يألف للتلحاح والمقاصب ويجاري الماء .

١٢٣٩٤ - زُرْزُور أَسْوَد
Sturnus unicolor (S). Etourneau unicolore (F). Spodess starling (E).
طائر من الزرور طوله نحو ٢٠ سم . ثوبه سوي اللون
الاسود اللامع . يعيش اسراب كبيرة المد يحب البلاد
من المد الى جنوب اروبة .

١٢٣٩٥ - زُرْزُور البَادِيَّة ، سَوَادِيَّة
Onychognatus (S). Onychognate, Etourneau noir (F). Grackle (E).
طائر من الزرائير يألف البادية يكثر في شبه جزيرة
سينا ثوبه الى السواد اللامع يملو مراح ازرق . قوامه
حر منقاره اسود . يألف الادغال وانجار البست .

١٢٣٩٦ - زُرْزُور المَهِند
Sturnus splendens (S). Etourneau splendide (F). Splendiferous starling (E).
طائر من الزرور ثوبه متراكب الالوان الزاهية الجميلة
المرطقة فيها الاسود والاحمر والجزوي والاصفر والابيض
والخضلي . طوله نحو ٢٢ سم . يألف المراعي ويجاري الماء .

١٢٣٩٧ - زُرْزُور مَالُوف
Sturnus vulgaris (S). Etourneau vulgaire, E. commun, Saisonnet (F). Common starling (E). Star (D).
طائر من الزرائير لقطاوع يحوب الشرق الاوسط واروبه
وافريقية الشمالية . طوله نحو ٢٢ سم . ثوبه الى السواد
اللامع يملو مراح ازرق واخضر ورقة يبيض يختل
سحب فضتها بين الظهر والصدر والبطن . منقاره حنطي .
عيناه كستينان || قوته الحشرات والدبدان والحلزون
والحبوب والثمار العنينة .

١٢٣٩٨ - زُرْزُورِيَّات
Sturnidae (S). Sturnidae (F). Sturnidae (E).
فصيلة طير من رتبة الجواثم اجنتها وانواعها عديدة .
اجناسها رتبة متوسطة القد . اجنتها مستطيلة .
اذنائها قصيرة . اسباعها قوية . مناتيرها مخروطية الشكل
دقيقة الطرف . انوعها عديدة الالوان المختلفة || اشهر
اجنتها الزرور والسمر والمينان والنفاف .

١٢٣٩٩ - زُرْزُفَة هو البراريس ، اطله .
١٢٤١٠ - زُرْزُفَة
Emblaver (F). To sow with wheat etc. (E).
حرث الارض وسدعا وبذرها .

١٢٤٠١ - زُرْزُفَة ، زُرْزُفَة
Céréales (F). Cereal, Corn crops, Grain (E).
كلمة شاملة تطلق على النباتات الزراعية المرسية من
فصيلة النجيليات التي تزرع لاستثمار حبوبها المنشوية
الغذائية .



زُرْزُور المَهِند



زُرْزُور مَالُوف



زُرْزُفَة



زُرْزُفَة

١٢٤١٤ - زُرْفُف *

Parusoreus (S).

Mésangeal (F). Siberian Jay (E).

جنس طير من فصيلة الزرقائيات ورتبة الجواثم سنيات
المتاثير. له نوعان واحد اسويدي والاخر كندي. يألّف
الاقلام الباردة والغابات واهراج الصنوبر انحصاراً صنوبر
سمبر || جسمه معتدل القد يطول نحو ٣٠ سم. ثوبه الى
النقطة الصفراء باسكتاء الرأس فإنه اسود. مناقده غروطي
الشكل ، شديد الصلابة ، جناحه معتدل الطول. ذنبه
وتاجي الزرقاء يستدير الطرف. سقطة عينه ذهبية اللون.
رسغاه الى السرة المستقيمة || قوته الحشرات والبذور ويغزن
بلور صنوبر سمبر في تجاويف الاشجار الشفرة كزخمية
لفصل الشتاء || يطن عشه في الاشجار القريبة من سطح
التربة. الاثنى تنبع من ه الى ٧ بيضات تحضنها وسدعا
نحو ١٧ بيضاً بينا الذكر يزئن لما للفداء.



زرف

١٢٤١٩ - زُرْفُوكِيوم

Zirconium

معادن دهايمي الاثوم مركزة بين الاوليوبديوم والسيليديوم.
رمزه (زر - Zr) وزنه الاثمي ٨٩.٩٦.

١٢٤٢٠ - زُرْفُوكِيَا

Murne (F). Moray (E).

هي الشقيق « من الاسماك البحرية المفترسة » الحلبا .

١٢٤٢١ - زُرْفُوب

هو القلقوس ، الحلبه .

١٢٤٢٢ - زُرْفُوكَة

Penil (F). Penila, Penial (E).

الجزء الخارجي العلوي من الفرج .

١٢٤٢٣ - زُرْفُوكَا * ، زُرْفُوكَة

Zingiber zerumbet, Anomum zerumbet (S). Zerum-
bet, Amome sauvage (F). Wild ginger, Broad leaved
ginger (E). Zerumbet, Wilder ingwer (D). Zenzero
blanco, Z. salvatico (I).

نبات بري جلمووي طبي من فصيلة الزنجبيلات منته
البلاد الحارة. مضغه يطر القم ويذبل روائح الخمر
ويصلب ومائيه. وهو منه مومي يحلل الرياح ويقرى
القلب. ساقه منتصبه حولية تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم.
اوراقها متناحية ، تفصلها سناني الشكل جامد الصفعة .
ازهارها هامة كبيرة القند ، كبريتية اللون .



زرباد

١٢٤٢٤ - زُرْفُوكَة ، زَهْرُ التلحج

Chionanthus (S). Chionanthus, Arbre de neige, A.
à franges (F). Fringe tree, Snow-drop (E). Schne-
flockenbaum (D). Chionanto, Fior di neve (I).

جنس اشجار وشجيرات وشجيرات برية وزرنيية من فصيلة
الجذيونيات. جذوعها اسطوانية. فروعها وانفادع مسطحة .
اوراقها عابلة متعاقبة بسيطة الشكل الجلد. ازهارها
مشكولية التنجبع ، ثلاثية التركيب ، يضلح اللون || اشهر
انواعها الازرنيية مايل .

١٢٤٢٥ - زُرْفُوكَة الشَّرْقِيَّة * ، زُرْفُوكَة صِينِيَّة

Chionanthus retusa (S). Chionanthus de Chine (F).

شجرة سبروتية تملو من ٣ الى ١٠ اثمار . اوراقها اطيحية
مقطوعة القاطعة ، مدببة البصعة. تفصلها يطول من ٤ الى
٧ سم. ويغرس من ٣ الى ٤ . مرقه باردة خلية البشرة .
مشكولها الزهري منتصب الاوتكاز ، ازهاره عطرية الورد
صغيرة القند تطول نحو ٢ سم. || ازهارها يستمر من
ايار الى حزيران .



زربوك الشرق

١٢٤٢٦ - زُرْفُوكَة فِيرْجِينِيَّة

Chionanthus virginica (S). Chionanthus de
Virginie (F).

شجرة سبروتية تملو من ٣ الى ١٠ اثمار . اوراقها
سنانية البصل الجملد تطول من ٨ الى ٢٥ سم. وتعرض
من ٣ الى ٩ سم. || مشكولها الزهري مثالي الاوتكاز .

١٢٤١٧ - زُرْفُوكَا *

Congridae (S).

Congridae (F). Congridae (E).

فصيلة اسماك بحرية مفترسة يبيض من مفتوحات اللغاتات .
اجناسها وانواعها الممرقة عديدة ، معظمها من احاديث
الحقية البياضينة من الاباج الثاني . اما المناصر منها فقليل
العدد يقضي الى جنس واحد يقى زرقوم || اسطائها بحار
البلاد الحارة والمنطقة الحارة . اجسامها مسطيلة ، عادمة



زرقوبة مبدولة

١٧٤٣٦ - زُوبِيَجَة * ، اُرُوَا كَرَكِي

Agrostis verticillata (S). *Agrostide verticillée* (F).
Switch grass (E). *Haargras* (D). *Pennacchini* (I).

نبات عشبي بري حولي من النجيليات يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. أوراقه سنائية ضيقة التجميع. يكثر في الأتربة الموصلة الاندماج والرطوبة، ترعاء للماشية وتستخدمه.

١٧٤٣٧ - زُوبِيَرَة * ، زَعْفَرَان الجَبَلِ * ، زَعْفَرَان

Bulbocodium vernum (S). **المرج**
Bulbocode princaiter, *Campanetta* (F). *Meadow saffron* (E). *Lichtblume* (D). *Colchico di Spagna*, *Croco rosso* (I).

نبات يسلي بري من فصيلة السورجانيات يكثر في البلاد الجبلية والمرج الرطبة. شكله بين السورجان والزعفران. يملكه سمره اللون. أوراقه ثلاثية العدد ضيقة التصل المنسلط المحجن. شراخه قرمي الانتشاب يعلو من ٥ الى ٣٠ سم. زهرته وردية أو بنفسجية اللون، قمية الشكل في أزهاره ينمو من نيسان الى حزيران يقال ان أزهاره صبغتها الجبال لا تخلو من القوائد الطيبة غير المقررة.

١٧٤٣٨ - زُوبِيَعَة

Emblavure (F). *Land sown with wheat etc.* (E).

هو الحقل وكل مزدوع سمه وكرب وبلد وأثير.

١٧٤٣٩ - زُوبِيَعَاء * هي رباح النابون، اخلبه.

١٧٤٤٠ - زُوبِيَعَاء * هي الفخلة السوديّة طائر من الدغل.

١٧٤٤١ - زُوبِيَعَاء * شَلْبَعَة عَرَبِيَّة * ، أَم ذَنْقِيَس

Eutropius niloticus (S).
سمكة نهرية حاكولة من فصيلة السلوريات يكثر وجودها في النيل والنيجر.

١٧٤٤٢ - زُؤَرُوب * ، زُؤَرُوبَات

Zosterops (S). *Zosterops* (F). *Zosterops* (E).
طائر من فصيلة الزئطروبيات. موطنه بعض الأقاليم الحارة من الشرق الاوسط وأفريقية الشرقية والنيالية في جسمه صغير القد اعين القوام بطول نحو ١٢ سم. ثوبه الى الخضار الزهري. رأسه وجناحه وذنبه الى الخضار اللامس. عيناه مطبقتان بالابيض. حنقه عينه الى الخضار الزهري. متقاربه رقيق ويحمل. رسنه رفيقان اسمران في قوته الحشرات الصغيرة والفراش والذباب والحمام في يذلن في الاجمار الرميّة. الاثت تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بتناوبة الذكر نحو ١٣ يوما.

١٧٤٤٣ - زُؤَرُوبِيَات * ، زُؤَرُوبِيَات

Zosteropidae (S). *Zosteropidae* (F). *Zosteropidae* (E).
فصيلة طير من الجوارم ريفات المناظر. اجناسها وأنواعها المعروفة نحو ٨٠ موطنها معظم المناطق الحارة من العالم القديم. تألف الثنايات والاسرار والحدائق وتقترب من المساكن الريفية في اجسامها صغيرة القد، رشيقة القوام. أثوابها متباينة التخفيف يكثر فيها الاخضر في ثوبها الحشرات الصغيرة والفراش والذباب والحمام وبعض البذور البرية.

١٧٤٤٤ - زُصْبِج * ، زُصْبِج

هو النيم الابيض الرقيق الخفيف البعيد.

أزهاره عطرية العرف تطلع من ٢ الى ٣ سم. في أزهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٧٤٤٧ - زُرُونُف

Ruisseau (F). *Rivulet* (E).
هو الجدول النافوي الذي يسحب في الحجر. ج زرايف.

١٧٤٤٨ - زُرُونِيَج

عنصر شبه معدني سحابي اللون عديم الرائحة والعلم يوجد في الطبيعة متزجاً بغيره من العناصر بكميات غشيلة متفاوتة القدر كما انه يوجد في ماء البحر وفي جسم الانسان (ز - As) وزنه الذري ٧٤.٩١. ثقله النوعي اذا كان متلوها ٧.٥ وان كان لا متلوها ٥.٧. يستمد باستخلاصه من مركباته الطبيعية وهو مع مركباته الصناعية من العناصر السامة المتعالة. مركباته الصناعية عديدة تستخدم في شتى الحقول اخصها مقاومة وابادة الحشرات الزراعية كما انها تستعمل في تلطب تقوية البنية وفي علاج بعض الامراض الجلدية.

١٧٤٤٩ - زُرُونِيَج أَحْمَر

Réalgar (F). *Realgar* (E).
هو كبريتور الزرنيخ الطبيعي.

١٧٤٥٠ - زُرُونِيَعَات (E). *Arsenates* (F).

مركبات صناعية ترتكز على الزرنيخ تستعمل في مكانة الحشرات النباتية. اهمها استخلاص:

Arsénate de plomb (F). *Lead arsenate* (E).

Arsénate de cuivre (F). *Copper arsenate* (E).

Arsénate de soude (F). *Salt-wort arsenate* (E).

١٧٤٥١ - زُرُون * ، زُؤَر العَرَبِي

Crossandra (S). *Crossandre* (F). *Crossander tree* (E). *Franzenbeutel* (D). *Crossandra* (I).
جنس جنباث تريينية مصرية من فصيلة الاقتنيات. انواعه خمسة منها الهند وأفريقية الشرقية. أوراقها اهليجية متعاقبة. أزهارها نوري التجميع، بحوري الارتكاز. أزهارها عطرية مستندرة البتلات القارشة الجبلية الشكل. ألوانها تختلف مع انواعها منها الابيض والاسفر والاحمر والمخض.

١٧٤٥٢ - زُرُونِيَاب * ، زُؤَر (E). *Geal* (F).

جنس طير من فصيلة الغراييات وربة الجوارم. انواعه ١٢ جميعها بقدر الامة. رؤوسها كبيرة، منقارها جالسة قوية. أثوابا ملونة بجلة الزاويق. في وهو يقبض الاصول كالبيداء. قوته جميع انواع الحشرات الكبيرة والقار والظاء والمساكن الصغيرة والبلوط والحبوب والبار. أشهر انواعه ابو زريق والقيق.

١٧٤٥٣ - زُرُونِيَعَة

Enclos (F). *Enclosure*, *Paddock* (E).
هي الحظيرة من خشب تحجز فيها المواشي.

١٧٤٥٤ - زُرُونِيَعَة اخْضَر

Porcherie (F). *Pigsty*, *Piggery* (E).
هي الخزانة ملوى الخنازير.

١٧٤٥٥ - زُرُونِيَعَة الطُيُور

هي الحريمة، اطلها.



زورين



زورباب



زُرِيَعَة



زوربة



زورطب

اوراقه مذبذبة القاعدة ، تصلها ادم التقصيص او قليله اخضر اللون على صفحته ، ازغب الصفحة السفلى .
نورته الزهرية كثيفة تعد من ١٥ الى ٢٠ زهرة ، زبد الجسم ، حشرية الاسدية . ثماره حراء اللون ، صغيرة لثد ، قطرها يراوح من ٤ الى ٧ سم .

١٢٤٥٤ - زُحُرُور زُطْبُوب

Crataegus tomentosa (S). *Aubépine tomenteuse*, *Epine tomenteuse* (F).

نوع من الزحورود يملو من ٥ الى ٦ أمتار . شوكه متدل لثد قليل الكثافة شديد الصلابة . اوراقه بيضيه مبيضة الشكل ، زبد النصل على صفحته . نورته تعد من ٢ الى ٧ أمتار . زهرته حشرية الاسدية الحراء اللون ، ثماره بيضيه او اجاصيه الشكل ، برتقالية اللون .

١٢٤٥٥ - زُحُرُور أُسُود ، بُونْت

Crataegus nigra (S). *Aubépine noire*, *Epine noire* (F).
نوع من الزحورود يملو نحو ٣ أمتار . اوراقه مذبذبة النصوص . تصلها خلى البشرة على صفحته . نورته متوسطة لثد تعد من ٥ الى ١٢ زهرة . زهرته كروية الاسدية ، خاسية اللقأت والثرغفات ، ثماره كروية الشكل ، لونها الى السواد ، قطرها نحو ٢ سم .



زجيرة

١٢٤٥٦ - زُحُرُور أَصْفَر

Crataegus flava (S).
Aubépine jaune, *Epine jaune* (F).
نوع من الزحورود يملو من ٢ الى ٣ أمتار . اوراقه مذبذبة القاعدة ، تصلها ادم التقصيص او قليله ، لونه الى الخضار البشري تملو غده مستطلة حراء اللون ، نورته تعد من ٢ الى ٥ أمتار . زهرته كبيرة لثد حشرية الاسدية الوردية اللون . ثماره صفراء اللون ، برتقالية المراجع ، قطرها يراوح بين ١٢ و ٢٠ سم .

١٢٤٥٧ - زُحُرُور الأودية ، زُحُرُور أَحَادِي

Crataegus monogyna (S).
Aubépine monogyna, *Noble épine* (F). *Hawthorn* (E), *Spitsdorn* (D), *Bianco spino* (I).

نوع من الزحورود ، هربي الشكل ، يرغب في الاودية . يملو من ٤ الى ٥ أمتار . اوراقه باقطة التقصيص . تصلها ستن الحافة ازغب الصلع والبروق على الصفحة السفلى . نورته تعد من ٧ الى ١٢ زهرة . زهرته احادية الفقة والثرغفة ، ثماره فردية للجمعة ، مختلفة الالوان ، فيها الاصفر والبرتقالي والاحمر جميعا صغيرة لثد قطرها نحو ١٠ سم .



زحورود الاودية

١٢٤٥٨ - زُحُرُور أُفْرِيكِيَّة

هو الاعراس الافريقي ، اطلبه .

١٢٤٥٩ - زُحُرُور جِرْمَانِي

هو الملسة ، اطلبه .

١٢٤٦٠ - زُحُرُور غَوْنِي

Crataegus prunifolia (S). *Aubépine à feuilles de prunier*, *Epine à feuilles de prunier* (F).

نوع من الزحورود يملو من ٣ الى عشرة أمتار شوكه قصير لثد . اوراقه غشوية الشكل تصلها خلى الصلع والبروق على صفحته السفلى . نورته تعد نحو ١٢ زهرة . زهرته خلية الجسم ، حشرية الاسدية . ثماره صفيرة لثد بيضيه الشكل حراء اللون ناشفة السيقة .

١٢٤٦١ - زُحُرُور سِيْنَا ، زُحُرُور مَوْنِي

ومنهم من قال طيق موسى . يعرف بشوك النار ، اطلبه .

١٢٤٥٥ - زُحُبَل *Cotonnier* (F). *Cotton-tree* (E).
هو جنبه القطن في زين حلها .

١٢٤٥٦ - زُحُبَلَة *Seau* (F). *Pail*, *Bucket* (E).
دلو يستقى بها .

١٢٤٥٧ - زُحُبُوب *Microrrhiza* (F).
نمت تعريفه يطلق على كل نبات صغير الجذور حقيقة .

١٢٤٥٨ - زُحُبُوبَة * *Nepticula* (S).
Nepticule (F). *Nepticula* (E).

حشرة من فصيلة الزيرليات ورتبة حشرقيات الاجنحة . اصطناعا بعض مناطق البلاد المتدلة الحرارة . تألف المراجع التي تذكر فيها السوليات || جسمها صغير لثد ، كثيف الخمل . سطحا نحو ٧ سم . رأسها متدل الجسم . عظمها صغير . ملسا قمران . صيها صيرتان ، بارزتان . زباناها عيطان . جناحهاا الخلفيين مستعرضا الاهداب . ظنايب قاصمها الخلفيين رباعية المناسخ الحادة . ثوبا الى البني . اجنحتها مجمعة بالآخر || الاثنى امين قدأ من الذكر واجبت ثوبا من || السرعة لالمة ، تموش على وزن النصال . تركيب جميع نباتات الفصيلة السولية .

١٢٤٥٩ - زُحُبُوبَات * *Nepticulidae*,
Stigmellidae (S). *Nepticulidés*, *Stigmellidés* (F).
Nepticulidae, *Stigmellidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المبرورة نحو ٢٢٠ منشرة في جميع اقطار العالم || اجناسها تعد من ٣٠٠٠ جنس . كثافة الخمل . رؤوسها متدلة الجسم . عظمهاا وملابسها صغيرة . صيها صغيرة . بارزة . قرنها الاستشعارية عيطية . مسطيلة . اجنحتها عيطية . مسطيلة . اهداب اجنحتها الخلفية ودية . ظنايب قواصمها الخلفية رباعية المناسخ . بطونها مستعصمة . الثوباها حبيابة الالوان || اساريها لالمة . اكمال عاداتها يتم على نصال الارواح الملتوية ضمن فهاج متدلة الخبال || اشهر اجناسها الزبوبة .

١٢٤٥٠ - زُحُتَر هو ستر البر ، اطلبه .

١٢٤٥١ - زُحُرُور *Crataegus* (S). *Aubépine*,
Epine (F). *Hawthorn*, *White thorn*, *May* (E).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة الورديات انواعه مذبذبة يصلها كثير الورد في جبال حوض البحر المتوسط . تتميز بشوكها وصلابة اعشاشها . اوراقها جامدة النصل . انزعاجها نورية للتجميع صغيرة لثد . ثمارها حنية الشكل مختلفة الالوان قل منها المأكول . اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

١٢٤٥٢ - زُحُرُور أَحْمَر *Crataegus sanguinea* (S).
Aubépine rouge sang, *Epine rouge sang* (F).

نوع من الزحورود يرغب في الاقاليم الباردة يملو من ٣ الى ٥ أمتار . الشواكه قليلة . فروعه حراء الملمد . اوراقه بيضيه مقصصة . نورته قليلة الزهر . زهرته حشرية الاسدية . ثماره صغيرة لثد قطرها نحو ١١ مم . لونها الى الحمرة الدموية .

١٢٤٥٣ - زُحُرُور أَخْضَر *Crataegus viridis* (S).
Aubépine verte, *Epine verte* (F).

نوع من الزحورود يملو من مترين الى عشرة أمتار .

12468 - زُعرور شائك * **كُتَف**
Plastron
الحاف الجزء الامامي من كوتل الحشرة وحاف الجزء السفلي من السلخانة .

12469 - زُعروران ، جدادي ، جَسَد ،
جِيَهَسَان ، ذَهَبْكَان ، رَادَن ،
رِيَهْكَان ، صَفْرَان ، كُوكِيَاَس ، زُكْبِيل
Crocus (S). Safran, Crocus (F). Saffron, Crocus (E).
جنس نباتات بصلية من فصيلة السونيات . انواعه
وضروبه واهاله عديدة منها البرية والزراعية معظمها
صباغي وبعضها طبي || تجارتها قصيرة القعد . انزعارها
اوراقها مستطيلة انابيا دقيقة الجسم بقية الطرف . اوراقها
ضيقة البصل الخدد || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

12470 - زُعروران ابيض
Crocus candidus (S).
Safran blanc, Crocus blanc (F). White saffron (E).
نوع من الزعفران شراعه يملو من ٨ الى ١٥ سم .
زهرة بيضاء البتلات ، صفراء المتق الداخل . سماتها
كاملة مهدبة ، شرعافها عادي || اوراقها خيشية مستطيلة ،
ماسة البصل . انزعارها يستمر من اذار الى نيسان .

12471 - زُعروران الجبل ، زُعروران المَرْج
هو الزورقة نبات بصل من السونيات . اطله .

12472 - زُعروران الربيع
Crocus vernus (S).
Safran printanier, Crocus printanier (F).
نوع من الزعفران . ضروبه كثيرة المدد . شراعه يملو
من ٦ الى ٢٥ سم . زهرته بنفسجية اللون خلية البتق
صفراء الانبوب . سماتها كاملة . شرعافها عادي || اوراقها
مستعرضة ، عرض نصفها يراوح بين ٥ و ٨ سم .
انزعارها يستمر من شباط الى اذار .

12473 - زُعروران ثنائي الزهر
Crocus biflorus (S). Safran biflore, Crocus biflore (F).
نوع من الزعفران ضروبه كثيرة المدد والالوان . شرعافه
يملو من ٨ الى ١٦ سم . زهرته صفراء الصلحة الخارجية
بيضاء او زرقاء الداخلة . سماتها كاملة ، شرعافها
عادي || اوراقها ضيقة البصل المتصل بالانسالب البتلة || انزعارها
يستمر من كانون الى شباط .

12474 - زُعروران ذهبي
Crocus chrysanthus (S). Safran jaune d'or, Crocus
jaune d'or (F).
نوع من الزعفران مهدب البتق الاوسط والبالقان ، شرعافه
يملو من ٥ الى ٨ سم . زهرته ذهبية اللون ، بترقالية المتق،
صفراء الانبوب . سماتها جزئية مهدبة . شرعافها عادي .
اوراقها خيشية ، معتدلة البصل ، خشنة الملمس || انزعارها
يستمر طوال شهر اذار .

12475 - زُعروران سُوري
Crocus syriacus (S).
Safran de Syrie, Crocus de Syrie (F).
نوع من الزعفران يكثر بحدوده في البلاد السورية .
شرعافه يملو من ٨ الى ١٢ سم . زهرته صفراء اللون
يملوها توشيح بايق . سماتها كاملة . شرعافها عادي .
اوراقها ضيقة معتدلة الطول || انزعارها يستمر من كانون
الى اذار .

12476 - زُعرور شائك * **شَرْكَه حَادَة**
Crataegus oxyacantha (S). Aubépine commune,
Epine blanche, Senelle (F). White thorn, May-bush,
Quick (E). Gemeiner dorn, Hagedorn (D). Marruca
blanca, Blancospino, Ceresella (I).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى ٥ أمتار . شوكه معتدل
القعد ، كثيف التجميع . اوراقه مقصصة . نصفها مسنن
الحافة على الصلحة السفلى . ثورته تمد من ٧ الى ١٢
زهرة . زهرته ثنائية للفة والبريق . ثمار ثنائية السجة ،
مختلفة الالوان لها الاصفر والاحمر . جبهما متوسطة
القعد ، قطرها نحو ١٥ م .

12477 - زُعرور شرقي
Crataegus orientalis (S). Aubépine d'Orient, Epine
d'Orient (F). Eastern thorn (E). Weissdorn (D).
Lazzaruolo d'Orient (I).

نوع من الزعرور يملو من ٥ الى ٩ أمتار . اوراقه قليلة
التفصيص ، نصفها كانه اللون على البشرة على صفحته .
ثورته كثيفة التجميع تمد من ٧ الى ١٥ زهرة . زهرته
رباعية او خمسية الملققات والبريقات ، ثماره صغيرة
القعد جميعها حجم الكرز البادي .

12478 - زُعرور صيفي
Crataegus crus-galli (S). Aubépine ergot de coq.
Epine ergot de coq (F).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى ١٥ أمتار . شوكه
مستطيل نحيل . اوراقه اطيالية الشكل ، مسنة الحافة ،
عامة التفصيص او قليلة . نصفها لامع البشرة على
صفحة ائليا . ثورته الزهرية تمد من ١٥ الى ٢٥ .
زهرة عشارية الاسدية الوردية اللون . ثماره الى الحمرة ،
صغيرة القعد ، ناعمة البوق .

12479 - زُعرور عادي * **بَلْكَ**
Crataegus azarolus (S). Aubépine azaroller, Azérolier,
Argéroller (F). Azerole tree, Neapolitan medlar
(E). Azaroldorn, Azarolbaum (D). Azzarolo, Azza-
ruolo (I).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى ١٢ م . شوكه قليل
الكثافة معتدل القعد . اوراقه قليلة التفصيص نصفها
لامع الصلحة العليا ، على السفلى . ثورته تمد من ٥
الى ٧ انزعار . زهرته ثنائية او ثلاثية الملققات والبريقات .
ثماره لليلة العلم ، كبيرة القعد ، قطرها نحو ٢ سم .

12480 - زُعرور قرمي
Crataegus coccinea (S). Aubépine écarlate, Epine
écarlate (F).

نوع من الزعرور يملو من ٢ الى ٧ أمتار . اوراقه
قلبية او مغنولية المقعدة . نصفها دائم التفصيص لونه
الى الخضار الباهت ، ثورته الزهرية متوسطة الكثافة .
زهرة خلية الجسم ، عشارية الاسدية . ثماره قرمزية اللون
قطرها يراوح من ٨ الى ١٥ م .

12481 - زُعرور قلبي
Crataegus cordata, C. phoenopyrum (S). Aubépine
à feuilles en coeur (F).

نوع من الزعرور يملو من ٥ الى ٩ أمتار . اوراقه
قلبية الشكل ثلاثية التفصيص . ثورته صغيرة القعد تمد من
٣ الى ٥ انزعار . زهرته عشارية الاسدية . ثماره حمر
اللون ، صغيرة القعد ، قطرها يراوح من ٨ الى ١٥ م .



زعرور شائك



زعرور عادي



زعفران طويل الزهرة

١٢٤٨١ - زَعْفَرَان *
Hesperophanes (S).

Hesperophane (F).
جنس حشرات غاشية من فصيلة القزبيات. أنواعه عديدة، جميعها متصلة الله، مستطيلة الشكل، طولها يراوح بين ١٤ و ٢٢ م. أجسامها زاهية، قرنها الاستشعارية مستطيلة منقطة. ألوان ألوانها تراوح بين الخشن والبي. تسرح من الغروب إلى الفجر. يرقاها تركيب وتنشر جميع أنواع الخشب اليابس بما فيها الاششاب المشغولة الخشبية.



زعفران لُبْنَانِي



زعفران غَزَنِي



زعفران



زعفران اربك



زعفران

١٢٤٨٢ - زَعْفَرَان لُزْمَك *
Hesperophanes cinereus (S). Hesperophane

cendrè (F). Hesperophanes cinereus (E).
حشرة غاشلة غاشية من فصيلة القزبيات ورتبة مفصليات الاجنحة. تألف اجراح السديان ورايات الحور والساكن الارضية. غناصها غاشلة تميش على اوراق النبات. يرقاها غاشية تركيب السديان والحور والاشباب الخشبية المشغولة. جسمها متوسط الله بطول من ١٦ الى ٢٢ م. ثوبا الى الشقة السوداء يطولها مراح اربك يمد الى الحبل الكثيف الاطمل اللون. رأسها مستطيل الجرم. عينها صغيرتان. زباناها مستطيلان مهدبان، ظهرها خشن الملمس الفارح اللامع. غداها متجانسة التعزيز الخفيف القاطب. كثيفات الحبل. ارساغها رباعية الشكل الظاهرة. الاثني اكبر قدما من الذكر واكد ثوبا منه واتصر زبانا. جيلها ثلاثي الحول. تظهر الحشرة الجملة في مطلع حزيران وتبقى حتى اواسط آب. تسرح من الغروب الى الفجر. البقعة بيضاء النثر تترك الكلال الجسودي بعد التقف بنحو ٢٢ شهرا. جسمها شبه مردي الشكل بطول نحو ٢٢ م. ثوبا الى الخشن الاصفر المالح. رأسها اسمر. طور الاكاد الذي يستوجب نحو ٤٠ يوما يتغني ضمن صلاجة مركبة من مواد نباتية مجبونة بالريال.

١٢٤٨٣ - زَعْفَرَان اكْبَه
Hespèrophanes gris (F).

حشرة مؤذية من القزبيات تدعى زعفران التي. اكلها.

١٢٤٨٤ - زَعْفَرَان الين *
Hesperophanes grisus (S). اكْبَه *

Hesperophanes grisus (F). Hesperophane (F).
حشرة غاشلة غاشية مؤذية من فصيلة القزبيات ورتبة مفصليات الاجنحة. تألف اجراح التي دون سواها. غناصها تميش على الازراق والجسم. يرقاها تسردب الانقاد والاعضان والجفوع. جسمها متوسط الله بطول من ١٢ الى ٢٠ م. ثوبا الى الكهية يطولها حل اربد وزنية شبهة. رأسها مستطيل الجرم. عينها كبيرتان نافذتان. زباناها مستطيلان دقيقان. ظهرها مدبب الطرف للامع. غداها كثيفات الحبل والرقبة. الاثني اكبر قدما من الذكر واجت ثوبا منه واتصر زبانا. لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملة في اواخر حزيران. تسرح في الليل. تساقط بعد ظهورها باسرع واحد. تمتع المكان وزيا تنفله مادة غروية تشبه في مكنها. بقية متد ادراكها الجسودي تطول من ٢٢ الى ٢٥ م. ثوبا الى البياض اللتي. جسمها مستطيل الرأس والصدر والقسم الاوسط من البطن وينتهي بطرف

١٢٤٨٦ - زَعْفَرَان طويل الزهرة *
Crocus longiflorus (S). Safran à longue fleur, Crocus

à longue fleur (F).

نوع من الزعفران مهدد جزر البحر المتوسط. شرعاه يملو من ١٠ الى ٢٥ سم. زهرته صفراء الانبوب، يرتقالية المتق، ليلكية البلات، يطولها تزيح بنفسجي. اسديتها صفراء. سمانها مقطوعة، يرتقالية اللون. شرعائها مستطيلة. اوراقه خضراء النصل المشغل الطول، المائل البشرة. ازهاره يستمر من تشرين الاول الى الثاني.

١٢٤٨٧ - زَعْفَرَان عُرْبَان الزهر
Crocus nudiflorus (S). Safran à fleurs nues, Crocus

à fleurs nues (F).

نوع من الزعفران شرعاه يملو من ١٠ الى ٢٠ سم. زهرته بنفسجية البلات. سمانها منقسمة، قدية الشكل يرتقالية اللون. شرعائها اري. اوراقه خضراء مستطيلة. يسلو يرسل بعد ذبول الارض لولوي وكورية مستطيلة. ازهاره يستمر من ايلول الى تشرين الثاني.

١٢٤٨٨ - زَعْفَرَان لُبْنَانِي *
Crocus zonatus (S). Safran zoné, S. du Liban, Crocus zoné (F).

نوع من الزعفران مهدد جبال لبنان شرعاه يملو من ٦ الى ١٠ سم. زهرته ليلكية اللون بتلاتها مقطوعة، صفها خلي البشرة، حاقب الصفار. انبوبها خشبي اللون. سمانها كاملة صقية الشكل. شرعائها عادي. اوراقه خيطية غشية مستطيلة. ازهاره يستمر من ايلول الى تشرين.

١٢٤٨٩ - زَعْفَرَان مَحْزُونِي *
Crocus officinalis, C. sativus (S). Safran officinal, S. d'autumnis, S. cultivé, Crocus officinal (F). Safran,

Crocus (E). Echter safran (O). Zafferano, Croco florito, Croco domesticus (I).

اعرف انواع الزعفران واسمها منذ اقدم المهدد. خروب كثيرة العدد. شرعاه يملو من ١٠ الى ٢٠ سم. زهرته بنفسجية البلات، ليلكية المتق، صفراء الانبوب. اسديتها بيضاء. سمانها حطرية الرائحة مستطيلة. شرعائها ثنائي الفلقة. اوراقه خيطية خضراء. ازهاره يستمر من ايلول الى تشرين الثاني. يستخرج من زهره وصبر يسلو زيت طيار كثير النفع. يحرق زهره حطري البرف من المذاق يستعمل في القلب وفي الروائح الطرية وفي الصباغ. والجزء الواحد من مسحه يصنع منق من الق جزء من الماء. اي ان غرابا واحدا من مسحوق الزعفران يصنع ١٠٠ لتر من الماء. ومن الوجبة الغلية فازعفران يملو البحر ويقوي الاصايب وينفض القلب ويعمره ويحب البياه ويدبر البول والطمث ويسهل الولادة اذا تسمرت، وهو مفاد للتشنج ويمنطر في الاذن فيمكن آلاها.

١٢٤٩٠ - زَعْفَرَان مَوْشَح
Crocus versicolor (S). Safran versicolore, Crocus versicolore (F).

نوع من الزعفران شرعاه يملو من ١٠ الى ٢٠ سم. يسلو عند قاعدته شرعاه قصير. زهرته حطرية الرائحة. يسلو اللون، موشحة بالنفسجي. سمانها كاملة. شرعائها مزدوج التركيب. اوراقه خيطية، مستطيلة، خلية النصل. ازهاره يستمر من شباط الى اذار.

يرقاتها غبراء اللون، قصيرة القد، تركيب جلود الكرة فترقشها وتخرشها.

١٢٤٩٠ - زُعْفُوقُ النَّخْلِ*، مَكْرُومُ النَّخْلِ*
Macrotoma palmata (S). Macrotonne du palmier (F).
حشرة خاشبة من القزنيبات طويلة نحو ٤ سم. لونها إلى البصرة الخطية. زباناها طويلة متعقبة. تسرح في الليل. تمتص مكثا على جلود النخل فينتفخ عن رقات غبراء اللون، زبأ الجسم، سوداء الملب تنخر الجلود وتطعنها.

١٢٤٩١ - زُعْفُوقِيَّاتُ*
هي القزنيبات فصيلة حشرات من غدييات الاجنحة، اطليها.

١٢٤٩٢ - زُعْفُوكَةُ
انزعفة هي عضو الحركة الانقباضية في الحيوانات المائية، ج زعانف، ولزعانف تقسم حسب موالها في الجسم إلى: سديرة وبعنية وظهيرة وشرجية وذنيية.

١٢٤٩٣ - زُعْفُوقِيَّاتُ الْأَقْدَامِ
Pinnipèdes (F). Pinnipedia (E).
رتبة حيوانات لبونة ألفن حياة البسر والبر. انواعها المعاصرة المعروفة ٣٦ تنقسم إلى ١٢ جنس ينجمها ثلاث فصائل كما هو مبين في الجدول التالي || اجسامها شبه وسمية الشكل، متفارقة الطول والحجم. اطولها تراوح من ١٧٥ الى ٢٥٠ سم. رؤوسها مكورة. هيونا كبيرة جاسطة. اذنانها ومناسقها ملحومة. اسنانها متباينة الاشكال والجمود لكنها وحيدة الصيغة عند كل فصيلة. اعناقها قصيرة واذناتها كالك. قوائمها خاصة افرع الكمامة الخطاب والمقلوبة ما يحمله كازماناف || قوائم الاسماك والقرنات والزعنجات. ملجتها الحيالي يختلف مع اختلاف الانواع. معظمها غمرى، جماعي وبضها زويبي.

١٢٤٩٤ - زُعْبُ
Croussement (F). Croak, Croaking (E).
الزعب هو صوت الغراب كالنبيب والنبيق.

١٢٤٩٥ - زُعْبُشَمَانُ
هو الزغرط، اطليه.

١٢٤٩٦ - زُعْفَارِي*، شُرْشُورُ جَبَلِي*
Fringilla montifringilla (S). Pinson de montagne, P. d'Ardennes (F). Mountain finch, Brambling (E). Bergfink (D).

نوع من الشرشور طوله من ١٨ الى ١٩ سم. رأسه وظهوره ذهبي إلى السواد الأزرق. جناحه مخطط بالأبيض. عيقه وسدره إلى الصبغة البرتقالية. بطنه وزيكاه بيض. انقلبه مرقشان بالأسود || يعيش اسراب كبيرة تجوب البلاد في طلب الحبوب والنبات. قوته الحشرات اخصها الذباب ثم زود النباتات الزرقية اخصها البرية || ينش في الانحجار. اثناء تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بتناوبة الذكر نحو اسبوعين.

١٢٤٩٧ - زُعْفَاغُ*
Cycloconium
جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة الفطريات جربه الكتيديية مهمة الشكل والترتيب. هيفه يجوب المناطق الخلوية داخل السافات الادمية الى ان يتحرق

مذيب || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ينغفي في النفق الذي احفرته البرقة.

١٢٤٩٥ - زُعْفُطَانُ الْخَرْثُوبِ*، زُعْفُطَانُ مَلَمَمٌ*
Hesperophanes fasciculatus (S). Hespérophanes fasciculatus, Longicorne du caroubier (F). Hesperophanes fasciculatus (E).

حشرة خاشبة مؤذية من فصيلة القزنيبات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألف الاشجار الزراعية والبرية اخصها الخربوب والين والتوت والبلوط والفتق والذليل... خنافسها تعيش على الارواق. يرقاتها تسردب الافناد والاغصان والجلود الاخضر منها واليابس فتطعنها وتزدها || جسمها متوسط القد بطول من ٢ الى ٢٠ سم. ثوبا الى الكلمة يطولها زغب الحبل ومغشة وبذاء. رأسها مستدق الجرم. هيانها كبيرتان. زباناها حديقان مستطيلان. ظهرانها مستطيط المسطح، مستدير المؤخر الاسف. غدها كتيفا الحبل والتمشيش || الاثني اكر قد من الذكر واكد ثوبا منه ولتصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملقة في اواسط حزيران. تسرح في الليل. تساه بعد ظهورها ياسور واحد. تمتع الممكن تحت الحياء وبين القشور || البرقة، عند بلوغها الادراك التام، تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. جسمها مردي الشكل، حنطلي اللون، اغبر الملوخ، اسمر الرأس والفكين والشرج، ميمر الهلب التضمير النقيق.

١٢٤٩٦ - زُعْفِي
Vireux (F). Vireux, Noxious (E).
نمت تعريفي يطلق على النباتات او المواد النباتية التي راعتها الكربية وطعمها الحس يئان عن وجود عنصر ضال قد يكون جسامي المادة.

١٢٤٩٧ - زُعْفُوقُ الْأَعْمِدَةِ*، هِيلُورُوبُ*
Hyloterpus bajulus, Callidium bajulus (S). Hyloterpe, Longicorne des charpentiers, Capricorne domestique (F). House longhorned beetle (E). Hausbock, Balkenbock (D).
حشرة خاشبة من فصيلة القزنيبات طويلة نحو ١٦ سم. لونها إلى البصرة الخطية قملوها زغبة غبراء || تركيب الصدور حيث تمتص مكثا فينتفخ عن رقات تنخر الخشب وتطعنها. تمرى بنوع خاص اعمدة التلفون وما اشبه.

١٢٤٩٨ - زُعْفُوقُ الْحِنْطَةِ*
Calamobius filum (S). Âgulfionnier, Saperde grêle (F). Grain borer (E). Getreidebohrrer (D).
حشرة خاشبة من القزنيبات صغيرة القد طولا نحو ١٢ سم. لونها إلى البصرة قملوها زغبة ملعلاء. قرنها الاستشعارية دقيقة وطويلة || تظهر في اواخر ايار، تمتص مكثا على قصب الحنطة تحت النابل فينتفخ عن رقات صغيرة تنخر القصبه وتقوضها تقصب كسرها وسقروا السنبلة على الارض.

١٢٤٩٩ - زُعْفُوقُ الْكَرْمَةِ*
Vesperus xatarti (S). Vespère des vignes (F). Grape vesperus (E). Vesperus xatarti (D).
حشرة من القزنيبات طويلة نحو ٢٠ سم. لونها إلى الصفار الحنطي. زباناها مستطيلة. انائها نصفية القد المنرج.



زُعْفُطَانُ الْخَرْثُوبِ



زُعْفُوقُ الْأَعْمِدَةِ



زُعْفُوقُ الْحِنْطَةِ



زُعْفُوقُ الْكَرْمَةِ (ذَكَرُ وَانْثَى)



زُعْفُوقُ النَّخْلِ



زُعْفَارِي

زغغيات الأقسام

المصيلة	عدد الأجناس والأنواع	أشهر الأنواع
أُتَارِيَات	جنس واحد ١١ نوعاً	أُتَارِيَة عَرَقَاء. أُمَدُ الْجَبَر أُتَارِيَة مَيْطَلَر أُتَارِيَة كَلْفُورِيَّة أُتَارِيَة دِيَّة
قُدِّيَّات	عشرة أجناس و٢٣ نوعاً	قُدَّة مَدُونَة قُدَّة غَرْبَنَة قُدَّة حَيْثِيَّة شَيْخُ الْجَبَر قُدَّة نَوْرَجَة مَعْرِيْس قُدَّ الْجَبَر
فُطِّيَّات	جنس واحد ونوعان	فُطَّ

الادمة ليكون جرابه الكتيدي الذي تملوه سبعة من الكتلانده المؤثرة الكروية الشكل، السمره اللون. انواعه قليلة اعرفها زغاغ الزيتون.

١٢٤٩٨ - زُغَاغُ الزَيْتُون *
Cycloconium oleagineum (S). Gel de pain des feuilles d'olivier (F).

نظر مجهري ركب زواتين حوضي البحر المتوسط. مظهره الخارجي يقع قريبا تشبه عين الطاووس، حجمها براوح من ٦ الى ١٠ م. ركب نصال الاوراق البالغة على صفتحتها. تظهر في اواسط الصيف وتقوم حتى اواخر الشتاء حيث تنقلص رويدا رويدا. تبدو سمره اللون سواء المحور واختار. تكثر على الصفة العليا وتقل على السفلى وقد تصيب المالحيق والتوامي || يكافح باستعمال سائل بودور على ثلاث مرات. الاول خلال شهر آب والثانية في تشرين الاول والثالثة في شباط.

١٢٤٩٩ - زُغَاغُ هُو الاثنا السفىءء اطليا.

١٢٥٠٠ - زُغْبُوب Figue-fleur (F). Fig-flower (E). ضرب من التين كبير لقد سميك التفشور سلم الطم.

١٢٥٠١ - زُغْبُوب Duvet (F). Dowa (E). اول ما يبدو من الزئيش والشر وتقل صفارها ولونها. وهو في بعض الازداد والتأخر (Bloom).

١٢٥٠٢ - زُغْبَابَة Stigma جنس فطور مجهرية من عارة الريدانيات وفضيلة الطحيات || جربه الكنديية قصيرة ديبية، قهبرية التجميع. كئانه فردية ء موءورة ء بيضية او مردنية الشكل || انواعه قليلة المدد والاذى اعرفها زغبارة الدلب وزغبارة المشش.

١٢٥٠٣ - زُغْبَابَة الدُّلْب Stigma placani (S). نظر مجهري يدري الدلب باراقه. مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة قطرها نحو ٢ م. ركب النصل على

صلفته السفلى. تبغو حطبة الزيتون ثم سمره || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة.

١٢٥٠٤ - زُغْبَابَة المِشْش *
Stigma briosiana (S).

نظر مجهري ركب ثمار المشش في طور نمو الاخير. مظهره الخارجي يقع مستديرة مقللة اللون ء حراء الخمار ركب بشرة الثمرة فتقرسها وتقودها الى الاطلاق بعد ان تغير لمعها الذي يكتبس بعض المرارة.

١٢٥٠٥ - زُغْبُوب * Muscardinus (S). Muscardin (F). Smil dormouse (E).

جنس حيوانات قاضمة من فصيلة قترقنيات. انواعه قليلة ء موطنها الشرق الاذن واروبة || جسمها صغير القد طوله ٨ سم. وذئها ٧. رأسها اسنبي الشكل. صيئها مستديرة. اذئها بارقان كيرتان. ويرها لبد الزئيب التام القصير. ذئها اسطواني. رأسها وظهرا وذئها الى الصغية السئانية يلما موج اوب. عئها وبعئها الى البياض الاغبر || تألف الثبايات والاذغال القربية من الحقول المزدرة. تتسلق الاشجار بئقة. قترها اليتق والجزء والحطبة وتختلف الثار البنية اعصها الصغرة. الاثى قطع ء ادواس تبسر وتكسي بمد وضعها باسويين. بياها الشئري يئوم نحو سة شعور. جبرها وكن قدره في صدع شجرة تقترش بالحشيش التام والصوف.

١٢٥٠٦ - زُغْبُوب هُو الزفنج ء اطليا.

١٢٥٠٧ - زُغْبُوب هُو ابن اوى ء راجحه.

١٢٥٠٨ - زُغْبُوب Amaraca (F). Amaracus (E).

ضرب من اللرو وقيل اللوق خلي النصل مستحب اللرف.

١٢٥٠٩ - زُغْبُورَة Stigmella

جنس فطور مجهرية من عارة الزحاميات وفضيلة الطحيات. كئانه بيضية قياسها نحو ٩X١٤ ميكرون.



زغاغ الزيتون



زغبارة المشش



زغبة

الى الصفار الباهت || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

Primula sinensis (S). زُعْدَةُ الصَّيْنِ
Primèvere de Chine (F).

عشبة معمرة ريفية تعيش في المزارك . اوراقها مقصصة رحلة ، نصلها خلى البشرة حبيش المسام الزرقية || شرانخها يملو من ١٥ الى ٣٥ سم . ازهاره ثلاثية الأتراس المتراكبة . زهرته خفيفة البوق ، مستحثة القاعدة المستعرضة . لونها يختلف مع الشروب منها الياض والوردي والازرق والاحمر والبنيصبي || ازهارها يستمر طوال الشتاء .

Primula glutinosa (S). زُعْدَةُ دَقِيقَةٍ
Primèvere glutineuse (F).

عشبة معمرة سبوتية اوراقها مستطيلة مغروية ، نصلها غدي البشرة البنية ، حناره مشفاري التنين || شرانخها يملو نحو ١٥ سم . ازهاره تد من ٣ الى ٧ لونها الى البنفسجي الزاهي ، عرفها فواح المطر . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

Primula elatior (S). زُعْدَةُ شَامِخَةٍ *
Primèvere élevée, Coucou élevé (F).

عشبة معمرة . اوراقها احليلجية ذلثة ، نصلها اخضر الصفحة العليا ، بحري السفل || شرانخها يملو نحو ٣٥ سم . ازهاره كثيرة البعد لونها الى الصفرة ، اقناعها الى الخضرة الباهتة بتوضيح ابيض || ازهارها يستمر من اذار الى ايار .

Primula verticillata (S). زُعْدَةُ ضُمِيَّة *
Primèvere à fleurs verticillées (F).

عشبة معمرة ترطب في الشواطى البحرية . اوراقها احليلجية الشكل تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . نصلها وسيد الفلج ، خلى البشرة ، قابل التنين || شرانخها يملو من ٣٠ الى ٤٥ سم . ازهاره ثنائية الفسة . كثيرة اللند ، فواحة العرف ، ذفبية اللون || ازهارها يستمر من ايلول الى ايار .

Primula spectabilis (S). زُعْدَةُ قَانَحَرَكَة
Primèvere remarquable (F).

عشبة معمرة ترطب في الأتربة الكلسية . اوراقها سنانية ، نصلها خلى البشرة البنية ، مسن الحافة الشرفوية المختار || شرانخها يملو من ١٦ الى ٣٠ سم . ازهارها سداسية او ثمانية التجميع لونها الى الازرقاني يملو موطج ودي || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

Primula luteola (S). زُعْدَةُ كَبِيرِيَّة
Primèvere soufrée (F).

عشبة معمرة سبوتية . اوراقها احليلجية تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . شرانخها يملو نحو ٢٥ سم . ازهاره صغيرة اللند كثيفة التجميع كبريتية اللون || ازهارها يول طوال شهر ايار .

١٧٥٢٢ - زُعْدَةُ كَثِيرَةِ الزَّهْرِ *

Primula floribunda (S). Primèvere floribonde (F).

عشبة معمرة ترطب في الشواطى البحرية . اوراقها بيضية ، مستطيلة ، مقنونة الطرف . نصلها ازغب البشرة حبيش المسام الغدية ، حناره لاقياسي التنين || شرانخها يملو من ١٥ الى ٣٥ سم . ازهاره مستعومة الشكل ، كثيرة اللند ، كبريتية اللون || ازهارها يستمر طوال الشتاء .

بويناته كروية ، جوفية التجميع ، عابقة اللون || ازهاره قليلة البعد والاذى تتصلل عل اوراق بعض الاشجار الحرجية دون ان تؤقها . مظهرها الخارجي بقع صغيرة مستدرة خلية ، شقراء اللون جوفية المختار ، تركب التصلل عل صفحته السفل .

١٧٥١٠ - زُفْيِي *
Tomenteux (F). Tomenteux (E).

نمت وصى يظن عل اجزاء النبات المغطة زغب لب نام يقبه نفد القطن .

١٧٥١١ - زُفْيِيَّات
Bombaceae (S). Bombacées (F). Bombaceae (E).

قسم من فصيلة الخبازيات يشمل بعض الاجناس والعديد من الانواع مظهرها اشجار كبيرة دائمة منبها البلاد الاستوائية . ازهارها عشوية ، خاسية الثلاث ، كثيرة السدية . ثمارها حقة الشكل تلتف بوراً فريدة او عديدة ينشأ زغب نام القلة تصيرها .

١٧٥١٢ - زُفْيِيَّة *
Bombax (S). Bombax, Bombace, Quindier, Fromager (F). Silk cotton tree (E). Sindendbaumwollbaum (D). Bombace, Bambaia (I).

جنس اشجار كبيرة دائمة من الزفيايات . انواعه عديدة مهدها المناطق الاستوائية .. جميعها سريعة النمو غليظة الجذع تعلو من ٢٥ الى ٢٥ م . اوراقها زنادية مركبة خاسية الوريقات البيضية الشكل . ثمارها حقائق مستطيلة تلتف عدة زهور ينشأ زغب نام جيداً قصير القيلة لا يسلع لفلز || بزورها مأكولة بعد التخميص ويستخرج من اوراقها مادة دهنية لها استعمالها في البلاد الحارة .

١٧٥١٣ - زُعْدَةُ كَاب *
Chiromèle (F). Chiromel (E).

جنس غفائش من هابة الحبار . موطنه ملقة والملايو . انواعه قليلة اللند تتميز بفراطيسها الاسطوانية المقنونة ، بأذانها المنتسبة الدالية وباضائها السلمية البارزة . يعيش جماعات متوسطة البعد . يرح في اوائل وأواخر اليل . قوته الحشرات . يات تجاريف الاشجار الحرجية والغارور والكهوف .

١٧٥١٤ - زُعْدَةُ كَة ، زُفْيِيَّة
Primula (S). Primèvere (F). Primula (E). Primel (D). Primavera (I).

جنس ثياتل عشبة من فصيلة الريبيات . انواعه كثيرة البعد منها الحولية والوهلة والمعمرة . مظهرها يري وبعضها زفسي . جميعها تنجيمية ، اوراقها قرصية الانتصاب . ازهارها سبوتاني التجميع يرتكز عل شرانخ دقيقة . ازهارها جميلة الشكل عديدة الالوان كوسها خاسية التنين ، توعايتها خاسية التفصيص ، انابيها اسطوانية الشكل ، لسيها شاذية لا متدعة . حقائقها خاسية المصارع || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

١٧٥١٥ - زُعْدَةُ أَذْنِيَّة ، أَذَان الدُّبِّ الوَشْشِي ، أَذَان الضَّبَع
Primula auricula (S).

Primèvere auriculée, Orelle d'ours sauvage (F). Auricula, Bear's ear (E). Aurikel primel, Aurikula (D). Primavera auricula, Orecchio d'orso (I).
عشبة معمرة . اوراقها بيضية مسطوية الشكل . نصلها بحري اللون ، خلى البشرة ، مسن الحافة الشرفوية المختار || شرانخها يملو من ٨ الى ١٥ سم . ازهارها



زُفْيِي



زُعْدَةُ شَامِخَةٍ



زُعْدَةُ ضُمِيَّة



زُعْدَةُ قَانَحَرَكَة



زُعْدَةُ كَبِيرِيَّة



زُعْدَةُ كَثِيرَةِ الزَّهْرِ



زُعْدَةُ كَثِيرَةِ الزَّهْرِ

٢٠ سم. أزهاره لا تقياسية التجميع. حديدًا يراوح من ٢ الى ٢٠ لونها ال الوردي يميلو مزيج بنفسجي .
أزهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٥٣٠ - زُغْدَة وَرْدِيَّة
Primula rosea (S). *Primavère carminée* (F).

حشبة معمرة سبروتية. أزوارها اهلجية تطول نحو ١٥ سم. نصلها جيل الحصار الزاهي مستن الحافة. شرانها يميلو من ١٥ الى ٢٠ سم. أزهاره قليلة العدد كبيرة للقد لونها الى الحمره الوردية الزاهية || أزهارها يستمر من ايار الى نيسان .

١٢٥٣١ - زُغْدَة يَابَانِيَّة
Primula japonica (S). *Primavère du Japon* (F).

حشبة معمرة سبروتية. جلورها علقة الزرقاء. أزوارها اهلجية مسطوية. نصلها مشطاري الحافة يطول نحو ١٥ سم || شرانها يميلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. أزهاره متراكبة الاراس التي تعد من ٣ الى ٦. زهرته مستعرضة الشكل لونها الى البنفسجي الموشح بالحملي || أزهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٥٣٢ - زُغْرُكِيَّة
Aquifère (F). *Aquiferous, Water-bearing* (E).

نمت تعريفية يطلق عل الطبقات الارضية التي تحوي بعض الماء او الكثير منه .

١٢٥٣٣ - زُغْرُكِيَّة
Aquiculture, Culture hydroponique (F). *Aquiculture, Fish-breeding* (E).

الزفربة او الزفربة المزفربة هي الزفربة في الماء بدون تربة. يصار اليها بتلوب المتاصر الفضائية الممندة في الماء فيمتصها النبات وينمو ويشمر كا لو كان مزروعاً في التربة .

١٢٥٣٤ - زُغْرُكِيَّة
Aquigène (F). *Aquigenous* (E).

نمت تعريفية يطلق عل كل كائن علق في الماء او يمشي فيه .

١٢٥٣٥ - زُغْرُغْ عَجَلَالِيَّة ، جَسِيل
Cursorius (S). *Courvite* (F). *Courser* (E).

جنس طير من طول الساق وقصيلة الزنزنات. انواعه المعروفة حشرة اسطاتها الصمصري الاسيرة والانقرانية || اسمها صغيرة القد . اطولها تراوح من ٢٢ الى ٢٧ سم. مناقبها مسطيلة ، دقيقة . اجنتها ذلقة . اذنانها قصيرة ، مستعرضة ، مقنطة الاطراف . سوتها راساها تحملة . اوتابها مختلفة الالوان يكثر فيها الالبيس والحملي || اعرف انواعه واشهرها الزنزغ الاغبس .

١٢٥٣٦ - زُغْرُغْ أَغْبَسْ ، جَسِيل أَغْبَسْ ، عَجَلَالِيَّة الْأَغْبَسْ
Cursorius isabellinus. *C. cursor* (S). *Courvite isabelle, Courvite gaulois* (F). *Cream-coloured courser* (E).

طائر من الزنزغ. اعطاه تيمد بن صماري الشرق الاوسط الى افريقية الشرقية والنبالية لانه من الصموارب التي تجوب القناري في طلب الرزق || جسمه متوسط القد يطول نحو

١٢٥٣٧ - زُغْدَة لَرَجَة *
Primula viscosa (S). *Primavère visqueuse* (F).

حشبة معمرة ترطب في الازربة الرملية. أزوارها بيضية مستطيلة السنت ، نصلها كثيف المسام اللينة القوية الرائحة، لونه الى الحصار الاصفر || شرانها يميلو من ٦ الى ١٥ سم. أزهاره لبسدة التجميع الصبوتلي ، فواحة الصف ، بنفسجية اللون || أزهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٥٣٨ - زُغْدَة مَكْرَدَة
Primula grandis (S). *Primavère géante* (F).

حشبة عملة سبروتية. أزوارها مسطحة كبيرة القد قليلة الشكل. نصلها كثير العمود ، قليل الزغب ، لاقابي التستين || شرانها يميلو من ٥٠ الى ٧٠ سم. أزهاره مستطيلة متدلية ، لونها الى الصفار الباحت || أزهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٢٥٣٩ - زُغْدَة مَسْطَطَة
Primula officinalis (S). *Primavère officinale, Coucou officinal* (F). *Cowslip, Paigle* (E). *Gartenprimel, Schlüsselprimel* (D). *Primavère, Primula odorosa* (S).

حشبة معمرة سبروتية يقال انها طيبة تلغ الصفو والامام. أزهاره جرسية اقاعها بيض ، ابواقها ملعبة ، اعناتها خماسية الزقنة البرتقالية || أزهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٢٥٤٠ - زُغْدَة مَسْطَطَة
Primula vittata (S). *Primavère rayée* (F).

حشبة معمرة. أزوارها خبيقة مستطيلة . نصلها ماس البشرة ، دقيق التستين || شرانها يميلو نحو ١٥ سم. أزهاره كثيفة التجميع . حراء القرن ، كزوبها جرسية الشكل تملوها حشبة خطوط بيض || أزهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٢٥٤١ - زُغْدَة مَرْبَرَّة
Primula hirsuta (S). *Primavère hérissée* (F).

حشبة معمرة ترطب في الازربة الرملية. أزوارها بيضية الشكل. نصلها مبشر المسام اللينة الحراء التي تعلو عل صفحتي || شرانها الزفري يميلون من ٣ الى ١٠ سم. أزهاره مستعرضة الشكل ، قليلة ، تعد من ١ الى ٣ . غناتها ابيض ، سارها وردي او ليلي القرن || أزهارها يستمر من نيسان الى تموز .

١٢٥٤٢ - زُغْدَة مَسْطَطَة
Primula helodoxa (S). *Primavère gloire des marais* (F).

حشبة معمرة ترطب في الاراضي الرملية . أزوارها ستانية النصل الملتص الاطراف || شرانها يميلو من ٦٠ الى ٨٠ سم. أزهاره متراكبة الاراس التي يراوح منها من ٦ الى ٨ . زهرته مقعرة القاعدة ، صفراء اللون . أزهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٥٤٣ - زُغْدَة مَهْدَبَة
Primula marginata (S). *Primavère bordée* (F).

حشبة معمرة ترطب في الازربة للكلية. أزوارها اهلجية الشكل . نصلها لحي التسج ، حصارها متقارب التستين ، مهدب الحافة || شرانها يميلو من ٥ الى



زغدة لرجة



زغدة يابانية



زنزغ اغبس

شفاغان، قوائمها مستطيلة، قصبة. ثوبها الى الصهبة النائية الموج || تمتع الاثنى المكن في لواء الاشجار فينتفخ من يقات صغيرة، غطيلة الشكل، بنية اللون تردب الحناء وتميش عليه حتى الاكمال.

Zaghoulina

١٢٥٤٧ - زُغُولَان * ٥

قطر مجهرى من فصيلة السحبابات ورتبة الامديات يركب بعض نباتات الفصيلة الزرقية واعضاء الشخص مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة لاقياسية التجميع تصيب الاوراق الجديدة النائية فتسبب لها تقصير التسج الحلوية وتتمتع النسل بمقبحها رفعة في البشرة تبدو كالبثور الى ان تتجبر عن بويغات كالحباب لونها الى الجوزة || يكافح عند ظهوره باستهلاك سائل يورده لخلول ١ %.

Amadina (S), Amadine (F).

١٢٥٤٨ - زُغِيم

جنس صافير صغيرة القد من الجوامث الغرويات المناقير، انواعه عديدة موطنها البلاد الحارة، جميعها بجمم الدوري، اثراها متراكبة الالوان الجميلة، تألف الازدغال والغابات المبعثرة الاشجار، قوتها يزور وحسب التنبيلات وبعض الحوام والديدان والحشرات الصغيرة || تفتن في الاجبار اناتها تقص من ٤ الى ٥ يمشات تحفها بمناوبة الككور نحو اسبوعين، وذلك كل ثلاث مرات في السنة || اشهر انواعه الزعيم الطوق.

١٢٥٤٩ - زُغِيم مُطَوَّق * ٥، ذُبُعُ السَّيِّ

Amadina fasciata (S), Amadine à collier, A. bandé, Cou coupé (F), Cut-throat (E).

نوع من الزعيم حجمه حجم الدوري الصغير، ثوبه الى الكهبة الصنائية يملوها زُغِيم ابيض واسود، عسراه وضيقه يبيض، زوره مطوق بخط ارجواني يتنه من مؤخر العين اليسى الى مؤخر اليسرى، جناحاه ذهبه سود، موطنه الغروية الشرقية والشمالية، سره يد من ٢٠ الى ٤٠ || يأنف حياة الدجبن ويتكاثر بسهولة لكنه لا ينزر.

Amadinidae (S).

١٢٥٥٠ - زُغِيمِيَّات ٥

Amadinidae (F), Amadinidae (E).

فصيلة طير من الجوامث غرويات المناقير، اجناسها وانواعها عديدة منظرها من صافير المناطق الحارة || تتميز باجناسها الصغيرة وبمناقتها الغروية القصيرة وباذنابها المقطعية التي يغل فيها القصير، اجنسها مستدة الطول، انوارها جملة الالوان الزاهية، اراشها دقيقة || جميعها تألف القفص، بعضها مستحب الزققة، قوتها يزور التنبيلات || احرف اجناسها واشهرها الزعيم والمطورو والبادس ...

Satinée (F), Satiny (E).

١٢٥٥١ - زُف

صغير الريش ونقص بفسهم به ريش النمام، قال للمتنى :
« كان المرو من زف الرئال » .

١٢٥٥٢ - زَقَالَة صَغِيرَة الْغَمْد * ٥

Rhiphophorus subdipertus (S), Rhiphophorus à élytres réduites (F), Rhiphophorus subdipertus (E).
حشرة وائمة ناعمة خاشرة من فصيلة الزقاليات ورتبة غمديات الاجنسة، تألف الاسكان التي تكثر فيها التفويغات

٢٥ م. ثوبه اغبس اللون، رأسه اذرق الموج، عيناه مكملتان بالاسود الذي يمتد كالخط حتى القفن، قوامه واباهره خطية الرقشة، كلاء صفر الاطراف و حر المابية، زقال فنبه مرقوة بالاسود والابيض، حدة فيه صلبة اللون، ساقه الى الزققة الجسرية، رساء واصابعه بلون البرل || يذنب انصرمه بين الحجابات التي تكتنفها الاشباب المراكبة الكثيفة، انشاء تقص من ٣ الى ٤ يمشات تحفها وحدها نحو ١٥ يوما بينها الذكر يوثن لها انشاء.

Zygote

١٢٥٣٧ - زُغَطَة

هي البينة الخصبه، راجع جنس .

Brindilles (F), Sprigs (E).

١٢٥٣٨ - زُغَط

الزغف : دقاق الحطب : اطراف الشجر الضعيفة واعالي الثوث والمرج.

Pontederia (S), Pontédérée (F).

١٢٥٣٩ - زُغِيل

جنس نباتات شبيهة برية ورتبة من فصيلة الزغليات، انواعها ثمانية جميعها جنسورية متعقة بوائيه سوقها شراعية متعقة تقني بالنسائل الزهرية، ازهارها جملة الشكل، سداسية الانقسام، زرقاء اللون || اوراقها متعقة كبيرة القذ لينة التصل، عنها ملاق متطيل يطوق بها على سطح الماء || تزور القزوين لكها تحف الصمغ.

Pontederiacae (S).

١٢٥٤٠ - زُغِيلِيَّات

Pontédéracées (F), Pontederiacae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة مسورات الزور، نباتاتها اشباب جنسورية الجفوع، اوراقها قرصية الانتشاب، مستطيلة الزناد وقلية التصل، ازهارها متبيلة التجميع تقدم على شراخ يمل الاوراق || منها المناطق الحارة تعيش في المنافع والمياه العذبة الرائدة.

Pigeonneau (F).

١٢٥٤١ - زُغُولَان

فرخ الحمام ما دام زق، يقال ازفل الطائر فرغه اذ زقه.

١٢٥٤٢ - زُغِيلِيل هو الادونيس الصغير، اطلبه.

١٢٥٤٣ - زُغِيلِيل القسَق

هو الحوزان الثريير، اطلبه.

١٢٥٤٤ - زُغِيلِيَّات هي لبن المروج، اطلبه.

Olives sauvages (F), زُغَبَج، زُغَبَج

Wild olives (E).

ثمر العتم (الزيتون البري) وهو مثل البق الصغار يكون اخضر ثم يرد فيحمر في مرارة وصيته مثل عصبة البق، يؤكل ويطبخ ويصفى ملؤه حتى يكون وبها كرب المتب.

١٢٥٤٦ - زُغُورَة طَالِيَة ٥

Zygoneura frivola (S), Zygoneura frivola (F).

حشرة مؤذية من فصيلة النياريات، تألف جميع الموامث الطالية والهاقن والمساكن || جسمها صغير القد يمل من ٤ الى ٥ م، رأسها مكور، عينها متلاصقتان عند الذكر، مفترقتان عند الاثنى، ذبانها خيطيان، صدرها شبه ييشي الشكل، ورشها كيراا القد، حامدا للحضاب،



زغل



زغوان



زغيم مطوق



زقالة صغيرة الغمد

Alaternum, Alaternkrenzdom (D). Alaterno, Ilatro, Putine (I).

نوع من البقي مهدد شرق البحر المتوسط. يوجد في بعض المناطق الجبلية اللبنانية والسورية. || يملو من متر إلى خمسة أمتار. أغصانه وأغصانه مرسة، وأوراقه هرو، كاملة، متعاقبة. نصلها سن الحافة يحمل من ٤ إلى ٦ أزواج من العروق المتاخمة || ازهاره عذبة البتلات، خضراء الاسدية وتنفصل الذلقة، ثنائية أو ثلاثية البتات. ثماره كروية، حمراء، ناعمة، ناعمة البتلات. يتبع ثماره اللون ثم تسمر وتتوسع مع النضج || يقال ان تقع ثماره ولذاته ويشبه يسهل المدة ويقوى الكبد والمعدة ويلعب بالبرقان.



زفرين الجرد

١٢٥٦٠ - زُفَرِين لَيْبَانِي * ، عُوْدُ الْخَيْرِ

Rhamnus libanensis (S). Nerprun du Liban (F).

نوع من البقي ينمو في جرد لبنان. وهو جنبة صغيرة تعلق نحو ١٥٠ سم. ساقها متعقبة خشبا حشبي اللون. أغصانها وأغصانها خالية القوام. أوراقها متعاقبة بيضيه. نصلها جابت النسيج، كثير العروق التي يبلغ عددها من ١١ إلى ١٥ زوجاً || ازهارها عذرية خضراء التركيب. ثمارها كروية نورية حمراء اللون ناعمة ناعمة البتلات يتبع ثماره اللون ثم تسمر مع النضج || يقال ان تقع ثماره يفيد الكبد والمعدة ويلعب بالبرقان.



زفرين لبناني

١٢٥٦١ - زُفَرَات * ، زُفَرَات

Vent fort et soutenu (F). High and sustained wind (E).

الزفرات والفراتة : الريح الشديدة المهبوب في دمام.

١٢٥٦٢ - زُفَرِين * ، زُفَرِين

Tonnelle (F). Arbour (E).

خيمة من حديد أو خشب تملؤها نباتات عارية.

١٢٥٦٣ - زُفَرِين * ، زُفَرِين

Expiration

خروج الهواء من الرئتين وهي حركة طبيعية تتبع الاستنشاق أي دخول الهواء الجري إلى الرئتين.

١٢٥٦٤ - زُفَرِين * ، تَرْجِيْس لَيْبَانِي

Zaphyranthes (S). Zephyranthe (F). Zephyr lily, Swamp lily (E). Zaphirblume, Flammenlilie (D). Zeffr (I).

جنس نباتات بصلية من فصيلة الفرجاسيات. أنواعه نحو ٢٠ مظهرها زراعي جميل الزهر الخفيف الألوان. شمراخها جوياء. أزهارها فردية. أوراقها خضراء النضج، قليلة البدء تنمو متأخرة قرب ابتلاج الزهر || أشهر الأنواع الفرجاسية ما يتبع.



زفر

١٢٥٦٥ - زُفَرِين أَيْبِيْض * ، زُفَرِين أَيْبِيْض

Zaphyranthes candida (S). Zaphyranthes blanc (F).

نوع من الزفر شمراخه يملو نحو ٢٠ سم. أوراقه اسطوانية مغطاة بتلوي نحو ٣٠ سم. زهرته يضاء اللون لا عرف لها. أزهاره في أيلول.

١٢٥٦٦ - زُفَرِين أَصْفَر * ، زُفَرِين أَصْفَر

Zephyranthes citrina (S). Zaphyranthes citrin (F).

نوع من الزفر شمراخه يملو من ١٠ إلى ١٥ سم. أوراقه خضراء النضج البتلات تتخذ شكل قوس ٣٠ سم. زهرته عذرية صفراء اللون طويلا نحو ٥ سم. ساقها مغطاة مقعسة || أزهاره في آب.

والصبرانيات. خنقها تموش على رقيق الإزهار ويتلها. يرقاها قتلهم ذبي الزناير واسارع القدان وغيرها من الحشرات || جسمها صغير القدر يملو من ٥ إلى ٨ مم. ثوبها إلى السرة الخفيفة الصبانية المخرج. وأنها صغير الجسم. زبانا مشطيان. عيناها صغيرتان ماحتتان. ظهورها جدحتان صغيرتان. ورشها صفائتان كبيرتان يلبها مستعرض الشكل. أوسانها وباعية العقل في الزوج الخلفي، خاضية في الزوجين الامامي والوسطي || لها جبل واحد في الحلق. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل سبيران وتمتش حتى أواسط أيلول. تسرح في النهار. تسافد في أواسط آب. تنجح لكن قرب غشرات الزناير وفي المواقع القريبة من مجموعات الاساربع || البرقة عند بلوغها الإدراك انتم تطول نحو ١٣ مم. جسمها بسيط الشكل، مستطيل القدم والرأس، مستطيل الخنجر، سداسي الزواجر، ضلع التذكير، أنير اللون، ودي المخرج، عنان الرأس، أسمر الزواجر والشرح || طول الاكمال الذي يستمر نحو ٣٥ يوما ينقضي في التربة تحت الجملانة.

١٢٥٥٣ - زُفَرَاتِيَّات * ، زُفَرَاتِيَّات

Rhiphophoridæ (S). Rhiphophoridés (F). Rhiphophorides (E).

فصيلة حشرات وأشعة خافرة من رتبة غدييات الاجنحة || اجناسها وأزواجرها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات البلاد المتعددة الحرارة ويضعها من حشرات حوض البحر الابيض المتوسط. تألف نباتات الغدييات والشفويات يرقاها خافرة تموش على ذبي الزناير || اجسامها صغيرة القدر أو متوسطة. رؤوسها مستديرة. زباناتها متباينة الاشكال منها الخفيفة والمرسية والمنشقة، تركب من ١٥ إلى ١٠ فصلة. كرواسها وأغصانها لاقامية الشكل والقد. أرسانها الخلفية وباعية العقل اما الوسطي والامامية لخاضيتها || أشهر اجناسها الزنازة واليعيم.

١٢٥٥٤ - زُفَرَات * ، زُفَرَات

Asphalte (F). Asphalte (E).

نوع من الحجر كيف المادة السوداء اللامعة يستعمل مجيلا مع كسر الحصى في تلمية وصف الطرقات لتثبيت تكديدها ووقايته.

١٢٥٥٥ - زُفَرَات * ، زُفَرَات

Empoiser (F). To picch (E).

طلي أو لاط الشيء بالزلف.

١٢٥٥٦ - زُفَرَات * ، زُفَرَات

Cire, Lorum (F). Cere (E).

الزفد خضاء يظن قاعلة الخفاد عند بعض فصائل الطير اصحابها الجوارح والجامات والنبغاوات || ومن الكائنات من استعمل كلمة "قير" للدلالة على الزفد في حين ان القير هو القطران.

١٢٥٥٧ - زُفَرَات * ، زُفَرَات

Tuteur (F). Prop (E).

هو المسند الذي تدعم به الشجرة الفتية.

١٢٥٥٨ - زُفَرَاتِيَّات * ، زُفَرَاتِيَّات

Cléomées (F).

سبط من فصيلة الكبريات.

١٢٥٥٩ - زُفَرِين الْجُرْد * ، تَبْقِي مُتَرَاكِك * ،

أَلْبِيْس ، أَلْبِيْس ، عَرْد الْقِيْس

Rhamnus alaternus (S). Nerprun alatern, Alaterno, Bourgue-épine (F). Alaternus, Barren privet (E).

في اواسط الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار . تتافد بعد ظهورها بنمو ستة اسابيع وتفتح المكنة رؤياً تلتقيها في الجلالة وتحت الاشعاب والحجاة || البرقة عند بلوغها الإدراك التام تطول نحو ١٥ سم . جسمها مردي الشكل ، كثيف الحلب ، صلب اللون ، اسمر الرأس والرواجب والشرح || طود الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع يتقضي في التربة ضمن جراب من الطين والمواد العضوية .

١٢٥٧٣ - زُفِيرِيَّات ٥ Zuphiidae (S). Zuphiidae (F).

فضيلة حشرات لاحة وقائمة من رتبة جمادات الاجنحة . اجناسها وانواعها المروقة قليلة العدد منقطعة من حشرات البلاد الحارة . تألف المراتق الرطبة وفضفاة البحر والبيحرات || جميعها صلبة القد قلاً يتجاوز طول الواحد منها ٢٠ سم . اجسامها خلية القشار ، متباينة الالوان الزاهية . رؤوسها كروية ، محبوبة الاصداغ ، ترتكز على اعناق دقيقة اسطوانية الشكل . عيونها قليلة النتوء . كراسلها قليلة العرش ، شبه غليظة الشكل . اغدادها مستطيلة ، مستديرة الأطراف || تسرح في النهار وتبيت في الليل . تسمى بسمرة وتطير مخففة . قوتها المواد العضوية المختلفة المصادر ولا تمتع من الضعيف من الحشرات الدنيا || اشهر اجناسها الزفيروم .

١٢٥٧٤ - زُفِي ٥ Abecquer, Embecquer (F). To feed (E).

زق الطائر فرشه : اطعمه بمقاره : راجع أنزل .

١٢٥٧٥ - زُفِي ٥ تَسْمِين Gavage (F). Cramming (E).

اطعام الطيور الباجنة قسراً طعاماً خاصاً بنية تسميتها .

١٢٥٧٦ - زُفِي ٥ Asque (F). Ascus (E).

خلية نباتية تتصلب الى كيس صغير يشأ فيه بوغ الفطور الفقية . ج. ارتاق .

١٢٥٧٧ - زُقَاد ، ضَبَح ٥ Crl du hibou (F). Cry of the owl (E).

صوت الوبوم حل اختلاف اجناسه .

١٢٥٧٨ - زُقَاح ، زُقَج ٥ Crl du singe (F). Cry of the ape (E).

الزقح والزقج : اسم صوت القرد خاصة والفصلك كذلك .

١٢٥٧٩ - زُقَار ٥ Fuscococcum

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات يتميز بريشته البكنيدية التي تنشأ عضوية ثم ترق تتصدع الادمة والبشرة وهي شفافة ، لبينة التركيب ، صلبة الجول . تصبها رحيمة الخياء ، مستطيلة الخنق . بويضاتها بيضية شفافة . انواعها قليلة لا ينتم منها اضرار تستحق العناية .

١٢٥٨٠ - زُقَار السُدْرَاك ٥ Fuscococcum cedrelae

فطر مجهرى يصيب سوك وافضان السدرال . مظهره الخارجى بلخ مستطيلة طولها من ٣٠ الى ٤٠ سم . تركيب السوك والانصاف فتؤذي وقد تسبب جفافها || يكائن بالكشط والتطهير والظلي باستئلاك .

١٢٥٨١ - زُقَاكُ اللوز ٥ Fuscococcum amygdali

فطر مجهرى يصيب اغصان اللوز واغصانه فيمرق سمر التسع

١٢٥٧٧ - زُفِير حاصين ٥ Zephyranthes sessilis (S). Zephyranthes sessile (F).

نوع من الزفير شرخاه يملو نحو ٢٠ سم . اوراقة نحيلة اسطوانية تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . زهرته عطرية حاصنة تطول من ٤ الى ٥ سم . لونها الالباس الموشع بالاجر . سمانها ثلاثية || ازهاره في نيسان .

١٢٥٦٨ - زُفِير فِيرِينِيَّة Zephyranthes stamesco (S). Zéphyranthe de Virginie (F).

نوع من الزفير شرخاه يملو نحو ٣٠ سم . اوراقه ضيقة محددة زاهية الخضار تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . زهرته عطرية ترتكز على زناد يملو الشراف المزدوج الفلقة . طولها نحو ٨ سم . لونها يستمر على اليباس الثلثي بعد ان تكون بياضها موشحة بالوردي || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٢٥٦٩ - زُفِير مَوْشَح Zephyranthes varicolor (S). Zéphyranthe varicolore (F).

نوع من الزفير شرخاه يملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقه ضيقة مدنية الزام الاخير تطول نحو ٣٠ سم . زهرته حلوة ترتكز على زناد قصير يملو الشراف . طولها نحو ٥ سم . لونها يستمر على اليباس الفلعل بالوردي يملو موج اخضر . ازهاره يدم طولاً فصل الشتاء .

١٢٥٧٠ - زُفِير وَدْدِي ٥ Zephyranthes rosea (S). Zéphyranthe rose (F).

نوع من الزفير شرخاه يملو نحو ١٥ سم . اوراقه ضيقة النصل المسطح تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . زهرته عطرية صغرة القد ترتكز على زناد مستطيل يملو الشراف . طولها نحو ٣ سم . لونها وردي يملو موج ليكي || ازهاره يستمر من آب الى ايلول .

١٢٥٧١ - زُفِيرُوس ٥ Ziphius (S). Ziphius (F). Ziphus (E).

جنس حيوانات بحرية لبونة عظيمة الهامة من المحريات متأكلات الاسنان وفضيلة التنبريات . انواعها المروقة قليلة العدد اعطائها، سطح مجار العالم || اجسامها كبيرة ، شبه ريشية الشكل ، مأمدة الاعتاق ، مخروطة الرؤوس الفصحة ، صغيرة الاعظام . انواها ال الخضار الالاس الازرق الموج ، بطنها الى اليباس الماسي || ملهنا الحياتي جامي . افواجاها متوحدة العدد الذي يراوح من ٥٠ الى ٢٥٠ رؤيا .

١٢٥٧٢ - زُفِيرُوس عَطِر ٥ Zuphium olens (S). Zuphium odoriferant (F). Zuphium olens (E).


حشرة قائمة من فصيلة الزفيريات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف المراتق الرطبة وفضفاة مجاري الماء . قوتها المواد العضوية المختلفة المصادر وما تستطع اقتناصه من الحشرات الدنيا . تتميز برائحتها العطرية المأمونة التي تم من وبيدها حل به متر || جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ٩ سم . ثوبها ال الفصحة السمره تعلوها تزاويق سواء اللون . رؤوسها صغير الحجم ، اسود اللون . عينها صغيرتان . زيانها عيطان مستطيلان . ظهورها مستعرض المخفر لا يلمس كامل البطن . سمرانها فضيحة . ارسافها خماسية المعقل || لها جيل واحد في الجول . تظهر الحشرة الجملانة



زفير



زفير سحر



زقار اللوز

ويُتَمَرَّحُ النَّوْدُ ॥ مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل
تركب الحادة منه أيد البرام . تبدو غيرة اللون ثم حنطة ،
تدوم من نيسان حتى أيلول حيث يختفي أثرها ॥ اغزاره
زعيدة لا تستعجب للكثافة .

١٢٥٨٢ - زَقَقَائِ أَشَقْعُ الْبَطْنِ ٥

Oxynotus rufiventer (S).
Oxynota à ventre roux (F).

طائر من الجوارح مشربوات المنابر وفضيلة الثعريسات .
أعطاه مدغسكار وبعض جزر المحيط الهادي . يألف
الغابات والحدائق والجنان . قوته الحشرات والذباب والحوام ॥
جسمه صغير لونه ، جسمه سمح اللون . ثوب الذكر
متداخل الاسود والازرق والاشهب الاخير . بطنه الى
الشفقة ، ذنبه زجاجي الريش ، مزرق الاسود . ثوب
الانثى الى الشفقة الموححة بالاصفر الغامق ॥ يدشن عشه في
الاشجار الرقيقة . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى
٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوما .

١٢٥٨٣ - زَقَقَائِ

Eurystomus (S). *Eurystome* (F).
جنس طير من الجوارح وأعانت المنابر وفضيلة الثعريقات .
أنواعه المشروقة سنة اصطفاها بعض المناطق الاستوائية والحارة
من المال القديم ॥ أجسامها قريبة الشبه بالثعراق .
منافيقها قصيرة مستعرة الاشدان . اجنتها كبيرة ،
ذرية الطراف . اذنانها معتدلة الطول . ضيقة الطرف
المستدير . انوثها الى الزرقه السعاه المراج ومنها الى الزرقه
الخضراء او الجزوية للمراج ॥ قوتها الحشرات والديدان .

١٢٥٨٤ - زَقَقَائِ

Crier (oiseau) (F).
To cry (bird) (E).
زق القائر : صوت .

١٢٥٨٥ - زَقَقَائِ

Plotus (S).
Anhinga (F). *Anhinga*, *Darter*, *Snakebird* (E).
الزرقه ج زقو . جنس طيور مائية من كفيات . اقدم
طويلات الريش . انوعها قليلة موطنها بعض انهار
ومجيرات المناطق الحارة . من طوارها انسابا تمكث
في مكانها حتى يكاد يقبض عليها فنحوس في الماء وتخرج
بديدا ॥ اجسامها رفيقة مستطيلة ، طولا يراوح
من ٨٥ الى ٩٥ سم . اعناقها اسطوانية . بالغة الطول .
رؤوسها صغيرة مستطيلة . منافيقها اسطوانية الشكل
مفرقة للمنفذ . اذنانها طويلة . قوائمها قصيرة مسنعة
الارتكاز الميكل . ارسانها قوية . اقدامها مستعرة .
انوثها الى السواد اللؤلؤ يملو مراح اخضر . رؤوسها
الى الكهية السوداء . ظهورها وبسوانها منشفة . ابلعها
ومناكبها وكلاهما مخططة بالابيض . اعناقها وسنابيرها
جزوية ॥ قوتها الاسماك والقشريات والفسفاد . تدشن
في الاشجار . اناثها تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها
بمناوبة ذكورها نحو ٤ اسابيع ॥ اشهر انوعها الشامة
والبلشوي .

١٢٥٨٦ - زَقَقَائِ بِسَالِيَّة

Plotus vaillantii (S).
Anhinga vaillant (F).
نوع من الزرقه موطنها بعض للمناطق الاسيوية والافريقية .
تكثر على ضفاف النيل ومجراته وفي العراق وتركيا .
وهي لا تفارق المياه العذبة الا لتقيم على الاشجار او
محور الجرف . طولا نحو ٩٥ سم . قوتها ثوب جسمها
يكثر فيه المراج الاخضر والازرق وتقل فيه نسمة
التنيش بالابيض .

١٢٥٨٧ - زَقَقَائِ شَالِيَّة ٥

Plotus anhinga (S).
Anhinga vulgaire (F). *Common darter* (E).
نوع من الزرقه . طولا نحو ٩٥ سم . قوتها قريب من
ثوب جسمها تكثر فيه الزرقه البيضاء . موطنها منابع
وضفاف انهار ومجرات القريفة النجلى وامريكة الجنوبية
والوسطى . وهي لا تفارق المياه العذبة الا عند الاستراحة
في ظاهرة النهار .



زَقَقَائِ أَشَقْعُ الْبَطْنِ



زَقَقَائِ شَالِيَّة

١٢٥٨٨ - زَقَقَائِ ، زَقَقَائِ ، دَمَشَقِي

Charadrius (S). *Pluvier* (F). *Plover* (E).
جنس طير من فصيلة الزرقائيات . انوعها عديدة صغيرة
ومتوسطة القده . جميعها من القواطع تجوب للمناقع والقيعان
والمراعي وكثبان الرمل ॥ اجسامها رفيقة . منافيقها
انصر من رؤوسها . اجنتها ذلقة . ارسانها رفيقة
ونحيلة . انوثها مراكبة الا لالوان . اذنانها موححة مخطوط
مستعرة ॥ قوتها الحشرات والديدان على اختلاف
انواعها . تدشن في الفصوص تدره في منحدر ما معرضه
الجنوب وتخلعه بقى الحشائش الناعمة . اناثها تبيض
من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين .

١٢٥٨٩ - زَقَقَائِ النَحْصِ

Vanneau à caroncule (F).
هو الكتاب ، طائر من الزرقائيات . اعليه .

١٢٥٩٠ - زَقَقَائِ الرَّمْلِ الْمَطْفُوقِ

Charadrius hiaticula (S). *Grand pluvier à collier*,
Gravelot hiaticule (F). *Ringed plover* (E).
نوع من الزرقاق كبير الجثة يتميز بطقه المستعرض
الاسود وبقائمه الجزوتين ॥ سره كبير المدد .
يألف لكثبان الرملية ويصاحب الانهر .

١٢٥٩١ - زَقَقَائِ شَامِي

Vanneau (F).
Peewit, *Lapwing* (E).
طائر يعرف باسم شهرته وهو ابيض طبع . اعليه .

١٢٥٩٢ - زَقَقَائِ فَيْفِي ٥

Squatarola squatarola (S). *Pluvier argenté* (F). *Grey*
plover, *Swiss plover* (E).
نوع من الزرقاق كبير الحجم ، البلق الثوب ، يلف فيه الرمادي
القفي المراج ॥ سره متوسط المدد . يألف المروج
والمراعي وضفاف الاغوار .

١٢٥٩٣ - زَقَقَائِ مَذْهَب ٥

Charadrius auratus (S). *Pluvier doré* (F). *Golden*
plover (E).
نوع من الزرقاق يحوي بلاد حوض البحر المتوسط . ثوبه
الشمس يفتل عن ثوبه الريدي . ظهوره اسود نسبي
تقلو نمشة سرشفية الشكل مقلية . زوده وصدره الى
السواد اللامع يملو توشع اصفر ويحيط اطراف ابيض .
بطنه وعواينه وزمكاه يبيض . عيانه ويتقاربه وقائمه
سود ॥ اسرابه متوسطة المدد . يألف المروج والمراعي .
قوته الحشرات والديدان .



زَقَقَائِ مَذْهَب

١٢٥٩٤ - زَقَقَائِ مُسَلِّحْ

Hoploptère (F).
طائر من الزرقائيات يدعى تهبوخ ، اعليه .

١٢٦٠٢ - زَقَبُوتُ الْاَثَلِ *

Stenaspis squamosa (S). *Sténaspis des tamaris* (F).
حشرة من الناصعات طولها نحو ٣٠ م. ثوبها الى الخضر
الزهرى، حنار ظهرها الى السمرة يعلوها مراح احر.
يرقاتها تركب فروع واغصان الاثل فتنتشر الخشب
وتعطيه.

١٢٦٠٣ - زَقَبُوتُ اخْوَج

Bupreste du prunier (F).
حشرة مشهورة باسم ناصعة اخوج، اطليها.

١٢٦٠٤ - زَقَبُوتُ الدَّرَائِي

Bupreste noir du pècher (F).
حشرة تدعى ناصعة الدرائق السوداء، اطليها.

١٢٦٠٥ - زَقَبُوتُ السَّنْدِيَّانِ *، نَاصِعَةُ الْبَلْطَرِ
Coræbus bifasciatus (S). *Bupreste du chêne*,
Coræbe bifasci (F). *Oak burncow* (E). *Zwei-*
blindiger Prachtkäfer (D).

حشرة من الناصعات طولها نحو ١٥ م. لونها الى الخضر
الملبب || يرقاتها تعيش على فروع واغصان السنديان
فتنتشرها وتؤذيها.

١٢٦٠٦ - زَقَبُوتُ الصُّنْبُورِ *، نَاصِعَةُ الصُّنْبُورِ
Chalcophora mariana (S). *Bupreste des pins* (F).

حشرة من فصيلة الناصعات طولها نحو ٢٨ م. لونها
الى الخيطي الاسفع المواجه ينحرف الى الاسود في آخر
مهداها. طيراتها سريع زق || يرقاتها تركب قلف
الصنوبر فتنتشره وتعطب لشكير.

١٢٦٠٧ - زَقَبُوتُ الْوَرْدِ

Bupreste du rosier (F).
حشرة تدعى ناصعة الوردة، اطليها.

١٢٦٠٨ - زَقَبُوتُ نَسَاعِيٍّ الْبَحْج *

Buprestis novemmaculata (S). *Bupreste à*
9 points (F). *Buprestis novemmaculata* (E).

حشرة غاشية من فصيلة الزقزقيات ورتبة غديات
الانجسة. موطنها يرم معظم اسواق حوض البحر الابيض
المتوسط. تألف المراتب التي يكثر فيها الصنوبر واليرز
والشربين والسرور. خنافسها تعيش على ما تقضمه من لصل
الدراكن. يرقاتها تعيش تحت القلف والحاء دون ان تتعدى
على الشكير || جسمها متوسط القد يطول من ١٥ الى

٢٠ م. فورها الى السواد الاسفع المواجه. مهداها وكسولها
مقبحة بالاصفر. رأسها صغير أجرم ينور تحت الكوسل.
عينها كبيرتان بارزتان. زباناها غليظتان، منفرجتان.
فكهاا ضليمان. كوسلها قبابي الشكل. ظهرها متدلل
الاحيدفاد. مهداها بليغتا التميزر المتوازي المخطوط
لقاطبة. ارباعها خاسية البقل || الانثى اكبر قدًا من
الذكر واضخم بطنًا مع واكد ثوبًا || جيلها ثنائي الحول.
تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتبقى حتى اواخر
الربيع. تسرح في التبار وتبيت في الليل || اليرقة بطيئة
النمو تدرك الكمال الجسموري بعد التفت بنحو ١٢
شهرًا. جسمها مستطيل المقدم، مستقيم المؤخر، يطول
نحو ٤٠ م. ثوبها الى البياض الاخير. رأسها اسمر اللون

١٢٥٩٥ - زَقَزَقَاتُ مُطَوَّقٍ *

Charadrius dubius cronicus (S). *Pluvier à collier*,
P. de rivage, *Gravière*, *Alouette de mer*, *Gravelot*
naie (F). *Lesser ringed plover* (E).

نوع من الزقزاق صغير القد، اسود المقار الخيط،
مستدير البين الكفالة، مطوق الصدر، احر العنق
والقدم || سره متوسط القد. يألف المنابع وصفات
الانهار والشلطى.



زَقَزَقَاتُ مُطَوَّقٍ

١٢٥٩٦ - زَقَزَقَاتُ نَاصِيسِ

Hoplosternis épineux (F).
طائر يدعى نبيوخ ناصيس، اطليها.

١٢٥٩٧ - زَقَزَقَاتِيَّاتُ
Charadriidae, *Charadriidae* (S). *Charadriidae*, *Charadriidae* (F).
Charadriidae, *Charadriidae* (E).

فصيلة طير من رتبة طولك الساق. اجناسها واتواعها
عديدة متماثلة الاشكال والاعلاق والمادات. تتميز
بسمة دعوها على الارض وبنقايرها المركبة من جزئين جز.
غضروفي يمتد من القاعدة حتى ثلثي المقار ويسير قرفي
يكون الثلث الاخير حيث الطرف والمقلط.



زَقَزَقَاتِيَّاتُ

١٢٥٩٨ - زَقَزَقَاتُ غَرْدٍ

Gazouiller (F).
To chirp, *To warble* (E).
زقزق وفرد الطائر : رفع صوته وطرب به. والزقزقة شاملة
لجميع الناصيات اما التفريد فنحاصر ببعضها.



زَقَبُوتُ الْاَثَلِ

١٢٥٩٩ - زَقَزَقَاتُ *، تَمَلَّةُ الْاُرْجَنْتِيْنِ *

Iridomyrmex humilis (S). *Fourmi d'Argentine* (F).
Argentine ant (E). *Argentiniñische Ameise* (D).

تملة صغيرة القد، دقيقة الجسم، تطول نحو ٣ م. ثوبها
الى السمرة الخيطية. صدرها بزمزماء اقل سمة من رأسها
وطليها. التملة الكاملة الشق، الجفنة، تطول نحو ٦ م. ||
تقيم زبائها في أي مدع كان ادخل المنازل ام خارجها.
جراتهم كيرة. مدادها بعد ثلاث سنوات لا يقل عن
٢٠ ألفا وقد يبلغ ٤٠ ألفا بعد خمس سنوات || حاملاتها
شديدة النشاط. سرعة الحركة : تسطر على مسطح انواع
النمل. صغر قفها يتكهن من ولوج جميع الاساكين لذلك
قهاها لا احد له لانه يشمل جميع المواد الغذائية واخصها
الحوم والمواد السكرية || يقال انها انتقلت من الاربعين
الى بعض اماكل اوروبية منذ ثلاثة اجيال. وانتقلت من
اوروبية الى اساكل الشرق الاوسط بنفس الطريقة. وهي
الآن من حشرات سواحل حوض البحر الابيض المتوسط.



زَقَبُوتُ السَّنْدِيَّانِ

١٢٦٠٠ - زَقَع

Chant du coq (F).
Crowing of the cock (E).
هو صياح الديك. زق الديك : صاح.



زَقَبُوتُ الصُّنْبُورِ

١٢٦٠١ - زَقَبُوتُ *، نَاصِعَةُ

Bupreste (F).
Buprestis, *Golden beetle* (E).

جنس حشرات من فصيلة الناصعات انواعه عديدة جميعها
حيلة الشكل والالوان الزاهية الناصية للمواج. تعيش
في المناطق المعتدلة الحارة. وهي ضوئية المسرح تمشي
الطيران والحركة || يرقاتها غاشية تعيش على مختلف
الاشخاب وعلى جذور وسوق النباتات العشبية.



زَقَبُوتُ نَسَاعِيٍّ الْبَحْج

قليلة منها المناطق الاستوائية. جلودها غليظة تنور في الماء. سوقها درنات صغيرة. أوراقها قرصية الانتساب، عسية التجميع، بتلة الشكل، فضلة النصل الحبيب الشارف الأطراف. أنهارها فردية محورية لأشعة. يقال إن أوراقها تنفخ بالزحار وتقطع بول الدم.

١٦٦٠٩ - زَيْتُونُتْ فَحَام *

Capnodis carbonaria (S). *Capnode charbonnier* (F). *Capnodis carbonaria* (E).

حشرة غاشقة نامضة موزية من الزيتونيات ورتبة مفصليات الاجنحة. تألف الموائل التي تكثر فيها اشجار الحور والخروج. غشائها تعيش على الاوراق والبراعم. يرقاتها تتغذى الشجر والحطب وتعطب الجلود تحت سطح التربة || جسمها كبير القند يطول من ٣٥ الى ٤٥ سم. ثوبها الى اسود التفتحي تملو حلة ملحمة. رأسها مستعرض الجرم. عينها كبريتان. زباناها غشيان. ظهرها ذلق المؤخر، مستند الطير الفارقة الاثف. غشاهما شديدا الصلابة. ارساها حشامية العقول || جيلها ثنائي الحول. الاثنى اكبر قدأ وانصر زبانا. تظهر من نيسان الى حزيران وتعيش نحو ٢٠ اسبوعا || البقرة دقيقة رقالة بطيئة النمو. تطول نحو ١٠٠ سم. ثوبها الى البياض الاخير. رأسها اسود. فكاها غشيان.



زيتون فحام

١٦٦١٩ - زَلَّة * هو فرخ القاختة.

١٦٦٢٠ - زَكَاة

الزكاة: ما اخبره الله من الثمر (التاج).

١٦٦٢١ - زُكَّام * هو الخنا، اطليه.

١٦٦٢٢ - زُكَّالَة * *Cytologia* (F). *Cytology* (E).

هي السيولوجية أي علم الخلايا. وهي علم يبحث في ماهية الخلايا وتطوراتها الحياتية من جميع النواحي أن جسموية او كيميائية او خلاياها.

١٦٦٢٣ - زُكَّالَة حَيَوَانِيَّة * *Cytzoologie* (F). *Cytzoology* (E).

فرع من الزكالة يبحث في ماهية الحيوانات الحيوانية.

١٦٦٢٤ - زُكَّالَة نَبَاتِيَّة * *Cytobotanique* (F). *Cytobotany* (E).

فرع من الزكالة يبحث في ماهية الخلايا النباتية.

١٦٦٢٥ - زُكْبَة * *Sperme des insectes* (F).

Sperm of insects (E). هو افراز البند التناسلية الذكرية عند الحشرات.

١٦٦٢٦ - زُكْبَة * *Cytoblaste* (F). *Cytoblaste* (E).

الزكبة جيلة الخلية النباتية.

١٦٦٢٧ - زُكْبِي * *Cytologique* (F).

Cytologic (E). كل ما هو مختص بالزكالة او علاه اليها.

١٦٦٢٨ - زُكُون، زُكُون * *Zaccon*, *Zacon* هو الحليج من البذايبات، اطليه.

١٦٦٢٩ - زُكْبَة * هي الافاتوسه، اطليه.

١٦٦٣٠ - زُكْبَة، صُرَّة * *Sore* (F). *Sorus* (E).

مجموعة الاعضاء التناسلية في بعض الفطور.

١٦٦٣١ - زُكْبَة، زُكْبَة * هي مرة الشجر، اطليه.

١٦٦٣٢ - زُكْبَة * *Zilla* (S).

Zille (F). *Zilla* (E). *Stachlichter kohl* (D). *Zilla* (I). جنس نباتات عشبية برية محولة من فصيلة الصليبيات.

١٦٦١٠ - زَيْتُونِيَّات * *Buprestidae* (S).

Buprestidae (F). *Buprestidae* (E). وتعرف بالناصعات وناصعات البقر. فصلة حشرات من غديات الاجنحة. اطلب ناصعات.

١٦٦١١ - زُكُوم * *Éléage*, *Chalef* (F).

Zakkoum-oil plant (E). هو الخلاف، اطليه. ورتة يلحم الجرح سريعا ويحلو الكلف. وسائر اجزائه تنفع من وجع المفاصل واللسا والتقرس. ودهنه نافع منه.

١٦٦١٢ - زُكُوم بَلَدِي * هو الخلاف الضيق الورق، اطليه.

١٦٦١٣ - زُكُوم لَيْفِي * هو الخلاف القضي، اطليه.

١٦٦١٤ - زُكُوم مَيْدِي * هو الربويع الاقدمين، اطليه.

١٦٦١٥ - زُكْبَات * *Ascomycètes*, *Eumycètes* (F).

Ascomycetes, *Eumycetes* (E). رتبة الفطور الزقية من شعبة الفطريات. تتميز باختلاف شربتها وانفصال مبيجها وتشعبه وانسيائه اللوني. تكاثرها رتي. ارقاها البرغية ورتية التجميع || وهي تقسم الى مرتبتين: الفشحيات والتغشيات. أما فصائلها فست. الخثرات والمجيدات والوقيات والوقيات والمطويات والخشريات.

١٦٦١٦ - زُكْبَة اللسان * *Ascoglossa*

مرتبة من الرغويات ألمدية.

١٦٦١٧ - زُكْب * *Pistia* (S).

Pistia, *Codapill floatant* (F). *Water lettuce*, *Tropical duck-weed* (E). *Wassersalat* (D). *Pistia* (I).

جنس نباتات نجمية مائية من فصيلة النلقانيات. اناؤه



زق



زقبة

١٢٦٤٣ - زُحَابَة

Zelcova, Abelicea (S).
Zelcova, Késki, Orme de Sibérie (F).
جنس اشجار حرجية من البقيعات وفصيلة الانجريات .
انواع قليلة . اشجار كبيرة القد تصل من ١٥ م ٣٠ م .
انماها ثنائية الانتساب . اوراقها ثنائية الشكل ظاهرة
المرق ، بيضية الشكل ، مسننة الحافة ، قصيرة
المتر . ثمارها باسمة بحجم الحمص .

١٢٦٤٤ - زُحْم

Dendrohyrax ١٢٦٤٥ - زُحْم ، وَبَر
جنس حيوانات لبونة قاسمة من فصيلة الدنانيات .
انواعها ٦ موطنها الشرق الاوسط وافريقية الشرقية والشمالية .
انواعها سوية اللون الازيد الاكمل . موطنها الى الصغار
التي . رمالها العليا مفلقة ، عيونها جاحشة . قوائمها
قصيرة . اناثها ثنائية الاطوار || تألف الاوراج والعلبات
وتتسلق الاشجار بخلاف الانسان الذي لا يقوى على ذلك .
قربا اثنان ونواحي الاشجار وبعض الاعشاب . اناثها تضع
من ٣ الى ٤ اداس ترسمها من ٦ الى ٧ اسابيع .

Faucon femelle (F). ١٢٦٤٦ - زُحْمَاء ، صُكْرَاء
الزهاء والصقرة : أنثى الصقر .
Female hawk (E).

Caroncule (F). Caruncle (E). ١٢٦٤٧ - زُحْمَاء
قال الخليل : الزلة تكون للمز في طرفها معلقة كالقروم
ولها زلتان .

Gabarit, Gabari ١٢٦٤٨ - زُحْمَاء ، شُورُون
المنجذع او رسم او تخطيط شيء ما بشكله الحقيقي وكامل
قياساته النسبية الواقعية .

Flours de myrte (F). ١٢٦٤٩ - زُحْمَاء
Flowers of myrtle (E). الزله : نور الريحان .

Glissement (F). ١٢٦٥٠ - زُكُول ، اِنْزِلَاق
Sliding, Slipping (E). حالة الشيء المنزلق او حركة انزلاق الشيء .

Oncidiella (S). ١٢٦٥١ - زُكُيَّة
Oncidiella (F). Oncidiella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل
الرئوية . اجناسها وانواعها المروفة عديدة منتشرة في جميع
بحار العالم || اصداؤها ثنائية المصارع الانتساوية ،
شبه اهليلجية الشكل ، قليلة الاحدياد الصاصي الاتحاد
يلوها من القمة الى الطرف الخلفي اخمدون ناشز غروطي
الشكل يضيق مع اقترابه من القمة .

Oncidiidae (S). ١٢٦٥٢ - زُكُيَّات
Oncidiidae (F). Oncidiidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل
الرئوية . اجناسها وانواعها المروفة عديدة منتشرة في جميع
بحار العالم || اصداؤها ثنائية المصارع الانتساوية ،
تتميز على الصنفور والنبوت البحرية القريبة من الشطوط .
سمرها دجوي || اشهر اجناسها الزكوية .

١٢٦٥٣ - زُكُيَّة

(Vieille) اسم سمكة بحرية يطلق على الكبدية المنفرد
ويطلق على الزكوط (Savonnier) .

انواعها المروفة اربعة منها الشرق . اوراقها حرجية .
ازهارها ليلية . يقال انها لا تنقل من بعض المنافع
الطبية .

Cronartium ١٢٦٥٣ - زُحَاب
جنس طيور مجهرية من فصيلة الزغاليات يتصل بالمصنص
الميزة التالية :
١ - صفاته تعيش وتتكاثر تحت ادمة النبات المنحدر .
٢ - صفاته الاثدية جرابة المسائل وجيوب عساقها
تتلف من بونيات ثملوية السطح .
٣ - صفاته وسادية متصبية رباعية الاغنية .
انواعها عديدة تنقل على اوراق واغصان النبات اشهرها
واعرنها ما يلي .

١٢٦٥٤ - زُحَاب الصُّوْبَر
Cronartium ribicola, Peridermium strobi (S).
Rouille des pins à 5 feuilles (F).

فطر مجهرى يتطفل على اذنان الصنوبر فيطيلها ويسبب
ذبولها وسقوطها . ويسبب الحاء فيقرحها وينفخها
ويسبب الاشجار وقد يقرحها الى اليابس .

١٢٦٥٥ - زُحَاب القُرَانِيَّة
Cronartium flaccidum, Peridermium coruni (S).
Rouille de la pivoine (F).

فطر يعيش طوره الاثدي على لحاء الصنوبر وطوره
النامي على القرواني . مظهره الخارجي على الصنوبر
صفت لا قياسي الشكل والحجم كونه يتأرجح بين الاحمر
والاصفر مركب الاغصان والاثنان من اوسط ايار الى
اوائل تموز فيقرح الحاء ويسبب الاغصان المصابة .
وهو على القرواني يقع لقياسه الشكل والحجم والتجميع
تركب نصل الاوراق على صفحتها السفلى تقسب ارتفاع
البشرة وانفجارها ثم صلب التسج وذبوله .

١٢٦٥٦ - زُحَابِيَّات
Cronartiacae (S). Cronartiacées (F). Cronartiacae (E).

فصيلة طيور مجهرية من رتبة الدماحيات قليلة الاجناس
والانواع . تتميز بعلاماتها الانقباضية الشكل والتجميع .
اذاها جرابة تملو سطوح الانسجة المنحجرة . ذماتها
وسادية او مدية الشكل . بونياتها صنفرة كروية .
اعرف وأشهر اجناسها الزحلاب والكروبيكس .

١٢٦٥٧ - زُكُولِيَّة
Sismique (F). Seismic (E).
نمت شرقي يطلق على كل ما له علاقة بالزلازل وبالزلات
الاذنية .

١٢٦٥٨ - زُكُولِيَّة
هو الازدعت ، اعليه .

١٢٦٥٩ - زُحْم
Garçure (F). Chap (E).
شروق سطحية في اطباء ضرور - البقر والمزى .

١٢٦٦٠ - زُحْمَب
زلف وزلفه وال تمام : وبر اي نبت عليه الور .

١٢٦٦١ - زُحْم
Parc (F). Park (E).
الروضة النضرة الريانة جادت مياهها وكثر طيرها .

١٢٦٦٢ - زُكُوم
Museum des canidés (F).
Muzzle of canidae (E). هو غظم الكليات واشملها .



زحلاب الصنوبر



زحلاب القرواني



زلم



زليجة

ظهوره مشج بالايض والايض الاسود .
قوامه ومناكه وأطرافه زيكه سود . بلنه وباطن مقع
وكسحه ييض . رسفه الى الرمة الزرقاء || الذكر اصفر
جنت من الانثى وانثى لوناً واصلب شكية || يحوب
البلاد في طلب القوت والمصيف والمشي || يأنث الجبال
والغابات والاسراج . يئنث منه بين فروع الاشجار
الباسقة . انشاء تحفن من وقتين الى ثلاث وقتان
نحو الشهر || يئلس قوته عنه الصباح الباكر .
يرغب في الجبث للثنته يشربها مها كانت جلوهها
قاسية .



زَيْلِقَة

١٢٦٦٠ - زُمَاحِيَّات
Sarcophages
فصيلة من النسور تنتمي الى رتبة الجوارح . اجناسها
الحالية ثلثة تشمل الزباج والكنكور .



زُمَاحِيَّات

١٢٦٦١ - زُمَاح
Cri de l'autruche (F).
Cry of the ostrich (E).
صوت للتملة وفي الصلحاح صوت النعام .

١٢٦٦٢ - زُمَاو *
Barita (S).
Fîloteur (F). Morning-clock (E).
طائر من فصيلة الفرايات . انواعه المرموقة ثلاثة موشيا
استرالية وشمسية . يأنث البوم والارواح المبسة الاجبار
ويقترّب من الاساكين الاكلة والنازلز الرقية || جسمه
كبير القد بطول نحو ٤٢ سم . ثوبه اسود اسم . قلاله
وظهوره الى البياض الاخير . لواحف جناحه وذنبه الى
البياض الناصع . منقاد غرظي الشكل ازرق اللون .
حققة عينه كشمسية . جناحه كبير القد ينفث لثقب .
ذنبه فيه مقطوم الطرف . رسفه الى السرة السوداء ||
اغلاله هنية . من ميزاته انه يئاش ترديد الحانه منذ
الصباح الباكر . ينثات صوته قريبة ثلثة بنجات الزمار
ما دعى الى تسميته بزمار || قوته الحشرات من اختلاف
اجناسها وانواعها واصعبها الكبيرة ومنها الجراد || يئنث
عنه في الاجبار الزبارة النمل المتعددة الارتفاع . الاثى
تحفن من مرتين الى ثلاث مرات في الحول . حسنتها
تزاروح من يئشتين الى ثلاث ييضات تقوم بترغيبها دون
الذكر الذي يئنث لها النداء .



زُمَاح



زُمَاح

١٢٦٦٣ - زُمَارُ الرَّمَلِ
طائر من القمق . اطلبه .

١٢٦٦٤ - زُمَارَاتُ الْبَحْرِ
Syngrathidae (S).
Syngrathidae (F). Syngrathidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من رتبة شعياتك المياح اجناسها
وانواعها عديدة اشتهرها زبارة البحر وسمان البحر .

١٢٦٦٥ - زُمَارَةُ الْبَحْرِ
Syngrathus (S).
Syngrathus (F). Syngrathus, Pipe fish (E).
جنس اسماك صغيرة مسطيلة . اجسامها غرظية الشكل
تدقة المؤخر المتسلف كاصفي . وروسها مسطيلة
كالنقار الانطس الطرف . تحمل زعنفة ظهرية واسعة
تقاولها فيه زعنفة بطنية متنامية في الصغر . انواعه
مدينة موشيا . جمع بحار العالم . امرؤها وانورها زبارة
البحر الابرية .



زُمَارَةُ الْبَحْرِ الْإِبْرِيَّةِ

١٢٦٦٦ - زُمَارَةُ الْبَحْرِ الْإِبْرِيَّةِ *
ابُو زُمَارُوك
Syngrathus acus (S). Syngrathus alguille, S. trompetta, S. serpens de mar (F). Needle pipefish (E).
نوع من زبارة البحر بطول نحو ٥٠ سم . تكثر في
البحر الابيض المتوسط وقرب شواطئ المحيط الاطلسي .

١٢٦٥٤ - زُمَيْلِقَة *
Brugnon (F). Nectarine (E).
هي الياض ثمرة الدرائن مها كان شكلها وقد صار
استادها الى التاجر المرمغة البشرية . ج زليق .

١٢٦٥٥ - زُلَيْقُو
مادة سامة ترتكز على مشقات النايوم . عرضها التجاري
المروف يأتي على شكلين : الشكل الاول حبوب مسبوقة
تستعمل للقصاء على الفيران والكنكار والناجس .
والشكل الثاني مجوّن وضع خصيصاً للاستعمال في مختلف
انواع العلوم وهو يقضي على الجرذان والارانب والكنكار
واشباها . انما يجب على كل من يستعمل مستحضرات
الزليق ان يكون ملدراً فيبعدها عن متناول الطيور والحيوانات
الناجحة لانها مؤذية وقد تكون مينة .

١٢٦٥٦ - زُمَاح * ، زُمُج
Herpethocheres (S).
Macagus (F).

جنس طير من عمارة الزبارة وفصيلة الصقريات . انواعه
ثلثة جميعها من الجوارح الصغيرة اقلد طولها يراوح من
٣٥ الى ٤٥ سم . انولها موشية بيوشة تلب فيها الجوزة .
ارياشها شاسعة . وروسها غليظة . مناسرها قوية عمودية .
سواقطها مسطلة . اذناها مستدقة . ارساها ثخينة .
غالبها حادة . الواحدة زججة || ارساها قليلة العدد
يحوب البلاد في طلب المصيف والمشي . تألف عباري
الماء وأطراف الغابات || قوتها الاراعي والعلطاء
والمويتات واغشرات وبعض الاسماك . يقال انه لم يأكل
احد من لحمها الا مات . قال الشاعر :
« أهل الهند اصيبت لهم عرو
ليت شمرى أم غلاما الزباج »

١٢٦٥٧ - زُمَاح
Sarcophame
جنس طير من كواسم النسور وفصيلة الزباجيات . انواعه
قليلة جميعها كبيرة اقلد بلقاء الثوب . وروسها واعناها
غفيرة . سواقطها مسطلة . ارساها سرسة غالبها قوية .
قوتها الجبث للثنته ومنهم من قال ان الزباج يأخذ الفضل
من مهله || اعرف انواعه واشهرها الزباج الملكي وزباج
اسريكة .

١٢٦٥٨ - زُمَاحُ كَلْيُورِيَّةِ
Pseudogryphus californianus (S). Sarcophame de California (F).

طائر من الزباج ملوه نحو ١٢٠ سم . وبسطة مسطلة
٢٥٠ سم . ثوبه اسود . مقطه ابيض . رأسه اغفر الرئش .
كبير العرف . اجسد الاذن والزائد . غليظ المنسر
الاعتقت البيرة || يئنث عنه على الحضيض وبين غشائيت
النسور في الجبال الريفية . انشاء تحفن من وقتين الى
ثلاث وقتان نحو الشهر || يئلس قوته طول النهار .
يرغب في الجبث للثنته مولده امريكة الشمالية اعصها
كليغورية .

١٢٦٥٩ - زُمَاحُ مَلِكِي *
Sarcophamus gyparcus papa (S). Sarcophame royal, S. papa (F).

طائر من الزباج يعرف باسم ملك النسور ملوه نحو
٩٠ سم . وبسطة مسطلة . رأسه اغفر الرئش .
خري اللون . منسره غليظ الشكل اسود الانتشاب اخر
الميكمل اعنفق البيرة المقطوعة الغفانة . عرفه يرتقالي
اللون . صدره اغفر اصفر . جثثه مطوق بالازرق .

Plumes sus-caudales (F). **زُجَيْجِي** ١٢٦٦٩
Sus-caudals feathers (E)
من ريش ذنب الطائر مركزة بين الانفيك والزنكي .
ومنهم من قال اصل ذنب الطائر (Croupion) .

١٢٦٧٧ - **زُجَيْجِيل ، لَحْسَنَالِيَه ، زُتْبَيْقِ الْبَيْر**
Lachenalia (S). Lachenalia (F). Tiger lily (E).
Lachenalia (D). Lachenalia, Giglio leopardo (I).
جنس نباتات صليبية من فصيلة الزنبقيات . انواعه كثيرة
العدد . اوراقها صفية الشكل . ازهارها سنبلية او
عقودية التجميع يحملها شراخ اجوف رفيع . اشهر
انواعه الازرقية ما يلي .

١٢٦٧٨ - **زُجَيْجِيل سَحْلَتِي**
Lachenalia orchidoides (S). Lachenalia-orchis (F).
نوع من الزنجبيل . اوراقه صفية الشكل لحمية النسيج
حرفية الخطار المنحرف . شمراره يملو من ١٠ الى
٢٥ سم . ازهاره سنبلية التجميع . جرسية الشكل ،
عارقة البتلات ، عطرية الرائحة ، يشاهد اللون يعلوها
مواج ازرق او صفراء اللون يعلوها موج اخر . ازهاره
يدوم طوال شهر ايار .

١٢٦٧٩ - **زُجَيْجِيل مُعَدَّتِي**
Lachenalia pendula (S). Lachenalia pendula (F).
نوع من الزنجبيل . اوراقه صفية الشكل لحمية النسيج
تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . وترش من ٤ الى ٥ . شمراره
يملو من ١٠ الى ٢٥ سم . ازهاره جرسية الشكل ،
عقودية التجميع . متدلية الارتكاز . تحمل صفات من
البتلات الخارجية اقصر من الداخلية لونها الى الحمرة .
اما الداخلية فتصلها بتنفسي اللون ومقصبات ليفية .
ضروبه عديدة تتميز بالوانها . ازهاره يشتر طوال
كانون الاول والكانين .

١٢٦٨٠ - **زُجَيْجِيل يَاقُوتِي**
Lachenalia rubida (S). Lachenalia rubis (F).
نوع من الزنجبيل . اوراقه سنانية الشكل تطول من ١٢
الى ١٦ سم . وترش نحو ٣ . شمراره يملو من ١٥ الى
٢٥ سم . ازهاره جرسية الشكل عقودية التجميع تله
من ٥ الى ١٥ زهرة لونها ياقوتي تلبثها الخارجية اقصر من
الداخلية . ازهاره يدوم طوال شهر ايلول .

١٢٦٨١ - **زُحْمَاط**
Clasterosporium
جنس فطور مجهرية من عماره الريدانيات وفصيلة
الحماقيات . كنانده عديمة ، مستطيلة ، مدورة ،
جانبية التقسيم . زُتْكَر حل حيث غليظ يقوم مقام
الجرب . انواعه قليلة ، اعرفها زحماط البن وزحماط
الشندر .

١٢٦٨٢ - **زُحْمَاط الْبُن**
Clasterosporium coffeanum
فطر مجهري يركب اوراق البن فيؤذيها . مظهره
الحماضي يقع صخرة مبردة تملو النصل حل صفحته
البيا . ثيدو صفراء اللون ، سمرار الخطار تنسع وتتحرف
على السرة يعلوها حل قليل الكثافة اشهر اللون يقودها
الى الذبول والبياس .

١٢٦٨٣ - **زُحْمَاط الشَّوْكَدَر**
Clasterosporium putrefaciens
فطر مجهري يركب اوراق الشندر فيعطها . مظهره

Hétérogénéité (F). **زَمَاع ، زَمَع** ١٢٦٦٧
Heterogeneity (E).
هو عدم الانسجام الجسموي والشكل الذي يملو بين
عختلف افراد القريب الواحد في الموقع الواحد .

١٢٦٦٨ - **زُصَاعَة**
Pleurotoma (S).
Pleurotoma (F). Pleurotoma (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الرئيل
وفصيلة الكريزيات . انواعها المتناسرة المروفة عديدة
منتشرة في منازل بحار البلاد الحارة . اصداؤها مخروطية
محزونة ، دقيقة الاضباب ، مستطيلة القنويات الميزابية
الاطراف ، حيلة الاوران والتراويق والزرخرة . اسفاطها
قوية للمادة .

١٢٦٦٩ - **زُصَالَة**
Bécassine (F).
Livestock trailer (E).
الزئالة شاحنة ممددة خضيساً لنقل البهايم .

١٢٦٧٠ - **زُصَام**
Herbes hautes (F).
High herbs (E).
هو العشب المرتفع .

١٢٦٧١ - **زُصَالَة**
Invalidité, Incapacité de
travail (F). Disability, Incapacity for work (E).
صفة ما هو لاشري او غير مستوفي الشروط ، والسير
والقصور وعدم الاحلية .

١٢٦٧٢ - **زُصَت ، اَبُر قَلَمُون**
Pyrrhocorax (S).
Chocard, Corbin chocard (F). Chough (E).
طائر من الغربان ربيع الجفة طول نحو ٤٠ سم . ثوبه
اسود اللون اخضر الملوخ . منقاره اصفر ، عيناه صليتان ،
رساه ونخاله حر . موطنه حوض البحر المتوسط . يعيش
اسراباً كثيرة العدد . قوته الديدان والحشرات والجرب
والثآليل انحصا الصنعية . يذش حشه في صواعق الصغور
والغمار . الاثن تحضن وسدعا من ٤ الى ٥ بيضات
لونها الى البياض الاخير يعلوه ثوب اصفر .

١٢٦٧٣ - **زُصَت الْجُرْدَة ، عَيْقِي**
Pyrrhocorax alpinus (S). Chocard des Alpes (F).
نوع من الزئوت وهو طائر من الغربان ربيع الجفة طول نحو
٤٢ سم . ثوبه الى السواد الاخضر الملوخ . منقار الى
الصغار الحظلي . عيناه خروبيتان . رساه ونخاله الى
الحمرة الجردية . موطنه حوض البحر الايطي المتوسط
يجبرها الى الحماض والديدان في فصل الشتاء من يمد اليها
في اواسط الربيع . يآلف الحياة الجماعية ، سره لا يقل
عن ثلاثة ازواج ولا يفوق عشرة . قوته الحشرات والديدان
والقشريات والجرب والثآليل ولا يصف عن جيفة ايها
شامدا . يذش في صواعق الصغور وفي الغمار والاطلال .
انشاء تحضن وسدعا من ٤ الى ٥ بيضات تبينة اللون خطية
الرقعة اللامسوبة التوزيع .

١٢٦٧٤ - **زُصَج** هو الزجاج ، الحليه .

١٢٦٧٥ - **زُصَج الْمَاء ، لُورَس ، لُورَس**
Larus (S). Mouette, Götland (F). Gull (E).
جنس طير من رتبة كليات القدم طوليات الريش
الابيض . يطرن اسراباً فوق الماء فيختلن منه البسك .
انواعه عديدة منها الجركة والحوري والدغية والدنكة
والرورس والزردبي والسكني والسويدي والعجمية والوروس .



زَمَاع



زست



زُتْ الْجُرْدَة



زنج الماء



زجبل ياقوتي



زحماط الشندر

١٦٦٩٣ - **زُمَكَة** هي الزئاع ، راجع .

١٦٦٩٤ - **زُمَكْ ، زُمِكِي ، قُظْن** Croupion (F).
Parson's nose (E).
منبت ذنب الباتر .

١٦٦٩٥ - **زُمِكِيَّات** Haloragaeae, Cercodianeae (S).
Haloragées, Cercodianées (F). Haloragaeae, Cercodianeae (E).



زمر ، زيمر

فصيلة نباتية من باديات الباقع ، ذوات الفلقتين ، مستقلة القنات ، ملتصقات الجوف . اجنسها ثمانية اما انواعها فنحو ١٠٠ نباتها اشباب ونبات بعضها مقني وباني . انواعها عشيرة صغيرة القند مختلفة الالوان .

١٦٦٩٦ - **زُمَكَة** Dessalage, Dessalaison (F).
Removal of salt (E).

الزملحة ازالة الملوحة من الماء .

١٦٦٩٧ - **زُمُلُول** Exobasidium
جنس فطور مجهرية من فصيلة الزملوليات يطفل على بعض النباتات الزينية فيؤذيها بعد ان يجهد اوراقها ويلوي غصنها || اشهر انواعه واعرفها الزملول الياباني .



زمر مجري

١٦٦٩٨ - **زُمُلُول ياباني** * * * **زُمُلُول الجلسان** Exobasidium japonicum, E. azaleae (S). Faustecloque de l'azalée, Gallies foliaires de l'azalée (F).
Azalea galls (E). Ohrtappchenkrankheit der azaleen (D).

فطر مجهرى يتطفل على الجلسان (ازاليه) فيؤذيها ويجهتها . منظره الخارجي يجهد في الاوراق وتضوي في البرام والنواحي التي يملوها الفطر حيث تبدو كأنها مظاة بارسية خلية بيضاء اللون تكثف بعض الورديات فتسبب تقلص الخشب وتحول فيها المواد النشوية الى سكرية . يكاثف بقطع الانصاف المصابة وينضج النبات بسائل بوردو المركز ١٪ او باحد الفوطامر الحبرية .



زملول ياباني (١)

١٦٦٩٩ - **زُمُلُولِيَّات** Exobasidiaceae (S).
Exobasidiaceae (F). Exobasidiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات . اجنسها وانواعها نحو ٦٠ منها فطور مرضية الدعامات تتكون بين الخلايا النباتية هييفا ضعيف البنية رزني الصميم ينشأ تحت الطبقة الدامية . وبها فطور دبسية الدعامات التشمبة البسيطة المرأشت الحيطية المنفصلة || اشهر اجنسها واعرفها زراعيا الزملول .

١٦٧٠٠ - **زَمَن** Période (F). Period (E).
اسم شامل يدل على الفتر وهو عهده الفاعم . فالزمن المطلق وهو من اجات المتلفه ، حالة استمرارية لا نهاية لها ولا علاقة لها بالمادة او الحركة || والزمن في العلوم الطبيعية كالفلك مقياس لايتبدل ويجري لا علاقة له بالمكان || والزمن النسبي الذي يقاس بظاهرة طبيعية معينة كدوران الارض حول الشمس يدعى الزمن الشمسي || والزمن الحسبي هو الحقبة التي مرت بها الارض في تكونها .



زملول ياباني (٢)

١٦٧٠١ - **زَمَكَة** Fonte de la neige (F).
Melting (E).
الزملة سيلان الثلج بعد ذوبانه .

الخارجي يقع صغيرة مستديرة حطية اللون سرمد الحار يملوها خل ليفي تركب الاوراق تسلبها وقد تصيب المشائل تنفسيها .

١٦٦٩٨ - **زَمَر** ، **زَمِير** ، **أَبُو شَوْكَة** Gasterosteus aculeatus (S). Epinoche commune (F).
Stickleback (E).

سمكة بحرية من فصيلة الزيريات . صغيرة القند طوله من ٣ الى ٥ سم . جسمها عديم الفلوس . وعانها ثلاثية . تشبه بالواكها النافثة المتفاوتة القند ، ثلاث منها ظهرية وواحدة بطنية .

١٦٦٩٥ - **زَمَر يَحْرِي** * * * **زَمِير يَحْرِي** Spinachia spinachia (S). Epinoche de mer (F).
Pricle-back (E).

سمكة بحرية من فصيلة الزيريات . اصطناعها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط . تألف معاصب المهاجم والتفتاق . الاثني عند اقتراب زين التفرقة . من نسيان ال حزيوان ، تسجل مع الذكر عشاً من اثنت تحبكه بين النباتات البحرية وتلتصق بمادة غريبة تفرزها الكلى . الذكر يحرس على السر ولا يغادر الش إلا بعد التلحج || جسمها صغير القند ، يحول الجرم ، يطول من ١٣ الى ٢٠ سم . غطها مثلث الاسطاة . فها مسن الفكين . جسمها عديم السيف باستثناء الجانبين المجهزين بنحو ٤ شرفه . زعنفتها الظهرية خفيفة الارتكاز يستبقها صف من المناس يد من ١٣ الى ١٥ . زعنفتها الخلفية صغيرة منحنية الشكل || غصها متوسط الصنف فير مرطوب فيه .

١٦٦٩٦ - **زُمَرَة ، فِكة** Groupe (F).
Group, Clump (E).

مجموعة نباتية تنصنف بلات الاشكال الخارجية او تحتل ببعض الصفات الجنبية المقررة .

١٦٦٩٧ - **زُمُرْد** Emeraude (F). Emerald (E).
نوع من الزبرجد وهو حجر بلوري كريم لونه يراوح من الاخضر الى الازرق . غروبه حديدية انغمزا اقلها ازرقاً واشداه لمة .

١٦٦٩٨ - **زُمُرْمُورَة** هي المرموزة ، اطليا .

١٦٦٩٩ - **زَمْرِيَّات ، زَمِيرِيَّات**

Gasterosteidae (S). Gasterostéidés (F). Gasterosteidae (E).

فصيلة اسماك بحرية ونهرية من السمليات الشائكات الزعانف . اجنسها وانواعها ثلثة البلد جميعها دقيقة الاجسام الصغيرة . البحرية منها اكبر قدماً من النهرية .

١٦٦٩٠ - **زَمُرْمُورِي** هو الاريجون ، اطلب .

١٦٦٩١ - **زَمُع** Guêpe mâle (F). Male wasp (E).
الزبور لا ابرة له . وهو الذكر من الزناير .

١٦٦٩٢ - **زَمَكَة**

هي البرعة بوجه عام . وهي الابنة التي تخرج منها النورة او المنقود الزمري . وهي حنة زائدة وراء الفللف ، في كل قائمة زمستان . يقال فرس ولفاء الزرع . وهي ايضاً الشجرة الدلاء في مؤخر ربل الشاة .

١٢٧٠٨ - زَيْمِير هو الزمر، اطليه .

١٢٧٠٩ - زَيْمِير هو خرطال فزا ، اطليه .

١٢٧١٠ - زَيْمِير تَبَوِي هو الخرمال الفريان ، اطليه .

١٢٧١١ - زَيْمِيَكَة Fabraea

جنس فطور مجهرية من السقيات وفصيلة الخشاريات يتبين بسلته الصغرة اللحم التي تتكون داخل الساق الأديم ثم تتجه نحو الخارج حيث تنفلق . بعضها ثنائي الخلية . يوبناها متصالية شفعية رباعية ٥ أشهر انزاعه الخلية الثلاثية التالية .

١٢٧١٢ - زَيْمِيَكَة السَّرَجَلَة

Fabraea maculata, Diplocarpon soraneri, Entomopeziza masplii, Stigmates masplii, Entomosporium maculatum (S).

فطر مجهري يركب أوراق السرجيل ويصيب الثآليل وقد يترى أوراق الاجاس والاكيديا ٥ مظهره الخارجي على أوراق السرجيل ، يقع صلبة شبه مستديرة قطرها من ٢ الى ٣ سم . تبدو صلبة على صفة التصل العليا ثم تتكاثف تنم كامل التصل . لونها وردي ثم مرجاني وينتهي الى الجوزة المايقة ٥ وهو وصل الاجاس يقع بذات اللون صغرة القند مستديرة مبيضة على كامل التصل ٥ اما في الاكيديا فقطر بقعة براوح من ٣ الى ٤ م . وهي مقرنة الزوايا مبيضة على كامل التصل ، تكثر قرب اطرافه ٥ اضراره منوطة برطوبة التربة الرطبة بالماء الجوية المواتية ٥ يكافح باستعمال سائل بورودو المخلوط ٥٨ ٪ على مرتين ، المرة الاولى بعد تمام الاوراق والثانية بعد الاول بثلاثة أو أربعة اسابيع .

١٢٧١٣ - زَيْمِيَكَة التَسْرِين

Fabraea earliana, Mollisia earliana, Diplocarpon earliana, Marssonina potentillae (S).

فطر مجهري يركب أوراق التسرين والشيلك فيطباها . مظهره الخارجي يقع قرمزية لا قياسية الشكل ولحمي تقريبا قبلها براوح من ٣ الى ٦ م . تركيب الاوراق قد تتشرب تنم كامل التصل حيث تشل الحركة النسبية . وقد يركب اذن الثآليل فيصيب سقرطها ٥ يكافح مكاملة النغطة باستعمال سائل بورودو المخلوط من ٥٨ الى ١ ٪

١٢٧١٤ - زَيْمِيَكَة الرَوْدَة

Fabraea rosae, Diplocarpon rosae, Marssonina rosae, Actinonema rosae (S).

فطر مجهري يصب أوراق الرود فيطباها ويسب سقرطها . مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل ولحمي تقريبا الاستدارة لونها الى الجوزة مايقة تركب التصل على صفة العليا تنضب التسج بعد الاخلايا وتسبب الاجاس الباكر مما يؤدي الى وقف النمو وعدم انتظام الدورة الميائية الخلية ٥ يكافح باستعمال سائل بورودو المخلوط من ٥٨ الى ١ ٪ يضاف اليه الصابون المخلوط ١٠ ٪ او باستعمال الكبريت الميكروني الممزوج ١٠ ٪ زرينيات الرصاص بمعدل ٩٠ ٪ كبريت ١٠ ٪ زرينيات تقييها على النبات من السج الى الثآليل مرات .

١٢٧١٥ - زَيْمِيَكَة ستاكيليدريم Stachylium

جنس فطور مجهرية من السقيات وفصيلة الطحيات . هيفه الكنديه متعصب ، متعصب ، عايق اللون ، يعمل في اطرافه ككائن بسيطة ، شائعة ، يفضية جشوية التسجيع .

١٢٧٠٢ - زَيْمِيَج Cenangium

جنس فطور مجهرية من الزيميجيات وفصيلة الخشاريات . سلته ملونة خافتة تتكون الجوانب وتتو داخل الامة فتسبب انغلاقها . تكاته ضخمة ، يوبها ثنائي التسجيع ، اعليها للشكل ، بسيط التركيب ، وسيد الخلية ، شفاف اللون او حنطي ٥ له نومان مؤذيان نيميج الحور وزيميج الصنوبر .

١٢٧٠٣ - زَيْمِيَج الحَوْر

Cenangium populeum, Dothichiza populea (S).

فطر مجهري يصيب الحور في لثاله فيطبه وقد يمتد . مظهره الخارجي يشوب صغرة اللون تنشئ اللحاء تلخعه يوشح الى الصغرة فالتياض . يركب الاوراق في بائن الامر ثم ينتقل منها بمشيجه الى الاثان والافصان والسوق ٥ يكافح بقطر الافصان الموبوة ويظهر الجروح وينشع للثآليل بسائل بورودو .

١٢٧٠٤ - زَيْمِيَج الصَّنَوْبَر

Cenangium ferruginosum, C. abietis, Dothichiza ferruginosa (S).

فطر مجهري يركب الصنوبر فيؤذيه وقد يسبب موته . مظهره الخارجي احمرار يصيب هدب الصنوبر ، على سد زله الاول ، فيطوح يسه ويفتلق بمشيجه الى الاثان والافصان فيطباها ويلبها ثم يمت الشجرة بعد ان يغضب غشيا بالسرة وبعد ان يكسبه بعض الصلابة القاسية العالية .

١٢٧٠٥ - زَيْمِيَجِيَّات Cenangiaceae (S).

Cenangiaceae (F), Cenangiaceae (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بسلاتها القرصية ، الملوحة ، الخالية ، او الصلبة الجسم ، القائمة على ونية لينة . تكاثف متشابكة مع تكاثف التشعية . يوبها ديد الاشكل مختلف التركيب ويوباها هو وسيد الخلية في الزيميج اذ به شفعي الاخلايا مديحا في الدفر ٥ له جنسان شيربان هما الزيميج والدفر .

١٢٧٠٦ - زَيْمِيَكَة Epicoccum

جنس فطور مجهرية من عمارة الطحيات وفصيلة الكندييات . ونيته شارة . جربه الكنديه كرودية ، قصيرة حنطة اللون . كاتته طرية كروية مايقة السرة . انزاعه قليلة اللد والاذى جميعا ردية تيش على لحاء الافصان اليابسة وعلى المواد النباتية للملحة .

١٢٧٠٧ - زَيْمِير ، مَرَوَس الدَّشِيَش

Erythrospiza glaginea (S), Erythrospiza glaginea, Trombestiere, Moros (F), Trumpeter bullfinch (E).

طائر من فصيلة البشرويات . وهو من الصائير القواطع التي تجرب البلاد في طلب البردق . سره براوح من ٣٠٠٠ الى ٣٠٠٠ صغور . اعطانه تمتد من الجزيرة الى افريقية الشرقية والشيالية يجرها في اواخر الربيع ويمد لها في اواسط الخريف ٥ طوله نحو ١٣ سم . منقاره غروطي الشكل قصير القند . جناحه مستطيل ذلق . ذنبه فارق . قو به الى الصغرة البرادية يطعها مواج وردي ، يتبين بصياحه الهاد الذي يشبه التزير . يألف البحر والجبال ولا يبتعد عن الماء . يترن في تجاويص الصخور . اثناء تحفن من ٤ الى ٥ يقات . قوته الحشرات والحوام واليزور البرية .



نَمِيج الحور



زَيْمِيَكَة السرجيل



زَيْمِيَكَة التسرين



زَيْمِيَكَة الرود

١٧٧٢٥ - **زُونْدَارِي** ، **حِزْكَامِي** **Zoniiforme (F).**
Belt-shaped (E).
نمت وصفي يمتلئ على ما كان شكله كالزئزار أو الخزام .

١٧٧٢٦ - **زُونْدَاتُ الصَّبِي** * **Byturus aestivus (S).**
Byturus aestivus (E).

حشرة وأشتهت ثماره من فصيلة الزئزليات ورثة معدلات الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الأدنى وأروبة ، تألف البراري والاحراج البغلة والأودية الغظيلة والمراعي الرطبة . غناصها تعيش على مثل الزئزار وطعمها . يرقاتها تعيش على الثمار البرية وأخصها معص المعوج || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى السرة الصهباء يطولها خل سحلي . رأسها مستدق الجسم . عينها صغيرتان بارزتان . زئزناها صولجانيان ، دقتان . ظهورها قليل الإحدياد مستدير المخزخ المزخز اللث . غداها كثيفتا الخلد والزغب . أرساغها خامية العقل و حجة الخالب || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملدة في اوائل ايار وتعيش حتى ابواخر تموز . تسرح في الثمار وتبيت في الليل || البرقة بطيئة النمو تطول عنه الادراك تمام نحو ٦ م . جسمها مبطط الجسم و مستطو القدم والرأس و مستدق المخزخ و سداسي الوجاب و سحلي اللون و اسمر الرأس || طول الكمال الذي يستمر من ١٢ الى ١٥ يوماً ثم في التربة ويتفشي ضمن صلجة سمكة للشواء المركب من مواد عضوية وثراب .



زُيَمَةُ الموز

١٧٧٢٧ - **زُونْدَاتِيَّات** * **Byturidae, Tricaxidae (S).**

Byturidae, Tricaxidae (E).
فصيلة حشرات وأشتهت ثماره من رتبة عذبات الاجنحة || اجناسها وأترعها قليلة البدن . منهاها يشغل معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والمنسوحة نحو البادية . غناصها تعيش على مثل الزئزار . يرقاتها تسرح الثمار وتنتشر داخلها || اجناسها صغيرة القد و مستطيلة الشكل ، خلية انتشار ، مستعرضة القروس ، صولجانية الزئبان المركبة من ١١ فصلة ، اغادها مستطيلة لاسعة . جرائرها مستعقة . أرساغها خامية العقل تشبه بصغر العلة الا ان والرقابة || اشهر اجناسها الزئزاط .

١٧٧٢٨ - **زُونْدَاتِي** ، **مِحْرَفَات** **Biseus (F).**

Chamfered edge (E).
اداة تستعمل لسحر في الخشب ولغيره .

١٧٧٢٩ - **زُونْدَاتِي** **Koleria (S).**

Koleria (F).
جنس لثلاث شعبة و برية ، مرموعة ، حولية او مرموعة من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة مدقة منهاها يستمر من الشرق الاوسط الى بعض اصقاع اروبة || جميعها شطنية متوسطة الانتفاع . صعلها شيق ، مستطيل . ازئزارها عتودي منتصب .

١٧٧٣٠ - **زُونْدَاتِي** * **Cercaspora (S).**

Cercaspora (E).
جنس طيور مجهرية من فصيلة الرنجلديات . تنبت بحجرة الكتيبية الدغلية القليلة الفروع . كئانه اسطوانية محزوزة الشكل ، عديدة الزئبان الممرضة || انواعها كثيرة تركب اوراق الثبات . امرؤها ما يتبع .

١٧٧٣١ - **زُونْدَاتِي الدَرَّاقِين** * **Cercaspora persica (S).**

Cercaspora persica (E).
نظر مجهرية يركب اوراق الدراق . مظهره الخاربي



زُونْدَاتِي صَبِي

انواعه قليلة تركب المواد الخشبية السائرة الى الاغول ومنها نوع يصيب الموز فيؤذيه .

١٧٧٣٦ - **زُيَمَةُ الموز** * **Stachyldium musae, S. theobromae (S).**

Bout de cigare de la banane, Maladie du bout de cigare (F).
نظر مجهرية يركب ثمار الموز في اصنافها وتثورها فيحطبا ويثويها ويؤذيها ويسبب لهاها بعد ان يقوده الى الاغول . وقد يمتري ثمار الكاكار فيحطبا || يكافئ يظهر الخزان وينضغ الموز المحفوظ بسائل شيرلان المحلول ٢ ٪ .

١٧٧٣٧ - **زُون** * **Desaichement (F).**

Drying up (E).
هو تجفيف المواد العضوية .

١٧٧٣٨ - **زُون** * **Nervule (F).**

Nervule (E).
الزئ النصيب اللين الذي يجمع بين الاعصاب الرئيسية في وشن الحشرة . ويدعى ايضا زئنة ج زئ و زئزات و زئزان .

١٧٧٣٩ - **زُونْدَاتِي** * **Aiguillon caudal (F).**

Caudal sting (E).
زئابة القرب: ابرتها التي تلدغ بها .

١٧٧٤٠ - **زُونْدَاتِي البَشَر** * **Crinoidea (F).**

Crinoidea (E).
صف حيوانات بحرية من قسم الشوكيات . رتبة وفضائل واجناسها وانواعها كثيرة البدن . منظفها من متحجرات الاحقاب البائرة . المعاصر منها منتشر في جميع بحار العالم اغصها بحار الاقاليم الحارة والمعتدلة الحرارة || اجناسها مركبة من قاعدة وساق وتوزيع وطباب . طبابها مستدير الشكل يعمل في فم الصفة العليا للفم والسر . ثوبها خامية القروس المستطيلة ومنها خامية حرة || جميعها في ابله عهدها ، مستقرة ثم تتحول بعد ذلك الى حيوانات ثابتة في موطنها او متقلبة تسرح حيث تشاء || اشهر فصائلها المعاصرة النسطوليات والمارجيات .

١٧٧٤١ - **زُونْدَاتِي مَحْشَرَة** * **Empicoris vagabunda (S).**

Empicoris vagabond (F).
حشرة قاتصة من فصيلة الدرويات ورتبة مختلفات الاجنحة . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٨ م . رأسها صغير الجسم . قصير العنق ، أصفر اللون . خطها مستدق الطول . عينها بارزتان . زئزناها مستطيلة و مفلتان . كسلها اصفر اللون يملو خططط طولي ومترسج اسمر . يحجبها صغيره مزوانة سمراء . يطها وتظهرها الى الصفار الندي . قاتنها الاماسيان بجوزان تقطن الا ان المور عادم المتخش || تسرح في الثمار . تألف الثبات والسكان الريفية . يكثر ويهدوا قرب المياه القذرة لانها تقطن الحشرات التي تعيش في هذه البيئة .

١٧٧٤٢ - **زُونْدَاتِي** * **Didymospora (S).**

Didymospora (F).
عارة ظهور مجهرية من فصيلة الطحيات . تنبت بيويناها الثنائية الخلية . اجناسها سبعة : الباقوع ، البسلوة ، البوليتريسيوم ، الخلد ، الزغاف ، الكردانة والمبارة .

١٧٧٤٣ - **زُونْدَاتِي** * **Tige florale (F).**

Stem (E).
عضو نباتي خشبي أو لني أو عشي منتصب الاثكاز مستطيل يعمل الانتزار .

١٧٧٤٤ - **زُونْدَاتِي** * **ذبابه صغيرة تكون في الحشوش . ج زئانير (السان).**

١٢٧٣٩ - زَيْتَقِ أَحْمَر * ، زَيْتَقِ مَرْتَقُون

Lilium martagon (S). *lis martagon*, *Martagon* (F). *Martagon-lily*, *Turkish-cap lily* (E). *Martagonlilie*, *Turkenbundlilie* (D). *Giglio martagone*, *Martagone*, *Turbante* (I).

نوع من الزئبق يملو من ٦٥ إلى ١٣٠ سم. ساقه اسطوانية قوية مغطاة بالاجر. اوراقه اسطوانية النصل ضمية التجميع ، كثيرة المروق || ازهاره كروية الرائحة كثيرة العدد تطول من ٣ الى ٨ سم ، لونها الى الحمرة البغمية الباقية يملوها تنميش جلوي . متاكها تبلغ ١٥ سم. ظلها اجر || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٢٧٤٠ - زَيْتَقِ إفريقية هو القمر ، اطلبه .

١٢٧٤١ - زَيْتَقِ الأبراج

هو البرجية ، من الزئبق ، اطلها .

١٢٧٤٢ - زَيْتَقِ الاسفانة ، زَيْتَقِ خَلْفَقُونَة

Lilium chalcedonicum (S). *Lis de Constantinople* (F). نوع من الزئبق يملو من ٨٥ الى ١٢٠ سم. ساقه زهاب . اوراقه كثيرة العدد صنية اللند ثلاثية وخامسة المروق . ازهاره عادية المرف قليلة العدد ، من ٢ الى ٦ ، لونها ارجواني تطول من الداخل وقعة حراء || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٢٧٤٣ - زَيْتَقِ الأند

Lilium andinum (S). *Lis des Andes* (F). نوع من الزئبق يملو من ٣٠ الى ٦٥ سم. ساقه اسطوانية دقيقة . اوراقه خطية تطول من ٣ الى ٦ سم. وتمرض من ٢ الى ٥ سم. || ازهاره قليلة المرف والعدد تطول من ٨ الى ١٠ سم. لونها الى الصفار المشرب الحمرة . متاكها تبلغ ١٢ سم. ظلها جلوي || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٧٤٤ - زَيْتَقِ البتير هو الزيجل من الزئبق ، اطلبه .

١٢٧٤٥ - زَيْتَقِ الفيرروج * ، ذَقْن الحية

Ophiopogon japonicus (S). *الفيرروجي* (F). *Ophiopogon japonicus*, *Muguet du Japon*, *Herbe aux turquoises* (F). *Japanese snake's beard* (E). *Japansische schlangenbart* (D). *Erba della turchine* (I). نوع من ذقن الحية الزيرني . اوراقه تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. نصليا جميل الحفار تقليه خطوط بيض وسفر . شراشه الزمري يملو من ٥ الى ١٠ سم. ازهاره صنية اللند ليلية اللون تطول نحو ٧ سم. || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران . تجار صنية الشكل فيروزية اللون تقوم من تموز الى كانون .

١٢٧٤٦ - زَيْتَقِ الشكار

اطلب نكه .

١٢٧٤٧ - زَيْتَقِ الوادي

هي اللوزة من الزئبق ، اطلها .

١٢٧٤٨ - زَيْتَقِ البانان

Lilium japonicum (S). *Lilium japonicum* (S). *Lis du Japon* (F). *Japanese lily* (E). نوع من الزئبق يملو من ٣٠ الى ٩٠ سم. ساقه نحيلة اسطوانية . اوراقه متعاقبة تطول من ٧ الى ١٥ سم. وتمرض نحو ٢ عروقه ثلاثة او خمسة || ازهاره عطرية

بمع سم تملو النصل حل صفحته العليا يقابلها حل الصنعة السفلى يقع خلية رادية اللون || اضراره زهيدة قليلة الاذى لا تتسبب للمكانة .

١٢٧٣٢ - زينة الفطن *

Cercospora gossypii (S).

فطر مجهرى يركب اوراق الفطن ، مظهره الخارجي يقع لا يقاسم الشكل والحجم توشم النصل حل صفحته العليا || اضراره زهيدة لا تتسبب للمكانة .

١٢٧٣٣ - زينة شائعة *

Cercospora herpotrichoides (S). *Champignon X* (F).

فطر مجهرى يقال ان اتحاده مع الصريان يقع لشد الاذى في بعض الزروع منها الحنطة والشعير || مظهره الخارجي يقع لا يقاسم تكثر فيها الاسطالة تركب اغداد الصفات ثم معة السلاحيات فتؤذي الارزاق والسوق وقد تملب الزروع وتؤذي || يكافح مكافحة الصريان .

١٢٧٣٤ - زَيْتَان

هو الصيدن من الذباب الساع ، اطلبه .

١٢٧٣٥ - زَيْتَان

Miniopterus (S). *Minioptera* (F). جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات . انواعه قليلة العدد . رؤوسها مخروطية ، فرائسها مقلوبة . آذانها متوسطة اللند منفصلة . الشفا واجنبها مستطيلة . اجسامها رشيقة طولا يراوح من ١٠٠ الى ١٢٥ سم . يستطاع من ٣٢٥ الى ٤٠٠ سم . واذناتها من ٥٥ الى ٦٥ سم . انواها بين الكهبة والسمرة || موطنها الشرق الاوسط واروبة الجنوبية والريفية الشرقية والشمالية || طيراتها خفيف سريع يشبه طيران الخفاف . تعيش ازواجا او جماعات قليلة العدد . تألف المغاور والكهوف واوراق الصغور والبيوت الخربة . قوتها الحشرات والمفرد .

١٢٧٣٦ - زَيْتَان

الزئبق : بقلة حارة حريفة مصدعة . من ابي حنيفة .

١٢٧٣٧ - زَيْتَقِ

Lilium (S).

Lis (F). *Lily* (E). *Lille* (D). *Giglio* (I).

جنس نباتات عشبية بصلية من فصيلة الزئبقيات . سوقها وحيدة مستقيمة مرفوعة . اوراقها القرصية والسوقية رمية النصل مستطيلة . ازهارها هامي الازنكار متقوي التجميع . ازهارها كبيرة الحجم ، جميلة الشكل ، فواحة المرف ، متعددة الالوان || اصرف انواعه واشهرها ما يتبع .

١٢٧٣٨ - زَيْتَقِ أبيض *

Lilium candidum (S). *Lis candide*, *Lis blanc*, *Bâton de St Joseph* (F). *White lily*, *Bourbon-lily*, *Madonna-lily* (E). *Weisse lillie*, *Marienlilie* (D). *Giglio bianco*, *G. della madona* (I).

ويعرف باسم زئبق مار يوسف. نوع من الزئبق يملو من ٩٠ الى ١٢٥ سم. ساقه قوية جامدة . اوراقه عديدة متعاقبة تطول من ١٥ الى ٢٩ سم. || ازهاره عديدة ، فواحة المرف ، تطول من ٨ الى ٨ سم. لونها الى الالبيض يملو توشج اجر ورشفة قرمزية . متاكها تبلغ ١٢ سم. ظلها اصفر || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .



زينة شائعة



زئبق ابيض



زئبق احر



زئبق الفيرروج

الشكل كثيرة طول من ٦ إلى ١٢ سم. وتقرض من ١٢ إلى ٢٥ سم. || انهارها عطرية ، قليلة البعد ، خضقة الألوان يكثر فيها الاصفر والبرتقالي والوردي والاراجواني || انهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٧٥٧ - زَيْتَبُ زَنْجَبِيلِي

هو الفتحصولي نبات جميل الزهر ، اطلبه .



زيتب انمر

١٢٧٥٨ - زَيْتَبُ صِينِي *
Lilium sinicum (S).
Lia de Chine (F). Chinese Lily (E).

نوع من الزنبق يملو من ٢٠ إلى ٩٠ سم. ساقه اسطوانية الشكل ، حراء اللون ، زباد . اوراقه كثيرة البعد تطول من ٥ إلى ١٠ سم. وتقرض من ٨ إلى ١٢ سم. || انهارها عاصمة البرف قليلة البعد لوها الى الصفار الكبريتي يملو تنقيش نمود . متاكها تبلغ ١٢ سم. طلها عايق الصفار || انهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٧٥٩ - زَيْتَبُ طَوِيلِ الزَّهْرِ *
هو الزنبق ، اطلبه .



زيتب بيري

١٢٧٦٠ - زَيْتَبُ طَوِيلِ الزَّهْرِ *
Lilium longiflorum (S). Lia à longues fleurs (F).
White trumpet-lily (E). Königsilie (D). Giglio lungo (I).

نوع من الزنبق يملو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه اسطوانية قوية . اوراقه متعاقبة تطول من ٧ إلى ١٢ سم. وتقرض من ٨ إلى ١٥ سم. انهارها عطرية طويلا من ١٢ الى ١٨ سم. لوها الى البياض اللطيف . متاكها تبلغ ٢ سم. طلها اصفر || انهارها يستمر من حزيران الى تموز .



زيتب صيني

١٢٧٦١ - زَيْتَبُ عَسْكَرِي
هي الخلزة من اللرجسيات ، اطلبه .

١٢٧٦٢ - زَيْتَبُ خَمِيح *
Lilium speciosum (S).
Lis brilliant (F).

نوع من الزنبق يملو من ٥٠ إلى ١٥٠ سم. اوراقه عديدة متعاقبة تطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. وتقرض من ٤ الى ٥ سم. || انهارها عطرية كثيرة البعد تطول من ٨ الى ١٢ سم. لوها الى البياض المشوح بالاحمر الخمرى . متاكها تبلغ ٢٠ سم. طلها احمر || انهارها يستمر من تموز الى اليلول .



زيتب طويل الزهر

١٢٧٦٣ - زَيْتَبُ قَلْبِي الْوَدْق *
Lilium cordifolium (S). Lis cordé, L. cordiforme (F).

نوع من الزنبق يملو من ٩٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه معتمة مستعرضة قليلة الشكل نصليا جميل الخضار الرايح تملو ماجة قرمزية || انهارها بقية الشكل ، عتقوية التجميع تطول من ١٠ الى ١٦ سم. لوها الى البياض الاخضر تملو نمشة قرمزية من الباقل انهارها يتقدم طولك شهر تموز .

١٢٧٦٤ - زَيْتَبُ كَرْوَلِيَّة *
Lilium carolinianum (S). Lis de la Caroline (F).

نوع من الزنبق يملو من ٩٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه اهليجية الشكل نصليا مالى البشرة حايق الخضار || حدد انهارها يراوح من ١ الى ٢٣ ، لوها الى الصفار البرتقالي || انهارها صيفي .

العرف ، اقية الارنكار تطول من ١٠ الى ١٨ سم. ياملها ابيض ، ظاهرا ودي . متاكها تطول نحو ٢ سم. طلها احمر || انهارها يستمر من تموز الى آب .

١٢٧٤٩ - زَيْتَبُ أَنْمَر * ، زَيْتَبُ هَرْقُط

Lilium pardalinum (S). Lis panthère (F). Leopard-lily (E). Tigerlilie (D). Giglio pardo (I).

نوع من الزنبق يملو من ٩٠ إلى ١٨٠ سم. ساقه قوية جامدة . اوراقه عديدة تطول من ١٠ الى ١٨ سم. وتقرض من ٢٥ الى ٥٠ سم. || انهارها كثيرة البعد عاصمة البرف تطول من ٥ الى ١٠ سم. لوها الى البرتقالي الزاهي تملو رقطة قرمزية كرمقة النمر . اسديتها مستطيلة . متاكها تبلغ ٢٠ سم. طلها جهوري || انهارها يستمر من تموز الى آب .

١٢٧٥٠ - زَيْتَبُ بَيْرِي *
Lilium eigrinum (S).
Lis tigré (F). Striped-lily (E).

نوع من الزنبق يملو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. ساقه جهورية اللون زباد الحاء . اوراقه متعاقبة متباعدة ، خاسية او مسابية البرق . تطول من ٧ الى ١٥ سم. وتقرض من ٦ الى ١٥ سم. || انهارها عاصمة الرائحة كثيرة البعد تطول من ٥ الى ١٠ سم. لوها الى البرتقالي الباقع يملو تخطيط جهوري اسفح الموج || انهارها يستمر من تموز الى آب .

١٢٧٥١ - زَيْتَبُ بَرُونِي
Lilium browni (S).
Lis de Brown (F).

نوع من الزنبق يملو من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقه قوية جامدة . اوراقه متعاقبة تطول من ١٢ الى ١٧ سم. نصليا حايق الخضار يملو موج احمر || انهارها عديدة متدلية تطول من ٨ الى ١٢ سم. لوها الى البياض اللطيف تملو رقطة متطيلة الاطار بنفسجي الخمر . متاكها تبلغ ١٢ سم. طلها جهوري || انهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٧٥٢ - زَيْتَبُ بَرُونِي *
Lilium croceum (S).
Lis orangé, Lis safrané (F).

نوع من الزنبق يملو من ٥٠ الى ١٢٥ سم. ساقه خضدة زباد . اوراقه متعاقبة مسطيلة . انهارها عاصمة البرف كثيرة البعد تطول من ٧ الى ١٢ سم. لوها الى الصفار البرتقالي . متاكها تبلغ ١٢ سم. طلها احمر || انهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٧٥٣ - زَيْتَبُ بَرُونِي
هو البرجية من الزنباق ، اطلبه .

١٢٧٥٤ - زَيْتَبُ بَهِي *
Lilium superbum (S).
Lis superbe (F).

نوع من الزنبق يملو من ٩٠ الى ١٨٠ سم. ساقه قوية جامدة . اوراقه سنائية الشكل ، متدلية من البرتقالي تملو نمشة جهورية || انهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٧٥٥ - زَيْتَبُ خَلْعَدُونِه *
هو زنبق الاسنانة ، اطلبه .

١٢٧٥٦ - زَيْتَبُ رَشِيح *
Lilium elegans, L. de Thunberg (F).

نوع من الزنبق عروبه كثيرة البعد تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقها مستدلة الشانة نمدة . اوراقها اهليجية

Liliaceae (S).

Liliacées (F), Liliaceae (E).

نفسيلة نباتية من وحدات العائلة أجناسها وأرقامها كثيرة العدد منها الزنبق والبصل والثوم والجلونج الخ .

١٢٧٧٤ - زَيْبُورِيَّة هي السحاح ، اطبله .

١٢٧٧٥ - زَيْبُورِيَّة ، زَيْبُورِيَّة

Pénis des insectes (F), Penis of insects (E).

الزنبيل قضيب ذكر الحشرات على اختلاف فصائلها .

١٢٧٧٦ - زَيْبُورِيَّة هو الزنبق ، اطبله .

١٢٧٧٧ - زَيْبُور

الزنبور : حشرة عظيمة في طول الدلية ولا عرض لها . ورفها مثل ورق الجوز في منظره وريحه . ولها نور مثل نور الشر ابيض مشرب ولها حل مثل الزيتون سواء . فإذا نضج اشتد سواده وسلا جدا يأكله الناس كالزبيب ولها عصية كعصية الفئراء وهي تصبغ الفم كما يصبغه الفرساد . تدرس غرسا . وحشدتها زنبورة وزنبارة وزنبورة (السان) .

١٢٧٧٨ - زَيْبُور Vespas (S), Guêpe (F), Wasp (E).

جنس حشرات من فصيلة الزنبوريات . أنواعها عديدة جميعها جارية ، بادقة ومغمرة . أعرفها وأشهرها ما يتبع .

١٢٧٧٩ - زَيْبُورِيَّة جَرْمَانِيَّة * Vespas germanica (S).

Guêpe germanique (F), German wasp (E), Deutsche waspe (D).

نوع من الزنبور الواسع الانتشار . ذكره بطول من ١٣ الى ١٥ سم . انتاه من ١٦ الى ٢٠ وعاملته من ٩ الى ١٤ سم . يقم عشاه في التربة ، يبنيه بالمواد الخشبية المتحللة التي تبلى كالورق في ثوله يمد من ١٠٠٠٠ الى ١٠٠٠٠٠ زنبور . قوته آثار والوقوم وما يقتنصه من حشرات .

١٢٧٨٠ - زَيْبُورِيَّة شَائِع * زَيْبُورِيَّة عَادِي

Vespas vulgaris (S), Guêpe commune (F), Common wasp (E), Gemeine waspe (D).

نوع من الزنبور البادئ ، الجارس ، الصغير القد ، العم الانتشار . ذكره بطول من ١٤ الى ١٥ سم . انتاه من ١٦ الى ٢٠ وعاملته من ١٥ الى ١٠ سم . يقم عشاه في التربة وعلى الأشجار والحيطات يبنيه بالمواد الخشبية المتحللة . ثوله يمد اقل من مئة . لسته مؤلة .

١٢٧٨١ - زَيْبُورِيَّة شَرْقِي Vespas orientalis (S).

Guêpe orientale (F).

ويعدى الزنبور الاجر . نوع من الزنبور الشائع في الشرق الاوسط . ذكره بطول من ٢٠ الى ٢٤ سم . انتاه من ٢٥ الى ٣٣ وعاملته من ١٦ الى ٢٠ . ثوله الى الحشرة الصفراء . رأسه وبشوشه اشد مرة من بطنه . اجنته نارية . يقم عشاه في اي مكان كان . وهو مغربس ، بادئ وجارس ، يقتنص النمل ويقربس آثار النمل السكرية عند ادراكها اخضاها المنب والتين والبسر .

١٢٧٨٢ - زَيْبُورِيَّة صَغِير * ذَبْر ، زَرْقُطَة ، نَسُوحَة

Polistes gallicus (S).

Poliste, Guêpe française (F).

نوع من الزنبور الصغير القد . ذكره بطول من ١٢ الى

١٢٧٨٥ - زَيْبُونِي كَتَا Lilium canadense (S).

Lis du Canada (F), Canadian lily (E).

نوع من الزنبق يربف في الآربة المتوسطة الانسلاج والربوبية . يعلو من ٥٠ الى ١٢٠ سم . ساقه قوية . اوراقه قليلة العدد نصلها جامد التسج ، خلي الصفحة السفلى ، خاسي او سباعي البروق . بطول من ٧ الى ١٠ سم . ويعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . || ازهاره متدلية قليلة البروق . لونها ال الوردي تملو مشة قرزية . متاكها تطلو نحو ١٠ سم . طلمها اجر . ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٧٦٦ - زَيْبُونِي مَدَهَب Lilium suratum (S).

Lis doré du Japon (F).

نوع من الزنبق يعلو من ٦٠ الى ١٨٠ سم . ساقه قوية جامدة . اوراقه متدلية متبادعة تطلو من ١٥ الى ٢٣ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ سم . || ازهاره عطرية العرف كثيرة العدد تطلو من ١٢ الى ٢٠ سم . لونها ال البياض الباسي يعلوها من الداخل تمشي ارجواني ويخط شارب ذهبي اللون يقسم البتلة الى قسمين . متاكها تبلغ ٢ سم . طلمها اجر || غروبه وماله عديدة تختلف بالوانها التي يكثر فيها او يقل الاصفر الذهبي . ازهاره يستمر طوال الصيف .

١٢٧٦٧ - زَيْبُونِي مَرْتَعُون ويكتب مرتاغون . هو الزنبق الاجر ، اطبله .

١٢٧٦٨ - زَيْبُونِي مَرَقُط هو الزنبق الانمر ، اطبله .

١٢٧٦٩ - زَيْبُونِي مَلَكِي Lilium regale (S).

Lis royal (F).

نوع من الزنبق يعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقه حلوية الصماء عادمة الاوراق حتى اقزام الثاني || ازهاره عطرية كثيرة العدد تطلو نحو ١٥ سم . ظاهرها ابيض اللون يعلو توشيح وردي . باطنها ال الصفار الذهبي يعلو موالج اسلم . متاكها تبلغ ١٥ سم . طلمها ذهبي اللون . ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٢٧٧٠ - زَيْبُونِي هَنْتَرِي Lilium henryi (S).

Lis de Henry (F).

نوع من الزنبق يعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . ساقه قوية زياه . اوراقه متددة تطلو نحو ١٥ سم . وتعرض نحو ٣ عرقها عديدة نصلها خلي الصفحة السفلى || ازهاره عديدة تطلو من ٦ الى ٩ سم . لونها ال البرتقالي تملو مشة سوداء . متاكها تبلغ ٨ سم . طلمها اصفر . ازهاره يستمر من آب الى ايلول .

١٢٧٧١ - زَيْبُونِي وَاشْتَنْغُون Lilium washingtonianum (S).

نوع من الزنبق يعلو من ٩٠ الى ١٨٠ سم . ساقه قوية جامدة . اوراقه السفلى خسية التسج . سداسية العدد او اكثر . اما العليا فتعاقبة || ازهاره عطرية كثيرة العدد تطلو من ٤ الى ٨ سم . لونها ال البياض الموشح بالقرمزي . متاكها تبلغ ١٢ سم . طلمها اصفر . غروبه عديدة بل الورد والابيض والقرمزي المايق . ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٢٧٧٢ - زَيْبُونِي Lilial (F), Liliéd (E).

نمت وصفي يطلق على ما هو شبيه بالزنبق كغوك يياض زنبق .



زنبور جرمانى



زنبور شائع



زنبور صغير



زنبور كبير



زينة البيلامو



زُتَةُ الْبَنْ



زُتَةُ الزُّيُورِ



زُتَةُ الْفُولِ



زُتَةُ الصُّوْبَا



زُتَةُ الْقَوْلِ

مظهره الخارجي يقع بيضية الشكل ميمرة أو كفيضة التجميع ، قطرها براوح من ١٠ الى ١٠٠ م. لونها زيتوني ، عموما أبيض ، اطرافها اسمر ، تركب النصل فتؤذي وتنطب الفواطير المرتكزة على المركبات الحساسة .

١٢٧٩١ - زُتَةُ الْجَنْجَنِلِ ٥

Cercospora cantuariensis (S).
نظر مجهرى يتطفل على أوراق الجنبيل || مظهره الخارجي يقع مستديرة ومادة اللون ، جوية الاطراف تركب النصل على صفحتي العليا فيألفها على السفلى يقع خلية حنطية ، زاوية المخرج || انحراره زغبية لا تستوجب المكانة .

١٢٧٩٢ - زُتَةُ الزُّيُورِ ٥

Cercospora cladoporioides (S).
نظر مجهرى يتطفل على أوراق الزُّيُورِ || مظهره الخارجي يقع فسيحة ميمرة الحبيد مظهره اللون ، يفسد المخرج تسبب ذبول الأوراق وإحلالها .

١٢٧٩٣ - زُتَةُ الْفُولِ ٥

Cercospora beticola (S). *Cercosporiose de la bettarave* (F). *Leaf spot of beet* (E).
نظر مجهرى يتطفل على أوراق الشندر في المواقع الرطبة . مظهره الخارجي يقع كثيرة العدد ، لاقياسة الشكل والحجم ، ميمرة على صفحة النصل ، لونها الى البصرة يطوقها حنار اخر ، تقضي على البشرة فتفجرها ثم تنطقها بوشاح غلي التركيب فني اللون يسير بها الى الذبول . انحراره قد تكون باهتة لانه يؤثر على نسبة المواد السكرية . يتكاثف باستعمال اكيلكودور النحاس عيار ٥٠٪ على الشكل الآتي :

١٣ جزاء اكيلكودور النحاس .

١٢ جزاء دقيق .

٧٥ جزاء تلك .

يستعمل تفجيراً على النبات بمعدل ٤ كيلو للهكتار الواحد .

١٢٧٩٤ - زُتَةُ الصُّوْبَا ٥ ٥ زُتَةُ دِيَارِ ٥

Cercospora diazi (S).
نظر مجهرى يركب أوراق الصوبا فيطليها ويؤذي النبات . مظهره الخارجي يقع صغيرة كثيرة العدد . لونها الى الجوزة تركب النصل فتفجر نحو ربع مساحتها || يتكاثف بظهور اليازور وباستعمال أسد الفواطير الحديثة المرتكزة على المركبات الفسفورية .

١٢٧٩٥ - زُتَةُ الْفُولِ ٥

Cercospora fabae, *C. personata* (S).
نظر مجهرى يتطفل على سوق وأوراق الفول || مظهره الخارجي يقع لاقياسة الشكل قطرها براوح من ٢ الى ٧ م. تركب الأوراق والسوق . لونها الى البصرة تقضي حالات متتابعة دقيقة الحنار لوناً الى الصفرة . تقضي على الأوراق وتذبل النبات || يتكاثف بظهور البازر بمحلول الفورولين وينفخ النباتات الموصولة بمائل يورده المحلول من ١٪ الى ٨٪ .

١٢٧٩٦ - زُتَةُ الْقَرْنِيَاتِ ٥

Cercospora zebrina
نظر مجهرى يتطفل على أوراق سوق يفسد القرنيات اغصانها الفضة والنائل والحقوق || مظهره الخارجي يقع مستديرة او بيضية الشكل ، لونها الى البصرة تملوها حالات متتابعة صفراء الحنار تلوح بالنجس المحلاة بقيم الى النبات وتعمد .

١٦ م. انتاه من ١٥ الى ١٧ واصله من ١٠ الى ١٤ . ثوبه اسود اللون يطوق تبيج اصفر . خشاء صغر القد ، قومي الشكل ، يقبض على الجنبات والاشجار البقلة يركزو على دهانة رسيحة قصيرة . فوله لا يعد اكثر من ٥٠ م. قوته الابل السكرية والديندان وبض الحشرات والقلم .

١٢٧٩٣ - زُيُور كَبِير ٥ ، دُيُور

Vespa crabro (S). *Frelon*, *Gülpe frelon* (F). *Hornet* (E).

نوع من الزُّيُور ، كبير القد واسع الانتشار . ذكره يطول من ٢١ الى ٢٧ م. انتاه من ٢٦ الى ٥٥ واصله من ١٨ الى ٢٥ م. رأسه اصعب اللون . جوشته الى السواد الموشع بالبرسة . زبانه واربعه حر . خشاء لاصق قومي يقبض به في أي مكان كان . فوله لا يقايي العدد لكنه لا يقل عن ٥٠ م. ولا يفوق ١٠٠٠ م ومن في الزناوير الشيعة الغرسة البائدة الجارسة يلسع الانسان ان ضايقه واسعت مؤلة مزينة .

١٢٧٩٤ - زُيُورِيَّات ٥

Vespidae (S). *Vespidés* (F). *Vespa*, *Faltenwespen*, *Papierwespen* (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة . اجتماعها وانواعها عديدة مظهرها من الحشرات الاشرائية النظام الجامعي العنشي . فيها الذكر والانثى والملكة الحنثى . تبني عشائها من الأوراق والالياف الخشبية المصروفة فتحيها في التربة وعلى المحيطات وبين ضائيف الصنوبر وفي تجاريف الاشجار وطليها || جميعها مفرمة بائدة وسارية .

١٢٧٩٥ - زُيُورِيَّات ٥

هو ليسون اخصاليا ، اطليه .

١٢٧٩٦ - زُيُورِيَّات ٥

جنس نباتات طيبة ميمرة من فصيلة الساجيات انواعه عديدة منها الاشجار والشجيرات والمتسلقات منهاها المناطق الحارة والاشترائية . أوراقها منفقة متعاقبة طليقة او رحيمة النصل . انماها عذقية التجميع تاجية . جنودها طيبة مقوية .

١٢٧٩٧ - زُتَةُ ٥

صفة اثرائة المروية قليلا .

١٢٧٩٨ - زُتَةُ ٥

Cercospora
جنس فطور مجهرية من الريدياتوفية وفصيلة الطحيات . جريه الكنديية مستطيلة الشكل ، سمره اللون ، فسيبة الانتشار ، قومية الارتكاز . كنهاده مستطيلة قاعدية او جانبية الانتشار ، مؤفورة كثيرة الاقسام الثقبية العدد || انواعه عديدة ، اغرنها واشهرها ما يتبع .

١٢٧٩٩ - زُتَةُ الْبَطَاخِ ٥

Cercospora concors (S). *Cercosporiose de la pomme de terre* (F). *Leaf spot of potato* (E).

نظر مجهرى يتطفل على أوراق البطاطا || مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها نحو ٤ م. لونها الى البصرة تملوها نقط سود تركب الأوراق على صفحتيها فتؤذيها وتوقع بالنجس خشار براوح قدرها من ٢ الى ٢٥ ٪ . يتكاثف باستعمال الفواطير المرتكزة على الكابريت والنحاس .

١٢٧٩٠ - زُتَةُ الْبَنْ ٥

Cercospora coffeicola (S). *Maladie des yeux bruns du caféier* (F).

نظر مجهرى يتطفل على أوراق البن فيؤذيها ويشوه آثار .

تراكيب بعض التوابل والمستحضرات الصحية الشرقية . ويستخرج منها شرابات شائعة الاستعمال .

١٧٨٠٧ - **زَنْجَبِيل مِيْمُونَا** (S). *Zingiber mioga* (S). *Gingembre mioga* (F).

نوع من الزنجبيل يُزرع الآن في اليابان . يلو نحو ١٠٠ سم . أزهاره سنانية كبيرة القد . سبلته الزهرية كثيفة التجميع . أزهاره بيضاء شريفاتها صفراء . هذه اليابان وهو من النباتات البرية التي تعيش وتجدد في كل تربة وموقع ومكان .

١٧٨٠٨ - **زَنْجَبِيلِيَّات** (S). *Zingiberaceae* (S). *Zingibéracées* (F). *Zingiberaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقة الواحدة || اجناسها وأنواعها عديدة جميعها جذمورية مهدبا المناطق الاسيوية الحارة || أشهرها الزنجبيل والخلنجيان والكرشم والحال وزلزياد .

١٧٨٠٩ - **زَنْجُجُر** هو الزريقون ، اطلبه .

١٧٨١٠ - **زَنْجُجُور** ، **سَمَك الْكَرَاكِي** (S). *Esoc* (S). *Esoc*, *Brochet* (F). *Pike* (E).

جنس اسماك نهريه من فصيلة الزنجوريات . انواعه هـ جميعا نهمة . مستطيلة الشكل ، واسعة الشدق ، دقيقة الخطم المفلطح ، حادة الاسنان القوية . طويلا يراوح من ٥٥ الى ١٠٠ سم . وزنها من ٥ الى ٢٥ كيلو . انثوا الى الرتبة الرصاصية تنبت مع اقربائها من نيج الطهر . جواربها مجزأة بالايض . يطبونها الى الصحة . لحما هادي او دون الوسط .

١٧٨١١ - **زَنْجُجُورِيَّات** (S). *Esocidae* (S). *Esocidae* (F). *Esocidae* (E).

فصيلة اسماك نهريه من فصيلة الحنات . اجناسها وأنواعها عديدة معظمها من اسماك المناطق الباردة . جميعا نهمة مستطيلة الاجسام ، مفلطحة الرؤوس والاسنام ، قوية الاسنان الحادة || أشهر اجناسها الزنجبور .

١٧٨١٢ - **زَنْد**

زند البقرة والثانة زندا : اخبرجت رحما عند الولادة .

١٧٨١٣ - **زَنْدَه** ، **زَنْدَه** (S). *Rachis* (F). *Stalk* (E).

محور السبله والحزيرة والسبق والارواق المركبة وغيرها .

١٧٨١٤ - **زَنْدَه الْعَبْدَه** هو الكارلين الشائع ، اطلبه .

١٧٨١٥ - **زَنْدَه بَيْسَل** ، **زَنْدَه بَيْسَل** (S). *Elephant (grand)* (F). *Elephant (great)* (E).

الذيل الكبير الجنة .

١٧٨١٦ - **زَنْدَكْدَل** (S). *Cistudo* (S). *Cistudo* (F).

جنس حيوانات زحافة مفترسة من السلاف ونفيلة الحشرات . تعيش في المياه العذبة . تألف البعيريات والانهير والماتق || تتميز بان حافة ذيلها لا تحكم الطوق على الجسم . قوتها الحشرات والرخويات والاسماك الصغيرة والصغار || لها ثومان فقط الزندل الازرق وزندل المحرم .

١٧٨١٧ - **زَنْدَكْدَلْ أَرْدَغ** (S). *Cistudo lutaria* (S). *Cistudo boueuse* (F).

نوع من الزندل . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا . تألف المناطق زغفان والانهير والبعيريات || جسمها بطول

١٧٧٩٧ - **زَنْدَه الْكَرْمَه** (S). *Cercospora vitis* (S).

فطر مجهري عيم الانتشار يتطفل على اوراق الكرمة . مظهره الخارجي يقع مستديرة حنطية اللون قطرها يراوح من ٢ الى ١٠ مم . تركيب النصل على صفحته || اضراره لا تسمى الاوراق ولا تتسبب في المكافئة الخاصة .

١٧٧٩٨ - **زَنْدَه الْكِشْفِش** (S). *Cercospora marginalis* (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الكشش . مظهره الخارجي يقع مستديرة او مقعرة الزوايا ، سمراء اللون ثم رمادية تركيب النصل دون ان توكديه .

١٧٧٩٩ - **زَنْدَه الْوَرْدَه** (S). *Cercospora circumscissa* (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الورد والخوخ والوردان . مظهره الخارجي يقع مستديرة سمراء اللون قطوح بالتسج المتشارفة فتسبب فيها وانحسارها || اضراره قليلة . ينشط في المناطق الساحلية التي يشهها الضباب .

١٧٨٠٠ - **زَنْدَه الْوَرْدَه** (S). *Cercospora rosicola* (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الورد . مظهره الخارجي يقع مستديرة طلاء اللون تركيب النصل على احدى صفحته اضراره لا تسمى التشويه .

١٧٨٠١ - **زَنْدَاكِي** (F). *Dysentery* (E). *Dysentery* (F).

مرض معد خبيث عوارضه فرط انطلاق البطن ، سببه قضييات او تفاحات .

١٧٨٠٢ - **زَنْجَاك** ، **زَنْجَاك** (F). *Verdet* (F). *Verdigris* (E).

اسم شامل يطلق على مختلف اسنات النحاس الخضراء اللون . محاليله تستعمل في مداواة وسكافة بعض الامراض الفطرية .

١٧٨٠٣ - **زَنْجَبِيل** (S). *Zingiber* (S). *Gingembre* (F). *Ginger* (E).

جنس نباتات عشبية جذمورية مسمرة من فصيلة الزنجبيليات . انواعه عديدة منها البرية والعلبية والزراعية . جذاميرها قرنية الشكل عقدا . سوقها مرققة تشبه سوق الفنا . اوراقها حاشية متعاقبة سنانية النصل . انهارها سلبية التجميع حامية الاذنكاز يحلها شراخ ليبي التركيب سرشفي الاوراق || أشهر انواعها ما يلي .

١٧٨٠٤ - **زَنْجَبِيل الْكَلَاب** هو لفلل الماء ، اطلبه .

١٧٨٠٥ - **زَنْجَبِيل شَمَاسِي** هو الراس ، اطلبه .

١٧٨٠٦ - **زَنْجَبِيل مَخْزُونِي** (S). *Zingiber officinale*, *Amomum zingiber* (S). *Gingembre officinal*, *Amome des Indes* (F). *Indian ginger*, *Common ginger* (E). *Gingiber*, *Ingwer* (D). *Zenzero*, *Zenzero*, *Pepe zenzero* (I).

نوع من الزنجبيل يُزرع لاستعماله الطبي والصناعي . يلو نحو ١٠٠ سم . أزهاره سنانية متجاوبة النصل . سبلته الزهرية لينة . انهار صفراء يتلاصق برتقالية مشددة بالايض || جذاميره صارية العرف ، لاذعة الطعم ، تحوي زيوت عطرية ورواد نشوية وغروية مختلفة . وهي مقوية القلب ، مرققة ، تنشط الباه وتذكرك . تنبت من الارياح وعسر المعظم وتتمتع للنصر كما أنها تدخل



زَنَّة الْكَرْمَةِ



زَنْجَبِيل عَزْرِي



زَنْجُجُور



زَنْدَلْ أَرْدَغ

الاشجار الحرجية واعصها الصنوبريات || اشهر انواعه
زَيْخَةُ اللاريس .

١٢٨٢٨ - زَيْخَةُ اللاريس *

Dasyscypha willkommii. Trichoscypha wil. (S).
Chancr du mûleze, C. du pin sylvestre (F). Cancer
de l'arch (E). Lärchenkrebs (D).



زَيْخَةُ اللاريس

فطر مجهرى يركب اغصان واغصان اللاريس فيعملها
ويهلوها . مظهره الخارجى لطحه قرحية مردنة الشكل
وطوا يراوح من ١ الى ٤ سم . تركب القشرة فتصطبها
وتشققها وتؤدي القسم الذي يعملها فتدبل اوراقه وتسقط .
وهو يفعل ذات الشيء في الصنوبر البري || يكافح
بتفريده الاشجار الكثيفة لان المنفعة ترتكز على النمو
الذي يحل دون انتشار هذا الفرم .

١٢٨٢٩ - زَيْكَلْ هو الرجلة او السويك .

١٢٨٣٠ - زَيْكَلْ * Pucciniastrum

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات ، يتميز
بدهانات الجولية الوثيرة ، السطيلة ، الخلفية انشاده ،
الشفعية الانقسام ، الثنائية او الرباعية الاشعية .
انواعه قليلة وانصره كذلك ، تنضج على اهداب التوب
ويركب الاتصال على صفحة السفل فيسي ال سبر النمو
الطبيعي دون ان يقيد الى العطب .

١٢٨٣١ - زَيْكَلْ * Cercosporina

جنس فطور مجهرية من الراديئات وفضيلة الطفحات ،
جرية الكندية سمراء اللون ، اسطوانية الشكل ، قرصية
الانتصاب قوية الانتكاز ، كنانته مستطيلة ، طرفية
او جانبية الانتصاب ، مؤثورة ، شفعية الانقسام .
انواعه عديدة قليلة الاذى معظمها امريكية او صينية
الهد .

١٢٨٣٢ - زَهَاد * Permebia (F). Permebia (E).

ارض زهاد : لا تسيل الا من مطر كبير .

١٢٨٣٣ - زَهَار * Fleuriste (F). Florist (E).

من تعاطى بستنة الازهار او يبيعها .

١٢٨٣٤ - زَهْدَم * Falco eleonora (S). Faucon éleonore (F).

طائر من الكوتج وفضيلة الصقريات . صيغر الجفة طوله
نحو ٣٧ سم . امير الصدر والين اسير الظهر والسقط .
غنيث الجناح والناظر قوته الجناح والناظر على اختلاف
انواعها . وهو من القواطع محبوب كامل بلاد حوض البحر
المحيط . يألف مجاري الماء والشواطى البحرية .



زهدم

١٢٨٣٥ - زَهْر النَجَج * Zénobie (F).

شجرة ترينيدية تدعى زنبوبك ، اطلبه .

١٢٨٣٦ - زَهْر العَرَبَر * Zenobia (S).

هو الزرهون ، اطلبه .

١٢٨٣٧ - زَهْر المِفْصَا * Zénobie (F).

هو الازية ، اطلبه .

١٢٨٣٨ - زَهْر الكِيرِت * Fleur de soufre (F). Flowers of sulphur (E).

مسحوق الكبريت الناعم يستعمل في الزراعة لمكافحة
بعض الامراض الفطرية اعصها الازهداد .

نحو ٣٠ سم . ذبلها يضيى الشكل ، معتدل الاحيداب .
ثوبها الى السرة المنقطة والشكل بالاصفر . رأسها معتدل
الجرم . ذنبها قليل الشفاعة ، دقيق الطرف ، يطول نحو
٥ سم . || لحما كاعن الصف مأكول في بعض بلاد
اروية .

١٢٨١٨ - زَنْدَلْ مُعَرِّم * Cistudo dentata (S). Cistudo dentelela (F).

نوع من الزندل . موطنها بعض مناطق الهن والبلاد المجاورة .
تألف المنافع والافوار والبيصيرات || جسمها يطول نحو
٢٧ سم . ذبلها يضيى الشكل ، معتدل الاحيداب مخرم
الحافة . ثوبها الى الخضار الاسمر يطوله تنقيط اخضر واصفر .
رأسها معتدل الجرم . ذنبها متوسط الشفاعة ، مستعرض
الطرف يطول نحو ٤ سم . || لحما كاعن الصف ،
مأكول من بعض القبائل .

١٢٨١٩ - زَنْدِيَاَت العَيُون * Podophthalmalres (F). Podophthalmalra (E).

رنية من الفشريات ليات الصدف تشمل عدة فصائل
تجسمها ثلاث مراتب : مشقوقات الارجل وبزويجات
الارجل وعشاريات الارجل .

١٢٨٢٠ - زَنْزَلْخَت * Zannichellia (S). Zannichellia (F).

جنس نباتات عشبية مائية معمرة من فصيلة حراسل الماء .
انواعه المروفة قليلة للبد ، اعطائها بعض مناطق البلاد
المعتدلة الحرارة . تنبت في المنافع وفي اشلج مجاري الماء ||
اوراقها شفعية ، ثلاثية ، نصاعها غروبية الشكل . ازهارها
محورية الانتصاب ، وحيدة الشق || اعرف انواعه الزنشل
المضعي (Z. palustris).

١٢٨٢٢ - زَنْطِين * Xanthéine, Xanthogène (F).

مادة واثنية مبلولة في مطر الازهار ، لوها الى الصفار
الاخضر ، لا تبلور ولا تزال مجهولة التركيب .

١٢٨٢٣ - زَنْفَك * Zannichellia (S).

هو الفارصين ، اطلبه .

١٢٨٢٤ - زَنْكَم * Zannichellia (S).

هي الاذنة ، اطلبها .

١٢٨٢٥ - زَنْكَم * Zannichellia (S).

الشجرة لا ورق لها كاهها رنة الشاة (السان) .

١٢٨٢٦ - زَنْكُوبَا * Zannichellia (S).

جنية وحيدة الجنس والورق من فصيلة الحنجيات تملو
من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها عروية متعاقبة يضيى
الشكل نصاعها جلدي النسيج عابق الخضار || ازهارها
جلجلية الشكل ، بيضاء اللون ، مقرنة للآثار الرباعية
التركيب || ازهارها يشمر من سزيران الى ايلول .

١٢٨٢٧ - زَنْكَيْخَةُ * Dasyscypha

جنس فطور مجهرية من الزهفيات وفصيلة الحشاريات
يتميز بطوائفه الصغيرة القرصية المحلية . تكاثره غروبية .
يضع ثنائي التركيب ، مردني الشكل ، شفاه ، يتدري

١٢٨٥٩ - زَهْرَةُ السَّمَاءِ الْجَمِيلَةِ راجع جوليانه .

١٢٨٦٠ - زَهْرَةُ الشِّعَاءِ الملب كيمونتس .

١٢٨٦١ - زَهْرَةُ الشَّمْسِ في الداهين ، اطلبه .

١٢٨٦٢ - زَهْرَةُ الْعَصَلِ في الصلية ، اطلها .

١٢٨٦٣ - زَهْرَةُ الْعُطَّاسِ في الأريكة ، اطلها .

١٢٨٦٤ - زَهْرَةُ الْعِنَقِ في الترابيلوم .

١٢٨٦٥ - زَهْرَةُ الْعَتَكَبُوتِ في القم ، اطلبه .

١٢٨٦٦ - زَهْرَةُ الْغَيْدِ في النجد ، اطلبه .

١٢٨٦٧ - زَهْرَةُ اللَّيْلِ

في النيكه من الرجبسات ، اطلها .

١٢٨٦٨ - زَهْرَةُ الرُّجْجَانِ في الكنية ، اطلها .

١٢٨٦٩ - زَهْرَةُ الْمُشْتَرَى

في لخيس المشتري ، اطلبه .

١٢٨٧٠ - زَهْرَةُ شَعْرِيَّةِ في القناه الشربانية .

١٢٨٧١ - زَهْرَةُ مَائِيَرِ في الابجة ، اطلها .

١٢٨٧٢ - زَهْرَةُ مَحْبُوبَةٍ في القمر اطلبه .

١٢٨٧٣ - زَهْرِيَّ (F). Floriforme (F).

نمت رسي يعلق عل ما هو شكله كالزهر .

١٢٨٧٤ - زَهْلِيَّات ٥ Helotiaceae (S).

Helotiaceae (F). Hélotiées (F).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الحشاريات ورتبة

الريقات . أجناسها وأزواها عديدة تتميز بسدائها الحمية

القمية أو القرصية الشكل القائمة على ونية جلدية الرُّقْل .

بورها تختلف الأشكال والترتيب يكثر فيه الانتظام

الشفي من الثنائي إلى البائي || لها جفان مؤذيان

الزينة واللحن .

١٢٨٧٥ - زُهْمٌ ، زُهْمَةٌ ، مَنَحٌ ، قَتَمٌ ، تَمَةٌ ،

نَمَسٌ Rance, Rancissement (F).

Rancid, Rancidity (E).

نساد المواد اللدنية على اعتلائها . سبه التأكسد وما يلمه

من فعل المراتم . فتاغمة رائحة قوية مستهجنة وطعم

حريف كره .

١٢٨٧٦ - زُهْمٌ Animaux non ruminants (F).

No ruminant animals (E).

الزهم ما لا يجر من الحيوان .

١٢٨٧٧ - زُهَيْرِ Polyanthe (F). Polyanthous (E).

كثير الأزهار .

١٢٨٧٨ - زُهَيْرَةٌ Fleuron (F). Florec (E).

زهرة صغيرة ابتدائية يتألف منها قرص الرئيس في أزهار

فصيلة المركبات .

١٢٨٧٩ - زُهَيْرَةٌ Florule, Floscule (F).

في الزهرة الصغيرة . وكل زهرة من أزهار السبلية تدعى

زُهَيْرَةٌ .

١٢٨٣٩ - زَهْرُ الْكَسَائِينِ

هو النجيل نبات عشبي زُرِّي ، اطلبه .

١٢٨٤٠ - زَهْرُ اللُّؤْلُؤِ هو البليس ، اطلبه .

١٢٨٤١ - زَهْرُ الْمَسِيحِ هو السك ، اطلبه .

١٢٨٤٢ - زَهْرُ النَّسِيمِ ، زَهْرُ الْحَوَاكِ

هو الإربتنس ، اطلبه .

١٢٨٤٣ - زَهْرُ مَرْمَرٍ هو اقنطرم البنفسجي ، اطلبه .

١٢٨٤٤ - زَهْرَاك

الزهراء : البقرة الوحشية . والذو الوحشي : أضر .

١٢٨٤٥ - زُهْرَكَةٌ ، وَهْرَكٌ Venus (F). Venus (E).

كوكب سيار ينتمي إلى مجموعة النظام الشمسي . يعتبر

ألم لكواكب المعروفة . يبعد عن الشمس نحو ١٠٨

ملايين كيلومتر ، وهو بذلك يكون أقرب إليها من الأرض .

ظهور من الشرق عند الفجر يعطيه لقب نجمة الصبح .

ويظهر عند الغروب يعطيه لقب نجمة الليل ونجمة الرباعي .

سرعة دورته الانتقالية في الفضاء نحو ١٢٤٩٢٠ كيلومتر

بالساعة . دورته المحورية الفلكية حول الشمس تستغرق

٢٢٥ يوماً || المنجمون يسمون الزهرة السعد الأسفر لاتها

في الساعات دهن المشتري وأضافوا إليها الطرب والسرور

والعز والإلفة والحب .

١٢٨٤٦ - زَهْرَكَةٌ Fleur (F). Flower (E).

الزهرة هي البصير النباتي المخصس بالتناسل لحفظ الكيان .

تلشأ الزهرة من برعة وتتألف من تحت يحوق به سوار

خارجي يعرف بالكأس وسوار داخلي يعرف بالتويج

ينتهي بالبتلة ويصل عند انشلاب قاعدته الداخلية مجموعة

الأصابع التي تتركب الأعضاء الذكورية || أما تحت الذي

يحصن الأعضاء الانثوية فيقبل الملقح حيث المبيض

تتلوه اللقعة المكونة من قلم وبسم .

١٢٨٤٧ - زَهْرَةُ الْأَلَامِ في الآلام ، اطلها .

١٢٨٤٨ - زَهْرَةُ الثِيرَسِ في الاندوزاس ، اطلبه .

١٢٨٤٩ - زَهْرَةُ الثَّالُوثِ في بفسج الثالوث ، اطلبه .

١٢٨٥٠ - زَهْرَةُ الثَّلَجِ

في النيكه من الرجبسات ، اطلها .

١٢٨٥١ - زَهْرَةُ الْجُرُوبِ في السكايزوا ، اطلها .

١٢٨٥٢ - زَهْرَةُ الْجَنَّةِ

اطلب زلف اللؤلؤة شجرة زُرِّيية جميلة الأزهار .

١٢٨٥٣ - زَهْرَةُ الْحَجَرِ في جزر جنم ، راجه .

١٢٨٥٤ - زَهْرَةُ الدَّمِ في الصقلاب للمسى ، اطلبه .

١٢٨٥٥ - زَهْرَةُ الرَّيِّحِ في الزففة ، اطلها .

١٢٨٥٦ - زَهْرَةُ الرِّسَالِ في الارناويه ، اطلها .

١٢٨٥٧ - زَهْرَةُ السَّاعَةِ اطلب الآلية زرقا .

١٢٨٥٨ - زَهْرَةُ السَّلْحَفَاةِ في الحليون نبات زُرِّيي .

12894 - زُوجَلَكَة ° *Zoogléa* (F), *Zoogloea* (E).
وَكَام من البكتيريا جميعها مادة غروية في اشكال مختلفة ليشو كالحطاط المتكاثف في السوائل وكجموية من النقط والتكتل في الجلود .

12895 - زُودَعَم ° *Piezomètre* (F), *Piezometer* (E).
جهاز يستعمل في قياس انضغاط السوائل .

12896 - زُودَحَة ° *Piezométrie* (F), *Piezometry* (E).
علم يبحث في انضغاط السوائل .

12897 - زُودَحِيَّة ° *Piezométrique* (F), *Piezometric* (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالزوحة .

12898 - زُودَحَن ° *Clerus* (S), *Clérude* (F), *Clerus* (E).

جنس حشرات غمضية من فصيلة الزوسينات . انواعه المعروفة نحو ٤٥ منتشرة في جميع مناطق العالم باستثناء الباردة . اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل . اثنائها غشقة الالوان المبهجة والمبضحة || مسرعا نهاري . قربتها وحيد ازهار الفصيلة الخبيثة || يرقاتها مقترنة تعيش تحت غطاء الاشجار المقطوعة اليابسة || أشهر انواعه زوسن النمل المعروف ايضاً ببرق النمل .

12899 - زُودَحَن النحل ° *Clérude des abeilles* (F).
حشرة تدعى برق النمل ، اطليها .

12900 - زُودَحِيَّات (F), *Clérudes* (S), *Claridas*, *Checkered beetles* (E), *Bunkkäfer* (D).
فصيلة حشرات من لينات البند ورتبة عديمات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٧٠٠ جميعها ٣٢ جنساً || اجسامها مستطيلة ، نحيلة . اثنائها زائفة جميلة . كواسلها صغيرة . قرونها الاستشعارية صولطانية الشكل ، مركبة من ١١ فصلة || اطليها قشطل مطر اصقاع العالم واخصها المنافع الحارة والمضلة الحرارة || يرقاتها مفترسة تدعى في معظم يرقات الحشرات الخالصة || أشهر اجناسها الزوسن والرقود والطوس والماشوق والتكروبة .

12901 - زُودَع زَاهِر ° *Anthicus floralis* (S), *Anthicus floral* (F).

حشرة زائفة غامضة دامت من فصيلة الزودعيات ورتبة عديمات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع البلاد الممتدة الحرارة من الشرق الاقصى واروپة . تألف البراري والمواقع الغضة . غناصها تعيش على رحيق الازهار وبتلاتها . يرقاتها تعيش على المواد النباتية المنحلة || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ سم . ثوبها الى السرة الثلاثة باستثناء الكويل ويقدم الظهران ظاهرا الى الصبهة يطويها مؤج صناعي في الذكر . راسها شبه مستدير الجرم . زباناها غليظتان . صناعها صغيرتان . ظهرانها مستدير الطرف اللامع . غداها قليلتا التبرزير . ارضانها الانامية والوسلى خاصة البغل . رصاعها الخلفيان رباعيا البغل || لها جيل واحد في الحق . تظهر اخشرة الجملانة في اواسط نيسان وتبقى حتى اواسط تشرين الاول . تسرح في النهار

12880 - زُهْرِيَّة ° *Flosculeuse* (F), *Floscular*, *Flosculous* (E).
هي الزهرة المركبة من عدة زهيرات .

12881 - زُوَالِيْن ° *Oliveraie*, *Olivette* (F), *Olive-plantation* (E).
هي بستان الزيتون او كرم الزيتون .

12882 - زُوَالِف ° *Reptiles*
هي الزسافات ، اسباعها .

12883 - زُوَالِ الْهَيْد ° هو الخفاف ، اطليه .

12884 - زُوَالِفِر ° *Assises* (F), *Bais* (E).
حجارة لثافت الاثني الاول من البناء .

12885 - زُوَال ° *Extinction*
هو انقضاء المدة القانونية .

12886 - زُوَال الْإِلتِزَامَات ° *Extinction des obligations* (F), *Extinction of obligations* (E).
هو انقضاء الملة القانونية بين الدائن والمدين بمقتضى احد الاسباب المخصوص عليها قانوناً وهي : التفتية والابراء والفاصة والتقدم والفسخ والاداء واتحاد الملة .

12887 - زُوَال الْيَد ° *Dépossession* (F), *Dispossession* (E).
هو عدم التصرف بالعين الذي كان وضع اليد يميزه .

12888 - زُوَال ، زُوَالَن ° *Lolium* (S), *lraie* (F), *Darnel* (E).
جنس نباتات عشبية حولية وحمولة ومعمرة من فصيلة النجيليات . انواعه عديدة . اوراقها عصفية النصل . ازهارها متنبيلة . منها البرية التي تلت في المروج والحروث ومنها الزراعية المرحومة واليخضورية || أشهر انواعه ما يلي .

12889 - زُوَالْن إِيطَالِي ° *Lolium italicum* (S), *Ray-grass d'Italie* (F), *Italian darnel*, *l. ray-grass* (E).
نبات عشبي حولي قابل الاحتشاش يزدح في المروج والمراعي والخامر .

12890 - زُوَالْن حَكْمِي ° *Lolium arvense* (S), *lvrable des champs* (F).
نوع من الزوان البري ينبت في الحقول والحروث . كثرته مؤذية لاهنا تقصر بالزورور .

12891 - زُوَالْن مُسْكِر ° اطلب دقنة .

12892 - زُوَالْن مَعْمَر ° *Zuwan inkilzi*, *تسكيلك* *Lolium perenne* (S), *lvrable vivace*, *Ray-grass anglais*, *Gazon anglais* (F), *Ray-grass*, *Ryegrass*, *Red darnel*, *Lawn-grass* (E), *Ryegrass*, *Dauerholch*, *Englisches ryegrass* (D), *Lollo perenne*, *Lollo vivace*, *Lajessa* (I).
نبات عشبي معمري يمضوي معم قابل الاحتشاش زراعت منتشرة في معظم البلاد .

12893 - زُودَع ° هو الدغ ، اطليه .



زوان ايطالي



زوان معم



زوحن



زودع زاهر

بيضاض اللون ، قطرها نحو ٤ سم. || تودورها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٩٠٦ - زودع حشر * Scaphopodes (F).

Scaphopoda (F).

الزودقيات فئة من الرغويات وحيدة الفصيلة والجنس . انواعها نحو ٣٥٠ اشهرها الناتئة .

١٢٩٠٧ - زودع حشر * و زودع حشر * و زودع حشر * و زودع حشر *

Limenitis camilla (S). Sylvain azuré, Petit Sylvain (F). White admiral Butterfly (E).

حشرة متراكبة الألوان الجميلة من فصيلة البورليات وربة حشرغيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحارة وربة الشرق الاذن واروبية . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سربتها تعيش على الحمايات والياسمينات || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٨ سم . بسمتها تراوح من ٤٨ الى ٥٢ سم . رأسها مستدلل الجرم . عينها كيرتات . زباناها صويجات . جوشنها وبطنها الى النبي الاسود المواج || ورشها متراكبة الاسنوك والزخارف والتزيين فيها الاسود والازرق والاحمر والاكسل والاشقق والابيض || لها جيل واحد في الحول . تظهر القراشة في ايار . تسرح في النهار . تتأكل بعد ظهورها بسة اسابيع وتفتح الممكن قطعاً مستطيلة على نصال اوراق النبات المائل || السرعة تطول نحو ٣ م . ثوبا الى الخضار البشري يطول غلات جانيان وريدان . قشورها ميمر الحلب الدقيق . رأسها اسود . ورجلها الصدرية صفراء اللون اما البطنية فخضراء || طور الاكل الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلبة متأسكة النسيج .

١٢٩٠٨ - زودع حشر *

خشب حريضة يمر بها تراب الارض المرتفعة الى الارض المنخفضة .

١٢٩٠٩ - زودع حشر * Zozimia (S).

Zozimia (F). Zozimia (E).

جنس اشعاش برية بحولة أو معمرة من فصيلة الخبيبات . انواعها المعروفة قليلة العدد متنبها بعض المناطق الحارة من الشرق الاذن || سوطها مستضفة فراء . منها الزفينة الاء . ومنها المغالية . جلودها غليظة . مغزلة الشكل . اوراقها متعاقبة . ريشة . لاقابية تنفخض . انزهارها صيراني التجميع . انزهارها بياض اللون . اشهر انواعها : زوزيمية افسنتينية الورق (Z. abcinthifolia) .

١٢٩١٠ - زودع حشر * Tranche (F). Slice (E).

هي القلمة من البلخ ونحوه . يقال زعت له زودع من البلخ . ج . زودع .

١٢٩١١ - زودع حشر * Adélomycètes,

Fungi Imperfecti (F). Adélomycetes (E).

رتبة فطور مجهرية عديدة المراتب والنصائل والاجناس والانواع . معظمها من الفطور الانتقاسية التطور . تكاثرها عديد الاشكال . نواتمها الثرونية التي كانت صفاتها المميزة . تسمى الآن ركاب العلم الحديث الذي قضى على ما كان يكتنفها من غموض || مراتبها اربع وهي الزفنيات والصفيانيات والمجانيات والرسنيات . اما فصائلها فتقسم وهي الدلايات والرفقيات والصفيات والكنتينات والكحيبيات والطحليات والمنايات واهلكيات والطحليات .

وتبيت في الليل || البرقة التي تترك الكال الجسموي يمر اربعة اشهر تبقى حتى اوائل اذار حيث تدغل في طور الاكل فتتصل الى حورية وبها الى خنفساء . جسمها عند تمام نموها بطول نحو ٧ م . ثوبا الى البياض الاخير . رأسها الى السرة السوداء . وهي سداسية الرواجب . مستطقة الطرف الذي .

١٢٩٠٢ - زودع حشر * Anthicus quisquilius (S).

Anthicus insignifant (F). Anthicus quisquilius (E).

حشرة مبذولة وائمة خاضعة دامت من فصيلة الزودقيات وربة مفصلات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع العالم . تألف البراري والمواقع الدفلة وضفاف مجاري الماء . خنفساتها تعيش على بتلات الازهار واوراق النبات . يرقاتها تعيش على المواد النباتية المتحللة والصائرة نحو الانحلال || جسمها صغير القد . خلي للقتار . بطول نحو ٤ الى ٥ م . ثوبا الى السرة الكستنية يطولها في ظهرها زناران صنيانين . رأسها يرمي الشكل يملو قرن قاطب حتى يمتد طرف الحمل . زباناها صغيرات . غدها خيطات . غدها متباعدة التحزيز . كنيثا الحمل . ارسافها الامامية والوسطى خاسية القمل . رسافها الخلفيان رباعيا القمل . غالبها صغرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان وتعيش حتى اواخر ايلول . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة التي تترك الكال الجسموي يمر اربعة اشهر تبقى حتى اوائل شهر اذار حيث تتصل الى حورية . جسمها عند تمام نموها بطول نحو ٧ م . وهو اسطواني الشكل . مستطال المقدم . مستطال الخؤصر . سداسي الرواجب . ثوبا الى الصغرة الدنة . رأسها كستني اللون || طور الاكل الذي يتم عادة تحت الجلالة والذي يستمر نحو ٢٥ يوما ينقضي طلياً من كل خلاف .



زودع حشر

١٢٩٠٢ - زودع حشر * Anthicidae (S).

Anthicidae (F). Anthicidae (E).

فصيلة حشرات وائمة خاضعة دامت من رتبة حدييات الاجنحة || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات اليلاد الحارة . تألف الاشعاش والنباتات الجنية والمواقع الرملية وضفاف المجاري المائية والمناقع والازهار || اجسامها صغرة القد . خضورة الشكل . مستعرضة الرؤوس . مستطيلة الزباني الخيطية المركبة من ١١ فصلة . ابراج جبرامها خاسية القمل باستثناء الزوج الخلفي فانه رباعي القمل || يرقاتها دامت تعيش على المواد النباتية الصائرة نحو الانحلال || اشهر اجناسها الزودع والنطقوس .

١٢٩٠٤ - زودع حشر * Poitrail, Thorax (F).

Breast, Chest, Thorax (E).

هو وسط الصدر وتيلي ما ارتفع منه الى الكتفين او ملتقى اطراف عظام الصدر حيث اجتمعت .

١٢٩٠٥ - زودع حشر * Plagianthus (S).

Plagianthus (F). Plagianthus (E).

مجيرة برية وتزيبين من فصيلة الخبيانيات . ساقها فراء نلوم من ٣ الى ٦ انتار . انتادها وانثاها متعصب . اوراقها عابلة متعاقبة . معتقة . تطول من ١٠ الى ١٥ سم . نصالها مرطاه سنة اخضر . حيلة اخضر الزاهي . انزهارها خضبة التجميع . محورية الانكازن . مستطيلة المالحق . متدلية .



زودع حشر

١٢٩١٢ - زَوْعُونِيَّة

Zoogonie (F).

Zoogony (E).

الزوعونية علم يبحث في تطور الحيوان. راجع شانة.

١٢٩١٣ - زَوْعِيَّات

Pédipalpes (F). Pedipalp (E).

رَبَّة من المتكشَّيات تتميز باستطالة الزوج الأول من أربطها فيبدو كزبان الحشرات.

١٢٩١٤ - زَوْفٌ *، جَسَمِي، حَسَك، أَشْتَنَادَاوِيد

Hyssopus officinalis (S). Hyssop officinale (F). Common hyssop (E). Echter yssop (D). Isopo sacro (I).

نبات عشبي بري طبي من فصيلة الشفويات. ساقه ليفية

منتصبة فراء تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه لاطئة،

سائقة، متضابلة. نصلها سناني الشكل بحري الخضار

يطول من ١ إلى ٣ سم. ويعرض نحو ٤ سم. صفحت

منبسطة كثيفة اللند البطرية || أزهاره نسيجية بحورية

زرقاء اللون. أوراقه وأزهاره عطرية الرائحة || أثيرها

يستمر من حزيران إلى أيلول || وين اسمائه ليسوف

وهي لغة عبرانية أما كلمة زوقا فالحاصل الميروفوني زيت.

منافعه الطبية عديدة. تنفع أزهاره منه وهاضم، وأوراقه

وأنياته تنقي من السعال وتقوي المعدة. زينه الطري

المسحرج بالتقطير يستعمل في عدة مستحضرات طبية.

١٢٩١٥ - زَوَّلَم

Palpmanes (S).

Palpmanes (F)j Palpmanes (E).

جنس حناكب مفترسة من فصيلة الزولليات. أنواعها

المعروفة متوسطة البدن أطولها جميع أصقاع البلاد الحارة

من العالم القديم || أجسامها صلبة القذ أسطوانية الشكل

مضغوطة تطول من ١٢ إلى ١٥ م. أثوابها إلى الحمرة

الجزئية أو القزمية. تتميز باستطالة الزوج الامامي

من الجرازم الذي يستعمل لالتقاط الفصص ولا يستعمل

لقنبيب.

١٢٩١٦ - زَوَّلَمِيَّات

Palpimanidae (S).

Palpimanidae (F). Palpimanidae (E).

فصيلة حناكب من رتبة الزولليات. أجسامها وأنواعها

المعروفة نحو ٧٠ موطنها البلاد الحارة من العالم القديم ||

جميعها مفترسة، متوسطة القد أو صغيرة. تتميز بخلو

بطونها من الصفيائح البنية التي تفصل المشائن عن بعضها

البفس، وبخلاصة جراثيما الامامية التي تفرغها دوماً ولا

تتضمنها السير || غائبها اجسام حورية اللون تخلدوا

تحت الحجارة والحزاز والطلمب || أشهر أجناسها الزوقل.

١٢٩١٧ - زَوَّلَم

Démarche du Corbeau (F).

الزَوَّلَم؛ مشية القراب. وهو الخطر المتقارب في تحركه

جسد المائي.

١٢٩١٨ - زَوَّلَمِيَّت

Zéolithe (F). Zéolithe (E).

مادة حجرية.

١٢٩١٩ - زَوَّلَمِيَّت

Zonite immaculé (F).

حشرة من فصيلة اللبوديات تدعى صفورة، أطلها.

١٢٩٢٠ - زَوْعَر *

Venus (S).

Vénus (F). Venus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم

معطيات الانجيل وفصيلة الزوعريات || أنواعها المعروفة

متوسطة البدن، منتشرة في معظم بحار العالم || أصدافها
شبه صيوانية الشكل، متساوية المصارع، ثلاثية
الاسنان الرئيسية. أصدافها مائلة أو متعابة التميز
للتحقيق. أطرانها مستنة الحار. مثاعها ثنائية، طبقة،
مهذبة الاطراف || تمش منتنة في القبال الممورة بالماء
قرب الشواطئ* وصيحات الانهر || لحوبها مأكولة، جيدة
الصف.

١٢٩٢١ - زَوْعَرِيَّات

Veneridae (S).

Vénérídes (F). Veneridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم

معطيات الانجيل || أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة

منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدة الحرارة ||

أصدافها شبه قلنسوية الشكل، متساوية المصارع،

ثلاثية الاسنان الرئيسية. مثاعها ثنائية، انبوية،

طبقة، معتدلة الطول، مهذبة الاطراف || أعرف أجناسها

وأشهرها الزيرع والشوب والثعرة.

١٢٩٢٢ - زَوْهَمِيَّات

Protohémiptères (F).

رَبَّة حشرات منقرضة من طبقة الصفاكيات. أحافرها

تعود إلى الحقبة الخامسة والانحيرة من الأياج الأول،

المعروفة أيضاً بالحقبة البرمية || الاسم العلمي يرمز إلى

أنها من اسلاف صفيحات الاجنسة وقد تبين فيما بعد أن

الاتاء المقدّر ينقصه الكثير من الأدلة الراجحة.

١٢٩٢٣ - زَوُّلُوجِي

Zoologiste, Zoologue (F).

Zoologist (E).

عَنْص يَعلَم الحَيَوانات.

١٢٩٢٤ - زَوُّلُوجِيَّة

Zoologia (F). Zoology (E).

علم الحيوان وهو فرع من التاريخ الطبيعي يبحث في

الحيوان.

١٢٩٢٥ - زَوُّلُوجِيَّة زَرَاعِيَّة

Zoologie agricole (F). Agricultural zoology (E).

علم الحيوانات النابتة أي الزراعية.

١٢٩٢٦ - زَوُّلُويَّت

Zoolite (F). Zoolite (E).

الزولويت البقايا المظومة المنحجرة من كل حيوان.

راجع جيفة.

١٢٩٢٧ - زَوُّبَق، زَوُّبَقِي

Mercure, Hydrargyre (F). Mercury (E).

الزئبق عنصر معدني سائل. وهو المعدن الوحيد السائل

يوجد في الطبيعة منفرداً أو متحلاً بمناسر أخرى مختلفة

التركيب || يوزن (Hg-٨٠) وزنه الذري ٢٠٠.٦١

ثقله الذري ١٣٥.٦ لونه فضي. يجمد في ٤٠° مع تحت

الصفر ويغلي في ٣٥٠° مع || مركباته عديدة تستخدم

في مختلف الاعراض اصحابها الصناعية والطبية.

١٢٩٢٨ - زَوُّبَق صَعْد

Sublimé de mercure

١٢٩٢٩ - زَوُّر، زَوُّر، زَوُّر * زَوُّجَرَة

Rugissement (F). Roaring, Roar (E).

صوت الالاس.

١٢٩٣٠ - زَوُّم

Ocelle (F). Ocellus (E).

الزَم؛ عين الحشرة أو بسيطة أو مركبة.



زوقا



زور

١٩٩٣٩ - زَيْت زراعي، زَيْت اَبْشِص

Huile minérale, H. blanche (F). Mineral oil (E).
يستعمل من تقطير القطران والكشط وهو ما كون فمال
يستعمل في المكافئة الشتوية .

١٩٩٤٠ - زَيْتَه هي غنازيرية الصحراء ، اطلبا .

Olea europaea (S). Olivier (F). * زَيْتُون
Olive tree (E). Echter Ölbaum (D). Olivo, Ulivo (I).
شجرة مثمرة من فصيلة الزيتونيات ، اقليمها اقليم حوض
البحر المتوسط يمتد من فلسطين الى اسبانية ومن مراکش
الى تونس . شروبا عديدة جميعها داخمة ، بطيئة النمو ،
طويلة العمر ، موطنها فسحة عجرا ، قشورها سحرابية
مفلجة كاشمة ، اغصانها غليظة ، افنانها مستدقة . اورقانها
هروء ، صغيرة القدة ، معققة ، متقابلة ، سنانية الصل
الكامل البسيط الجامد || انزعارها سبيل التجميع ، ابلي
الارتكاز سبلته تسمى سبله . انزعارها خشوية ، صغيرة
جلجلية الشكل || ثمارها لحية السووق ، خضراء اللون ،
بيضية او مستطيلة . صلبها خشية صلبة . بزورها
لوزية || تتكاثر بالبذر والمقل والتسلق والتشتف .
جميع شروبا سريرية تمشي وتشر في مختلف الاربعة
لا تحصى سوى المناطق وكثرة الربوية . وهي متناوبة الحمل
زاعدة غير انه يحسن تسليها لان التسميد يحول دون بعد
التناوب بين الحمل والتشح .

١٩٩٤١ - زَيْتُون البَرِّ هو اللغفة الزيتونية ، اطلبا .

١٩٩٤٢ - زَيْتُون بَرِّي هو السَّم ، اطلبه .

Olive * زَيْتُونَة
ثمرة الزيتون تؤكل ويستخرج منها الزيت بالصر .

Olivacé, Olivâtre (F). * زَيْتُونِي اللون
Olivaceous (E).
نمت وصي يطلق على ما كان لونه كازيتوني .

Oleaceae (S). * زَيْتُونِيَّات
Oleaceae (F). Oleaceae (E).
فصيلة لبائية من ذوات الفلقين . اجناسها وانواعها كثيرة
العدد تنتمي الى ثلاثة اسباط : الزيتونية والمرانيسة
والياسمينية .

Oléifère (F). Oleiferous (E). * زَيْتِي
نمت تمرني يمر من وجود المادة الزيتية ككوكاك الخروع
نبات زيتي .

Huileux (F). Oily (E). * زَيْتِي
ما كان شكله كازيت .

Oléine (F). Oleine (E). * زَيْتِين
احد مركبات الزيوت الدهنية والشعوم الجامدة .

Table astronomique (F). * زَيْج
Astronomical table (E).

قاعدة حسابية فلكية ترتكز على نتائج دوران بعض
الاجرام السماوية بموجب ترتيب سماوي خاص يدعى
النورة . اما الاجرام التي تتألف منها النورة فهي برتوبها
المرجخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر وزحل والمشتري .

Accroissement (F). Increase (E). * زَيْدَاة
هو حق زيادة حصة الاراث نيا او نقل احد او بعض
الورقة من صميم .

Tord-nez, Mouchette (F). * زَيْكَا
Twitch, Barnacles (E).
لاقط خشبي تضغط به بجفلة الفرس فيدل .

* زَيْطَا
هو المستنقود قرد من فصيلة البوسيات .

Décorateur (F). Decorator (E). * زَيْيَان
من تعامل مهنة التزيين .

Chlamydera (S). * زَيْيَان
Chlamydère (F).
جنس طير من فصيلة الرشيديات . انواعه المعروفة سبعة

موطنها بلاد استرالية . ملجئها الحيواني زوجي في الربيع
والصيف ثم جماعي . تألف الغابات والادغال . قريبا الثبار
اغصانها الدقاق والشمش والتين والموز والبرتقال وبعض
الزهور وجميع انواع الخشرات || اجسامها متدلة القدة ،
تطول من ٢٤ الى ٣٠ سم . اونها مختلفة الالوان جميعها
مبقعة وبنية يتنازع قفنية الانتشاب . انثاها عادمة
للقنازع ، ياحة الالوان || من ميزاتها انها تقم بالقرب
من اشجارها سارسا مسقوفة بالقش تزيها بمختلف
الاشيا الملونة تتوسطها سد من القشبان المبركة فتلها
الاناث كلما اشتهت السفاد || احرف انواعه واشهرها
الزيتان المبرقش .

١٩٩٤٦ - زَيْيَان مُبرَقَش *
Chlamydera maculata (S). Chlamydère tacheté (F).

نوع من الزيتون . موطنه بعض مناطق استرالية . يأتف
لغابات القرية من الجذائق والسران . قوته الثبار والبزور
والحشرات || جسمه معتدل القدة ، يطول نحو ٢٧ سم .
نوبه اسود السفحة العليا المبرقة بالاخر والاصفر
والبرتقالي . صدره وبلته واثنيكه الى الفرة يملوها مزلج
اصفر قفزة برتقالية اللون . ثوب الاثي اهد من ثوب
الذكر واقل رشفة منه || يدن حشه في الاشجار الرقيقة
ويشم سرسه حيث يستطيع . الاثي تحضن مرنان في
الحول وتضع في كل مرة من بيضتي الى ثلاث بيضات
قرحها بمثابة الذكر .

١٩٩٤٧ - زَيْيَانَة ، عَشْبَة هندية
Hemidesmus indicus (S). Hémidesma indien,
Salsepareille de l'Inde (F). Indian sarsaparilla (E).
Halbden, Indische sarsaparilla (D). Salsaparilla
d'India (I).

جينة عارضة معمرة من فصيلة السفلانيات . اورقانها
معتقة فلية ، نصلها اغصن الصفة العليا ، مابن
الحمل . انزعارها عشكزية التجميع ، عورية الارتكاز
ملوانة || يقال انها لا تنقل من المنافع الطبية . تستعمل
للتزيين .

١٩٩٣٨ - زَيْت
Huile (F). Oil (E).

سائل دغني نباتي او حيواني يستخرج من ثمار وبزور
النباتات الزيتية ومن نحم الحيتان وغيرها || والزيتون
تقسم الى طيارة وثابتة وجامدة وناجفة . جميعها اقل كثافة
من الماء ولا تقرب فيه . تستعمل في اغراض مختلفة
اغصانها الطعوم والاضادة وصناعات الصابون والشمع .



زيتان مبرقش



زيتون



زيتونة

١٢٩٥١ - زيتون

هو اكسيد الزئبق السليمي . لونه ابيض الفجر . ثقله النوعي ١٦ . صلابته من ٢ الى ٣ || يستعمل في دهان الحديد لانه يمنع عنه الصدأ .

١٢٩٥٢ - زيتون الحصاد Cigale (F). Seventeen year locust (E).

جلس حشرات من فصيلة الزيتونيات انواعه عديدة طولها يراوح من ١٦ الى ٤٥ م . ويسقطها من ٤٥ الى ١٠٠ م ثوبها مخضلة الاوان يكثر فيها الاسود والاسمر والابوي . تميش على بعض الاشجار الحرجية والزراعية اعصها الصنوبر تتميز باصولها الحادة للاستهلاك المزعجة كلها تقول فيها زيت .

١٢٩٥٣ - زيتون احمر Tibicen haematodes (S). Cigale rouge (F). Red cicada (E).

الاسم العلمي يمين ٥ نزار ٥ . حشرة صرارة من فصيلة الزيتونيات ورتبة حشرات الاجنحة . جسمها كبير القد ، طولها من ٢٨ الى ٣٨ م . يسقط تراوح من ٧٦ الى ٨٦ م . || ثوبها الى الصناتي الاخر للملج . رأسها مستقيم مستعرض طولها تجلج غير وافر واسفر . غطها مستند الطول . حناها كيرتان جاسفتان . زباناها ديقان ، صفيان . كولها مريح الشكل ، يجلج والاخبر والاخر والاصفر . حيد يطنها اخر . اجنتها غشائية ، ملاطها يعرفها رصاصها عتابة اللون . قوائمها صغيرة مهدبة || تسرح في التبار . تألف الحراج والغابات .

١٢٩٥٤ - زيتون البحر Scyllarus latus (S). Scyllarus, Cigale de mer (F). Shrimp (E).

حيوان من القشريات حشرات الارجل . يبدل في مياه السواحل البنانية .

١٢٩٥٥ - زيتون الصنوبر Cigale orní, Setigira orní (S).

حشرة صرارة من فصيلة الزيتونيات . جسمها مستقيم الجسم طولها من ٢٣ الى ٢٨ م . يسقط تراوح من ٦٨ الى ٧٨ م . ثوبها الى البني الاشعث يمين في الرأس والكوسل والبن . رأسها مستقيم طولها زخارف وتاريخ . غطها غرزي الشكل . حناها كيرتان جاسفتان . زباناها ورشي الشكل عند الذكر ، غطي عند الانثى . كولها يميني ، يجلج بالابوي . يطنها اصفر الحيد . اجنتها غشائية طولها ، في الزوج الاسامي ، بعض التكت السمر . تسرح في التبار . مرتها الحراج اعصها الصنوبر .

١٢٩٥٦ - زيتون الغاب Cicadetta sylvestris (S). Cigale sylvestre (F). Wood cicadetta (E).

حشرة صرارة من فصيلة الزيتونيات . جسمها شبه وشي الشكل ، طولها من ١٨ الى ٢٢ م . يسقط تراوح من ٤٦ الى ٥٤ م . || ثوبها الى البني الاسمر يملو تجلج عتابي في الرأس والكوسل . رأسها عريض . غطها مستند الطول . حناها كيرتان . زباناها صفيان . كولها شبه مريح . يطنها غرزي الشكل ، عتابي الحيد . اجنتها غشائية ، متابة المروق والاصعب . قوائمها صغيرة ، مهدبة || تسرح في التبار . تألف الغابات واشجار غصاف مجاري الماء .

١٢٩٥٧ - زيتون صرور Cicadatra querula (S). Cigale criarde (F). Poenish cicadatra (E).

حشرة صرارة من فصيلة الزيتونيات . جسمها طولها من ٢٢ الى ٢٧ م . يسقط تراوح من ٥٥ الى ٦٤ م . || ثوبها الى الكسني الاسمر طولها زخارف بترقالية في الرأس والكوسل . وفي جانبي البطن . الصفة السفلى من يطنها سوداء . رأسها مستعرض ضخم . غطها مستند الطول . حناها كيرتان . زباناها صفيان . كولها شبه مريح . اجنتها غشائية ، شفافة ، مدبجة بالاسود . قوائمها نشطة مهدبة || تسرح في التبار . تتميز بكثرة صرورها . تألف الحراج والحدايق القديمة الاشجار .

١٢٩٥٨ - زيتون صيدو Lyristes plebejus (S). Cigale commune (F). Common cicada (E).

حشرة صرارة مبدولة من فصيلة الزيتونيات . جسمها مستقيم طولها من ٣١ الى ٣٧ م . يسقط تراوح من ٨٥ الى ١٠٥ م . || ثوبها كسني اللون اسفغ الملج . الصفة السفلى من يطنها الى الصفة طولها حمار اسود يقبل الى الاصفر عند مؤخر البطن || رأسها مستقيم الجسم طولها تجلج ابيض وتتي . غطها غرزي الشكل . حناها كيرتان . زباناها صفيان ، ديقان . كولها كيرتان ، يجلج بالاصفر . يطنها شبه ورشي الشكل . اجنتها غشائية شفافة ، قليلة المروق ، كثيرة الاصاب . قوائمها نشطة ، مهدبة || تسرح في التبار . مبدولة في جميع الحراج انما يكثر ويبدوا حل الصنوبر .

١٢٩٥٩ - زيتون باربول Barboles

في اطراف الزيتون .

١٢٩٦٠ - زيتونيات Zizania (S).

Zizania, Riz d'eau (F). Water oats (E). Wasser reits (D). Zizania (I). جنس نباتات عشبية مائية من فصيلة النجيليات . انواعه عديدة اورانها صفية لتسلسل . زمارها متكونة لتجميع المواد النشوية || أشهر انواعها : الزيتونية المريضة الورق (Zizania latifolia) وهي حبة مسرة مأكولة الجلع منها مناطق الصين . والزيتونية الكندية (Zizania canadensis) وهي حولية تزرع بها المأكول .

١٢٩٦١ - زيتون Perameles (S). Pérarnéle, Bandicoot (F). Bandicoots (E).

جنس حيوانات جامة لاجه من فصيلة الزيتونيات ورتبة الجرابيات || انواعه المروفة حبة موطنها بلاد استراليا || اجسامها رمية طولها من ٤٥ الى ٦٥ م . بما فيه الذنب . رؤوسها اسفينة الشكل ، مستقلة المفاصل . اذانها كاسية طولها من ١٥ الى ١٦ م . || قوائمها الديدان والحشرات المختلفة والسائل .

١٢٩٦٢ - زيتونيات Peramelidae (S). Pérarnélidés (F). Peramelidae (E).

فصيلة حيوانات جامة لاجه من رتبة الجرابيات . اجسامها المروفة اربعة موطنها بلاد استراليا . مرتها الاراح || اجسامها صفرة القد ، مستقلة الشكل ، حبيبا لا يتجاوز حجم الارنب . رؤوسها اسفينة مستقلة المفاصل . قوائمها الخفيفة الطول من الامامية . نظام تركيب اسابها



زيتون



زيتون البحر



زيتون الصنوبر



زيتون الغاب



زيتون صرور



زيتونية



زيتون

١٩٩٨ - زَيْفُون صَغِير الْوَرَق

Tilia cordata, *T. parvifolia* (S). *Tilleul à petites feuilles* (F).

نوع من الزيفون للترابي. مهدد أروبة. شجرته تملو من ٥ إلى ٢٥ م. أوراقه قليلة الشكل، صغيرة القدر. نصلها حابق الصفحة العليا، أزرق السفلى. ثماره صغيرة الحجم خالية من الانسلح || ازهاره يستمر من حزيران الى عوز.

١٩٩٩ - زَيْفُون فَهِيءٌ وَجَيْسُون

Tilia argentea (S). *Tilleul argenté* (F).

نوع من الزيفون الترابي مهدد الشرق الاذن، شجرته هرية الشكل، لفاته خلية السحاب، أوراقه متوسطة القدر، نصلها خلي البشرة نقي اللون والمعالج. ثماره بيضية الشكل بيضاء الصلوع || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

١٩٩٧ - زَيْفُون مَنُغُولِي

Tilia mongolica (S). *Tilleul de Mongolie*, *T. à feuilles de vigne* (F).

نوع من الزيفون الترابي مهدد الصين. شجرته تملو من ٢ الى ٨ م. أوراقه صغيرة القدر ثلاثية القسوس نصلها مسن الحافة، مائل البشرة. ثماره خالية من الاصلح. ازهاره يدوم طوال شهر تموز.

١٩٩٦ - زَيْفُون مَيْشُوكْسِي

Tilia michauxi, *T. neglecta* (S). *Tilleul négligé* (F).

نوع من الزيفون الترابي. مهدد أمريكا الشمالية. شجرته تملو من ٢ الى ٢٥ م. افنانها حر السحاب، أوراقها تملو من ١٠ الى ١٧ سم. نصلها ازغب الصفحة السفلى يصفر عند دخول الخريف || ازهاره يدوم طوال شهر تموز.

١٩٩٧ - زَيْفُون هُولَنْدِي

Tilia platyphyllos, *T. europaea* (S). *Tilleul de Hollande* (F).

نوع من الزيفون الترابي مهدد أروبة. شجرته تملو من ٢٥ الى ٤٠ م. افنانها زهاب السحاب. أوراقها تملو من ١٥ الى ٢٠ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا، خلي السفلى الموشة بالازرق. ثماره اجاسية الشكل، خاسية الصلوع البارزة || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

١٩٩٣ - زَيْفُونِيَّات

Tiliaceae (S). *Tiliacées* (F). *Tiliaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين حديثة المقالات. اجناسها وانواعها عديدة منها الاجار والشيرات والجنابات والاشباح. أوراقها متعاقبة. ازهارها فردية او متقوية التجميع، عوردي او تاسي الازتكاز. ازهارها غشوية، صغيرة القدر، عطرية الرائحة.

١٩٩٤ - زَيْفُونِ الْحَقْل

Lycopsis arvensis (S). *Lycopside des champs* (F).

نبات شجري بري مرصوي من فصيلة الجسحيات، شكله قريب الشبه بالاشورة. يختلف عنها بافنانها المرققبة الانابيب || ساقه متعقبة، قليلة الفروع، تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم. أوراقه متعاقبة، لسنة، مزقية النصال. ازهاره طرفي الازتكاز. ازهاره بنفسجية اللون في اولى صعدا ثم زرقاء. تنويره يستمر من حزيران الى آب || يعتبر من النباتات المرصوة المسنة والمدر.

لا يختلف عن النقر. اجرة افنانها متعقبة الرصاة تلتف ثمانية اطراف ويتفتح من الوراء || اشهر اجناسها الزيزب والكروبي.

١٩٩٣ - زَيْفُون عُنْكَبِي

Sisyphus schaefferi (S).

Sisyphus araneiforme (F). *Sisyphus araneiforme* (E).

حشرة نائلة دامت من فصيلة الجعليات ورثة مفدمات الاجنحة. تألف المراتق التي يكثر فيها البراز. تعيش على يصر المازر والشمس وصل السلق والمواد النباتية المنحلة || جسمها صغير القدر تملو من ٦ الى ١٠ م. ثوبها الى السواد الكامد. رأسها مستعرض الشكل. زباناها دقيقان. ميناء صغيرتان، ظهورها ضيق الطرف المقطوم الذي لا يلمس كامل البطن. ارسافها خاسية القفل || الذكر اكبر قدماً من الانثى واجبت ثوباً منها وأقصر سرباً || لها جيل واحد في الحقول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف. تسمر في التبار. تساقط في شهر آب. تنجح الحشرة في البر وتطمره في التراب || البرقة عند بلوغها الكمال الجسودي تملو من ١٤ الى ٢٢ م. جسمها مستطيل الجسم، ضلع الكثير، قصير الروابج، سطحي اللسوس، جزوي الرأس || طوره الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع ويتقضي في التربة.



زَيْفُون عُنْكَبِي

١٩٩٤ - زَيْفُون

Tilia (S).

Tilleul, *Tilios* (F). *Linden*, *Lime tree*, *Lime-blossom*

tea, *Lindenbaum*, *Linde* (D). *Tiglio* (I).

جنس اشجار حرجية وزينية من فصيلة الزيفونيات. انواعه عديدة أوراقها متعقبة، متعاقبة، عابرة، ازهارها عطرية، نورية، خاسية الفصل والبيوتات. مهددة الاسدية. احشائها صناعية. قشورها ليفية تستعمل استعمال القطن. ازهارها وأوراقها طيبة مرققة ومضادة للقتح. تسكن السالك وتفيد الصدر. تهدئ الاصاب كالابرئين وتفيد في النوم. ويستخرج من زبورها مادة دهنية شائعة الاستعمال الطبي || اشهر انواعه ما يتبع.

١٩٩٥ - زَيْفُونِ الشَّرَقِي

هو الخلاف الضيق الورق، اطليه.

١٩٩٦ - زَيْفُونِ امْرِيكِي

Tilia americana, *T. glabra*, *T. nigra* (S). *Tilleul d'Amérique* (F). *American lime-tree* (E).

انوع من الزيفون الترابي. مهدد أمريكا الشمالية. شجرته تملو من ٢٥ الى ٣٠ م. أوراقه تملو من ٩ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٦ الى ١٥ سم. نصلها مائل البشرة حابق الخضار، مسن الحافة، مستطيل المتق. ثماره كروية خالية من الانسلح || ازهاره يدوم طوال شهر تموز.



زَيْفُون شائع

١٩٩٧ - زَيْفُونِ شائع

Tilia vulgaris (S). *Tilleul commun* (F). *Common lime-tree*, *C. lindae* (E).

نوع من الزيفون الترابي. مهدد أروبة. شجرته تملو من ١٥ الى ٢٥ م. أوراقه متوسطة الحجم. نصلها مسن الحافة، مدبب المتعقبة، باهت الخضار. ثماره مستطيلة، خاسية الصلوع البارزة || ازهاره يدوم طوال شهر تموز.



زَيْفُونِ الْحَقْل

Ablette (F). ١٢٩٩٨ - زيتانة فضية *

Small bleak (E).

سمكة نهريّة صغيرة القد فضية اللون تطول من ١٢ الى ١٥ سم. حراشفها لؤلؤية المادة، صناعية، تلمع على حطر القرق وروح الشرق. تستعمل في صناعة الكلال الكاذبة.

١٢٩٩٩ - زيتنب * ، زكّيل ، مسك ربي ،

Polianthes tuberosa (S). زنبق طرابلسي

Tubéreuse, T. des jardins (F). Garden tuberosa (E).
Echte tuberosa (D). Tuberosa (I).

الواحدة زيتنة. نبات عشبي يصل صسمي مسمر من فصيلة الوردسيات. أوراقه خضراء مستطيلة مخددة النصل. شراخه الأزهرى ساقى الشكل ، مورق ، يطول من ٧٥ الى ١٥٠ سم. ازهاره سنبل التجميع. ازهاره مستطيلة ، حمراء ، بيضاء اللون، فواحة العرف الذي يستخرج من ازهاره بالتقطير حطر فاخر عيّن. ازهاره يستمر من حزيران الى تشرين.

١٣٠٠٠ - زيتنة هي اصنافا كسوس ، اطلها .

١٣٠٠١ - زيتينة *

Zinnia (S). Zinnia (F). Youth and oldage (E). Zinnien, Schmuckzinnia (D). Zinnia, Fiori stellini (I).

جنس نباتات من فصيلة المركبات معقودة التبريف على اسم الطبيب البوتاني «زين» انواعها وفروها كثيرة الممد جميعها عشية حولية زيتينة مهدا للمكسيك. سوقها فراء تملو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. أوراقها خضراء متعاقبة حملة الخضار. ازهارها ورديّة، فردية، تاجية الارتكاز ، عديدة الالوان السوية او الموشحة. وهي من النباتات السروية المبلولة في جميع الحدائق، ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف.

Chromasporiées ١٢٩٩١ - زيتونات *

مارة لطور مجهرية من فصيلة الطلعيات. اجناسها ثلاثة : الأفيوكلاديم ، الميسليفتوزو والنيكروسترويه.

١٢٩٩٢ - زيتع الزيلع : ضرب من الودع صغار .

١٢٩٩٣ - زيتلوز ، كسيلوز ، خشبوز

Xylose مادة سكرية تستخرج من قصب الذريرة الصغراء وقش الخنطة وعشب الزان ونبات الطويل الخ .

١٢٩٩٤ - زيتنار

Zymase خيرة غيبياتية تحول فروب السكر الى كحول وغاز كربوني .

١٢٩٩٥ - زيتلوزجكة *

Zymologie (F). Zymology (E).

الزيمولوجية علم التخخير او الاختيار .

١٢٩٩٦ - زيتاب

Zinabe فاطور زراعي شديد اللعج لا يذوي النبات يرتكر على مادة كرميات الزنك يستعمل في مكافحة الامراض الفطرية اعصها الميليرو .

١٢٩٩٧ - زيتانة ، سمكة يضاء

Salmo (S). Able, Poisson blanc (F). Bleak (E).

جنس اسماك نهريّة من فصيلة الشبوطيات . انواعه عديدة : موطنها مجيرات وانهر الشرق الاذنل واروبه . جميعها صغيرة القد دقيقة اعرف انواعه واشهرها الزيتانة الغصية .




زيتانة فضية



زيتنب



زيتينة



ساج

13008 - سأكركه ، وكيمكة Lamelle (F).

رأية صغيرة من الزجاجة متناخبة في الدقة تشمل لتغطية القطعة المطلوب فمحصا تحت الجهر .
Lamella (E).

13009 - ساج * ، دلب هندي Tectona (S).
Tack, Tek' (F). Teak-tree, East Indian oak (E).
Teakbaum, Indische alche (D). Tek (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة الساجيات . انواعه ثلاثة جميعها اشجار ضخمة دائمة وظلمة . اوراقها متعقبة ، متقابلة ، ريشية الشكل . نصلها خالي البشرة ، بارز العروق والشرايين . ازهارها عتقودي التجميع ، منتصب الجلس ، ناهي الارتكاز . ازهارها خشوية عطرية ، بتلاتها ليس . ثمارها نووية كروية مأكولة . اغشائها شديدة الصلابة . وقنها كثيفة القدرات المتراصة التي تحمّل دون الانفصال بالموازل الخاربية . تشمل خاصة في صناعة السفن .

13010 - ساجو Sajou

هو السوس قرد من فصيلة السوسيات .

13011 - ساجول ، سوجل ، سوجكة Clisse (F). Wicker (E).

غلاف القارورة يحبك عادة بالقضبان الدقيقة او بقعد القصب .

13012 - ساجوم Moullfant (F). Wetting (E).

كل سائل شديد اللبونة والرزوية يضاف الى الادوية الزراعية ليؤدي انتشارا واصفاً .

13013 - ساجيات Verbenaceae (S).

Verbenacés (F). Verbenaceae (E).
وتعرف أيضاً برعي الحام . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيادات الثمالة . اجناسها وانواعها كثيرة

13012 - ساجيمي Septennat (F). Septennial (E).

هو ما يدوم سبع سنوات او ما يمارد كل سبع سنوات .

13013 - ساجي Gagnant (F). Winner (E).

اول خيل الحلبة وهي عشرة عند العرب اولاً السابق للمروح بالجلي ثم للمسل ثم الخيل ثم المثلث ثم المربع ثم المظفر ثم الخفي ثم الخيل ثم الطيم ثم السكت .

13014 - سابينديات ، سبينديات ، هابينديات Sapindaceae (S). Sapindacées (F). Sapindaceae (E).

فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة مستقلة الفعالات . اجناسها 118 تشمل زهاء 1000 نوع . منها الاشجار والشجيرات والجنات والتمسقات والاشواب . ازهارها رباعية او خاسية التركيب . ثمارها كبورية او نووية .

13015 - سابينوت ، سابينوط Carpe (F). Carp (E)

هو الشبوط ، اطلب .

13016 - سابينيا Sabia (S).

Sabie (F). Sabia (E).

جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة السابيات . انواعها سبعة معظمها زراعي قرضي || ازهارها كبيرة ، جملة ، حراد اللون ، كثيرة الاسدية الصفراء الملهبة || تزود في المراكن لانها تنقى البرد .

13017 - سابينيات Sabiaceae (S).

Sabiaceas (F). Sabiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة الفعالات مرتفعات البلفس . اجناسها اربعة وانواعها نحو 30 جميعها جنات صغيرة واعشاب معمرة منها بعض مناطق افريقية الاستوائية والحارة || اشهر اجناسها السابيا .

تبي اللون || بوغياته احليجية شفافة قياسها نحو ٣×٥ ميكرون || كيانج باقتلاع النباتات الموصية وباستمال البترة الزراعية لاجتناب استمرار زراعة المنبوت او القطن سنة بعد سنة في نفس الموضع .

١٣٠٢٢ - **ساجيد** (F). Decurrent (E). **دكرونت** (F). Decurrent (E).
نمت وسمي تعريف لكل ورقة او جزء منها كالمنق والصلع تنمو لاصقة بالفتد او البقية او اللث .

١٣٠٢٣ - **سكاد** Tapir
هو السناد ، اطلبه .

١٣٠٢٤ - **سكاج** هو قرفة ملابار ، اطلبها .

١٣٠٢٥ - **سكاحه** (F). Downpour (E). **اڤرس** (F). Downpour (E).
المسابة الشديدة الأنهار التي تصرع النبات .

١٣٠٢٦ - **سكادروان** هو اشة الصباغين نوع من الحراز .

١٣٠٢٧ - **سكاديبي** (F). Sexennial (F). Sexennial (E).
هو ما يلوم ست سنوت او ما يعاد كل ست سنوت .

١٣٠٢٨ - **سدالات الأجنحة** (S). Megaloptera (S). **مغالوبتراس** (F). Megaloptera (E).
رتبة حشرات نافعة من طبقة عصيات الجناح تشمل فصليتين والعديد من الاجناس والاناوع . جميعها كبيرة القد او متوسطة . رقاتها مائية لاحة .

١٣٠٢٩ - **سدان** (F). Nictitans (F). Nictitans (E).
نعت تعريفية يطلق حل كل غشاء مشترك من قطب الى قطب كما في غشاء العين الثالث عند الطير .

١٣٠٣٠ - **سداتيات الأجنحة** (S). Mecoptera (S). **مكوبتراس** (F). Mecoptera (E).
رتبة حشرات من طبقة سدنيات الجناح . كانت كثيرة الانتشار في الاحطاب النارية . تتبدل الان بفصليتين . اعطاهما للاحقة . زباناها عديدة الفواصل .

١٣٠٣١ - **سداج هندي** هو المستويه ، اطلبها .

١٣٠٣٢ - **سدازي** (F). Sarcocarpe (F). **ساركارپوس** (E).
من البهار ما هي لحية اللدق .

١٣٠٣٣ - **سدريه** * **سدريه** * **سدريه** * **سدريه** * **سدريه** * **سدريه** *
Isiophorus nigricans (S). Makeire, Voilier (F).
سمكة بحرية بيوض مفترسة من فصيلة السبيديات ورتبة شائكات الزعانف . اعطائها المناطق الاستوائية من المحيط الاطلسي . تعتبر اسرع سمكة معروفة . سرعة عصبها تقارب ١٢٠ كيلومتر بالساعة || جسمها كبير القد ، وشي الشكل ، يطول نحو ستة امتار . ثوبها الى الزرق البحرية يعمق في الظهر ويبرز ويبيض في البطن . تتميز اولاً بكبر زعنفتها الظهرية المستعرضة الزرقية التي تبدو ، عند نشرها ، كالشرار . ثم باستطالة زعنفتها الخلفية القليلة العرض . وتتميز ايضاً باستطالة عظم فكها العلوي الذي يبدو كالربع المستقيم النصل المدبب الطرف || يقال انها تعيش نحو ٤٠ سنة وتكون يافعة بعد ثمان سنوات || لحمها كامن للسمك ، كثير المادة الزيتية .

١٣٠٣٤ - **سداسلي** هو اليرموح الهندي ، اطلبه .

المدد فيها الاشجار والشجيرات والجنات المداة . وفيها النباتات الطبية والمقوية والمضادة السموم || اشهر اجناسها الساج وربي الحام والارث .

١٣٠١٤ - **ساجينه** * (F). Sagina (S). Sagina (P).
wort (E). Lagerknebel, Sternmoos (D). Sagina (I).
جنس نباتات عشبية من فصيلة الفرفنفليات . انواعها قليلة جميعها معمرة صغيرة القد ، سرقها حزنية ، اوراقها خمرزية متعاقبة متحدة القاعدة . ازهارها يضاء اللون ، صغيرة القد ، عادية الفائدة والطلاوة || اشهر انواعها الثلاثة التالية .

١٣٠١٥ - **ساجينه ذرية** (S). Sagina subulata (S).
Sagina subulata (F).
نوع من الساجينة تملو من ٥ الى ١٠ سم . اوراقها خمرزية ذرية . ازهارها خماسية التركيب . ازهارها يستمر من ايار الى تموز . ترطب في الارثية الرملية .

١٣٠١٦ - **ساجينه زبانه** (S). Sagina pilifera (S).
Sagina pilifera (F).
نوع من الساجينة تملو من ٢ الى ٨ سم . اوراقها قصيرة زباء النصل . ازهارها خماسية التركيب كبيرة البتلات . ازهارها يستمر من حزيران الى آب . ترطب في الارثية القليلة الانساج .

١٣٠١٧ - **ساجينه مضطربة** (S). Sagina procumbens (S).
Sagina couchée (F).
نوع من الساجينة تملو من ٢ الى ١٠ سم . ازهارها رباعية التركيب . ازهارها يلوم من ايار الى تشرين الاول || ترطب في الارثية الرملية .

١٣٠١٨ - **ساحير** (F). Circé (F).
Circé, Circinus (E).
الساحر كوكب . سيار من الخفس يحمل دلم ٣٤ . يمدد اكتشافه لفلكي هكزونك عام ١٨٥٥ .

١٣٠١٩ - **ساحيل** ، **مجداح** Littoral
الارض القريبة من الشطوط البحرية .

١٣٠٢٠ - **ساحوج التوب** (F). Phaeolus schweinitzii (S).
فطر ربي من فصيلة السيات يركب معطر الراتنجيات اعصها التوب . اروسه ترسة للشكل خليفة . صفحتها العليا مغطاة بمحودية كثيفة الحراشف الخفيفة اللون السوداء المزج . لبها اسفنجي التركيب لونه الى الصفرة المايقة . ميسجه ابيض الحليف الكثيف يمتري النبات في مستوى الجذور وينفذ الى قلب الجذوع بعد ان يطغ الحلب الذي يتحول شيئاً فشيئاً من كميات كبيرة قياسها نحو السنن الى كميات صغيرة فاصفر حتى تنتهي بجم ذرة القنبار .

١٣٠٢١ - **ساحوج المتبوت** (F). Phaeolus manihotis (S).
فطر من فصيلة السيات يركب جذور المنبوت والقطن . ميسجه كثيف الحليف يمتري الجذور من مركز انتشاهها فينقلها يوشاح اريد اللون اسفنجي التركيب يتغني حل الجراودة وعل التبادل النسل || اما الفطر فاروسه خلية السطح الاحل ، كبيرة ، مستديرة ، مغطاة ، قطرها نحو ٢ سم . لونها اصفر مخلي . لبها ظني التركيب



ساجينة



سارية



سكفراس

13047 - سائل أول أسفع *
Tige souterraine (F).
Underground stem (E).
هي الساق التي تنمو في التراب كالجنود.

13048 - سائل حمر
Ranier (mâle) (F).
Ring-dove (male) (E).
هو ذكر الورشان.

13049 - سائل سوداء
Jambe noire (F).
Black leg (E).
وصم بكيري يركب البطاطا في سوقها ويدنأها فيلذها
أشد الأذى. سببه الكروية البكتيرية الخطية.

13050 - سائل عكاشة ، سائل عكاشة
Tige grimpante (F). Climbing plane (E).
هي التي ليس لها من لفتة ما يكفلها للانصباف فتسلق
غيرها وترتكن عليه.



سافرية

13051 - سائل عكاشة
Tige tuberculeuse (F).
Tuberous stem (E).
هي الساق المكونة من اللدنة والسائل.

13052 - سائل عكاشة ، زاحفة
Tige rampante (F). Prostrate, Runner (E).
هي التي لا تسلق الانصباف في الهواء فتزحف على
الأرض.

13053 - سائل ملتفة ، عكاشة ، عكاشة
Tige volubile (F). Twining plant (E).
ساق تلتف حول دعامتها.



سافرة

13054 - سائل ملتفة ، صعدكة
Tige dressée (F). Dress stem (E).
كل ساق تسلق الانصباف بقلتها.

13055 - سائل
Stator
نمت تمرين يثقل على القسم الثابت من المحركات
الآلية.

13056 - سائل ، سائل
Pithecia (S).
Sakti (F).
جنس قرد أمريكي من فصيلة البرسيميات. أنوعه ٦
موطنها شمال أمريكا الجنوبية. جميعها كسلانة قليلة
الحركة. أجسامها ربة. وذوها مستديرة شارفة الجبهة.
قوائمها متوسطة الطول. أنفها طويلة جلجلة لا إعادة
أثوابها سوية الألوان يكثر فيها الأصفر وشتتانه. شعورها
قليلة الكثافة متوسطة الطول. تألف الثنائيات الثنائية.
تسرح في الليل. مرتعا الأشجار. جماعها قليلة العدد.
قوتها الفأر والسسل.



سائي

13057 - سائل ، سائل
Serpent noir (F).
Black snake (E).
الأنثى السوداء الثوب.

13058 - سائل العروس هو القطيفة الخطية.

13059 - سائل أسفع *
Selatosomus latus (S).
Taupin bronzé (F).
حشرة من السالويات طولها نحو ١٦ سم. ثوبها إلى البسرة
السفاد يملؤها مراح أخضر. تركب الزودع والبقول.
رقبتها اسطوانية مسطوية تقوذي جنود حدة ثنائيات.



سائل أسفع

13059 - سائل أسفع *
Sassafras (S). Sassafras, Bois odorant (F). Sassafras
tree, Ague tree (E). Sassafrasbaum, Fenchelholz
(D). Sassafraso, Sassafrasso (I).

شجرة وسيدة الجنس والنوع من فصيلة الناريات. منبها
كثنا وفلوريده. شجها صناعي أصفر اللون ، خفيف
الوزن عطري العرف. أوداتها تستعمل استعمال القليلات
والزوايل وذلك بعد تجفيفها وتحمها.

13060 - سائل هو الأبنوس ، اطليه.

13061 - سائل
Ebénisterie (F).
Cabinet-making (E).
السامة تجارة السالم أي الأبنوس وغيره من الأخشاب
الفاخرة المائلة.

13062 - سائل
Fendoir (F). Cleaver (E).
آلة حادة يقطع بها اللحم والعظم.

13063 - سائل
l'Horloge (F). Horologium (E).
الساعة كوكبة نجوم مقيمتها الجنوب. مركزها فوق كوكبة
النهر. عدد نجومها ٢٤ لأمها من المرتبة الخامسة.

13064 - سائل
Sagou (F). Sago (E).
دقيق نشوي مدق يستخرج من لب جنود يفس
التخلبات والسكاسيات التي تبت في البلاد الحارة.

13065 - سائل ، شجرة السائل ، لخل
Sagus rumphii, Metroxylon
sagu (S). Sagoutier (F). Sago-palm, Sago tree (E).
Sagopalme (D). Sago, Sagou, Palma de stoffe (I).
جنس أشجار معمرة من فصيلة التخلبات. مهدا البلاد
الحارة يستخرج من لب جنودها مادة نشوية مفضية تسمى
سافر لها فائده عند قوم تلك البلاد.

13066 - سائل
Crin (F). Coarse hair (E).
شعر الذئب والهلل.

13067 - سائل
Sparganum (S).
Sparganier (F). Reed-grass, Bur-reed (E). Igelkol-
ben (D). Sparganio (I).
جنس نباتات جنودية مائية معمرة من فصيلة البوليوات
أنواعها المبرزة ثمانية. أوداتها متعاقبة لاثت مسطوية.
تصلها ميزاني الصفحة الضيقة. أوداتها أبطية الانكناز
وعالية ، فسية التجميع ، متباينة ، كروية الشكل.
أشهر أنواعها شريط الماء.

13068 - سائل
Jambe (F). Leg (E).
من أعضا الحيوان وهي بين الفخذ والعرقوب.

13069 - سائل
Tibia
هي في الحشرات العضو المستقيم الكائن بين الفخذ
والرأس.

13070 - سائل ، جلدع
Tige, Tronc (F).
Trunk (E).
هي الجزء الأصلي في النباتات الرمائية. تقوم على
الجلد وتدور صعدا في سقم النباتات وتحمل الأضمان
والورق والجذر.

* ١٣٠٦٥ - سالكو ختملي *

Agriotes niger, *Elatér niger* (S). *Taupin velu*, *Agriote velu* (F).

نوع من السالكو طولها نحو ١٢ م. ثوبها إلى السواد القسعي تملو حلة غبراء. يكثر وجوده في أوائل الربيع. يركب مع رقاته الجوزية اللون زروع الحنطة والشعير وسائر التنبليات الزراعية والبرية والشوذر وشتل التبغ في الحقل.

١٣٠٦٦ - سالكو مشير *
Taupin rayé (F). هو سالكو الحصيد، أطله.

١٣٠٦٧ - سالكو منقط *، **لاقون منقط ***
Lacon punctatus (S). *Lacon punctué*, *Taupin punctué* (F). *Lacon punctatus* (E).

حشرة غاصلة مفترسة من فصيلة السالكويات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألف غابات الصنوبر وأحراجة. غناها تمش على بعض أوراق النباتات البرية وعلى أبر الصنوبر. يرقاتها تعيش على المواد الخشبية للحنطة وعلى ما تقتنصه من الحشرات الدنيا || جسمها متوسط القد، ويطول من ١٦ إلى ٢٠ م. ثوبها أسود اللون تملو حراشف فضية شديدة الصغر تبدو كأنها كالتقط. رأسها كبير الحجم. فكاهها ضليان. عيناها صغيرتان. زباناها عظيمتان. ظهرها مستدير الطرف للأحشف. أرسافها خامية المقل || الأث أكبر قدماً من الذكر وأكده ثوباً منه وأقصر زبناً || جيلها رباعي الخول. تظهر الحشرة الجملانة في أوائل حزيران وتعيش حتى أواخر آب. تسرح في النهار. تساهل بعد ظهورها بأسبوعين وترز في المكان في التربة تحت الجملانة || البرقة شكلية الشكل، قنية اللون حتى تصفر مع تقدم العمر || طولها أكمل الذي يستمر نحو سبعة أسابيع ينقضي في التربة على عمق يراوح من ١٠ إلى ٢٠ سم.

١٣٠٦٨ - سالكويات *
Elatéridae (S). *Elatéridés* (F). *Elatéridae*, *Snapping beetles*, *Click beetles*, *Wireworms* (E). *Feldschnellkäfer*, *Schnellkäfer*, *Dratzwürmer* (D).

فصيلة حشرات من رتبة مهديات الاجنحة اجناسها وأنواعها كثيرة المدد جميعها صغيرة القد. زباناها مركبة من ١١ فاصلة وهي غشبية الشكل أو منشأية أو مشطية. أرسافها خامية المقل. من ميزاتها أنها إذا رقت على ظهرها أو وضعت كلك تلت لامعاًة تولزها الطبيعي ونظماً ترعها بضع سلتيمرات ترافقها قرقة خاصة. رقاتها اسطوانية مستطيلة، اجسامها قوية جلدية، لوها إلى الصفرة العناية || تركب جنود وبنود وصافل عدة نباتات.

١٣٠٦٩ - سالكينوم *، **بكدونس جبكي ***
Selinum (S). *Sélin* (F). *Milk parsley* (E). *Kummel-silge* (D). *Applio di montagna* (I).

نبات عشبي يري ممر من فصيلة الحميميات. منته البلاد المعتدلة المناخ. يكثر في بعض اقاليم سورس البحر المتوسط. يقال انه لا ينجل من المناخ الطيبة المجبة التحديد.

١٣٠٧٠ - سام *
Paltre (F). *To graze* (E). سام الماشية تأدها إلى المرض ورماء.

* ١٣٠٦٠ - سالكو أطحل *

Las murinus, *Brachylacon murinus* (S). *Taupin gris* (F).

حشرة من السالكويات طولها نحو ١٦ م. ثوبها حنطي تملو رقة لعملاء. تركب بيلات الرود وأوراق بعض النباتات فتقرضها إلى البرقة صفراء اللون شكلية الشكل كثيرة الفروق تركب جنود الزروع والشوذر والبطاطا وشاتل الاجار المشرة.

١٣٠٦١ - سالكو التبع *
Agriotes ustulatus (S). *Taupin noir*, *Agriote noir* (F).

حشرة من السالكويات طولها نحو ١٥ م. لوها أسود لامع. يكثر وجودها في اواسط الربيع، تعيش على مختلف النباتات البرية وتقتضم سوق شتل التبغ، عند حملها، يمتوى سطح التربة. يكافئ باستمال أحد الحلوشر للعدالة تميراً على التربة عند آخر حراثة يعقها التشتيل.

* ١٣٠٦٢ - سالكو الحصيد *

Agriotes obscurus, *A. lineatus*, *Elatér segetis* (S). *Taupin des moissons*, *T. rayé*, *T. obscur*, *Agriotes des moissons*, *A. rayé*, *A. obscur* (F). *Striped elaterid beetle*, *Click beetle*, *Dark elaterid beetle* (E). *Saatschnellkäfer*, *Feld-Hummuschnellkäfer*, *Düsterer-Hummuschnellkäfer* (D).

اسم يطلق على عدة حشرات من السالكويات اجسامها متشابهة يصعب معها تمييزها. طولها يراوح من ٧ إلى ١٠ م. الزباناها بنية اللون تملوها شمشة خلية. اتحادها جمعة. رقاتها اسطوانية الشكل، مستطيلة القد، جلدية البقرة، صلبة التركيب، بنية اللون. ذنبية المسوج تركب مع رقاتها تخلف الزروع والبقول والتبرغ.

* ١٣٠٦٣ - سالكو الرياض *

Selatosomus cruciatus (S). *Taupin des futaies* (F). حشرة من السالكويات طولها نحو ١٢ م. لوها حنطي. فهداما إلى الصفرة النهار تملوها خطوط سود || تركب الاجار الحرجية والأزبينية اعصها السنديان والترزفون.

* ١٣٠٦٤ - سالكو بصاق *

Agriotes sputator (S). *Agriotes cracheur*, *Taupin cracheur* (F). *Agriotes sputator* (E).

حشرة مؤذية غاصلة لامة من السالكويات مفدمات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط إلى اوروبية وأفريقية الشالية. تألف المزروعات والراعي والخول والمائل. غناها تعيش على اوراق النباتات المرموعة والبقيلة وعلى بيلات الزروع اعصها ازهار القصبية الصرواية. يرقاتها تعيش على جنود التنبليات والجزر والشوذر || جسمها صغير القد يطول ٦ إلى ٨ م. قوبها إلى الصفرة السوداء الكسنية المواج. رأسها محبوس الشكل يطول في تقدم الجنية شبه اثار يمتد بين الزبائين. زباناها عظيمتان طويلتان. عيناها صغيرتان. كسلها معدل الايدياد، كثيف التفتيل وألعل. أرسافها خامية المقل || الاثنى ابرز قدماً من الذكر وأكده ثوباً منه وأقصر زبناً وأخسب بطناً || جيلها رباعي الخول. تظهر للفراسة الجملانة في أوائل الربيع وتبقى حتى أوائل الصيف. تسرح في النهار. يرقاتها بطيئة النمو لا تدرك اكمال النمور إلا بمر ثلث سنوا فيصبح طولها اذ ذاك نحو ١٨ م. ويستمر ثوبها في الصفرة المواج ٥٥ إلى ٥٥

ويبدأ وينتهي بظهور الحشرة الجملانة.



سالكو أطحل



سالكو التبغ



سالكو الحصيد



سالكو الرياض



سالكو بصاق



سالكو منقط



سالكو خلي



سالكينوم

- 13071 - سَامّ Vénimeux (F). Venemous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان حوى بعض السم ؛
او باستطاعته القلق سمه لئلا او نسا الخ
- 13072 - سَامّ اَبْرَص هو الزنفة ، اطلبها .
- 13073 - سَامِيَك Ichtyophag, Piscivore (F).
Ichtyophagous, Piscivorous (E).
مفعل بالسلك من مختلف الحيوان والبلد .
- 13074 - سَامِيل Limivore (F). Limivorous (E).
الذي يعيش في الاسفال والاموال ويقنات من محتوياتها
الضورية .
- 13075 - سَكُور Diamant brut (F).
Rough diamond (E).
هو اللئس الخام كما يوجد في الطبيعة (راجع ساس) .
- 13076 - سَكْدَرُوس Citharexylum (S).
Citharexylon, Côtelet, Bois fidèle (F). Fiddle-
wood, Savannah wattle (E). Geigenholzbaum (D).
Legno fidèle (I).
جنس شجيرات برية من فصيلة الساجيات مهددا بالبلاد
الاستوائية . اشجارها مزينة ، حمراء ، تستعمل في صناعة
آلات الطرب .
- 13077 - سَالِف Caprophage (F).
Caprophagous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على سلف
القطانيات .
- 13078 - سَالِه Produire alternativement (F).
To produce alternately (E).
ساعة الشجر ؛ حل سنة وتأسر اخرى . والشجرة السالِه
تدعى سبها .
- 13079 - سَالِيَة هي قنطرة . ج سوان .
- 13080 - سَاهِيَج Fumifuge (F).
Smoke-preventing (E).
نعت تعريفي يطلق على كل شيء او مادة تبيد الدخان .
- 13081 - سَاهِيَج Vent violens (F).
Strong wind (E).
الريح الشديدة الريح .
- 13082 - سَاهِر * ذَيْل الكَلْب Cynosura cristatus (S). Cynosura, Crételle des
prés (F). Dog's tail-grass (E). Echtes kammgras (D).
Ventolans dei preli, Lentolans crestatis (I).
نبات عشبي طلي يري من فصيلة النجيليات وسيل
المكشريات . مهدد حوض البحر المتوسط . يملو نحو
٦٠ سم . يتكرر في الغشاب والجبال وفي المراعي الطبيعية .
ثمة جيد الصنف مرغوب فيه .
- 13083 - سَاهِيَكَة Vent fort (F). High wind (E).
هي الريح القوية الهبوب تحرك الشجر .
- 13084 - سَاهُور Halo
الساوور كالمالة والظلاله يغلظ القصر بدارته .



ساهر

- Dominant 13085 - سَائِد مُتَوَكِّل
صفة المائل التواكلي للقلب .
- 13086 - سَائِس Palefrenier (F).
Groom, Ostler (E).
عامل يوسر الخيل فيقدم لها الطعام ويحميها ويرسها .
- 13087 - سَائِغ Assimilable
هو من المواد الغذائية ما كان قابلا لتقبل .
- 13088 - سَائِي المِيزَان سائق الميزان نجم يسير وراء نجوم برج الميزان فيبدو
كأنه يروحها .
- 13089 - سَائِل Fluide (F). Fluid (E).
صفة الاجسام اللامسكة الأتار ، والسوائل تقسم الى
تسعين السوائل اللامنة والسوائل الغازية .
- 13090 - سَائِلَة ، مَحَلُول Bouillie (F). Wash (E).
السائل حسب الاصطلاح الزراعي غليظ مائع مركب
من مواد مختلفة مذابة او معلقة في الماء ، والسوائل
الزراعية عديدة تستعمل في مكافحة الحشرات والاورام
الفطرية .
- 13091 - سَائِل بُورُود ، مَحَلُول بورود Bouillie bordelaise (F). Bordelese wash (E).
سائل مركب من كبريتات النحاس مع الكلس في الماء
يعدل 1٪ سلفات النحاس وقدره كلس حراق يشاف
القيح 1٪ كالزين . وهو اقدم الفروايطر واعماله انتشارا .
خصائصه ويزنات عديدة منها : انه يفيد النبات دون
ان يؤذي الاوراق ويسمها . يلتصق جيدا بجميع الاجزاء
التي يلتصقها . لا يحترق عليه من الوجبة الحشوية ونحو
ثمة الذي يحمله بمثابة الجبجج || وهو ينحصر بمزج
محلول الكلس الحراق (الخام) مع محلول سلفات النحاس
بنسبة واحد الى واحد او ٢ الى ٣ او ٤ الى ٤
الى ٤ . واختلاف هذه النسب يمد الى اختلاف النبات
والوسم الفطري المقصود وزمن الاستعمال . ويجب الا
يزرب من بال احد ؛
١ - ان النحاس هو العنصر القاتل في هذا السائل .
٢ - وجوب تخفيف هذا السائل في اوعية خشبية او
فخارية .
٣ - مراعاة تماثل نسبة الكلس من سلفات النحاس
لان زيادة الكلس تنهب بغاية السائل كفاطور كما
وان زيادة النحاس تذي فاعليته القاصرة بالسام
والبشرة .
٤ - ان محلول بورود الجاهز الموروث في الاسواق
لا يوازي السائل الممكن تخفيفه في الزمرة .
٥ - ان انقلبه ما حضر واستعمل يوبيا .
- 13092 - سَائِل بُورُغُونِي Bouillie bourguignonne (F).
سائل مركب من سلفات النحاس وكبريتات الصودا
مع الماء يعدل ٢٪ سلفات النحاس مع ١٪ كبريتات
الصودا . ولا يجوز استعمال هذا المحلول قبل انكاسه من
زوال ساقضيه ويتم ذلك باستعمال ورق الفلترنول الاحمر
فان ازرقته الورقة عند تطبيقها بالمحلول كان السائل
قلوبيا وصح استعماله والا اضيف اليه سلاوي الكبريتات
حتى زوال اللون الاحمر .

١٣٠٩٣ - سَائِل حَاشُورِي

Bouillie insecticide (F). Insecticide wash (E).

هو ما صنع خاصة للقضاء على الحشرات التي تترى النباتات الزراعية وقد يختلف باختلاف المادة الفعالة التي يرتكز عليها ولنبه عنصرها الجمالي .

Bouillie arsenicale (F). سَائِل زَرْيَخِي Arsenical wash (E).

كل سائل حاشوري يدخل في تركيبة الزرنيخ . ولما كان الزرنيخ من السموم الفتالة لذلك يجب استعماله بروتية على أن لا يتعدى استخدامه أبداً زمن الإزهار والمعد .

Bouillie au savon (F). سَائِل صَابُونِي Soap-wash (E).

يتركب من كبريتات النحاس والصابون في الماء وذلك بمعدل ٢٪ كبريتات النحاس مع ٢٪ من الصابون . وقد يضاف مذوب الصابون حتى أزرقاق ورقة الطرنشول .

Bouillie fongicide (F). سَائِل فَاشُورِي Fungicide wash (E).

هو من السوائل ما جعل خاصة لمكافحة الفطور والقضاء عليها .

Bouillie cuprique (F). سَائِل نُحاسِي Cupric wash (E).

هو كل سائل كانت إحدى مواد النحاس من مركباته المتصيرية الرئيسية .

١٣٠٩٨ - سَائِل نَوَوِي

Enchylème, Suc nucléaire (F). Enchylème, Nuclear succus (E).

هو السائل اللبوي الذي يحيط باللبية .

١٣٠٩٩ - سَائِل هَضَام عَصَاة هَضَامَة

Suc digestif (F). Digestive succus (E).

عصارة حافظة طبيعية تفرزها المعدة تسهياً لحضم الطعام وتغليه .

Liste en tête (F). سَائِلَة سَائِلَة

من شيات الخيل وفي الفترة التي تسيل على قصبه الألف .

Quadrupède herbivore (F). سَائِلَة Herbivorous quadruped (E).

السائمة كل راعية من الدواب . ج سوائم .

Alchiba - سَائِلَة

السبا نعيم من كوكبة الغراب ويدعى أيضاً غياه وينتقل للغراب .

Alchiba - سَائِلَة

السبا : البود يحمله الليل من بلد الى بلد . ج سبايا .

Vin (F). Wine (E). سَائِلَة سَائِلَة

هو الخمر الجيدة . والسبب : بياح الخمر .

Index (F). Fore finger (E). سَائِلَة

السبابة والسبة والسبابة والسبابة والمشيعة والمشيعة هي الاصبع التي تلي الإبهام .



سبَاق

١٣١٠٦ - سَبَاقِيَّات Pterophoridae (S).

Pterophoridae (F). Pterophoridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . أنواعها المروقة نحو ٦٠٠ منتشرة في معظم اصقاع العالم || تسرح من الغروب الى قسمة الليل ، طيراتها خفيفة الحركة ، محتدل المرقعة والحرم || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، فضفية ، رؤوسها معدلة الجرم . عيونها صغيرة ، ناشزة . قرونها الاستشعارية خيطية ، ملابسها نحيلة ، مراشفها مستطيلة . حذباتها منقودة . بطونها سفينة الحمل ، عادمة الزغب ، وراشها صغيرة ، مستطيلة الشكل . الامامية منها ثنائية الاصابع المنثقة الاطراف ، الخلفية ثلاثية الاصابع المستقيمة . جرازمها تامة النمو . ظنايبها الخلفية مستطيلة ، ثنائية للنخاس الطويلة || اساريها مستغلطة الاجسام ، زبده . تموش داخل الثمار او داخل الانقاد التي تنقبها وتغذها || حادراتها تحمي طور الاكمال مؤرجسة معلقة بالحصيفة او مزورة بغطى حريري المادة .

١٣١٠٧ - سَبَاق

هو البستان المعد لزراعة البقول ، راجع بستان خضر .

١٣١٠٨ - سَبَاق

هو الزيل ، راجعه .

Limnémie (F). سَبَاقَة Limnémie (E).

علم يبحث في التغيرات الدورية التي تطرأ على مستوى سطح المياه في مكان معين .

١٣١١٠ - سَبَاقَة

Sargus annularis (S). Sargus sperillon, Sargue, Spartin (F). Sar, Sargo sparus (E).

سمكة بحرية من الغرغوس وفصيلة الغرغيات . تكثر في المتوسط . جسمها صغير القد ، بيضي الشكل ، نوباً الى الكهبة الفضية يملوه تجذيع باغت . وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف .

Bouldere (F). سَبَاقَة

الموضع المخصص لجمع النفايات من تراب وواضخ .

١٣١١٢ - سَبَاق الطيَر

Oiseaux de proie, Rapaces (F). Rapacious birds, Birds of prey (E).

رتبة من الطيور تدعى الجوارح .

Heptandre (F). سَبَاقِيَّ الأَسَدِيَّة

نعت وصفي تعريفي يطلق على الأزارار المسببة الاضواء الذكورية .

Heptagone (F). سَبَاقِيَّ الأَصْلَاح

كل شكل هندسي مسج الاضلاع .

Heptagyne (F). سَبَاقِيَّ الأَقْلَام

نعت وصفي تعريفي يطلق على الأزارار التي يحمل وزجها سبعة اقلام .

Bague (F). Ring (E). سَبَاقِيَّ

السباق خاتم في رجل الطائر من جراح وغيره .



سبال ادفون



سبال نخلي



سبت



سينتوم ليشيك

١٣١٢٥ - سَبَالٌ نَحْلِي * Sabal palmetto (S).

ساقه قصيرة . اوراقه طويلة الزناد ، مستطيلة الخوص المنتعجة . مستطلة البرعم . كثيرة تغريفي . نصلها الى الخصار البحري يتحين عند انصاف زامه الثالث . يرغب في الاربة النضجة الانماج والرطوبة . يزود في المراكب والحفاظ . يتكاثر بالبذر .

١٣١٢٦ - سَبَالَتِج هو الاسبانج ، الحلبه .

١٣١٢٧ - سَبَبٌ ، اَعْتِيارَ Considerant (F).
Preamble (E).
هو في البرق الحقوقي احد الانساب التي يمس عليها الحكم سواء اكان قضائياً ام ادارياً .

١٣١٢٨ - سَبَب Cause
هو القصد الذي يلزم في سبيله شخص نحو شخص آخر . وقد يكون ناقماً وعاطفاً ورائفاً وعطوفاً وصورياً الخ .

١٣١٢٩ - سَبَبُ الْاِبْطال Rescatoire (F).
Rescissory (E).
هو السبب الاصل الذي بني عليه الابطال .

١٣١٣٠ - سَبْتٌ * Alcea ficifolia (S).
Alcea rose, Passe-rose, Rose de mer (F). Andwerp hollyhock (E). Stockrose (D).
نوع من الخيازي وهو نبات زراعي زريعي معمر يماز من ٥٥ الى ١٠٠ سم . ساقه فراءه . اوراقه عشائيه . نصلها خامسي التفريغ من الحافة . ازهاره كبيرة مكسيه قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الحمرة الوردية . انزهاره يستمر من حزيران الى ايلول .

١٣١٣١ - سَبْت Peau tannée (F).
Tanned leather (E).
جلد البقر وكل جلد مدبوغ لا شعر عليه . وان كان عليه شعر ووبر وصفه فهو مصعب .

١٣١٣٢ - سَبْتُغُلُوم * Septoglossum
جنس فطور مجهرية من فصيلة الغريثات . انواعه قليلة الحد والاذى تفيض على الانداد والاوراق . كنانته قسيه التجميع . ثنية اللون ، تنشأ في الادمه . يورثاته مستطيلة الشكل ، مؤنثه ، وريه الانقسام الثلاثي او الخماسي . اشهر انواعه سبتغولوم الشليك .

١٣١٣٣ - سَبْتُغُلُومُ الشَلِيك * Septoglossum fragariae (S).
فطر مجهرى يركب اوراق الشليك البري والزراعي . مظهره الخارجي يقع سمراء اللون ، قزبيه الاطار ، مرقنة الزوايا ، قطرها براوح من ٣ الى ٨ سم . تركيب نصل الاوراق فتوتها . يتكاثر بتطهير الرواكب قبل غرسها بواسطة الحامض الكبريتي المخلول من ١,٥ الى ١,٧ ٪ .

١٣١٣٤ - سَبْتُغُلُومِيكْس * Septomyxa
جنس فطور مجهرية من فصيلة الغريثات . انواعه عديدة مستطيلة رمية تركيب الاعشاب المقطوعة والمواد العضوية . تتميز بوثاقها المحصورة الناشئة في الطبقة الادمية . كنانته مستطيلة ، مؤنثه ، شفاقة ، قياسها نحو ٣×١٥ ميكرون .

١٣١١٧ - سَبَاقُ الْخَيْلِ Course de chevaux (F).
Horse-race (E).

ركض الخيل لمعرفة اكثرها صلواً وقوة وصلابة وشجاعة . وسباق الخيل من انواع الرياضة التي اشتهر بها العرب . وكانت خيل السباق تعرف بالحلبة (راجع سابق) . وسباق الخيل يجري الآن في ميادين خاصة وفقاً لنظم مرمية الاجراء ويتخذ بها كل صاحب جواد .

١٣١١٨ - سَبَالٌ Moustaches des animaux (F).
Whiskers (E).

السبال عند الحيوان كالسودل او الشارب عند الانسان . وهي مجموعة من الحلب تملو الشفة العليا .

١٣١١٩ - سَبَال Sabal
جنس نباتات برية وزريرية من فصيلة النخليات . انواعه عديدة . معظمها جلعي وبعضها سنخي . اوراقها زنادية ، مروحية . ازهارها كافوري سرحها كثير القزوع . جانبها نصفية . ازهارها عشوية ، لاطفة الارتكاز . ترتيبها ثلاثة اليبلات . ثمرها كروية الشكل ، صغيرة القد ، سوداء اللون ، ثلاثية البزور ، غير مأكولة . اشهر انواعها ما يلي .

١٣١٢٠ - سَبَالٌ اَدُونْسُون * Sabal adansonii (S). Sabal d'Adanson, S. glabra (F).
ساقه سنخية . اوراقه مروحية ، هيئة التشرج ، قطرها نحو اثتر ، لونها الى الخصار البحري ، زنادها متصب الارتكاز يملو نحو ٩٠ سم . || يشكو من مقفوره الاضطالي الذي يقوده الى كثرة الفسائل .

١٣١٢١ - سَبَالٌ اَمِيرِي Sabal blackburniana (S). Sabal prince (F).
بطي . النمو ساقه تملو نحو حشرة اثمار . قطرها براوح من ٣٠ الى ٣٥ سم . اوراقه حيلة الخصار . البايق . قطرها نحو ١٥٠ سم . زنادها باحت اللون ، جانبي الارتكاز يطول نحو ٨٠ سم . || يرغب في المواقع الرطبة ويجود في الحدائق المحصنة .

١٣١٢٢ - سَبَالٌ مَكْسِيكي Sabal mexicana (S).
Sabal du Mexique, S. serrulata (F).
بطي . النمو . جذعه يملو نحو ٦ اثمار . اوراقه مضرفة قطرها لا يقل من ١٣٠ سم . زنادها منشاري الحافة يطول من ٧٠ الى ٩٠ سم . || اقليمه السواطي البحرية . يرغب في الاراضي الرطبة والمواقع الغائفة .

١٣١٢٣ - سَبَالٌ مُؤْتَفٍ ، سَبَالٌ مُظَلِّي Sabal umbraculifera (S). Sabal parasol (F).
نوع من السبال . موطنه جزر الاندول وبني وكوبا . جذعه متصب ابيض يرتفع من ٨ الى ١٠ اثمار . اوراقه كبيرة ، مروحية . قطرها نحو ٢٠٠ سم . لونها الى الخصار البحري . زنادها مؤتف شائكة يطول نحو ١٠٠ سم . || يرغب في الاربة المعتدلة الانماج والرطوبة .

١٣١٢٤ - سَبَالٌ لَجْجِي Sabal minima (S).
Sabal acule (F).

نوع من السبال اللامد الجذع . اوراقه مستطيلة الزناد . نصلها كثير التشرج ، جميل الخصار الزاوي . || يرغب في الاربة الخفيفة المعتدلة الرطبة ، يحثى المواقع الباردة . تكثر زراعته في المراكب .

الريشة وتقفى على نشاط اشعة الشمس || يبدو على الأساط والأغاد بقع صغيرة عديدة مبعثرة أو كيفية التجميع مثل الحركة التسنيفية وتقرن لنمو || في سبيل الوقاية يحسن حفظ البصل في أماكن موهية ثم تريضه بهض الوقت لاشعة الشمس المباشرة .

١٣١٤٢ - سبجة الشهبان

Colletotrichum claviae
نظر مجهري يركب أوراق الشهبان فؤجها || مظهره الخارجي نقط سود مبعثرة تملأ صفحة النصل فتعزل سير التبغ وتقرن النمو وتؤدي إلى الإزهار والازهار || يكثف باستعمال اللواتل النحاسية الحويذة بمعدل ١ ٪

١٣١٤٣ - سبجة الكتان

Colletotrichum lini
نظر مجهري يركب الكتان في مختلف ادوار تكوين من حين انتشار البزرة في التربة حتى الإزهار وتكوين البزور الجديدة || مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة غيراء اللون سمراء المائلة تركب السوق والاوراق وتلتاح الزهرة والثمار || يكثف بتطهير البذار بواسطة الاملاح الفلزيقية .

١٣١٤٤ - سبجيل

Spigelia (S). Spigélie (F).
جنس نباتات عشبية سولية أو صمغية من فصيلة اللوزيات . انواعه ٣٠ بعضها زينة ومنها البري الطبي . سوقها فراء . اورثاته متعاقبة لائنة لائسبة الشكل . ازهارها أنبوية . ثمارها جرداء كروية الشكل صغيرة القد . بزورها دقيقة . اشهر انواعه مايلي .

١٣١٤٥ - سبجيل طبي * ، عشبة الهند

Spigelia anthelmia (S). Spigélie anthelmintique (F). Indian pink, Worm grass (E). Indisches wurmkraut (D). Spigelia, Erba da bachi (I).

نبات عشبي طبي بري حولي يطول من ٢٥ الى ٤٠ سم . اورثاته متعاقبة سنائية النصل . ازهاره دقيقة لونها الوردية . باطنها اصفر . ثماره جرداء كروية صغيرة القد || اورثاته وزهارها سوقه طيبة معوية وطاردة للديدان .

١٣١٤٦ - سبجيل ماريلاندا

Spigelia marylandica (S). Spigélie de Maryland (F).
عشبة سبوتية صمغية تملو من ٣ الى ٩٠ سم . اورثاتها كاملة . نصلها يبيض الشكل . ذلك التزام الاخير ، خلج المروق . ازهارها مستطيلة خاسية التفصيص . صفراء اللون كامها كروية مزدوجة || ازهارها يشمر من ايار الى تموز .

١٣١٤٧ - سبجيليات

هي القوانيات نصيلة نباتية ، اطباها .

١٣١٤٨ - سبجي ، قلايدي

Moniliforme (F). Moniliform (E).
نمت تمريري يدل على شكل خاص من أشكال الزباني ونحوها قوامه فواصل صبية متتابعة تشبه السبجة أو القلادة .

١٣١٤٩ - سبجيعة ، عديلية

Streptococcus (F). Streptococcus (E).

ويقال لها مكورة سبجي ومكورة عديلية . بكثيره مستديرة الشكل شائعة توجد في كل مكان . تكثر بنوع خاص في المواد المغانة .

١٣١٤٥ - سبج

Ochropsora
نظر مجهري من فصيلة الريحيات وسيد الجنس النوع يتنيز باليداته المنفردة وبعلاماته الاسطوانية الشكل القصيرة القد والمقلقة القاعلة || يتطفل على الثغراء فتركب الارزاق على صفحاتها السفلى . مظهره الخارجي بقع نسيجية لائسبة الشكل والحجم لونها الى الصفرة ثم تتحول الى الخليل حيث ترفع البشرة وتقرسها || انصراره زخمية لا تتعوب للكثافة .

١٣١٤٦ - سبجيعة

Colletotrichum
جنس تطور مجهري من فصيلة الثريات . يتميز بهابه اللون القائم على القصات الكثيثة || انواعه عديدة ووفية ، اعرفها ما يتبع .

١٣١٤٧ - سبجيعة الاسبانج

Colletotrichum spinaciae (S). Anthracnose de l'épinard (F). Spinach anthracnose (E).
نظر مجهري يركب اصول الاسبانج فيصيب يباس الارزاق مظهره الخارجي بقع يبيض قمرها من ١ الى ٢ سم . تركب نصل الارزاق على صفحته . قصباته سرفولية ، كتالته وشعة مستقيمة او قليلة التجميع ، قياسها ٣×١٧ ميكرون || يكثف باستعمال الاملاح النحاسية .

١٣١٤٨ - سبجيعة البطاطا

Colletotrichum atramentarium, C. solanicolum (S). Darcrose de la pomme de terre, Enroulement flasque (F).
نظر مجهري يصيب البطاطا فيعطب الشعن ويقرح الدرن . مظهره على السطح قبل الإزهار وبهده سقم ويحل واستطالة ثم ذبول والتفاف في الارزاق يمتد يباس النصل . وهو على الدورات والجلور والسوق ع حتى ارتفاع ٢٥ سم . يقع صغيرة مفرقة ازرايا ، غيراء او سمراء اللون باحة المراج . ومنه قطع البزرة المصابة يسلط ، على مقطعه ، ويوجد حلقه صفراء او سمراء اللون تملو المنطقة القشرية . يقال انه لا يعيش في المناطق التي تملو ٦٥٠ مم^٢ وانه يرغب في المراتع الطليلة || يكثف بتطهير البذار وباحتجاب الاربة المويضة .

١٣١٤٩ - سبجيعة البندورة

Colletotrichum phomoides
نظر مجهري يركب ثمار البندورة قرب ادراكها قهيلا . مظهره الخارجي يقع مستديرة خالية اللون مبشرة ثم مراكية تشبه البشرة ثم القاب || يكثف باستعمال الاملاح النحاسية وبسم من يضيف الكبريت .

١٣١٥٠ - سبجيعة الحنفيات

Colletotrichum gloeosporioides (S). Anthracnose des citrux, A. des limes (F). Anthracnose de limes, A. spot, A. tear-stain (E).
نظر مجهري يصيب بهض اجناس وانواع الليمون منها الاراج والليمون الهندي والخامض والمخلو والتانين والبرتقال . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة سمراء اللون تركب نصل الارزاق يقابلها جفاف في فواهي الاثنان يصب يباسها . يكثف باستعمال سائل بوردر المحلول ١ ٪ او غيره من الفلواطير الحديثة .

١٣١٥١ - سبجيعة الزنبق

Colletotrichum circinans (S). Anthracnose des lilacées (F). Anthracnose of lilacosa (E).
نظر مجهري يركب بصل الزنبق وسوقه . ينشط في المراتع



سبجة البندورة



سبجة الحنفيات



سبجة الزنبق



سبجيل طبي

١٣١٦٢ - سَبْرودَة الْمُتَوَسَّطَة

نوع من السبر يعرف بأبي اليسر، أغلبه .



سبب شائع

١٣١٦٣ - سَبْرودَة، قَتْلَكَة

Spergula (S). *Spergula*, *Spergula*, *Spergula* (F). *Spurry* (E). *Spark*, *Sparzel* (D). *Spergola* (I).

جنس نباتات عشبية حولية بمرية وزراعية من القترنليات . سقيا خضيرة قرماء . اوراقها لائفة متقابلة خطية الشكل . ازهارها فردية ، زائدية ، صغيرة القد ، ريمية || أشهر انوعاه السبرغولة الحقلية .



سبراله

١٣١٦٤ - سَبْرودَة حَقَلِيَّة *

Spergula campestris (S). *Spergule des champs*, *Spergula* (F). *Sylvan spurry* (E).

نوع من السبرغولة الزراعية المرحوية تملو من ٢٥ الى ٥٠ سم . تروء في المراعي الاسطعانية لانها تعتبر من الاغشاب للشفقة الخشبية التي تغني الاقطار الحلوب وتغنيها على اللد .



سبرغولة حقلية

١٣١٦٥ - سَبْرودَة، سَبْرِيَّة

Rustique (F). *Rustic* (E).

لمت تعرفي يطلق على كل نبات لا يتطلب تربة صينة ونباتية خاصة ويينة مخمدة .

١٣١٦٦ - سَبْرودَة

Saperda (F). *Saperda* (E). جنس حشرات غاشية من فصيلة القترنليات || انواعه عديدة . اجسامها متصلة للقد وسدرة . زياتاما شوكية و مستطيلة ومقومة . رقاتها تعيش على المواد الخشبية الحية واليابسة || اعراف انواعها واضعها ما يلي .



سبرود امير

١٣١٦٧ - سَبْرودَة أَغْبَر *

Saperda carcharias (S). *Saperda chagrinée*, *Grande saperda* (F). *Great poplar borer* (E). *Grosser Pappelbock* (D).

نوع من السبرود طوله يراوح من ٢٢ الى ٢٨ سم . نوبه الى الخشنى الاغبر تملو نقشه سواد . عليه متوسط الكثافة اسحب اللون || يرقة غاشية تقترس بطول الحور لكثينة فسطها .



سبرود البسق

١٣١٦٨ - سَبْرودَة البُنْدُقي *

Oberna linearis (S). *Saperda du noisetier* (F). *Oberna linearis* (E). *Hazelbock* (D).

نوع من السبرود طوله نحو ١٣ سم . نوبه الى السواد الاسف . زياتاه وارجله صفر || يرقة تركيب اثنان البندقي تقترسها وتسبب يبلها .



سبرود الحور

١٣١٦٩ - سَبْرودَة الحَوْر *

Saperda populea (S). *Saperda du peuplier* (F). *Poplar borer* (E). *Kleiner Pappelbock* (D).

نوع من السبرود طوله نحو ١٣ سم . نوبه خشنى اللون يملو مزاج بني . عليه كثيف التجميع اسفم اللون || يرقة تركيب اثنان واثنان الحور تقترسها وتسطها .



سبرود سلمي

١٣١٧٠ - سَبْرودَة سَلْمِي *

Saperda scalaris (S). *Saperde échelle* (F).

نوع من السبرود طوله نحو ١٦ سم . نوبه الى الخشنى الاسفل المواج يملو تجزيع ووراكس سد تشبه السلم . عليه قليل التجميع اسفم اللون || يرقة غاشية خاشية تركيب مختلف الاشجار والاعشاب انصها السنتيان والجزور والحور والتغام والكرز تقترس لحاء وشكير الاشجار الحية والاعشاب اليابسة .



سبرود سلمي

١٣١٥٠ - سَبَّحَة هي اللقح ، أغلبه .

١٣١٥١ - سَبَّحَة مَالِيَّة

Marais salant, *Salin* (F). *Salt marsh* (E).

كل ارض تركبها المياه البحرية وترسب فيها الملح .

١٣١٥٢ - سَبَّحِيَّات

Bryindes (F). رتبة من السببالات اجناسها وانواعها كثيرة العدد تنسج الى نصليتين الرحوكيات والصرعيات .

١٣١٥٣ - صَبَدَة

صيد الفرخ بدا يرشه يطير .

١٣١٥٤ - صَبَدَة

Bourra (F). *Kind of down* (E). ما يطلع في وروس النبات وراعه قبل ان ينشتر . ج امباد . واليد ما تلب من الشعر او الور .

١٣١٥٥ - صَبَدَة

Plumula (F). الجزء الناقش من البزرة او الحبة .

١٣١٥٦ - صَبَدَة

Caprimulgus (S). *Engoulovent* (F). *Goatsucker*, *Nightjar* (E).

جنس طير من فصيلة السبديات . انوعه ٧٥ مشتركة في جميع الاقطار . اجسامها مستطيلة . وراسها حلقة مقلعة . مناقيرها صغيرة . اشداها . واسعة . اصنافها قصيرة . اجسامها خفيفة مستطيلة . ارجلها قصيرة مسرلة || تترن في الارض بين الاغشاب والامدال . اناها يتنفس من ٤ الى ٦ يشات تحسها من ١٦ الى ١٨ يوما || جميعها من الرامس القواطع . قريبا اغشرات على اشجارها || أشهر انواعه السبد السباح والدموية .

١٣١٥٧ - صَبَدَة شَائِعَة * أُنُوسِيَّة

Caprimulgus vulgaris (S). *Engoulovent commun* (F). *Common nightjar* (E).

نوع من السبد طوله ٢٨ سم . وريسته ٥٨ سم . يرشه شديد النعومة متوسط اللون لونه الى البنية والسواد يملو تدبج وتدمش وتوشم || وهو من القواطع يحوي البلاد في طلب المصيف والشمي يقم في لبنان يفسر البوث .

١٣١٥٨ - صَبَدَة نِيَّات

Caprimulgidae (S). *Caprimulgidae* (F). *Caprimulgidae* (E).

فصيلة السبديات من رتبة الجوارم المشقوقات المناقير .

١٣١٥٩ - صَبَرَة ، سَبَّحَة ، سَبَّحَة

Soudage (F). *إسْبَاحَة* ، *إسْبَاحَة* (F). *Souding* (E). تحري حق الطبقات الارضية وتصامرها .

١٣١٦٠ - صَبَرَة

Glaréoles (F). *Glaréola* (E).

جنس طير من السبديات القترنليات . انوعه المعروفة ١٥ جميعها من القواطع . ارجلها قليلة العدد . تألف الشطوط الريلية والمناط السبحة . انواها رصاصية اللون . اعناها ويطون يفسر . قوامها وطراف اذناها ، القلقة ، سود || أشهر انوعاه سبرة المتوسط .

١٣١٦١ - صَبْرَالِيَّة *

Sobralia (S). *Sobralia* (F).

جنس نباتات تربينة من السبليات . مهدا امريكة البصل . ازهارها حلية البشرة ، حيلة الشكل ، مزركشة . الاوان العلة الزائمية للمواج || تروء في الماكن والاعمار .

Sepsis (S). ١٣١٨٢ - **سببوت**
Sepsis (F). **Sepsis (E).**
 جنس حشرات من فصيلة السببوتيات ورتبة ذرات
 الجناسين. انواعه المروفة عديدة اصلاها مناطق البلاد
 الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى
 ٦ م. رؤوسها شبه مكورة ، مستقلة ، هيونها فارقة عند
 الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل.
 ملاسها غامرة. اعطاشها صغيرة. كراسلها شبه اسطوانية،
 محزوزة. بطونها غيقة القاعدة والمؤخر. وراشها قليلة
 الخضاب. قوائمها مستطيلة. اثارها كثيرة ، جميعها وحيدة
 اللون || الجملانة تعيش على ريق الانهار اخصها
 الحبيبات. البرقة نائلة او دامتة .

Sepsidae (S). ١٣١٨٣ - **سببوتيات**
Sepsidae (F). **Sepsidae (E).**
 فصيلة حشرات من رتبة ذرات الجناسين. اجسامها وانواعها
 المروفة عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم || اجسامها
 صغيرة تطول من ٣ الى ٧ م. رؤوسها مكورة ، مستقلة ،
 هيونها فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة ،
 ثلاثية الفصل. ملاسها صغيرة او غامرة. بطونها غيقة
 القاعدة والمؤخر. وراشها قليلة الخضاب. افخاذ وثلاثية
 قوائمها الامامية والحلفية مزودة بمخاض حادة || ذكور
 بعض انواعها مجهز ببند تنضح افرازات عرفها كعرف
 الحنفوق || الحشرة الجملانة تعيش على ريق الانهار او
 على المواد النباتية او الحيوانية الجزئية الانحلال. البرقة قد
 تكون غاضلة او دامتة او نائلة او للامسية || أشهر
 اجناسها السببوت .

Tribu (F). ١٣١٨٤ - **سببوت** ، **قبيلة** ، **وفا**
Tribe (E).
 مركزه في تصنيف الاحياء بين الفصيلة والجنس.
 لذلك فالفصيلة تشمل بعض الاسباط والسببوت يشمل
 عدة اجناس .

١٣١٨٥ - **سببوت** نبات كاللبن مرعى جيد (السان) .

Septupler (F). ١٣١٨٦ - **سببوت**
To increase sevenfold (E). ضايف التي سبع مرات .

Bête féroce (F). ١٣١٨٧ - **سببوت** ، **سببوت** ، **سببوت**
Carnivorous animal (E).
 هو الحيوان المفترس . ج اسبوع وسببوت . وسمية .
 ومن الكثير ما اكل اللحم خالصا . وارض سبه اي
 كثيرة السباح .

١٣١٨٨ - **سببوت** هو الجفيل ، اطلبه .

la Bête (F). ١٣١٨٩ - **سببوت**
the Beast (E). كوكبة نجوم مشهورة باسم القلب ، اطلبه .

Baguer (F). ١٣١٩٠ - **سببوت**
To ring (E). سبق الطائر اذا جعل السباك في رجليه .

Epi (F). ١٣١٩١ - **سببوت**
Ear of corn (E). السبلة والسبولة : السنبله من الحنطة ونحوها . وهي ايضا
 شكل من اشكال الازهار قوامه محور تجتمع حوله الازهار
 وتتصايف || يقال اسبل الزرع : اذا شربت سبولة .

Giareolidae (S). ١٣١٧١ - **سببوتيات**
Giareolidae (F). **Giareolidae (E).**
 فصيلة السببوت من الرقائيات تنتمي الى رتبة طول السباك .

Cypris (S). ١٣١٧٢ - **سببوت**
Cypris (F). **Cypris (E).**
 جنس حيوانات مائية من القشريات الدنيا الصدفيات
 وفصيلة السببوتيات . انواعه المروفة عديدة منتشرة في
 معظم انهر وبحيرات وبتاق العالم القديم || اجسامها شديدة
 الصغر ، حادة التسليم ، مستطيلة الزباني . اختلفها
 ملونة ، مائسة ، رقيقة ، ثنائية المصارع الصدفية المائسة .

Cypridinidae (S). ١٣١٧٣ - **سببوتيات**
Cypridinidae (F). **Cypridinidae (E).**
 فصيلة حيوانات مائية ، بحرية ونهرية ، من القشريات
 الدنيا الصدفيات || اجسامها وانواعها كثيرة العدد بعضها
 بحري والبعض الآخر نهرى || تتميز بالخطبة الثنائية
 المصارع الصدفية || أشهر اجناسها واكثرها انتشارا
 السببوت .

١٣١٧٤ - **سببوت** هو التفاف المروف ، اطلبه .

Seps ١٣١٧٥ - **سببوت**
 من سمح الحيوان لفرق الذكور امين الملوغ . هو
 اللسان ، واجبها .

Gongyle oculif (F). ١٣١٧٦ - **سببوت** **أنمر**
 هو النمامة النمر ، اطلبه .

Seps chalcidé (F). ١٣١٧٧ - **سببوت** **مخطط**
 هو النمامة المخططة ، اطلبه .

Savane (F). ١٣١٧٨ - **سببوت**
Savanna (E). هو المفازة الشاسعة المترامية الاطراف كثر مروجها
 واشجارها الطويلة الموسمية .

Felis ruppelli (S). ١٣١٧٩ - **سببوت**
Chat de Ruppell (F). **Cat of Ruppell (E).**
 نوع من السنائير البرية قريب الشبه بالنم . موطنه
 الحيشة والزوية وبصر . جسمه يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم.
 وزنه من ١٦ الى ١٨ سم. ثوبه الى الصبغة الرمادية
 يمتزج مع اقترابه من شمس الظهور ويعلو يتميز بزع
 مفرق اسود يكتنفه من قاعدة الفتق الى طرف الذنب .

١٣١٨٠ - **سببوتان** هو الدين ، اطلبه .

Cybister (S). ١٣١٨١ - **سببوت**
Cybister (F). **Cybister (E).**

جنس حشرات مائية مفترسة من عمديات الاجنحة وفصيلة
 المنكرويات . انواعه المروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار
 العالم اخصها المناطق الحارة . اكثر انواعه يالغ المياه
 المذبة وبعضها بحري . قوتها كل ما تيسر من حشرات
 وقشريات وبلابغ واسماك صغيرة || اجسامها كبيرة القدر ،
 اعمليجية الشكل ، مبطلة . تتميز بكبر قوائمها الخلفية
 اعجابية الشكل والامتداد . اثارها سوية الالوان للماقية
 يكثر فيها الجوزي والكسني والبي والاضهر اللامس .



سببوت



سببوت



سبوتيلس

Cebus (S). ١٣٢٠٢ - سبوتس *، سبوتو *
Sajou (F). Sajou, Sapajou (E).
جنس قرد امريكية من فصيلة السبوتات. أنوعها ١٩
موطنها يمتد من البرازيل إلى نيكاراغوا || أجسامها
رشيقة. ووشها صفيرة. قوائمها مخصصة للقول. أذنانها
كاسية مغلقة لا أعادة. أنوفها قصيرة الشعر اليد
التيان الأولان || تألف الفنايات. مرتها الأجار
تسريح في قمها || جماعها قليلة العدد تتألف من
ذكر وثلاث أنثى وبعض الجراء || قوتها الثمار والبراعم
والخضراوات ويبيض الطير.

Cebidae (S). ١٣٢٠٣ - سبوتيات *
Cebidae (F). Cebidae (E).

فصيلة قرد من الثمارات موطنها البلاد الامريكية.
أنوعها المعروفة ٦٦ تنقسمها ١٥ اجناس. تتميز بجلوها من
الاصهء والكتائب، باستاطة اجسامها الرشيقة وبأذنانها
الأعذة || تألف الفنايات والارواح الكيفية الرطبة.
تمش على الاثبار تنقل عليها بقعة مدهشة. جماعها
تد من ٢٠ إلى ١٥٠ || قوتها الثمار والبراعم والخضراوات.
انثاها تضع من جرد إلى جردين || أما اجناسها
فهي التالية بالترتيب الابجدي: أنل، اواركاري،
راكيتل، دروكول، ساكي، سيوس، ستور،
كرزيريكسي، كليترش، لوفوتش.

١٣٢٠٤ - سبوت ذهبي هو النوع، اطلبه.

١٣٢٠٥ - سبوتة هي البيلان الاسود، اطلبه.

١٣٢٠٦ - سبوتل *، ثوم قصبي *
Allium fistulosum (S). Ciboule (F). Welsh onion (E).
نبات يصل عمره من فصيلة الزنبقيات. اوراقه قرمية
الانتشاب متصبية تطول نحو ٣٠ سم. يتصلبها شراب
اجوف يعلو نحو ٥٠ سم. تكلمه قسمة كثيفة، سبوتانية
الشكل، ازهارها بيض اللون خضر المالح || غروبه
الزراعية عديدة. فيهما ترطب في الارابة البدالية الخفيفة.
وهي تستعمل كمحلاة وليس كمسرة.

Crin (F). Coarse hair (E). ١٣٢٠٧ - سبوتيب *
السبيب من الفرس: شعر النامية والرف والقلب.
فروس غفيف السبيب. الرفاعة سبية.

١٣٢٠٨ - سبوتيدج * هو الحبار، اطلبه.

١٣٢٠٩ - سبوتير * كحول

Alcool, Esprit-de-vin (F). Alcohol (E).
سائل يستخرج من تقطير النبيذ او صمغ السبب المختصر
او غيرها من الثمار والحبوب وغنفل المسواد النباتية
المختصرة || وهو سائل شفاف. سريع التبخر،
ساد الحليم يكرى الحلق. يقل في ٧٨ + ٨٠. ويجمد
عند - ١٣٠. شغ.

١٣٢١٠ - سبوتيس * هي الوك الابيض، اطلبه.

١٣٢١١ - سبوتير *
نوع من مالك الحزين يبيض بلشون جبار. كنيته ايوالزاد

١٣٢١٢ - سبوتكة * هي ذنب الثعلب، اطلبه.

١٣٢١٣ - سبوتكة * هي الابل، راجعه.



سبوت

Jaguarondi (F). ١٣١٩٢ - سبوت امريكي *
حيوان لاح مفترس يدعى جنوردي، اطلبه.

١٣١٩٣ - سبوتيات *
هي السبوتيات فصيلة نباتية، اطلبه.

١٣١٩٤ - سبوتيلس *
Spondylus (S).
Spondyle (F).
بحار متوسطة القد حديد النواهي الصلابة يكثر في بحار
البلاد الحارة.

١٣١٩٥ - سبوتة هي الاغراس الامريكية، اطلبه.

١٣١٩٦ - سبوتيات *
Sapotaceae (S). Sapotaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين، وحيدات القعالة،
مرتقات المبيض. اجناسها ٣١ مهدا للمناطق الاستوائية
والحارة. فيها الاثبار والشجيرات والجنات. اوراقها
متعاقبة، كاملة، جلدية النصل. ازهارها اطية الاوتكار.
ثمارها حشوية الشكل. يستخرج من معظم اجناسها صمارة
صمغية صناعية تدعى طبرخي || اشهر اجناسها الاغراس
والبرام والاباجان والكنيت.

١٣١٩٧ - سبوتج *
Sebastes (S). Sébaste (F). Norway haddock, Rosefish (E).

جنس اسماك بحرية من شاككات الزمان وفصيلة الجلائخيات.
انواعها المعروفة نحو ٣٥. فيهما من اسماك بحار المناطق
الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها ممتددة القد وصغيرة.
سهما مبراشي الشكل، شاكك المقصة. زعانفها الظهرية
متسلسلة تتميز بشدها الشاكك الاطراف. اثبارها زاهرة
الالوان الزائفة || اعرف انواعها واشهرها سبوتة المختص.

١٣١٩٨ - سبوتة المختص *
Sebastes dactylopterus (S). Sébaste de la Méditerranée (F). Mediterranean Rosefish (E).

سمكة من السبوت اعطانها البحر الابيض المتوسط. طولها
نحو ٢٢ سم. ثوبها الى البردة القضيعة الموهجة بالاعضر
الوردي. زعانفها جلدة ومزركشة بالاعضر الرصاصي
المزاج. زعنفتها الشرجية مسلحة بمخس حاد || لحمها
كامن الصنت مأكول.

١٣١٩٩ - سبوتو *
Ardoiné (F). Slate (E).

حجر طري التركيب سهل التصفيح ورصاصي اللون
ازرق المزاج او اسود. يستعمل استعمال الفريد في تغطية
سقوف البيوت.

١٣٢٠٠ - سبوتونيسمة *
Sporonema

جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلائيات. انواعها قليلة
عمدة الاذى. بكتيداتها بدو متلفة ثم تنزق عند
الطراف جولا. بروتيناها يفضية او اسطوانية الشكل،
بسيطة شفاقة.

١٣٢٠١ - سبوتري *
Ardoiné (F). Sals-colour, Bluish-grey (E).

نمت وصفي يطلق على ما كان لونه لون السبوت.

S. nux vomica سترينكوس القيء، جوز القيء

S. Ignatii إينياس ، فول إينياس

S. Icaja إيكاجا

S. dewevrei دوفري

S. colubrina كولبرينا

S. ligustrina ليفستينا

من فئة النباتات الجمالية التي تسم الدم والتي كان استعمالها على الحراش شائعاً فيما مضى عند زواج أفريقيا وأمريكا نخص بالذكر :

S. toxifera سترينكوس توكسيفرا

S. rouhamon وهامون

S. curare كراير

S. castelnaei كستني

لحاء اشجارها طيبة وبعضها يبيد الكلب والجملاد .

١٣٢٢٢ - سترينكوس القترع ، لندة ، لندة

Strychnos potatorum (S). Strychnos des buveurs (F). Clearing nut tree (E). Bergkrähenaugenbaum (D). Nuce potatora (I).

شجرة من السترينكوس هدية المنبت كبيرة القند داغمة . ثمارها مأكولة اللب ، بذورها حادة الناصر السامة ، روق الماء المكر وتنقيه .

١٣٢٢٣ - سترينكوس القيء* ، جوز القيء

Strychnos nux-vomica (S). Strychnos vomiquier, Vomiquier (F). Nux vomica tree (E). Brechnussbaum (D). Nuce vomica, Fungo di levant (I).

شجرة دائمة متوسطة القند . ساقها كهيء الجملاد . اغصانها سرسة . افئادها شائكة . اوراقها بيضية النصل ، خاسية المروق . ازهارها حامى الايتكاز . ازهارها خضراء اللون . ثمارها كروية بجميع التفاح لونها الى الصفار البرتقالي . سيقانها لينة التركيب ، ابيض اللون مأكولة . بذورها نحو ١٥ وهي لاقياسة الشكل والقند . لونها الى الكهية اللبراء يملوها زغب هليبي الشكل اسم اللون . هذه البذور تحوي :

من ١ الى ١.١٩٪ سترينكين

من ٧ الى ١.١٥٪ بروسين

ويستدل من الهيدروكس ان تركيبها المصنوي يشمل ١.٥٪ من المنزوع ٨.٥٪ من الفلكنوز .

١٣٢٢٤ - سترينكوس النوبة

Strychnos innocua (S). Strychnos inoffensis (F).

شجرة من السترينكوس مهداة النوبة ثمارها مأكولة اللب اللذيذ الطعم . بذورها حادة الناصر السامة تستعمل في بعض المستحضرات الطبية الموية .

١٣٢٢٥ - سترينكوس إينياس* ، فول إينياس

Strychnos Ignatii (S). Strychnos Ignatier, Fèves de St Ignace, Vomiquier, amer (F). St Ignatus bean (E). Bittere Ignatie, Ignatienbaum (D). Fava di Sant' Ignazio (I).

جنية عارضة سريعة من السترينكوس . مهداة جزر الفيليين وزرع في الكوششين والهند الشرقية . اوراقها بيضية الشكل ذائقة . ازهارها بيض . ثمارها كروية بجميع البرتقال الصغير . قشورها ملس ، لونها الى الصفار

١٣٢٢٤ - صيت الحشن في البلادون ، اطلبه .

١٣٢١٥ - صيت حشديجكة في وزال الشرق ، اطلبه .

١٣٢١٦ - سقالة

Résidu (F). Residue (E). هي الرزالة من المواد النباتية المصنوعة كمثل لسان والشوندر والزيون .

١٣٢١٧ - سترانج

Stratégie, Stratégiste (F). Strategus, Strategist (E).

من كان اختصاصه السترجة .

١٣٢١٨ - سترانجي

Stratégique (F). Strategic (E).

ما هو نخص بالسترجة على اختلاف اهدافها .

١٣٢١٩ - سترنجة

Stratégie (F). Strategy (E). السترجة فن تنظيم القوى الحربية والسياسية والاقتصادية والمعنوية عندما تدعو الحاجة ان في حالة الهجوم ام في حالة الدفاع . وبالترجمة تعتبر السترجة السياسية فن ترتيب وتجهيز وتوجيه جميع الاعمال المتتوية في اطار مصلحة معينة .

١٣٢٢٠ - سترولسيوم

معدن اصفر اللون يوجد في الطبيعة مزوجاً ببعض المعادن والعناصر اغصانها الرصاص ويها البحر (ست-ست) وزنه الاتومي ٨٧.٥ ونقله النووي ٢٤.٥ || ناقلته الكهربائية ضعيفة . يفكك الماء بالحرارة الطبيعية ويترج مع الكور واليود والكريت . اما اطلاقه الصناعية المختلفة فهي ما يتجمن عن مزيج مختلف الحامض .

١٣٢٢١ - سترينكوس ، سترينكوس

Strychnos جنس نباتات برية وزراعية . من فصيلة الوردانيات انوامه ٦٥ تقسم الى ثلاث فئات . فئة النباتات الصحية ، الطبية ، غير المؤذية . فئة النباتات السامة . وفئة النباتات الجمالية (الكرارية) . معظمها اشجار ونجيرات وسينيات عارضة وبعضها شجيرة || مهداة البلاد الاستوائية . اوراقها معتقة متعاقبة كاملة . ازهارها حلوية التجميع ، ابطية او تاجية الايتكاز . ثمارها كروية الشكل ، برتقالية اللحم ، لحمية اللب ، ليفية القشرة . بذورها تحوي بعض الجواهر الفسالة والمواد الطبية النافعة ، والقلوية السامة كالسترينكين والبروسين والكرار . لحاء اشجارها يستعمل في علاجات الامراض الجلدية . اغصانها تنفع الامراض العصبية || من فئة النباتات غير المؤذية والطبية نخص بالذكر :

سترينكوس ايوبا

S. iboga

S. innocua

S. potatorum

S. spinosa

S. vacouca

S. coeculoides

S. melanocarpa

من فئة النباتات السامة التي تقضي على الجهاز الحوي نخص بالذكر :



سترينكوس القيء



سترينكوس إينياس



سنل ناسك

١٣٢٢٣ - ستلارين (F). *Stelarine (F). Stelario (E).*
مادة دهنية قوامها للكلبيرون وأحد الحوامس المعدنية.
تستخرج خاصة من لحم الحيوانات لا سباعها فحم الامعاء.

سكيتيغ

١٣٢٢٤ - سكيتيغ
السكيتيغ طائر يشبه الببغاء (محيط المحيط).

١٣٢٢٥ - ستير - ستير هو الفلوس ، اطليه .

١٣٢٢٦ - سكيوكة (F). *Schro (F). Sere (E).*
وحدة قياسية مؤلفة من جهاز خاص يستحب متراً مكعباً واحداً من المطب .

١٣٢٢٧ - ستيريس صاير (F). *Satyre circé (F).*
هو الحبان لاسار ، اطليه .

١٣٢٢٨ - ستيرانوس (F). *Scyranus*
جنس فطور مجهرية من عارة الحيوانات فضيلة
الكيميائية . يتميز بكرياته الفارشة الطرف القزمي
الشكل . كئانله طليقة الانكاز سمية التجميع مرارة
اللون || انواحه طليقة جميعا رية تعيش حل المراد البتالية
والفضوية المنحلة .

١٣٢٢٩ - ستيلوسبور (F). *Stilbospora*
جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريديات . انواحه قليلة
العدد والاذى تركب مله بعض الفينيات الحرجية .
يتبين بوضوح الكتيبة المنطقة التي تغلف بوبها من فتحة
ضيقة توضعها بعد اقلت || بوبها اسطوانية -
عروية ، مؤودة ، وباعية الانقسام ، مرارة اللون .

١٣٢٣٠ - ستيروب جينور (F). *Scythrops glanz (F).*

طائر من فصيلة القيقويات ورثة المنطقات ، موطنه
يتمد من ماليزيا الى استراليا || جسمه كبير القند يطول
نحو ٦٥ سم . يسلطه نحو ٩٠ سم . ثوبه الى الكهبة
المزينة بالابيض والاسود . رداؤه الى انقراض الزئي للملح .
متفاده كبير وضلع . حنقه عناية اللون . عينه مطوطة
يجار اسود || اخلاعه حنية لكنه كثير البول والخر .
يمش جماعات قليلة العدد الذي يراوح من ٦ الى ١٢ .
قوته الزرعيات يحل اصدانها متفاده الصلح ثم الزور
والخشرات اصحاب الحيات الانجسة والجراد || طيرانه
طويل الشوط قليل التصعيد والتهبط || الاثني لا تمش
بل تقنع البيضي في امشالين فريدا من الكيلر ولا تقنع
في المش الواحد اكثر من بيضة .

١٣٢٣١ - صج (F). *Enduire (F). To coat (E).*
صج الحائط : سمحه بالطين الرقيق . والحسية هي المشية
التي يطلى بها الجدران وفي المالبات والمسلط والمسلط والمطاط .

١٣٢٣٢ - صجج (F). *Enduit (F). Coating (E).*
الطلاء الرقيق منها كان مصدره وبها كانت غايته .

١٣٢٣٣ - سنجاس (F). *Pleuronectes (F). Pleuronect (E).*
جنس اسماك مجهرية بيوضة من فصيلة جانبيات العمود ورثة
للساكنات || انواحه المروقة عشرة . اصطناعها شطوط البحر

البرتقالي . سؤتها لباني مر الطم . يزودها من ١٠
الى ١٢ لونها الى الكهبة الزرقاء الملوح يملوها زغب طلي
الشكل .

وهذه البزور تحوي : ٥٠٪ من الستريكن
١٠٪ من البروسين .

٥٠٪ من اليرقانين وغيرها ...
ويستدل من المبدولين ان تركيها المضوي يشمل
٤٤٪ من المنور و٦٠٪ من البكتوز .

١٣٢٢٦ - ستريكنوس الغابون (F). *Jboge (S).*
Strychnos du Gabon (F).
نبات صبي جزيل النفع يدهى ليدوغا ، اطليه .

١٣٢٢٧ - ستريكنوس شاليك (F). *Strychnos spinosa (S).*
نوع من الستريكنوز مهدد مفسك . وهو شجرة صغيرة
القد شائكة ، ثمارها برتقالية الشكل والحجم . لبها
ماكول زفير الصمارة السكرية المسحبة الطم . يزودها
قليلة العدد عادمة العناصر الجبلية .

١٣٢٢٨ - ستريكنوس فاكاكوا ، ستريكنوس
مدهغسسكر (F). *Strychnos vacuous (S).*
Strychnos de Madagascar (F).

نوع من الستريكنوز يكثر في مفسك . شجرة متوسطة
القد سرسه . ثماره كروية قطرها نحو ٥ سم . لبها
برتقالي اللون مأكول ، صمارة فزيرة ، لينة ، مسحية
وذكية العرف . يزور ثماره قليلة العدد ، غالية
من العناصر الجبلية غنية بمادة البكتوزين القلوية
لكنها لا تؤذي الجسم البشري .

١٣٢٢٩ - سيكروزا (F). *Neophron (F).*
سكيتل

١٣٢٣٠ - سيك (F). *Néophron (F).*
جنس طير من الكواس ينتمي الى فصيلة القسريات .
انواحه قليلة جميعها كبيرة الجثة تتميز برأس اسيلع وحق
اغفر يسقط طويل وذنب قصير ونسر احين الهرة
الشديدة الانعاف || اشهر انواحه السدل ناسك .

١٣٢٣١ - سكتل لاسك (F). *Neophron pileatus (S).*
Neophron molne (F).

نوع من السدل طوله نحو ٧٢ سم . يسلطه نحو ١٦٠ سم .
ثوبه الى السرة الكنتية . عقه اغفر الريش اغفر اللون .
رأسه اسيلع اخر . منبره اترق . رصاه ونخاله رصاصة .
موطنه البلاد الحارة والمعتدلة . يعيش جماعات . سره
لاقياسي البدن . ياتل عرواها للذن والمارك || قوته
الجيف وقامة للذن . انشاء تبيض ثلاث يضاها تحضها
بمنوبة الذكر نحو ٤ اسابيع .

١٣٢٣٢ - سكتشور (F). *Mycetes (S).*
Stenor, Hurleur, Singe hurleur (F). Howler,
Howling monkey (E).

جنس قرود امريكية من فصيلة السبوسيات . انواحه
سنة موطنها غابات البرازيل والباراغواي والفاتيالا .
اجسامها ربة ، ورويسها غليظة . اسطفاها بأزوة
على ذكورها كثيفة الشعر الطويل . اذنانها مسطبة
اعانة . انواها سوية الاثني يكثر فيها الاسمر || قوتها
البرام والازمار والاوراق والثمار . اناتها تقنع جرواً
واحداً .



سنتور، زباط



ستيلسبون



سروب جبار

Combustile

١٣٢٥٤ - سَجُور ء سَجُور

هي الرقود من اي نوع كانت .

Decline

١٣٢٥٥ - سَجِين

نمت تفرفي يطلق على كل نبات لاقياي الانظام الزمري .

Marne calcaire (F).

١٣٢٥٦ - سَجِين

Calcareous marl (E).

تراب كثر في تبة المواد الجصية من كربونات الكلس مع بعض الصلصال والقليل من الرمل والمواد العضوية .

Engraissement (F).

١٣٢٥٧ - سَح ء سَحُوح

Fattening (E).

هو تسمين للماشية . يقال سمح البقرة والشاة اذا سميت غاية السن . فهي صالح وساحة ج صالح وصالح .

Cachrys (S).

١٣٢٥٨ - سَحَاء

Cachryde (F). Cachrys (E).

جنس نباتات عشية ممررة برية من فصيلة النسيات . انواعه المروفة قليلة المدد منها في بعض مناطق الشرق الاذق وآسيا الصغرى والشمالية || سورها منتصب خلية الساء ء قليلة الفروع او كثيرتها بالنسبة الى النوع . اوراقها ضخمة اتصال المستطيلة ، كثيفة الحمل والزغب . انزهارها صيولي التجميع . انزهارها صفراء اللون . تنويرها ربيعي .

١٣٢٥٩ - سَحَاء

هو الزباد ليات عشية طبي شمري يجرس انزهاره النحل .

Nuage (F). Cloud (E).

١٣٢٦٠ - سَحَاب

هو الغيم كان فيه ماء او لم يكن فيه . راجع غيم .

Synotus (S). Synota (F).

١٣٢٦١ - سَحَاءة *

جنس حيوان من فصيلة الحفشيات له ثومان يتميزان بأذانها المسترفة المنحطة فوق الجبهة . مناعيرها جوية تظهر عند قلم القروطة . اذانها مستطيلة . موطنها فصح الارباء يشل بعض مناطق اسية واروبه وافريقية لسماء الكسول وتقسم الاكبر من امريكا الشمالية والجنوبية لسماء الامريكية . ج سحا .

١٣٢٦٢ - سَحَاءة كَسُول *

Synotus barbastellus (S). Synote barbastelle, Barbastelle (F).

نوع من السحاً موطنها فصح الارباء يمتد من الهند وبلاد فارس الى الشرق ، الاذق واروبه وافريقية الشمالية . فويها الى الزبدة السمرام يديق مع اقترابه من شبح الظهور . وبرها اسود القاعدة اصعب الطرف . جسمها ربيع قصير طوله نحو ٩ سم ، اما بسطه فهو ٢٧ سم ، والذنب ٥ سم . تعيش منفردة . ذكورها لا تقرب انثاهي الا في زين الكوم . الانثى تقص جروين تحملها حتى القمام . طيراتها بليء تألف جميع الاكابر لا تبث اسيراً واحداً في محل واحد . وهي لا تغش المطر والزاوي . مسرعا يعدم من الغروب الى فحة الليل ومن القمر العميق الى البروز . قوتها الحوام والذباب والحشرات .

Air, atmosphère (F). سَحَاك ء سَحَاك

Air, Atmosphere (E).

هو الهواء والجو . « حلق النسر في السكاك » .

الايض المتوسط والحيط . الاطلسي والهادي والعتدي || اجسامها بيضية او اعليجية الشكل ، مطقة الجرم . اطولها تراوح من ٣٠ الى ٩٠ سم . رؤوسها صغيرة ، مستوية الاصلام . زعانفها الظهرية والشرجية لاسفة متصل بالبالية || عيونها جيدة الصنف ء لذينة العلم .

١٣٢٤٤ - سَجَاس مُؤَدَّر * ء حَوَاسِم ء أُم

Pleuronectes zebra, Solea الزَّرْد

zebra (S). Pleuronecte zèbre, Synapture zébré (F). Striped Pleuronect (E).

سمكة من السجاس . اعطانها بحار البلاد الحارة والبحر الايض المتوسط || جسمها اعليجي الشكل بطول من ٣٠ الى ٤٥ سم . خضاب قريبا يختلف بين اليمن واليسار . الجانب الايمن اغمبر اللون ، يعقو تأخير شديد السمرة يمتد كالاطواق من الخطر الى طرف الذيل . الجانب الايسر الى الشبهه التبراه || رأسها صغير الجرم ء مستدير الخط . اسنانها صغيرة ، ذرية . عيناها صغيرتان ء لامتساويتان ، يميئتا الاركاناز . زعانفها الظهرية والشرجية متصلة بالبالية || عيناها جيد الصنف ء مأكول .

١٣٢٤٥ - سَجَاف (F). Diaphragm (E).

حجاب حاجز يستعمل لتحديد فوطة النور في آلة التصوير واشباهها .

١٣٢٤٦ - سَجَّه البَن الكثير الماء وهو ارق ما يكون .

١٣٢٤٧ - سَجَر سَجَر سميرت البقرة : حنت عند حلبها .

١٣٢٤٨ - سَجَرِيَّيَّ هو الاريجوان ء اطليه .

١٣٢٤٩ - سَجَسَج Terre moyennement compacta (F). Fairly compact soil (E).

الارض ليست بصلبة ولا سله ء اي المتوسطه الانتماج .

١٣٢٥٠ - سَجَج Roucoulement (F). Cooling (E). صوت القمري .

١٣٢٥١ - سَجَل Mamelle volumineuse (F). Voluminous udder (E).

السجل : الفرع العظيم . بقرة بحلاء : عظيمة الفرع . وضرع بحيل واجيل : متدل واسع .

١٣٢٥٢ - سَجَل عَقَارِي Registre foncier, Livre foncier (F). Register landed (E).

هو السجل الزمعي الصادر عن الدوائر العقارية بين المنطقة ورق العقار وصاحته واسم المالك وطريقة استلاكه والحقوق المبينة للنسبة على العقار . ومن خصائص هذا السجل ان قيوده منشئة الحقوق التي تشير اليها .

١٣٢٥٣ - سَجَلَاط * Nyctanthes (S). Nyctanthe (F). Arabian jasmine (E). Nachtblume (D). Nictanto, Gelsomino d'Egitto (I).

جنس نباتات جنينية فناء من سبط الياضييات وفصيلة الزيتونيات . منها في البلاد الحارة . اوراقها متعاقبة ء بيضية او اعليجية النصل . انزهارها صيولي التجميع محورية وتابية الاركاناز ء جميلة الشكل ء قلبية او قينية اللون . تفتتح عند غروب الشمس من حرف ذكي اخاذ وتعلق مع انبلاج القمر .



سجاس مؤدّر



سجلاط



سحاة



سحاة كسول

Lima (S).

Lime (F). Lima (E).



سحار

* سحابة ١٢٢٧٤

Aérobiose (F).

* سحابة ١٢٢٦٤

حياة الكائنات السحابة (الهوائية).

* سحابة ١٢٢٦٥ هوائية، إيروبي

Aérobique (F). Aerobic (E).

نمت ترميفي يطلق على جميع الاحياء الجهرية التي لا تستطيع الحياة والتكاثر بعيداً عن الهواء.

* سحابة ١٢٢٦٦ هوائية، إيروبيك

Aérobic (F). Aerobe (E).

صفة الكائنات الجهرية الحية التي لا تستطيع البش منقطعة عن الهواء.

Varanidae (S).

Varanides (F). Varanidae (E).

* سحابة ١٢٢٧٥

اسم شامل يطلق على بعض اجناس الورل. تتميز باستطاعة اجسامها وبالسباحة المشوقة الزرية. انواها زائجة الاوان تاق الوسط الذي تعيش فيه.



سحاف الزرين

Limidae (S).

Limides (F). Limidae (E).

* سحابة ١٢٢٧٦

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات فصليات الخياشيم، عادات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة البند. معظمها من متحمرات الاباح الثاني. الانواع القليلة المعاصرة منتشرة في جميع بحار العالم. تتميز باسنادها الشعاعية المتخدي، يكثر فيها الشكل القروطي. اعرف اجناسها واشهرها السحابة.

Cerbers (S).

Cerbère, Manglier latex (F). Indian mango tree (E). Ostindischer mangosbaum (D). Cerbers (I).

* سحام ١٢٢٧٧

جس حيوان داحية هربية كبيرة لثد من فصيلة الفليات. انواها قليلة اوراثها معتقة متناوية الطليعية اصلها جلدي للنج عائق اخضر. ازواجها يقصر او وردية ثمارها يضيء الشكل ولثد، وسيدة السمكة الكبيرة السلية. وهذه الاجزاء جميع اجزائها من اساق ال الورقة والثررة خزررة المعصرة الجعالية الميتة.



سحابة

Puccinia

* سحام ١٢٢٧٨

جس فطور مجهرية من فصيلة السعيمات تتميز بلحامات الدائرية الشكل التي تغلب فيها الاستدارة والقصانة. مشبه القطري يعيش ويتكاثر على خلايا النج نباتية. فاعله شاملة ميتة او متفاداة مرصوة التجميع. انواها المؤدية المعروفة عديدة اشهرها ما يتبع.



سحام

* سحام أسف ١٢٢٧٩

Puccinia tritici (S).

Rouille brune du blé, R. b. du froment (F). Orange leaf rust (E). Braunrost des weizens (D).

* سحام أسف

فطر مجهرى شديد الاذى يصيب الزرع في جميع ارضاه فينفص الانتاج ويبدل الصف اذ يفقده بعض المواد الغذائية. مظهر الحاربي بطور قرحية ميتة، لانظمية، مستورة الشكل قطريا يراوح من ٢ الى ١٥ سم. تركب النصل على صفحتيه ولا تمتف من البند والساق وصفيات السابل. تلو صلية اللون، براقية الاطراف، ثم تنحرف الى الخزوة فالسفرة. تنحرف عن خيرات بوقية شديدة النضية لونها الى السفة تتطير كالمباب. يكافح باستعمال الكبريت الميكروني او احد الفطريات الزراعية المؤثرة على الكبريت والملاح التماس.



سحام أسف

* سحابة ١٢٢٧١ Dumping (F). Dumping (E).

السحابة عمل اقتصادي تمارسه بعض البلاد على حمل صادراتها او على انواع مينة منها تعرضها في الاسواق انجازية يسر اذى من السمر الحلي حق واذق من ثمن التكلفة.

* سحابة ١٢٢٧٢ Pécule (F). Peculium (E).

المقرر من السمل. وما اكتسبه وقته لنفسه المرووس. وما قرر لنفسه السجين او الاسير طيل مدة عقوبته او امره.

Ecale (F). Shell (E).

* سحابة ١٢٢٧٣

هي قشر ابر والظهير ونحوه.

١٣٢٨٥ - سُحَامُ الزَّرْع * ، مَرَقَ الزَّرْع *

Puccinia graminis (S). Rouille noire, Rouille linéaire des céréales (F). Stem rust of grain (E). Schwarzrost (D).

فطر مجهرى يصيب أكثر النباتات النجيلية وأخصها الزرع فيعطب الصف والسايل ويلحق الضرر بالخصب. مظهره الخارجي بثور قرحية تملأ نصال الصف فتبدو صفيرة مستديرة ثم تكبر وتتسطل حتى تبلغ ١٢ م. لوها يكون إلى الشفرة المائقة ثم ينحرف نحو السرة عند ارتفاع بشرة النسيج التي يعقبها التغير ويسطوح النبات البويي || وقد يركب الزيدات والسيليات فيسطعها ببقوده وقروحه الخيطية التي تنتهي نهاية بثور الصف. أضراره قد تكون حسيمة فإ لو مكنته العوامل الجوية من سرعة الانتشار || مكافحته صعبة تستوجب الكثير من العناية. || يكافح :

أولاً - باستعمال الفطوب المعروفة بقوة مناعها والتي صار اختيارها اقليمياً في هذا السيل أو الفطوب الباكورية كالفلورنس أورود (Florence aurore) الذي صار اختياراً في لبنان وهو يقاوم هذا الوبس لأنه يدرك باكراً قبل انتشار السحام.

ثانياً - باجتنب الاكثار من عنصر الاوزون لانه ينشط المواد الباقية والخضرية ويغير الإدراك فيمرض الزرع إلى الإصابة.

ثالثاً - باستعمال الكبريت الميكروني تمهيداً على الزرع عند ظهور الوبس. وهناك فطوبر اخرى عديدة يمكن استعمالها لكنها باهظة الثمن.

رابعاً - بالقضاء على جميع نباتات البربريس (الأثرارة) القريبة والبيدة من الحقل لأنها الوجج للنابت والبؤرة الحقيقية التي يعيش فيها عليها السحام.

١٣٢٨٦ - سُحَامُ الزَّرْع الأصفر * ، مَرَقَ الصَّفَر *

Puccinia glumarum, *P. rubro-vera* (S). Rouille jaune des céréales (F). Yellow rust of wheat (E). Gelbrost (D).

فطر مجهرى شديد الاذى يصيب الزرع في جميع أصفاه وعلى اختلاف انواعه وضروبه || مظهره الخارجي يتتابع على ثلاث مراحل. في الاول بثور صفر صغيرة القد متصقة متتابعة على شكل الخيطي تركب النصل في زامة الاخير بمروازة عروية. وقد يبلغ امتدادها من ٢ إلى ٣ سم. ويعد عيوطها المتوازية من الثلاثة إلى الستة. وفي المرحلة الثانية اصفرار على نصل الصف ينتج في الزام الاخير على شكل قند متقطعة متوازية تحمل في جوفها بؤع السحام الاصفر اثرأهي. وفي المرحلة الثالثة بثور حسيمة الشكل رائحة تركب الصف بدون انتظام وتصيب السرق والاعقاد والسايل. صفرتها فائقة ذعية اللواج || يكافح بالكبريت الميكروني تمهيداً على الزرع منذ المرحلة الاولى. كما يحسن تلف جميع النباتات الطرية وذلك باستعمال المبيدات الخاصة. ومن المستحسن ايضاً سرق الحقل على أثر الحصاد.

١٣٢٨٧ - سُحَامُ السَّيْسَم *

Puccinia antirrhini (S). Rouille du muflier (F). فطر مجهرى واسع الانتشار يتطفل على السيم فيعطب الاوراق ويضعف النبات وقد يجب موته || مظهره الخارجي بثور صفيرة مستديرة حطية اللون شقراء الاطوار فتحيه التجميع تملأ نصال الاوراق على صفحاتها السفلى

١٣٢٨٠ - سُحَامُ التَّرْتُشُول *

Puccinia helianthi (S). Rouille du tournesol (F). Sunflower rust (E).

فطر مجهرى واسع الانتشار يتطفل على مختلف انواع وضروب الترتشول. يركب الاوراق فيؤذيها وقد يصيب بنجاحها ويسوقها الباكر. مظهره الخارجي بثور صفيرة مستديرة لاقليمية التجميع والارتكاز لوها إلى الصهبة المائقة تركب النصل على صفحة السفلى تصطب التسج وترتقل اللسع وتصبب الصفب وفلة انتاج البذر || يكافح باستعمال الادوية الفطورية اخصها المركزة على عنصر الكبريت والنحاس.

١٣٢٨١ - سُحَامُ التَّرْتُشُول * ، مَرَقَ القُطْبِيَان *

Puccinia bromina (S). Rouille des bromes (F). Bromus rust (E).

فطر مجهرى يتطفل على جميع انواع وضروب الترتشول وهو كثير الانتشار في اوردبه وافرقيته القليلة || مظهره الخارجي بثور قرحية ميمرة او متاخية تملأ النصل على صفحة العليا فتبدو صهباء اللون وردية الاطوار الضيق ثم تنحرف إلى الجؤوة ويبقى عليها حتى تنجبرها || يكافح عند الاقتضاء مكافحة غيره من السحام.

١٣٢٨٢ - سُحَامُ الثُّوم * ، مَرَقَ الثُّوم *

Puccinia alli (S). Rouille de l'ail (F). Garlic rust (E).

فطر مجهرى يتطفل على بعض نباتات الفصيلة الزنبقية وأخصها الثوم والكراث فيركب الاوراق دون ان يقع بها الاضرار. مظهره الخارجي بثور لوها إلى الصهبة، مصغرها ذائغ القطر تملأ نصل الاوراق بدون انتظام ولا قياس ثم تنحرف تدريجياً نحو الجؤوة البفسجية وتستقر عليها حتى تنجبرها || أضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة.

١٣٢٨٣ - سُحَامُ الخَبَازِيَات *

Puccinia malvacarum (S). Rouille des malvacées (F). Hollyhock rust (E). Malvenrost (D).

فطر مجهرى يصيب أكثر الخبازيات في اورتاقها وسوقها وزادها فيعطبها ويلبها || مظهره الخارجي بثور صفيرة تركب الاوراق على صفحاتها السفلى وتركب السرق وكثر في الزهر. تبدو برتقالية اللون يحيطها اطوار كتشجي ثم تنحرف إلى الجؤوة السمراء حيث ترغف كاللعال دون ان تغير البشرة. وبهد ذلك ياربية او حسة اسابيع تظهر ذائغ القطر على التنايل فتبدو حطية اللون ثم تتحول إلى حطية فضية يعلوها سراج ايض. يكافح باستعمال اوكسيكلورير النحاس المخلول ١/١ عند ظهور القطر وينبض مرة ثانية موحداً بعد الاول ياسيومين || وبهم من استعمل رينفانتات ليرتاس وهي مقلية اذا امتصت في يده الامر ولكنها تصعب عدية النفع عند ظهور الممانع.

١٣٢٨٤ - سُحَامُ الدُّوْر * ، مَرَقَ الدُّوْر *

Puccinia maydis, *Aecidium oxalidis* (S). Rouille du maïs (F). Maize rust (E).

فطر مجهرى يتطفل على الذرة في جميع البلاد والاتاق. أنيداته تموش على الخاض وسها تنقل إلى الذرة. وهو على صف الذرة ذائغ ميمرة كثيفة التجميع تركب النصل على صفحته بمروازة الشلل فيبدو التسج للنحار قليل الخصب اشقر البثور المتوجة بالاصفر ثم ينحرف لوها إلى الاصهب فالخضلي المايق || أضراره غالباً معدودة لا تستوجب المعالجة.



سحام الترتشول



سحام الترتشول



سحام الثوم



سحام الخبازيات



سحام الذرة



سحام الزرع



سحام الزرع الاصفر



سحام السيم

سُحَام الشَّعِير - سُحَام قَصَب السَّكَّر



سحام الشعير



سحام النشوان



سحام الكرز



سحام الكرزاتيم



سحام الحليون



سحام النشع



سحام قصب السكر



سحام الهندباء

السفل قصب جفاف النسيج وانصل || وهو على السوق بدور ميمرة قليلة المدد لها الى الصبغة العائقة الحطية للواج || يكافح ويقطع الاوراق المصابة وينضغ قنبات يساقط بورود الحبوب ١٪

١٣٢٩٣ - سُحَام الْكُشْمِيَّة

Puccinia ribis (S). Rouille du grossillier (F).
فطر مجهرى يتطفل على الكشمش يؤذيها وقد يميت .
مظهره الخارجي يقع نسيجه تركب نصل الاوراق النامية فتلويها . تبدو شقراء القين ثم تنصرف الى السرة الزاحية وتنتهي بيباس النسيج المنحارة التي يتبعها يباس النصل وضعت الشجرة || يكافح باستعمال احد البوتاسل الملوكلية المحلوة ١٪ نصفاً على الكشمش قبل ازهاره .

١٣٢٩٤ - سُحَام النَّعْنَع

Puccinia menthae (S). Rouille des menthes (F).
فطر مجهرى يتطفل على بعض الشفويات اعصها النعنع .
مظهره الخارجي بدور صغيرة مهاد القين تركب الاوراق على صفحتها السفلى وتتلو الجذابر والنازيب فتعزل سير النعنع وتسبب ذبول الاوراق وسقوطها بعد ان تبين الزواي وتخلو دون سيات نفاشها || يكافح بانتلاخ وحرق النباتات المصابة قبل تقضي الصوم . بين المسحون مد النعنع بالازوت النيتريكي الذي ينشغ على مقاومة هذا الفطر .

١٣٢٩٥ - سُحَام الْحَلِيَّة

Puccinia asparagi (S). Rouille de l'asperge (F). Asparagus rust (F). Spargelrost (D).
فطر مجهرى يتطفل على سوق الحليون فيطبعها ويؤذيها .
مظهره الخارجي بدور قمية الشكل ردية القين تلو السوق ميمرة بدون انتظام فتعزل على النسيج وتضرر النبات .
يكافح باستعمال عدة وسائل اولها سائل بورود نصفاً على النبات . ثانياً الكبريت تمعيراً على التربة والنبات . ثالثاً وينتر كركاز بلات امسدا . وايها زوج الضروب المنية التي تقاوم هذا الفطر .

١٣٢٩٦ - سُحَام الْحَنْدَبَاء

Puccinia elchorti (S). Rouille des chichorées (F).
فطر مجهرى يتطفل على اختلاف انواع وضروب الهندباء فيصيب الاوراق ويصبها || مظهره الخارجي بدور ميمرة مستديرة لها الى الصبغة تلو النصل على صفحته السفلى تضطيه وتعزل نحو النبات || يكافح باستعمال سائل بورود المحلول من ٥٠ الى ١٪ حين ظهور المراض .

١٣٢٩٧ - سُحَام قُرْمُزِي ، مَرَق قُرْمُزِي

Puccinia purpurea (S). Rouille du sorgho (F).
فطر مجهرى يتطفل على القمح البيضاء ويؤذيها وينضغ انتاجها || مظهره الخارجي يقع نسيجه قمرزية القين تلو النصف واعماه تضطيه ونحوه الى نحو النبات بعد ان تعزل سير نسه || يكافح مكافحة غيره من السحام .

١٣٢٩٨ - سُحَام قَصَب السَّكَّر ، مَرَقَةُ الْمَنَاء

Puccinia kuehni, *Uromyces kuehni* (S). Rouille de la canne à sucre (F).
فطر مجهرى يصيب قصب السكر الذي ان يؤذيها يصيب له حطياً يذكر || مظهره الخارجي يقع مستطيلة او مردنية الشكل ميمرة بدون انتظام قليلة المدد تركب

تسبب تعجير بشرة النسيج وصلب الاوراق الذي يبعه سقم النبات وبذوله || يكافح باستعمال الكبريت الميكروني تمعيراً على النبات منذ ظهور الفطر على ان تباد الملية من المراتين الى الثلاث مرات . ومنهم من ينصح باستعمال سلقور البوتاسيوم المحلول ٥٠٨ ٪

١٣٢٩٨ - سُحَام الشَّعِير ، مَرَق الشَّعِير

Puccinia hordei, *P. anomala* (S). Rouille naine de l'orge (F). Barley rust (E).
فطر مجهرى يتطفل على الشعير يؤذيها ويخفف من مقدوره الانتاجي ومن صفاته المشدودة في صناعة البيرة .
مظهره الخارجي بدور صغيرة تلو نصل المصفاة عند خب الزرع وتكون بدرة واحدة على النصل الواحد . تبدو بياض القين ثم تنصرف نحو البرقنقالي وتنتهي عند انفجارها بالون الاصهب الاخر || يكافح مكافحة غيره من السحام .

١٣٢٩٩ - سُحَام الشُّوْثَان ، مَرَق الشُّوْثَان

Puccinia coronata, *P. coronifera*, *P. helii* (S). Rouille couronnée de l'avoine (F). Crown rust of oats (E). Kronen rost des hafers (D).
فطر مجهرى يتطفل على الشوفان وصل بعض النسيجات البرية .
أثباته تعيش على التبقبات والخلافات .
تظهر خلال شهر حزيران فيسود يقع ممراسة صفر او حر مستديرة صغيرة على صفحة النصل السفلى يقابلها على الصفحة العليا انتفاعات في النسيج والبشرة لها الى الجروة || وهو على عصص الشوفان ضائع ميمرة بدون انتظام تركب النصل ولحمه على صفحتها خبثو يقع مستديرة ومستطيلة ميمرة وممراسة كالملة لها الى الصبغة الزاحية ثم تنصرف الى الجروة وتنتهي بالون البنفسجي الباق || يكافح مكافحة غيره من السحام بعد القضاء على دوجه الطبيعي للبق أو الخلف .

١٣٢٩٠ - سُحَام الْقَصَاب

Puccinia viciae (S). Rouille de la pervenche (F).
فطر مجهرى يركب مختلف انواع القصاب يؤذيها وقد يقضي عليها || مظهره الخارجي بدور مستديرة كيفية التجميع تركب الاوراق على صفحتها السفلى وتصبب السوق والفروع . تبدو مهاد القين ثم تنصرف نحو الحطية حيث تضجر من بوغ هياي اخر || اما الاوراق المصابة فتبني صغيرة القند رافعة النصل الخشن المهاد الحولية || يكافح عند ظهور البوم يستعمل سائل بورود المحلول ١٪

١٣٢٩١ - سُحَام الْكَرْك ، مَرَق الْكَرْك

Puccinia cerastii, *P. pruni-spinosae* (S). Rouille du cerastier, R. du pêcher (F). Rust (E). Zwetschenrost (D).
فطر مجهرى يصيب الكرك والدراتي والوجع يؤذي بعض اوراقها دون ان يقع بها اضراراً تذكر || مظهره الخارجي يقع صفر تركب النصل على صفحته السفلى ويقابلها على الصفحة العليا موج اخر او بنفسجي يدوم بعض الوقت الى ان تنفجر البثرة من بوغ هياي اصهب القين .

١٣٢٩٢ - سُحَام الْكَرْزَاتِيم

Puccinia chrysanthemi (S). Rouille du chrysanthème (F).
فطر مجهرى يصيب الكرزاتيم في اوراقها وسوقها يؤذيها .
مظهره الخارجي بدور صغيرة مستديرة ميمرة قليلة المدد لها الى الصبغة الزاحية تركب الاوراق على صفحتها

تتركب من ١١ فصلة . اتحادها لاسفة . جرامها نشطة .
أرسافها ثلاثة المقل || أشهر أجناسها السحبل والسهبلة .

Traffic Illicite (F). ١٣٢٠٤ - سَحْتٌ

Illicit traffic (E).
السحت والسحت الرقاعة المحظورة أو ما سقت من
مكاسب عمرة .

Bourgeon à fleurs (F). ١٣٢٠٥ - مَسْعَنَةٌ

Blossoms bud (E).
الاية القلطة في النمن .

Abrasion (F). ١٣٢٠٦ - مَسْجٌ

Abrasion, Attrition (E).
السج الاستهلاك بالاحتكاك المستمر كسج الأسنان
في اللث وكسج مياه البحر لصخور الجراح .

Traumatisme (F). ١٣٢٠٧ - مَسْجٌ ، مَسْجَةٌ

Traumatism (E).
الآثر الذي يحدث من غشش أو جرح . ج مسج ومسجوج .

Broyage (F). Crushing (E). ١٣٢٠٨ - مَسْحٌ

دق الشيء اشد الدق .

Pécune (F). ١٣٢٠٩ - مَسْحَلٌ ، نَقْدٌ

السحل النقد من الدراهم .

Chaetodon (S). ١٣٣١٠ - مَسْحَلٌ

Chétodon, Poisson papillon, Demoiselle, Bandoulière (F). Butterfly fish (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات . أنواعه مدينة

جميعها صغيرة القد ، قصيرة ، مبطلة ، عرشها يوازي
ثلاثة أرباع طولها . ألوانها جميلة مزججة عليها
تجذيع ممتدس متقابل وزرقة هبة لامة || محيطها
بحار الحارة . أنواعها المبرودة في المتوسط
ثلاثة .

Chaetodon saxatilis (S). محل الصخور ، تتقوت

Chétodon saxatilis (F).

Chaetodon argenteus (S). محل فضي

Chétodon argente (F).

Chaetodon maculosus (S). حورية البحر .

Chétodon maculé (F).

Salap ١٣٣١١ - مَسْحَلَبٌ

مادة نشوية تستخرج من بعض أنواع السحلب الزراعي .

١٣٣١٢ - مَسْحَلَبٌ ، عَصَى التَعْلَبِ ، عَصَى

الكتب ، قاتل أخيه ، سَلْطُورِيُونُ

Orchis (S). Orchis, Barbène, Sazyron, Salap (F).

Orchis, Lizard orchis (E). Bockersamenzunge (D).

Orehide, Satirione, Testicolo di cane (I).

جنس اشباب عشقولة معمرة من فصيلة السحليات .

أنواعه للمروفة نحو ٨٠ معظمها بري وبهشها زراعي

وتربسي . يستخرج من ساقها بعض أنواعه مادة نشوية

يبيعها بطبخ كالحليب ويؤكل || أعرف أنواعه

واشهرها :

سحلب أبيض

Orchis maculée

سحلب أناتولي

Orchis d'Anatolie

نصل المصف . تبو حطية ألون عملة جملة شبة
تبنية ثم تنحرف نحو السرة وتبقى على سبيلها حتى انفجارها .

١٣٢٩٩ - سُحَامٌ مُشْتَاتٌ ، مَرَقٌ الشَيْتَمُ

Puccin dispersa (S). Rouille brune du seigle (F).

فطر مجعري يتطفل على الشيلم فيزديه .

مظهره الخارجي

يتوار قرحية ممتدة بدون انتظام تركب النصل على

صفحته وتعييب الاتحاد والوق وصيفات السنايل .

تبو مستدرة صغيرة لونها ال الصبة ثم تكبر وتفتش

فينحرف لونها الى الجوزة وتغير من بوع هبابي لونه

الى الجوزة السراء || يكاثف كثيره من السهام .

١٣٣٠٠ - سُحَامِيَّاتٌ

Pucciniaceae (S). Pucciniaceae (F).

فصيلة فطور مجعريه من رتبة النعاميات تتميز بطايلها

اللاقمية التركيب والانتظام || دعاماتها فردية أو

مدينة الاثنية . يورثاتها فردية أو شعبة الانقسام عملة

على أحيات (ركائز) شاذلة غروية أو ملونة جميلة

وسرمة السطح ، ذينها حاضرة جميع الأحيات كتيها

كانت || أجناسها مدينة . أشهرها زراعيًا واقتصاديًا

الثانية التالية : السهام ، الشبول ، الصدنية ، الصنعة ،

الضبة ، الظفرة ، الكشورة والمسيلية .

١٣٣٠١ - سَحْبُ المُوَافَقَةِ

Retrait d'agrément (F). Right of consent (E).

عمل يميزه القانون يقضي بالماله الموافقة المنفق عليها .

١٣٣٠٢ - مَسْحِيلٌ قِرْمِزِيٌّ

Endomychus coccineus (S). Coccinella scarlate (F).

Endomychus coccineus (E).

حشرة دامة من فصيلة السحليات ودية مملسات الاجنحة .

تألف الغابات والأحراج ، عناقضها ويرقاتها تعيش على

الفطور وامشاجها وعلى المواد النباتية المنسلة || جسمها

صغير القد بطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها الى الحمرة

القرنزية يملوها في وسط كرسها بقية سوداء ويملونها في

ظهرها اربع بقع سود ، بقعتان في كل ثمد . رأسها

مستدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها مستطيلان ،

صغرا الاطراف . ظهرها ضيق المؤخر المستدير اللامع .

خدهاا محزرتان ، كتيها النحل . أرسافها ثلاثية المقل ||

جا مل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجلجلة في أوائل

أيار وتعيش سن اواخر تموز . تروح في النهار وتسكن

في الليل || البرقة عنه بلونها الكمال الجسموري تطول نحو

٨ م . جسمها سحكي التركيب ، قليل التقويس ، سداسي

الزواجب ، اسير اللون ، جزوي الرأس ، كتيها الزنب ،

سيدر الخبل || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة

اسباع يتقضي تحت قشور الانجار المائلة ضمن صلجة

متأسكة الفشاء المركب من مواد نباتية مجعرة بالريال .

١٣٣٠٣ - مَسْحِيلِيَّاتٌ

Endomychidae (S). Endomychidae (F).

فصيلة حشرات دامة من رتبة حشرات الاجنحة . أجناسها

وانواعها المبرودة قليلة العدد مهنها البلاد الممتدة الحرارة .

تألف الموامق المسوية الرطوية حيث تتكاثر الفطور التي

تعيش عليها || جميعها صغيرة القد ، اهليلجية الشكل

تحتل المركز الوسطي بين القرنبيات والدمصقيات . رؤوسها

مستعرفة . زباناها مستطلة الطول ، صغرا الاطراف .



سحام مشتات



سحبل قرمزي



مسحل



مسحلب



سحلية

عينها صغرتان تلحفها اجفان شفاقة متحركة. اذا ما خافتا انشأ الصوري الاخير الغلاف. عنها متوصلة الطول والشفاة. جلدها متتابع التماثيل الدقيقة. ذنبا سريع الطول والانقسام. قريبا الى الصهبة الجوزية المنشة يملؤها موج الحمل ابيض ينسجم مع الحيطان والخجارة التي تكثر من المكوث عليها. ياتها الشوي يستمر من ١٢ الى ١٥ اسبوعا. تحسر قنارها بده غروبها من ياتها باسبوع وتنفد به ذلك باسبوع. الاثني تبين من ٦ الى ١٢ شفة تطورها في الربل او في المراتع الجنوبية المرض النافذة. تسرح في النهار وتتسلق السطح السموية. قتها الحشرات الصغيرة والديدان والذباب والحوم. تتجر من الزحافات النافعة.

١٣٢١٩ - سحلية خضراء * ، سحلية خضراء ،

عقابة خضراء (S). Lacerta viridis (S).
Lézard vert (F). Green lizard (E).

حيوان يبيض من الشتاء وفضيلة السقايات. موته البلاد المعتدلة الحرارة. جسمها يطول من ٢٢ الى ٢٦ سم. الاثني اكبر قدما من الذكر. رأسها عراقي الثورن. عيناها لوزيتان تلحفها اجفان شفاقة متحركة. اذا ما خافتا انشأ الصوري الثاني الغلاف. عنها متوصلة الطول والشفاة. اصابعها دقيقة مزودة بالظاير حادة. جلدها متتابع التماثيل الدقيقة. ذنبا سريع الطول. قريبا اخضر اللون. اسفح الموج، تملوه بقعة رمادية زيتية تنتهي عند قاعدة الذنب. الذكر يميز بزدها اللون ويلزق انفسه. ياتها الشوي يستمر من ١٢ الى ١٥ اسبوعا. والاثني تبين من ٨ الى ١٦ شفة تطورها في الجناة والديال. تألف المروج والاماكن الرملية. تسرح في التبان الاثني برفقة الذكر ويثبت معه في جسر راسه. قتها الحشرات والديدان والذباب والحوم. تتجر من الزحافات النافعة.



سحلية الخيطان



سحلية خضراء

١٣٢٢٠ - سحلية رشيقة * ، سحلية رشيقة ،

عقابة رشيقة (S). Lacerta agilis (S).
Lézard agile, Lézard des souches (F). Agile lizard (E).

حيوان يبيض من الشتاء وفضيلة السقايات. موته البلاد المعتدلة الحرارة. الاثني اكبر قدما من الذكر. جسمها يطول من ١٨ الى ٢١ سم. رأسها عراقي الثورن. عيناها صغرتان ملموستان بابها شفاقة متحركة. اذا ما خافتا انشأ الصوري. عنها متوصلة الطول والشفاة. جلدها متتابع التماثيل الدقيقة. ذنبا سريع الطول والانقسام. قريبا الى الصهبة البسراء المنشة بالاسود والابيض. ياتها الشوي يستمر نحو اربعة اشهر. الاثني تقطع من ٦ الى ١٢ شفة تطورها في الديال. تألف السمراء والورع حل السواء. تسرح في النهار. حبرها حيث ترتد في الليل تفق ستليل فتلده تحت جلوح الانجار المسطحة على التربة. قتها الحشرات الصغيرة والديدان والذباب والحوم. تتجر من الزحافات النافعة الملية.



سحلية رشيقة

١٣٢٢١ - سحلية وكود * ، سحلية وكود ،

عقابة وكود (S). Lacerta vivipara (S).
Lézard vivipara (F). Viviparous lizard (E).

حيوان سريو من الشتاء وفضيلة السقايات. موته البلاد المعتدلة الحرارة. جسمها يطول من ١٥ الى ٢٢ سم. الاثني اكبر قدما من الذكر. رأسها عراقي الثورن. عيناها



سحلية وكود

Orchis de Gallée	سحلب جبلي
Orchis melle	سحلب ذكر
Orchis à larges feuilles	سحلب عريض الورق
Orchis papilionacée	سحلب فراشي
Orchis des marais	سحلب متقي

١٣٢١٢ - سحليات ، سحليات

Orchidaceae (S). Orchidacées, Orchidées (F).
Orchidaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة. منبتها الاعالي الحارة. انواعها المعروفة نحو ٢٥٠٠٠ تضم الى ٩٥٠ جنسا جميعا خمسة اسباط: البايوجيات والجيوتيايات والماجيبات والسحاب والونيليات. جميعها ثنائية السائل، قرصية السوق، مستطيلة الارزاق الكاملة. ازهارها متباين الاشكال. ازهارها جميلة الالوان الزاهية، بعضها صوري الترف الفواح وبعضها حديد لا عرف له او كرية الزاهية.

١٣٢١٤ - سحلياتية * ، خراس * ، خراس

Aceris (S). Aceris, Homme pendu (F).

جنس نباتات صقلية من فصيلة السحليات. انواعها المعروفة ٧ اصنافا تمتد من الهند الشرقية الى اوروبا الوسطى والجنوبية الى اورقها غطية، مزابية، سمكية النصال، جميلة الخضار، شراخه الزهري قرصي الانتساب. ازهارها سلبية التجميع، متدلية. معظمها يربض في الارابة الرملية وبعضها يهود في الجصية. يستخرج من عناقها السحلب.

١٣٢١٥ - سحلية ، سحلية

Lepereau (F).

Young rabbit (E).

هي كل ازنب صغير اقلع من الحرق ولزاق انه.

١٣٢١٦ - سحليات

Chaetodontidae (S). Chaetodontidae (E).

فصيلة اسماك من العظمايات اثناثاكت الزعانف موطنها بحار المناطق الحارة الاستوائية. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. جميعها صغيرة القند اجسامها مبطلة يضيئة او مستديرة الشكل. الارباب متراكبة الالوان المزخرفة، الزاهية الجميلة. اشهر اجناسها:

Chelmo	التقع
Pomacanthus	البصكر
Hemitochus	الدقنوب
Platax	الرباني، الربني
Chaetodon	السحل
Zanclus	الشوش
Holocanthus	الطبق، الكنف

١٣٢١٧ - سحلية ، هي الغظاية ، الحلبا .

١٣٢١٨ - سحلية الحيطان * ، سحلية الحيطان ،

عقابة الحيطان (S). Lacerta muralis (S).
Lézard des murailles (F). Wall lizard (E).

حيوان يبيض من الشتاء وفضيلة السقايات. موته البلاد المعتدلة الحرارة. جسمها يطول من ١٩ الى ٢٢ سم. الاثني اكبر قدما من الذكر. رأسها عراقي الثورن.

Mellerax musicus (S). السحون الغريد *
Mellerax chanteur, Autour chanteur (F).
Mellerax polygonus (S). السحون للمسنج
Mellerax rayé (F).
 وما من الجوارح الثلاثة لانها يقضيان على جميع انواع الاناعي والمطاط والورق والخشبات .

Cryptostictis ١٣٣٢٨ - سَحِيلَة
 جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . يتميز ببكتيناته البيضاء المجزأة في قطبيها بأهداب منقطعة . انواعه قليلة العدد والاذى كتركب بعض النباتات الحرجية .

١٣٣٢٩ - سَحِيلَة مَحْمُومَة
Bambidion ustulatum (S). **Bambidion brûlé (F).**
 حشرة قاتنة ناعمة من عديدات الاجنحة وفصيلة الرتيليات . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا . تألف المواقف الرملية اخصها ضفاف مجاري الماء ، حيث تكثر الديدان والخشبات الصغيرة . جسمها بطول من ٥ الى ٦ سم . رأسها وكسولها الى الخضار الالوس . هدها الى السرة الكسئية الخضراء المولاج . فكاهها ضلعان . ذهابانها دقيقان . جنتها صغيرتان نازحتان . ظهورها قليل الاسدياب ، مستدير الطرف اللاحف ، ثنائي التحزيز البدني القاطب . ارادها خاسية المقل . لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجذابة في الربيع وتبقى حتى الخريف . تسرح في التبار . في البرقة عند تمام الادراك تطول نحو ١٠ سم . جسمها اسطواني الجرم ، قائم السرة . رأسها وشرجها ودواجها الى السواد القصبي . طولها اكمل يستمر نحو ٥٠ يوماً ويقتفي ضمن فلات وام في نفق قليل الانحدار تحفله البرقة في الجحالة او في الهال .

١٣٣٣٠ - سَحِيلَة
Leptoconchus (S).
Leptoconque (F).
 جنس حيوانات بحرية من الرغويات عديدات الاصيل وفصيلة الرغويات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة من العالم القديم ، اخصها البحر الاحمر وأحيط الهندي . اصداؤها صغيرة رقيقة ملونة جرابية الشكل فسيمة الجيوب دقيقة الاعقاب الطنازية . تعيش لاصقة بمذات الرجزان او بصخور الحشاش المعنوعة .

١٣٣٣١ - سَحِيلِيَّات
Septobasidiaceae (S).
Septobasidiacées (F).
 فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات وسيدة الجلس . حديثة الاتواج . فطورها تتكفل بالاشتراك مع القرزليات التي تسيطر عليها على عدة نباتات منها الحشبات والاحصاس والنجاش والسنديان كان مهذا امركة افريقية افريقية وقد انتشرت الآن في معظم اقطار العالم .

١٣٣٣٢ - سَحِيلَة
Huile de radis (F).
Radish oil (E).
 مادة زيتية تستخرج من البصر من بذور الفجل . متافها وفوائدها طبية تستعمل في علاج الجذور والامراض المعوية وصعوات المرارة .

١٣٣٣٣ - سَحِيل
Phelloderme (F).
Phelloderm (E).
 نسج نباتي قليل السقى يفصل الطبقة الغليظة من الخشب .

لوزياتان صغيرتان تلحمها ارجان شفافة متحركة . اذناها غائبتا الشفاء السيرياني الاخير الغلاف . منقها قصيرة مستطلة . جلدها متناهي التنايل الدقيقة . ذنها مستقيم الطرف سريع المقلب . فوقها متراكب الالوان ، اسفح المولاج ، يكثر فيه الاخضر والجوزي والجزوي والخضبي وتلمو عظمون من القطع متضاربة الالوان من الابيض الى الاسمر والامرود . يبايتها الفطرية يستمر نحو اربعة اشهر . والاذنى تقص من ٦ الى ١٢ بحليلة طول الواحدة منها لا يتجاوز ٢٥ مم . تألف المروج والحادق وضفاف الانهار ومجاري الماء وبويعت السكن الريفية . تسرح في التبار . فوقها الحشرات الصغيرة والديدان والكباب والهومل . تعتبر من الزحافات الناعمة .

١٣٣٣٢ - سَحَابَة
Sorosporium
 جنس فطور مجهرية من فصيلة الراهورييات . طيلها وسيدة الخلية تجمعها حوائط لاقياسية الجسم تنفكك منه بلوغها من بويغات فردية . انواعه قليلة اشهرها سماء الدخن وسماء الترفنليات .

١٣٣٣٣ - سَحَابَة الدخن
Sorosporium panic-millicae, Sphacelotheca panic-millicae, Ustilago panic-millicae (S).
 فطر مجهرى يركب يبيض ذرة الدخن فيحول الى بورة بوج فضياري . وقد يصيب كامل الانواع فيحول الى بورة مثالكها كاتها اهداب فم تملوها التاكيل وتلفها الارواق للابلابة . يكافح وتكافى ذلك بتعطيل البذر اما بمحلول الفرمول المركز ٠,٥ ٪ او بمحلول سلفات النحاس المركز ٠,٥ ٪ .

١٣٣٣٤ - سَحَابَة الترفنليات
Sorosporium saponariae (S).
 فطر مجهرى يصيب بعض الترفنليات يتركب قرس الزهرة عند انتشابه النبات حيث يكون سقاها البورية الحنطية الابن الى ان تبلغ كامل دورها الحياتي فتفلق من غيرات حنطية السرة وريدة المولاج . يكافح بقطر وسحق الاضرار الموصولة .

١٣٣٣٥ - سَحَابَة
 «كلاه يشبه السحيرة ابيض ينبت في البراق والاكمام ، وليست بمشبه ولا تجر وهي اقرب الى الطريفة والصليان .» وقال ابن سينا السحبة اسم ينبت تحت الصليان والكنكس والآ انه يطول فيها في الساء ، وربما كان طول السحبة طول الريمل واضخم (اللسان) .

١٣٣٣٦ - سَحَابَة ، **شِيَار**
Schéma (F).
Diagram, Drafé (E).
 غنط تخطيطي يوضح نسبة الصلوات الدالة ومختلف حركاتها في المروض للقصد .

١٣٣٣٧ - سَحُون
Mellifex
 جنس طير من البراة وفصيلة الصقريات . شديد الذعن ، قوي الشكبة ، ربح الجثة طوله نحو ٥٥ سم . يسلمه تراوح من ١١٨ الى ١٢٢ سم . موطنه افريقية الشرقية والوسطى . يألف مجازي المياه . قوته الاناعي والحشرات . يثن في الاشجار الريفية اناثه تحضن ٤ رفات نحو ٤ اسابيع . له نومان فقط .



سماء الدخن



سحون غريد



سحيرة مشعرة



سحينة

13344 - سَمَكَة (F). *Eaux fœtales* (F). *Fœtal water* (E). ماء أصفر غليظ يخرج من المشيمة عند الوضع.

13345 - سَمَكَة هو السلف ، اطلبه .



سَمَكَة

13346 - سَمَكَة (F). *Agneau et Agnelle* (F). *Lamb and Ewe lamb* (E). ولد الأنثى أو الذكر كان أو أنثى ج تلحج ويضال وصنلان .

13347 - سَمَكَة *Barrage* حاجز يُقام في وجه النهر إما لتخفيف سرعة الاندفاع المياه ولما تحزنها ويمكن تصريفها عند الطلب أو الاستفادة من طاقتها المولدة .

13348 - سَمَكَة هي الحلة الكبيرة ، اطلبها .

13349 - سَمَكَة *Diplortémone* (F). تمت ترميزه يطلق حل كل زهرة عند أمديتها ضعف عند البتلات أو القناعات .



سَمَكَة

13350 - سَمَكَة *Cebrio gigas* (S). *Cébrion géant* (F). *Cebrio gigas* (E). حشرة خاضعة خاشبة من فصيلة السدائيات ورتبة مهدبات الاجنحة . تألف الاسراج والحدائق . غشائها خاضعة قوتها ما تقضم من اوراق النبات . يرقاتها خاشبة تعيش على جلوس الاشجار وسوقها || للذكر يطول من ٢٥ الى ٢٨ م. ثوبه ثنائي اللون كسني الرأس والكفيل ، اشجع البطن والجرايمز . رأسه كبير الجرم . عيناه كبيرتان . زبانه دقيقان . ظهره مستطيل الشكل ، مستدير الطرف الاثني . بطنه فاخر السرك المطط القرون || الاثني تطول من ٢٤ الى ٢٨ م. جسمها عار عادم الجناح . غشائها بيضاء متفلقتان . زباناها قصيران مستطيلان . بطنها اعليجي الشكل ، مضطرب الجرم ينتهي بسرك مدبب الطرف || لها جليل واحد في الحلق . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط آب وتعيش حتى اواسط تشرين الاول . تسرح في الليل وتبيت في النهار || البرقة مردنية الشكل تطول عند ادراكها تمام من ٣٢ الى ٤٥ م. وهي سداسية الرواجب ، صفراء اللون ، غبراء اللون ، كسنية الرأس .



سَمَكَة

13351 - سَمَكَة *Plasche* (F). *Lath, Slat, Strip of wood* (E). لوح صنبر من الخشب الرقيق .

13352 - سَمَكَة *Cebtronidae* (S). *Cébrionidae* (F). *Cebtronidae* (E). فصيلة حشرات خاشبة من رتبة مهدبات الاجنح || اجناسها وانواعها قليلة العدد معظمها من حشرات المناطق المعتدلة الحرارة . تألف الاسراج والحدائق والجنان . يرقاتها خاشبة تعيش على جلوس الاشجار || اجناسها متصلة لقد تتميز بالاختلاف الاصاعي بين الذكور والاناث . ذكورها مجتمعة ، مستطيلة الامهاد والزباني المنشاورية لتسعين . اناثها ملاء . عادمة الجناح ، قصيرة الامهاد المنطقة ، صغيرة الزباني السمكية المنطقة . جرايمها نشيطة ، ارجاسها خاشبة القمل || اشهر اجناسها السدابة .



سَمَكَة

13353 - سَمَكَة *Examina* (F). *Stamen* (E). العضو الذكري في الزهرة . وهي مركبة من حامل يسمى

13324 - سَمَكَة *Melanopsis* (S). *Mélanopside* (F). *Melanopsis* (E). جنس حيوانات مائية من الرضويات سدبات الاربل وفضيلة السديقيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش في المياه العذبة || اصنافها شبه اهليلجية الشكل ، سوداء اللون ، يبرجية الاطباع ، مغتربة التغيرات المستطيلة || اجسامها مستطيلة . رؤوسها مقبولة ثنائية الجراس افروطية المستطيلة المعينة .

13325 - سَمَكَة بقلة . ج حماء (السان) .

13326 - سَمَكَة *Terre franche* (F). *Thorough soil* (E). السخاخ والسفاسخ والسفواء . الارض اللينة الحرة ، تصلح لحظ الزراعات .

13327 - سَمَكَة * ، أبو مَيَّير *Gryllomorpha dalmatina* (S). *Gryllomorpha* (F).

حشرة دجوبية عديمة الجناح من فصيلة المجدجديات ، ذكرها اصفر قدام انتاعها يطول من ١٢ الى ١٤ م. والاثني تطول من ١٧ الى ١٩ م. ثوبها الى الصفار الخشن تملو رشفة سماء . ارجسها سداسية . زبانيها خيشية ، مستقيمة ، فاقتة الطول . سركها كالبرح حاط بقومين غفروين || تعيش في الاماكن الرطبة المظلمة وفي الحافان والمطابع . سرحها دجوبي يمتد من الدفش الى النسر . قوتها جميع المواد النباتية باستثناء السموم وله تفضل المواد النباتية على غيرها .

13328 - سَمَكَة *Symphodial, Sympodique* (F). *Symphodial* (E).

ما كان السخند من ميزان الجسورية او التعاقبة . كترك انتاعن شمادي او نحو شمادي كما هي الحال في بعض القنطور العنقيا .

13329 - سَمَكَة *Plumule* (F). *Plumula* (E). السخام الرش الرش التي تحت اجنحة الطير .

13340 - سَمَكَة *Sphaeritaceae* (S). *Sphaeritaceae* (E).

مارة تطور مجهرية من فصيلة المصطويات ورتبة الزقيات اجناسها وانواعها الموزعة عديدة || تتميز باصنافها الصلبة العايقية الالوان التي تنقل في صام مستديرة . اما ارتكاز اصنافها فقد يكون فرديا او شيا مجتمعة ورتبة واحدة || اعرف اجناسها التي تهتم الاقتصاد الزراعي . الدماق ، الدافعة ، الروتينية ، الصنجان ، الحوط ، القنترديه ، الكندوة ، الصاع ، الشبح ، والنظيفة .

13341 - سَمَكَة هو الاذخر ، اطلبه .

13342 - سَمَكَة هو ما يخرج من بطون ذوات الحافر او ذوات الخلف قبل ان تاكل .

13343 - سَمَكَة *Bifidus* (F). *Bifidity* (E). سَمَكَة جَمَزَك || التصاق عضوان لثباتان ببعضهما بعض كورقين او صولجين .

سرسها سدوي . تدو عل الارض بئمة وتلسن الاثمار
برفاة || تدن اعشاشها اما في تجاوبف الاثمار القريبة
من سطح الارض او بين الاشجاب المتناكفة المتركة ||
اشهر اجناسها السداف والبزبور .

Stratigraphie (F). سیداکه *
Stratigraphy (E).

جزء من الخصلة يبحث في الصخور المتصدية .

Stratigraphique (F). سیداکي *
Stratigraphy (E).
ما له علاقة بالسداكة كتركيب درس التربة السداكي .

Béolre, Bettolr, سیدكم *
Béoura (F), Swallet, Sink-hole (E).
السدام حاجز صني يتدفق بحرى الماء .

Syma (S). سیدكم *
Symé, Halcyon-aele (F), Syma (E).
جنس طير من الجواثم واعثات المتأخر وفصيلة القرلايات .
انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها أستراليا وجزر التوايح .
تألف المناق وصفات الانهر واغوارها . قوتها الاسماك
الصغيرة والبلابلط والقشريات || اجسامها ريمية صغيرة .
ننقلها كبيرة مسنة الاناك بما يجعلها تستكن من الاسماك
بسهولة . اثراها الى الربة يطورها موج ازرق اخضر في
الراس ورداء والجناحين والذنب . صدورها الى الربة
الصنايعة .

Aculte (F), Rscalpt (E). سید *
راجع اسوتي .

سیدر * ، نبق المسح ، شجرة النبق
Rhamnus spina Christi, Zizyphus spina Christi (S).
Nabks, Nabquah, Epine du Christ, Jujubier d'Orient (F).
Christ's thorn, Nabk tree (E). Christdorn,
Christdornbrustbeere (D). Spina di Cristo, Giugliolo di Palestina (I).
شجرة برية شائكة من فصيلة النبقيات . مهدها فلسطين
يقال ان اكليل الشوك الذي وضع على رأس السيد المسيح
كان منها . اشواكها مشية ، غروبية ، قوية ، جامدة ،
ذرية لها الى العنابي . خشها شديد الصلابة شائع
الاستعمال الحرفي || يستعمل في السياجات الحية فيفرس
على ابعاد تراوح من متر الى مترين .

سیدر البتر * هو الفال ، اطلبه .

سیدر * ، شربين عطر ،
شربين الاكاجور

Cedrela odorata, Toona odorata (S). Cédrel odorant,
Toona odorant, Acajou femelle, Fauc-acajou (F).
West Indian cedar, False cedar (E). Bastard cedar,
Barbadoceder (D). Cedro acajou, Cedrella odorosa (I).

قوته هو الاسم الهندى . شجرة حرجية وثنية من فصيلة
الاذرنشيات . تدلو من ١٥ الى ٢٥ م . واولها مركبة .
وريقاتها وترية براوح حددها من ١١ الى ٢٣ . نصلها
مالس البشرة . مسن الحافة لونه الى اخضر الباهت .
ايزرارها حفي التسجيع . اثمارها غشوية ، جلجلة

انحيط ينتهي طرفه العلوي بجزء متفتح يعرف بالثير
او الشك ، يتكون عادة من فصين مستطيلين يفرزان
ويحضنان جذوات الفلق . ج اسدية .

Scaminal سیداكى *
نمت ترمين يطلق على كل ما له علاقة بالاسدية .

سیداد * هو التنبص ، راجعه .

Bouchon (F), Cork (E). سیدادكة فلبكة *
هي الصمام الذي يند به ثغر القارورة وبها اثبه .

Sexiflora سیداكى *
ما كانت اثماره سداسية التسجيع .

Héxandre (F). سیداكى *
Hexandrous (E). ما كانت اسديته سداسية التركيب .

Hexapodes (F). سیداكى *
Hexapod, Hexapoda (E). اسم شامل يطلق على جميع الحشرات السداسية الارجل
للمناوية . انحصا فراشات حرشيات الاجنحة .

Hexapétale (F). سیداكى *
Hexapetalous (E). سفة الازهار المركبة من ست بتلات .

Hexactinellidés (F). سیداكى *
Hexactinellides (E). رتبة من الاشبح السواني .

Fusilium سیداك * ، فرويلوم
جنس فلور مجهرية من النوسيات وفصيلة الرطيمات .
انواعه قليلة العدد والاذى . جميعها ريمية تركب لاء
الانسان اليابسة .

Phytogénétique (F). سیداكه *
Plant-breeding (E).

السداكة علم يبحث في انتخاب اجود البذار .

Seringops (S), Stringops, سیدان *
Perroquet nocturne, Kakapo (F), Kakapo (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة السدانيات . موطنه
زيلندة الجديدة . يألف الثغابات والبراري الكثيرة المش .
ملجته الحياي زويي . صرجه سدوي يستمر من الغروب
الى النجر . قوته اثار الياينة والساقل والنواي واغشرات
واساريمها والسقاء || جسسه كبير القد . رأسه قريب
الشف برأس القنادة . ذنبه شبه غروفي الشكل ، متدلل
اطول . ثوبه الى اخضر المتفاوت المائجات يطو جميع
وتسجع اصفر في الرداء والجناح والصدر والبطن ، ورقشة
شدية الصرة في الذنب .

Phrénite (F). سیداكه *
Phrenitis (E). التهاب الحجاب .

Phrénique (F), Phrenic (E). سیداكى *
سیداكى *
سیداكى *

Stringopidae (S). سیداكيات *
Stringopidae (F), Stringopidae (E).

فصيلة طير من التسلفات بيناوات الشكل . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها زيلندة الجديدة
واستراليا || تتميز برووسها الشبيهة برووس الفناد .



سداف



سدان



سدر

Cardia (F). Cardia (E). ١٣٣٨٠ - صدك

السلة هي قوة المريء مركزها بالقرب من القلب.

Stratifier (F). To stratify (E). ١٣٣٨١ - صدك

سدك التبر. لقد بسطها فوق بعض نهي سدك.

Inclination (F). Inclination (E). ١٣٣٨٢ - صدك

السد والجنية والميل واحد.

Boute-en-train (F). ١٣٣٨٣ - صدك

Stallion kept with mares (E).

الفحل الذي تعرض عليه الاثاث للاستباحث في بعض وقتها

فاذا ضمت يذري عليها من الفحل المنتخب.

Scydmaenus (S). ١٣٣٨٤ - صدك

Scydmaena (F). Scydmaenus (E).

جلس حشرات من فصيلة السديميات ورتبة غديات

الاجنحة. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض اقطار

البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة، هياض

تطول نحو ٣ م. رؤوسها طليقة، صغيرة، شبه مكورة.

حياتها بارزة. قاذورها صغيرة. ملابسها الفكية مستطيلة.

قرونها الاستشعارية صولطانية، مهدبة الفصل. كواسلها

محدودة. اغادها لاسعة، عادمة التشنج. قوائمها نشطة.

مهدبة الاضداد والظنايب والارياض. اثارها وصيدة الحزن

تكثر فيها الجوارى فالشقة قاصصة || جميعها دامة

تمشي في التيرب والجلاطة والردوي الثاني وتعت القشور

والحاء.

Scydmaenidae (S). ١٣٣٨٥ - صدك

Scydmaenidae (F). Scydmaenidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجسامها وانواعها

المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة

الحارة || اجسامها صغيرة، طولها من ٢ الى ٧ م.

رؤوسها صغيرة، مكورة. حياتها بارزة، قاذورها وفكوكها

لانظامية، علاسها مستطيلة. قرونها الاستشعارية

صولطانية، مركبة من ١١ فصلة. كواسلها لاقبائية

الشكل. تكثر فيها الاستطالة. اغادها لاسعة، عادمة

التشنج. قوائمها نشطة. ارباسها خاسية القفل || جميعها

دامة تمشي بين القشور والطعالب وفي الردوي الثاني

وفي التيرب || اشهر اجناسها السديمون والسديمون ابلق.

Indule (F). Indulem (E). ١٣٣٨٦ - صدك

Indule (F). Indulem (E).

في غباتي يوسيد في اوراق السرخس يحضن الاكاثم

او اكياس البزخ. وهو ايضا النشاء الرقيق الذي ينفذ

السرد وسكن الحشرات.

Cydne (S). Cydne (F). ١٣٣٨٧ - صدك

Cydne (S). Cydne (F).

جلس حشرات صغيرة ومتوسطة القد من فصيلة القبابيات.

انواعها نحو ٦٠ معظمها مركبات الالوان الباهية كالاسود

والاصفر يعيش على الاغصان البالية يحضن نسلها.

اشهر انواعها المؤنثة السديمون ابلق.

Cydne bicolor (S). ١٣٣٨٨ - صدك

Cydne bicolor (F).

نوع من السديمون صغير القد يضيء بشكل مفلطح الجسم

يطول نحو ٨ م. ويعرض في اوقات الحزن. رائحته

كريمة ركب البترول والكرية فينض التلغ ويلدوي

النبات.

الشكل، متدلية، يبيض الحزن، حرقبة الرائحة المتعينة. ثمارها يزور جافة مجتمعة || خشبها جبل الحزن يشبه الاكاجور ويستعمل اسماءه. رائحته رائتجية تقرب من رائحة الارز.

Cédron (F). ١٣٣٧٦ - صدك

شجرة تدعى سيبا، اطلبها.

١٣٣٧٧ - صدك

Sideritis lithargyria (S). Sideritis des graminées (F). Sideritis lithargyria (E).

حشرة مبدولة من فصيلة السقليات ورتبة حشرغيات

الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا

وافريقية الشمالية. فراشها جارية قوتها رقيق الازهار.

مرقتها توش على صفت النجيليات || جسمها متوسط

القد يطول نحو ١٧ م. بسطها نحو ٣٧ م. رأسها صغير

الجرم. منها كيرقان. زباناها عيطيان. مرقتها معتدل

الطول. جوشها ويطنها الى الحطلي الاصفر المروج ||

روشتها الاماميان الى الحطلي الصناعي المروج تملو تعلقة

وسلى يبيض وتقرص حادري البحر. وروشتها الخلفيان

الى الصخرة تملوها مشعة سمراء || لها جيل واحد في الحول.

تظهر القرفة في حزيران ويقتى حتى آب. تسرح في الليل.

لماظل يبد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتنتج المكن لسطا

مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الازراق ||

السرقة تفلو نحو ٤٠ م. جسمها اسطواني الشكل. ثوبا

الى الصفار الفس تملو سبعة خطوط قاطبة سمراء الحزن

وتسعة خطوط متفرقة جزوية الحزن. رأسها احمر. مدبا

الى السمرة الغبراء. وراجها شديدة السمرة || طور الاكاثم

الذي يسمر نحو ١٥ يوما يتغني في التربة حيث تنفذ

السرقة على عمق ٤ او ٥ م.

١٣٣٧٨ - صدك

Sideritis vitellina (S). Sideritis vitellina (F).

Sideritis vitellina (E).

حشرة من فصيلة السقليات ورتبة حشرغيات الاجنحة.

موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية.

فراشها جارية قوتها رقيق الازهار. مرقتها تمشي على

صفت النجيليات وسلى اوراق النباتات المروية || جسمها

متوسط القد يطول نحو ١٧ م. بسطها نحو ٣٧ م. رأسها

معتدل الجرم. منها كيرقان. زباناها عيطيان. مرقتها

معتدل الطول. جوشها ويطنها الى الحطلي اصفر المروج ||

روشتها الاماميان الى الصخرة تملوها مشعة صناعية وخطوط

متفرقة سمراء الحزن وتقرص حادري اسود. وروشتها

الخلفيان الى الصخرة تملوها مشعة سمراء. اعدابها الى

البطلة الفضية || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجبل

الاول في ايار وراثة الجبل الثاني في آب. تسرح في الليل.

لماظل يبد ظهورها بنحو خمسة ايام وتنتج المكن على

الصفحات السفلى من نصال الازراق التي تلتصق التربة ||

السرقة تفلو نحو ٤٠ م. جسمها مائل قشدار. ثوبا

الى الصفار الزيتي الاصفر المروج يملو تسعة خطوط قاطبة

سوداء الحزن وتسعة خطوط متفرقة صفراء. رأسها الى

السمرة الازرقانية. مدبا الى الريمكة. وراجها الى السمرة

القائمة || طور الاكاثم الذي يسمر نحو ١٥ يوما يتغني

في التربة حيث تنفذ السرقة ضمن جلابيا من التلغ.

١٣٣٧٩ - صدك

Sextupler (F). To sextuple (E).

جعل الشيء ستة اضعاف.



سديمون



سديمون مؤنثة



سديمون



سديمون ابلق

والبحيرات والناقص || اصداها متباينة الاشكال والاحجام
يكثر فيها الشكل المزدوج المتساوي الخالصة حتى القنب ||
احرف اجناسها واشهرها السديفة والصحية .

١٣٣٩٩ - صددم ، رهمج Stratus
نوع من الثوم وهو غطوط من السحب الشفافة الرقيقة
المستطيلة تملأ الاقنى وتند مجازاته .

١٣٤٠٠ - صددم Nébuleuse (F). Nebula (E).
سدمج سدمج متطورات شمالية تبدو كشدة نجوم عاتقة
الضوء الملمح عل حيث صامة يضاء || اختلاف اشكالها
ومعالمها وماحياتها المقدرة دى الى تقريبها في عدة فئات .
اشهرها السدم القريبة ثم المنتشرة فالخسفة فالغازية فالقائمة .

١٣٤٠١ - صددين Archéogone (F).
Archeogonium (E).
السدن قصبة تحضن السمو التناهي الاثوي من الطعالب
والكبديات وسعرات الزهر الرطانية . وفي السدن تروبة
الويضة القابلة الانحصاب .

١٣٤٠٢ - صدفة Apothea, Apothécis (F).
Apothecium, Shield of lichen (E).
هي فتحة الخراز واشباهه من النبات . قمع وتغفن الجراثيم
التناسلية .

١٣٤٠٣ - مذاب ، قبيج Ruta (S). Rue (F). Rue (E).
جنس نباتات عشبية رية طيبة معمرة من فصيلة السليديات.
اوراقه متضامة مركبة ازهاره متكوني
التجميع ، عامي الارتكاز . ازهاره خشوية رباعية
البتلات ، ثمانية الاسدية || أشهر انواعه ما يلي .

١٣٤٠٤ - مذاب البر Ruta montana (S). Rue sauvage, R. de montagne (F).
Mountain rue, Wild rue (E). Bergrante (D). Ruta
montana, R. flinocchina (I).
نوع من السذاب وهو نبات عشبي طيب يري يملو من ٤٠
الى ٨٠ سم . ساقه ليفية خلية الصماء . اوراقه ثلاثية
التشريح والتفرغض الضيق || ازهاره الى الصفرة .
منافع الطبية دون منافع السذاب المخزني واقل فاعلية .

١٣٤٠٥ - مذاب الماعز Rue de chèvre (F).
Goat's-rue (E).
هو المكناة الخنزيرة ، اطبا .

١٣٤٠٦ - مذاب سوري Ruta angustifolia (S). Rue d'Alep, R. à feuilles
étroites (F). Syrian rue, Aleppo rue (E). Aleppo
raute (S). Ruta frangiata (I).
نوع من السذاب وهو نبات عشبي يري طيب يكثر في
بعض المناطق السورية . يملو من ٣٠ الى ٧٠ سم .
اوراقه جالسة سنانية . تشريحها غيبق التفرغض ، لانياسي
الشكل . ازهاره الى الصفرة . بتلاتها قارضة مشرشرة .
منافع الطبية تعادل منافع مذاب البر .

١٣٤٠٧ - مذاب عطر Ruta suaveolens (S).
Rue parfumée (F).
نوع من السذاب وهو نبات عشبي زراعي تربى معم
يملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه كاملة مستطيلة ملوكة
الطرف تقطو نحو ٢ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم . ازهاره

١٣٣٨٩ - سد ثوب مذهب اليرباني

Cydus flavicornis (S).
Cydrne à antennes dorées (F).

حشرة من السدون وفصيلة القبابيات . جسمها صغير
القد ، مفلطح ، شبه يضي الشوزن ، يطول نحو ٤ سم .
ثوبها الى الجوزة يملوها مروج يراوح من الخيطي الى الاسود .
رأسها شبه مذكور ، اطرافها الداعلية مجهزة بطوق من الهلب
القصير الشالك . خطها معتدل الطول . عيناها صغيرتان
نازحتان . زياناها ذهبي اللون . كوسلها يثير الجانيين
ماس الوسط . يلبها كثير الهلب المنطبع . قشراتها
خفاف . قوتها شديدة . ظنايبها الامامية موكلة الاطراف
الثالثة || مرتها اشباب الشطوط . يكثر ويوجد على
الزمل حيث تنعم بسمرة مدعقة || راجعها كريمة .

١٣٣٩٠ - صدكيات الجناح Mecoptera, Mecopteroides (S). Mécoptéroïdes, Mécoptères (F). Mecopteroides, Mecopterera (E).
طيفة حشرات مجنسة تشمل اربع رتب وهي حلوذيات
الاجنسة وعرضيات الاجنسة وذات الجناحين ومادنات
الاجنسة .

١٣٣٩١ - سدوم Nébucisé (F). Patch of haze (E).
هو الدجيم ظل الهم ويلى حبه ائمة الشمس .

١٣٣٩٢ - سدس Rosée de la nuit (F).
Night dew (E).
السدى هو لى الليل . ويلى السدى ما كان في اول الليل
والسدى ما كان في آخره .

١٣٣٩٣ - سدس Date verte (F). Sour date (E).
السدى هو البلع الاخضر قبل ان يلو .

١٣٣٩٤ - صدفة Plancha à dessin (F).
Drawing-board (E).
السدية لوح من الخشب لمجوع الاطراف مربع الشكل
او مستطيل .

١٣٣٩٥ - سدس Schedir
السدر نجم نير من كوكبة ذات الكوس . يبرون عنه
في الجداول العام بالتيم ألفا من الكوكبة المذكورة .

١٣٣٩٦ - صدمة Aréole (F). Areola (E).
تؤلؤل قلسوي الشكل ازغب البشرة او شالكها يكون
في ماء بعض النباتات اسمها الصبار .

١٣٣٩٧ - صدفة Melanis (S).
Mélanis (F). Melanis (E).
جنس حيوانات مائية من الرضويات سميات الاربيل
وفصيلة السديليات . انواعها المروية نحو ٤٠٠ منتشرة
في جميع اصقاع العالم . تعيش في المياه العذبة الراكدة
القليلة النور || اصداها مدوية محاذية سوداء اللون .
اجسامها مستطيلة . رؤوسها مقنطرة ثنائية القواس المميونة .

١٣٣٩٨ - صد يكيات Melanilidae (S).
Mélaniidés (F). Melanilidae (E).
فصيلة من الرضويات سميات الاربيل . اجسامها وانواعها
عديدة منتشرة في سطر اقطار العالم . تعيش في الانهر



سديفة



سذاب البر



مذاب سوري

Fougères, Filicales (F). ١٣٤١٨ - مَرْأَخِيس

Ferns (E).

صف من شعبة مستورات الزهر الوعائية . يشمل السرخس والخشخاش وكزبرة البئر وفيها ما مركزها في سلم الرقي النباتي يأتي بين الحزازيات وباديات الزهر . وهي من ذوات الجذور الحقيقية || ضالها وأجناسها وأنواعها المنتشرة لا تحصى لأنها كانت أكثر النباتات انتشاراً وأجناسها جميعاً . أما أجناسها المعاصرة فنحو ١٥٠٠ وأنواعها لا تقل عن ٦٠٠٠ || وما طبقات القمم الجبري سوى تنحسر وتختبر ما تراكم وتكسب من السراخس وفيها في الحقبة الكبريتية التي دامت أكثر من ٣٠٠ مليون سنة .

١٣٤١٩ - مَرْأَكَة

المرادة والبراد من الثمر ما اضر به البشش فيس وسط قبل ينه .

١٣٤٢٠ - مَرْأَزَان ٥ هو النسم ، الملبه .

Sénilité (F). Senility (E). ١٣٤٢١ - مَرْأَكَة ٥

المراسة البون الجسدوي الذي يميل بالرجل منه الشيخوخة .

١٣٤٢٢ - مَرْأَوِيل الطَّكْكِيل ٥ هي الشمسية ، الملبه .

١٣٤٢٣ - مَرْأَكَة ٥ عَدُوِّي Contagion, Infection
قابلية انتقال الامراض الميكروبية من فرد مريض الى آخر سليم .

Cave (F). Case, Cellar (E). ١٣٤٢٤ - مَرْأَب

محلز تحفظ فيه بعض المحاصيل الزراعية الصناعية او فيها كالمس والجبن الخ .

Collecteur (F). Collector (E). ١٣٤٢٥ - مَرْأَب

مصرف كبير تنتهي اليه مياه المصارف فيسيها الى المشيرة .

١٣٤٢٦ - مَرْأَب

Troupe, Troupes, Banc de poissons (F). Troop.

Flock, Herd, Drove, Shoal of fish (E).

اسم شامل يطلق على القطيع الكبير من الطير والحيوان والسلك .

Rangée de vigne (F). مَرْأَبَة ٥ مَرْأَب ٥ ١٣٤٢٧

Range of vine-branch, Row of vine-branch (E).

الصف من تصرب الكرمة .

Serapis (S). ١٣٤٢٨ - مَرْأَس ٥

Sérapias (F). Serapis (E).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة السبيليات . انواعها المعروفة خمسة منها حوض البحر الابيض المتوسط || سوطها خراعية منتصبه جيوه . اوراقها متعاقبة حافسة ، مستطيلة ، متساكنة اتصال الضيقة . ازهارها هابي فيه متبلي التجميع . ازهارها كبيرة ابروانية اللون او جوية || جميع انواعه تزيينية تزروع في المراكب .

Stromateus (S). ١٣٤٢٩ - مَرْأَسَة ٥

Stromatée (F). Stromateus (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزمانف وفضيلة الاقصريرات . اصنافها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ||

مصفرة اللون ، عطرية العرف الزندي || ازهاره يشتر من حزين الى ابيض .

١٣٤٢٨ - مَرْأَب مَحْزُونِي * ٥ فَيَجِين لَتَرِن

Ruta graveolens, R. hortensis (S). Rue officinale, R. féécide, R. des jardins (F). Common rue, Rue of grace (E). Raut, Garten raut (D). Ruta, Ruta dei giardini (I).

نبات عشبي طبي يري يعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم . ساقه ليلية متصلية . تصل اوراقه عميق التفريص . لونه الى الأخضر الازرق . ازهاره منتفحة اللون يتلها مقعر الشكل متجمعة الصفحة ، مسنة الحافة || وهو نبات كزبرة الرائحة مر الطعم ، لاذع ، حريف . يستخرج منه بالتقطير دهن طيار له مناهضه الطبية . يستعمل منعفاً للجلد ويدراً لثلبث وينها للعدة وخافضاً لحرارة ومضاداً للتشنج ولطارداً للديدان .

Rutaceae (S). ١٣٤٠٩ - مَرْأَبِيَّات

Rutacées (F). Rutaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، مستقلات الفصلات ، مرتفعات المبيض . انواعها كثيرة العدد تبلغ ٧٠٠ جنسها ٨٠ . جميعها اسياط . جميعها من نباتات الاقاليم الحارة والمعتدلة . فيها الاشجار والشجيرات والاحشاب || اوراقها لا قياسية الارتكاز منها المتعاقبة ومنها المتعاقبة ازهارها خشوية . ثمارها برؤوس بسيطة او جراء عديدة الاغصية .

Fral (F). Spawn (E). مَرْأَة ٥ مَرْأَة ٥ ١٣٤١٠

بيضه السمكة وتدهي صخر . ج سره وسره .

Fray (F). To spawn (E). ١٣٤١١ - مَرْأ

سراً السلك : باض .

١٣٤١٢ - مَرْأَة

المرء : شجر تنخذ منه القسي الواحدة سرامة . (السان) .

١٣٤١٣ - مَرْأَبِيَّة ٥ هي الكورينة ، الملبه .

١٣٤١٤ - مَرْأَج الفُولَة ٥ هو اللوريجان ، الملبه .

١٣٤١٥ - مَرْأَج الفَطْرُب ٥ هو الخرم ، الملبه .

١٣٤١٦ - مَرْأَكَة ٥ هي زنان الخيل ، راجسه .

١٣٤١٧ - مَرْأَجِيَّة * ٥ مَرْأَج شَالَم ٥ قَصَب

ذَمِي ٥ عَوَخ المَاء

Lysimachia vulgaris (S). Lysimache commune, Chasse-bosse, Herbe aux cornalies (F). Common loosestrife, Yellow loosestrife (E). Goldfärbich, Gemeiner Weiderich (D). Lismachia vulgare, Mazza d'oro, Cosaria (I).

نوع من السرمج وهو نبات عشبي معمر يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه متعاقبة شعية ثلاثية . نصلها ذهبي اللون ، فصلها حر اخضر المذهب || ازهاره يشتر من حزين الى آب . يرغب في الآتربة المتوسطة الانساج والرطوبة .



مذاب غزلي



سراجية

١٣٤٤٠ - سربوطة (F).

هو ديب الحوت، جنس اسماك كبيرة القد تعيش في المياه العميقة.

١٣٤٤١ - سربوطة (F).

جنس طيور بحرية من الرديانيات وفصيلة السلحفاة. يتميز بكتله المورثة للشفية الانقسام العاقبة اللون التي تحمل في اطرافها بعض الحنوط المحلية القريبة الشبه بالزبان. انواعه قليلة العدد والادى تركب الاوراق دون ان تطها.

١٣٤٤٢ - سربوطة (F).

جنس حيوانات بحرية من الرنويات معديات الاربل خليفات الخياشيم وفصيلة اللوريسيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اصحابها بعض مناطق المحيط الهندي والبحر الاحمر. اجسامها مرعطة مستطيلة عديدة الظهور الثلاثية التناوب. رؤوسها ثنائية القياس. خياشيمها ضيقة التجميع ترتكز على حلقات انبوبية قواعدا تلاصق قواعد التناوب الظهري الاخرى. ارجلها زوجية مستقلة الطول ضيقة.

١٣٤٤٣ - سربوطة (F).

جنس حيوانات بحرية من الرنويات معديات الاربل وفصيلة السربيات. انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من متحيزات الطبقة الجهورية والبعض الآخر منتشر في سطح بحار البلاد المعتدلة الحارة ومنها البحر الابيض المتوسط. اصداها صغيرة، مدنية الشكل، متناوبة الحلزنة حتى الاصاب. فوفتها ضيقة، ارفقتها متصبية. رأسها صغير، لها مربع الشكل والخطم. لاستساها مستطيلتان.

١٣٤٤٤ - سربيت (F).

جنس حيوانات بحرية من الرنويات وأسيات الاربل وديانيات الخياشيم وفصيلة السربيات. انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من المتحيزات. احافيرها لتسمر من الحقة البرية الى التراسية. اصداها اسطوانية الميكلة قرصية الشكل. كثيرة الميجرات والصلوح الناشرة المتفرقة.

١٣٤٤٥ - سربيت (F).

السربية او النسيلة مجموعة الفسح الثلثة التي تتألف منها الكتلة المركزية في بؤفة النباتات بدييات الزهر.

١٣٤٤٦ - سربيتيات (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرنويات وأسيات الاربل وديانيات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحيزات اواخر الاياج الاول واولى الاياج الثاني. اعرف اجناسها السربيت.

١٣٤٤٧ - سربتين (F).

نوع من الخفايش الفيلة يدعى غشاف الليل، اطلبه.

انواعها المعروفة حسة تتميز باجسامها المحلية الشكل، وديانها الظهري والشرية المتجلية المقعرة. رؤوسها صغيرة، غاطها مقعرة مستديرة، ملاصقا بجذعة تكاد تكون مستطلة. انواعها مختلفة الالوان تكثر فيها الربعة الفقية المالح. اعرف انواعها واسمها سربوطة الحنوط.

١٣٤٤٨ - سربوطة الحنوط (F).

Stromateus fiatola (S). *Stromateus fiatola*, S. de la Méditerranée (F).

نوع من السربوطة. سمكة بحرية بيوض. اصلاها البحر الابيض المتوسط. جسمها صغير القد، مبطط الجرم، مدني الشكل، يطول نحو ٢٠ سم. ثوبها الى الربعة المرجانية الضيقة المالح تقيم عند الظهر ولتر وتزهر عند البطن وملوحا تسنخ ذهبي في الشطر الاصل من الجانبين. رأسها صغير القد. غطها شديد القصر، مستدير الطرف. زمانها الظهري والشرية مستطيلة، مقعرة، متجلية الشكل. زعنفتها الذيلية ثاقبة مستطيلة الجناح. لها متوسط الصف، مأكول.

١٣٤٤٩ - سربوطة (F).

في الاشارة نبات من الخلدات، اطلبه.

١٣٤٥٠ - سربوطة (F).

في الاشارة الأرض في الاشارة السري، اطلبه.

١٣٤٥١ - سربوطة (F).

في قصص الماء، اطلبه.

١٣٤٥٢ - سربوطة (F).

في اشارة البحر، اطلبه.

١٣٤٥٣ - سربوطة (F).

سرة الفرس نجم ثير من كوكبة الفرس الاعظم مركزه على السرة.

١٣٤٥٤ - سربوطة (F).

في اذن يودا من الفطور المأكولة، اطلبه.

١٣٤٥٥ - سربوطة (F).

جنس طير من الجوام وقيقات المتانير وفصيلة المتانيرات. انواعها المعروفة سبعة، اصلاها الثاقبة الاسترالية وجزر ماليزيا. اجسامها ربة. مناقبها مستطيلة، غرزية الشكل، قليلة التفويص. اذنانها صغيرة. ارساها دقيقة، مستعدة الانفتاح. انواعها الى الحشرة الزقية المالح و بطونها الى الصغار الكبريتي. اعناق ذكورها زبرجدية تحاص المالح. قوتها الجوام وسيق الازعار.

١٣٤٥٦ - سربوطة (F).

جنس حيوانات بحرية من الرنويات معديات الاربل وفصيلة السربيات. انواعها المعروفة عديدة، بعضها من متحيزات الطبقة الطيارية والبعض الآخر منتشر في بحار البلاد المعتدلة الحارة والباردة. اصداها مخروطية، متناوبة الحلزنة حتى الاصاب. حلزونها قليلة النور، ضيقة التضيق والتضيق المتعرج. اعرف انواعها السربوطة المدنة (*C. tubercularis*).



سربوطة الحنوط



سربوطة



سربوطة



سربوطة



سربوطة

* ١٣٠١٢ - سَرْفُود بَرْبِي

Anthriscus sylvestris (S). Cerfeuil sauvage, Chérophyll (F). Wild chervil, Cow parsley (E). Wilder kälberkropf (D). Cerfoglio salvatico (I).

نبات عشبي بري محلي. منه المروج والمرابي الجبلية. جلوره مستطيلة فائقة يقال إنها لا تخلو من بعض العناصر الجحالية الصارة بالحولان.

* ١٣٠١٣ - سَرْفُود بَكْلِي

Anthriscus cerefolium, Scandix cerefolium (S). Cerfeuil cultivé (F). Chervil (E). Kerbel, Kälberkropf (D). Cerfoglio coltivato (I).

بقلة زراعية حولية تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها مأكولة مستحية العلم، فواحة العرف المنطر || تجود في جميع الأتربة المعتدلة الانسلاج.

* ١٣٠١٤ - سَرْفُود عَطِير * سَرْبِس

Myrrhis odorata (S). Myrrhis, Cerfeuil musqué (F). Myrrh, Sweet fern, S. cleya (E). Spanische süssoide (D). Mirrhe, Finocchiella odorata (I).

جنس نباتات شبيهة حزازية معمرة من فصيلة الشبليات. أنواعها قليلة العدد منها البرية والزراعية. البرية صغيرة الجذور المستعقة. ساقها ترتفع نحو ٧٠ سم. أوراقها مركبة كبيرة القند، خلية النصل الثلاثي التفليغ، رائحتها ذكية العرف تشبه الآتيسون || أما الزراعية فجلورها حزازية الشكل، غليظة اللحم. كانت ولا تزال من النباتات المفيدة الانتشار لأنها ترطب في المناطق البحرية الكثيرة الضباب.

* ١٣٠١٥ - سَرْفُود لَفْطِي

Chaerophyllum bulbosum (S). Cerfeuil bulbeux, C. tubéreux (F). Turnip rooted chervil, Parsnip chervil (E). Rubenkalberkropf (D). Cerfoglio bulboso (I).

نبات حقول بقلي محلي. جلوره لفي الشكل كبير القند. ساقه تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقه مركبة، خلية النصل ثنائية أو ثلاثية التفليغ || جلوره أبيض اللب، سكري العلم، يحوي من المواد الغذائية ما قدره نحو ٣٥ ٪ مواد ازوتية

٣٥ ٪ مواد دهنية

٢٧,٨ ٪ مواد هيدروكربونية

وهو من النباتات التي ترطب في الأتربة الجواراة الحصية للفسوية العناصر الغذائية.

* ١٣٠١٦ - سَرْفُود أَسْوَد * Salamandra noire (F).

راجع سمك أسود.

* ١٣٠١٧ - سَرْفُود مَبْدُول * Salamandra terrestra (F).

هو السمندل الليلول، اطلبه.

* ١٣٠١٨ - سَرْفُودِيَّات * Urodèles (F). Urodela (E).

رتبة حيوانات من صف الضفادعيات، اجناسها وأزواجها كثيرة العدد جميعها أربع فصائل || معظمها مائي وبعضها قريب. تتميز بمراء جلودها وما تنقسمه من مواد أكالة سامة || أشهر فصائلها السمندليات.

* ١٣٠١٩ - سَرْفُودَة * Acervule

السرفولة هي البكنية التي لا يمكن تمييز جيلها عن القنصة البوقية.

كلوراك الهندباء. أزهارها وريمية مستطيلة، المالحق، لونها الالودي يتحولها تشويح عايق || ضوح أوراقها وأزهارها عند العرك، يشبه اليرد || أزهارها عتيشر طولك الصيف والخريف.

* ١٣٠٢٠ - سَرْفُودَة * هو ينور البربر، اطلبه.

Sargus (S).

Sargus (F). Sargo, Sargus (E).

جنس اسماك بحرية من القرشيات الشائكات الزعانف. أنواعه عديدة جميعها يضيئة الشكل مفلمنة. رؤسها غليظة وقصيرة. زمانها الليلية فائقة. سمها حولي رقيق || ألوانها عديدة فيها الغني واللحمي والمزجاني والاسمر الزيتوني || أشهر أنواعه الاربعة التالية: السرفوس المألوف والسندبر والسياس والحلارة.

* ١٣٠٢١ - سَرْفُود حَذَاوِي * Sargus (F).

هو السرفوس المستدير، اطلبه.

* ١٣٠٢٢ - سَرْفُود مَأْلُوف * Sargus vulgaris (S).

Sargus commun (F). Common Sargo (E).

نوع من السرفوس مستدير الشكل، فني اللون، عايق الظهر، يكثر في البحر المتوسط || يعتبر من الاسماك العادية المتوسطة الصنف.

* ١٣٠٢٣ - سَرْفُود مُسْتَدِير * Sargus rondeletii (S).

Sargus mouchon, Sargon (F).

نوع من السرفوس مستدير الشكل، مستطيل الزعنفة الليلية الفائقة. ثوبه اطمل اللون يملو موج فني وتوزيع ودي. ظهره عايق من جانبيه وبطنه. يكثر في البحر المتوسط || يعتبر من الاسماك العادية المتوسطة الصنف.

* ١٣٠٢٤ - سَرْف * Apathique (F). Apathetic (E).

نمت تعريفي يطلق عل من كان عايق الشعور ويحتم بالكسل والقصور.

* ١٣٠٢٥ - سَرْفَة * Chenille (F). Caterpillar (E).

اسم تعريفي يطلق عل يرقات الفراشات منذ تفهنا حتى دخولها في طور الحادة.

* ١٣٠٢٦ - سَرْفُوس مُجْدَلَع * Syrphus corollae (S).

Syrphe angulirandé (F).

حشرة نائمة من السرفديات. شكلها كالذبابية. طولها نحو ٨ م. رأسها أصفر اللون. يطنها بجعد الالاسود. تنجح مكها عل الالوراق التي يركها الارق فينتفخ من يرقات دويدية، حلقية الشكل، ضباب اللون تلتحق الارق وتقرسه.

* ١٣٠٢٧ - سَرْفُوس مُوَكَّر * Syrphus boeckae (S).

Syrphe à ceinture (F).

حشرة نائمة من السرفديات. شكلها كالذبابية طولها نحو ٨ م. رأسها أصفر. يطنها مزر غطوط وزرأ كش سود || رقاتها مفترسة تغني عل الارق.

* ١٣٠٢٨ - سَرْفِيل * هو الاطريال، اطلبه.



سرفوس مألوف



سرفوس مستدير



سرفوس مجعد



سرفوس مزور



سرفول بري



سرفول بقلي



سرفول عطر



سرفول لفي

١٣٥٢٠ - سُرُون أَيْضُ الدَّرَقَةِ *، سُرُونِيَّ

Anisoplia leucaspis (S).
 السُّرُونِيَّ *
Anisoplia arvicola (F). Pastoral chafer, Cereal chafer (E).

حشرة وأتمة غاشلة مؤذية من فصيلة الجملبيات ورقية منقذات الاجنحة. موطنها ينشغل معظم المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الأقصى إلى أوروبا وأفريقيا الشمالية. تألف المزارع والحقول، غنصافها تعيش على أزهار النباتات المختلفة الأنواع وعلى صفت النجيليات. يرقاتها تعيش على جذور الزروع والنباتات المروعة. جسمها صغير اللد، يطول من ٧ إلى ١٠ م. نوبها إلى الخصار الاملس تلوح في التمدن زركفة صفراء. رأسها صغير الحجم. يفر بمظفه تحت الكوسل. عيناها صغيرتان. باردتان. زباناها مرتفعتان، صميجتان. كوسلها مخروطي الشكل. جرابها معدلة الطول و ماسلة الانفاذ، مسنة للفتابيب. ارصافها خاسية العقل، مهدبة الحوافي. الاثني اميز قداً عن الذكر وغلظ بنتاً واطول سراً واكد ثوباً. لها جبل واحد في الحول. تظهر الحشرة في اوتال ايار ويبقى حتى اواسط تموز. تسرح في النهار وتبيت في الحول. البرقة بطيئة النسو تترك الكال الجسومي بعد التفث بسة أشهر. جسمها مقوس يطول نحو ٢٢ م. نوبها الى الحطلي. رأسها والحلقه الصدرية الاول الى السرة. طور الاكمال يستمر من ٤٥ الى ٥٥ يوماً.

١٣٥٢١ - سُرُونِيَّ *، Carophytum (S).

Cérophyte (F). Carophytum (E).

جنس حشرات من فصيلة السُرُونِيَّات ورقية غديات الاجنحة. انواعها الممرقة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة من المالحين القديم والجديد. اجسامها مسطوية الشكل، هيفاء، تطول من ٥ الى ٩ م. رؤوسها مستدلة الجرم والثشوي. عيناها صغيرة، باردة، تكبرها وبلاسلها نظامية. قرونبا الاستشعارية مسطحة عند الذكور، مشاربة عند الاناث. كواسلها محدودة مطوية للقدم والمؤخر. الحادها لاحقة، تحيلة لتعديد القاطب. قرونها نشطة. اثوابها ملونة. تألف لثابات التي تكثر فيها الاجنار الوريفة كالصفاص والحور والسديان، لانها تعيش مع يرقاتها في الجلوع النخرة.

١٣٥٢٢ - سُرُونِيَّات *، Carophytidae (S).

Cérophytidae (F). Carophytidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجسامها وانواعها الممرقة متوسطة العدد، منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحارة والحارة. اجسامها صغيرة اللد، مسطوية الشكل، معدلة البطيط، تطول من ٥ الى ٩ م. رؤوسها مستدلة الجرم. عيناها صغيرة، باردة، تكبرها وبلاسلها نظامية. قرونبا الاستشعارية مسطحة عند الذكور، مشاربة عند الاناث. مركبة من ١١ فصلة. كواسلها شبه مكورة. الحادها لاحقة، تتميز باستقامة مداور القروان الواسلي والحلقية. ارصافها خاسية العقل. اثوابها ملونة. تألف القابات التي تكثر فيها الاجنار الوريفة حيث تعيش على جلوعها النخرة. اشهر اجناسها السُرُونِيَّ.

١٣٥٢٣ - سُرُونِيَّ اعظم *، Rhingia rostrata (S).

Rhingia à grand rostre (F).

حشرة من ذوات الاجنح وفصيلة السُرُونِيَّات. جسمها متوسط اللد، يطول من ٩ الى ١١ م. رأسها كبير الحجم،

شبه يرمي الشكل، اصفر اللون. خطها غروطي. مكها شديدة النشط. عيناها كبيرتان فارقتان. زباناها دقيقتان صغيرتان. صدرها الى القرقة السفلى. يطها كالباطية، اصفر اللون. صتاي اللوح. قواها الى الصفرة الصتائية. ورشاشها خطلي الخشب. تظهر الحشرة الجبلدة من ايار الى تشرين الاول. مسرحها البراري والغابات. قوتبا رقيق الانصار. الاثني اكبر قداً من الذكر تمتع مكها في براز الحوران يفتت من يرقات نائلة تعيش على البراز حتى الاكمال.

١٣٥٢٤ - سُرُونِيَّ البَصَل *، Eumerus strigatus (S).

Mouche des bulbes, Eumère décharné (F). Lesser bulb fly (E). Kleine Narissenfliege, Zwiebelmückenfliege (D).

حشرة صغيرة من السُرُونِيَّات طولها من ٧ الى ٨ م. لونها الى الخصار الاسمر تلوح ثلاثة زركن سفر. تظهر في ايار ثم تمتع مكها على اوراق البصل والزيتون والبطاطا يفتت من يرقات تقرض الاقراص الجبلية والنباتات.

١٣٥٢٥ - سُرُونِيَّ الدَّرَقَةِ *، Merodon aestivus (S).

Méridon, Mouches des narcisses (F).

حشرة من السُرُونِيَّات طولها من ١٥ الى ١٧ م. اجتم النملة، زباه الجسم، لونها الى السرة. تظهر في ايار. تمتع مكها على اوراق النرجس وبعض الزنبقيات يفتت من يرقات تنجب ثوباً نحو القوس البصل فتقرض ولا تتركه الا عند آخر السلاخ قبل ان تتحول الى ملءاء كزود.

١٣٥٢٦ - سُرُونِيَّ اَيْضُ *، Orthoneura elegans (S).

Orthoneura élégante (F).

حشرة ناعمة من فصيلة السُرُونِيَّات. اجسامها خضراء، صغير اللد، يطول من ٧ الى ٩ م. رأسها مخبط أسف الخصار. خطها وشكها صغيران. عيناها كبيرتان ارجوانيتان. زباناها دقيقتان صغيرتان. صدرها الى الخصار الملح. يطها شديدة السرة، اخضر الحثار. قواها الى السرة السوداء. ورشاشها قسطنطيني الخشب. تظهر الحشرة الجبلدة في الصيف، مرتها البراري والحقول للزودة. الاثني اكبر قداً من الذكر، تمتع مكها على سوق النباتات التي يركبها الارق يفتت من يرقات شديدة الصغر تسمى وراه الارق فتقرض.

١٣٥٢٧ - سُرُونِيَّات *، Syrphidae (S).

Syrphidae (F). Syrphidae, Hover flies, Flower flies (E). Schwebefliegen, Schwirrliegen (D).

فصيلة حشرات من ذوات المالحين اجناسها وانواعها معدلة لا تقل عن ٧٠٠٠ جسمها صغيرة اللد خضة. طولها يراوح من ٣ الى ٢٠ م. رؤوسها بفسضة صغورها. قرونبا الاستشعارية ثلاثية القواسل. الاثني زاهية مستدلة. نمط انواعها يعيش على شرب الازهار، وفيها الحواكة والثالثة. مكها دقيق الجسم لاقياسي الشكل والربع والجمع. قد تمتع على اوراق النبات او تقذف به في الماء لراكه الاثني من زرذ الى الارق وفي بعض القنطور. يرقاتها خضة، صغيرة، شكلها شكل الملق. لونها الى السرة وفيها الاخضر والاصفر والحطلي. يبي واجتة او هواكة او نائلة. مطها لريش وبضها عالي. والارضية منها تلم الاوراق التي تركبها وتقرض الاقراص الجبلية والنباتات.



سُرُون أَيْضُ الدَّرَقَةِ



سُرُونِيَّ



سُرُونِيَّ اعظم



سُرُونِيَّ البَصَل



سُرُونِيَّ الدَّرَقَةِ

١٣٥٢٧ - سركوستوماتيات (S). Sericostomatidae (F).

فصيلة حشرات من رتبة جملويات الاجنحة. اجناسها وانواعها المروفة مدينة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة، سرار اللون. اجنحتها معتدلة الطول، كثيفة الخمل الذي يثني الاصحاب والورق. الملابس الفكية عند الذكور مستطيلة الخبل المرموس الذي يبدو كالقناع امام الوجه. وتتميز ذكورها ايضا بقصود زنايلها المسنة الطرف || اساريمها تعيش في المياه الجارية ملحوة بجلايبب متباينة الاشكال، ويكثر فيها الغروطي .

اشهر اجناسها :

- Sericostoma (S). السركوستوم
Goera (S). الغوريه
Silo (S). السيلو
Curnocia (S). الكوروسيا
Lasiocephala (S). اللال لوسيفالا

١٣٥٢٨ - سركوپ قياسي البتج (S). Cercopis quinqueangulata (F).

حشرة من فصيلة السركويات . جسمها صغير القذ يطول نحو ٩ م. ثوبها الى السواد الاسفع تملو خس بقع حر . رأسها مستعرض ، قليل التواء . خطمها مستدل الطول . عيناه صغيرتان ، زباناها قصيران ، نجيلان . كوسلها محذوب . حنجرتها صغيرة ، عرمة . ظهرها كامل الحنجبة ، لاحف . روثانها غشائيان ، شفافان . يثنها اسود على صفحتيه . قوائمها خيطية سراد اللون || مبلولة في كل مكان . قوتها النسخ تنصه من اوراق الاشباب .

١٣٥٢٩ - سركوپ عديمي (S). Cercopis sanguinea (F).

حشرة من فصيلة السركويات . جسمها صغير القذ يطول نحو ١٢ م. ثوبها الى السواد الاسفع الملطخ بالاحمر . رأسها مستعرض ، قليل التواء . اسود . خطمها مستدل الطول . عيناه صغيرتان ، زباناها قصيران ، نجيلان . كوسلها محذوب . حنجرتها مزوانية . ظهرها كامل الحنجبة ، لاحف ، شديد الحرة الارجرانية ، مبيج بالاسود . روثانها غشائيان ، شفافان . يثنها اسود على صفحتيه . احمر الحيد . قوائمها الى السواد || يكثر وجودها حيث تكثر الاعشاب والنباتات الدغلية . قوتها النسخ تنصه من الارواق .

١٣٥٤٠ - سركوپيات (S). Cercopidae (F).

Cercopidae, Aphrophora (F), Spittle bugs, Froghoppers (E), Schaumzikaden (D).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المروفة مدينة ، معظمها يأنف البلاد الحارة وبعضها يعيش في البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة مبطة . ورونها مستقيمة . نوايضها ثنائية الزلام . عرونها كبيرة . قرونها الاستعمارية قصيرة ونحيلة . تتميز بظنايبها الخلفية المادنة الاكثار ، لكنها مجهزة بمنافس حادة . وتتميز ايضا بالقفر يساعد على ذلك استطالة قوائمها الخلفية .

١٣٥٢٨ - سرق (F). Scaple fibre (E).

نسيج اسطواني اكثر لانة من الرود ، سده قصير القيلة يجمع بالنخل .

١٣٥٢٩ - سرق (F). Acroclinium (S).

جلس نباتات عشية حولية وبعمرة من فصيلة المركبات . انواعها مدينة تنبت بيرة في الاسفاح المعتدلة . منها نوع واحد زراعي تربتي ينح السرق الوردي .

١٣٥٣٠ - سرق وودي (F). Acroclinium roseum (S).

Acroclinium rosea (F), Everlasting, Immortelle flower (E), Schmaier sonnenfugel (D), Acroclinio (I).

نوع من السرق وهو نبات عشبي حولي تربتي . يطو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقه متعاقبة لاطة . نصلها سناني الشكل ، ضيق الصفحة . ازهاره وريسية قفرا نحو ٤ سم . لونها الى الوردي ، حثارها ابيض || انفرار يستمر طوال الصيف .

١٣٥٣١ - سرقاط زباعي الاصابع (F). Suricata tetractylis (S).

حيوان لبون لام وحيد الجنس والنوع من فصيلة اتر باديات موطنه بعض مناطق افريقية الجنوبية || جسمه صغير القذ قريب الشبه بالنمس . طوله نحو ٤٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٥ سم . قوائمها قصيرة رباعية الاصابع ، ضلجة البرازن ، اخصها الامامية . جلده كثيف الزبر . وبزه احر القادة واقسم الاسفل ، اطح القسم الاحل المشوب ببعض الصغار . اذناه ورياء صغيرتان مطوقتان بالاسود . ذنبه الى الطلعة الصفراء باستثناء الطرف الاسود . ظهره مبيج بالاسود || ملجته الحياتي جماعي . يأنف الموالع الرملية حيث تنور له سهولة استغفار الاوتار . قوته القويوات اخصها الجردان والفران ثم يصل الثباتات القوصية .

١٣٥٣٢ - سرق (F). Sharp wine (E).

هو لكتيل الحامض السقم ولا يكون ذاك الا في الحمر الجديدة التي ينقصها بعض السكر .

١٣٥٣٣ - سرقين (F). Compost

هو السباد السوي المختصر الناعم من غنظ ارباخ وكثامة والقدار المزومة يضاف اليه بعض الكلس بمعد ١٠٪ تسهلا لتحويله واشغاره ورسمة تميله فبا يده .

١٣٥٣٤ - سرقيني (F). Humigène (F).

فمت تربتي يطلق على كل مادة تتجج الدبال .

١٣٥٣٥ - سرق (F). Cerque, Cornicula (F).

Small horn-shaped cup (E).

زائدة قرنية مزدوجة لاقسيمية الشكل تعمل بها الحشرات المستقيمة الاجنحة مركزها تحت آخر رتبة فوق الحلقة الشرجية مثل سرك الهوك الذي يشبه الجلم .

١٣٥٣٦ - سرك (F). Perdrix (femelle) (F).

Partridge (female) (E).



سرق وودي



سرقاط زباعي الاصابع

الى السمرة الكستنية ، فكاهها غليظان . وهي سداسية
الرواسب ، ثلاثية الخالب الطرفية ، مجسرة الحلب الجانبي .

١٣٥٤٨ - سرموكود ^٥

Ovovivipare (F).
Ovoviviparous (E).
نمت تمرينى يطلق على الحشرات البويضة الوليدة كما في
بعض القزوينيات والذباب التي يتم حضان مكبها وتضعه
داخل الجسم عند طرف الانطوية .

١٣٥٤٩ - سرموج ^٥
هو غرغز الخنثى اي طرف المني المستقيم .

١٣٥٥٠ - سرموج ^٥
Ephippiger ephippiger (S).
Ephippigère, Porte-selle, Porte-hotte, Hottaux (F).
Ephippiger (E). Sattelschracke (D).

جندب من القزوينيات ثوبه الى الصغار الخنثى . طوله
٢٧ الى ٤٠ سم . كوسله كبير القدر مسروج ،
يملو تخليج متصابل اسمر اللون . زبانه دقيقتان
مستطيلتان . مرزه كالسيف شكله واستقامته . مجاديله
شدنية القصير . اجنحته ريشية . افخاذها كبيرة . سيقانه
دقيقة لا تمكنه من القفز المستمر . يكثر وجوده في المراعي
وبين الاعشاب وحل الارض البور . قوة الورد الاخضر .
وقد يركب الكروية فيقتضي حل عليها ويلبذها .

١٣٥٥١ - سرمكيات ^٥

Mégascoptères (F).
Megascoptera (E).
رؤية حشرات متفرقة من طبقة البفكيات . اسنودها
تعود الى الخفية الاخيرية من الاباج الاول المعروفة ايضا
بالخفية البرمية || اسنودها تقل عن ان حشراتها
كانت كبيرة القدر ، قضية الاجسام ، مفترسة كما هي
الحال عند البفكيات المعاصرة .

١٣٥٥٢ - سرمكان ^٥

Aeschna (S). Aeschna (F).
جنس حشرات مفترسة من السرميات . انواعه عديدة
تعيش قرب الماء قربها اللباب والحوام وبعضها يفتس
التحلل .

١٣٥٥٣ - سرمكان شائع ^٥

Gomphus vulgatissimus (S). Aeschna commun (F).
نوع من السرمكان طوله نحو ٥ سم . جوشه اخضر اللون
يملو تسليج اسود . يملك مستطيل الشكل يمتدحه يمتدح
اخضر . ارجله سود || يفتس اللباب والحوام والتحلل .

١٣٥٥٤ - سرمكيات ^٥

Aeschnidae (S).
Aeschnidae (F). Aeschnidae (E).
فصيلة حشرات من رؤية الفراشات . اجنحتها وانامها
عديدة تتميز بقوة طيرانها وبامتداد اجنحتها عند الراحة .
انثاهما تسمى في الماء الراكة فضلت يمكنها حل سطحه .
مسطها من الحشرات المليقة لانها تقتدر الحوام .

١٣٥٥٥ - سرموج ^٥

Lysimachia (S).
Lysimachia (F). Loosestrife (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الربيديات . انواعه
نحو ٥٠ مظهرها بري وبهضما ترينى . اوراقها متعاقبة
وسبها خضبة ثلاثية ار رباعية التسبيج . ازهارها حامية
الارتكاز ، عقدية متصبة او سبلية || منبها
البلاد الحارة والمعتدلة . ترغب في المواتع الرطبة . المشور
انواعها ما يتبع .

Sarcode (F). Sarcode (E).
١٣٥٤١ - سرموكود ^٥
السرموكود مادة حيوانية عادمة الاغشية والشرابين .

١٣٥٤٢ - سرموكوفيل ^٥

هي ذبابة السم ، اطلبها .

١٣٥٤٣ - سرموكوك ^٥

Sarcococa (S).
Sarcococque (F). Sarcococca (E).
جنس جنباث معمرة من فصيلة البقياس . موطنها الشرق
الاقصى . سيقانها فروع متصبة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم .
ازهارها صغيرة لاقائية الشكل . ازهارها وحيدة المسكن
صفراء اللون . ثمارها نورية .
انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٣٥٤٤ - سرموكوك مسكندري الورق ^٥

Sarcococca ruscifolia (S).
Sarcococque à feuilles de fragon (F).

نوع من السرموكوك . ساقه متصبة تملو نحو ٢٠٠ سم .
اوراقها لامعة تتصل تطول من ٣ الى ٥ سم . ازهارها صغيرة
الاحمر ، صفراء اللون الباحت . ثماره كروية الشكل
حمر اللون ، متينة اللحم .

١٣٥٤٥ - سرموكوك صفصافي الورق ^٥

Sarcococca saligna (S).
Sarcococque à feuilles de saule (F).

نوع من السرموكوك . ساقه زهاب اللحاء متصبة تملو من
١٢٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها شبيهة باوراق الصفصاف ،
تطول من ١٠ الى ١٢ سم . ازهارها الى الصفار الكبريتي .
ثماره بيضيه الشكل ، ارجوانية اللون .

١٣٥٤٦ - سرموكوك هوكر ^٥

Sarcococca Houkeriana (S).
Sarcococque du Houker (F).

نوع من السرموكوك . ساقه تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم .
اوراقها احليجية الشكل تطول من ٥ الى ١٢ سم . ازهارها
الى الصفار الباق . ثماره نصف كروية الشكل سيدة
اللون .

١٣٥٤٧ - سرموكوكه بتسفيجية ^٥

Cerocoma violacea (S). Cérocôme violet (F).
Cerocoma violacea (E).

حشرة طيبة واثقة غاشلة وانجمت من فصيلة الملوذيات ورؤية
الحرازة من اعمار القديم . تألف البراري . خنافسها تعيش
على ازهار فصيلة المركبات . يرقاتها والجمه تعيش على ما
تستطيع اقتحامه من الدب والمكن || جسمها متوسط القدر
يطول من ١٢ الى ١٤ سم . ثوبها الى الزرقه البنفسجية
يملوها موانج اخضر . رأسها مستدير الشكل . زبانهها
صنوبريات . عندها صغيراتان . ظهورها مستدير الخلف
اللاصق || من ميزاتها انها تنقرز عنه لسها مادة صفراء
اللون كريمة الرائحة . وان جهازها اللسوي وشوارها يحرقان
مادة نائلة تهيج الجلد وتضر الباه والايلاج . وهو ما يجعلها
من الحشرات الطيبة . اما نسبة اللدابين الموجودة فيها
فتراوح من ٩٠ الى ١٪ || الاثني ابرز قدام من الذكر
واجهت ثوبها منه وادخس يملو || لها جيل واحد في الحوط .
تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتعيش حتى اواخر
تموز . تحرق في اهاب || البرقة تطول نحو ٢٠ سم .
جسمها مبسط الشكل ، اسمر اللون ، اغبر اللون . رأسها



سرموكوكه بتسفيجية



سرمكان



سرمكان شائع



سرموج

ممتعة ، متعاقبة ، كبيرة اللقد ، شاربة ، قلبية الشكل .
نصلها حديد المروق ، كثير التجميع ، لونه الى الخضرا
المايق || اوراقها تستعمل استعمال السبانخ . اما يزورها
قلبية سهلة وبقية .

١٣٥٦٤ - سَمَرَج بَحْرِي * ، قَطَف بَحْرِي ،

حلم
Atriplex halimus (S).
Arroche marin, Pourpier de mer, Halime (F).
Sas-orache, Ses purslane (E). Meerportulak, Ständ-
melde (D). Porcellana marina, Disciplina
fratrup, Malochia (I).

جنية برية غشوية تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم.
رغب في المواقع الساحلية الشرقية على البحر . اوراقها
مأكلة وقد تخلل . يكثر استهلاكها في بعض المناطق
الاسبانية والانكليزية .

١٣٥٦٥ - سَمَرَج بَرِّي * ، قَطَف بَرِّي

Atriplex hastata (S). Arroche des champs (F). Wild
orache (E). Spissmelde (D). Atriplex astata (I).
عشبة برية حولية تكثر في الحقول المزروعة . اوراقها
مستطيلة سنانية . ترعاها الماشية ليحسن حالها ويجيد
درا .

١٣٥٦٦ - سَمَرَجِيَّات

Chenopodiaceae, Salsolaceae, Atriplicaceae (S).
Chenopodiaceae, Salsolaceae, Atriplicaceae (F). Chen-
opodiaceae, Salsolaceae, Atriplicaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجناسها وانواعها عديدة .
اصطلاحها البلاد للمتلة الحارة . جميعها اشباب وجينات
بعضها يرغب في السبانخ المالحه .

١٣٥٦٧ - سَمَرَجِيَّات * Dictyoptera (S).

Dictyoptères (F). Dictyoptera (E).
رتبة حشرات تنتمي الى طبقة الوردانيات ، تشمل عدة
فصائل اشهرها بنات وردان والسرغويات . اجناسها
وانواعها زهاء ٤,٠٠٠ اكثرها من حشرات البلاد الحارة
وبعضها يعيش في البلاد المعتدلة .

١٣٥٦٨ - سَمَرَجِيَّات Strombus gallus (S).

نوع من الدلائع يكون منه افطار الطيب .

١٣٥٦٩ - سَمَرَجَة * ، مَكِينَة * ، (سَكان المَكِينَة)

Carlinche (S). Cérinche, Mélinet (F). Honeywort (E).
جنس نباتات عشبية مثالية طرية برية حولية او معمرة
من فصيلة المصحيات . انواعها المعروفة نحو ١٢ . جميعها
اشباب فراء . اوراقها متعاقبة حافسة بحرية القوية .
ازهارها سنبلية التجميع ، صغيرة اللقد ، صفراء اللون اورادية .
تفرز رسيقا حلي المادة يحمره النمل || اوراقه طيبة
تستعمل في علاجات العين . يزود تسكين للمصن ولبواع
الجنب والظهر . وفرقة منه مع الزعفران والبصل يمد
الظهر تين على الحمل . وهو يبيع الباء || اشهر انواعه
ما يلي .

١٣٥٧٠ - سَمَرَجَة خَشَنَة * ، مَكِينَة خَشَنَة *

Cérinche aspera (S). Cérinche rugueuse, Mélinet
rugueux (F).

نوع من السمنة المثمرة للبرية الحولية . عشبتها تملو
من ٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها اعليجية الشكل . اذيتها

١٣٥٦٩ - سَمَرَج رُبَاعِيّ الْوَرَق

Lysimachia quadrifolia (S). Lysimache à 4 feuilles (F).
نبات معمر بهذه امريكة الثبالية . يملو من ٣٠ الى
٩٠ سم . ساقه زبابة . اوراقه متعاقبة ، لاطئة ، ضمية ،
رباعية . نصلها اخضر اللون على صفحته . ازهاره كبيرة
اللقد ، فريدة ، اعطية الارتكاز ، طويلة الزنادة متدلية .
لونها الى البياض التي || ازهاره يستمر من حزيران
الى آب .

١٣٥٧١ - سَمَرَج سَالِك

مشهور باسم سراجية . اطليا .

١٣٥٨ - سَمَرَج عَكِيظِيّ

Lysimachia atropurpurea (S). Lysimache pourpre-
noir (F).

نبات حولي او حول يملو نحو ٦٠ سم . ساقه سرسة .
اوراقه متعاقبة اعليجية . نصلها مائل البشرة ، اخضر
الصفحة العليا ، طابق السفل . ازهاره متوسطة الكثافة
متدلية . لونها الى الحمر العنقية || ازهاره يستمر
من تموز الى ايلول .

١٣٥٩ - سَمَرَج مِرْوَال

Lysimachia ephemerum (S). Lysimache éphémère (F).

نبات معمر يملو نحو ١٥٠ سم . ساقه سرسة . اوراقه
لاطئة ، متعاقبة ، سنانية . نصلها بحري اللون . ازهاره
عنقودي ، منتصب ، مستطيل . ازهاره صغيرة اللقد
بيضاء اللون || يزهر من تموز الى آب . يرغب في الارربة
الكلسية .

١٣٥٩٠ - سَمَرَج مُسَبِّل ، سَمَرَج عَيْشِيّ

Lysimachia barystachys (S). Lysimache à gros
épis (F).

نبات سرهوي معمر بهذه العين . يملو نحو ٦٠ سم .
ساقه زبابة . اوراقه متعاقبة اعليجية . نصلها خلي البشرة
اخضر الصفحة العليا بحري السفل . ازهاره سبل الشكل
كثيف التجميع . ازهاره صغيرة اللقد بيضاء اللون || يزهر
من حزيران الى تموز .

١٣٥٩١ - سَمَرَج مَوْشَم

Lysimachia punctata (S). Lysimache ponctuée (F).

نبات معمر يملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ساقه زبابة .
اوراقه متعاقبة ضمية ثلاثية او رباعية التجميع . نصلها
سناني الشكل ، خلي البشرة على صفحته . ازهاره صفراء
اللون يعلوها تيجيح اخر وتهدب وودي || ازهاره
يستمر من حزيران الى تموز .

١٣٥٩٢ - سَمَرَجِيّ ، قَطَف Atriplex (S).

Arroche (F). Orache (E).
جنس نباتات برية ، عشبية حولية او غشوية معمرة
من فصيلة السمرجيات . انواعها عديدة منتبها الاقاليم
المعتدلة . ساقها غزيرة المصارة القوية الزجة . اوراقها
متعاقبة . ازهارها قياسية متباينة الالوان || اشهر انواعه
ما يلي .

١٣٥٩٣ - سَمَرَج اَبْيَض * ، قَطَف اَبْيَض

Atriplex hortensis (S). Arroche des jardins, A. épi-
nard, Belle-dame, Bonne-dame, Chou d'amour, Follette (F). Orache, Butter leaves, Mountain spi-
nach (E). Gartenmelde, Grünkraut (D). Atriplex,
Spinachon, Belle dame, Bietons (I).

بقلة زراعية حولية تملو من ٩٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها



سَمَرَج اَبْيَض



سَمَرَج بحري



سَمَرَج بري



سَمَرَجَة

الاسجام قطرها من ١٠ الى ٥٠ مليكريون. اشهرها واعما انتشاراً يورس Y ويورس A ويورس X ويورس S ويورس Z ويورس M. كل منها يشكل غرباً منفرداً له ميزاته الخاصة. جميعها مؤذية لتعلب الارواك والسوق والاسفال. وفي من الارصام المتحصنة الي حيز البلم حتى الآن من مائلتها وانقضاء عليها. فارقاً ما يجنب البذار الملوث والارثة للميوعة وقرارات المائلة القريبة هي غير حاية مستطاعة الآن .



سرج البطاطا

١٣٥٧٧ - سَرْتَجَة التَبَاق * Mosaïque du tabac (F). Mosaic disease of tobacco (E).

نوع من السرج تسببه يورس مركبة قصية الشكل تطول من ٢٠ الى ٧٠ مليكريون تنتقل مع السنج الى سائر اعضاء النبات اغصان الارواك والساق || مظهره الخارجي، جل الارواك القمية، بقع عابطة وبهات لاتيامة الشكل والارتبب تملو صفحة التصل وتغويه الى مختلف الاشكال التشوية القريبة اغصان الاستطالة والتفرغض والتجعيد والاكشاش. وانذا اضرى الارواك بعد اكثال نموها يبقجها دون ان يشو شكلها .



سرج التبغ

١٣٥٧٨ - سَرْتَجَة * Philadelphus (S). Syringa (F). Syringa, Mock orange (E). Jasminier, canarouch, Falscher Jasmin (D). Strina, Fior d'angiolio, Pasionza (I).

جنس شجيرات رية ورتيئة من فصيلة اليفرسات (الليليات). انواعها نحو ١٥ موثقاً فردها. فريضا متقابلة. اوراقها عابطة، معققة، متقابلة، يضيبة التصل المسن الحافة || ازهارها كبيرة القد، جملة الشكل، عطفلة التجميع، انقية البتلات اللبسة وكثرة الاسدية، يضاء اللون، يعضها فواح العرف المشع للشمل القصار || اشهر انواعها اليرتيئة ما يبع .

١٣٥٧٩ - سَرْتَجَة زَيْبَة * Philadelphus hirsutus (S). Syringa hirsuta (F).

شجرة سريوية مهددا امريكة الشالية . تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها تطول من ٣ الى ٦ سم. نصلها مشاري الحافة، خلي الصفحة السفلى || ازهارها عادمة العرف، يضاء اللون قطرها نحو ٣ سم || تزهر في حزيران .

١٣٥٨٠ - سَرْتَجَة شاكمة * Philadelphus coronarius (S). Syringa commun (F).

شجرة سريوية حديثة الشربو مهددا القوقاز واربزية . تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها تطول من ٧ الى ١٢ سم. نصلها ساني الشكل، مائل الصفحة العليا، خلي السفلى، مهدب الحافة || ازهارها فواحة العرف، يضاء اللون، خاسية التجميع، كبيرة القد، قطرها نحو ٤ سم. || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .



سرتجة

١٣٥٨١ - سَرْتَجَة صَغِيرَة الْوَرَق * Philadelphus microphyllus (S). Syringa à petites feuilles (F).

جنية زفية مهددا امريكة الوسطى . تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها سنائية تطول نحو ٣ سم. نصلها ازغب الصفحة السفلى . عادم للتسني || ازهارها صغيرة القد، مرفية الرائحة، يضاء اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف .

مستطيلة . نصلها مهدب الحافة المسنة، مدرن البشرة على صفحته . ازهارها متدلية، تويجها اربوانية اللون، صفر الالوان || ازهارها يستمر طوال شهر تموز .

١٣٥٧١ - سَرْتَجَة صَغِيرَة * حشيشة البرسيم (لسان العصفور الصغير) Cérinthe minor (S). Cérinthe petite, Mélilot minor, Petit mélilot (F). Small honey-wort, Waxflower (E). Gelbe wachablume (D). Erba violas (I).

نوع من السرته المشرية البرية وفي حبة محولة تملو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها مستوية الاذنات، يضيبة الشكل. نصلها مدرن الصفحة العليا. ازهارها الى اصفار الكريبي يطلوها عند قواعدها تبقج خالي المد ابيض اللون او احمر . ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٣٥٧٢ - سَرْتَجَة هَالِسَة * Cérinthe glabra (S). Cérinthe glabra, Mélilot glabre (F).

نوع من السرته المشرية للمصرة . يجلتها تملو نحو ٤٠ سم. اوراقها يضيبة الشكل، دقيقة الاذنات، نصلها مائل البشرة على صفحته . ازهارها ذهية اللون عجة القصوس . ازهارها يستمر من ايار الى آب .

١٣٥٧٣ - سَرْتَجَة مَقَارِبَة * Cérinthe retorta (S). Cérinthe retournée, Mélilot retourné, M. de montagne (F). Honey-wort (E). Wachablume (D). Cerinthe (I).

نوع من السرته المشرية البرية وفي حبة سوية تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم. اوراقها مستوية الاذنات، اهليجية الشكل. نصلها مدرن البشرة على صفحته . ازهارها صفر التريجات، ينسجبة القصوس || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٣٥٧٤ - سَرْتَجَة مَلَطَحَة * Cérinthe maculata (S). Cérinthe maculée, Mélilot maculé (F).

نوع من السرته المشرية للمصرة . يجلتها تملو من ٦٠ الى ٧٠ سم. اوراقها اهليجية مستطيلة، اذناتها مستديرة . نصلها مدرن الصفحة العليا . ازهارها نارية اللون يملوها عند قواعدها نصوسها تبقج ازرق || ازهارها يستمر طوال الصيف .

١٣٥٧٥ - سَرْتَج * Mosaïque (F). Mosaic (E).

جنس اوصام يورسية فتاكة الاانواع حديدة تصيب نباتات نؤذيه وقد تقضي عليه . يورسا ذرية القعد لا تشاهد بالبحار العادية لان طولها يراوح من ١٠ الى ٦٠ مليكريون . وفي تمش داخل السنج النباتية وتنتقل اليها مع السنج بواسطة الجروح والاغاديش والخرشات القاضية والماسمة || اشهر انواعها واضرها سرج البطاطا والتبغ والبندورة والشيك .

١٣٥٧٦ - سَرْتَج الْبَطَاطَا * Mosaïque de la pomme de terre (F). Mosaic of potato (E).

نوع من السرج تسببه يورس اسطوانية الشكل مختلفة

١٣٥٨٢ - صَرْجَة عَادِيَة العُرْف

Philadelphus canadensis (S). *Deutzia corymbosa* (S). *Seringa inodora* (F).

شجرة سبروتية مهددة أمريكية الثنائية . تملو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها بيضيه مديبة المقصه ، تطلو من ٦ الى ١١ سم . نصلها من الحافة ، خلي العروق || انزاعها عمدة العرف ، و ترة التجميع ، فردية او ثنائية ، قطرها نحو ٤ سم . لونها الى البياض المالحى || انزاعها يستمر من ٤ الى ٥ أسابيع ابتداء من اوائل ايار .

١٣٥٨٣ - صَرْجَة كَبِيرَة الزَهْر

Philadelphus grandiflorus (S). *Seringa à grandes fleurs* (F).

شجرة وفية مهددة أمريكية الثنائية . تملو من ٤ الى ٦ أمتار . اوراقها بيضيه تطلو من ٨ الى ١٤ سم . نصلها مائل للثيرة ، منشاري الحافة || انزاعها قليلة العرف ، يضاء اللون ، كبيرة اللد ، قطرها نحو ٦ سم . نتائجها الزهرية مستقلة قليلة الكثافة || انزاعها يستمر من نيسان الى ايار .



سَرُو ف صياد

١٣٥٨٤ - صَرْجَة مَكْسِي كَة

Philadelphus mexicanus (S). *Seringa mexicana* (F).

شجرة سبروتية مهددة المكسيك تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها حرة صلبة اللد تطلو نحو ٥ سم . نصلها جلدي الصفة من الحافة || انزاعها غريبة الرائحة ، يضاء اللون بعلها ، عند انتشاب بتلاتها ، من الداخل ، تنمش ابيوانى || انزاعها يستمر من حزيران الى تموز .

١٣٥٨٥ - صَرْجَاتِيَّات

Paleoptera (S). *Paleoptères* (F).

شعبة سحرات من طائفة الحشرات أصلاً . تشمل حالياً طليتين وأربع رتبة تعريفها ما يلي :

١ طبقة البليات التي تشمل رتبة الأفيقيات ورتبة الزسرفيات .

٢ طبقة الرعسيات التي تشمل رتبة الجحليات ورتبة الرخاشات .

١٣٥٨٦ - صَرْفُون

Balbusard (F). *Bald buzzard* (E).

السرفون ج سرائف ، جنس طير من العقيان وفضيلة الصقريات . انواعه عديدة جميعها من القواطع : اجنسها مستقلة ذلقة . منارها قوية ، شديدة الانحناف وحبية البرة الذرية || يالغ الاخر والجحرات والظطوط البحرية . قوته الامساك ، يثن منه في الاشجار الزلية او حل الصغور الناتية قرب مجاري الماء . اناته تحسن وجدا من ٣ الى ٤ وفئات نحو الشهر || اشهر انواعه واخرها السرفون السيد .



سَرْفِيَّ مَجَل

١٣٥٨٧ - صَرْفُون صَيَّاد * ، صَرْفُون مَحْمَرِي ، عَقَاب ثَسْرِيَة

Pandion haliaetus (S). *Balbusard pêcheur*, *B. fluviatile* (F). *Aspray* (E).

نوع من السرفون ربع الجثة طوله يراوح من ٥٥ الى ٦٥ سم . ريشه من ١٣٠ الى ١٤٠ سم . رأسه وصغره ويطه ييض . صدره مديج ونشش . ظهرو الى السرة ذبه مجاز يستطو صَرْفَة متساوية . عيناه الى الصفرة الباقية . مناره وخالبه سود || يالغ الظطوط البحرية ومجاري الماء . قوته الامساك .

١٣٥٨٨ - صَرْفِيَّ

Cirrhites (S). *Cirrhite* (F). *Cirrhites* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السرفيات . انواعه المعروفة ستة ، اصطلح المحيط الهندي والبحر الاحمر || اجسامها احليلجية الشكل تطلو من ٢٥ الى ٣٥ سم . جميعها فردية الزمانف الظهريه المستطيلة الكثيرة المناخس . زمانفها للشرجية ثلاثية المناخس الحادة . اقلها متباينة الالوان منها الاصفر والاشهب والاصفر البحري والاحمر والاريد الرصاصي ، جميعها مزودة الظهور والجوانب || اعرف انواعها واشهرها السرفيت المجدع .

١٣٥٨٩ - صَرْفِيَّ مَجْدَع

Cirrhites maculatus (S). *Cirrhite maculé* (F).

نوع من السرفيت . اصطلح البحر الاحمر . تعيش قرب الجحاف . ملجئها الحيائي جماعي . معانها متوسطة اللد || جسمها احليلجي الشكل ، مستغل التلطيط ، يطلو نحو ٣٥ سم . رأسها خافت الجبهة ، اسفر اللون يطلو تنقيط اسفر . خلفها قصير . شفتها دون البسط . عينها كيرتان ، مستديرتان ، ناشرتان . زعنفتها الظهريه مستطيلة ، قاطبة ، القسم الامامي منها تساعي المناخس الختالية الطوك ، المرفقة بالجفوي . زعانفها الصدرية والحوضية كبيرة . زعنفتها الشرجية ثلاثية المناخس المنسقة الحادة . زعنفتها الذيلية مقبضية الطرف || لونها الى الشبهة ، بعلها في ظهروا وجانبها يتيج وتجميع اسفر || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٣٥٩٠ - صَرْفِيَّات

Cirrhitidae (S). *Cirrhitidae* (F). *Cirrhitidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من شاتكات الزمانف . اجنسها وانواعها المعروفة عديدة جميعها من اسماك مجاز المناطق الحارة || اسماكها مستقلة اللد ، احليلجية الشكل ، تطلو من ٢٥ الى ٣٥ سم . سفنها صغير الحجم مستدير الشكل . زمانفها الظهريه والشرجية تحمل مناخس سادة || اعرف اجنسها واشهرها السرفيت .

١٣٥٩١ - صَرْو

Cupressus (F). *Cypress* (E). *Echte cypresse* (D). *Cipresso* (I).

جنس اشجار حرجية وزيينية من سبط السرويات وفضيلة الصنوبريات . انواعه نحو ١٥ تحليلها الجسدية العامة ترتكز على الميزات التالية : بانثاقها مرفوقة ، راعمها مغطاة بالاوراق . اوراقها حرة ، فلسية ، متعاقبة ، مفلوقة ، مرسوسة على اربعة صفوف وهي ساعدة القاعدة والزام الاول || انزاعها طرفية وحيدة اللغ والمسكن ، والدكرية منها كثيرة الاسدية وحبوب اللوغ || ثمارها اكرار كروية الشكل تتألف من جراحات صغيفة ، ليفية ، جامدة يراوح عددها من ٦ الى ١٤ || يزورها صغرة مجننة لا قياسية الشكل والحجم || اشهر انواعه ما يتبع .

١٣٥٩٢ - صَرْو أُرِيُونَة

Cupressus arizonica (S). *Cypress de l'Arizona* (F).

شجرة سبروتية سرية النمو مهددة اريون من احوال امريكية . تملو من ٢٥ الى ٣٥ م . بانثاقها دقيقة ، لاقياسية الانظام . اوراقها رائحة ، فلسية ، شديدة اللعسر ، لونها الى الخضار الزرق . رعمها ولتحي ابيض اللون . انزاعها الذكرية كبريتية اللون اما الانثوية

١٣٥٩٨ - سُرُو مَكْنَاب

Cupressus macnabiana (S). *Cypress de Mac Nab* (F).
شجرة جادسة بطيئة النمو معها كليلفونية. تملو
٢٥ الى ٣٠ م. وهي بجلة الشكل شائعة الانتشار في
تجدي في جميع الاراضي ولا تحشى الكلسية.
١٣٥٩٢ - سُرُو بِحْرِيّ الْوَن

Cupressus glauca, *C. lusitanica*, *C. coulteri* (S). *Cypres glauque*, *Cèdre de Goa* (F).
شجرة سبروتية في الاقاليم الحارة ، جادسة في المعتدلة
مدها المكسيك . تملو من ٢٥ الى ٣٠ م. بناتها
نظمية ، رباحية الاضلاع ، بحرية اللون. اوراتها
مدنية عادمة الرشح الراتنجي بحرية الخضار . ازهارها
الذكورية صفراء اللون يملوها مواج اويولي اما الانثوية
فال الزهرة للمزوجة بالبنفسجي || اكرازها صغيرة
بنفسجة الشكل لونها الى الجوزة القاتعة || تجدي في جميع
مواقع ساحل البحر المتوسط وفي كل تربة .



سرو شائع

١٣٥٩٩ - سُرُو تَحِيْس ، سُرُو الْفَكَايِر

Cupressus funebris (S). *Cypress pleureur*, *C. funebre* (F).
شجرة سبروتية سريعة النمو . مدها الصين . تملو من
٢٥ الى ٣٠ م. بناتها نظمية ، مبطلة ، بجلة الخضار
الباهت . اوراتها مدنية ، شديدة الخضار الزاهي . اكرازها
صغيرة قطرها نحو ١٢ م. جراحاتها من ٦ الى ٨ لونها
الى الزبدة البسراء || تجدي وتنمو في جميع الاراضي .

١٣٥٩٤ - سُرُو تَحْلَايَا

Cupressus torulosa (S). *Cypress toruleux* (F).
شجرة سبروتية في الاقاليم الباردة والمعتدلة ، جادسة في
الاقاليم الحارة . مدها حلايا . تملو من ٢٥ الى ٤٥ م.
بناتها نظمية ، كياسية ، دقيقة اللد ، فسفتية اللون .
افتادها وخرابيحها متدلية . اوراتها شديدة الصفرة عابقة
الخضار . ازهارها الذكورية صفراء اللون اما الانثوية
فال الزهرة البنفسجية . خشبها احمر اللون تلم الرقعة .
اكرازها صغيرة . جراحاتها مقرنة || لها قربان مهوران .
Cupressus torulosa corneyana, *C. tor. majestica* (S).

١٣٥٩٥ - سُرُو فَسَاك

Cupressus sempervirens (S). *Cypress commun* (F).
شجرة سبروتية سريعة النمو مدها عوض البحر المتوسط
فروجا عديدة تملو من ٢٥ الى ٣٠ م. بناتها دقيقة ،
غيراه اللون ، لاقياسية الارتكاز . اوراتها نظمية ،
شديدة الصفرة ، عابقة الخضار ، راتنجية الرائحة . قطر
كرزها يراوح من ٣ الى ٤ م. ومدد جراحاته من ٨
الى ١٤ || اقلها المناطق الحارة والمعتدلة . لا تتحمل
كثرة الصقيع واشتراره . تجدي في جميع الاراضي . تفضل
الري . تتحمل لحد الرياح || فروجا المشهورة
حسة ، اسمها العلمية ما يلي :

Cupressus sempervirens contorta, *C. s. fastigiata*,
C. s. horizontalis, *C. s. thuyaeifolia*, *C. s. variegata* (S)

١٣٥٩٦ - سُرُو كَشْمِير

Cupressus
cashmiriana (S). *Cypress du Cachemire* (F).
شجرة زهية بطيئة النمو مدها الهند والباك . تملو من
١٥ الى ٢٥ م. بناتها نظمية بحيلة دقيقة . اوراتها
بحرية الخضار . افتادها وخرابيحها متدلية الاطراف .
اكرازها كروية قطرها يبلغ ١٥ م. جراحاتها من ٨
الى ١٢ لونها الى الخشنى الباهت || تعتبر من اجل
الانواع التي يذنب كنها قليلة الانتشار نظرا لخطابها
الترية والمؤقتة .

١٣٥٩٧ - سُرُو كَلِفُونِيَّة

Cupressus goveniana (S). *Cypress de Californie* (F).
شجرة جادسة بطيئة النمو مدها كليلفونية . تملو من
١٥ الى ٢٥ م. بناتها بحيلة ، قصيرة ، جالسة الانتعاش .
اوراتها عابقة الخضار . اكرازها كروية قطرها نحو
٢ م. جراحاتها حمراء اللون يملوها مواج بنفسجي لامع .



سرو كليلفونية

Chitridinae (S). *Chitridinées* (F). *Chitridinae* (E).
مرتبة من رتبة الفطور البيضاء تشتمل على فصليتين
الصفريات والمولقيات .

Oolithe (F). *Oolithe* (E). *١٣٦٠٣ - سُرِيَّة*
آربة كلسية مسوبة الى الجوزية ذاتها كسر السلك .
اشهرها .

Oolithe blanche (F). *White oolithe* (E). *سُرِيَّة بِيضَاء*
Oolithe ferrugineuse (F). *سُرِيَّة حديدية*
Ferruginous oolithe (E). *سُرِيَّة دَحْنِيَّة*
Oolithe miliare (F). *Miliary oolithe* (E). *سُرِيَّة كَبِيرَة*
Oolithe grande (F). *Big oolithe* (E).

Lapiaz, *Lapiez* ١٣٦٠٤ - *سُرِيَّة* ، *لَيْبَاز* ١٣٦٠٥ - *سُرِيَّة*
دبار طبيعي لاقياسي المسق والاساع بخد مسطح انشور
الجملي . ج اسرية .

Criquet (F). *Locust* (E). *١٣٦٠٥ - سُرِيَّة*
هو الجراد من اي جنس او نوع كان .

Cerithium (S). *١٣٦٠٦ - سُرِيَّة*
Cérithie (F). *Cerithium* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدليات الاريل
وقصيلة السريريات . انواعه للرغوة كثيرة العدد بعضها
من متحجرات الانسحاب الاول وبعضها محاسر منتشرة في
جميع مجار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها متباينة
الاشجام ، جميعا غروبية حلزونة وبشرة التشنيد القوي .
الواها سوية تلتب لها الخضابات القاتعة .

Rigole (F). *Trench* (E). *١٣٦٠٧ - سُرِيَّة*
جري ماء الساقية أو الري .



سُرِيَّة



سُرِيغ



سُرِكَة



سُرِيُولَةُ الْخُرْطُوط



سَطَائِس الْمَنَاقِعِ



سَطَائِس جِرْمَانِي

١٣٦٠٨ - سُرِّيَّاتٌ ٥ Cerithiidae (S).

Cérithilidae (F). Cerithiidae (E).

قصيلة من الرغويات مديات الارجل مشطيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من محسرات الاخشاب الاول والبعض الآخر مامس منتشر في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اصنافها خرطوية عازنة ، قريبة القوابل الفاترة ، مفرغة الاغادي ، شبه مستديرة القوفا المنحنية بنحو يحسي الرأس || اعرف اجناسها واشهرها السريت والسرتونه والسرتونة والسنتوية والبيطس .

١٣٦٠٩ - سُرِيغ هو البرواق ، اظله .

١٣٦١٠ - سُرِيغٌ * Didelphus (S). Sarigue (F).

جنس حيوانات راسمة من الجرابيات . انواعه المعروفة ٤٠ موطنها امريكا الوسطى والجنوبية . اجسامها مستطيلة الشكل طولها يراوح من ١١ الى ٥٦ سم . وذنانها من ٧ الى ٣٨ سم . وذيها اسطوانية . اذنانها كبيرة مستديرة . اصنافها غليظة . جرابزها قصيرة . اظفارها سادة . اذنانها اخاذة ، مستطيلة ، كاسية الزمام الاول حشفية الثاني والثالث والزايع || اجرة انثا كبيرة لقد مطالعة . امباروها وربة الترتيب يراوح عددها من ٧ الى ٢٥ . محبل الاثني بدوم ٢٥ يوما تنقص على اثره من ٤ الى ١٦ درصا . وفي من الحيوانات الشائعة تسرح في الليل . قوتها الحشرات عسل اختلاف انواعها والزخافات مع الافاعي والصائير . ويضها والثار السكرية عند الحاجة .

١٣٦١١ - سُرِيغ هو الصف من الكرم . راجع سربة .

١٣٦١٢ - سُرِيكَة ٥ Serica (S).

Sérique (F). Serica (E).

جنس حشرات خافضة من عديدات الاجنسة صليبيات للقرن ونصفه الحديث . انواعها المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها مغلطمة ، شبه اطيالية الشكل ، معدبة الرأس والكوكس والشد ، تطول من ١٤ الى ١٨ سم . وروسيا مستعمرة . متاكها كفاضة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية مرققة ، صليبية الاطراف . اعانها ععدة لاسحة . قوائمها نشيطة ، متصلة الفخانة . انثاها وحيدة اللون السوي يكثر فيها الكسني ثم الاصفر والاسود والاسمر ، جميعها سماء المواج || تعيش على المواد النباتية المختلفة .

١٣٦١٣ - سُرِيُولَة ٥ Seriola (S).

Sériole (F). Seriola (E).

جنس اسماك بحرية من الاسمريات شائكات الزعانف . انواعها المعروفة نحو عشرة . اصنافها بحار البلاد الحارة وللمعتدلة الحارة || اجسامها كبيرة القد ، اطيالية الشكل ، تطول من ٥٠ الى ٩٠ سم . القوابل الى الرتبة النفسية المواج تميم وتشتد سميتها مع الاتراب من ثبح الظهر وتزهر وتبيض عند البطن . زعنفتها الظهرية مستطيلة منقسمة الى جزئين لامتداوين ، الجزء الخلفي نظامي مستطيل ، الجزء الامامي صغير القد ، ناشر المناسخ اعنها المنخس الامامي المؤذي لطح الرأس . زعنفتها الذيلية فارقة || اشهر انواعها واهرها سُرِيُولَةُ الْخُرْطُوط .

١٣٦١٤ - سُرِيُولَةُ الْخُرْطُوط ٥

Seriola dumertii (S). Sériole de la Méditerranée,

S. argentée (F). Silver seriola (E).

نوع من السُرِيُولَة . سمكة بحرية يبيض . اصنافها البحر

الايض المتوسط . مسرعا يمي ولا تقترب من التقاف والحادح الا في الربيع والخريف || جسمها اطيالي الشكل يطول من ٨٠ الى ٩٠ سم . قوابل الى الرتبة النفسية تزرق وتشتد زرقتها عند الظهر وتزهر وتبيض عند البطن . رأسها مستطيل الجرم ، قصير الخطم . عينها كبيرتان . فكها الاسفل يتقدم الاعل . اسنانها كثيرة العدد . زعنفتها الظهرية مستطيلة منقسمة الى جزئين لامتداوين . الجزء الامامي ونحي الشكل ناشر المناسخ الحادة اعنها الاول المنطقت اقترابا نحو الرأس . الجزء الثاني نظامي الشكل ، عادم المناسخ . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٣٦١٥ - سُرِيكَة ٥ Euvé (F). Hard-raed (E).

كل سمكة اثني لا يزال جرابها الشلبي مئذ بالسره تمت بالسريرة .

١٣٦١٦ - سُرِيُولِيكَة Sociologie (F).

Sociology (E).

السيولوجية علم يبحث في الجماعات البشرية وفي المناسخ الاجتماعية .

١٣٦١٧ - سَطَائِكَة

وهجرة تنبت في الديار في اطنان المياه ترعاها الماشية وينسل بورتها الرووس « (السان) .

١٣٦١٨ - سَطَائِيغِيَس هو السطائس ، اطله .

١٣٦١٩ - سَطَاع Pillar (F). Pillar (E).

كل عمود فالت ترتكز عليه السلطنة واسمها .

١٣٦٢٠ - سَطَائِقِس ، سَطَائِيغِيَس Stachys (S). Epiaire (F).

جنس نباتات برية وتربينية من نسيلة الشفويات . انواعها زهاء ٢٠٠ معظمها عشبي وبعضها جنبي . سوطها فرها . اوراقها كاملة ، متعاقبة ، منقطة . ازهارها سلبية التجميع تاجية الازتكاز اكثرها عطرة || اشهر انواعها يتبع .

١٣٦٢١ - سَطَائِقِس الْمَنَاقِعِ

Stachys palustris (S). Epiaire des marais, Ortie des marais, Ortie morte (F). Marsh botony, Clown's all-heal, Marsh wound-wort (E). Sumpfziest (D). Scabiosa palustre, Spigo fiorito (I).

نوع من السطائس وهو عشبة برية متعاقبة تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها فرها . اوراقها مقطوعة . ازهارها ارجوانية اللون . تستعمل في تطيب بعض الملل الجملدية .

١٣٦٢٢ - سَطَائِس جِرْمَانِي * ، قَكَه ، وَرْطُورَة Stachys germanica (S). Epiaire de Germanie, Sauge molle, Stachyde, Epi fleuri (F). German stachys,

Downy wound-wort (E). Deutscher ziest, Ziest (D). Stachide germanica, Spica fiorita, Madre salvia (I). نوع من السطائس وهو عشبة برية وتربينية معمرة . تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقها مفصلة زياء الحذاء . اوراقها قليلة القمامة . تصلها خلي البشرة ، مسن الحافة . ازهارها وديدة اللون ، فضية السلة الزباد || ازهارها يستمر من سوزران الى ايلول .

١٣٦٣٣ - سَطَائِسُ سَبْيِي * ، إِوْلَقِيَّة ،

سَطَائِسُ

Stachys recta, S. procumbens (S). Plaire droite, Crapaudine (F). Upright hedge nettle (E). Bergzieg (D). Erba giudaica (I).

نبات عشبي طيب يري معمر من السطائس . يعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم . ساقه قليلة الفروع زينة العلاء . أوراقه سنانية . نصلها خالي البشرة يبدو كأنه فني . ازهاره مستطيلة الشكل كثيفة زغبية || كان شائع الاستعمال الطبي وقد اعمل لكراهية رائحته .

١٣٦٣٤ - سَطَام * Origne (F). Origin (E).

هو الاصل ج سلم .

١٣٦٣٥ - سَطَام * ، أْبُر مِلَقَط * Anastomus (S). Anastome (F). Anastomus (E).

جنس طير من طوأل الساق وفضيلة القتالي . أزواره المروقة قليلة العدد اصطناعا ببعض مناطق أفريقيا الوسطى والشرقية والهند وجزر الأراج . ملجئها الحيائي جامي . يتكرر وجودها قرب الشواطئ ويجاري الماء . قوتها الاسماك والفسادع والسمابين والزرع || تتميز بصفاته منافعها المستطيلة المشطوفة الحنود الناعقة كالمتشاش . اصنافها وثلاثها مستطيلة . اذنانها قصيرة . اجنتها لاهفة . انوايا الى البيض الاخير باستثناء الاذنان واطراف الاجنحة السود .

١٣٦٣٦ - سَطَلَّة

هي سطح مسطح البت من اي طابق كان .

١٣٦٣٧ - سَطْح Surface

١٣٦٣٨ - سَطْح * ، مَسْتَوٍ Plan

١٣٦٣٩ - سطح مُسَافِي Quadrique (F). Quadric (E).

١٣٦٤٠ - سطح مُسْتَوٍ Surface plane (F). Level surface (E).

١٣٦٤١ - سَطَوَال هو الجندار المقيد ، اعطيه .

١٣٦٤٢ - سَطُور * Suthora Nipalensis (S).

Suthora du Népal (F).

مائل وحيد الجلس والنوع من الجرائم غروبليات المنافع وفضيلة الترفيفات . موته يمتد الى الصين ، يتكرر وجوده في غابات التيبال . ملجئها الحيائي جامي . انواعه قليلة العدد . قوته الحشرات ومكثها ويرقاتها وثمار وايزود البرية || جسمه شبيه بالقرقف الكبير . طوله نحو ١٥ سم . يتميز ببنونه القصيرة وذيابه المروحي الشكل عند الانقباض . ثوبه الى الخضار البنفسجي اللامعة . يمتد الى البركة الصفراء اللواج .

١٣٦٤٣ - سَطُورِيُون هو السطح ، اعطيه .

١٣٦٤٤ - سَطُور Insolation (F). Sun-stroke (E).

هو الشمس ، اعطيه .

١٣٦٤٥ - سَعَادَى Carex (S). Carex, Lachie (F).

Carex, Sedge (E). Segge (D). Carico, Lica (I). جنس نباتات جلمورية معمرة من فصيلة السعديات . انواعها المروقة زهاء ٥٠٠ نوعها ثلاثية الاصلع . اورادها

بامتدالة سقمها وهي عشبية تشكل ثالثة الحروف الحادة القاضية . ازهارها وحيدة اللثى متبيلة التجميع . جذاميرها طيبة معروقة || اشهر انواعها ما يتبع .

١٣٦٣٦ - سَعَادَى الرَّعْل * Carex hirta (S).

Carex hirsuta, Lachie des sables (F).

نوع من السعدى يعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اورادها مستطيلة النصل الضيق الغائب الحرف . ساقها خفية اللون . يعيش في الرمال المتاخلة ويستعمل لتثبيتها . كاتب .

١٣٦٣٧ - سَعَادَى بَلْدَنَسِيَس * Carex baldensis (S). Lachie du Mont Baldo (F).

نوع من السعدى يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم . اورادها مستطيلة ضيقة . ساقها الزهرية قصيرة مستعرجة لكتفها ثلاث اوراد صغيرة شاذكة || يربط في الموائع الجليدية والارابة الكلسية .

١٣٦٣٨ - سَعَادَى شَمْرَاخِي * Carex scaposa (S).

Lachie à hampe (F).

نوع من السعدى . قصبة ساقه شمراخية الشكل تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . اورادها ضيقة مستطيلة اقصر من قصبة الساق . عذكو الزهرى يعلو من ٨ الى ٢٠ سم . وهو عديد السنايل المنسجة بالانثب والاعصر || يربط في الموائع الثقيلة والارابة الرطبة .

١٣٦٣٩ - سَعَادَى عُنُقُودِي * Carex beccana (S). Lachie à grappes (F).

نوع من السعدى يعلو من ١٠ الى ١٥٠ سم . اورادها تطول من ٧٠ الى ١٨٠ سم . نصلها جلدي التجميع ، اريواليا المختار . ازهاره عذكو التجميع ، ساقها كبيرة القذ لها الى الحسرة || يعيش في المراكن والمنازل .

١٣٦٤٠ - سَعَادَى عَذَاكَ

نوع من السعدى يعرف بالغب ، اعطيه .

١٣٦٤١ - سَعَار هو الكلب مرض غيبث ، اعطيه .

١٣٦٤٢ - سَعَاط Fragrance

الريح الطيبة من كل شيء والزرع والخمر والثار وفيها .

١٣٦٤٣ - سَعَب Etirer (F). To stretch (E).

سحب الشيء مطه وتسحب الشيء تمطد .

١٣٦٤٤ - سَعَك Capacité, Contenance (F).

هي القنودر الاستيعابي . (F). Capacity, Extent, Area (E).

١٣٦٤٥ - سَعَتَر * ، مَسَعَتَر Thymus (S).

Thym (F). Thyme (E).

جنس نباتات عشبية خشبية معمرة من فصيلة المغفريات . انواعها عديدة جميعها من الاقلوية . مهادها البلاد المعتدلة . اورادها صغيرة ، كاملة ، متفالة ؛ نصلها غدي الصلبة ، ازغب البشرة ، حنود متصالية الارتكاز ذرية الحجم خفية بطر التيمول || انواعها صغيرة القذ ، حطرية الحرف ، وديسة اللق الى اوليك . اشهر انواعها يتبع .



سطائس سبلي



سطام



سطر



سعادى بلال سعادى بلنشىس



سعادى شمراخى سعادى عُنُقُودِي



سَعْتَرُ الْبَرِّ



سَعْتَرُ الْبَرِّ



سَعْتَرُ الْبَرِّ



سَعْتَرُ الْبَرِّ



سَعْتَرُ شَرْقِي

١٣٤٦ - سَعْتَرُ الْبَرِّ * ، سَعْتَرُ بَرِّي ، زَعْتَر
Thymus serpyllum (S). Thym serpolet, T. sauvage,
Serpolet (F). Creeping thyme (E). Feldquendel,
Thimian (D). Timo serpillio, T. salvatico, T. cedrato,
Serpillio (I).

نوع من السعتر يملو نحو ٢٥ سم. ساقه قزواء، فروها
الفلق أظفئة الانتساب، ثم ترتفع. أوراقه أحليجية. نصلها
مهبب الفلج، بارد العروق، خلل البشرة. أزهار
وردية اللون. يستخرج من أوراقه وأزهاره البتيرول.

١٣٤٧ - سَعْتَرُ الْبَرِّ * ، سَعْتَرُ الْبَرِّي ، حاشا
Thymus capitatus (S). Thym de Crêze (F). Headed
thyme (E). Kretschier thymian, Kopfthymian (D).
Timo di Crêze (I).

نوع من السعتر يملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ساقه قزواء.
أوراقه بيضبة الشكل، العلوية منها أحرص نصلًا من
الفلق وأقل زغبًا وغلًا. أزهاره وريدية اللون. أوراقه
وأزهاره بلسمية العرف والظم يستخرج منها عطر السعتر.

١٣٤٨ - سَعْتَرُ الْبَرِّ * ، سَيْسْتَرُ ، نَمَامُ
نَمَامُ الْمَلِكِ وَزَيْبَرِيَّة

Thymus glaber (S). Thym glabre (F). Wild thyme,
Mother of thyme (E). Wilde thymian (D). Sermolino,
Timo glabre (I).

نوع من السعتر يملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ساقه نحيلة
كثيفة الفروع المنتصب. أوراقه خيفة، مستطيلة،
نصلها غائر الفلج، مائل البثرة، شديد الحصار.
أزهاره وريدية اللون يملوها موليح أبيضاني || يرغب في
المواقع الرطبة.

١٣٤٩ - سَعْتَرُ شَالِبِ * ، سَعْتَرُ شَالِبِ
Thymus vulgaris (S). Thym commun, Farigoule (F).
Garden thyme, Pot-herb thyme (E). Thymian-
quendel, Gartenquendel (D). Timo comune, T. col-
tivato, Erbuccia, Popolina (I).

نوع من السعتر يملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. ساقه كثيفة
الفروع الخشيشة المنتصب. أوراقه سنائية خيفة.
أزهاره ليلية اللون. يعيش في جميع الأودية. يفضل
الكلية ويحترق الرطبة || يستخرج من أوراقه وأزهاره
عطر السعتر ودهنه.

١٣٥٠ - سَعْدُ
Cyperus (S).
Souchet (F). Sedge (E).
جنس نباتات صفولية، عشبية، معمرة من فصيلة
السمديات. أنواعه عديدة جميعها متعينة من نباتات المناطق
الحارة. أوراقها سنائية مستطيلة. سوقها شراخية يملوها
أزهار سنبل التجميع تكثفها غصية وريدية مؤلفة من ثلاث
أو أربع وريقات || أشهر أنواعها ما يتبع.

١٣٥١ - سَعْدُ الْأَخْيَبِ
ويسمى سعد الحليان، منزل من منازل القصر البانية يتزلفا
القصر في الليلة الخامسة والعشرين. وهو أرمبة كركاب
متقاربة واحد منها، في وسطها، أنور الجميع. وقيل إنما
سمي سعد الأخيبي لأن عند طلوعه تخرج الحشرات الخفية
من الأرض || رقيب سعد الأخيبي يدعى الزبرة.

١٣٥٢ - سَعْدُ الْبَارِ
سعد البارح نباتان متقاربان من كوكبة القوس الأعظم
مركزها في الصدر.

١٣٥٣ - سَعْدُ الْبَهَامِ
Baham, Biham
سعد البهائم نباتان من كوكبة القوس الأعظم مركزها
على رأس القوس.

١٣٥٤ - سَعْدُ الْخَصْرِ ، سَعَارُ حُلُو ، عَكُوبُ ،
Cyperus alopecuroides (S).
Krois
Souchet à nattes (F). Foxtail sedge, Max sedge (E).
Zypergras (D). Giunco cannellino, Testa di riccio (I).
نوع من السعد الجلموري اللباد، شراخه يملو نحو المتر.
أوراقه قرصية غصية تطلو من ٧٠ إلى ٩٠ سم. وتعرض
من ٨ إلى ٢٠ م. نورته الزهرية غائرة || يعيش في
المتنوع والأراضي الرطبة. أوراقه تستعمل في صناعة
الحصر.

١٣٥٥ - سَعْدُ الدَّاحِبِ
منزل من منازل القصر البانية، وما كوكبان نباتان
تجد ذراع، في بحر أحدهما نجم صدير كأنه يلجمه لقربه
منه || قال بعض علماء الفلك أن السعد الداحب كوكبان
متقاربان على التوالي منها كوكب صدير يكاد يلمس به
يسرى الذئب ولذلك سمى العرب السعد الداحب لزعمهم أن
الذئب شاته وقد ذبحها.

١٣٥٦ - سَعْدُ السُّعُودِ
Sadsalsud
منزل من منازل القصر البانية. وهو ثلاثة كركاب أحدها
يرير والآخرون دوله. والعرب تسمي به || رقيب سعد
السعود يدعى الجبهة.

١٣٥٧ - سَعْدُ الْمَطَرِ
سعد المطر نباتان من كوكبة القوس الأعظم مركزها على
الركمة البسي.

١٣٥٨ - سَعْدُ النَّكَالِ
Cyperus natalensis (S).
Souchet du Natal (F).
نوع من السعد الجلموري اللباد، شراخه يملو من ٦٠
إلى ١٠٥ سم. أوراقه مستطيلة خيفة النصل. سنبله
متوسطة الكثافة تكثفها غصية ثلاثية الأوراق القصيرة.
يرغب في الأودية المتوسطة الاندماج والرطوبة. يعيش
في المراكب.

١٣٥٩ - سَعْدُ الْهَامِ
Hamam, Homam
سعد الهام نباتان من كوكبة القوس الأعظم مركزها على
الفتق.

١٣٦٠ - سَعْدُ بَلْعِ
Albal
سعد بلع منزل من منازل القصر البانية. وما نباتان مستويان
في البحر لامتساويان في القدر والنمو. وبني الأكبر
بالأ كانه يلم الأخر واحد ضوء. وهو من كوكبة الدلو،
طلوعه الليلة ثبتي من كانون الثاني وسقوطه ليلة ثبتي من
آب || رقيب سعد بلع يدعى الطرف.

١٣٦١ - سَعْدُ شَرْقِي * ، سَعْدُ مُسْتَدِير * ،
سَعْدُ الْحَمِيرِ ، وَزَيْن ، صَبَاحُ الْفَيْرِ
Cyperus rotundus (S). Souchet rond (F). Nut-grass
(E). Runde zyperwurzel (D). Ciperero orange,
Stiancia rotunda (I).
نوع من السعد البادم الجلمور. عساقله عديدة، بيضبة
الشكل، كالوربة الرائحة. أوراقه مستطيلة. شراخه

Cours de change (F).

سر القطع

تعلو من ١٠ الى ٣٠ م. سنبله فائقة صوياي || يكثر في الاربة الرطبة . يتبر من النباتات الضارة .

Cours Negl (F).

سر قانوني

Cours moyen (F).

سر متوسط

١٣٦٦٢ - سعد عطر * Cyperus longus (S).

Souche odorant, S. long (F). Galingale, English galangale (E). Galgentwurz, Langes zypergras (D). Cyparo lungo, C. odoroso, Cunza (I).

نوع من السعد . جنسوه مداد عطر لا صائل له . شاربته تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . أوراق شديدة الطول || سنبله مروحية الازتكاز تكتنفها غصه ثلاثية الاوراق || يعيش في المناطق وعلى ضفاف الماء .

١٣٦٦٣ - سعد مأكول هو حسب الزلم ، الطلبة .

١٣٦٦٤ - سعد مروحي Cyperus flabelliformis (S). Souche en éventail (F).

نوع من السعد الجسوري الركوي . شراخه اسفنجي الجوف ، طليظ القائمة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . أوراقه جامدة تصل طولها الى ١٥ الى ٤٠ سم . وتفرش من ٥ الى ١٥ م . سنبله الزهرية مروحية تتجمع بجمله الشكل . يزرع في المراكز . يرغب في الرطوبة المستمرة .

١٣٦٦٥ - سعد مظلي Cyperus alternifolius (S).

Souche à feuilles alternes, Petit papyrus, Ombrelle (F).

نوع من السعد الجسوري البامد الصائل . أوراقه القروية صغيرة القبة ، قليلة العدد . شراخه يرتفع من ٣٠ الى ١٢٠ سم . تعلو سنبال زهرية مظلية الشكل تكتنفها غصه ورقية يراوح عدد أوراقها من ٦ الى ٢٥ || يكثر زراعته في المراكز لانه سروي وجمل الخضار .

١٣٦٦٦ - سعدان

السدان ثبت من افضل مراعي الايل له فوك تشيه به حلقة الثدي فيقال لها سعدانة (السان) .

١٣٦٦٧ - سعدان ، قرد (S). Singe (F). Ape (E).

اسم شامل يطلق على جميع انواع القرد ج سعدين .

١٣٦٦٨ - سعداكة وكملة Châtaigne (F).

Zaïne قرية للمادة تملو قائمة القرس . Chestnut (E).

١٣٦٦٩ - سعداكة سعدانة الثدي : ما اطاف به كالفلكة . وهي ايضا مدخل الجردان من ثوبية القرس .

١٣٦٧٠ - سعديات Cyperaceae (S).

Cyparacées (F). Cyperaceae (E).

فصيلة نباتية من ربيدات الفلقة تشمل السعد والسادي وسب الزلم .

١٣٦٧١ - صغر هو الكلب مرض غيبث ، الطلبة .

١٣٦٧٢ - صغر ، هيتي (F). Prico, Rate (E).

تريفة القوائد السنوية التي ينتجها صيلج قدر مة .

١٣٦٧٣ - صغر (F). Market, Price, Rate (E).

هو ما يقوم عليه من البضاعة يما وفرا على ان تكون الصفقات متتالية كالمتوقفة في المصنف ، وسر السوق... وهذا السعر قد يكون :

Cours forcé (F).

سر الزامي

١٣٦٧٤ - صغر القابيل

Taux de capitalisation (F). Capitalization rate (E).

هو السعر الذي تكتنه شركات التأمين والتأمين لحساب فواكه الاموال والاحتياطيات .

١٣٦٧٥ - صغر الحسم ، صغر القفص Taux de l'escompte (F). Rate of discount (E).

هو السعر الذي تحسب به كل عمليات الحسم والصرف في يوم معين وسوق معينة .

١٣٦٧٦ - صغر الفائدة Taux d'intérêt (F).

Rate of interest (E).

سر الفائدة يكون اما قانانيا وهو ما يقره القانون او اتفاقيا وهو ما يحدده الاتفاق .

١٣٦٧٧ - صغران

هو الاياهاز جنبه برية تشمل في تنظيف الثياب .

١٣٦٧٨ - صغرانبيات Anabasées (F). Anabasis (E).

سبط من فصيلة المرمقيات .

١٣٦٧٩ - صغرة ، حوريرة Caloria

هي الوحدة الحرارية او الوحدة في قياس الحرارة .

١٣٦٨٠ - صغكة Palma (F). Palm (E).

هي قصب النخل وهي مركبة من جريدة تحمل الحوص اي الوردقات .

١٣٦٨١ - صغكة هي القروية ، الطلبة .

١٣٦٨٢ - صغكة الثياب فراشة مؤذية تكس قروية الثياب ، الطلبة .

١٣٦٨٣ - صغكة السجاد فراشة مؤذية تكس قروية السجاد ، الطلبة .

١٣٦٨٤ - صغكة السمكة فراشة مؤذية تكس قروية السمكة ، الطلبة .

١٣٦٨٥ - صغقيات

هي القرويات فصيلة حشرات من حشرقيات الاجنحة .

١٣٦٨٦ - سيلة ، شهام Simia satyrus, Pithecius satyrus (S). Orang-Outan, Orang, Homme des bois (F). Orang-utan, Pongo pygmaeus (E).

السيلة والسلاء ج سمال . ونهم من سماما الانسان الوشي . حيوان ثديي من فصيلة اشياء الانسان ومرتبة القرديات . قاته تجاوز ١٤٠ سم . يده تعلو نحو ١٠٥ سم . جسمه كثيف الشعر طليظ المسطيل || يعيش ذكرا وانثى يتبعها من الصغرين الى الثلاثة . الانثى تضع ولدا واحدا ترضعه من ٣ الى ٤ اشهر || موطنه جزر الانيز . قوة الكار على اختلاف انواعها وقصب السكر والذرة وبعض البقول . وهو يألف النباتات الكثيفة والفاض البعيدة عن كل همران .



سعد صغر



سيلة

١٣٦٩٨ - سُمَّة * Mycetophagus (S).

Mycetophaga (F). Mycetophagus (E).

جنس حشرات من فصيلة السفاقيات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في بعض غابات وسراج البلاد المعتدلة الحرارة والباردة || اجسامها صغيرة ، معتدلة الاحدياب ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ٥ الى ٧ م. رؤوسها معتدلة الجرم وخرطومية الشكل. حيونها بارزة. تاشيرها وبلاسها نظامية. قرونها الاستشعارية ثلاثية. كراسلها معتدلة الجرم. اغمادها لاصقة يطولها تحفدي قاطب. قوائمها نشيطة. اذواها ثنائية الاذن || تألف الغابات والحراج وتميش على بعض انواع الفطور من الفاريقيات والسميات .

١٣٦٩٩ - سُمَّة * Mycetophagidae (S).

Mycetophagidae (F). Mycetophagidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة ، اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم غابات وسراج البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ٣ الى ٧ م. رؤوسها معتدلة الجرم. حيونها بارزة. تاشيرها وبلاسها نظامية. قرونها الاستشعارية ثلاثية. كراسلها كبيرة. اغمادها لاصقة. قوائمها نشيطة. ارساغها رباعية العقول. اذواها ملونة || تألف الغابات والحراج. تميش على بعض انواع الفطور اعصها المشتية الى الفاريقيات والسميات || اشهر اجناسها السفاجة .

١٣٧٠٠ - سُمَّة * Copulation, Sallie (F).

Copulation, Covering (E).

نوع ذكر الحيوان على الانثى ، اذا غرّب الجود الحمبر قيل قما وزلا .

١٣٧٠١ - سُمَّة * Opercule (F).

Gill-cover (E).

السطاف والسطاف ج اسفاط . هو الفشاء الغفروني المادة الذي يلفف التنجوف الخيشوي عند الاسماك . وما سفاطان او سفاطان ايمن وايسر .

١٣٧٠٢ - سُمَّة طَائِفَة *

Callimorpha dominula (S). Callimorpha

tyran (F). Callimorpha dominula (E).

حشرة من فصيلة السفاقيات ورتبة خرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبا الجنوبية والغربية . فراشها صفيحة تميش على ذخيرتها المعزبة . سرقتها خاضعة قوتها اوراق النبات واعصها الحس والهندباء والقرص والنبع ولسان الحمل ... || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٦ م. بسطتها تراوح من ٤٥ الى ٥٠ م. رأسها معتدل الجرم. حينها كيرتان. زباناها شيطان . مرشها جمعة . جوشها كيثف الحمل . كسني الاذن . بطنها احمر يطول موج وودي وضط لبيجي قاطب شديد السمة || روشناها الاناميان الى الخضار الانلاس تملو بقمع مستديرة صفراء وبقتان بريقا لثان . روشناها الخلفيان الى الحمرة يطولها موج صناعي ويطوقها حنار كسني اسود وبقتان وبقة طرية تحمل كامل الزام الاخير . تنضيب وراش الاذن لا يختلف الا بالبرقالي الذي يتحول الى سطني || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح في الليل . تماثل على ظهورها باسوب

١٣٦٩٧ - سُمَّة

ما تملك من لشفر الاذن من الجير ونحوه .

١٣٦٩٨ - سُمَّة النجوم

سود النجوم عشرة وهي سد بلع وسد الاغنية وسد الكايم وسد السمود وهذه الاربعة من منازل القمر . ثم سد ناشرة وسد الملك وسد البهام وسد المام وسد البارح وسد سطر وهذه الست ليست من المنازل . كل منها كوكبان .

١٣٦٩٩ - سُمَّة هو الاغنيا ، اطلبه .

Tabac à priser (F).

Snuff (E).

مسحوق التبغ يستعمل شأ لكثيف . يستحصل عليه من اوراق التبغ المسحوق بعد تنعيمها ويزجها ببعض المواد العطرية او الحرفية || وقد تختلف قيمة السموط باختلاف صفته وبنوده الاولى اذا كان معصروا تصال اوراق او سلعها .

١٣٦٩٩ - سُمَّة هو الماكاك الميخون ، اطلبه .

Besoin d'eau (F).

Want water (E).

صلح الزرع والنبات .

١٣٦٩٣ - سُمَّة * Coluber lineatus, و تشاب

C. jaculus, C. stratus (S). Dard, Serpent vol-

lans (F). Coluber lineatus, C. jaculus (E).

حية يبروس من البواقيات وفصيلة الحنشيات غلغيات الاعايد . جسمها قليل التضاعة يطول نحو ١٠٠ م. قوتها الى الكعبة البرداء يطولها غط اسود يمتد من الخلف الى طرف اللبب وضخان اصران عايقان ايمن وايسر يمتدان من الشفتين الى اللبب . رأسها لوزي الشكل . زاوية شفتها خفية الملاق . حينها صغيرتان . حادتان . عدد اسناتها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاذن من اصلها اربعة عتاف خفية خلفية الارتكاز تهزرن السم في كل عضو تصببه عندما يرق سقي مستواها الداعلي || تألف الاخراج والمغصاب ، تتسلق الاشجار وتنقبض كالهم من شجرة الى اخرى ومن كل مكان مرتفع الى آخر منخفض || بيتها الشتوي يمتد نحو خمسة اشهر . تسرح في النهار . قوتها الحشرات والوزع والطاء والثران والجرذ . تقضي على فريستها الكبيرة الحجم بالتقليص ثم تبتلعها بعد ذلك || اغلاقها شرسة . حينها صغير حاد . تبلغ كامل نموها بمر ١٥ سنة وتميش نحو ١٢٠ سنة || الاذن تساه بمر خمس سنوات وتضع من ١٢ الى ٢٤ بيضة مجعومة في سجين تطهرها في موضع دافئ جنوبي المعرض || تعتبر من الكائنات المؤذية .

١٣٦٩٩ - سُمَّة الاجناس هو علة الاجناس ، اطلبه .

١٣٦٩٥ - سُمَّة الزرع هو علة الزرع ، اطلبه .

Plante épineuse (F).

Thorny plant (E).

كل شجر له شوك .

١٣٦٩٧ - سُمَّة ، شعاع ، صُرُق

Barbe du blé (F).

Beard of corn (E).

هي حسك شتيلة الحنطة والشعير .



سُمَّة



سُمَّة



سُمَّة طائفة

وتفتح المكن لطعاً على اتصال الأزراق || السرة تطول ٤٢ مم. جسمها اسطواني الشكل ، مثلث السك ، أسود اللون تطول ثلاثة خطوط من النقط الصفراء وضلعان الى الزرقاة الرصاصية . ثملها متوجة بالخط الاسود || طور الاكمال الذي يستمر من ٢٤ الى ٢٧ يوماً ويتفقي ضمن صلبة متينة الخيلك تسحبها السرة تحت قشور الاجبار وفي شقوق الهواء .

١٣٧٠٣ - سَفَاطَةُ مُسْتَحَبَّةٌ *

Callimorpha dulcitra (S). *Callimorpha*
agrabia (F). *Callimorpha dulcitra* (E).

حشرة من فصيلة السفاطيات ورتبة حرشفيات الاجنسة . موطنها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار وظلها . سرتها خاضعة قوتها اوراق النباتات العشبية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ ملم . بسطها تراوح من ٥٠ الى ٥٥ مم . رأسها معتدل الجرم . صياها كيرتان . زبالها خضبان . مرشها مستطيل . جهشها بني اللون كثيف الخمل . بطنها احر اللون يملو غط قبيجي قاطب اسمر || روشتها الانسيابية يملوها تجمع وتبيض كمن || لها جيل واحد البرقائلي يملوها تجمع وتبيض كمن || روشتها الخلفيان الى الحمرة واصفر وزويان من النقط البياض والصفراء : رواشن الاثني عادية التنطيط . روشتها الخلفيان الى الحمرة البرتقالية يملوها تجمع وتبيض كمن || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الفرشاة في حزيان . تسرح في الليل . تعامل بمد ظهرها ينمو اربعة اسابيع وتفتح المكن على الصفحات السفلى من اتصال الاوراق || السرة تطول نحو ٢٥ مم . جسمها اسطواني الشكل ، اسود اللون ، اصفر التضييع ، مثلث السك تملو في كل لمة فسة من الخلب الاثني . رأسها اسود . ملها الى الخطلة القائمة || طور الاكمال يستمر نحو ٢٤ يوماً ويتفقي ضمن صلبة تسحبها السرة بين فروع النبات وقصبها .

١٣٧٠٤ - سَفَاطِيَّاتٌ *

Hymenophyllae (F). السفاطيات فئة من الرماض مستورات الزهر الرمالية .

١٣٧٠٥ - سَفَاطِيَّاتٌ *

Callimorphidae (S). *Callimorphidae* (E).

فصيلة حشرات من حرشفيات الاجنسة غطلت القرن . اجناسها واوراها المرفوعة نحو ١٢٠ مظهرها من حشرات البلاد الحارة المنتشرة نحو الاسترالية || جسمها معتدلة القد . اجسامها فيه اسطوانية الشكل . رؤوسها صغيرة . صياها زقية . قوتها الاستشارية خطية . بسطة . ملابسها صغيرة ، جالسة . مرأشها كبيرة . مصطبة . رواشن الانسيابية اكبر من الخلفية واقل استدارة منها واكثر قبيجي وزرقة . سذاتها جانبية الارتكاز . مصطبة الجرم . ارتجلها ثامة النمو ورياعة المناس || مكها مكور الشكل . اساريمها مثلثة التشار ، ضمية الخلب . خادراتها تلتصق بصلبة متينة محدلة الخلب || اشر اجناسها السفاطة .

١٣٧٠٦ - سَفَاطِيَّاتٌ *

Cochlearius cochlearius (S). *Savaco huppé*, *Bee-en-cuiller* (F).

طائر من طول الساق وقصبة البشريات . اصانه المناطق الاستوائية الامريكية . يألث غصاف الابرير والناثين مسرعة دجوي يستمر طول الخيل . قوته الاسماك والناثين والزرق والغفاد والرعوات ... || جسمه مكمل معور .



سَفَاطَةُ مُسْتَحَبَّةٌ



سَفَاقٌ



سَفَانٌ



سَفَانَةٌ



سَفْجُورُ الزَّرَقِ

١٣٧٠٧ - سَفَانٌ *

Cephennum (S). *Cephennum* (F).

جنس حشرات من فصيلة السفانيات ورتبة غديات الاجنسة . اذراعها المرفوعة نحو ٥٠ منتشرة في جميع انحاء العالم || اجسامها صغيرة ، تطول من ٢ الى ٣ م . رؤوسها صغيرة شبه مكورة . صياها قليلة البروز . قوتها تأشيرها وتكونها صغيرة . ملابسها كبيرة . قوتها الاستشارية صولجانية . كواسها محدودة . شبه اربسة الشكل . احمادها لاسفة ، حادة التضييع . قوتها نشيطة . انواها وسيدة اللون ، يكثر فيها الجوزي الاسف فالاسيد فالاسف فالاصب فالاصفر || تألف الخراج والغيات حيث تكثر الطحالب التي تعيش عليها .

١٣٧٠٨ - سَفَانَاتٌ *

Sphagninées (F). *Sphagninées* (E).

رتبة من الطحالب تشل نصليتي السفانيات والقرنبيات .

١٣٧٠٩ - سَفَانَةٌ *

Hypophopus seven (S). *Séphen* (F).

حيوان بحري من السفنقيات الاثلاث وفصيلة الطرقيبات . اصطناه تمتد من الخليج العربي الى الصين || جسمها بما فيه الذنب يطول نحو ١٤٠ سم . ثوبه البروي الى السرة الخنطية المواجه . ثوبه السفلى الى الثيرة اثنية . منخسه اللابل نحو ١٥ سم . || لحمه متوسط الصنف ، مأكوله . اما جلده فخاصر الصنف مرفوب فيه .

١٣٧١٠ - سَفَانِيَّاتٌ *

Sphagnacées (F). *Sphagnacées* (E).

فصيلة من الطحالب تنتمي الى رتبة السفانيات اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الطلب .

١٣٧١١ - سَفَاقَةٌ *

هي الاصطراف ، اطليه .

١٣٧١٢ - سَفَاقٌ الرِّيحِ *

Direction du vent (F). *Direction of wind* (E).

وجية هبوب الريح .

١٣٧١٣ - سَفْجُورُ الزَّرَقِ *

Dryptes caerulea (S). *Dryptes bleue* (F).

Dryptes caerulea (E).

حشرة قانصة ناتجة من فصيلة السفجوريات ورتبة مضفات الاجنسة . تألف المروج والرماس وضفاف مجاري الماء . قوتها المواد الضوية وبما تصطبقت اقتناصه من الحشرات القذيا || جسمها صغير لحد يطول من ٤ الى ١٠ م . قوتها الى الزرقاة خنطية خنطية متني وموج اسف . رأسها غروطي صغير . فكها ذربان . صياها كيرتان جاحظتان . زبالها عيطان حقيقان . ظهرها لا يلف السكة

المرصعة الرياح المروج . يرغب في الاربة العميقة الغور المتوسطة الانساج والرطوبة الموزونة التركيب الحكسي . ثماره تحسن صفات في الاربة الجنية || يتكاثر بالبذر والتفصيل والتفريق والتفصيل || يفرس على ابعاد تراوح من ٤ الى ٦ امتار || وهو من الاشجار التي يفسد بها التفعل لانه يحيد من نشاطها وين مقودها الانماجي . اشهر شرويه الزراعية ما يتبع .

١٣٧١٨ - سقرسجل البرتغالي C. du Portugal
غرب سبروني يملو نحو ٦ م . ثماره كبيرة القند متوسطة البسط . مزينة الرأس والقلب . لهايا غزير المصاراة متوسط المغوصة || يحيد في جميع الاربة المختلفة التركيب العميقة الغور || ينشئ الجفاف وكثرة الكلس والبريل .

١٣٧١٩ - سقرسجل الصين
هو الشنول الصيني ، اطلبه .

١٣٧٢٠ - سقرسجل اليابان
هو الشنول الياباني ، اطلبه .

١٣٧٢١ - سقرسجل انجيه C. d'Angers
ضرب جاحد يتطلب مواقع خاصة لانه ينشئ الصقيع . يملو نحو ٤ م . ثماره كبيرة القند . غزيرة المصاراة ، طرية العرف ، ذكية العلم ، قليلة المغوصة || يحيد في جميع الاربة العميقة الغور ما عدا الكلسية والرطوبة .

١٣٧٢٢ - سقرسجل شمسيون C. champion
ضرب امريكي واسع الشجرة . ثمرته شديدة النشاط غاذقة تملو نحو ٧ م . ثمارها كبيرة القند ، ذكية العلم والعرف ، غزيرة المصاراة ، قليلة المغوصة || يحيد في جميع الاربة المتوسطة الانساج والرطوبة .

١٣٧٢٣ - سقرسجل عادي C. commun
ضرب سبروني عديم الانتشار يعيش في معظم الاربة والمواقع . يملو من ٢ الى ٤ م . ثماره كروية متوسطة القند . لهايا متوسط المصاراة ذكي العلم والعرف .

١٣٧٢٤ - سقرسجل هندي
هو اللوسينية عجيبة شمرة ، اطلبه .

١٣٧٢٥ - سقرسجلية Coing (F). Quince (E).
ثمرة السقرسجل . لهايا جامد المكسر حامض العلم ، متوسط المغوصة ، يستعمل في المربيات . يزورها الرتبة شائعة الاستعمال الطبي .

١٣٧٢٦ - سقرس Saxifraga (S). Saxifrage (F).
Saxifraga, Rockfool (E). Steinbrech (D). Saxifraga (I).
جنس نباتات عشبية من فصيلة السقرسيات . انواعه زهاء ٣٠٠ جميعها عشبية خشبية . اكثرها معمرة ومنها حولية وعشوية . معظمها بري وبعضها زراعي تزييني . اوراقها مصاعية ، صغيرة القند ، خضراء النضج ، فيها البسطة والمفرسة والسنة . تصلها خلي البشرة منتج الصفة . ازهارها خضراء التركيب . يزورها صغيرة الحجم تكثر فيها الاستدارة || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

الشرية . غدها تساهبا تحفيز المتساوي الخطوط . ابراسها خضراء البقل || لها جبل واحد في الحق . تظهر الحشرة الجملانة في ابراسه آب وتعيش حتى اواخر ايار . تسرح في النهار . تساه في اوائل الربيع وتضع المكن تحت الجملانة والفسور والصفلة والعلف والحجارة في شقوق الاعشاب فاتحة || والبرقة عند تمام اعدادها تطول نحو ١٥ م . جسمها شبه اسطواني الشكل اسمر الغريب ، كثيف الغلب . اسود الرأس والرواسب والشرج المهبط دقيقين || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينشئ في التربة .

١٣٧١٤ - سقرسجريات Dryptidae (S).
Dryptidae (F). Dryptidae (E).

فصيلة حشرات لاحة من رتبة همديات الاجنسة . اجناسها وانواعها المروعة قليلة العدد ، معظمها من حشرات البلاد الحارة . تألف المراعي والغياض والمواقع الرطبة || جميعها صغيرة القند ، جملة الالوان ازرقية الباعة ، رؤوسها مستوية ، مستطيلة الاطعام والازبال . ميرها جاحظة . كواسلها متضخمة مستطيلة . احمادها مقنونة الاطراف ، تساه الخنود المتوازية || تسرح في النهار وتعيش في الليل . تسمى بمرقة وتطير بشفة || قوتها المواد العضوية المختلفة المصادر . اشهر اجناسها السقرسجور .

١٣٧١٥ - سقرسجل * ، سقرسجلة التمسك Cabadilla (S). Cevadilla, Cebadillo (F). Cevadilla, Cebadillo (E).

نبات عشبي دولسي طلي معمر من فصيلة السورجانيات . اوراقه قرصية الانتشاب ، عضوية الشكل ، مستطيلة القند ، ازهاره سبلي التجميع يرتكز بل فرخا دقيق مسط . ازهار صغيرة القند ، ابيضانية اللون سود المراج . ثماره جرابية الشكل ، يزورها دقيقة ، مضغمة ، قسية اللون || يستخرج من يزوره عدة مواد قلوية اشهرها السلفيدلين والفسرين والخاص الغريبي || مسحوق يزوره شديد الفاعلية كان ولا يزال يستعمل في القضاء على القمل .

١٣٧١٦ - سقرسجليين * ، سقرسجليين Cevadilline, Sabadilline (F). Cevadillin (E).
مادة شبه قلوية لا تتبلور تسخرج من بذور السلفيدلين ويثيرة .

١٣٧١٧ - سقرسجل * Pyrus cydonia, Cydonia oblonga, C. vulgaris (S).

Cognassier, Colgnassier (F). Quince tree (E). Echte quince, Bruquince (D). Cotogno, Pomo cotogno (I).
السقرسجل ج . صفارج صفاريل . ثمرة شمرة من فصيلة الورديات وحيدة الجنس والذوق عذبة القدررب . ثمارها مأكولة ترتب . يزورها طيبة . وهي تلو من سترين الى ثمانية امتار . ساقها قصيرة سرسة حمراء اللون . اجناسها فائقة مضغمة . اوراقها عابلة ، بسطة ، كاسلة ، متعابلة ، ينشئ الشكل ، قليلة القناعة . تصلها بارز العروق ، خلي الصفحة السفلى . ازهارها خضراء التركيب لونها الى البياض الودي . ثمارها كروية الشكل او شبه كروية مستطيلة ، كبيرة القند ، خضراء البشرة ، مسحة العرف ، جامدة الياق . عابوها تألف من ٤ غرافات تحضن الكثير من البذور || يعيش السقرسجل في الاقاليم الحارة والمتندلة . ينشئ المواقع الطليقة



سقرسجل



سقرسجل



سقرسجل

١٣٧٢٢ - سُفْرَسُ الْحَصَى *

Saxifraga granulata (S). *Saxifrage granulée*, Herbe à la gravelle (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراتها حرة ككلوية . نصلها مفصص الحار . ازهارها كبيرة اللد ، يضاء اللون ، صطرية البرق || ازهارها يستمر من لبسان الى سزيان || يقال انها طيبة ، اروبها نافعة تريل البرد والحصى .

١٣٧٢٨ - سُفْرَسُ الظِّل *

Saxifraga des ombrages, Mignonette, Désespoir du peintre (F).

بجلة جادسة معمرة تملو نحو ٣٠ سم. أوراتها اهلجية رفيعة ، عبقها كثيف الزئب . نصلها مقر الصفة . مفشاري . الحافة || ازهارها مستترفة يضاء اللون . ازهارها يستمر من سزيان الى تموز . ترغب في اللواتع اللطيلة التبريد الرطوبية .

١٣٧٢٩ - سُفْرَسُ خَشِين *

Saxifraga aspera (S).

Saxifraga rugueuse (F).

بجلة سبروتية معمرة ترطب في الاثرية الرطبة . تملو نحو ٢٠ سم. اروبها خادقة الرواكيب . نصلها مقر الصفة . نحو ٣ || ازهارها يضاء اللون وكوبها مواج اصفر . ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٣٧٣٠ - سُفْرَسُ سَرْمِي *

Saxifraga tomentosa (S). *Saxifrage sarmenteuse* (F).

بجلة جادسة معمرة تملو من ٢٥ الى ٤٠ سم. أوراتها مستنبة بالأبيض والاخر . حنار نصلها ارجواني . ازهارها حربي الشكل ، ازهارها يبيض تملوها مشنة صفراء || زهر من ايار الى تموز .

١٣٧٣١ - سُفْرَسُ سَرْمِي *

Saxifraga crustata (S). *Saxifrage incrustée* (F).

بجلة معمرة تملو نحو ٤٠ سم. أوراتها ككلوية الشكل نصلها محبب الصفة ، سرجيمي التجزيع ، اصفر الحار || ازهارها حشوكية التجميع هامة الارتكاز لوئها الى البياض المربح بالابيض || ازهارها يستمر من سزيان الى تموز . ترغب في الاثرية الكلسية .

١٣٧٣٢ - سُفْرَسُ سَرْمِي *

Saxifraga cymbalaria (S). *Saxifrage cymbalaire* (F).

بجلة حولية جادسة تملو نحو ١٥ سم. أوراتها حرة اللد ، مستترفة الشكل ، خاسية او سباعية التجميع الكولي ، نصلها مسطح بالاسر || ازهارها صفر . ازهارها يستمر من ايار الى آب .

١٣٧٣٣ - سُفْرَسُ طَحْشِي *

Saxifraga hypnoides (S). *Saxifrage mousse*, Gazon d'Angleterre, G. cure, G. mousse (F).

حشية سبروتية معمرة . اروبها مستطيلة الرواكيب اليفسورية . ساقها موقرة تملو من ١٠ الى ٢٠ سم. أوراتها قوية التبريم . مستطيلة الاثاق الزغبية الاسطوانية || ازهارها يبيض . ازهارها يستمر من ايار الى سزيان || ترغب في الاثرية الرطبة والمواتع الجلية .

١٣٧٣٤ - سُفْرَسُ كُشْلِي *

Saxifraga cuscuteformis (S). *Saxifrage-cuscuta* (F).

بجلة زهية معمرة تملو نحو ٢٠ سم. أوراتها مستنبة ،

سكوبة ، نصلها خلي البشرة ، سنن الحافة . ازهارها حربي ، قليل الكثافة . ازهارها يبيض بطولها مواج اصفر . تبيض في الراكن . زهر من سزيان الى تموز .

١٣٧٣٥ - سُفْرَسُ مَحْرُوفِي *

Saxifraga cuneifolia (S). *Saxifrage cunéiforme* (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو نحو ١٥ سم. أوراتها قرصية التجميع . نصلها محروفي الشكل ، اخضر الصفة العليا ، جزوي السفل . ساقها عادمة الورد . ازهارها صترة اللد يضاء اللون || ازهارها يستمر من سزيان الى آب . تحشى المواتع الحارة .

١٣٧٣٦ - سُفْرَسُ مُسْتَدِيرِ الْوَرَق *

Saxifraga rotundifolia (S). *Saxifrage à feuilles rondes* (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقها موقرة . أوراتها ككلوية الشكل . نصلها غدي التبرج ، خلي البشرة ، سنن الحافة . ازهارها منشة الاصفر والاخر || ازهارها يستمر من سزيان الى آب .

١٣٧٣٧ - سُفْرَسُ مُسْتَطِيلِ الْوَرَق *

Saxifraga longifolia (S). *Saxifrage à longues feuilles* (F).

بجلة معمرة تملو من ٢٠ الى ٨٠ سم. أوراتها مستطيلة . نصلها مقر الصفة . ازهارها كثيرة العدد ، يضاء اللون ، يطلو تبيض اصفر ومضة حراء || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٣٧٣٨ - سُفْرَسُ مِغْبَار *

Saxifraga mutata (S). *Saxifrage changée* (F).

حشية جادسة عملة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. أوراتها متناقة اهلجية ، نصلها جامد الصفة ، مهذب الحار سنن الزام الانبي . ازهارها حربي الشكل . ازهارها مدنية البتلات لوئها الى الصفرة بطولها مواج يرتقل . زهر من سزيان الى آب . ترغب في الاثرية الكلسية .

١٣٧٣٩ - سُفْرَسُ مُشَقَّص *

Saxifraga scandens (S). *Saxifrage dressée* (F).

حشية سبروتية عملة تملو نحو ٢٠ سم. أوراتها محروفية الشكل ، ثلاثية التجميع . نصلها غدي لرج . ازهارها تدو ودية وتنتهي بالأبيض || ازهارها يستمر من سزيان الى آب .

١٣٧٤٠ - سُفْرَسِيَّات ، سُفْرَسِيَّات *

Saxifragaceae (S). *Saxifragacées* (F). *Saxifragaceae* (E).

السفريسيات او القليات كما سماها بعضهم فصيلة نباتية من ذوات القلتين مدينة الشلالات . اسماؤها وابجتها وازهارها كثيرة العدد . معظمها نباتات حشوية . جميعها خشوية الازهار ، قليلة البزور .

١٣٧٤١ - سُفْرَنَة * ، سُفْرَنَكِيَّة *

Sphyræna spec (S). *Sphyrène*, Brochet de mer, Espec (F). *Sae-pike* (E).

سمكة بحرية من شاتكات الزنائف وحيدة الجنس والنوع . موطنها مياه البحر المتوسط . تتميز بأشواطها . راسها ذلق الخضر . لوئها الى الرقبة الكفشفية يبتدع من اقترابه من فيج للظهر || وفي من اسماك الشواطئ النباتية ، بجية الصنف ، مستنبة العلم .



سُفْرَسُ الْحَصَى



سُفْرَسُ حَرْمِي



سُفْرَسُ خَشِين



سُفْرَسُ صَنْبُغِي



سُفْرَسُ مَرْجِي



سُفْرَسُ مُسْتَدِيرِ الْوَرَق



سُفْرَسُ مُسْتَطِيلِ الْوَرَق



سُفْرَنَة

Spongipellis

١٣٧٥٣ - سَفَنَدِيَّات

ظفر من السيات يركب أحشاش يقض الراتنجيات
أعصاب التنوب واللاسفة فيصيب العفن المكسبي الذي
يشقق الخشب ويفصله ، بالطول والعرض ، إلى مكبات
مترابطة متناوبة عديدة الصلابة تحيطها من جميع جوانبها
أغشية للمشيح الحولية الحطية اللون || أما القطر فقوته
كلوية الشكل قطرها نحو ٤ سم. طرافها فارقة متطيلة
مركبة من طيتين العليا اسفنجية الميكيل سماكتها نحو
٣ م. والسفل ليفية حشوية سماكتها من ١ إلى ٥ م .
غضابها قليل الألوان ينطب فيها الحطلي والتي . لبابه
أبيض . بويضاته اعليجية الشكل طولها من ٣ إلى ٥
ميكرون .

Ruscus (S). Fragon (F).

١٣٧٥٤ - سَفَنَدَوْر

جنس نباتات مبروية عشبية معمرة من فصيلة الزنبقيات .
أنواع عديدة . سوقها مصلصة . رذائنها جلدية ، سنانية
الشكل . أزهارها نصلية الانتصاب . ثمارها عتية حمر
اللون . يزورها سيد || أشهر أنواعه ما يلي .

١٣٧٥٥ - سَفَنَدَوْر ذُلُفِي ، حَبَّ النَّار

Ruscus hypophyllum (S). Fragon hypophylle, Laurier alexandrin (F). Alexandrian laurel (E). Alexandrinischer Iorbeer (D). Rusco a foglie nude, Lauro alexandrino (I).

جنية برية وزينية تملو من ٤٠ إلى ٨٠ سم. رذائنها
تحمّل من ٥ إلى ٦ أذمار . أزهارها ثنائية اللون . ثمارها
إلى الحسرة المائلة .

١٣٧٥٦ - سَفَنَدَوْر كَبِير هو الرعد ، اطلبه .

١٣٧٥٧ - سَفَنَدَوْر لَاسِع

Ruscus aculeatus (S). Fragon piquant, Petit-houx, Houx-fralon, Suls piquant, Myrte épineux (F). Butcher's broom, Kneeholly, Box-holly (E). Echter müsedorn (D). Ruscopungenta, Brusco (I).

جنية ذليلة برية وزينية ترهب في الأتربة الكلسية .
تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. رذائنها صلبة ذلقة مديدة
لاسعة . أزهارها فردية أو ثنائية التجميع ، غصافها اللون .
جلابدها طيبة لتدخل في بعض المستحضرات النباتية
وفي مادة اللون تلبه المحمق وتنتقل الدم .

١٣٧٥٨ - سَفَنَدَوْر لَسَن * ، لِسَان الثَّرَمَس

Ruscus hypoglossum (S). Fragon hypoglosse, Langue de cheval (F). Horse tongue, Double tongue (E). Zungenmäusedorn (D). Rusco lingus-pagana, Bislingua (I).

جنية برية وزينية تملو من ٤٠ إلى ٨٠ سم. رذائنها
لسنة سنانية تملو من ٦ إلى ١٢ سم. أزهارها عتدية
ثلاثية أو خماسية التجميع .

١٣٧٥٩ - سَفَنَدَوْر لَيْثُون هو المرقلة ثنائفة ، اطلبه .

Sphénodon (F).

١٣٧٦٠ - سَفَنَدَوْن

حيوان بيوض من غطويات الرؤوس يعض أيضاً هتيره ،
اطلبه .

Sphindidae (S).

١٣٧٦١ - سَفَنَدِيَّات

Sphindidae (F). Sphindidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وأنواعها
المزعة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة

Grain de poussière (F).

١٣٧٦٢ - سَفَنَاف

Grain of dust (E).

اصفر ما يكون من ذرات اللقيح والأتربة وهي التي ترتفع
كالغبار .

Sophisme (F). Sophism (E).

١٣٧٦٣ - سَفَنَافَة

الفسطة برنة إستدلالية مغالطة .

Ecal'e d'oignon (F).

١٣٧٦٤ - سَفَط

Scale of onion (E).

سَفَط ج أسفاط . كل طبقة من طبقات البصلة تنحى
سَفَطاً .

Grain de colocynth (F).

١٣٧٦٥ - سَفَعَة

Seed of colocynth (E). سلع .

١٣٧٦٦ - سَفَنَدِيَّات المَشْعَرَيْن

Catarrhiniens (F).

Catarrhines (E).

في مجموعة قرود العالم القديم من أنف مخترجة متقاربان
وتقاربها تحت الألف || أنوعها واجنسامها كثيرة العدد
تجمعها ثلاث فصائل : أشباه الإنسان والمجربيات
والمجربيات .

Macrocystis (S).

١٣٧٦٧ - سَفَلِيح

Macrocyste (F). Macrocystis (E).

لبات بحري من الخفيات السمر . أطالنه معطر بحار
الناطق العطلة الحرارة || كلالينه نشطة قوية . صاقه
وحيدة السرعة المبط ، تملو من ١٠٠ إلى ٥٠٠ م .

١٣٧٦٨ - سَفَن

Peau écaillée (F). Scaly skin (E). سَفَن هو كل جلد أعشن كجلد التسلس .

Raja sephen (S).

١٣٧٦٩ - سَفَن ، سَفَن

سكة من الثغنين كبيرة القد تملو نحو ٨٠ سم. مرمتها
قاع البحر .

١٣٧٧٠ - سَفَنَاج *

Cacospongia (S).

Cacospongile (F). Cacospongile (E).

ويدهى الاسفنج الجامدة . جنس حيوانات بحرية ركنية
من اللاحيويات وفصيلة الاسفنجيات . أنواعه المبروة
قليلة العدد أطالنها معطر بمجادح البحر الأبيض المتوسط ||
تتميز بأاليها القرنية التركيب الجامدة التي لا تصلح
للاستعمال .

١٣٧٧١ - سَفَنَة *

Siphneus (S). Siphné (F).

جنس حيوانات لبرنة قاسمة جامة من المكبريات وفصيلة
الفلاريات . أنواعه خمسة جميعها صغيرة لقد موطنها البلاد
الاسيوية من الصين حتى بحر قزوين || اجسامها ريمة
تملو نحو ٢٥ سم. أذناها ٣ سم. وروثها شبه كروية .
حيوتها صغيرة . أذناها لاقفية . جرابنزا قصيرة خماسية
الاصابع . أطالنها مسطيلة مقوسة سادة . جامة تمككها
من سرعة الحفر في التربة || أنوعها إلى الكهة انفراد
تبقى عند الظهور وتبيض عند البطن || قوتها الاحشاش
والجنور وسائر المواد النباتية .

١٣٧٧٢ - سَفَنَاج ، سَفَنَاج

طائر كثير الاستئان (العمير) .



سَفَنَاج



سَفَنَة



سَفَنَدَوْر لَاسِع



سَفَنَدَوْن

١٣٧٧٣ - سِقَايَات

Buses, Buteonens (F).

حمار طير من فصيلة السقريات تشمل خمسة اجناس : البقاعة ، الصرارة ، الخوام ، النعيل والزنيق . جميعها ودية الجثة ، وروصها خضرة . مناصرها قصيرة عصينة البحرية الذرية . سواتلها واذانها مستطيلة . ارسافها قصيرة . غالبا قوية . اظافرها شديدة الالتصاق || مهدها العالم . قوتها القواصم والزخافات والحشرات لذلك فهي من الطيور النافعة || تكثر اركانها في الاشجار الباسقة الرقيقة . انثاها تقصع من رفة إلى اربع زفات تحضنها بتلويرة الذكر نحو اريمة اسابع .

١٣٧٧٤ - سِقَايَات

Buteo (S), Buse (F).

جنس طير من حمار السقريات . انواعه زهاء ١٧٥ جميعها ودية الجثة . وروصها خضرة . مناصرها حادة . سواتلها غليظة وقصيرة . غالبا غفية . اظافرها حادة . سواتلها متصلة الطول لا تلتصق الاذنان || قوتها القواصم على اختلاف انواعها والحالات والطقاء والتفادع واشغرات . لذلك تعتبر من الطيور النافعة الواجب حمايتها || اشهر انواعها ما يتبع .

١٣٧٧٥ - سِقَايَات السِقَايَات

Buteo desertorum (S), Buse des déserts (F).

نوع من السقارية موطنها الصحاري والقبائل طولا نحو ٦٠ سم . ثوبها يتخلط مع فصول السنة ولكن تلب في الكهبة الخفيفة . ذنبا عريض التجزيع . حيناها الى الحرة . مناصرها سطحي القاعدة ، اسد البحرية . رسفاها وغالبا الى الصفرة القاتمة .

١٣٧٧٦ - سِقَايَات السِقَايَات

Buteo borealis (S).

نوع من السقارية موطنها الولايات المتحدة الامريكية طولا نحو ٨٠ سم . ثوبها الى الكهبة الصنافية . واسها وظهورها وسطاها ابيض من صدرها وبلها وانتيكها . ذنبا اخر اذن يعلو تجزيع اسمر .

١٣٧٧٧ - سِقَايَات شالكة

Buteo vulgaris (S), Buse commune, B. vulgaire (F), Common buzzard (E).

نوع من السقارية موطنها لسيح الاربابه يمتد من اقصى الشرق الى اطراف اوروبية وافريقية . طولا نحو ٧٠ سم . ثوبها حديد الالوان يتخلط مع فصول السنة وتقدم الاسمر . تلب في الحرة . ذنبا مستعرض التجزيع . حيناها جرويتان مشرها ازرق القاعدة اسد البحرية . رسفاها وغالبا صفر .

١٣٧٧٨ - سِقَايَات صقريّة

Buteo lineatus (S).

نوع من السقارية موطنها شرق الولايات المتحدة الامريكية طولا نحو ٧٠ سم . تتميز بتمنيكها الشائنين الحرة . اظافرها سود . تألف ارجاع البتولا والقياب والمزار .

١٣٧٨٠ - سِقَايَات هيبانيات

Laceridae (S), Laceridae (F).

فصيلة حيوانات زملقة من رتبة السقليات المشققات الالسة . اجناسها ١٨ وانواعها زهاء ١٠٠ اجسامها رفيعة مستطيلة . انثاها زاهية الالوان صفاء اللوح .

والنحرفة نحو الباردة || اجسامها شديدة الصغر ، شبه اسطوانية الشكل ، تطلو من ٢ الى ٣ م . وروصها صغيرة . عيناها بارزة . تأشيرها ويلاصها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف ، مشارية للفصل . كواسلها مستطيلة الشكل . اتحادها لاحقة . ارسافها خاسية للقل . انثاها ملونة || تعيش على المواد النباتية وخاصة الفطور التي تنمو على جذوع الاشجار || اشهر اجناسها السننوس (S) Spindus . طوله نحو ٢ م . ثوبه الى السوداء الفضي يعلو خل تام . تألف ارجاع حيث تكثر الفطور التي يعيش عليها .

١٣٧٩٢ - سِقَايَات

Réformé (F), Reformed (E).

السيف من الخيل التي قطع منها السفاد .

١٣٧٩٣ - سِقَايَات كَرْعَان

Echinus esculentus (S), Oursin comestible (F), Edible sea-urchin (E).

نوع من الاعميس المأكول وهو كروي الشكل ، معلوم للقاعدة ، كثير الشوك . يكثر في البحر الاخر ويريد في المتوسط .

١٣٧٩٤ - سِقَايَات

Saphir (F), Sapphire (E).

هو الباليوت الازرق ويلى ايضا لازورد .

١٣٧٩٥ - سِقَايَات

Fane (F), Haum, Dead leaf (E).

هو الشمن يشغل ما سقط من اوراق الاشجار ويشغل ايضا سوق اوراق النباتات القليلة خسر المأكولة من الانسان كسوق واوراق البطاطا .

١٣٧٩٧ - سِقَايَات رَيْبِيَّة

Sphaeronema (S).

جنس طور مجهرية من فصيلة السقيات . بكتيدات غصينة او سطحية الارتكاز . نيفية او كروية الشكل ، صفراء او حناية الجول . قصباته مستطيلة الشب لتتني بكتائد يضيء || انواعه عديدة مظهرها ربي مركب . الحطب والعامد دند ان يطب النبات ان يؤذي كثيرا .

١٣٧٩٨ - سِقَايَات

Argo, Carène, Charles de mer, Vaisseau des argonautes (F).

Argo, Argo novis, Velâ argo, Pyxis (E).

السفينة كوكبية نجوم جنوبية المقع مركوها تحت الكلب الاكبر || مدد تجريبها ٩٤ اميزدا واشهرها التير الذي على المحيط الجنوبي وهو من المرتبة الاولى وتسمي العرب وسهك || ولسهيل اسطورة راجعها في الشعرى الباناء || ومن النجوم البارزة العالدة الى هذه الكوكبة « الترس » ودم مركب القوس » .

١٣٧٩٩ - سِقَايَات جَوِيَّة

Aéronef (F), Alroscif (E).

السفينة الجوية كل مركب تحلق طاقته الذاتية ، اي طاقته محركاته ، من الارتفاع عن الارض والسير في الجو .

١٣٧٩٠ - سِقَايَات

Aiguardier (F).

هو الذي يظهر ماء السقاية ويوزنها على مستقيما .



سقارة البيضاء



سقارة شالكة



سقارة مشوطة

١٣٧٩٢ - سِقْرُوسٌ مُخَطَّمٌ *

Cychrus rostratus (S). Cychre rostré (F).
Cychrus rostratus (E).

حشرة مفترسة ثائفة من فصيلة السكروبيات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألفت الاجرايح. قوتها الحزرون والبراق وديدان الحشرات || جسمها متوسط القد بطول من ١٥ الى ١٨ سم. ثوبها ال اسود الفسحي الكاند. رأسها مخروطي ينتهي بنظم مستدق وفكين غليظين. عيناها صفيرتان. زربانها دقيقتان مسطيلتان. ظهرانها اهليجي الشكل، مذهب الطرف للاحت. ارساغها خماسية المقل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في الخريف وتعيش حتى الربيع. تسرح في النهار. تسافد في نيسان وتجمع المكن ميعاديا على سطح التربة بين العبل والاوراق اليابسة || البرقة عند تمام ادراكها تطول من ٢٣ الى ٢٧ سم. جسمها مردي الشكل، مبط الجرم، سداسي الرواسب. ثوبها ال الطحلة السوداء القائمة. رأسها وكها وشربها ال السمرة الكسنتية || طول الاكمال الذي يستمر من ٣٥ الى ٤٥ يوما يقضي في البش المودي القور الذي يتخفوه البرقة للاختباء فيه والايقاع بقضها.

١٣٧٩٣ - سِقْرُوبٌ * Scarite (F). Scarites (E).
جنس حشرات ثائفة من فصيلة السقروبيات. انواعه عديدة جميعها مفترسة. ألوانها سوية اللون يلب فيها الاسود اللامع. تأثيرها قوية. ارجلها الاسامية كبيرة القد جامة || تألف الشطوط البحرية والتهرية غابها تربة، وخرولية الشكل، عروية الاوتكار الفوري. اشهر انواعه ما يتبع.

١٣٧٩٤ - سِقْرُوبٌ اَمَلَسٌ *

Scarites laevigatus (S). Scarite lisse (F).
حشرة شبالية تسرح من الشروق الى الغروب. طولها رايوح من ١٦ الى ٢٠ سم. ثوبها ال اسود اللامع. غدها قاطبة الخطوط المائلة المبهمة. موطها شرطي البحر المتوسط. قوتها كل ما استطاعت اليه سيك من الحشرات والديدان || مسرحها يقوم طول الربيع والصيف.

١٣٧٩٥ - سِقْرُوبٌ مَكَاوِدٌ * Scarites buparius (S). Scarite géant (F).
حشرة دجوية تسرح من الغروب الى الشروق. طولها رايوح من ٢٥ الى ٣٥ سم. ثوبها ال اسود اللامع. موطها شطوط البحر المتوسط. قوتها كل ما استطاعت اقتنانه من الحشرات || مسرحها يستمر من اوائل الربيع ال اوائل الخريف.

١٣٧٩٦ - سِقْرُوبِيَّاتٌ * Scaritidae (S). Scaritidés (F). Scaritidae (E).

فصيلة حشرات ثائفة مفترسة من مفدمات الاجنحة اجناسها وانواعها كثيرة العدد. اجسامها متباينة القد. ألوانها مختلفة تغلب فيها الالوان السوية انحصا الاسود اللامع. تأثيرها قوية. قوتها الاستشارية "تكثر على تجاوب مفرقة مركزها تحت العوينات || تألف الشواطئ البحرية والتهرية. تقترب الحشرات والديدان والحوم.

١٣٧٩٧ - سِكْسَاقٌ هو الزقازق : اطلبه.

١٣٧٩٨ - سِقَطٌ Aile (F). Wing (E).
هو جناح الباتر. يقال رفع الطائر سقطة.

١٣٧٩١ - سِقَايَة هي السقاية : اطلبه.

١٣٧٩٢ - سِقَايَة الحِطَّانِ

Lézard des murailles (F).
عقاية تدعى بحلية الحيطان، اطلبه.

١٣٧٩٣ - سِقَايَة خَشْرَاك

Lézard vert (F).
عقاية تدعى بحلية خشراه، اطلبه.

١٣٧٩٤ - سِقَايَة رَشِيك

Lézard agile (F).
عقاية تدعى بحلية رشكة، اطلبه.

١٣٧٩٥ - سِقَايَة وَكُوْد

Lézard vivipare (F).
عقاية تدعى بحلية وكد، اطلبه.

١٣٧٩٦ - سَقَبٌ Branche mère (F). Mother branch (E).

النصن الريان الغليظ الطويل الذي يتوسط الشجرة ويكون امتدادا لسانها. يقال له في لبنان الملك.

١٣٧٩٧ - سَقَبٌ

ولد اللقاة الذكر. قال الاصمعي. اذا وضعت لقاة ولدها فولدعا سامة تقضم سايل قبل ان يعلم اذكر هو ام انثى فاذا علم فان كان ذكرا فهو سقب وانه سقب ويقال لذاتي سائل.

١٣٧٩٨ - سَقْدٌ * ، سَقْدَةٌ Entrainer (F). To train (E).

سقد وسقده الفرس : غسره. خرج في البحر يسقده ويسقده الخيل || والسقده هو الفرس المضر.

١٣٧٩٩ - سَقْدَةٌ * ، سَقْدَةٌ

Estrela minima (S). Sénégalain nain (F).
حصول من الجراثم الخروطيات المتأخر. موطنه افريقية الاستوائية. طول نحو ١٥ سم. ثوبه احمر اللون تملوه معة بيضاء. مثاقه ورجلاه ال الصفرة || يألف الحدائق والحقول وجوار الممران. قوته البرور والثر والحشرات والحوم || يرجع ويعيش في المطيرة والحدائق لكن لا يقدر.

١٣٧٩٠ - سَقْدِيَّاتٌ * Molluscose (S). Molluscacées (F). Molluscacées (E).

عمارة لقور مجهرية من فصيلة الحشرات ورتبة الزقيات. اجناسها وانواعها عديدة تتميز بيسادتها الطليقة السطحية الاوتكار. تكاثرها تحضن بويقات شفافة بسيطة او حديدية الخلايا. تكاثرها خيطية تشابع التكاثر || لها جنسان مؤنثان : الذليل والزيقة.

١٣٧٩١ - سَقْرَابٌ * Scarabus (S). Scarabe (F). Scarabus (E).

جنس دوبيات بحرية من الرضويات مدييات الابل. انواعه المخرقة عديدة اعطائها بحار البلاد الحارة والمتلة الحرارة || جميعها مفترسة. حلازنيها يرمية الشكل و مستعرضة القدوة الرمية : طول من ٣ الى ٧ سم. || ألوانها عديدة : جميعها مزخرفة ومنقطة بالجزوي اوالقوي او الكسني او العاني.



سَقْدٌ



سَقَبٌ



سَقْرُوسٌ خَشْمٌ



سَقْرُوبٌ اَمَلَسٌ



سَقْرُوبٌ مَارِدٌ

١٣٧٩٩ - سَقَطَر * ، سَقَار *

Sparus striatus (S), *Spara strid*, *Scachare* (F), *Scacher* (E).

سمكة بحرية يابوس من فصيلة الاسبوريات شاكات الزعانف . اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط اسمها المحلي الشكل ، مبط الجرم ، يبلول نحو ٢٥ سم. سفها مستوي الشكل ، معتدل الجرم . ثوبا الى الريدة السمرة الرصاصية المواج يمتد من الظهر ويتر ويبيض عند البطن ويلو في الجانبين تزيين ازرق اسود التي الابداع يتألف من ١٢ خط . رأسها معتدل الجرم ، قصير المنظر . فكاهها متساويان . شفتها قليل الانفرج . اسنانها متراصة . منبها لقبان صيران . منها كيرتان ، نادران ، وقبما الاركان . زعانفها قياسية الاظام . الظهرية واحدة ، مستطيلة ، شاككة القسم الاسامي . الشرسية تقابل القسم السرح من الظهرية ونحوي ثلاثة مناجس . الذيلية قليلة التغير . لها متوسط الصف والجودة ، مأكول .

١٣٨٠٠ - سَقَطَم في القارة الآرية ، اطلميا .

١٣٨٠١ - سَقَطَر * *Cynopterus* (S), *Cynoptère, Mégère sans queue* (F).

جلس صيران من فصيلة الخوطاطيات . انواعه المعروفة قليلة يقال انها ثلاثة . جميعا اميرية شرقية ، صغيرة القد ، براه ، طليقة القراس ، قصيرة العنق . طولها يراوح من ١١ الى ١٢ سم . وبسطها من ٥٠ الى ٥٥ سم . تعيش جماعات قليلة العدد . تألف التمثل والاشجار الغربية . قوتها آثار حل اختلاف انوميا اعضها المتنة والذئفة .

١٣٨٠٢ - سَقَطِين * ، مَكَلَك البَحْر *

Squatina squatina (S), *Squatina, Ange de mer* (F), *Angel-fish, Angel-shark, the Monk* (E).

سمكة بحرية ولودة معتدلة من فصيلة السقطيات . اعطائها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . سرسها على قاعا تقترب من المباح والشطوط . قوتها الاسماك البليطة والرخويات والقشريات . جسمها معتدل انتطيط ، شبه صفي الشوزن ، يبلول من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . رأسها غليظ عريض مبط الجرم ، مقطوم الحظ الاطلسي . لها طر في الاركان واس الشفق . اسنانها صغيرة مدنية اطراف الحادة المتعقبة . منبها كيرتان . منبهاها ونسها صيران . زعانفها الصدرية والخروية كبيرة الحجم فائدة كالجناح . زعانفها الظهرية صيرة القد ، خلفيتا الاركان الذي يتألف قاعدة الذنب ، الزعنفة الشرسية حاسمة لا اثر لها اما الذيلية لمعدلة الحجم فائدة . لها متوسط الصف ، مسكها جيد يستعمل في صناعة الاغذية الشسية .

١٣٨٠٣ - سَقَطِينِيَّات * *Squatinidae* (S).

Squatinidae (F), *Squatinidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية ولودة من السقطينات وربة الاشلق . اجنتها وانوميا المعروفة قليلة العدد . اعطائها جميع مناطق البحر الابيض المتوسط والاشلق الغربية من الشاف نادرا جدا . قوتها الاسماك البليطة والرخويات والقشريات . جسمها معتدل التبيط . خروية الشوزن ، تعلو نحو ١٥٠ سم . رؤسها مبطلة مسطوية الاظام . تتميز بخليها

من الزعانف الشرسية ويكر زعانفها الصدرية والخروية ويصر زعانفها الظهرية الخلفية الاركان . اشهر اسماكها واعرها السقطين .

١٣٨٠٤ - سَقَع *Plage* (F), *Beach* (E).

لثاحية المنسبة البريلة من الشط .

١٣٨٠٥ - سَقَقِيَّات الخيشوم *Tecibranchs* (F).

ربة حيرانات من الرخويات المدية غليظات الخياشيم .

١٣٨٠٦ - سَقَقِيَّات الرؤوس * *Stégocéphales* (F), *Stegocéphalous* (E).

ربة من الصفصيات الصغيرة يمد عنها الى الاباج الازل وقد انقرض معظمها في اوائل الاباج الثاني . بعض حيراناتها كانت تشبه التاسيح وبعض الآخر يشبه السطاه . جميعها كانت مصفحة الرؤوس المسقوفة .

١٣٨٠٧ - سَقَلَّاط * *Porcellana* (S).

Porcellane (F), *Porcellana* (E).

جنس منع من فصيلة السقليات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم ومنها البحر الابيض المتوسط . اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل . ظهورها معتدلة الابداع ، صلبة الدروع الجامة . ارجلها كبيرة ، مدنية الاظافر باستثناء الزوج الخلفي التفتين الجرم والرجل الاركان . ملاحظها طليقة ، مبطلة ، شديدة النشط . زنها غليظة مستطيلة . قرانها الاخضر اللامع او الجزوي ملونها رقة سفراء يتخلل انتشارها بالنسبة الى الانواع .

١٣٨٠٨ - سَقَلَّاطِيَّات * *Porcellanidés* (F).

Porcellanidae (E).

فصيلة من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل تتميز بدقة الزوج الخلفي من ارجلها النشابة في المحيط الظهري بدلا من المحيط البطني . اجسامها وانوميا عديدة منتشرة في معظم بحار العالم .

١٣٨٠٩ - سَقَمُونِيَّات * ، مَحْمُونَة

Convolvulus scammonia, *C. syriacus* (S), *Scammonée, S. d'Alep* (F), *Scammony plant* (E), *Purgierwinde, Syrische winde* (D), *Scammonia, Scamonea d'Aleppe* (I).

نبات طبي حشبي لني حار من فصيلة البلياتيات اوراقه متعاقبة رعية مثلك الزوايا . ازماره ابليبة الاركان طويلة الزناد ، بيضية الشكل ، صفراء اللون مشربة اللباس . يستخرج من جلوده صارة وتاجنية صنية كثيرة الاستعمال الطبي .

١٣٨١٠ - سَقَمُونِيَّات في البلياتيات فصيلة نباتية .

١٣٨١١ - سَقَطَر مُشِير * *Centropomus lineatus* (S), *Centropomus rayé* (F).

Centropomus lineatus (E).

سمكة بحرية يابوس من فصيلة القرشيات شاكات الزعانف . اعطائها سطر اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . جسمها المحلي الشكل ، يبلول من ٢٥ الى ٣٥ سم . قوتها الى للهمة القضية . ظهرها ينمسي اللون ويلو في جانبيه تزيين قاطب اصفر ذهبي . رأسها مخروطي الشكل ، ذات الحزم ، كبير الشفق . فكها



سَقَطَر



سَقَطِن



سَقَلَّاط



سَقَمُونِيَّات



سَقَطَر مُشِير

الشكل ، مشدود القشار . ثوبها الى الخضر الاخهب تملوه بقعة سمراء وسط فصوص اسود وعطشان جانبها الى الجؤرة . ويعطوها في كل سكة من سكهها البطينية اربع نقط سود متوترة بالهب . رأسها الى الجؤرة القامة . مدبها الى الرتبة السوداء . وراجها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة ضمن جلاباب من الطين .

١٣٨١٩ - سَقَنُورَة عَشَشَة ، قَبُوتَات

Pressure (F). Pluck, Harslet (E).

هو كل ما له قيمة ثانوية في التصابة كالتربة والقلب والكروش والقوائم الخ .

١٣٨٢٠ - سَقَنُورَة هَنْجَار ، هَنْجَارَة

Hangar (F). Outhouse, Shed (E). السقفة والصفت بناء زراعي مكشوف الجانب او بعضها تحفظ فيه الآلات الزراعية ويستعمل أيضاً لايلاء المحاصيل .

١٣٨٢١ - سَكَّ

Araneus (S). Epelre (F). جسد حناكب كبيرة القد ، انواعه نحو ٨٠٠ موهبها العلم .

١٣٨٢٢ - سَكَّ

Gite du scorpion (F). Lodging of scorpion (E). هو جسر المغرب .

١٣٨٢٣ - سَكَّ مَشُوج *

Araneus diadematus (S). Epelre à diadème (F). Garden spider (E). Kreuzspinne (D).

نوع من الحناكب المغترمة المبلوطة ، ثنائيات الورايا سداسيات المشاق ، من فصيلة الرمبييات || جسمه مشعل اللد يطول نحو ٩ سم . عند التكب ونحو ١٥ سم . عند التكب . صدره يرمي الشكل ، صغير القد ، حنطي القرن . عيناه زيمتان ، شمساه صغيران ، ذربان . فكاه معتدل الطول . بطنه اهليلجي الشكل ، حنطي اللون تملوه نقط نظامية تبرز كالمردف المرفوف . جزماته مستطيلة ، كهيئة الحلب القصير || يأت البراري والحدائق . شم كبير القد . يتجسس بين الاجار والادغال . قوته الخشرات والذباب والحوام || يعتبر من الحناكب النافعة اللاذمية .

١٣٨٢٤ - سَكَايُورَة ، جَمْرِيَّة ، زَهْرَة الْحَرْب

Scabiosa (S). Scabieuse (F). Scabious (E). Skabiose (D). Scabiosa (I).

جسد نباتات برية وتربلية من فصيلة الدبسيات انواعه نحو ٥٠ منها الحناكب والاشباب الحولية والحولة والمصرة . اوراقها متعابلة مركبة وبفرقة . ازهارها ولوسية طويلة الزناد . جملة الشكل والالوان ، كانوا يمزون لها في الماضي القريب عدة خواص طبية منها الشفاء من الجرب والسلس وضربها من الامراض الجلدية . اشهر انواعها ما يلي .

١٣٨٢٥ - سَكَايُورَة الْقَوْضَاك

Scabiosa caucasica (S). Scabieuse du Caucase (F).

مشبة معمرة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها مشنة الخافتة ، جملة الخضر الزاهي || ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٦ سم . لونها الى الزرة السابوية || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٣٨٢٦ - سَكَايُورَة بَسْتَانِيَّة *

Scabiosa purpurea (S). Scabieuse des jardins, Fleur des vroupes (F).

مشبة حولية عديدة القرب تملو من ٤٠ الى ٩٠ سم .

الاسفل يتقدم الامل . اسنانها صغيرة ، ذرية ، متراصة . عينها كيرتان ، ناشرتان ، رفقا الانكاز . زعانفها الظهريه اثنتان . زعنفتها الذيلية كبيرة ، فارقة || لحمها غافر الصفت ، مغروب فيه .

١٣٨١٧ - سَقَنُور

Scinus (S). Scinque (F). Skink (E).

جنس حيوانات من العظاء القصرات الالسية . انواعه ثمانية منها غشاق الانهار والصحارى الالسية والافريقية . جميعها اكبر من السحالي واضخم . قوائمها خالية الاصابع . اذنانها قصيرة . اكثافها بجمجمة ، ظهورها مدببة بصفرة وصاد . بطونها الى البياض الاغبر . كان ولا يزال يستعمل ، بعد تحفيره وتجفيفه بالمالح ، لتجيب الباء والامناظ . وهو شائع الاستعمال في مصر والسودان ويغريها من البلاد الافريقية . ومنهم من قال انه يلهب بالفالج والقوة والقرص والوجع المفاصل .

١٣٨١٨ - سَقَنُورِيَّات

Scincidae (S). Scincidae (F). Scincidae (E).

فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العظاء قصيرات الالسة منها السقنور واليدبة ورضافة البقر والحكاكة || انواعه نحو ٤٠٠ معظمها من زحافات المناطق الحارة .

١٣٨١٩ - سَقَنُورَة الْأَجَل

Déchance du terme (F). سقط من المدين في الاجل الموت قاتلياً عندما لا يقع قطعاً مستحقاً بعد انذاره رسمياً بسقوط حقه في الاجال الباقية فيصبح اللين اذا ذلك واجب الاداء . هذا وقد يسقط الحق في الاجل الموت ، قانونياً ، في سالت ؛ اشهار افلاس للمدين او اذا قام للمدين باعمال تحط من قيمة الضمانات المرصودة .

١٣٨١٥ - سَقَنُورَة الدَّعْوَى

Péréemption d'Instance (F).

هو اعاء آثار كل اجراء في الدعوى يتعذر به للمضى عليه بعد انقضاء مدة مملوطة .

١٣٨١٦ - سَقَنُورِيَّات

هو الشركة الصفراء ، المظلمة .

١٣٨١٧ - سَكِّي ، تَرْوِيَة

Abreuvement (F). Wacering (E). هو اسقاء او ارواء الحيوان والنبات .

١٣٨١٨ - سَكِيَّة اَنْثِيَّة *

Scotogramma elegans (S). Scotogramma élégane (F). Scotogramma elegans (E).

حشرة من فصيلة السقليات ورتبة حرشقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . فرائشها جارية قتيها ريشق الازهار . سرقتها تقيش على اوراق السرققيات البرية والزراعية || جسمها صغير القد يطول نحو ١١ سم . يسقط نحو ٢١ سم . رأسها صغير الحجم . جناحا كيرتان . زربانها غطيان . سرقتها مشعل الطول . بيوتها وبطنها الى الرتبة || ورشها والاميان الى الرتبة الخطية تملوها زورقة وزرقة متباية يتخللها بعض البياض . ورشها الخلفيان الى الرتبة الثراء تسمر مع اقترابها من الطرف الخاربي || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجبل الاول في ايار وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب . تسرح في الليل . تمانل بعد ظهورها بنحو سبعة ايام وتحت المكن لطفاً مستطيلة على الصفحات السفلى من تصال اوراق السرققيات || السرعة تطول نحو ٣٠ سم . جسمها اسطواني



سَقَنُور



سَقَنُورَة اَنْثِيَّة



سَكِّي مَرْج



سَكَايُورَة بَسْتَانِيَّة

الزناد. غيبية التركيب ، خامسة الفصل || اشهر انواعه سكب الغرب .

١٣٨٣٤ - سكب الغرب *

Sanicula europaea (S). *Sanicle d'Europe*, *Sanicle mille* (F), *Common sanicle*, *Wood march* (c). *Echte heilknecke*, *Sanikel* (D). *Sanicola*, *S. maschia* (I).

نوع من السكب هو نبات عشبي، جلمووي، طيب، بري، يطلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. ازهاره وردية اللون. يتصلل في الطب البيطري. اوردته تقيد الاقار عند الاضرار وبعد الوضع لانه يستعمل المخلص اي خروج المشية.

١٣٨٣٥ - سكب
Scape هي في الحشرة اول فصلة من الزبان .

١٣٨٣٦ - سكب
Planche basse (F).
Shallow bed (E).

سطيل او مربع من التراب سفل وسفل منخفضاً عن سطح التربة لاحتيا لامتصاص ماء السقاية .

١٣٨٣٧ - سكتيات
Saniculées (F). *Sanicles* (E).
سبط من الخبيات عديد الاجناس والانواع اشهرها السكب .

١٣٨٣٨ - سكتينج
هو انجذان الدم ، اطلبه .

١٣٨٣٩ - سكتة ، حثيطة ، همدكة ، حثربة
Apoplexie, Coup de sang (F).
Apoplexia, Apoplexy (E).

استقان شديد مع زف او رشع او انسكاب دموي في انسجة المخ او غيره .

١٣٨٤٠ - سكر
Bastardeau, Vanna (F).
Coffer-dam, Water-gate (E).

حاجز يتحرك من فوق الى تحت يترقى طريق الماء فيسمح بمروره او يمنعه . وهو ايضاً مد يسمح بتحويل الماء من مجرى الى آخر .

١٣٨٤١ - سكر
Sucre (F). *Sugar* (E).

مادة حلوة اللماق متبلورة سهلة اللويان في الماء . كثيرة الانتشار في المملكة اللبنانية توجد في جلود النبات وسوته واوراقه وعصاره || وهو من الوسيه الكباريه يقسم الى مادة سميكة تدعى غلوكوز كا في الشب وسطح التار. ومادة ثنائية تدعى سكروز كا في عصير قصب السكر والفلوشو... || اما السكر من الوجيه الحيوانيه فهو مصدر الحرارة الحيوانيه التي يرتكز عليها كل نشاط .

١٣٨٤٢ - سكر
Saccharifier (F). *To saccharify* (E).
حوك الى سكر .

١٣٨٤٣ - سكر العنب
Glucose هو الفلوكوز ، اطلبه .

١٣٨٤٤ - سكر متعكس
Sucre inverti (F).
Inverted sugar (E).

هو السكر الذي صار قابلاً للاختار اي السكروز الذي تحول الى غلوكوز وفلغولوز .

١٣٨٤٥ - سكرات
Saccharate كل مركب من السكر مع اوكسيد معني .



سكايوزة حثيئة



سكايوزة ورد الحام



سكب الغرب

اوراقها ملتحة ، ربابية . خلية النصل || ازهارها كبيرة اللد لونها يختلف باختلاف الضرب فيها البنفسجي والازرق والبيكي والوردي والايض والاصفر والوشج . جميعها لراحة العرف المسكي || ثمارها خلية البشرة ، ثمانية التخليد القلبي || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

١٣٨٣٧ - سكايوزة حثيئة *
Scabiosa arvensis (S). *Scabieuse des champs*, *Langue de vache* (F). *Scabious*, *Pin-cushion flower* (E). *Ackergrindkraut* (D). *Scabiosa del camp*, *Ambretta* (I).

عشبة طيبة برية معمرة تملو من ٢٠ الى ٧٠ سم. اوراقها ملتحة مشرقة مستطيلة الفص الوسطي . تصلها زغبية البشرة ، احمل القرن || ازهارها صيرة اللد قطرها رلوح من ٢ الى ٣ سم. لونها الى الزرقه البليكية . ميرها مسكي العرف || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٣٨٣٨ - سكايوزة عطرية
Scabiosa canescens (S). *Scabieuse odorante* (F).

عشبة معمرة تملو نحو ٦٠ سم. اوراقها كبيرة اللد مشرقة ، تدرعها ندي الشكل || ازهارها كبيرة الحجم ، زرقه اللون ، عطرية العرف . ثمارها خلية البشرة ثمانية التخليد القلبي || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٣٨٣٩ - سكايوزة كبريئة
Scabiosa sulphurea (S). *Scabieuse jaune soufre* (F).

عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٤٥ سم. اوراقها كاملة مستطيلة مدنية . تصلها ازغب بالصفحة ، احمل القرن . ازهارها خلية البشرة ، كبيرة اللد ، كبريئة اللون || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٣٨٤٠ - سكايوزة نجمية
Scabiosa stellata (S). *Scabieuse étoilée* (F).

عشبة حولية تملو نحو ٥٠ سم. اوراقها ملتحة ، ربابية ، سفنة . تصلها خلي البشرة احمل القرن || ازهارها مستطيلة الزناد ، متوسطة الكبر ، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الياض البيكي ، حنارها اصفر || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٣٨٤١ - سكايوزة ورد الحام *

Scabiosa columbaria (S). *Scabieuse columbinaire*, *Columbina* (F). *Small scabious*, *Lilac flowered scabious* (E). *Taubenskabiose* (D). *Scabiosa columbaria* (I).

عشبة معمرة عديدة الضروب تملو من ٢٠ الى ٨٠ سم. اوراقها مفصصة وسفنة الحاللة . تصلها خلي البشرة بحري القرن || ازهارها كبيرة اللد لونها يختلف باختلاف الضرب . فيها الاصفر والازرق والايض والاصفر . ثمارها خلية البشرة ثمانية التخليد القلبي || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين .

١٣٨٤٢ - سكاكة
Aérologie (F).
Aerology (E).

السكاكة علم يبحث في اسوال الجو الرقيق وفي غلغل مساحبه الصاعدة والمنخفضة .

١٣٨٤٣ - سكب
Sanicula (S). *Sanicle* (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخبيات . انواعه ثلاثة اوراقها طويلة الريجات كفية مفصصة . ازهارها عذكولة التجميع ، حامية الارتكاز ، طويلة

* ١٢٨٥٨ - سَكْسِيْد ، سِيلِيْكْسِيْس *

Cinixys (S). Cinixyde (F). Cinixys (E).
جنس حيوانات زسافة يرية مائية من فصيلة السملحات .
انواعها المعروفة ثلاثة موطنها بعض مناطق افريقية اخضا
غنية والبلاد المجاورة || اجسامها متوسطة القد . اذبالها
لاسحة ، عذرة بالطلول والعرض ، مفصلي الاطراف
الخلفية ، تطفل كامل الجسم || جميعها حاصلة قوتها
الاعتصاب البرية والمائية .

* ١٢٨٥٩ - سَكْسِيْك *

Saxicava (S). Saxicava (F). Saxicava (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات صليحيات الخياشم ،
وفصيلة الصلغويات . انواعها المعاصرة قليلة اصطناعا بعض
مناطق البحر الابيض المتوسط وايطالي الاطلسي || اصداها
شبه هربة الشكل ، متساكنة ، غمدية ، متوسطة القد . تعيش
مشابها مستقلة . مصاريها عادية التستين . تعيش
لاصقة بالصخور الكلسية . ليفتها غزير المادة كيميها .

* ١٢٨٦٠ - سَكَّع ، بَعُورُ مَرَمِمْ ، زَهْرُ الْمَسِيحِ ،

عَرَقَنِيْقَا ، وَكَلَف ، حَمِيْرُ الْمَشَايِغ ،
بَغْلَاْمَس ، وَكَلَف ، يَرْوِغ ، سِيكْلَامِن
Cyclamen (S). Cyclamen, Cycdame, Pain de pour-
ceau, Arthanite, Arthanite (F). Cyclamen, Bleeding-
sun, Sow-bread (E). Cyclamenvelchen (D). Cicle-
mino, Tubero florito, Pan porcino (I).

جنس نباتات عشوية معمرة من فصيلة الربيما
انواعه نحو ١٢ صنفها مستندرة مبطلة لونها الى الجفرة
الناعمة . اوراقها زانعا قرصية الانتشاح مستطيلة الزباد .
ازهارها خامية التركيب ، فردية التجميع ، متسكة
الارتكاز . ثمارها كمار صغيرة ، كروية ، عديدة
البذور . كان ولا يزال من النباتات المغايرة
التي تدل على تركيب علة مستحضرات . وهو شائع
الاستعمال في الطب البيطري عصاره صنفها غنية بالسكرين
وهي مادة قلوية غمدية ومنهم من استعمالها في صيد الاسماك .
اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

* ١٢٨٦١ - سَكَّعُ اُرُوبِي *

Cyclamen europeum (S). Cyclamen d'Europe (F).
حسيت متوسطة القد تطرها نحو ٤ سم . قلاتها الجلدية
عشية التركيب تم كامل الصفحة السفلى . اوراقها
قلبية . مستندرة الزوايا ، فصلها جامد النسيج ، اخضر
الصفحة العليا المنسجة بالابيض ، اخر السفلى || ازهارها
مرفية الرائحة ، وردية اللون ، يعلوها نواج قرمزي . مبالغها
تطول من ١٠ الى ١٥ سم || ازهارها يستمر من تموز
الى تشرين .

* ١٢٨٦٢ - سَكَّعُ الْبَنْدَلِيَّةِ *

Cyclamen
neapolitanum (S). Cyclamen neapolitan (F).
حسيت كبيرة القد تطرها يراوح من ٥ الى ٢٠ سم .
قلاتها الجلدية حنارية حوقية || اوراقها قلبية الشكل ،
مهمة الزوايا ، فصلها جامد التركيب ، ابيض التليج
والخافت . ازهارها يضاء اللون او وردية يعلوها عند اعناقها
توضيح اخر . مبالغها تطول نحو ٢٠ سم . || ازهارها
يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

* ١٢٨٦٣ - سَكَّعُ الْقَصْع *

Cyclamen coum (S). Cyclamen de Cos (F).
حسيت صغيرة القد تطرها نحو ٢ سم . اوراقها يغيية

Sucrose (F). Invert sugar (E). سَكَّرَان
هي خيرة السكر التي تحول السكر الى غلوكوز ولفركوز
قابليين للاختار .

* ١٢٨٦٧ - سَكَّرَان هو البنج الاسود ، الملبه .

* ١٢٨٦٨ - سَكَّرَان *

Scopolia (S). Scopolie (F). Scopolia (I).
Scopolia (E). Tollkraut (D). Scopolia (I).
جنس نباتات عشوية بطورية معمرة من فصيلة
البذنجانيات . انواعها قليلة جميعها زراعية تربية .
سوقها فاقية . اوراقها متفكة بسيطة متناحية . ازهارها
فردية . ابطية ، كوية ، مملقية ، متدلية || احرف
انواعها ما يتبع .

* ١٢٨٦٩ - سَكَّرَان اَصْفَر *

Scopolia lurida (S). Scopolia jaunâtre (F).
عشبة تربية مهددا الهند . تمل نحو ١٥٠ سم . ازهارها
خلفية التفصيص صغيرة القد تبدو عفرها اللون ثم
تتحرف الى الاصفر وتقتني بالاربعوني || ازهارها
يشمر ٥ اشباع ابتداء من اواخر آب .

* ١٢٨٧٠ - سَكَّرَان الْعَرَبِ *

Scopolia carnolica (S). Scopolie de carniole (F).
عشبة معمرة مهددا غربي اروبة . تمل من ٣٠ الى
٦٠ سم . ازهارها جلوية اللون متوسطة القد || ازهارها
يشمر من نيسان الى ايار .

* ١٢٨٧١ - سَكَّرَاة هي الزوان ، الملبه .

* ١٢٨٧٢ - سَكَّرَجَا *

Soldanella (S). Soldanella (F). Sea bind-weed (E). Straudwinde,
Bärwinde (D). Soldanella (I).
جنس نباتات عشوية يرية جبلية معمرة من فصيلة
الربيما . انواعها خمسة . سوقها خراغية تمل من ٥ الى
٣٠ سم . اوراقها جلدية مملوقة مستندرة . ازهارها فردية ،
هامية ككل الشراغ . لونها ورجمها يختلفان مع نوصها .
لها الاحمر والبنفسجي والازرق والبيجي .

* ١٢٨٧٣ - سَكَّرُ ثَبَات *

هو الابلوج والقديم الملبها .

* ١٢٨٧٤ - سَكَّرُوز *

Saccharose (F). Saccharose, Cane-sugar (E).
هو المادة الحلوة الموجودة في صير قصب السكر والشوكر
والقند والاسفندان . وهو منشوري التبلور ثقله القوي
٩٠٦٦ غلوه المائي متيسر .

* ١٢٨٧٥ - سَكَّرِي *

Sacchareux (F). Saccharous (E). يحتوي حل سكر .

* ١٢٨٧٦ - سَكَّرِين *

Saccharine, Sucre de houille (F). Saccharin, Glusidum (E).
هو سكر القلم الحبري ، مسروق ابيض شديد الحلاوة
كثير حلوته ٣٠٠ مرة من السكر المعروف . يستخرج
من قوران القلم الحبري . يمتزجه مشرا بالصمغ
ولا يميزون استعماله الا في الصيدلة .

* ١٢٨٧٧ - سَكْسَكُر *

Talapoin (F). هو هيرس سكار . الملبه .



سَكَّرَان



سَكَّرِي



سَكْسِيْد



سَكْسِيْك



سَكْسِيْك



سَكَّعُ اُرُوبِي



سَكَّعُ الْبَنْدَلِيَّةِ



سَكَّعُ الْقَصْع

غشقة المزهر اللبد . اغامدا لا تلتف كامل البطن .
قوائمها نشيطة ، مستدة الجرم . أثوابها متباينة التخصيب
منها وريجة اللون ومنها بيضيه وبرزক্ষে || جميعها دامتة
تميش تحت القشور والحاء وفي الاغشاب النخرة .



سكج لينائي

١٣٨٧٠ - سَكْفِيَّات (F). Scaphididae (F).

فضيلة حشرات من عُمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها
المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم غابات المناطق
المعتدلة الحارة والحارة . اجناسها صغيرة طول من ٥
الى ٩ م . رؤوسها مصعرة ، ملوحة ، عينها صغيرة ،
بارزة . تاشكرها وفكوكها قياسية . قرونها الاستشعارية
لانظامية ، منها الصولحانية ومنها الخيطية ، جميعها مركبة
من ١١ فصلة . كواسلها عديمة ، شارقة ، تلتف القسم
الاكبر من الرأس . اغامدا مائلة لا تلتف كامل البطن .
بطونها مدبة المزهر . جميعها دامتة تميش تحت الحاء وفي
الاغشاب النخرة وفي فكاك القشور الدالة || اشهر
اجناسها السكفيد .

١٣٨٧١ - سَكْل (F). Synodontis (F). Schal (F).

الشكل ج أسكال . جلس اسماك نهريه من فضيلة
السورديات تكثر في مياه الانهر الانريقية ، تتميز
بضخامة شكلها واسوداد لونها وصفر وريوسها وتبهيب
طبقاتها الست .



سكبد

١٣٨٧٢ - سَكْلَاف (F). Acalaphus (F).

جلس حشرات لافونية من فضيلة السكلافيات ورتبة
شارفات الاجنحة . انواعها المعروفة عديدة ، مغطيا بألف
الاقاليم المعتدلة والبعض الآخر يعيش في المناطق الحارة
او المتحيرة نحو القابرة || اجناسها متوسطة القد وكبيرة .
بطونها تراوح من ٣٥ الى ٨٠ م . رؤوسها شبه مخروطية
الشكل ، كهيئة الحلب النقيق . اجنسها مستطيلة ، بعضها
شفاف والبعض الآخر مغطى . جميعها ملوكة . غشايها
الرئيسي اصفر او عاجي تملو بضع وزخارف يراوح لونها
من الاصفر الى الاسود . قرونها الاستشعارية مستطيلة
تنتهي بطور من الحلب الناعم سفية الشكل او مدنية .
صغورها معتدلة النعانة ، كهيئة الحلب النقيق . بطونها
اسطوانية او مدنية الشكل ، سواء اللون ، مغطاة بالاصفر
او الاخير او العاجي || عرقاتها شبه يضيئة القرون ،
معتدلة التيطيط ، بارزة الحنار السكسي الذي يده كسانن
المنشار . رؤوسها مريمة ، نازرة . ملاسها التكية
كلابية الشكل ، مسنة من الداخل . جميعها مفترسة
تميش بين الاغشاب وتحت الحجارة .



سكلاف

١٣٨٧٣ - سَكَلَفِيَّات (F). Acalaphidae (F).

فضيلة حشرات من صصيات الجناح ورتبة شارفات الاجنحة .
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار
البلاد الحارة والمتعددة الحرارة من العالم || اجناسها متوسطة
القد وكبيرة . بطونها تراوح من ٣٢ الى ١١٥ م .
رؤوسها شبه مخروطية ، كهيئة القزب والحلب النقيق .
عينها كبيرة ، جاحشة . قرونها الاستشعارية خيطية ،
مستطيلة ، تنتهي بمجموعات من الحلب والقرزب يكثر فيها
الشكل المائي ثم الصفي . صغورها ، من اكبول الى
الريجاد ، زباد . بطونها شبه مدنية الشكل . اجنسها

الشكل تملها متواجج التسج لونه الى الخضار الباق .
ازهارها عادمة اللون ، شديدة الحمرة ، صغيرة القد ،
ماليقها طول نحو ٨ م || ازهارها يستمر من شباط
الى آذار .

١٣٨٦٤ - سَكْع رَيْمِي (F). Cyclamen vernum (F).

حصيلته صغيرة القد قطرها نحو ٢ م . قلافتها الجلدية
محورية قرصية . جلودها غشبة الانتشاب || اوراته
قلبية ، ظاهرة الزوايا . تصلها جامد التسج اخضر
الصفحة العليا ، عايق السفلى || ازهارها وردية اللون ،
قلية اللون . متوسطة القد . ماليقها طول من ١٥
الى ٢٥ م . || ازهارها يستمر من آذار الى ايار .

١٣٨٦٥ - سَكْع فارسي (F). Cyclamen de Persie (F).

نبات ردف يتطلب بعض العناية الخاصة . فروبه عديدة
تختلف بالازن ازهارها واتكال بيلتها || حصيلته متوسطة
القد قطرها يراوح من ٤ الى ٦ م . اوراته يضيئة ، تصلها
مترابك التسج والترييح ، مسن الحافة ، شديدة الخضار
النايق || ازهارها . كبيرة القد . عديدة الالوان فيها
اللكمية والمتباينة والمهدة . ماليقها طول من ٢٥ الى
٤٠ م || ازهارها يستمر من تشرين الثاني الى آذار .

١٣٨٦٦ - سَكْع كيليك (F). Cyclamen cilicium (F).

حصيلته صغيرة القد قطرها نحو ٣ م . قلافتها الجلدية
محورية قرصية . جلودها غشبة الانتشاب || اوراته
قلبية مستطيلة . تصلها متواجج التسج اخضر الصفحة
العليا اطول السفلى || ازهارها وردية اللون تملو نمشة
ارجوانية تزين قاعدة البتلات . عرقها متوسط الارتفاع .
ماليقها طول نحو ١٢ م || ازهارها يستمر من ايلول
الى تشرين .

١٣٨٦٧ - سَكْع لِبْنَانِي (F). Cyclamen libanoticum (F).

حصيلته متوسطة القد قطرها نحو ٥ م . لونها الى الجوزة .
قلافتها الجلدية محورية قرصية || اوراته قلبية مسنة
الحافة . تصلها اخضر الصفحة العليا ، بجوري السفلى .
ازهارها متوسطة الحجم ، هريفة الرائحة ، وردية اللون ،
بيلتها مسنحة القاعدة . ماليقها طول من ١٢ الى
٢٥ م . || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٣٨٦٨ - سَكْمِين ، سِكْلَامِين (F). Cyclamine (F).

مادة قلبية سامة تستخرج من صصرة السكم تستعمل
في مكافحة الحشرات وفي بعض المتحضرات الطبية
الليطرية .

١٣٨٦٩ - سَكْفِيد (F). Scaphidium (F).

جلس حشرات من فضيلة السكفيدات ورتبة عُمديات
الاجنحة . انواعها المعروفة قليلة لعدد اعطائها بعض غابات
وخراج الاقاليم المعتدلة الحارة || اجناسها صغيرة القد ،
اطليبية الشكل ، طول نحو ٦ م . رؤوسها مستعرضة ،
ملوكة . عينها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية
صولحانية . تاشكرها وفكوكها ويلاصها نظامية . كواسلها
كبيرة ، عديمة ، شارقة ، تلتف معظم الرأس . بطونها



سِكَّة

لا تؤكل. يتكاثر بالبرء أما يفضل غرس الشجرة كما هي وذلك بعد انتاش بقلتها الذي يحصل منه وضعها في مكان رطب || وهو يرغب في الأتربة الخفيفة البنية النور ويصلب الى مساند او عوائل نباتية يستغلها.

١٣٨٩٥ - سَكَلْ ، حَوْش
Châtrier (F).
To castrate, To geld (E).

انزع الخصيتين في الاسمنة والبركاش والحيوس وغيرها.

١٣٨٩٦ - سَكَلْ
Manne (F). Hamper (E).
جينة كبيرة من القصب تستعمل في نقل بعض ثمار والخضار.

١٣٨٩٧ - سِيلْ ، قَدْرُونْ ، سَحَاف
Tuberculosis (F). Tuberculosits (E).
مرض معد خطر يدعى السيل والفسل والتدرن في الحيوان والسحاف في النبات.



سِكُوم

١٣٨٩٨ - سِلْ وَلَوِي ، قَدْرُونْ رَتَوِي
Tuberculosis pulmonaire, Phthise pulmonaire (F).
Phthisis, Consumption (E).

مرض معد يصيب الرئة فيطبخها . كشفه العالم الألماني كوخ عام ١٨٨٢ وهو من الامراض غير الوراثية أما يعيش في الهواء واليساق وانفراغات الجسم والملايس والاعصنة وفي طبخ الماشية المصابة || تحصل عدواه اما باستنشاق الهواء الملوث من طريق الجهاز التنفسي الى الرئتين او من طريق الجهاز الهضمي بواسطة الاغذية الملوثة.



سَلَا

١٣٨٩٩ - سَلَا *
Sarcophorus (S). Sarcophore (F).
جنس طير من فصيلة الزرقانيات اهلل القنوب طويل الرجلين مهده القنابي الافريقي.

١٣٩٠٠ - سَلَا * ، دُودَة عَيْطِيَّة
Trichoccephalus (S). Trichocéphale (F). Trichoccephalus, Thread worm (E).
نوع من الديدان السلكية الدقيقة المستطيلة . رؤوسها شعرة اطرافها مدببة . تعيش طفيلية في الامعاء اخمصها اللحمي القليل.

١٣٩٠١ - سَلَاح *
Thecopora
جنس طيور مجهرية من فصيلة البصبيات ، يتنير بسماماته الخطية اللغاة ، الجولية القوية المستطيلة ، الشفوية الانقسام والثانية او الرابعة الاغنية || انواعها قليلة تعيش طويلا الاثدي على الصنوبريات ، اشجارها واعرفها سلاج البرقوق .

١٣٩٠٢ - سَلَاحُ الْبَرْقُوقِ *
Thecopora padi, T. areolata (S). Rouille des pruniers (F).

نظر من السلاج يقضي طوره الاثدي على الصنوبر ويتنقل في طوره النامي على البرقوق والقوق والكزبر . مظهره الخارجي يقع حر مفصلة الزوايا تركب الاوراق على صفحتها العليا يقابلها على الصفحات السفلى بنور قرحية لاقامية الشكل والحجم لنوا الى الجلوده فالسمة تطبق لتسحق وتنب ذليل الدراق ومقربها || يتكاثر بالايضاد عن الصنوبر الموبوء ويستعمل الفواطر الحديثة الخالية من المولد النعاسية .



سَلَاحُ الْبَرْقُوقِ

١٣٨٨٩ - سَكَّة * ، سُرْعُولَةُ الْبَحْرِ

Squilla (S). Squille, Mante de mer (F).

جنس دوابات بحرية من القشريات فيات الاصيل . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في مجار البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة . انفتها رقيقة مدببة بالسك المدرية الاربع الاصل . اما السك الاربع التالية طفيلية . يطبخها كبيرة مستطيلة . الزوج الاساسي من قوائمها بالغ القصامة والكبر مجهز للخطف كما هي الحال عند السرعولة || غولها مرغوب فيها مأكله .

١٣٨٩٠ - سِكِين
Coutre (F).
Ploughshare, Coulter (E).
جزء من المحراث حاد الطرف يقطع كتل التراب عموديا .

١٣٨٩١ - سِكِينِي الْسِن
Cultridenté (F).
Cultridental (E).
من الحيوان ما كانت اسنانه حادة الاطراف ، سكية الشكل .

١٣٨٩٢ - سِكِينِي الْمِنْفَاد
Cultrirostre (F).
Cultrirostral (E).
من الطير ما كان منقاده صلب الطرف ، حاد كالسكين يخص بالذكر القلق والباشون .

١٣٨٩٣ - سِكِينِي الْوَرَق
Cultrifolié (F).
Cultrifoliate (E).
من النبات ما كانت اوراقه سكية الشكل .

١٣٨٩٤ - سِكِينِي * ، شَبْطُ * ، كُوسِي
إفريقي ، غيبال الإفريقي

Sachium edule (S). Chayote, Chocho, Chuchu (F).
لبات زراعي ممر ويسعد الجنس والنوع من فصيلة القرقيات . مهده بلاد المكسيك ومنها انتشر في سائر اقطار العالم . جلوده دنية كبيرة القد . ساقه ليفية متسلقة طول بصفة اثمار . حواملها ثلاثية او خاسية التركيب . اوراقه متعكفة كفية خاسية القصوس والبروق ، طول وتعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . ازهاره ابطية الانتساب صفراء اللون ، ذكرية وانثوية . الذكرية متعديسة لتجميع والانثوية فردية . ثمار تؤكل مطبوخة وهي كبيرة القد بصفة الشكل . مقبولة القعب ، مفصلة القشرة المهدوبة ، المتصصة ، البصرة الفتوك . لبها جامد المادة البيضاء اللون يحسن حبة كسنتية الشكل ، كبيرة القد ، هفة القشار ، المنة جزء من لباب الشجرة تحوي العناصر التالية

ماء	٩١,٠٠٪
مواد دهنية	٢,٢٢٪
مواد سكرية	٢,٢٨٪
مواد ازوتية	٢,١٦٪
مواد غير ازوتية	٣,٣٤٪

درجات جلوده تستعمل امتثال البطاطا وهي تزن من ٥٠٠ الى ٢٠٠٠ غرام . وتوصي ما قدر

١,٥٠٠٪ من النشا
٢,٥٠٪ من المولد الازوتية

عدد درنات البتة يراوح من ٣ الى ٧ يتنقل منها الثلث اي من الدرقة الواحدة الى الدرنتين ويجب ان تكون الدرقة حولة او محولة اما اذا زاد عمرها عن السنتين تنفس ليفية

Blépharite (F). Blépharitis (E). **سَلَكِي** ١٣٩١١ -
هو ريد الجفن أو التهاب الجفن .

Anthropologia (F). **سَلَاة** ١٣٩١٢ -
Anthropology (E). السلاطة علم طبائع الانسان .

Lévrier (F). **سَلَايِي** ١٣٩١٣ -
Greyhound (E). سلاية كلاب عذامة تصيد الزئران والأرانب والغالب
وينت أوى تمييز باستطاعة اجسامها وقوائمها .

Monoblepharidae (S). **سَلَايَات** ١٣٩١٤ -
Monoblepharidées (S). Monoblepharidae (E).
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة التسلينات ورتبة
البويضيات .

Race (F). **سَلَاة** ١٣٩١٥ -
Race, Breed (E). سلاية عيرقي
جراح افراد مشابهة من نوع واحد تقتفل صفاتها
بالوراثة . ومن المستحسن استعمال سلاية في النبات وورق
في الحيوان .

Racial **سَلَايِي** ١٣٩١٦ -
هو صنف بالسلاية أو العنصر .

Phalange (F). Phalang (E). **سَلَايِي** ١٣٩١٧ -
السلاميات عظليات في الاصابع .

Phalangidae, Faucheurs (F). Phalangide, Mowens,
Harvestermen, Daddy longlegs (E). Weberk-
nechte (D). **سَلَايَات** ١٣٩١٨ -
رتبة من العنكبوتيات رتيلاواتها طوال الارجل ذقائهما يمشين
كالخسافين .

Entre-noeud, Mérithalle (F). **سَلَامِيَّة** ١٣٩١٩ -
Internode (E). جزء الساق بين عقدتين .

Age de la charrue (F). Plough-beam (E). **سَلَب** ١٣٩٢٠ -
تصاب الحراث أو قومه . وهو الجزء الجامع لاسر اجزاء
الحراث .

سَلَب ١٣٩٢١ -
السلب من القصة : قسرها . والسلب : لاه شجر في
العين يصل منه الخيال وهو اجفى من ليف القل واصلب .

سَلَبِي ١٣٩٢٢ -
السلبج والسلبجة ضرب من الذهب ج سلابج .

سَلَبُوت ١٣٩٢٣ -
Tropaeolum (S). **سَلَبُوت** ، **سَلَبِيَّة** ، **سَلَبُوتِيْن** ،
Capucine (F). Nasturtium (E).

جنس نباتات عشبية ليفية مدادة من فصيلة السلبوتيات .
انواعها ٣٥ معظمها امريكي المنبت . سوقها عادمة الخواص .
اوراقها متعاقبة مجنبة ، ساقها لولبية . ازهارها محورية
الارتكاز ، كروية ثنائية التركيب ، مبهازية النعامة .
توتيجاتها خمسة البتلات الملقطة . اوراقها . وازهارها
مأكولة قريبة الشبه من الرشاد || اعرف واشهر انواعه
ما يلي .

Haemastopus (S). **سَلَاك** ١٣٩٠٣ -
Hultrier (F). Oyster-catcher (E).

جنس طير من طوال الساق وقصيلة السلاحيات . انواعه
المعروفة عشرة منتشرة في معظم اقطار العالم . ملجتها الحيواني
جامعي . اسراجها تمتد بعض المرات . جميعها من القواطع
الجلجلة . قوتها الرغويات والتشرييات والديدان ... ||
اجسامها ربة متوسطة القد . مناقبها مستطيلة جالسة .
اجتمعتا شارفة تلحف الانذاب . اسواقها دقيقة متدلة
الطول . اصابعها ثلاث مستطيلة الجرم . مستعززة
الافانير . القصيرة || تدشن في الكشبان والهاميب .
انحاصها قدر سطحية يحرقها اطار من حطام الصدف
والصريع . انائها تقص من يعضين الى ثلاث يعضات
تخصها وسدحا ٢ اسابيع || اعرف انواعه واشهرها
سلاج كشش .

سَلَاك كَشْدَش ١٣٩٠٤ -
Haemastopus ostralegus (S). Hultrier-pie,
Bécasse du mer, Pie de mer (F). Sea pie (E).

طائر من السلاج . موطنه يشمل معظم اقطار العالم القديم .
مشتاه البلاد الحارة والمعتدة الحارة . مصيفه البلاد الباردة .
يألف التطوط البحرية وصفقات الانهر والمستنقعات . شربه
يد بعض المئات || جسمه متوسط القد بطول نحو ٤٤ سم .
بسطه نحو ٨٦ سم . قوته ثنائي اللون ، اسود الرأس والظهر
والعنق . ابيض الجبين والبطن والساق والانيك . جناحاه
سود القصبة العليا . يفضي الاياهر والصفحة السفل .
ذنبه ابيض القسم الاول ، اسود الطرف . سلقه حية
قرنزية اللون . ينفوه برفقالية . مقاده احر القاعدة
والجسم . اسير الملقط . يرعاه الى الحفرة || اناءه لا
تحسن اكثر من يعضين .

Haemastopodidae (S). **سَلَاكِيَّات** ١٣٩٠٥ -
Hémastopodidae (F). Haemastopodidae (E).

فصيلة طير من طوال الساق . اجسامها وانواعها المعروفة
قليلة لملجتها من القواطع الجلجلة . ملجتها الحيواني
جامعي . اسراجها وافرة العدد . قوتها التشرييات والرغويات
والديدان والاسماك الصغيرة || اجسامها متوسطة القد ،
الزوايا ملونة || اشهر اجسامها السلاج وكبيرة السلاج

سَلَاخِي ١٣٩٠٦ -
Chelonia (S). Chéloniens (F). Chelonia (E).

رتبة من الزحافات البيضية تشمل خمس فصائل تتميز
باجسامها المبططة الحديثة الطور . رؤوسها صغيرة . اصانقها
متوسطة الطول . فكوكها عادمة الانسان . قوائمها غليظة
وقصيرة . بطونها قرنية الكنف . ظهورها مدرة . ذنبها
اما فصائلها فهي : الحسليات والرتميات واقرقيات
والسحليات والجنيات .

سَلَاكَة ١٣٩٠٧ -
Plasticité (F). Plasticity (E).

هي الانطباع ، الطلي .

سَلَاكُوس ١٣٩٠٨ -
Hirudiniculture (F). Leech-breeding (E).

هي فن تربية السلق وتكثيره .

سَلَاك ١٣٩١٠ -
هو ما يميل من العنب قبل حصره .



سلاج كشش



سلاحي

١٣٩٢٤ - سَلْبُوتٌ عُثْمَانِيَّةٌ ، سَلْبُوتِيَّةٌ عُثْمَانِيَّةٌ ،

كَبَبُوسِينَ عُسْفَلِيَّةٌ

Tropaeolum polycaporum (S). *Capucine* de Lobb, *C. velue* (F). *Lobb nazurdum* (E).

عشبة ليلية مدادة زياة تطول من ٣ الى ٥ امتار. اوراقها خضراء، ضلعا مستطيل كالشبكة. ازهارها برتقالية اللون. بتلاتها المغل ممتدة الحار او مهدبة || ازهارها يستمر نحو ٥ اسابيع ابتداء من اواخر تشرين .

١٣٩٢٥ - سَلْبُوتٌ رَشِيْقٌ ، سَلْبُوتِيَّةٌ رَشِيْقَةٌ ،

كَبَبُوسِينَ رَشِيْقَةٌ

Tropaeolum speciosum (S). *Capucine gracieuse* (F). عشبة ليلية مدادة تطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها

خضراء، التفصيص رفق تكون سداسية . فصلها خلى البشرة حل مسطحة المغل. ازهارها ارجوانية اللون . مستطيلة الهاميز ، قلبية البتلات || ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

١٣٩٢٦ - سَلْبُوتٌ صَغِيرٌ ، سَلْبُوتِيَّةٌ صَغِيرَةٌ ،

كَبَبُوسِينَ صَغِيرَةٌ

Tropaeolum minus (S). *Capucine mineura*, *Petite capucine*, *C. naine* (F).

عشبة ليلية مسطحة تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها مستديرة ، اضلاعها مستطيلة . ازهارها صفراء اللون يملو تضيح ويجمع اخر || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين .

١٣٩٢٧ - سَلْبُوتٌ عُثْمَانِيَّةٌ ، سَلْبُوتِيَّةٌ عُثْمَانِيَّةٌ ،

كَبَبُوسِينَ عُثْمَانِيَّةٌ

Tropaeolum tuberosum (S). *Capucine tubéreuse* (F).

عشبة ليلية مدادة وعارضة تطول نحو ١٠٠ سم. جلورها صفولية غروطية او اعليجية الشكل . اوراقها خضراء التفصيص . فصلها مائل البشرة. ازهارها صفيرة البتلات المستديرة ، ولها الى الصفرة . صاقاتها مأكولة تستعمل استعمال البطاطا .

١٣٩٢٨ - سَلْبُوتٌ كَبِيرٌ ، سَلْبُوتِيَّةٌ كَبِيرَةٌ ، كَبَبُوسِينَ

كَبِيرَةٌ ، أَبُو حَنْجَرٌ ، طَرَطُورُ الْبَاشَا

Tropaeolum majus (S). *Capucine majeure*, *Grande capucine*, *Cresson d'inde* (F). *Tail nasturtium*, *Tail Indian cress*, *Canary creeper* (E). *Kapuziner-Indische kresse* (D). *Astuzzia maggiore*, *Nasturzio maggiore* (I).

عشبة ليلية مدادة عارضة تطول نحو ٣٠٠ سم. ساتها ليلية خضراء مائلة للحماء . جلورها خيطية نجيل كثيرة الانشعاب . اوراقها نجية الشكل ، فصلها تالم البشرة الالامسة ، بحري الخضار. ازهارها لردية النجيم ، بحورية الارتكاز ، مغنوية البتلات ، عديدة الالوان فيها الاحمر والاريجاني والقرنيزي والبرتقالي والاصفر || وفي حولية في المناطق المعتدلة ، سمرة في المناطق الحارة . ازهارها يستمر طوال السنة || ذروع لزيين وكنيات يقي . ازهارها حريقة العلم المسحب . ثمارها الفتية تستعمل استعمال الكدر في الخللات . يقال ان ازهارها واورقها لا تخمر من التوتينات القوية .

١٣٩٢٩ - سَلْبُوتِيَّاتٌ

Tropeolacées (S). *Tropeolacées* (F). *Tropeolacées* (E).

فصيلة نباتية من مزدوجيات القلفة مستقلات القمالات .

اجناسها وانواعها عديدة جميعها عشبية او ليلية مدادة وعارضة عارضة الحوائط .

١٣٩٣٠ - سَلْبُوتٌ عُثْمَانِيَّةٌ ،

Zorotypus جنس حشرات طامسة ، وانجحة ، صفيرة اللد ، تعيش في التربة . انواعها قليلة . ذكورها حامدة الجناح . اناتها مجتمعة . قرونها الاستشعارية قلابية الشكل . ارساغها ثنائية المغل . اما جهازها التناسلي فبني .

١٣٩٣١ - سَلْبُوتِيَّاتٌ

Zoraptera (S). *Zorapteras* (F). *Zoraptera* (E).

رتبة حشرات تنتمي الى طبقة الذراريات . انواعها عديدة جميعها من الحشرات الطامسة ، الواجحة ، الصفيرة اللد . اقليمها البلاد الحارة . تعيش في القرباب . اناتها مجتمعة . قاشرة العينون البسيطة . ذكورها داجة العينون عارضة الجناح . قرونها الاستشعارية قلابية . ارساغها ثنائية المغل .

١٣٩٣٢ - سَلْبُوتٌ

Scalporus (S). *Scalpora* (F).

جنس حيوانات زسقة من الطاء وفصيلة العيشيات . انواعها المعروفة نحو ٢٥ جميعها من طاء امريكية الوسطى والثائية || اجسامها صفيرة اللد ، قصيرة الرؤوس الفطس ، غليظة البطن ، ربة القوائم النشطة . اناها خفيفة الالوان يكثر لها الاخضر والاصفر وتغطي قاعاب اسيد او بخوي || قوتها الحشرات الصفيرة والديدان والنبات والحوام .

١٣٩٣٣ - سَلْبُوتِيَّةٌ

في السلبوت ، اطلة .

١٣٩٣٤ - سَلْبُوتِيَّةٌ

Salpinge (S). *Salpinge* (F). *Salpingus* (E).

جنس حشرات من فصيلة السلبينيات ورتبة عديدات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع اقطار العالم || اجسامها صفيرة ، خضراء ، تطول من ٤ الى ٧ م. رؤوسها شبه غروطية الشكل . صوبها بارزة . تأثيرها وبلاسها نظامية . قرونها الاستشعارية صولجانية . كواسلها مغنوية المقدم ، خبيثة الخصر . احمادها لاسعة . قوائمها نشطة . اناها وسيدة اللون باكشيتا . ولها السائلة الوردي والاشهب والاريد والادس والصفاني . الاسم || تألف البراري والمواقع التي تكثر فيها الازهار . جميعها واحة او دامة .

١٣٩٣٥ - سَلْبُوتِيَّاتٌ

Salpingidae (S). *Salpingidae* (F). *Salpingidae* (E).

فصيلة حشرات من عديدات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في ستم اقطار العالم || اجسامها صفيرة ، اعليجية الشكل ، معدلة البطيخ ، تطول من ٣ الى ١٠ م. رؤوسها غروطية الشكل . صوبها بارزة . تأثيرها وبلاسها نظامية . قرونها الاستشعارية قلابية او صولجانية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها لاقليمية الشكل والحجم . احمادها لاسعة . قوائمها نشطة . ارساغها خضراء حلبة المغل باستثناء الزوج الخلفي الغرامي المغل . اناها ملونة || جميعها واحة او دامة تعيش على الازهار او على المواد النباتية المنحلة || اشهر اجناسها السلبين والكثير .



سَلْبُوتٌ كَبِيرٌ



سَلْبُوتٌ



سَلْبُوتٌ



سَلْبُوتٌ

الازرق تحوي من ٣٢ الى ٣٥٪ من الزيت الاصفر الصناعي القاتع الاستعمال الصناعي. كسبه على نحو ٥٪ من الاوت من التباينات السبروتية المعلقة التي لا تتأثر كثيراً بالاقليم بشرط ان لا تخف فيه الرطوبة. يجود في جميع الارربة العميقة النور غير انه يخشى الجاسكا المنسوجة.

١٣٩٤٨ - سَلْتَم حَقْلِي *

Brassica napus sylvestris (S). Navette, Chou-colza (F). Nape, Naphew, Winter rape (E). Stackrübe, Kohlrübe (D). Navone, Cavallo navone (I).

نبات عشبي دهني على برقي وزراعي من فصيلة الصليبيات قريب الشبه من السلق الا انه اصفر قداماً واشد مناعة. يزود اما لاستخراج دهن بزوره التي تحوي نحو ٣٣٪ من الزيت واما كملف القاشية يفيد الفرع وينشط الدرع.

١٣٩٤٩ - سَلْتَم

Pardreau (F). Young partridge (E). السلك والسلف والسلك : فرخ الحجل . ج سلمان .

١٣٩٥٠ - سَلْتَم

Poulaitte بنو حيس الدجاج من الاسمدة المعصورة النشطة الذنية بحصر الاوت. متوسط تركيبة الكياري :
ازوت ٢,٥٪
حامض فسفوري ١,٣٪
عناصر مختلفة ٦,٢٪

١٣٩٥١ - سَلْتَم

السلج : بهاء الماء في البذران وحيثما كان . يقال ماء المد وباء السلج وباء الكرع .

١٣٩٥٢ - سَلْحَفَة Tortue (F). Tortoise (E). السلحفاة كوكبية نجوم شمالية المفع مشهورة باسم قنطرة ، اطلها .

١٣٩٥٣ - سَلْحَفَة

Testudo (S). Tortue (F). Tortoise (E). جنس سلاحف من فصيلة السلحفيات . انواعه ١٤ منتشرة في جميع البلاد الحارة . جميعها ارضية المسرح خاضعة طويلاً براوح من ٢٠ الى ١٠٠ سم . ذيلها متوسط الاسدياب اسير اللون تملو قتر قرنية برمية الشكل او مستطيلة ، لوها الى السرة الزرقوتية || تألف المرامي والهيول . تقضي نياتها الشري الذي يدوم نحو ٤ اشهر في جسر قليل النور تخفوه في التربة .

١٣٩٥٤ - سَلْحَفَة الْبَرّ

Tortue terrestre rude (F). نوع من السلاحف مشهور باسم سلحفاة خشنة ، اطلها .

١٣٩٥٥ - سَلْحَفَة خَشَنَة * ، سَلْحَفَة الْبَرّ Testudo scabra (S). Tortue raboteuse, T. terrestre rude (F). Rough tortoise (E).

سلحفاة برية خاضعة من فصيلة السلحفيات . طولها عند كمال نموها لا يتجاوز ٢٢ سم . بما فيه الذنب الذي يطول نحو ٤ سم . الاثنى اعرض من الفيل وأقصر منه . فارق الطول والبرص نحو ٢ سم . || ذيلها يضيئ الشكل تملو قتر قرنية المادّة . ثوبها الى السرة الزرقوتية . وأسماء اسطواني الشكل ، اظفر اظلم . تقمها الطع حاد الانسان . اسنانها متوسط الطول مطاط . تحتها قليلة التجماع عند الانكماش .

١٣٩٦٦ - سَلْت هو الشليم ، اطله .

١٣٩٦٧ - سَلْتَة

Panier, Corbelle (F). Pannier, Basket, Hamper (E). سل صغير من القصب أو القضبان الدقيقة يستعمل في نقل الثمار وبعض الخضار وما اشبه .

١٣٩٦٨ - سَلْتَة

هي الابوصارون الاسباني عشبة علفية محففة تسمن عليها الايتار والافنام . انزادها مثريّة تجربها للنحل .

١٣٩٦٩ - سَلْتَة زُرَاعِيَة في الدرع ، اطله .

١٣٩٦٠ - سَلْتَة عَرَف الدبلك في حرن النعم ، اطله .

١٣٩٦١ - سَلْتَج * ، نَعْمَة Celsia (S). Celsie (F).

سلج ج سلايج . جنس نباتات برية وتربوية من فصيلة الخنازريات . معقودة التحريف على اسم البوتاني السويدي اولات سلايزيس (Olaf Celsius) || اوراتها مفرغة . انزادها عسفوي التجميع . انزادها صغيرة القند مختلفة الالوان العابقة || عرف انواعها الزراعية يتبع .

١٣٩٦٢ - سَلْتَج اِكْرِي Celsia cretica (S).

Celsie de Crète, Queue d'ours de Crète (F). عشبة مبروتية محولة مهدحا جزيرة اكرت . ساقها تملو نحو ١٠٠ سم . اوراتها متعاقبة لاطنة || انزادها وديّة اللون كبيرة القند . ساقها وارقاتها لزجة || انزادها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٣٩٦٣ - سَلْتَج عَرُصِي الْوَرَك

Celsia bugulifolia (S). Celsie à feuilles de bugle (F). عشبة مبروتية ممررة مهدحا ترائيه والساحل اليوناني . ساقها تملو نحو ٥٠ سم . اوراتها السفل خضبة التجميع ، يضيئة الشكل ، مفرغة ، فصلها مالمس البشرة مابق الخضر || انزادها الى الصفرة السراء يطوها تسلج ازرق وبلج اسفع .

١٣٩٦٤ - سَلْتَج قَبْرِي Celsia glandulosa (S).

Celsie de Chypre (F). عشبة سبروتية محولة مهدحا قبرص ووسائل الاناذية . ساقها تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم . اوراتها متعاقبة خلية وغدية التصل || انزادها صغيرة القند صفراء اللون || انزادها يستمر من تموز الى ايلول .

١٣٩٦٥ - سَلْتَجَان هو الملقوم .

١٣٩٦٦ - سَلْتَجَة

Huitre (F). Oyster (E). صدفة بحرية فيها شوي ، يوكل . ج سليج . اطلب عمار .

١٣٩٦٧ - سَلْتَمَج *

Brassica campestris (S). Colza (F). Colza, Rape, Carrot-oil plant (E). Olraps, Kolza (D). Colza, Napo oleifera (I).

نبات عشبي زراعي من فصيلة الصليبيات . جذره وتدي . ساقه غرامه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراته متعاقبة مفرغة ملتفة ، اصلها خلي الحروق سنن الحاقه ، بحري الخضار . انزادها عسفوي التجميع . انزادها صغيرة ، رباعية البتلات ، يضاء اللون أو صفراء . غمار عسوفية مستطيلة . بزوره صغيرة دقيقة مستديرة لوها الى السواد



سلج



سلم



سلم حقل



سلحفاة خشنة

قوامها قصيرة وفيلقة. اصابعها كبيرة الاظافر المجدبة ||
تسرح في النهار وفي الليل. قوتها الاعشاب والمواد النباتية
والحيوانات والحراطين || تعيش نحو ٨٠ سنة وتحفظ
بطاقتها التناسلية اكثر من ٧٠ سنة.

١٣٩٥٦ - **سَلَفِيَّاتٌ** (S). *Chersidae, Testudinidae*
(F). *Chersidae, Testudinidae* (F). *Chersidae, Testu-*
nidae (F).

فصيلة حيوانات زاحفة بيوضة من رتبة السلاحف. مهددا
البلاد الحارة. اجناسها وانواعها عديدة جميعها خاضعة
ارضية المسرح، غطية الدرة للمحمية. ذيلها محدد
الشكل تملو قدر قرنية لاثباتية الشكل والحجم. زفها
سداسي النفر يخرج منها الرأس والذنب والقوائم الاربع
التي تنكشف وتختفي عند الاستراحة والوقوف، داخل
الدرة || اشهر اجناسها السلحفاة والفرسين.

١٣٩٥٧ - **سَلَفِيَّةٌ** (S).
جنس فطور مجهرية من عسارة الوطانيات وفصيلة
الكتنيات. يتميز بمشجه الخفي التجميع ويكتالده الحلية
الاطراف || انواعه قليلة العدد والاذى. اعرفها سلفية
البار.

١٣٩٥٨ - **سَلَفِيَّةٌ الثَمَارِ** (S). *Volutella fructi* (S).
فطر مجهرى يركب الثمار الناضجة المفضضة اغصانها التفاح
والاجاص والدرارن والسفرجل والخلوخ والمشمش || مظهره
الخارجي تدف خلي اسود اللون يملو البشرة المطوية
فيها ويضغ الب ويغور فيه.

١٣٩٥٩ - **سَلَفُ** سلخ النبات، ماد يذ المجع واغضر.

١٣٩٦٠ - **سَلَفُ** (F). *Mue* (F). *Moulting* (E).
سلعة اخية || جلتها التي تسلف فيها. يقال هذ ارق
من سلخ اخية.

١٣٩٦١ - **سَلَسٌ**
عدم استمساك البرد أو التالط.

١٣٩٦٢ - **سَلَسِيْلٌ** (F). *Tragopogon* (S).
Salsifia (F). *Salsify* (E).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة المركبات.
اوراقها مصفية الشكل. قناياتها وسيدة الصف. يزورها
مغاريه دقيقة يملوها حرك ريشي || اشهر انواعه ما يلي.

١٣٩٦٣ - **سَلَسِيْلٌ اَبْيَضٌ**
هو السلفيل الشري، اطلبه.

١٣٩٦٤ - **سَلَسِيْلٌ اَسْوَدٌ**
Salsifis noir (F). *Scorzonera* (E).

هو الدبع الزراعي، بقلة مأكلة الاوراق والجذور.

١٣٩٦٥ - **سَلَسِيْلٌ المَرْجُ *، لَحْيَةُ التَّيْسِ**
Tragopogon pratensis (S). *Salsifis des prés, Barbe*
de bouc (F). *Shepherd's clock, Yellow goat's-beard*
(E). *Bocksbart, Weisenbocksbart* (D). *Salsifia dei*
prati, Barba di becco (I).

نوع من السلفيل البري مهدد الشرق الاوسط. عشبه
معمره تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها سباعية المروق
خلية التصال. ازهارها كبيرة اللده صفراء اللون.
ازهارها يستمر من ايار الى حزيران

١٣٩٦٦ - **سَلَسِيْلٌ اَمْرُطٌ**
Tragopogon geropogon (S). *Salsifis glabra* (F).
نوع من السلفيل البري. مهد مناطق حوض المتوسط.
عشبه سولية تملو من ٢٠ الى ٨٠ سم. اوراقها مرطاه
النسل. قناياها ثنائي اللسنيات. ازهارها حراء اللون.
ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران.

١٣٩٦٧ - **سَلَسِيْلٌ بَحْرِي *، قُومِي**
Tragopogon crocifolius (S). *Salsifis sauvage* (F).
Wild salsify, Goat's beard (E). *Wildier bocksbart*
(D). *Salsifia salvatica* (I).
نوع من السلفيل البري. مهد مناطق حوض المتوسط.
عشبه سولية تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقها بحرية
الخضار الباهت. ازهارها صفراء القرمص، بتفسجية
البيئات. ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٣٩٦٨ - **سَلَسِيْلٌ شَرَقِي *، سَلَسِيْلٌ اَبْيَضٌ**
Tragopogon orientalis (S). *Salsifis blanc, S. à feuilles*
de poireau (F). *White salsify, Salsify, Oyster plant*
(E). *Haferwurz, Wurzelbocksbart* (D). *Salsifia,*
Scorzobianca (I).
نوع من السلفيل البقل الزراعي. فروعيه عديدة منها
اخريه واحده تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقه وكليه
الشكل بقلية. جلوره حترابية مسطلة يفضاه اللون
مأكولة. ازهاره الى الصفرة الاخضيه || رطب في الارية
المجيدة التركيب، المتوسطة الانماج والقنية بالمسود
البصرية.

١٣٩٦٩ - **سَلَسِيْلٌ مَبْدُولٌ**
Tragopogon porrifolius (S). *Salsifis commun* (F).
Common salsify (E).
نوع من السلفيل البري. مهد مناطق حوض البحر
المتوسط. عشبه سولية او محرة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم.
اوراقها خلية النصل، بحرية الخضار. ازهارها كبيرة اللده
لونيا الى البنفسجي المايق. لوراقها وجلورها مأكولة.
ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٣٩٧٠ - **سَلَسِيْلٌ وَرْدِي**
Tragopogon ruber (S). *Salsifis rose* (F).
نوع من السلفيل البري مهد المناطق البادية. عشبه
معمره تملو نحو ٥٠ سم. اوراقها بحرية الخضار. ازهارها
وردية اللون يملوها موج ارجواني || ازهارها يدوم
اسابيع ابتداء من اوائل ايار.

١٣٩٧١ - **سَلْسَلَةُ السَّكَّرِ، عَمُودٌ قَنْزَرِي،**
قَنَازَةُ قَنْزَرِيَّةٌ
Colonne vertébrale,
Rachis (F). *Vertebral column, Spinal column* (E).
مجموعة الخزرات المشعة من قاعدة الرأس الى صعب
المصمص.

١٣٩٧٢ - **سُلْطَانٌ** هو التلوكسينيه، اطلبه.

١٣٩٧٣ - **سُلْطَانٌ اِيْرَاقِمٌ**
هو البستروج من الاسماك المشهورة، اطلبه.

١٣٩٧٤ - **سُلْطَانٌ اِيْرَاقِمٌ الصَّخْرِي**
هو البستروج الصخري من افضر الاسماك واكتفا.

١٣٩٧٥ - **سُلْطَانُ الْجَبَلِ**
هو صريمة الجدي، اطلبه.



سلفيل البحر



سلفيل بري



سلفيل شرقي

١٣٩٨٧ - سلطنة المصان * - *Marasmius sacchari* (S).

نوع من السلطة يركب عيدان المصان يقيف على نموها بعد ان يتعلق السلاحيات السفلى، عند انتشابه ليانها، عيشية اليه الاصفر الذي يبيب احمرار ويجفاف العقد، ثم اصفرار النصف وذبوله || مظهره الخارجي فطر ابيض اللون، يحيل الجسم، اروسه جرسية الشكل قطرها نحو ١٥ م. يعيش على العيدان المقطوعة. نمته كثيفة المنطور تضم من ٥ الى ٢٠ || يكاتف بانتزاع الاقدام والطراريج للميوعة وبالا كثار من الاسمدة الازوتية التي تنشط النمو الجلي والقمري.

١٣٩٨٨ - سلطنة الموز * - *Marasmius seminat* (S).

نوع من السلطة يركب اريمة الموز ويظهر فيطليا ويقيف على الاوراق || مظهره الخارجي فطر صغير اللد، ساقه اسطوانية تحمله بيضاء اللون. اروسه صابية، قطرها نحو ١٠ م. ثوبا متراكبا اللون، مظهره البياض والصفرة والخمرة || يكاتف في اول هذه بانتزاع الاقدام الميوعة وينفخ الازوتية باحد المركبات النحاسية المحلولة ٢.٤ ٪ يضاف اليها ١.٥ ٪ من الكلس || وبما ان هذا الفطر لا يقرب الا التباينات الضعيفة في المواقف الرطبة. لذلك يحسن اجتناب الاماكن الرطبة واستعمال الاسمدة الممنوعة انحصا الازوتية التي تشل الالياف والمواد الخضرية.

١٣٩٨٩ - سلطنة حبيكة * - *Marasmius perniciosus* (S). *Balai de sorcière du cacaoyer* (F).

نوع من السلطة واسع الانتشار يكثر في البلاد الحارة. يركب بعض النباتات انحصا الكاكاو فيجيش الانسان والنواحي. وقد يصيب الثمار فيشوها || مظهره الخارجي فطر صغير اللد، ساقه اسطوانية تحمله بيضاء طويلا نحو ١٥ م. لونها الى الصفرة الزاهية. اروسه قلنسوة قطرها من ٢٠ الى ٢٥ م. لونها الى الجوزة || يكاتف بانتزاع وحرق الاجزما الميوعة وينفخ الاجبار بسائل يورده بعد طلي الجروح بالمستيك الالوي.

١٣٩٩٠ - سلطنة

سلطنة البقرة والشاة : خرج بانهاا وهي سالخ. والسولوخ في ذوات الاطلاق بمنزلة البزول في ذوات الاصفاف لانها اقصى استنابها. فكل البقرة اول سنة حبل ثم تباع ثم جلع ثم تبي ثم رباغ ثم مديس ثم سالخ سنة وسالغ ستين الى ما زاد. والشاة اول سنة حلق ثم جلع ثم تبي ثم رباغ ثم مديس ثم سالخ. ج. ع. ل.

١٣٩٩١ - سلطنة - *Alexan* (F). *Chestnut* (E).

من الثواب او ألوان الخيل وهو الذي غلخت شقرته.

١٣٩٩٢ - سلطنة - *Pardreu* (F).

الف صغير الحبل ان كان ذكرا اما الانثى قلقة.

١٣٩٩٣ - سلطنة، مستغف، كرتب، كراب - *Scariffage*

حرث سطحي بالسلفة تبتصر به ذرات التراب ولا تقطب.

١٣٩٩٤ - سلطات، كويجات - *Sulfate* (F).

اسم شامل يطلق على مختلف املاح الحامض الكبريتي

١٣٩٩٥ - سلطنة - *Sulphate* (E).

اسم شامل يطلق على مختلف املاح الحامض الكبريتي

١٣٩٩٦ - سلطنة التقدير

Pouvoir discrétionnaire (F). *Discretionary power* (E). هي السلطة التي لم يمين مسلكها بقائمة قانونية تسيير عليها.

١٣٩٩٧ - سلطنة القضاء

Autorité de justice, Jurisdiction (F). *Authority of justice, Judicature* (E).

هي السلطة المنوطة لقضاة بان يقضوا بين الناس فيما يتعلق بالنفس والمال.

١٣٩٩٨ - سلطنة قضائية - *Pouvoir judiciaire* (F).

هي التي استندت اليها ولاية القضاء.

١٣٩٩٩ - سلطنة * - *Crabe* (F).

Crab (E).

السلطان والعلون والكرمران والقمع اسماء شاملة تطلق على عدة حيوانات مائية او قازية من القشريات المشاريات الاصيل.

١٣٩١٠ - سلطنة الصغر - *Pouperc* (F).

حيوان من القشريات يدهي بوبار، اطله.

١٣٩١١ - سلطنة نهري - *Crabe* (F).

هو سرطان البحر، اطله.

١٣٩١٢ - سلطنة * - *Cissus* (S).

Cisso (F). *Sorrel-vine, Wild grape* (E). *Cissus-plante* (D). *Cisso* (I).

جنس نباتات معمرة حرة حارشة من فصيلة الكرديات. انواعه عديدة منها خلية الساق كبيرة الحجم تمتد نحو سبعة امتار. ومنها متوسطة وصغيرة كسائر المتروحات. يستخرج من جنوبها عند حرما عصارة مشروبة نافعة تروي الغليل || اورانها بيضاء او ليلية الشكل. نصلها قليل الزغب جميل اخضر الشبيب، من الحافة. حوائتها خلية الزغب محببة الاطراش. انهارها صغيرة خضراء اللون. ثمارها عنبية صغيرة اللد || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٣٩١٣ - سلطنة هربان - *Cissus quadrangulais* (S).

Cisso quadrangulaire, Riz du singe (F). *Edible stamed vine* (E). *Wildweinebaum* (D). *Vite cisso* (I).

نوع من السلح اللمداد الاراش السماع. مهده البلاد الحارة. يطول من ٥ الى ١٠ امتار. ساقه زياه. اوراته مستقيمة مرباعية الشكل. نصلها خلية البشرة الزغب الزائد والصلح والبروق || تسنها خبز الماد من العلم يروي النش.

١٣٩١٤ - سلطنة هي الطقة، اطلها.

١٣٩١٥ - سلطنة، عفدة دركية، عفدة

Scrofule (F). *Scrofule* (E).

علة مدلية المظهر الخارجي سببا اعتلال في توازن الغذاء وانسياع في الجسم يليه لانتقال مختلف الجراثيم.

١٣٩١٦ - سلطنة * - *Marasmius*

جنس فطور مؤذية من الباروقيويات. انواعه عديدة تركب نباتات المناطق الحارة انحصا الحربية وينفخ التباينات المروية منها الموز واللمسان || اشيع انواعه واضرها ما يتبع.



سلطان



سلح



سلطة المصان

بالحامض الكبريتي . تركيزه التجاري الموصوف يحوي ٤٠ أو ٥٠ ٪ من السلفات الصرفة || يستعمل في مكافحة الحشرات علولا بللها بمعدل يراوح من ٥٠ الى ٢ ٪

١٤٠٠٢ - سلفات Emprunt (F). Borrowing (E).
السلفة والاستلاف هو القرض .

١٤٠٠٣ - سلفات Sulfatage (F).
Sulphating (E). هي المعالجة بالسلفات .

١٤٠٠٤ - سلفات Sulfatage (F).
معالجة الحمر بالسلفات اي بالحامض الكبريتي .

١٤٠٠٥ - سلفات Sulfurage (F).
هي المعالجة بالسلفور وقد تعفن الآزوتية الزراعية بسلفور الكربون القضاء عل الاوصام الجرملوية والحشرات .

١٤٠٠٦ - سلفور الكربون، كبريتور الكربون Sulfure de carbone (F). Sulphid of carbon (E).
سائل طيار حريف لا لون له بخاره قتال الجراثيم والحشرات .

١٤٠٠٧ - سلفوسيانور Sulfocyanure (F).
Sulphocyanate, Sulphocyanide (E).
مادة جرسانية قوية في حريف الامونياك تقضي عل الاعشاب والحشرات .

١٤٠٠٨ - سلفوسلفات الامونياك Sulfonitrates d'ammoniaque
سماد كيماوي ازوتي يحوي ٢٦ ٪ من الآزوت نسبيا ١٩٥٥ ٪ آزوت امونياكي بلي " الاعلال و ٦٥ ٪ آزوت نيتريكي سريع الانفعال والتشليل .

١٤٠٠٩ - سلفيت Sulfite (F). Sulphita (E).
ملح مركب من حمض الكبريت وبادة اخرى .

١٤٠١٠ - سلفيديات Silphidées (F).
رابع دقيات .

١٤٠١١ - سلق Beta vulgaris (S).
Poirée, Bette, Bietta (F). Swiss-chard beet (E).
Beitskohl, Beet, Gartenmangold (D). Bietta, Bietola, Coets (I).

نبات عشبي بقل زراعي من فصيلة البورقيات . قريب الشبه من القرنار - جلوه وقته ليبي و اوراقه قرصية النسيج ، كبيرة اتقه مستطيلة ، نصلها غليظ النضج ، مائل البصرة ، شديد الخضار || يتكاثر بالبذر . انتاش يزود يتم بفترة ايام وقابلية الانتاش تتدرج نحو ٦ سنوات || يحيد في جميع الموائل ويريب في الآرية الدبالية اللينة بالمصنر الازوتي .

١٤٠١٢ - سلق الماء هو جار النهر ، اطليه .

١٤٠١٣ - سلق بيري هو حريف المناع ، اطليه .

الناتجة من تآلفه مع بعض المادان اعصها الحديد والنحاس والكلسيوم واليتاسيوم والصوديوم اللع .

١٣٩٩٥ - سلفات الامونياك

Sulfate d'ammonique (F). Sulphate of ammoniac (E).
سماد كيماوي ازوتي ابيض اللون ، دقيق البرفلة ، يحوي نحو ٢٥ ٪ من الآزوت الامونياكي البلي " الاعلال بسبب تربيته وما يتخللها من تحاميل وانفصالات موصية تسيرها ظروف التربة وادائها وسالتها الحكمية || وهو من اشهر الامصدة الازوتية وانقماها استعمالا . يصنع ، ميدليا ، لكافة النباتات وجميع الآرية التي لا تقتصر الى الكلس اعصها الحمرية التي يراوح دالها بين الدرجة السابعة والثامنة (راجع دالغ) || يحسن استعماله باكرًا قبل حاجة النبات اليه بمضمة او ستة اسابيع وذلك ليتسكن من اجتياز شئ التحاميل والاختلالات اللازمة لتربيته وتجاهب تمثيله || ويجرد ايضا طوره في الآرية بعد ذره لتلا سر به الامطار أو يجرد مياه الري .

١٣٩٩٦ - سلفات البوتاس Sulfate de potasse (F).
Sulphate of potash (E).

سماد كيماوي يستخلص من كلوريد البوتاس بعد معالجته بالحامض الكبريتي || وهو مسحوق نام اصفر اللون او ابيض يبري من ٤٦ الى ٥٢ ٪ من البوتاس الصرفة مع ٢٥ ٪ من كلوريد البوتاس || وهو سريع اللويان بلما وسريع الانفعال وتشليل يصلح لجميع الآرية اعصها الفقيرة بالكلس (راجع بوتاس) .

١٣٩٩٧ - سلفات الحديد ، كبريتات الحديد، زجاج اخضر

Sulfate de fer, S. ferreux, Vitriol vert, Couperose verte (F). Sulphate of Iron, Green vitriol (E).

ملح متبلور اخضر اللون فصوص العلم يلوب في الماء الساخن . يستعمل في التطهير وفي مكافحة بعض الامراض الفطرية اعصها البذار والقصور والبقان || ويستعمل ايضا كماشب يقضي عل البسان والحفيضان والاشبا .

١٣٩٩٨ - سلفات الصودا ، كبريتات الصوديوم Sulfate de sodium, S. de soude (F). Sulphate of sodium, S. of soda (E).

ملح ابيض اللون متبلور مر اللذان شائع الاستعمال البيطري يسهل المدة جرحه تتخلف باختلاف الحيوان .

١٣٩٩٩ - سلفات الكلسيوم ، كبريتات الكلس هو الجبس ، اطليه .

١٤٠٠٠ - سلفات النحاس ، كبريتات النحاس ، زجاج ازرق

Sulfate de cuivre, Vitriol bleu, Couperose bleue (F). Copper sulphate, Blue vitriol (E).

ملح متبلور ازرق اللون ، حريف الطعم المنصع ، يلوب في الماء . تقاطله حاضي بمجر ورقة الفزفولن الزرقاء . يستعمل في مكافحة معظم الامراض الفطرية وفي وقاية الامعدة والمساند والمسابك من حيث الحشرات وقوضها .

١٤٠٠١ - سلفات النيكوتين Sulfate de nicotine (F). Sulphate of nicotin (E).

سائل قلوي سام يستخرج من تن التبغ بعد معالجته



سلق

١٤٠٢٣ - سِلْكُوتْ أَرْجَوَانِي *

Carabus violaceus (S). *Carabe pourpre* (F).
حشرة من السلكوت طويلاً يراوح من ٢٥ إلى ٣٥ م. ثوبها إلى السواد اللامع. ظهورها أسفع المراج. جانبها إلى الأخضر الأرجواني. تألف الجنائن وأحفادها والإحراج. مسرحها الموصي يستمر من أواخر الصيف إلى أواسط الشتاء. تفتقر جميع أنواع البرقات والحزرون والبزاق.

١٤٠٢٤ - سِلْكُوتْ بَهِي *

Carabus splendens (S). *Carabe resplendissant* (F).
حشرة من السلكوت طويلاً يراوح من ٢٥ إلى ٣٥ م. ثوبها إلى الصفرة الذهبية يعلوه موج أخضر. مسرحها يستمر طوال الصيف وأخريف. تألف الجنائن والإحراج. تكثر في الأقاليم الجبلية. تفتقر الحزرون والبزاق. وتختلف الحشرات الدجوية.

١٤٠٢٥ - سِلْكُوتْ حَقَلِي *

Carabus arvensis (S). *Carabe des champs* (F).
حشرة من السلكوت طويلاً يراوح من ١٢ إلى ١٨ م. ثوبها إلى الزرقاء المابقة يعلوه موج أسفع. مسرحها الموصي يستمر طوال الخريف والشتاء. تألف الحفول. تفتقر مختلف أنواع البرقات.

١٤٠٢٦ - سِلْكُوتْ مَدَّهَب *

Carabus auratus (S). *Carabe doré, Jardiniera, Sergeant, Vinaigrier* (F).
حشرة من السلكوت طويلاً يراوح من ٢٥ إلى ٣٥ م. ثوبها إلى الأخضر المذهب يعلوه موج زرجدي ساطع. زبائنها وأرجلها صناعية اللون. تألف الحفول وأحفادها وإبائتها. مسرحها يستمر من أوائل الربيع إلى أواسط الخريف. تفتقر الحزرون والبزاق ويعظم احشرات الدجوية والجلل.

١٤٠٢٧ - سِلْكُوتِيَّات *

Carabidae (S). *Carabidés* (F). *Carabidae, Ground beetles* (E). *Laufkäfer* (D).
فصيلة حشرات من رتبة عُمَدَات الإبنة. أجسامها وأنواعها كثيرة العدد. معظمها كبير القد. ألوانها سوية الألوان المابقة للامعة. تألفها قوية. قرونها المستشعرة خيطية. أرجلها طويلة. أرسافها خماسية العقل. تسرح في الليل وتبيلت في النهار تحت الإحجار والأشعاب. جميعها من الحشرات النافعة. تفتقر الصفارة أعصمها الحزرون والبزاق والصفقات.

١٤٠٢٨ - سِلْكِيَّات *

Nematoda (S). *Nématodes* (F). *Nematodes* (E).
طبقة الديدان السلكية من شعبة الحفليات تشمل العديد من الفصائل والأجناس والألوان منها الصفر والمداين وغيرها.

١٤٠٢٩ - سَلَم *

السلم مجموعة كواكب متتابعة أسفل من العانة من ميمها.

١٤٠٣٠ - سَلَم * - نَبَاح

Scalaris (S). *Scalaris* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات مبدلات الأجيال وفصيلة السليمان. أنواعه المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في

١٤٠١٤ - سِلْكُ مُصَلِّع *

Beta cicla, B. vulgaris foliosa (S). *Bette à cardes, Bette-spinard* (F). *Leaf-beet, Egyptian chard beet* (E). *Ägyptischer bosta, Ag. gartenmangold* (D). *Bicola foglia* (I).
ضرب من السلق البقل الزراعي يتميز بكبر أروقته وفلاحة خلطها وسماكته تصلها للمالئ البشرية الشنيعة. الحشرة || يحده في جميع الأتربة البدائية المعتدلة الانساج اللينة بالمصر الأزوي.

١٤٠١٥ - سِلْكَان

Loup (F). *Wolf* (E).
هو الثوب والأذن سلفه. ج. سلق.

١٤٠١٦ - سِلْكِيَّة

هي السلق المصلع، أخلبه.

١٤٠١٧ - سِلْكُ

Pardreux (F). *Young partridge* (E). *سِلْكُ*
فرخ الحجل الذكر، والأذن سلكة.

١٤٠١٨ - سِلْكُ حَدِيدِي

Fil de fer (F). *Iron wire* (E).
الاسلاك الحديدية أنواع منها لمساء تستعمل في تسديد الشبر وغيرها ونسباً شائعة تستعمل في إقامة الحواجز منباً من الصدي.

١٤٠١٩ - سِلْكَان ، دَمَجَاجَة الحَرَجِ

Bonasa (S). *Gélinotte* (F). *Hazelhen, Hazelgrouse* (E). *Hazelwild* (D).
جنس طير من عمارة الضرسيات. وفصيلة الطيوريات موطنه يمتد في شمال البلاد الآسيوية إلى أوروبا وشمال أفريقيا الشمالية. يتميز بقزقته الصغيرة وبصر متنازع. ثوبه إلى الخفوة لعمود رقيقة سميكة وبياض وطلعه وسواده. طولها يراوح من ٣٥ إلى ٤٥ سم. الأذن أصفر قدماً من

الذكر. قوته البرام والجبوب والبار على اختلاف أنوعها. يعيش ذكراً وأنثى. يمتد في الأرض يرتبط الفصوص بين الأدغال البنية أو بين الخغار وفي شجاليات الصخور. أثناء تفص من ٨ إلى ١٢ بيضة تحضنها وسدها || له نومان السلكان الشائع وسلكان للشرق.

١٤٠٢٠ - سِلْكَانُ الشَّرْقِي

Bonasa severtzowi (S). *Gélinotte d'Orient, G. des steppes* (F).
طائر من السلكان طولها نحو ٣٥ سم. ثوبه متراكب الألوان والزرقعة. موطنه شمال البلاد الآسيوية. يألف الإحراج والأدغال.

١٤٠٢١ - سِلْكَانُ شَايِع *

Bonasa sylvestris, B. betulina (S). *Gélinotte des bois, Poule des bois, P. des couedriers* (F).
طائر من السلكان طولها نحو ٤٥ سم. ثوبه متراكب الألوان والزرقعة. موطنه يشمل نصف الأقطار الأوروبية وشمال أفريقيا الشمالية. يألف الإحراج الكثيفة الغظلية.

١٤٠٢٢ - سِلْكُوتْ *

Carabus (S). *Carabe* (F). *Carabus, Carabid* (E).
جنس حشرات دجوية مفرمة نافعة من فصيلة السلكوتيات. أنواعه عديمة منتشرة في جميع الأقاليم الحارة والمعتدلة. أجسامها كبيرة القد. ألوانها عابقة الألوان السوية. من ميزاتها المخاصة أنها إذا خذرت من تيم خلقت من ثوبها يسائل لأصعب يكثر فيه الخنافس السبي || رقاتها مفترسة. أجسامها مبطلة تستنق عند أطرافها || أشهر أنواعها ما يلي.



سَلْكُ مُصَلِّع



سَلْكَانُ شَائِع



سَلْكُوتْ أَرْجَوَانِي



سَلْكُوتْ بَهِي



سَلْكُوتْ حَقَلِي



سَلْكُوتْ مَذْبَح



سلم

١٤٠٣٧ - سلمون كليفوريه و سلمون كينات
Salmo quinnat (S). Salmon de California, Quinatz (F).
نوع من السلمون الرسل الجيد الصنف يرغب في مياه
المنطق الدافئة. طوله يراوح من ١٢٠ إلى ١٥٠ سم.
قويه متراكب الألوان تقف في ظهوره الزرقه وتخف في
بطنه الحمراء.

١٤٠٣٨ - سلمونيات
Salmonides (S). Salmonides (F). Salmonides (E).
فصيلة اسماك من رتبة مفتوحات الخياشيم فيها السلمون
والدرة والحمل البلح.

١٤٠٣٩ - سلمى
Stellaria (S). Stellaira (F).
جنس نباتات عشبية برية حولية وبحولة وسمره من فصيلة
القرنفليات. انوعها المعروفة عديدة اصنافها معطر اقاليم
البلاد المعتدلة الحارة || سوقها خلية الحاداء و فراءه.
اوراقها لانظامية الاركانز و منها الساقية والمضغلة و منها
المضغلة واللاذخه والقلبية النصال والسانيه والرعيه. ازهارها
قردية او حثكولية تتجمع.

اشهر انواعها :

سلمى وسطى و حشفة القزاز S. Media (S).
سلمى زهاب و حشفة القزاز المرقيه S. pubescens (S).

١٤٠٤٠ - سلميات
Sclariidae (S). Sclariidae (F). Sclariidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرضويات سميت الاجليل
اماميات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد
منتشرة في جميع بحار العالم. جميعها مفترسة. ملجبتها
الحياثي جماعي و جاماتها قليلة العدد || اصنافها متباينة
الاحجام و محلزقة و يكثر فيها الشكل المزدني || اعرف
اجناسها السلم.

١٤٠٤١ - سلنوغرافية
Sclénographie (F). Selenography (E).
وصف القمر وروحه

١٤٠٤٢ - سلنوب
Longiligne (F). Longiline (E).
نمت تعريفه يوصف به الطول في الحيوانات الداجنة.

١٤٠٤٣ - سلوت
Scelotus (S). Scélotus (F). Scélotus (E).

جنس حيوانات زحافة من الطاءه وفصيلة السقنوريات.
انواعها المعروفة عديدة. اصنافها غسيمة تمتد من افريقية
الاستوائية الى الشرقية وبجزيرة مدغشقر || اجناسها
صغيرة و دقيقة و حادسة الاعتناق و رؤوسها قصيرة.
قوتهاها شديدة الصبر ومن الانواع من لا تقوى له. انوعها
سوية الا لوان يكثر فيها الكتفي الاسمر الاسفنج || قوتها
الذباب والحوام والديدان.

١٤٠٤٤ - سلور
Clarias (F). Silurus, Sheatfish (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة السلوريات. انواعه نحو
١٢ معظمها من اسماك مياه البلاد الحارة. جميعها مخلطحة
الرأس و مستطيلة الشكل و عادية الخرافات || اشهر
انواعه سلور المامسي والبربور والبن و البياض والثلثية
والقرومط.

جميع بحار العالم. جميعها مفترسة قوتها الرخويات والوديات
الصغيرة || اجناسها متباينة الحجم و يكثر فيها الصغر.
اصنافها سلبية و لامة و مردنية و محلزقة ومعددة و تحفظها
يولد كالقرو المستدير.

١٤٠٣١ - سلم و سلمام
Acacia flava (S). Mimosa blond, Acacia blond (F).

نوع من السنط و هو شجرة من الفصاء ميمرة الشوك الحاد.
تكثر في البادية. ورقها يعض القترط يصلح للباغة.
الواحدة سلمة.

١٤٠٣٢ - سلم التفرجة و عكس التفرجة
Dénitrification

تحول يحصل في الاربة الرملية بتأثير ميكروبات خاصة
تحول النترات الى نيتريت فامونيك غازات و هو بذلك
يكون عكس التفرجة وفيه ضرر كبير لان النيتريت
اسهل والقرب تحميلة واتصاصا من النيتريت.

١٤٠٣٣ - سلمون و سلمون و سلمك سلممان
Salmo (S). Saumon (F). Salmon (E).

جنس اسماك بحرية - بحرية مفترسة لاحة من فصيلة
السلمونيات. انواعه نحو ٥٠ جميعها كبيرة القد قليل
كامل نمجا بصر ست سنوات حيث يراوح طولها بالنسبة
الى انواعها من ٥٠ الى ٢٠٠ سم || والسلمون من
الاسماك التي تعيش وتتكاثر في المياه الباردة وقد تعيش في
المياه المعتدلة دون ان تتكاثر لانها لا تسرع في البحر.
اما الايداء في المياه الباردة فتكون قصيرة القد متوسطة الجودة.
ويحيى بحاها الطبيعية ترسل الى المياه الباردة في التشايرين
وتسرا في الكواثرين ثم تعود الى البحر بعد نفث سرها
وذلك في اواخر شباط. اما صغرها فيقيم في الماء الملب
وبها يطلع الحراير فيرسل اذ ذلك الى البحر ويبيض
عيشه جنبه ومادته الفطرية في التجول والتسرلة || اشهر
انواعه ما يتبع.

١٤٠٣٤ - سلمون البحريرات
Salmo lacustris (S). Saumon des lac (F).

نوع من السلمون الآبد المتوسط الصنف والقد و يعيش
في المياه الباردة. يبلغ كامل نمو بمر ٥ سنوات. طوله
يراوح من ٧٠ الى ١٠٠ سم.

١٤٠٣٥ - سلمون البنايع
Salmo fontinalis (S). Saumon de fontaine (F).

نوع من السلمون الآبد المتوسط الصنف والقد. يعيش
في مياه البنايع الباردة الباردة. طوله يراوح من ٥٠ الى ٨٠
سم. يبلغ كامل نمو بمر خمس سنوات.

١٤٠٣٦ - سلمون سكار * سلمون مبدول و
سلمون معروف
Salmo talar (S). Salmo commun (F). Common salmon (E).

نوع من السلمون الرسل الكبير القد طوله و عند اكبال
نموه و يراوح من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. قويه متراكب
الالوان. ظهوره اردوازي يميلو موانج ازرق. جانبها
الى الزبدية النضية. بطنه الى الحمراء || اثناء تسرا
بظرف ثمانية ايام من ٢٠ الى ٢٦ ألف سرات تقف بعد
اربعة اسابيع ثم تتصور وتتلخ وتبلغ كامل نموا النضي
بمر مت سنوات.



سلمون سلاز



سلوت



سلور

السرة تنطفل على سكن الحرشيات ويدبائها أعصها دودة ورق القطن والدودة القارضة .

١٤٠٥٥ - سُلُورَةُ الطَيَارِيَات *

Inostemma bosci (S).

حشرة صغيرة من السلونيات غليظة الجسم ، مستطيلة الأشرة . طوطا براوح من ١ الى ٢ م . تنطفل على سكن الطيارات وتقتني عليه .

١٤٠٥٦ - سُلُورَةُ القَامِيَاء *

Microphanurus semistriatus (S).

حشرة صغيرة من السلونيات غليظة الجثة القصيرة طوطا براوح من ١ الى ٢ م . تنطفل على سكن جميع أنواع القامياء .

Scallionidae (S).

١٤٠٥٧ - سُلُورِيَات *

Sodillonidae (F). *Scallionidae* (E).

فصيلة حشرات نائمة من رتبة شقائق النعمان ، غليظة الرأس أجسامها وأزواجها عديدة جميعها صغيرة القد ، غليظة الرأس والبطن ، والأرجل إلى السرة العادة الموج || تنطفل هي ورفقاتها على سكن العناكب وحشرشيات الاجنحة ويمل بعض الديدان واليرقات .

١٤٠٥٨ - سُلُورِيَّي هي الصفرى نوع من التلقل ، أطليها .

Amnion, Poche d'eau (F).

١٤٠٥٩ - سُلُورِيَّي

Amnion, Bag of water (E).

السل التلقل الذي يكون فيه الولد حين يخرج من الرحم ، وهو الشفاء القلوي الداخلي الذي يلف المجرى أي الجنين .

Lyra (F). *Lyra* (E).

١٤٠٦٠ - سِيلِيَاتِيَّي

السلياق كوكبية نجوم شمالية الخوخ مشهورة باسم قيشارة ، أطليها .

Gymnanthe (F).

١٤٠٦١ - سَكِيْب *

نعت تعريفي يطلق على كل نبات زهرته تتكون من الأعضاء التناسلية دون سواها ، أي دون فصل وبيلات ...

Romeria (S).

١٤٠٦٢ - سَكِيْب ، رَمِيْرَة

Romeria (F). *Romeria* (E).

جنس نباتات شبيهة حولية بوية من فصيلة الخشخاشيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد أصنافها بعض مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط || سيقانها غبراء ترتفع من ٢٥ الى ٤٥ سم . أزهارها متعاقبة ، مركبة ، وريحية التفرغ . أنواعها طرية ، فردية ، متعاقبة الحجم أو كبيرة ، قرزية اللون أو بنفسجية . أشهرها :

R. orientalis (S).

السلح الشرقى

R. hydrida (S).

السلح النطلي

١٤٠٦٣ - سَكِيْبَة هي القرقة الصيلية . أطليها .

Huile de noix de muscade (F). *Sakib* (E).

Oil of nutmeg tree (E).

دهن جوز الطيب .

Scyllidae (S).

١٤٠٦٥ - سِيلِيدِيَات *

Scyllidae (F). *Scyllidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من السنفقيات القرشيات . أجسامها وأزواجها المعروفة قليلة العدد مشتركة في معظم بحار العالم

Clarias orontis (S).

١٤٠٤٥ - سُلُورُ العامي

Clarias de l'Oronoe (F).

ويسمى السك الاسود . نوع من السلور يكثر في العامي . يطول نحو ٥٠ سم . ثوبه إلى السرة الخضراء . لحمه عادي الصنف ، يذلل المذاق .

Silure commun (F).

١٤٠٤٦ - سُلُورُ القرات

Common silurus (E).

هو الجري ، أطليها .

Clarias du Nil

١٤٠٤٧ - سُلُورُ النيل

هو القرموط نوع من السلور يكثر في النيل .

١٤٠٤٨ - سُلُورُ جَنْجِيْس *

Silondie du Ganga (F).

سمكة ثورية من مفتوحات الخاثة وفصيلة السلوريات . أصلها بحر الجنس أي التني || جسمها أطليها الشكل ، كبير القد ، متدل التجليط ، يطول نحو ٢٠٠ سم . رأسها صغير الجسم ، مخروطي الشكل . عظمها كبير اللدق . عيناها كبيرتان ، وأصاحتان . زعنفتها الظهرية الأولى متدلة الجسم أما الثانية فتشديدة الصغر . وزعنفتها الثانية فارقة . ثوبها إلى اليردة السوداء اللفضية الموج || لحمها كامن الصنف ، مأكول .

Siluridae (S).

١٤٠٤٩ - سُلُورِيَات

Siluridae (F). *Siluridae, Catfishes* (E).

فصيلة الجري والسلور وهي من الاسماك الدنية الحراش .

١٤٠٥٠ - سُلُورِيَّي ، نَابِيْبَة ، نَابِيْبَس

Nepenthes (S). *Népanthe, Népanthas* (F). *Nepenthes, Pitcher plant* (E). *Kannenstrauch* (D). *Nepente Pianta da brocche* (I).

جنس نباتات ممررة من فصيلة السليقيات . أنواعها نحو ٣٠ منها البلاد الحارة . جميعها عارشة بوية وزيينية . أرواقها متعاقبة سنانية التصل المستطيل الذي ينتهي بمخاريط يطول قدره ثم يتطور ويتصور عند طرفة يصبح كالجراب الجالس يطول غشاءه وعلق ويثقل عند الانضواء يجمع فيه رحيق سكري . حامز لرحق تفرزه غدو خاصة لا يجذب الحشرات فإذا ما دخلت الحشرة لا تترافق الرحيق الزرقعت من السائل وانطق عليها النضاء تفرق وتتمل وتتصل إلى غذاء يمتصه النبات || أزهارها سبلي أو حشوكية التجميع . أزهار صغيرة القد ، ثنائية المسكن || يقال إن منافعها الطبية عديدة .

Nepenthaceae (S).

١٤٠٥١ - سُلُورِيَّيَات

Nepenthaceae (F). *Nepenthaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات اللفلقتين تشمل جنس السلور دون سواه .

Le Lévrier, Chiens de chasse (F). *Canes Venatici* (E).

١٤٠٥٢ - سُلُورِيَّان

السليقان كوكبة نجوم شمالية المذبح مركزها بالقرب من الذنب الأكبر . نجمها عديدة أبرزها من المربعة الثالثة . وهي تشتمل على سديين لوليين قريبا الشبه بكليبي سيد .

١٤٠٥٣ - سُلُورِيَّان

هو سليسيلات الفينيل يستعمل مطهراً للأسماء .

١٤٠٥٤ - سُلُورَةُ الخَرْشِيَّات *

Telenomus bombycis (S).

حشرة صغيرة من السلونيات طوطا غليظة وأسد لونها إلى



سلور جنس



سلور



سلورة الحرشيات



سلورة الطيارات



سلورة القامياء

المسكن || أوراقه وتوابعه وصاروة سوية تستعمل في عدة صناعات كالدهانة والصباغة والطلاء || أعرف وأشهر أنواعه ما يتبع .

١٤١١٢ - سُمَاق الدَّبَّاعِينَ * ، تَسَمَّى

Rhus cortaria (S). Sumac des corroyeurs, Roure des corroyeurs, Corroyère, Vinaigrier (F). Sumach, Tanner's sumach (E). Essigbaum, Gerbersumach (D). Sommaco, Scotano romano (I).

هو السباق المعروف لليلول في البلاد القنطانية السورية . شجيرة عابلة تملو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم . فروعها زاهية الغداء أوراقها مركبة تد من ١٥ الى ٢٠ ورقة نصليا باهت الخضار خلي الصفة السفل . ازهارها عشكولي كنيث التجميع يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ازهارها خضراء اللون . ثمارها بلسنية الشكل ، جزوية اللون ، خلية البقرة . يزورها ثديية الصلبة معقولة || أوراقها دباغية . سوق ثماره من التوابل الحامضة المانصة للشهورة .

١٤١١٣ - سُمَاق الصَّبَاغِينَ ، عَرَبِيَّ

Rhus cotinus (S). Sumac des teinturiers, Fuscet, Arbres à perruque (F). Smoke tree, Wig tree, Venetian sumache (E). Echer perückenstrauch, Perückenstrauch (D). Sommaco à parrucca, Scutano, Rubione (I) .

شجيرة عابلة تملو من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم . أوراقها مركبة . وريقاتها سنانية ذقنة . نصليا عابك الخضار . خلي الصفة السفل . ازهارها تاجي الارتفاع هربي الشكل . أوراقها دباغية وصباغية ، غضبا اصفر اللون .

١٤١١٤ - سُمَاق الطَّلاء * ، عَرَبِيَّ

Rhus vernix (S). Sumac vernis, Bola chandelle (F). Lac sumach (E). Lackbaum, Firnisumach (D). Sommaco d'Indie (I).

شجرة عابلة تملو نحو ٦ أمتار . ساقها ملسة الغداء . أوراقها مركبة تد من ٥ الى ٢١ ورقة نصليا سنن الزام الاخير ينمو عابك الخضار اللامع ثم ينحرف الى الجلوة . وينتهي في اوائل الخريف بالحمرة البرتقالية || ازهارها ابلي . ازهارها صفراء اللون ، خلية البقرة . ثمارها بلسنية تطرق نحو ٤ سم . يزورها مفسلة . ثمارها وأوراقها وصاروة قلبية للمادة جعالمأ اروي || عصاريتها غزيرة ، تستخرج بالخر ، يصنع منها الكحني الصافي الفاخر الصنت .

١٤١١٥ - سُمَاق اللَّك * ، Rhus verniciflua (S).

Sumac à laque (F). شجرة عابلة تملو نحو ١٥ أمتار . ساقها ملسة الغداء . أوراقها مركبة تد من ٧ الى ١٣ ورقة نصليا يطول نحو ١٦ سم . ازهارها هربي الشكل عشكولي التجميع . ازهارها الى الصفار الباهت || يستخرج من ساقها بالخر صارة صغيفة لزجة يصنع منها الكح الياباني الفاخر الصنت .

١٤١١٦ - سُمَاق جُمَحَالِي * ، Rhus toxicodendron (S).

Sumac vénéneux, Arbre du poison (F). جنبة عارضة عابلة تملو نحو ٥ أمتار . أوراقها مركبة ثلاثية . نصليا قلمي الشكل ، ضرب المقصعة ، ازغب الصفة السفل . ازهارها عشكولي التجميع ، محوري الارتفاع . ازهارها خضراء اللون . ثمارها مجسم وشكل الحصن ، ملاء البقرة ، صفراء اللون || ثمارها جمالية تحوي بعض المواد القلوية الفتالة .

والانتاج الزاخر الاثام || لذلك فالاسمدة الكيماوية عديدة لانها وضعت ، ولا تزال توضع وترقى مع العلم والتقنية ، سلبا لحاجة النبات وظروف التربة والأقليم || تقسم الاسمدة الكيماوية الى ثلاثة عناصر رئيسية : الآزوت وسلفر والفوسفور والبوتاس . ثم تلبها العناصر الثانوية كالكلور والمغنيزيوم والكبريت واليورق ، الخ .

١٤١١٢ - سَمَاد مُرَكَّب (F). Engrais composé (E).

هو كل سماد سوي كامل أو بعض العناصر الرئيسية وقد شاع استعمال الاسمدة المصنوعة المركبة نظراً لحققه من اقتصاد ملموس ومن نتائج طيبة .

١٤١١٣ - سَمَاد مُعَدَّنِي (F). Engrais minéral (E).

هو كل سماد مصدره معادن الأرض يستخرج ويستخلص في سبيل التربة والنبات .

١٤١١٤ - سَمَاد وَسِيط (F). Engrais catalytique (E).

هو السباد المحصري الذي اذا اضيف الى التربة نطت بفعالية الحبيطة نباتاتاً المزروعة دون ان تكتل منه || الاسمدة الوسيطة عديدة جميعها من العناصر الثانوية والثالثية . اشهرها الكبريت والمغنيزا واليورق المنيزا .

١٤١١٥ - سَمَكِر هو الأصل ، اطليه .

١٤١١٦ - سَمَكِر اُخْضَر هو الأصل العربي ، اطليه .

١٤١١٧ - سَمَكِر شَالِك هو الأصل الكولاني ، اطليه .

١٤١١٨ - سَمَكِرَة * ، تَوَدْرِيح ، فِجَل الجِمَالِ

قُسْطُ بَرِّي (F). Sisymbrium (S). Sisymbrium (S). Hedge mustard (E).

Wegerauke (D). Sesembrio, Rapino (I).

جنس نباتات عشبية برية سوية أو مصرة من فصيلة الصليبيات . أوراقها متعاقبة مفروقة . ازهارها صغيرة القد صفراء اللون || أنواعها عديدة أشهرها السيرة الحزنية وأوراقها وازهارها طيبة نقيها فيه بحة الصوت .

١٤١١٩ - سَمَكِرِي * ، Chauliastmus strepera (S).

Canard chipeau, Chauliastmus, Chipseau bryuant, Ridonne (F). Gadwall (E).

طائر مائي وسيد الجنس والنوع من فصيلة البطيات . طول نحو ٥٥ سم . ثوبه ابيض اللون . منقاره أسود . ساقه الى الحمرة البرتقالية . الاذن اصفر من الذكر . صدرها الى الصبهة المنقطة بالاسود || وهو من القواطع محبوب التفرق وأروية . يألف الجببرات والناقم . قوته الاشباب المنقطة والخراش والدبدان والاسماك || يش حقه في المنافع بين الادل . انشاء تصع من ٨ الى ٩ فيضات تحضها وسعها .

١٤١١١٠ - سَمَاط جَوَقِي * ، Nappe phréatique (F).

Water ground (E). هو جملة المياه الجوفية الحزونة في الأرض .

١٤١١١١ - سَمَاق (F). Rhus (S). Sumac (F).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة الراتنجيات . انواعه عديدة . أوراقها متعاقبة . كاملة النصل أو مركبة ورتية ، ثلاثية الورقيات أو ريشية . ازهارها خماسية التركيب ، وسيدة المبيض منها الحشوية والفرضية وثلاثية



سمارة



سماري



سماق الدباغين



سماق الطلاء



سماق الكلك

صنيرة اللد. اجسامها صنيرة ، ثنائية الخائب الطليقة المستطيلة || تعيش في الاسمان والريال القليلة النور .

١٤١٢٦ - سَمَاقِيَّات *
Psammobidae (S).
Psammobidae (F).
Psammobidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الحليمان . اجسامها وانواعها المروقة عديدة معظمها من متحجرات الاراضي الثالثة || اجسامها صنيرة اللد او متوسمة . مستطيلة الخائب . اصداؤها شبه مظلة الشكل ، جملة الالوان المتراكبة الزاوية || اعرف اجناسها واشهرها البالية والدسامة .

١٤١٢٧ - سَمَاق
Fourmi rousse (F).
Reddish ant (E).

البسام وتسمى البسام هي النملة الحمراء .

١٤١٢٨ - سَمَاقَة ، مَحْطَفٌ ، حَفْص
Cypselus (S). Martinet (F). Swift (E).
جنس طير من فصيلة السبايات . انواعه المروقة ٢٠ جميعها من القواطع ذات الصيف والمشي . اجسامها مستطيلة . اجتنابا غارة الطول . لذاتها فارة . ارجلها قصيرة مدرولة . متاهرها صنيرة . اشداؤها واسمة || وهي من الطيور النافعة التي تقضي على الذباب والحلم واليهوض وبعض الحشرات الاخرى . تتميز بجريتها الشديدة الكائنة تحت السليا . طيراتها فالت سرعة . تكثر اوراقها في اوقاب الصغور وتحت مطوح البيوت . انها تحسن وجعها من يفتين في ثلاث بضات زهاء اسبوعين . اشهر انواعها ما يتبع .

١٤١٢٩ - سَمَاقَة الصُّرُود * ، عَوْرَق
Cypselus melba, Micropus melba (S). Martinet alpin, M. à ventre blanc (F). Alpine martin (E).
من اكبر انواع السامة . تألف البلاد الجبلية ، يكثر وجودها في الشرق الاذني وفلسطين . طولها نحو ٢٣ سم . ثوبها الى السواد الفخمي . بطنها ابيض ، صغرها موشج بخل اسمر .

١٤١٣٠ - سَمَاقَة رَيْدَا * ، مَحْطَفٌ اَسْمَر
Cypselus murinus, Micropus murinus (S). Martinet murin (F). Little grey (E).
سامة متوسطة اللد طولها نحو ١٧ سم . ثوبها الى الريبة السوداء . صغها ابيض موطنها سواحل البحر المتوسط وافريقيا الشرقية والجزيرة .

١٤١٣١ - سَمَاقَة صَوْدَا * ، عَوْرَق
Cypselus apus, Micropus apus (S). Martinet noir, M. de murailles (F). Black martin (E).
سامة كبيرة اللد طولها نحو ٢٢ سم . ثوبها الى السواد الاسفنج يملو مواج اخضر . زورها ابيض احطل . تألف جمع بلاد سواحل البحر المتوسط وقد تتوغل في الداخل .

١٤١٣٢ - سَمَاقِيَّات
Cypselidae (S).
Cypselidae, Apodidae (F). Cypselidae (E).
فصيلة الطيور البسام من الجوامع المروقات للناظير اجناسها وانواعها عديدة جميعها من الطيور الناجية للتنام . الصغيرة اللد ، المستطيلة الجناح . السريعة الحركة والحليقة الطيران || معظمها من القواطع . قويا الحشرات والحلم .

١٤١٣٣ - سَمَان
Pomacantre symman (F).
سمكة بحرية تسمى سمان سمان ، اطليا .

١٤١١٧ - سَمَاق حَرْتَه ، عَوْرَق

Rhus pentaphylla, R. albidia (S). Sumac à 5 folioles (F). Hawthorn like sumach (E). Spitzdorn (D). Scotano albidia (I).

شجرة هروية تملون ع الى ٧ اثار . ساقها وقرونها شالكة . اوراقها مركبة ثلاثية او خمسية الوريقات . نصلها مالى البشرة ، مستطيل الشكل ، ثلاثي التستين . ثمارها ملوة العلم ما كولة || اوراقها دبابية وصفيانية لكنها متوسطة الصنف .

١٤١١٨ - سَمَاق عَطْرِ
Rhus aromatica (S).
Sumac aromatique (F).

شجرة عابلة تملون من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها مركبة ثلاثية . نصلها مسن الحافة عطري الرائحة عند التفرع . انزعارها متشكول مستطيل يسبق الارق . انزعارها صفراء اللون || تزرع لقرنين ترخر من اذار الى نيسان .

١٤١١٩ - سَمَاق كَاذِب ، عَوْرَق
Rhus succedanea (S). Sumac succédané, S. hârd (F). Tallow sumach, Japanese wax tree (E). Japonischer sumach, Wachsbäum (D). Sommacco da sego (I).

يكثر في الشرق الاقصى شجيرة تملون نحو ٦ اثار . يستخرج من ساقها بالخر مصارة صمغ لزجة وصنع منها الكك الصبي اللد الذي يمتزج من الاصناف الوسطى .

١٤١٢٠ - سَمَاقِي
Granit, Porphyra (F).
Granit, Porphyry (E).

حجر البياق وهو حجر صواني قلبي اسود اللون او احمر او اخضر او موشج بالاحمر والاصفر والجلوي .

١٤١٢١ - سَمَاقَة
السباك منزل من منازل القمر الشامية ، ويعلى السباك الازل لان ليس امامه فيه في حين ان السباك الرابع الذي لا يزل القمر ، يتبعه كوكب يقال له راية السباك . وبعض العرب يميل من السباكين ساقا الاسد || رقيب السباك يدعى بطن الحوت .

١٤١٢٢ - سَمَاقَة اَعْرُك ، سَمَاقَة
Epi, Spica (F). Spica (E).

السباك الازل او السفلة نجم ثير من برج الطغراء . مركزه بالقرب من اليد اذاء السباك الرابع . يبعد عن الارض نحو ٤٠٠ سنة ضوئية .

١٤١٢٣ - سَمَاق وَامِج
Arcture, Arcturus (F).
Arcturus (E).

السباك الرابع نجم ثير اخر من كوكبة السوء . مركزه بين فطلي البقار اي السوء . ويدعى حارس السوء لانه لا يغيب حتى تحت اشفة الشمس . يبعد عن الارض نحو ٤٠ سنة ضوئية .

١٤١٢٤ - سَمَاق
١٤١٢٤ - سَمَاق
دودي في الماء التلق .

١٤١٢٥ - سَمَاقَة *
Psammobius (S).
Psammobie (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الحليمان وفصيلة السبايات . انواعها المروقة تناثر المنة . بعضها من متحجرات الاراضي الثالثة والبعض الآخر معاصر متشر في جميع بحار العالم || اصداؤها شبه مظلة الشكل ،



سَمَاقَة



سامة الصرود



سامة ريداء



سامة صوداء

١٤١٤٧ - **سَمْعَاق** (F). *Périoste* (E).
جِلْبِيَّة رَقِيقَة لَيَقِيَّة المَادَّة تَنْشِي المِظَام .

١٤١٤٨ - **سَمْعَاق** ، **عَكَوَض** *Cirro-stratus*
نَوْع من التَّيَرَمِ التَّصِلَة البَيد مَظْهَرها طَبَقَات مُتَابِية
أَفْئِيَة الازْتِكَاذ وَشَاحِيَة الشَّكْل مُسْتَعِيلَة يَتَخَلَّها بَض
الْكُتَل المَائِيَّة .

١٤١٤٩ - **سَمْنَح** *Germination (débüt)* (F).
هُوَ بَدَأُ الْإِنْتِشَاح . رَاجِعُ أَنْتَاش .

١٤١٥٠ - **سَمْنَعَة** ، **صِرْم** *Sous-variété* (F).
Sub-variété (E).
السَّمْنَعَة صِرْمٌ . هِيَ أَفْرَاد من ضَرْب وَاحِد تُخْتَلِفُ بِصِفَات
خَاصَّة جَعَلَهَا يُتَمَيِّز بِبَعْضِ الشَّيْءِ عَنِ الْقَرِيبِ التَّصَدُّعِ عَنْهُ .

١٤١٥١ - **سَمْنَعِيَّة** *Epigenèse* (F). *Epigenesis* (E).
السَّمْنَعِيَّة هِيَ الطَّرِيقَةُ التَّجَنُّبِيَّة فِي تَقْصِيرِ... تَكُونُ لِلاِجْسامِ
المُرَكَّبَةِ عَنْدَ إِضَافَةِ مَا كَانَ يَتَضَمَّنُهُ أَوْ مَا كَانَتْ تَقْتَضِرُ
أَلَيْهِ جَرُونَتُهَا .

١٤١٥٢ - **سَمْنَد** *Engraisser* (F). *To manure* (E).
اِسْتِمْلُ المِهَاد لِقَرِيَّة .

١٤١٥٣ - **سَمْنَر** *Clair-obscur de la lune* (F).
الْمَر اسم ظَلِ الْقَمَرِ .

١٤١٥٤ - **سَمْنَر**
هُوَ السَّطْحُ الْقَوْبِي اِطْلَبَ . وَجَاءَ عَنِ ابْنِ حَنِفِيَّةٍ : « شَجَر
مِنَ الْمَشَاءِ وَلَيْسَ فِي الْمَشَاءِ أَجْدَدُ خَشْيَةً مِنْهُ يُنْقَلُ إِلَى
الْقَرَى تَنْفَضِي بِهِ الْبَيْتُ » الرَّاحِدَةُ سَمْرَةٌ . وَيُقَالُ أِنْ
الشَّجَرَةَ الَّتِي يَبْرُحُ تَحْتَهَا رَسولُ اللَّهِ كَانَتْ سَمْرَةً .

١٤١٥٥ - **سَمْرَقَر** * ، **سَمْرَقَرْد**
Pastor roseus (S). *Martin roselin*, *Ecourneau*
rose (F). *Rose-coloured starling* (E).

وَمِنْ أَسْمَاءِهِ بِأَذْنَانٍ وَسُكُوتٍ وَفَرْمَادِي . طَائِرُ قَنْبَرَانٍ
وَحِيدِ الْجُلُوسِ وَالنَّوْعِ مِنْ فَصِيلَةِ الزَّرَّازِيرِ طَوْلُهُ نَحْوُ ٢٣
سَم . رَأْسُهُ وَطَرُهُ وَخَنَقُهُ وَبَيْنَاسُهُ وَزَيْكَاةُ أَلِ السَّوَادِ
الْأَزْرَقِ المُلَاج . سَائِرُ رِيثِهِ أَحْمَرُ وَبَدِي . مُتَشَابِهٌ
وَبَدِيلُهُ أَلِ الْبَصْرَةِ فِي مَوَاطِنِ الْبِلَادِ الْحَارَةِ يَجُودُ فِي
طَلَبِ الصَّيْفِ وَالْمَطَرِ قُوَّةُ الْجَرَادِ وَالْجَانْدَابِ وَالْقَائِيَابِطِ .

١٤١٥٦ - **سَمْرَوِيلَة** * ، **قَصْب** هَرَّ

Simaruba (S). *Simaruba* (F). *Simarouba* (E). *Simarubum* (D). *Simaruba* (I).

جِنْسُ الشَّجَرِ حَرَبِيَّةٌ طَبِيْعَةٌ مِنْ فَصِيلَةِ السَّمْرَوِيَّاتِ . أَنْوَاعُهُ
٦ مِنْهَا أَمْرِيكِيَّةُ الوُطَى ، سَوَقُهَا لِمَسَاكِينِ الْمَاءِ تَمَلُّو
مِنْ ٥ أَلِ ٢٠ م . أَوْرَاقُهَا مُعَاكِفَةٌ بَسِيطَةٌ أَوْ مَرَكَبَةٌ
أَنْزَعَارُهَا مُتَكَوِّلٌ التَّجَمُّعِ تَاجِي اِلْتِكَاذ . أَنْزَعَارُهَا خَشَوِيَّةٌ
خَاصَّةً بِتَلَاتِلَاتِ ٭ اِنْشَابِهَا صَلْبَةٌ صَفْرَاءُ الْوَرْدِ خَافِرَةٌ
الصَّبْتُ . لَحَاءُ سَوَقُهَا وَأَصْفَانِهَا مَرَّةً الطَّرِيقِ طَبِيْعَةٌ . نَقِيبُهَا
يَسْتَعْمَلُ فِي مَكَائِفَةِ الْحَشَرَاتِ . يَصْبِقُ أَوْرَاقُهَا وَنَفِيعُهَا
مُضَادٌّ لِسَمِ الْإِقْلَامِيِّ وَهُوَ يَسْتَعْمَلُ فِي مَعالِجَةِ السُّفْلَسِ وَبَعْضِ
الْأَمْرَاضِ الْجِلْدِيَّةِ .

١٤١٥٧ - **سَمْرَوِيَّات** *Simarubaceae* (S).

Simarubaceae (F). *Simarubaceae* (E).
فَصِيلَةٌ لَبَاتِيَّةٌ مِنْ ذَوَاتِ الثَّلَاثَيْنِ مُسْتَقِلَاتُ الصَّفَالَاتِ .

١٤١٦٤ - **سَمَانَة** *Callie* (F). *Quail* (E).
وَاحِدَةُ السَّيَّانِ طَائِرٌ مِنَ التَّنَزِيحِيَّاتِ . يُقَالُ سَمَانِي الْوَاحِدُ
وَالْوَاحِدَةُ سَمَانَةٌ جَمْعُهَا سَمَانِيَّاتٌ .

١٤١٦٥ - **سَمَانِي** * ، **قِرِي** ، **قَتِيلُ الرِّعْد** ،
مَرِيغِي *Coturnix* (S).

Callie (F). *Quail* (E).
جِنْسٌ طَيْرٌ مِنْ عِمَارَةِ الْحَبْلِيَّاتِ وَفَصِيلَةِ التَّنَزِيحِيَّاتِ
وَاحِدَتُهُ سَمَانَةٌ وَقَرَاةُ جَمْعِهَا سَمَانِيَّاتٌ وَطَرِي . أَنْوَاعُهُ نَحْوُ
١٥ جَمِيعًا مِنْ التَّقَوُّاعِ مَعْظَمُهَا صَغِيرٌ . لَدُنْهُ طَوْنٌ
يَرِاحُ مِنْ ١٥ أَلِ ٢٠ سَم . اِتَّوَابُهَا إِلَى الصَّبَةِ . الْحَبْلِيَّةُ
يَطْلُوها تَجَنُّبُ عِزِّهِ وَيُضَيِّحُ وَيُضَيِّحُ وَيُضَيِّحُ ٭ تَأَلَّفُ فِي تَجَوُّلِهَا
الْمَقْبُولِ الْمَزْدِيَّةِ وَالرَّاحِي وَالْكُرُومِ قَرَبُهَا الْأَشْجَابُ وَالْحُجُوبُ
وَالْهَوَامُ ٭ الْإِنْسِيَّ اسْفَرَّ قَدًّا مِنَ الذَّكَرِ وَاعْبَرُ لَوْنًا
تَدُنُّ اِنْصِصَافُهَا فِي الْإِدْغَالِ وَبَيْنَ الْأَشْجَابِ الْكَثِيفَةِ
وَرُصَصِهَا بِالْعُشِيِّ اِتَّامَ . تَقَعُ مِنْ ٨ أَلِ ١٥ بَيْضَةً
تَحْضِنُهَا وَحْدَهَا زَمَانًا ثَلَاثَةً أَسَابِيحَ .

١٤١٦٦ - **سَمْبَلُفُورَة** ، **مُحْتَكِمَة** *Cymbalophora pudique* (F).

هِيَ الطَّمْرُوسَةُ الْمُحْتَكِمَةُ ، اِطْلَبُهَا .

١٤١٦٧ - **سَمْت** *Azmut* (F). *Azimuth* (E).
اِسْمُ طَرَفٍ عِلْمِيٍّ فَلَكَ يَدُلُّ عَلَى نَقْطَةِ زَوَايَا وَاقِعَةٍ فَرْقٍ وَأَسَ
الرَّاصِدِ تَدْعِي سَمْتُ الرُّأْسِ يَقَابِلُهَا نَقْطَةُ أُخْرَى تَقَعُ تَحْتِ
قَدَمِ ذَاتِ الرَّاصِدِ تَدْعِي سَمْتُ الْقَدَمِ أَوْ التَّنْظِيرِ . وَمَعْنَى الرُّأْسِ
وَالْقَدَمِ هَا تَلْبِيَا دَائِرَةَ الْإِنْفِ .

١٤١٦٨ - **سَمْتُ الرُّأْسِ** *Zénith* (F). *Zenith* (E).
مَعْنَى التَّنْظِيرِ أَيْ سَمْتُ الْقَدَمِ .

١٤١٦٩ - **سَمْتُ الْقَدَمِ** ، **نَظِير** ، **نَظِيرُ السَمْتِ** *Nadir*

١٤١٧٠ - **سَمَة** *Stigma* (F). *Stigma* (E).
الْجُزءُ الْأَعْلَى مِنْ مَقْعَةِ الزَّرْعَةِ وَهُوَ الَّذِي يَتَنَبَّلُ الْوَلِيعُ .
وَهِيَ فِي الْحَشَرَاتِ لِلْفَصِيلَةِ قُوَّةٌ تَنْفِصِيَّةٌ سَطْحِيَّةٌ مَبَازِرَةٌ
الِاتِّصَالَ بِالْأَنْبُوبِ التَّنْفِصِيِّ .

١٤١٧١ - **سَمَة** *Nacce* (F). *Matting* (E).
مَفْرَعَةٌ مِنْ خُوصٍ تَبْسُطُ تَحْتِ النَّظْلِ وَفِيهَا مِنَ الْأَشْجَارِ
الْمُتَرَفِّعَةِ لِيَقْطَعَ عَلَيْهَا مَا تَنْشَرُ مِنْهَا . ج . س .

١٤١٧٢ - **سَمَة** ، **عَلَامَة** ، **وَسَم** *Etiquette*, *Marque* (F). *Ticket*, *Mark* (E).

١٤١٧٣ - **سَمَة الشَّجَرِ** *Marcelage* (syrv.) (F).
Marking of trees (E).
عَلَامَةٌ يَضْمُنُهَا مَأْمُورُ الْأَجْرَاجِ عَلَى بَعْضِ الْأَشْجَارِ الْحَرَبِيَّةِ
الْمَاجَرِ قَطْعُهَا .

١٤١٧٤ - **سَمْتِي** *Zénithal* (F). *Zenithal* (E).
عَنْصَ بِسَمْتِ الرُّأْسِ .

١٤١٧٥ - **سَمْنَح** ، **السَّح** : لَمَّا لَا عَقْدَةَ فِيهِ .

١٤١٧٦ - **سَمْنَح** ، **السَّح** : الْفَرَسُ الطَّوِيلُ الطَّرْفُ .



سَمَانِي



سَمْرَم



سَمْرَوِيَّة

١٤١٦٦ - سَمْفُورِين الصِّين

Symphoricarpos sinensis (S). Symphorine de la Chine (F).

جنية مبروتية تملو نحو ١٥٠ سم. أرواقها صغيرة لينة. أزهارها تاجي. انزهارها مستطيلة المفايق، جرسية الشكل، بيضاء اللون. ثمارها الى الزرقة يطولها موج احمر وخلة صهباء.



سم

١٤١٦٧ - سَمْفُورِين المَكْسِيق

Symphoricarpos microphyllus (S). Symphorine du Mexique (F).

جنية جادحة تملو نحو ٩٠ سم. أرواقها خضيرة ذلقة الزام الاخير. فصلها جيل انضمار الزامي، مهدب الحافة، ازغب الصفحة السفلى. أزهارها تاجي. انزهارها مستطيلة وريدية. ثمارها الى الحمرة الباست.



سم

١٤١٦٨ - سَمْفُورِين شاكعة

Symphoricarpos albus (S). Symphorine commune (F).

جنية مبروتية عديدة الضروب تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. أرواقها متوسطة اللثة فصلها انضمر الغنر اللون يطول موج احمر. صفحت السفلى خلية البشرة. أزهارها وريدية اللون، زينة البشرة. ثمارها بيض.

١٤١٦٩ - سَمْفُورِين مُسْتَدِيرَة الْفَرْق

Symphoricarpos orbiculatus (S). Symphorine à feuilles rondes (F).

جنية مبروتية قليلة الضروب تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. أرواقها تطول نحو ٤ سم. فصلها بالاس الصفحة العليا الخضراء اللون، ازغب السفلى. أزهارها وريدية يطولها موج اغضر. ثمارها حمر اللون كقبة الشكل واللثة.

١٤١٧٠ - سَمْفُورِين، سَمْفُورِين، كَسْبِيدَة

Symphytum (S). Consoude (F). Consoude (F).

جلى نباتات عشبية برية مبررة من نصيلة الحسبنيات انزاهة للمروقة ١٥ سنيتها البترة الاذل واروبه. أرواقها لائقة كاملة سنانية النسل. انزهارها لوري او عنقودي التجميع. انزهارها صغيرة اللثة انبوية. جميع انزاهة طرية اشهرها واغزرها مادة لعالة السفسلون الحزني.



سمفون

١٤١٧١ - سَمْفُورِين مُعْزَنِي * كَسْبِيدَة مُعْزَنِيَة

Symphytum officinale (S). Consoude officinale, C. commune, Grande consoude (S). Common consoude, Black-wort (E). Echter beinwoll, Walfwurz, Beerswurz (D). Consolida maggiore (I).

عشبة مبروتية مبررة تملو من ٧٠ الى ١٢٥ سم. أرواقها وشعية. ماها فرام فناء. أرواقها سنانية مستطيلة. انزهارها صغيرة اللثة لونها خفيف باختلاف الضروب فيها البنفسجي والارزواني والايض المشج بالاسفر. جلودها وانزهارها واوراقها طرية مبررة وتتمثل في حدة مستحضرات.



سمفون عزن

١٤١٧٢ - سَمَق، نَحْو، شَبَاح

Croissance (F). Growth (E). علا وقال فهو ساق وقن.

١٤١٧٣ - سَمَكَة

Plafond (F). Ceiling (E).

التسك-هو السقف وسمك البيت سقفه.

١٤١٧٤ - سَمَكَة

Paisotaga

غرز السمك قرب الكرتة لدعها.

اجتاسها ٢٥ اما انواعها فكتيرة اللد جميعها اشجار وشجيرات طرية مبررة البلاد الانريكية الحارة.

١٤١٥٨ - سَمَسْمَرَة

Courtage (F). Brokerage (E).

عمه الاجرة التي يقبضها الوسيط لقاء صفقة سى ما ونعها.

١٤١٥٩ - سَمَسَق، سَمَسَق، هو السمس، اطليه.

١٤١٦٠ - سَمَسَقِيَّات

Pédaliées, Pédaliées (F). Pedalia (E).

سبط من الجسبريات تتميز نباتاته بتكويها المشبي وبجلو يزورسان الامين.

١٤١٦١ - سَمَسَم * سَمَسَق، جَمَجَان

Sesamum oleiferum (S).

Sésame, Juguoline (F). *Sesame, Gingelly, Gingili* (E). *Sesam, Ollinge* (D). *Sesamo, Gluggiolena* (I).

نبات مشبي سولي زراعي دعي من السمسقيات. يزور ليزور الزينية التي يصخرج منها بالمصر السبرج. لماية كيل من حب السبرج تحوي ٤٥ كيلو من السبرج المأكول ١٢ كيلو من الزيت الصناعي ٨٥ كيلو من الكلب. يطول السمس من ٧٠ الى ١٥٠ سم. جلوده وريدية، سوتة اسطوانية، مغلدة، متصصة، فراء. اوراقه معتقة متعابلة الهلجية. فصلها متصبع الصفحة غائر العروق. انزاهة ابطية الارتكاز فردية. ثمارها جراء مستطيلة، ودياية المصارع تحوي نحو ٢٥٠ زرة. واليزور صغيرة اللثة، مغلطة، الهلجية، لونها يختلف مع القرب فيها الابيض والكتني والاصفر والاسمر واللاوس. يجرى في جميع الاربة المتوسطة الادماج والرطوبة. تكثر زراسته في بلاد الشرق العربي والهند.

١٤١٦٢ - سَمَسَمَة، سَمَسَمَة

Formica rufa (S). Fourmi rouge (F). Red ant (E). *Rota waldensis* (D).

السمسم هو النمل الاحمر الصغير.

١٤١٦٣ - سَمَسَمِيَّكَة، هي الماطس السبلي، اطليه.

Lycan pictus (S).

Lycan, Loup pait, Cynhyène, Chien hyénoide (F). *Painted lycan, Cape hunting dog, Cynhyena* (E).

حيوان مفترس سيد الجلس والتمع من نصيلة الكليات، قريبه من الشبه من الكلب واللثب والضع. موته البلاد الافريقية. جنته مستطيلة تبلغ نحو ٩٠ سم. وذنبه ٣٨ سم. قوائمها رفيعة. اذناه كيرتان جالستان. قويه اشبع ألون مجزج وديج بالاسد والايض والاصفر. اخلاعه ثمرسة. يعيش جماعات يروح عدد افرادها من ١٢ الى ٦٠.

١٤١٦٤ - سَمْفُورِين * جَنَبِيَّة الدُر

Symphoricarpos (S). Symphorine, Arbre aux perles (F). Snowberry, Waxberry (E). *Schnee beere, Petersstrauch* (D). *Sinforicarpo* (I).

جلى جنبات فناء برية ويزينية من نصيلة النباتات اوراقها معتقة كاملة متعابلة حاملة بيضية الشكل. انزهارها سبلي التجميع، ابطي الارتكاز. انزهارها صغيرة اللثة بيضاء اللون او وريدية. ثمارها لحمية، شبه كروية. اعرف انزاهة واشهرها ما يلي.

Croissance (F). Growth (E).

Plafond (F). Ceiling (E).

Paisotaga

Croissance (F). Growth (E).

Plafond (F). Ceiling (E).

Paisotaga

Croissance (F). Growth (E).

Plafond (F). Ceiling (E).

Paisotaga

Croissance (F). Growth (E).

ماحتان ، زعنفتها الظرفية تمتد من الخطم إلى طرف الذيل .
زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف || لحمها فاخر الصنف ،
مغروب فيه .

١٤١٨٧ - سمكة الشكل
Ichtyomorpha (F).
Ichtyomorphous (E).

١٤١٨٨ - سمكة
Vase (F). Silme, Mud (E).
ج سمل واسمال واسمال وسمول . بقية الماء والحساء في
الحوض والدير .

١٤١٨٩ - سمكة
السلق : القفر لا نبات فيه وقيل القلاع المستوي الاسلس
الابر لا شجر فيه . ج سائق .

١٤١٩٠ - سمكة
Rhglo (S).
Rhagio, Leptis (F). Rhagio (E).
جنس حشرات من فصيلة السليبيات ورتبة ذوات الجناحين.
أنواعها المروقة عديدة منتشرة في معظم انقطار البلاد الحارة
والمعتدلة الحارة والباردة || أجسامها متفاوتة القدر تطول
من ١٢ إلى ١٨ سم . رؤوسها كبيرة ، قليلة التكوير ،
مستقلة . عينها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها
الاستثمارية صغيرة ونحيلة . أعطامها مستطيلة . ملابسها
صغيرة . كواسلها كبيرة . بطونها شبه مدنية الشكل .
رواشنها كبيرة ، ملونة . ظنايب قوائمها الوسطى والأخلفية
ثلاثية المفاصل الحادة . أنفها ملونة || تألف الحراج
والغابات والأخلاق . جميعها قانصة . يرقاتها وألحج تمش
في التيرب والجافة والأعشاب النخرة .

١٤١٩١ - سمكة الياقات
Rhagionidae (S).
Rhagionidés (F). Rhagionidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . أجناسها وأنواعها
المروقة عديدة منتشرة في جميع أصقاع العالم باستثناء
أستراليا . جميعها غائلة ، مقترمة || أجسامها متفاوتة
القدر ، تطول من ٦ إلى ٢٠ سم . رؤوسها قليلة التكوير ،
مستقلة . عينها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها
الاستثمارية صغيرة ونحيلة . أعطامها مستطيلة . ملابسها
صغيرة . كواسلها كبيرة . بطونها مستطيلة . رواشنها
ملونة || أنفها أكبر قدماً من ذكورها . يرقاتها وألحج
تمش على ما تستطيع اقتراضه من دويبات ترحل في
محيطها || أشهر أجناسها السليطة والتريس .

١٤١٩٢ - سمك
Beurre (F). Butter (E).
سلاذ الزبدة للصنعة بالمأخض الرية المتعدة .

١٤١٩٣ - سمك
Engraisser (F). To fatten (E).
بالغ في تليدة الحيوان لتحسين لحمه وزيادة وزنه .

١٤١٩٤ - سمك نباتي
Cocose, Végétaline
هو دهن جوز الهند أي عجر الكانرجيل . وكل دهن مأكول
مصدرة النبات .

١٤١٩٥ - سمكة
Griwière (F).
Thrush aviary (E).
مطربة فيحة مشبكة الجوانب والسقف تستعمل لترية
السن .

١٤١٩٥ - سمكة
Poissons (F). Fish (E).
حيوانات قفارية من خلق الماء تختبر من ذوات الدم
البارد ومن ادف الحيوانات القفارية || رتبها وفصائلها
وأجناسها وأنواعها نحو ٤٠٠٠٠ . تتميز بأعضائها التنفسية
المركزة على الخياشيم التي تقوم بعملية تبادل الغازات .
وبعضها الحركة التي تستند على الزعانف والمضلات .

١٤١٩٦ - سمكة أحمر
هو النوع ، أطله .

١٤١٩٧ - سمكة الترس
Rhombus (S). Turbot (F).
جنس سمك بحري من فصيلة المفلطحات . أنواعه ٧
موطنها الألبانيس الأطلسي والبحر المتوسط . جميعها كبيرة
القدر مستديرة مبطلة . طولها يراوح من ٤٠ إلى ١١٠ سم .
أنفها إلى الصبهة المختلفة المزاوج يطولها توشم أسود .
لحمها لذية الطعم ، فاخر الصنف .

١٤١٩٨ - سمكة الكراكي
Brochet, Esox (F).
Esox, Pike (E).
هو الزنجبور جنس سمك نهرية كبيرة القدر مستطيلة .

١٤١٩٩ - سمكة سلبان
هو السلمان من الاسماك المشهورة .

١٤١٩٠ - سمكة فقي
هو الشمية ، أطله .

١٤١٩١ - سمكة متعجر
Ichtyolithe

١٤١٩٢ - سمكة موسى
Solea (S). Sole (F).
جنس سمك بحري من الملساوات الجانيات اليوم أنوعها
سنة موطنها جميع البحار . أجناسها مفلطحة صغيرة
القدر أو متوسطة . طولها يراوح من ١٥ إلى ٦٠ سم .
لحمها لذية الطعم فاخر الصنف . أجودها أمبقها ثجبا .

١٤١٩٣ - سمكة
Poisson (F). Fish (E).
راجع اسمك . ج سمك وسمك وسمك وسمك .

١٤١٩٤ - سمكة بشفاه
هي الزنباية ، أطله .

١٤١٩٥ - سمكة طليكة
Poisson volant (F).
Fish volant (E).

السكة الطائرة كوكبة نجوم جنوبية الملقح مركزها تحت
برج الدلو || عدد نجومها ١٧ . جميعها من الرتبة الخامسة
وبادونها .

١٤١٩٦ - سمكة موسى الشاكبة

Solea solea, Pleuronectes solea (S).
Sole commune, Perdreux de mer (F). Sol, Soul (E).

نوع من سمك موسى . سمكة بحرية يعيش من فصيلة
جانيات البحر . أصلها منظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة
وأخصها البحر الأبيض المتوسط . تتميز من اسمك أسلم
الكتاف . جميعها عويجي الحركة || جسمها مبطط الجرم ،
الميلاني الشوزن ، يطول من ٣٠ إلى ٤٥ سم . تتميز
بالاستلقاء على الجانب الأيسر مما يحمل عليها في الصنعة
التي من الرأس . فوقها مآذن المحيط التي تمش في
الصنعة التي إلى الخلف المزاوج . الصنعة اليسرى
إلى الثنية البيضاء . رأسها صلب الجرم . انفس الملقح
متصل اللشق . فكها الأمل يتقدم الأسفل . استأنها
صغيرة ، ذوبة ، عذبة الصفوف . عيناها صغيرتان ،



سمك الترس



سمك موسى



سمكة موسى الشاكبة

اللون أو بياض أو زرقاء ، ثمارها نورية عديدة البزور ۥ تنوعها وديهي .

١٤١٩٦ - سُمَّة * ، حَسَنُ النَجْمَةِ

Valeriana locusta, Valerianella olitoria (S). *Valerianella potagare, Mâche, Bourssett, Doucette* (F). *Cornsalad, Milkgrass* (E). *Ackersalat, Echter feldsalat* (D). *Valerianella, Dolce mangiare, Dolcetta* (I). بقلة زراعية من فصيلة النارديةيات . أرواتها خضبة فائضة بأكله لزود رغيد في جميع الأثرية المختلفة التركيب . تتكاثر بالذر . بزورها صغيرة مستديرة تحافظ على قوة أنبتها نحو ٥ سنوات .

١٤١٩٧ - سُمَّة * ، سُمَّة

Turdus (S). *Grive* (F). *Thrush* (E). ج سمين وسمان وسمان ، جئس طير من الشمروريات ، أرواه عديدة مظهرها من القواطع . أجسامها مسطيلة ، رؤوسها صغيرة ، مناقيرها جالسة . أرواسها دقيقة حارية . أرواها تختلف باختلاف الأنواع ۥ قوتها الحشرات والثمار . تكثر أرواها في الأشجار والأدغال ، أناتها تشبه من ٤ الى ٥ يضايات تحفها بنبوبة الذكور . أشهر أرواه مايلي .

١٤١٩٨ - سُمَّة الدَّقْن * ، سُمَّة الحدائق

Turdus viscivorus (S). *Grive draine, G. du gaul, G. de brou* (F). *Mistle-thrush* (E). طائر من أرواه الشرق الاوسط واروبة . طول نحو ٢٢ سم . ظاهر ثوبه الى الصبهة السوداء بملوحا موج جزوي . زوره وبلته وانيكه الى البياض الاصفر تملو رشفة سمر ۥ أناته تحف من برئين في العام . تكثر شها في الصنوبر والسديان والزنان .

١٤١٩٩ - سُمَّة مجرّالة * ، سُمَّة

Turdus mauvis (S). *Grive mauvis* (F). *Fieldfare* (E). طائر من القواطع غنيث الطيران سريه . يحرب الشرق الاقصى واروبة وأفريقية الشمالية . يألف النابات والحدائق والزارعين والمروج وصفات الآخر . طول نحو ٢٢ سم . ثوبه فوب سمته الدَّقْن ، بطنه الى البياض الاغبر ۥ ينش منه في الأدغال وفي العرص والقزاب والصربة . أناته تحف مرة واحدة ۥ سربه كبير الممد يفوق المنة .

١٤٢٠٠ - سُمَّة مطربة * ، سُمَّة شائعة

Turdus musicus (S). *Grive musicienne, G. commune, Merle-grive* (F). *Song-thrush, Thrush* (E). طائر من القواطع يحرب الشرق واروبة وأفريقية الشمالية والشرقية . طول نحو ٢٣ سم . رأسه وحنه وظهوره وبنجاباه وذنبه الى الصبهة السوداء بملوحا مراح زين . حنجره جناه الى الصفرة . زوره وبنوشه وبلته وانيكه الى البياض الاغبر بملوحا ترش اسم ۥ أناته تحف من برئين في العام . ينش في الأدغال والشجيرات الحرجية الكثيفة ۥ وهو من الطيور اللريدة النشيطة التي تتغفل الانحان وتردها .

١٤٢٠١ - سَمَنْتُوس

اطلب ارانة .

١٤٢٠٢ - سَمَنْجِيَّة * ، Epacris

Epacris (S). *Epacride* (F). جنس نباتات جنينية معمرة برية وفريقية من فصيلة السمنجيات . أرواها المعروفة قليلة العدد منتبها بعض جبال البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم ۥ شكلها حبيب قشبه بالتحس . سورها متصبغة فراء . أرواها متعلقة نباتية النصال الضيقة . أنهارها صغيرة مسطيلة الاوراق حراء

١٤٢٠٣ - سَمَنْجِيَّات * ، Epacridaceae (S). Epacridaceae (F). Epacridae (E).

فصيلة نباتات جنينية وبجيلة مسرة من ذوات الفلقتين . أجسامها وأرواها المعروفة قليلة العدد . منتبها بعض المناطق الجبلية من البلاد المعتدلة الحارة ۥ تثبت طويلا في المراتع المعتدلة الرطوة اغصانها الحراج والنباتات ۥ تتدبر بكثرة أنهارها المتتامة على الافان . لونها السائدة الابيض ثم الاحمر الابيضالي والازرق ۥ أشهر اجناسها السمنجة .

١٤٢٠٤ - سَمَنْدَلْ جَبِيلَة

Chloromyia formosa (S). *Chloromyia bella* (F). حشرة من فصيلة اليرقات ، جسمها صغير القد . خلي القشور ۥ بطولها من ٦ الى ٩ سم . رأسها مستدل الجرم ، ثوبه مكرور للشكل ، اسود اللون . حنيتها فاروقان قرصان . ملابسها صغيرة ، زياتها متصبان ، سداسيا الفصل . سعوا اخضر اللون ، جزوي الموج ، ملج الحمل . حنيتها سرسة . بطنها سداسي الشكل ، اخضر اللون . ورشها مستدلا الجرم ، حنيتها اللون . قوتها الى السرة ۥ تألف المراتع التي تكثر فيها الاعشاب والنباتات البقلة ۥ يربتها دودية الشكل ، سمره اللون ، تميش في الجلالة على المود النباتية للمستلة .

١٤٢٠٥ - سَمَنْدَلْ * ، سُرْفُوت ، سَمَنْدَلْ

Salamandra (S). *Salamandra* (F). *Salamander* (E). ومن اسمائه لرفون وسمته وسندل . جنس دوابيات زسافة من السمنديات . أرواه عديدة منها الارضية والقارزية والمائية . جميعها بيلة الحركة أجسامها مسطيلة الشكل طولها يراوح من ١٧ الى ٢٥ سم . أرواها تختلف باختلاف الأنواع فيها الاسود والاصيد والاسود الملبع والداغبر . قوتها الحشرات والحوام ۥ زم القصد ان السمندل يدخل النار ولا تحرقه وسقطة الامر ان جلده السمندل يفرز مادة آكلة قارضة تظلي النار الى حد تفنوها . ج سمدل .

١٤٢٠٦ - سَمَنْدَلْ أَسَدُود * ، سُرْفُوت أَسَدُود

Salamandra atra (S). *Salamandra atra* (F). *Black salamander* (E). حيوان قازب سرلود من فصيلة السمنديات . جسمه مغلق الشكل ، وديعي القوام ، بطول نحو ١٤ سم . منه الذكور ١٤ سم . منه الانثى ١٧ سم . رأسه مستدير اعظم واسع الشفق ۥ كمثل القسطن في الفكين . حنياه صغيرتان جاسختان مكملتان الجفون . متع باقعة القصر . ظهوره متابع الاسقاط المتعاقبة . ذنبه غليظ القاعدة مستدق الطرف . قوائمه قصيرة وبطيقة . قائمته الاماميان وديعيان الاصابع اما الخلفيتان فغاسختان . ثوبه سوري اللون الاسود تملو مابة بتسجسة ۥ يبلغ كامل نموه بمسر اربع سنوات ويعيش نحو ٢٤ سنة . يألف المراتع القريبة من الماء . يسرح في الليل ويبيت في البهار بين الصخور وتحت الحجارة ۥ قوته الحشرات وأسارها ولديان والزروعيات ۥ الاشر تقسم على حافة الماء سديلان كاملا الاصله داما اتيالشم الحارجية . ثم تلغح بها الى الماء حيث يقنان نحو خسة أشهر قبل ان يتسكتا من السير على الارض ۥ يعتبر من القوارب النافعة .



سَمَنْجِيَّة



سُمَّة الدَّقْن



سُمَّة مجرّالة



سُمَّة مطربة



سَمَنْجِيَّة



سَمَنْدَلْ



سَمَنْدَلْ أَسَدُود

١٤٢١٣ - سَمَنْدُودَةُ الْعَرُورِ *

Semanotus laurasi (S). *Sémánote du genre-vrier* (F). *Semanotus laurasi* (E).

حشرة غاصلة خاشية من فصيلة القرنييات ورتبة سمندلات الاليمية. تألف الجروود حيش حيث يكثر العرور والفران والابل. غنسانها تعيش على الارواق والازهار وخوا الغرايب. يرقاتها تركب الجروح والاضاح تنفجرها وترسبها حتى الشكير في جسمها حشوش القند يطول من ٩ الى ١٢ سم. عند الذكر ومن ١٥ الى ١٨ سم. عند الانثى التي تتميز ايضا بكير المرو. ثوبها ثنائي اللون ، اسود الرأس والكوكول والزبان والبلطن والجرازم ، اشجع الظهران الخشب بمجمة متفرعة سوداء. رأسها سمندل الجرم. حينها كيرقان جاحظتان. زباناها خيطيان مهدبان. ظهرانها سمندلير الطرف اللاحف عند الذكر في جيلها ثلاثي الخلو. تظهر الحشرة الجملة في نيسان وتبقى حتى ايلول. تسرح في النهار. تشافه يند ظهورها بنحو ثمانية اسابيع. ترض المكن بين التشرور في البرقة عند الادراك التام تطول من ١٨ الى ٣٠ سم. جسمها منحودوب الظهر ، مبط الملب ، صغير الرواجب التودية. ثوبها الى السرة يطولها موال اشجع وتبقى اسمر عند الحلقفة الصدرية الثانية الى السمكة البطنية قبل الاخيرة. رأسها جزوي اللون يغور من الحلقفة الصدرية الاولى الى طور الاكمال الذي يسمر من ٤ الى ٥ سم. يوبيا يتفشي عند مدخل آخر نفق احتفرته البرقة ضمن صلحية من المواد النباتية المعبونة بالريال.

١٤٢١٤ - سَمَنْدُودَةٌ *

Scymnorhinus, *Scymnus* (S). *Scymnorhine* (E). *Scymnus* (E).
جنس اسماك بحرية سرودة من فصيلة السمندويات. انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي اعصها المنطقة المتحدة المغرب الى البرتغال في مسرحها لحي ولا تشاهد قرب المهاد الا نادرا. قوتها الاسماك الصغيرة والسرطان والفشريات والرخويات و اجسامها اهليجية الشكل ، تطول من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم. رؤوسها شبه مخروطية. اعطائها ذلقة ، منفردة الاضداد. اسنانها صغيرة ، متفارقة الاشكال ، متألثة في الفكوك العليا والسفلى. ثوبها الى الزرقا البحرية اليرداء المالح تقي مع اقترابها من الطور وتبيض وتغير عند البلن ، ويطولها في جوانبها تجلجج اسمر منكرس المخطوط المتساوية في طولها بين متوسطة المنسف وكاعة. مسوكها فاعرة. مرغوب فيها في اشهر انزلها السمندوة المشقة والسمنودة المساء.

١٤٢١٥ - سَمَنْدُودَةٌ مُشَقَّةٌ * ، عَمُورَةٌ

Echinorhinus spinosus (S). *Echinorhine*, *Requin bouclé*, *Bouclé* (F). *Prickly-shark* (E).

نوع من السمندوة. سمكة بحرية سرود. اعطائها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تعتبر من اسماك البواج. اخلاقتها حنية ، تخشى الانسان وتبتعد عنه في جسمها اهليجي الشكل يطول من ١٥٠ الى ٢٢٠ سم. مسكها غشن ميمر المثلث المشقة متخمس مجعبة ذرية الاطراف. ثوبها الى الزرقا البحرية اليرداء المالح يبق وتشتد زرقته مع الاقتراب من لبع الطور ويغير ويبيض عند البلن. ويطولها في جانبها تجلجج اسود منكرس المخطوط. رأسها سمندل الجرم ، ذلق الملق. لها سفلى الاليتكار. شفتها سمندل الرحابة. اسنانها متراصة ،

١٤٢١٧ - سَمَنْدَلُ الْمَاءِ * ، سَمَنْدُودَةٌ ، سَمَنْدُور

Molge (S). *Triton* (F). *Triton*, *Newt* (E).

جنس هويات زملقة قازية من السمندليات. انواعه نحو ٢٥. جميعها صغيرة القند مستطيلة الشكل مبطة. حشار ظهورها ثنجي الاليتكار منس الحافة. حشار اذنانها عديم الكتين. ثوبها زركشة ومنسجة ومديجة في قوتها البديان والموال واللاصط. تألف الشائق تعيش فيها حتى فصل الشتاء. يلبها الشري يادم نحو ٤ اشهر تبقى فيها تحت الحجارة وفي التراب.

١٤٢٠٨ - سَمَنْدَلُ الْمَاءِ الْمَبْدُول

Triton vulgaire (F).
اطلب نيوت ملبول.

١٤٢٠٩ - سَمَنْدَلُ مَبْدُولٌ * ، سَمَنْدُور

Salamandra salamandra (S). *Salamander* (E). *Salamandra terrestra* (F).

حيوان قازب سرود من فصيلة السمندليات. جسمه متوسط القند رباعي القوائم يطول نحو ٢١ سم. عند الذكر ونحو ٢٤ سم. عند الانثى. رأسه مبطة ، سمندلير الخط ، واسع الشق ، كامل التتين في الفكين. حينها صغيرتان جاحظتان. عنقه بالمنة القصر. قوائمه قصيرة وفليظة. التامعان الالاسمان وياصبا الاصابع اما الخلفيتان فخاصيتها. جلده مشعل القشار. ثوبه الى السواد اللامع يطول يتفجج اصفر يمتد من الرأس الى طرف اللنب في يعيش نحو ٢٤ سنة. يالغ شفاف مجاري الماء. يسرح في الليل ويبيت في النهار بين الصخور وتحت الحجارة. قوته الحشرات والبديان والرخويات في الانثى تضع على حافة الماء من ١٥ الى ٢٠ سيلا طول الواحد منها يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم. تخفق كالملة الاعضاء ، كبيرة الخياشيم الخارجية. ويعد مرور ساعة من الوضع قلع الانثى بمصارها في الماء تبقى نحو سبعة اشهر الى ان تنفلس خياشيمها فيعتبر من القواذب النافعة.

١٤٢١٠ - سَمَنْدَلُ كِيَات

Salamandridae (S). *Salamandridae* (F). *Salamandridae* (E).
فصيلة من السمنوديات اجناسها وانواعها عديدة جميعها اربع عمارات اشهرها السمندل والسمنود.

١٤٢١١ - سَمَنْدُور مَبْدُول

Triton vulgaire (F).
هو النيوت المبلول ، اطبله.

١٤٢١٢ - سَمَنْدُودَةٌ *

Semanotus (S). *Sémánote* (F). *Semanotus* (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنييات ورتبة غديات الاليمية. انواعه المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات المناطق الباردة. جميعها صغيرة القند مبشرة الملب الدقيق المستطيل. اجسامها تطول من ٨ الى ١٨ سم. رؤوسها وكراشلا سود او حر. اعادها سمندة الالوان منها الاصفر والاشاب والخنفي والوردي والاسمر والاخير. جميعها تنتهي بالاسود وتفرسها عند اتصافها جده عابقة اللون يلب فيها الاسود تسرح في النهار. تظهر في اواسط نيسان وتبقى حتى ايلول. مرتفعة الازهار الحرجية والبرية في يرقاتها خاشية تعيش على جلوج وانصان العرور والابل والقزاب الخ...



سمندل الماء



سمندل هيلول



عنوت الحر



سمندوة مشقة

١٤٢١٩ - سِمُونُوس مُعَقِّبُ الرَّاسِ *

Scymnus frontalis (S). *Scymne à tête br.*
Scymnus frontalis (E).

حشرة خاتلة آفة نافعة من فصيلة السمونيات ورتبة غديات الاجنحة. تألف جميع الاماكن التي يكثر فيها الارق لانها مع يرقاتها تعيش عليه || جسمها صغير القند يطول نحو ٣ م. ثوبها الالوان التمشي ملوحي في كل غده بقية حراره. رأسها صغير الحجم. عيناها بارزتان. زباناها صقايان حقيقان. فكهاا شيطانان. ظهورها مستدير الطرف الاصح. غدهاها شديدا الصلابة و كثيهاا خلل. ارساغها مستطيلة و رباعية الشكل || اجباهاا الحولية لثالة. تخرج الحشرة الجملانة من بيهاا الشتوي في اوائل الربيع. تسرح في النهار. تسافه بعد غروبها ياسمين. تمتح المكن لطفا شقية المدد على نصال الازراق || البرقة حدة بلوفا الازراق التام تطول نحو ٤ م. جسمها مستطيل الشكل، سحلي القرن ابرح الجرم، ابيض الحبل القلبي التجميع || طور الاكمال قلبي تسرح نحو ثمانية ايام يتغني على النبات المائل حيث تشل البرقة من نصل الورقة الى ان تم مراحل التطوير وينقل القشار.



سمونة ملساء



سمونوس سوردي



سمونوس معقب الرأس

١٤٢٢٠ - صِمَّهَاد *

Diplocladium
جلس تطور مجهرية من الفتيحات فضيلة للوطيات. جره الكتيبة متصبة يطولها فروع شقية لتتهي بكتلة فردية أو شقية التجميع. كتلته مستطيلة شفاة ثنائية الخلية || انواعه عديدة مظها لا مؤ وبعضها يتغزل على المواد الضوية والثباتية للخلعة.

١٤٢٢١ - سَمُور *

سمور الزرع: لم يخلط بلبات. السمورة في الزرع هي عدم الاشتهاء. والانواع او الفرويق السمورة في القليلة الاشتهاء.



سوزال

١٤٢٢٢ - سَمُورَال *

Diastata adusta (S).
Drosophila des fleurs (F).
حشرة صغيرة من المصبيات (ذباب الخلل) يكثر وجودها في الناقع وصل الازهار والثمار الناضجة.

١٤٢٢٣ - سَمُور *

Muscula (S).
Marce, Marcra (F). *Martzen* (E).
جلس حيوانات لاحة مقفرة من السموريات. انواعه عديدة موطنها العالم. تألف الاسراج واللبات. تتسلق الاجشجار وتسرح في الليل والثمار || اجسامها مستطيلة. رؤوسها اسطوانية الشكل. اعطهاها ذلقة مقعوية. اذانها عريضة كاسية. اذانها مستطيلة جللة. جرابها قصيرة. غالبا ذرية حادة || انثاها تضع من ٣ الى ٤ جراء. تبيض بعد وضعها ياسمين وتتسلق الاجشجار بعمر ٧ اسابيع.

١٤٢٢٤ - سَمُور صَبِيرِيه هو الزبلين و لظله .

١٤٢٢٥ - سَمُور شَائِع عَمَر ، سَمُورَاك

Muscula marces (S). *Marce commune, Marcra commune* (F). *Common musca* (E).

نوع من السمور. طولها نحو ٤٨ سم. ارتفاعها ٢٥ وذنبها ٣٠ سم. ثوبهاا الجوزة الختلة. صفه زودرو وصدره يبيض . موطنه احرار الشرق الاقصى والاربع. يسرح في الليل والثمار وهو من الحيوانات الجروية البطانة الجملة التي لا تفت من اي حيوان كان تستطيع اليه سبيلا .



مُور

رباعية الصقوف في الفكين . عيناها لوزيتان . زعانفها الظهرية اثنتان . زعانفها الذيلية كبيرة القند تكمل الشرجية || تصاد لسكها الفاعر وزيتها . لحمها كاعن الصف .

١٤٢١٦ - سِمُونَةُ مَلَسَاءَ * و لِيَحَہ

Scymnorhinus lichia, *Scymnus lichia* (S).

Scymnorhine, Licha (F). *Scymnus lichia* (E).

نوع من السمونة . سمكة بحرية مقفرة . اصطناعا البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من اصنام المصايد . اعطهاها رضية لا تشاكس ولا تقرب من الانسان || جسمها وشي الشكل يطول نحو ٣٠٠ سم. سمكها عادم القند والمناخس . ثوبها الى الزبدية السمراء البنفسجية الملوحة بملوفا تمشيح اسود من الحبل الجاني الى شبح الطهر وتشميح اخبر يافيش من الحبل الجاني الى قم العين . رأسها مستطيل الجرم ، مستطيل الجبهة ، ذلق الحظم . لها سنن الازنكار . شدقها مستطيل لحرابة . اصطناعا حوضعة الحليم و مثلة الزوايا ، رباعية الصقوف في الفكين . عيناها لوزيتان . زعانفها اثنتان . زعانفها الذيلية كبيرة مجذانية الفلقة العليا و مزوانية السفلى || تصاد لسكها الفاعر وزيتها الجيد . لحمها كاعن الصف .

١٤٢١٧ - سِمُونُودِيَات *

Scymnidae (S). *Scymnorhineidae, Scymnidae* (F).

Scymnorhineidae, Scymnidae (E).

فصيلة اسماك بحرية سرودة من السمونيات ورتبة الاضداد . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اصطناعا معطر بحار العالم || اجسامها اعطليبية الشكل تطول من متر الى ستة اذكار . انواها الى الزرق البصرية الطلوع الملوحة يطولها تجليح مفرقش اسمر في الجانبين . سمكها بعض انواعها شقيقة بدران شاككة . رؤوسها غروقية . اصطناعا ذلقة . اشدافها مستطيلة الانفراج . اصطناعا لاقياسية الانتظام بين الفكين || انثاها معتدلة الشار تضع في كل مرة ، في فصل الصيف ، من ٣٠ الى ٤٥ ججرا || اشهر اجناسها السمونة والحريفة .

١٤٢١٨ - سَمُونُوس صُورِي *

Scymnus syriacus (S). *Scymne syrian* (F).

Scymnus syriacus (E).

حشرة خاتلة نافعة من فصيلة السمونيات ورتبة غديات الاجنحة . تألف الحقائق والمباقل وبياتين الحشويات . خنافسها ويرقاتها تعيش على القرمزيات والمفريات || جسمها صغير القند يطول نحو ٣ م. ثوبها الى السمرة الكستنية تلوحها تشميحات حطوية تمود الى الحبل الاصهب القلبي التجميع في الكورول والتمدين . رأسها صغير الجرم . عيناها بارزتان . زباناها صقايان صغيران . ظهورها مستدير المؤثر الاصح . غدهاها شديدا الصلابة . ارساغها رباعية الشكل || اجباهاا الحولية لثالة . تخرج الحشرة الجملانة من بيهاا الشتوي في اواسط نيسان . تسرح في النهار . تسافه بعد غروبها من مكنتها ياسمين . تمتح المكن لطفا طرقتات والمفريات ... البرقة حدة بلوفا الازراق اتمام تطول نحو ٤ م. جسمها اعطليبي الشكل . ثوبها الى السمرة الكستنية المابتة يطولها نحو ابرح . طور الاكمال الذي يستمر نحو سبعة ايام يتغني على النبات المائل حيث تشل البرقة وتتدل من نصل الورقة .

كالاجاص والموخ والجوز والكتنا. ويركب جلوع بعض الاجبار الحرجية كالسديان والقيقب والسبط والمصفاص والحور والدلب || مشبه يدخل من الجروح القديمة الباسية فيعثرى الابهية ثم القلقة الخشبية الاولى التي يعلقلها بمادة لزجة كالصم تتصلص شيئاً فشيئاً بعد ان تشقق الخشب بالطلوع والبرش على شكل مرمبات تحيطها من جوانبها الستة اغشية المشيج البيضاء اللون || اما القطر بعد ذاته فهو كالمصقع المتراكبة المنبسطة الحوائط المتصعبة المشربة . يظهر من ايار الى تشرين وهو سريع التمو قطر لكتمه يبلغ نحو ١٠ سم . غيبته عديدة الاكوان يعلب فيها الاصفر الكبري ويوجد فيها الخسلي المابت والزاهي والبرتقالي والوردي والاصهب والاشقر والبيي والابيض الاخير || وهو من القطور المأكولة لكنه يشكو من مذاقه المز الطعم . كانوا ولا يزالوا يستخرجون منه مادة صلبة صفراء اللون .

١٤٢٣٣ - سمية حوشكية

Polyporus squamosus, Melanopus squamosus (S). Polypore squameux (F). White rot (E). Schuppiger porling (D).

قطر من السميات كثير الانتشار يركب جلوع وارومات ويطور بعض الثباتات الحرجية اخصها الحور والصفصاف والمثث والسديان والزان وقد يصيب التوت والدلب والجوز . قوته كلوية الشكل طويلا نحو ١٠ سم . لونها بني او سحلي . يطوح سفة من الحراشف النقيقة المعلقة الملوخ . لياه ابيض اللون طري في اول مهده ثم جلدي عند الادراك . رائحته كرائحة السل وهو من القطور المأكولة المستعملة الطعم || اضراره قليلة لانه قلما يعلب الخشب والقالب || يكافح بالظهور بعد انتزاع القطر وتنظيف الجرح من الشكر اليابس والخشب الموصوم .

١٤٢٣٤ - سميج *Epigène (F). Epigène (E).*
تمت تعريفي يطلق على كل ما اتصف بالسمية .

١٤٢٣٥ - سميد *Triton*
هو سمندل الماء ، اطلبه .

١٤٢٣٦ - سميد حيدل *Triton vulgaire (F).*
هو التوت الحيدل ، اطلبه .

١٤٢٣٧ - سميد لوم *هو الكرنس البري ، اطلبه .*

١٤٢٣٨ - سميم *Calluna vulgaris (S).*
Calluna vulgaris, Bruyère commune, Brando (F). Heather, Common ling (E). Gamelina heldek-raut (D). Brendolo, Scopa carnica, Erica scopia (I).
جنية برية معمرة من فضيلة الخشنيات . ساقها رفراء تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ورقها خضيم ، رباعية ، متعاقبة . ازهارها رباعية التركيب ليلكية اللون || تكثر في المناطق الجبلية الرملية . تستعمل استعمال الشج لقتل وحي صناعة المكائن .

١٤٢٣٩ - سميطر

السميطر والسميطر والسميطر اسماء مختلفة لثمار واحد . يعنى البشون الجبار طويل المتق جدا . يرى ابدأ في الماء القهضاض ، اطلبه .

١٤٢٣٦ - سموريات ، صرغوريات ، عرسيات *Musculidae (S). Mustelidae (F). Mustelidae (E).*
فصيلة حيوانات لاحة مفترسة تشمل السمور والصرور وبابن عرس والقمامة والقاسم والثران والقيزون والرائل الخ :

١٤٢٣٧ - سمولس ، ليين الماء

Samolus valerandi (S). Samole, Mouron d'eau (F). Brook-weed, Water pimpernel (E). Samoskraut, Salsbungen, Wasserpimpernel (D). Samola, Pimpernel aquatica (I).
نبات عشبي بري متقفي من فصيلة الربيقيات . ساقه متصبية . اولاده معققة بيضية متعاقبة . ازهاره صفودي التجميع . ازهاره صفيرة اللد يضاء اللون خضمية البتلات . يقال ان عصاره سرقه تلجم الجرح بصره .

١٤٢٣٨ - سموم *Vent chaud (F). Hot wind (E).*
الريح الحارة . قال ابو حنيفة السموم بالهار والحور باليل .

١٤٢٣٩ - سميات *Polyporaceae (S). Polyporacées, Polyporiacées (F). Polyporaceae, Polyporiacées (E).*

فصيلة تطور من رتبة الدعاميات نكاهما كبيرة الخشب جلدية التركيب او لينة تحمل على صفحتها السفل بعض السام والتجاويف . يورفاتها شفعية التجميع رباعية شفاقة او ملونة || اجناسها وانواعها عديدة منها حورية ومنها معمرة تتصلق وتمش على الاجزاء البقية من غشفت الاجبار الحرجية والسمامية والرزينية والشمرة || مشبهة يشري الماء والفكر والقلب فيسبب اعتلال حواجز الابوية والخلايا ثم ينغص بيهه الكيف على الاجزاء الخشبية فيطسها ويوصمها بمفنه التي او المكسي او المتروفي او الهلالي || ومنها اجناس تطفل على الاجشاب المقطوعة والمصنوعة فتؤذيها وتطسها || اشهر اجناسها من الرتبة الاقتصادية الزرادية : الحافرية ، الرار ، السحوج ، السنجية ، السمية ، الطبق ، القليلس ، القوس ، الثريت .

١٤٢٤٠ - سمية *Polyporus (S). Polypore (F).*
جاس تطور من السميات . انواعها عديدة منها المأكولة ومنها اللذيذة والسامة . ربعضها يتطفل على النبات فيوق به بعض الاضرار .

١٤٢٤١ - سمية البن *Polyporus coffeae (S). Phtiriose du caféier (F).*

قطر رمي من السميات يركب البن على اعضاءه الترية . يعيش من الستين الى الثلاث سنوات وقد يعلب الجوز والجلبج || ويبها كمية القطر تشا عنه ارموية الساق اذ يكائده المستطيلة ، القصبية الشكل ، الزقية التركيب ، تمت الى الجلود وتغلطها بشبكة من المشج تمش على ما تفرزه الجلود من مواد سكرية يسبها ونخر الكوشيل . يكافح بالقضاء على الكوشيل التي تمش سطم حياتها خارج التربة على اعضاء النبات الهوائية .

١٤٢٤٢ - سمية السندريان

Polyporus sulfureus (S). Polypore sulfureux, Pourriture rouge du chêne (F). Brown checked wood rot (E). Schwefelgelber porling (D).

قطر رمي من السميات يتطفل على سوق الاجبار المشربة



سمولس



سمية البن



سمية السديان



سميم

١٤٢٥٠ - سَنَاق بَرِّي ، قَلْبَل ، قَلْبَل

Cassia tora (S). *Casse fédué*, *C. sauvage* (F).
نوع من السنا البري الطبي. كرويه الرائحة، كثير الأوراق
البلية. موطن برادي سينا والعراق وشمال الجزيرة والصحراء.
شجيرة تملأ من الماء إلى الغابة أثمار.



سنيق

١٤٢٥١ - سَنَاق عَدِيْ

Cassia corymbosa (S). *Casse corymbiforme* (F).
نوع من السنا البري. شجيرة جاذبة تملأ من ٢٠٠
إلى ٣٠٠ سم. أوراقها ثلاثية أو خمسية الأزواج.
وربقتها سنانية النصل. حناقيها الزهرية عتيقة الشكل،
محدودة وتاجية الارتكاز. أزهارها متوسطة القد، حمراء
الصغار. ثمارها قرون ليفية خشبية. صهاربا سلوة
العلم لزجة. أزهارها يذوق أربعة أسابيع بتدريج في البوترة
الأولى من تموز.

١٤٢٥٢ - سَنَاق مَرِيْلَانْدَة

Cassia marylandica (S). *Casse du Maryland* (F).
وينحى السنا الأمريكي. نوع من السنا البري السمرقوي
يصل من ٦٥ إلى ١٠٠ سم. أوراقها ثنائية أو تساعية
الأزواج. وربقتها احليلية النصل، الشاككة الكرون.
حناقيها الزهرية كثيفة التجميع. أزهارها إلى الصغار
الزراعي. أزهارها يثمر من آب إلى تموز.



سنا مزمار

١٤٢٥٣ - سَنَاق مِرْهَر *

Cassia floribunda (S). *Casse floribonde* (F).
نوع من السنا البري. وهو جنبة جاذبة تملأ نحو
٢٠٠ سم. أوراقها ثلاثية أو خمسية الأزواج. وربقتها
سنانية النصل اللين القرب. حناقيها الزهرية حثكولية
الشكل. تاجية الارتكاز. أزهارها كثيفة التجميع.
أزهارها يثمر من حزيران إلى تموز.

١٤٢٥٤ - سَنَاق صَكِي * ، سَنَاق حَبَاكِي

Cassia acutifolia (S). *Casse à feuilles aiguës*, *Séné moka*, *Casse séné* (F).
نوع من السنا البري الطبي يكثر وجوده في تمام البحر
الاحمر. شجيرة صغيرة القد تملأ نحو ٣ أمتار. أوراقها
خماسية أو سباعية الأزواج. وربقتها شبيهة النصل
الاخضر الاخضر اللين. نفع أوراقها وثماره سهل
العمدة.



سنا صكي

١٤٢٥٥ - سَنَاق

Sua (F). *Soot* (E).
هي المادة السوداء التي تجمعت وتلبه على جدران اللسان
وقد تتصلب كماء لزقي لأنها لا تخلو منه.

١٤٢٥٦ - سَنَاحَة مَبْدُولَة *

Diaea diaea (S). *Common diaea* (E).
دورية من النواكب الساعية اقناسة ثنائية الرأيا
سلابية المشانق، من فصيلة القوطيات. جسمها صغير
القد يصل نحو ٨ مم. عند الذكر ونحو ١٢ مم. عند الانثى.
صدراها قصفي الشكل، صغير الجسم، اسمر اللون.
عيناها زرقاوتان. شفاهها صغرتان. فكها قديقتان. جرائرها
متباعدة الطول، كثيفة الملب. يلبها يقضي الشكل
حتلي اللون تتوسطه بقعة بؤرية. تألف الاغاريات
لللسان وتقترب من المساكن الملوثة. قوتها الاغاريات
الصغيرة. تسرح في التبار. بيئاتها القوي يثمر نحو
خمس أشهر. حثكيتها صلبة بلوطية الشكل تحبها تحت
الحجارة. تعيش الانثى إلى حين تجمعت المكان وتخصه.



سَنَاحَة مَبْدُولَة

١٤٢٥٠ - سَنَاقِي

Tanon
خشبة في التبر تحيط بفتح الثور كالمروق وما يسميان.

١٤٢٥١ - سَنَاقِي الدَكَب

Crassicauda (F). *Crassicaudate* (E).
نمت تعريفها يطلق على كل حيوان متماثل الذنب.

١٤٢٥٢ - سَنَاقِي السَّاق

Crassicaule (F). *Thick-stemmed* (E).
نمت تعريفها يطلق على كل نبات ساقه صلبة.

١٤٢٥٣ - سَنَاقِي الزَّوْكَة

Crassifolia (F). *Crassifoliata* (E).
نمت تعريفها يطلق على كل نبات يحمل أوراقا متماثلة.

١٤٢٥٤ - سَنَاقِي *

Cephalotaxa (F).
جنس اشجار حرجية سمرقوية بطيئة النمو من الطسقيات.
انواعها المروفة قليلة العدد. جميعها شرقية النبت مهيما
اليابان والصين والهند وإيران. اشجارها تملأ من ١٥
إلى ٣٠ م. أغصانها متعاقبة. أوراقها ابيدة. نصلها شبيه
الصفحة يطل من ٥ إلى ١٠ سم. ويخرج من ٤ إلى ٦
م. صفحتها السفلى مقبوسة إلى حمة غطوط ثلاثة
نبا خضر واثنان اشقران. أزهارها وسيدة للسكن. عطرية
التجميع. اشتباه صلبة جيدة الصنف، شائعة
الاستعمال الصناعي واللزقي.

١٤٢٥٥ - سَنَاقِي

Tarin commun (F).
هو لكثير المجلول، اطله.

١٤٢٥٦ - سِن

هي في الحيوان مقدار العمر منذ الولادة. وفي الشجرة
من بعد نموها. وتعرف من الدواب بلحم استنبا.
اما من الشجرة فليحس مراكز النمو السنوية في قطاع
ساقها.

١٤٢٥٧ - سِن *

Dent (F). *Tooth* (E).
من ج اسنان. تعبر الانسان من اعضاء الجهاز الهضمي
لأنها تقدم وظيفة مضغ الطعام واعداده. في مركزيها
اسنان الفك العلوي والسفلي. تتكون من ثلاثة اجزاء
التاج واللق والجذور. ومن طبقتين: الخارجية للاسنة
والجسمية الباطنية للمحورة. وتنقسم الانسان إلى عدة
اقسام مرجحها العمل المنوط بكل منها. في الخيل مثلا،
تقسم إلى: ثلثة ورباعية وقارح وناهب وفريس.

١٤٢٥٨ - سِن "المَجْوُز" هي حرن اللحم، اطله.

١٤٢٥٩ - سَنَاق ، سَنَاقِي

Cassia (S). *Casse*, *Séné* (F). *Senné* (F). *Cassia*, *Senna* (E). *Kassia*, *Sene* (D). *Cassia*, *Senna* (I).
جنس نباتات معمرة من فصيلة القرنبيات. انواعها زهاء
٤٠٠ منظرها بري وبعضها زراعي تربي. فيها
الاشجار والشجيرات والجنبا. أوراقها مركبة، وبيدة،
شفوية. أزهارها متفويدي التجميع. أزهارها صغيرة أو
متوسطة القد، قصيرة الأنبوب، متراكبة الفصول والبتلات.
ثمارها قرون غزيرية اسطوانية مسطوية. حناقيها البلية
سوية. أشهر انواعها الطبية والثريلية ما يلي.

ويمش الذكور الى حين يكوم الاثنى التي تنقضي عليه ||
تعتبر من الدواب المقيمة .

١٤٢٦٦ - سَنَبَدَاَج ، سَنَبَدَاَج (F). Emerl

سموق شديد الصلابة ينجم عن تحطيم القرند يستعمل في
صقل وحت ونهك المادان والاخشاب .

١٤٢٦٧ - سَنَبَل (F). Pince (F). Toe (E).

من اجزاء الحافر عند الخيل .

١٤٢٦٨ - سَنَبَل (F). Epi

هو النادون ، اطلبه ، مه الازرق والحداني والاطليبي .

١٤٢٦٩ - سَنَبَل هَنَدِي (F). Epi

هو اذخر مكبي ، اطلبه .

١٤٢٧٠ - سَنَبَكَة ، سَنَبَكَة (F). Epi

هي فورة يقض الثباتات اخصها النجيلية ، والسليخة

مجموعة من السيليات المتتابعة المرتكزة على محور واحد .

١٤٢٧١ - سَنَبَكَة (F). Epiage (F). Earing of grain (E).

اجمع اسبال .

١٤٢٧٢ - سَنَبَكَة (F). Epiage (F). Earing of grain (E).

شعبة من النجيل تعرف بالنجيل الازرق . اطلبه .

١٤٢٧٣ - سَنَبَكَة (F). Epi (F). Spica (E).

نجم ثير من برج المدراء يعرف بالسباك الاخرى ، اطلبه .

١٤٢٧٤ - سَنَبُولَة (F). Cymbula (S).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الاربل

وفصيلة السيلوليات . انواعها المعروفة ثلاثة اعطائها البحر

الايض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي اخصها

الجنوبية || اصداها غسيرة المادة ، اهلبيجة الشوزن ،

شالكة الاطراف ، شفاقة . اجسامها شفاقة ، صغيرة

الزروس ، ثنائية القواطع واليمين ، وحيدة الاعظام .

زمانها مسطحة رقيقة ، بيضيه الشوزن || تسبع وتقوم

على ظهورها ، يطرأ مرسية نحو سطح الماء .

١٤٢٧٥ - سَنَبُولِيَّات (F). Cymbulidae (S).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الاربل .

اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في جميع بحار

البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها صغيرة ، اهلبيجة

لشكل ، معتدلة التنطيط ، فخرافية المادة ، متجانسة

المصاريع ، مسطحة الزعانف اي الاردية المسطحة

البيضية الشوزن || اعرف اجناسها واشهرها السيلولة .

١٤٢٧٦ - سَنَّة حِسَاكِيَّة (F). Exercice (F). Financial year (E).

هي في الاصطلاحات الحسابة حساب السنة من السنة

التي تنقضي بين حسابين ختامين || وهي في الاصطلاحات

المالية حساب السنة التي تنقضي بين ميزائيتين .

١٤٢٧٧ - سَنَّة هَوِيَكِيَّة (F). Année-lumière (F).

السنة الضوئية هي المسافة التي يجتازها الضوء مدة ٣٦٥

يوما بمعدل ٣٠٠٠٠٠ كيلومتر بالثانية . وقد تبلغ نحو

عشرة آلاف مليار كيلومتر .

Hypocrescaea (S).

Hypocracées (F). Hypocrescaea (E).

عمارة فلور بحيرية من فصيلة المشويات ورتبة الزرقيت .

تتميز باصنافها البديعة الزاوية الاوران || اجناسها

عديدة تختلف باختلاف وثل البورغ وبشكل الوبيصة وما

تصله من اصناف || امرفها من الوجهة الزراعية

الاقتصادية الاجناس التالية : الرءاء ، الماكوب ،

المروعة ، البوم ، القصبة ، القنار ، الحيمة ،

الهدكة ، التوبلة والوتيشة .

١٤٢٥٨ - سَنَدَا * ، تَابِير ، تَابِيرُوس ، ماد

١٤٢٥٩ - سَنَدَا يَدَات (F). Tapir (S). Tapir

جنس حيوانات برية من فصيلة السناديات . انواعها خمسة

منها واحد اسوي واربعة امريكية . جميعها كبيرة

الجلقة القصبة ، جلقة الرأس والخط الذي يشبه الحفرم

القصير . ثوبها ابيض اللون ، اذنها صغيرة مستقيمة ، ذيلها

بالتم القصير || اخلاها حنية تعيش في المناطق والاحراج

الكثيفة قوتها الاخشاب ويولدو النبات .

١٤٢٥٩ - سَنَدَا يَدَات (F). Tapiridae (S).

فصيلة حيوانات برية وحيدة الجنس تتميز بفخامة الجفة

وطول الخط وصغر الاذن وقصر الذيل . قوتها ثلاثة

الاصابع الحافرية .

١٤٢٦٠ - سَنَدَلَة (F). Gompholobus (S).

جنس نباتات برية جنية وعشبية معمرة من البذرليات

وفصيلة القرقيات القفرافية . انواعها المعروفة نحو ١٢

منها بعض مناطق استراليا || اوراقها صغيرة النصال

متقابلة . ازهارها غنودى التجميع . ازهارها محورية

الازنكاز او تاجية ، عطرة العرف ، منها الابيض

والاصفر والوردي والايرواني || اوراقها وانواعها جميلة

لذوي الماشية وقد تسبب لها التسم والوت .

١٤٢٦١ - سَنَدَم (F). Bosse (F). Boss, Hump (E).

حدية في ظهر البير وهي كتلة حدية تملو السلسلة

القفرية يستند منها الجمل ما ينتج عن الطعام اذا خلا

جوفه من الغذاء .

١٤٢٦٢ - سَنَدَم (F). Basifuge (F). Basifugal (E).

نست تعريفه يطلق على كل نبات هامى النوة فقط .

١٤٢٦٣ - سَنَدَمَة (F). Production alternative (F).

صفة الانجاز المتناوبة الحبل كالتريث .

١٤٢٦٤ - سَنَدَان الرَقَش (F). Lance d'arrosage (S).

جهاز يوضع في طرف القنصل او البربع لفضط الماء

وتريه وشه .

١٤٢٦٥ - سَنَدَانِي (F). Lancéolé, Lanciforme (F).

ما كان شكله كالسنان .

١٤٢٦٥ - سَنَدَانِي (F). Lanceolate (E).

ما كان شكله كالسنان .



سناد

١٤٢٨٨ - سنجاب النخل *

Sciurus palmarum (S). *Ecureuil palmiste* (F). *Palm squirrel* (E).

نوع من السنجاب صغير القذ طولُه نحو ١٥ سم. وذنبه ١٢، ثوبه إلى الصبغة البهلاء تملو ثلاثة خطوط يمش تقطبه من النقرة إلى الذنب || موطنه الهند. يألف الأشجار المثمرة انحصا النخل ويقتر من الأماكن الآكلة.



سنجل

١٤٢٩٠ - سنجاب الهند *

Sciurus indicus (S). *Ecureuil de l'Inde* (F). *Indian squirrel* (E).

نوع من السنجاب الكبير القذ طولُه نحو ٤٥ سم. وذنبه ٤٠، ثوبه متعدد الألوان رأسه واذنائه وصنقه وأطرافه إلى الجلالة القزمية للمواج. ظهره وذنبه وبرازهم سود. يطة إلى الصفرة البنية || يألف الإحراج الكثيفة يسرح في البهار. قرته البهار والمواد النباتية.



سنجاب النخل

١٤٢٩١ - سنجاب شائع *

Sciurus communis (S). *Ecureuil commun* (F). *Common squirrel* (E).

نوع من السنجاب موطنه فصح الإقليم يمتد من أقاصي الشرق إلى أطراف أروبة. جسمه مستطيل الشكل يبلغ نحو ٢٥ سم. وذنبه ٢٢ سم. ثوبه إلى الصبغة البنية، صدره ويطة إلى البياض. فرائه مستعنة شائعة الاستعمال.

١٤٢٩٢ - سنجابيات

Sciuridae (S). *Sciuridae* (F). *Sciuridae* (E).

فصيلة حيوانات لبونة قاضية تشغل عدة أجناس والنبات من الإقليم. أعرف أجناسها السنجاب والجلمم والناميه والموقل والمربوط والبطلوس والبستونيس والبلمريس. جميعها مستطيلة الأجسام والأذنان ملطوقة الجرامم العليا. موطنها العالم. تألف الثبات والإسراج. تتسلق الأشجار. قوتها البهار وتختلف المواد النباتية.



سنجاب شائع

١٤٢٩٣ - سنجابيات الشؤوب *

Sciurormorphes (F).

مرتبة حيوانات لبونة من رتبة القوام تشغل ثلاث فصائل السنجابيات والحاروديات والهيريات.

١٤٢٩٤ - سنجة *

Centrospora (S). جنس فطور مجهرية من الردياتيات وفصيلة الطعيات. يتميز بكتانه المستطيلة الملبه المحببة الشكل والزيتونية اللون || ينظقل على الأوراق فيقرها ويمل البهار فيعنها قبل ادراكها || أنواعه المعروفة اثنان :

Centrospora acerina (S). سنجة الأسفندان *

Centrospora bromi (S). سنجة الثؤوب *



سنجة

١٤٢٩٥ - سنجة *

Bigarrure (F). *Medley* (E).

اجتماع الأشكال والألوان دين رابط أو تراس.



سنجوس

١٤٢٧٨ - ستروزوم

هو الجسم المركزي المجيري في الحيوان والخلوي في النبات.

١٤٢٧٩ - ستنروزوم

هي العملية، أطلمها.

١٤٢٨٠ - ستنونين

Santonine (F). *Santonin, Santoninum* (E).

جرهر فالك يستخرج من مختلف أنواع الفنج اصصها الشيمان. وهو من المواد الطبية الشائعة الاستعمال.

١٤٢٨١ - ستيفراد

مقسوم إلى مئة درجة.

١٤٢٨٢ - ستيفرام

Centigramme (F). *Centigram* (E).

الجزء الواحد من أصل مئة جزء قسم عليها الغرام.

١٤٢٨٣ - سنثيل *

Scintilla (S). *Scintille* (F). *Scintilla* (E).

جنس حيوانات مجرية من الرخويات صفحيات إبحاشم وفصيلة الخلويات. أنواعه المعروفة نحو ٥٠ منتشرة من شط العرب إلى خطوط الهند وجزر آفانيا || أصداها بيضيه الشوزة، وقيمة القطن، ثالثة المصارع، مالة السطوح جميلة الألوان الزائفة.

١٤٢٨٤ - سنثيل

الجزء الواحد من أصل مئة جزء قسم عليها اللتر.

١٤٢٨٥ - سنتمتر

Centimetre (F). *Centimetre* (E).

وسدة قياسية مصرية تساوي جزء من أصل مئة جزء الذي يتألف منه المتر. والسنتمتر يقسم إلى عشرة ملليمترات.

١٤٢٨٦ - سنج

السنج والسنج هو الثياب، أطلمها.

١٤٢٨٧ - سنجاب

Sciurus (S). *Sciurus* (F). *Eichhörnchen* (D).

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة السنجابيات. أنواعه نحو ٧٥ جميعها صغيرات القذ، مرهفات الحواس ولها أذنان طوال جحيلات الصفوف. تألف الإحراج والعايات. تتسلق الأشجار بسرعة وخفة. قوتها المواد النباتية. تفضل البهار والزيمات والزوي. يقال أنها تستلذ بيش المصاير || ترتب أجماعها في صغور الأشجار، مداحلها من الشرق وغارها من الغرب. أناسها تقسم من ٣ إلى ٦ أذناس تبصر بعد وضعها بأسبوع || أعرف أنواعه وأشهرها ما يلي.

١٤٢٨٨ - سنجاب الغاب

Sciurus tristriatus (S). *Sciurus* (F). *Ecureuil des jungles* (F).

نوع من السنجاب صغير القذ طولُه نحو ١٢ سم. وذنبه كذلك. ثوبه إلى الصبغة البنية تملو ثلاثة خطوط صفر تقطبه من نقرة الرأس إلى طرف الذنب || موطنه سرنديب. قوته البهار. يقتر من الأماكن الآكلة ويدخل المساكن في طلب السكاكر والخلويات والبياض.

من أي نوع كانت ان مقيمة أو غيرها ، الى مستأجرها ومن الواجب ان يشتمل على كل شروط عقد النقل .

١٤٣٠٨ - سَنَدٌ ثَلَاثِيّ (E). Triptych (F). Triptyque
هو من السندات الخاصة التي يصرح بها باستيراد بعض الاشياء وقتياً ، انحصاراً للسيارات على ان يعاد تصديرها مثلاً .

١٤٣٠٩ - سَنَدٌ قَائِلُ الْإِسْتِزَالَةِ
Obligation amovible (F). Redeemable obligation (E).
هو السند الذي يمكن تسديده قيمته من طريق الاستبدال .

١٤٣١٠ - سَنَدٌ قُسْطُ التَّأْمِينِ (F). Billet de prime
Bonus bill (E).
هو سند أدنى يلتزم به المؤمن ان يدفع الى المؤمن قسط التأمين في يوم يتفقان عليه .

١٤٣١١ - سَنَدٌ لِحَامِلِهِ (F). Billet au porteur
Bill to bearer (E).
سند يلتزم موقفه دفع مبلغ معين من المال في موعده معلوم الى أي شخص كان يحمل هذا السند .

١٤٣١٢ - سَنَدٌ لَدَى الْإِطْلَاعِ
Billet à vue, B. à volonté (F). Bill payable at sight (E).
سند يلتزم موقفه ان يدفع الى شخص سُمي أو لانه مبلغاً من المال بمجرد تقديم السند اليه .

١٤٣١٣ - سَنَدٌ مُرَوَّرٌ (F). Passavant
Pass, Permit (E).
سند بيان بضائع خاصة لرسوم جمركية أو غيرها غير مباشرة تفق منها في مرورها الى وقت معين ومن مصادقة محدودة .

١٤٣١٤ - سَنَدٌ مُتَقَدِّرُ الدَّائِلِ
Effet négociable (F). Negotiable bill (E).
من السندات التجارية للمدفوعة التحويل والتعامل بها . تحوّر في صيغ خاصة وتكون قيمتها وأجده الاداء لدى الاطلاع عليها أو بعد اجل قصير .

١٤٣١٥ - سَنَدٌ مُنْصَرَفٌ (F). Effet bancable
Bankable bill (E).
هو السند الذي يحمل جميع الشروط المطلوبة لحسمه من البنك .

١٤٣١٦ - سِنْدَارِيَّةُ ° ، دُوَيْبِرُ لُؤْمِيَّةُ °
Deuterophoma (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة السليبيات . يتشبه ببيكتيندك الحبيبة التركيب ، المرسومة التي ، الخالية من الزئبقية الطاغرة . بويغاته قائمة عند اطراف المشع الذي يختلف حول البكتينية الباعل || نوعه الوحيد المعروف والمندروس حتى الآن هو البتالي .

١٤٣١٧ - سِنْدَارِيَّةُ الْحَمِيَّاتِ ° ، وَصَمٌ سِكُورُ
Deuterophoma tracheiphila (S). Mal sacco (F).
فطر مجهرى يسبب اليمون الحامض والاراج . مظهره الخارجي جفاف فبالي يحمل بعض الانداز بعد استقرار وذبول اوراقها يتغير جفاف الماء وانجراف لون المادة الخضيشة نحو الجوزة الزائمية ثم السرة القائمة || يكالغ بتقليم وحرق الاجزاء الموصوبة وتطهير الجروح .

ملحجه الخيالي جامي . جماعته متوسطة العدد || جسمه صغير القته بطول نحو ١٨ سم . رأسه كبير الجرم ، منقاره معتدل الحجم ، ضلع . جناحه ذلقان ، ذنبه مستطيل الشكل ، منقارهم الطرف . ثوبه الى الشقعة السوداء تيقن في الراس والرداء وتغير في البطن . زوره حاجي اللون يطرقه حنار اسود يمتد من قاعدة الانتقار الى العين فالمنتقار فأمل الصدر . ايلامه منشفة بالاخير . منقاره ورشاه واصابعه الى السرة القائمة || يدن من حة في الاجبار القرعيا . الاثنى تحفن وسدما من ٤ الى ٥ بيضات . الذكر يؤن غا الفناء .

١٤٣١٨ - سَنَخ هو الخشروب ، اطبله . ج اسنخ .

١٤٣١٩ - سَنَخ (F). Collet, Collar, Neck (E).
السرخ هو الأصل ، وهو الجزء من الجذع تقصره التربة . ج اسنخ وصنوخ .

١٤٣٢٠ - سَنَدٌ
Obligation
كل التزام قانوني يرتكز على عقد رابط .

١٤٣٢١ - سَنَدٌ (F). Bill (E).
كل ورقة مكتوبة تحتوي على التزام يدفع مبلغ معلوم من النقد .

١٤٣٢٢ - سَنَدٌ ، مُسْتَكْتَد (E). Titre (F). Bond
هو المحرر الذي يوضح فيه للعمال القانوني أو للمقد المادي الذي يحدث آثاراً قانونية كسند الدين وسند الملكية . ولقسته صيغ عديدة ، أشهرها :

سند إذني
سند إسمي
سند إطلاق تصرف الدائن
سند إسمائي
سند أولي
سند تنفيذي
سند لحامله
سند وهمي
Titre à ordre (F).
Titre nominatif (F).
Titre paré (F).
Titre reconnaît (F).
Titre primordial (F).
Titre exécutoire (F).
Titre au porteur (F).
Titre putatif (F).

١٤٣٢٣ - سَنَدٌ إِذْنِي
Billet à ordre (F).
Bill payable to order (E).
سند يتعهد من موقفه بان يدفع الى شخص آخر مبلغاً معلوماً بعد اجل قصير لدى اطلاعه على السند .

١٤٣٢٤ - سَنَدٌ اخْتَوَّنَ ، سَنَدٌ خِيَامِين
Warrant
سند أدنى يثبت بموجبه رهن بضائع مودعة في المخازن السوية .

١٤٣٢٥ - سَنَدٌ الرَّهْنِ الزَّرَاعِي (F). Warrant agricole
Agricultural warrant (E).
سند أدنى يدفعه الزارع الى دائنه يثبت به انه رهن له دين ثقليه من الحيازة مستجابت زراعية أو حثاداً صناعياً وعاصيل ومأراً أو عقارات بالقيمة أو بالتخصيص .

١٤٣٢٦ - سَنَدٌ الرَّهْنِ الْعَقَارِي
Cédula hypothécaire (F). Mortgage schedule (E).
سند مثاقور التبادل كالأوراق المالية يدل على قية الدين على العقار في السجل العقاري .

١٤٣٢٧ - سَنَدٌ الشَّحْنِ ، لَدَ كَرَّةُ الشَّحْنِ
Connaissement (F). Bill of lading (E).
ايصال بالبضائع للشحونة يقسمه صاحب الشاحنة ،



سندارية الحميات



سندباد



سندباد



سندباد



سندباد



سندباد



سندباد



سندباد

الاصابع || جسمها صغير لحد يطول من ١٢ الى ١٥ سم. رأسها عراقي الشوكة. عيناها لوزيتان صغيرتان. اذنباها خافتتا النشاء الصواني الاسمر الغلاف. منها مستعدة القصر والشفافة. ذنبها مستطع الطرف، سريع الانقسام. ثوبا الى الصبغة الخنطية تملوا رقة مبراء وتقطيع اثير. ساجه ثوبا كمنبر بالشوكة اي انها تمانن الحفيد الموجودة فيه || الاثني اكبر قدما من الذكر وايتم ثوبا منه. تبغض من ٤ الى ٨ بيضات تطهرها في المواقع الجنوبية المعرض || تألف للبراح وكثيرا الرمل. تدبش في انفاق تخملها بين جلود النبات. نرسح في التبار وتبيت في القبل. قوتها الحشرات الصغيرة والديدان والذباب والحمام || تعتبر من الزخافات النافعة.

١٤٣٢٥ - سندبادي هو السندباد الاخضر، اطلبه.

١٤٣٢٦ - سندبادان بَلوط Quercus (S). Chêne (F). Oak tree (E). Eiche (D). Quercus (I).

جلس اشجار حرجية من فصيلة السنطانيات، انواعها زهاء ٣٠٠ مغطيا اشجار كبيرة دائمة. اغصانها صلبة صناعية. اوراقها جاذبة جلدية. ثامها بلوطية حلقة. قشور بعضها فليزية واوراقها دبابة || اشهر انواعها ما يتبع.

١٤٣٢٧ - سندبادان ابيض Quercus alba (S). Chêne blanc (F).

شجرة جاذبة مهدبا ابركة النالية. تملو من ٢٥ الى ٣٠ م. ساقها بيضاء اللحاء. اوراقها عابطة تطلو من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من ٧ الى ١٠. نصلها ثلاثي او رباعي للتفصيص الجانبي، ازغب الصفحة السفلى، امرط العليا. لونه يتصرف مع العمر من الاخضر الباهت الى البنيجي || تفرقها صير الحرافش. بلوطها طري القشور والياب.

١٤٣٢٨ - سندبادان احمر Quercus rubra, Q. borealis (S). Chêne rouge (F).

شجرة مبروتية تملو من ٢٥ الى ٥٠ م. نائلها وزمباتها جزوية اللون. اوراقها تطلو نحو ٢٢ سم. وتعرض ١٥. نصلها مستعرض للتفصيص، واسع الاضلاع، جامد النسيج اللامع الذي يتصرف من الأخضر الباهت الى الحمرة الجذوية || تفرقها في الشكل سنن الحرافش. بلوطها كبيرة، حلقة و لها الى الحمرة البسراء.

١٤٣٢٩ - سندبادان اخضر بَلوط اخضر Quercus ilex, Q. Balota (S). Chêne vert, Yew, Balota (F). Evergreen oak, Holly oak, Holm oak, Bole oak (E). Stecheiche (D). Eice, Leccio, Lecina, Quercia verde (I).

نوع مبروتي كثير القصور يرغب في الالة للكلية. اشجار تملو من ٢٠ الى ٢٥ م. اربواها فلسة. سواها حلقة اللحاء الصلابة الكمامة. اوراقها حرة، لاقامية الشكل والسنن، نصلها عابح اخضر اللامع، مرفوعة تد من ٦ الى ١٠ ازواج || تقاريفها بجمرة اللون، زغبية الحرافش المتراكمة.

١٤٣٣٠ - سندبادان ازغب Quercus lanuginosa, Q. pubescens (S). Chêne pubescent (F).

شجرة جاذبة ترغب في الاراضي الكلية. تملو من ٦

Utricularia (S). Utricularia, Lenticulaire (F). Bladder-wort, Hooded water milfoil (E). Wassenschlauch, Grosser wasserhalm (D). Utricularia, Erba vicia (I).

لبات عطري بري مالي من فصيلة السنطيات. جلوده حرجية، ساقه طراخية. اوراقه مركبة ريشية خيطية. ازماره فردية او متفويذة التجميع تركنل على الشراخ. لها يختلف مع الانواع ثوبا الاصفر والاحمر والازرق.

١٤٣٢٩ - سندباديات Lantibulariae, Utriculariae (S). Lantibulariades, Utriculariades (F). Lantibulariae, Utriculariae (E).

فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة، قلبية الاجناس والازواج جميعا من النباتات المائية التي تدبش في غمرة الماء او تطفو على سطحه. اشهرها السندباد.

١٤٣٢٠ - سندباد Thibaudia (S). Thibaudia (F).

الباحدة سندباد. جنس شجيرات برية وكثيرة من فصيلة الخنطيات، انواعها المعروفة نحو ٤٠ جميعا من نباتات المناطق الاستوائية من المابين القديم والجديد || سواها قرواء تملو من مترين الى اربعة اشرار. اوراقها متعاقبة، سنالية النصال الجاذبة الامة. ازمارها فسي التجميع، محوري الانتكاز. ازمارها جملة الشكل، حديدية اللون. جميعا الى الحشرة المتفطرة التخفيف والملاجئ.

١٤٣٢١ - سندبادك * ثوبا عقديّة Tetracelis articulata (S). Thuya articulata, Cyprès à sandarac (F). Sandarach tree (E). Sandarachbaum (D). Sandaraca (I).

شجرة حرجية وسيدة الجلس والنوع من السرويات. مهدبا جبال الاطلس. ساقها قرواء، كثيرة العقد القرية. بلوطها للتدو تملو من ٥ الى ١٥ م. نائلها حلقة. اوراقها فسية، رباعية، حرة. اكرازها كروية تطرها يراوح من ٨ الى ١٢ م. جزلهاها اربع غير متساوية القد || يستخرج منها سمغ السندراك المشهور. اغصانها فاذرة المنصف طرية اللون.

١٤٣٢٢ - سندبادوس Callitris (S).

Callitris (F). Arar tree (E). Echter schmuckzapfen (D). Callitris (I). جنس اشجار وشجيرات حرجية من السرويات. انواعها نحو ٢٥ م. ساقها تملو من ٤ الى ٢٠ م. افاضها كيفية التجميع. اوراقها فلية الشكل، حرة. ازمارها وحيدة الشكل والمسكن. اكرانها شبه كروية، سداسية او ثمانية الجراعات الشفرية الشكل و الخفدة. يزوها الحليجية وحيدة الجناح || يستخرج من بعض انواعها سمغ السندروس الذي يشبه سمغ السندراك ويستعمل استماله. لحاء اشجاره خنية بالمطمان. اغصانها وامة، جيدة الصنف شائعة الاستعمال الصناعي.

١٤٣٢٣ - سندبادك هو السندباد. اطلبه. وهو طائر يأكل البش (حكاك الجوهري من الماخذ).

١٤٣٢٤ - سندبادوس Pammodromus (S).

Pammodrome (F). Pammodromus (E). حيوان يبيض من المطاء وفصيلة السقايات قاببات الاسنان، مكنكيات الالسة الحمرية و دبايات القوام، خاصيات

الحرارة. تملو من ١٥ إلى ١٥ م. ساقها لمساء اللحماء. بناتها مرسية. اوراقها عروية، بيضية، مسنة الزام الاخير. نصلها جامد للتسج، بحري الخضار، خلي الصفحة السفلى، يطول من ٧ إلى ١٥ سم. ويترس من ٣ إلى ٦ || تفرقها خلي الحرافش الدقيقة. بلوطها مستطيلة.

١٤٣٣٧ - سيتيكان بلانج، بلسنج

Quercus coccifera (S). *Chêne kermès*, *C. cocciné* (F). *Kermes oak*, *Scarlet oak* (E). *Kermes elche*, *Kermesbaum* (D). *Quercia della cocciniglia*, *Quercia del kermes* (I).

شجرة دقلة مهددا حوض البحر المتوسط تكثر في الاراضي الكلسية. تملو من ١٥٠ إلى ٤٥٠ سم. اوراقها عروية، احليلجية، ذلقة، تطول من ٢ إلى ٦ سم. وتترس من ١٥ إلى ٢٥ سم. نصلها صلب التسج المائل للامع، لونه ابيض الحمار الزاوي، حشاه مفرس الحافة، فسح الاضلاع، شائك الحطب || تفرقها شائك الحرافش المتراكبة. بلوطها لامع القشرة الحظلية يطوى تشويح عايق.

١٤٣٣٨ - سيتيكان عصصكي الثمر

Quercus conferta (S). *Chêne à glands fasciculés* (F).

شجرة سريرية جميلة الشكل تملو من ٣٠ إلى ٥٠ م. اوراقها حابطة مستطيلة، نصلها متواج الصفحة. خلي البشرة السفلى. نصوسه عديدة، متفارية، فوسية الاضلاع || تفرقها قلنوسى الشكل، قليل العمق، متراكب الحرافش النقية الذرية. بلوطها تطول نحو ٣ سم. يطوى لتسج مستطيل عايق. ثمارها ثنائية او ثلاثية التجميع.

١٤٣٣٩ - سيتيكان رومسي، مكلول

Quercus agrifolia (S). *Chêne vérali*, *C. agrifolia* (F). *Valonian oak*, *Valani oak* (E). *Knoper elche*, *Valonian elche* (D). *Quercia da concia*, *Q. della valiones* (I).

شجرة سريرية مهددا الشرق الاذن تملو من ٢٥ إلى ٢٥ م. اوراقها حابطة، بيضية، مسنة الزام الاخير، تطول من ٦ إلى ١٢ سم. وتترس من ٣ إلى ٧. نصلها جامد التسج، منشاري الحافة || تفرقها كبير اللقد مستطيل الحرافش شائع الاستعمال في الابناغ والصباغ.

١٤٣٤٠ - سيتيكان شومر، سيتيكان الفلين

Quercus suber (S).

Chêne liège, *Surrier* (F). *Cork oak*, *Cork tree* (E). *Kork elche*, *Korkbaum* (D). *Quercia sughero* (I).

شجرة جامدة مهددا بعض مناطق حوض البحر المتوسط. يتكرر ويوجد في افريقية الشالية، ترطب في الازربة الزلية. تملو من ١٥ إلى ١٥ م. حلا ساقها ثخينة قوية التركيب يستخرج منها الفلين. اوراقها عروية، داخلة الخضار، تطول من ٣ إلى ٦ سم. وتترس من ١٥ إلى ٤٥ سم. نصلها بيضي الشكل جامد التسج، امرو الصفحة العليا المايقة الخضار، ازغب السفلى الطلاء اللون. حروته من ٥ إلى ٧ ازواج || تفرقها غروفي الشكل اطول الحرافش القصيرة المسترسفة. بلوطها متوسط اللقد، مذهب اللذام.

١٤٣٤١ - سيتيكان صباغي

Quercus tinctoria, *Q. vulutina* (S). *Chêne querceron* (F).

شجرة سريرية تملو من ٢٥ إلى ٣٠ م. بناتها وزيتاتها خفيفة، زباء البشرة، صفراء اللون. اوراقها تطول

الى ٢٠ م. جلدها وندي. ساقها عتدا متعرجة. قشورها مسطحة، ختنة، سوداء اللون. اثنائها وبناتها زياء اللحماء. اوراقها حابطة، خلية الصفحة السفلى، تطول من ٨ إلى ٨ سم. وتترس من ٤ إلى ٦ || تفرقها صير اللقد، مذهب الحرافش الشائكة. بلوطها دقيقة، مستطيلة، مويجة، حادة اللذام الاسود.

١٤٣٤١ - سيتيكان أسود

Quercus ferruginea (S). *Chêne noir* (F).

شجرة ريفية مهددا ايريكية الشالية. تملو من ١٥ إلى ٢٠ م. اوراقها كبيرة اللقد تطول نحو ٢٢ سم. نصلها ثلاثي او خماسي التجميع، جامد التسج، جانبي الحمار، خلي الصفحة السفلى || تفرقها رمي الشكل. بلوطها صغيرة اللقد، ايرية اللذام.

١٤٣٤٢ - سيتيكان آسي، الورق

Quercus myrsinaefolia (S). *Chêne à feuilles de myrte* (F).

شجرة سريرية مهددا اليابان. تملو من ١٥ إلى ١٥ م. ساقها مسطحة اللحماء، اوراقها عروية، احليلجية، آسية، تطول من ٤ إلى ١٥ سم. وتترس من ٢ إلى ٤. نصلها غائر المروء امروء البشرة، بحري اللون.

١٤٣٤٣ - سيتيكان اشعر، سيتيكان تركي، لك

Quercus cerris (S). *Chêne chevalin*, *C. de Bourgogne*, *C. lombard*, *Cerro*, *Doulier* (F). *Iron oak*, *Mossyup oak*, *Turkey oak* (E). *Zerrelche*, *Turkische elche* (D). *Quercia cerro*, *Cerro* (I).

شجرة سريرية مهددا الشرق الاذن واروية تملو من ٢٥ إلى ٣٥ م. اوراقها حابطة تطول من ١٥ إلى ١٤ سم. وتترس من ٤ إلى ٦. نصلها جامد التسج، عايق الخضار البحري، دماهي او دماهي او ثنائي التجميع. حروته الرئيسية تعد من ٦ إلى ١٥ ازواج يتخللها اصحاب متعرجة بيضاء || تفرقها قوي الحرافش الحظلية البشرة.

١٤٣٤٤ - سيتيكان افور، عذر

Quercus afaris (S). *Chêne afaris* (F).

شجرة سريرية حرمية الشكل تملو من ٢٥ إلى ٢٥ م. يقال ان مهددا الجزائر وهي مبلولة في بعض جرد جبل والقصية ونيان. اوراقها حابطة تطول من ٨ إلى ١٥ سم. نصلها جامد التسج، مفرس الصفحة المستديرة التجميع، تفرقها اطول اللون غروفي الحرافش الحظلية البشرة. بلوطها كبيرة اللقد طويلا نحو ٤ سم. وقطرها ٢.

١٤٣٤٥ - سيتيكان العكص، سيتيكان البرغشكال، عكص

Quercus lusitanica (F). *Chêne à galls*, *C. du Portugal*, *C. des teinturiers* (F). *Dyer's oak*, *Gall oak*, *Nut gall oak* (E). *Echte gallische*, *Galläpfel elche* (D). *Quercia della galla* (I).

شجرة سريرية مبلولة، ضيقة اللقوة، متعرجة القروء تملو من ١٥ إلى ٢٥ م. اثنائها وبناتها خلية اللحماء. اوراقها حابطة تطول من ٥ إلى ١٥ سم. نصلها بيضي الشكل مفرس الحافة، ضيق الاضلاع، خلي الصفحة السفلى، انتسر العليا || تفرقها مذهب الحرافش بلوطها مستطيل الشكل، مذهب اللذام.

١٤٣٤٦ - سيتيكان بصري، الورق

Quercus glauca (S). *Chêne glauque* (F).

شجرة سريرية مهددا اليابان ترطب في المناطق المعتدلة



سيتيكان افور



سيتيكان سور

جامد النسيج ، سنن الحافة ، عروقه متوازية الخطوط
عندما يراوح من ٨ الى ١٢ زويًا كل واحد منها ينتهي
بنس || تقرونها اطليجي الحراشف ، بلوطها طول
نحو ٤ سم قطرها ٢ سم .

١٤٣٤٨ - سِتْدِيَان لَاطِيَّ الزَّهَر *

Quercus sessiliflora (S). *Chêne sessile*, C. à trocheas, Rouvra, Durin (F).

نوع سروتي عديد القربوب يملو من ٢٠ الى ٣٠ م .
اوراقه منتنة لا اذنوية . نصلها ساجي او ثنائي التفتيس ،
خلي البشرة حل صفته السفل || تقروها حادم الاذان ،
فخيل الحراشف المتراكبة . بلوطه سوي اللون الخنطي ،
مدبس الشذام .



سيتيان كستي الورق

١٤٣٤٩ - سِتْدِيَان لِبْنَان *

Quercus libani (S). *Chêne du Liban* (F).

شجرة سروتية مهدا جبال لبنان تملو من ١٠ الى ١٢ م .
اثنائها صغيرة اللد لونها الى الصفار الخنطي . اوراقها
عابلة طول من ٥ الى ١٣ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ .
نصلها جامد البشرة ، منشاري الحافة ، حابق الصفة
العليا الشديدة الخضار ، باث السفل الصفراء المراح .
تقرونها يضي الحراشف الجامدة الخلية .



سيتيان لاطي الزهر

١٤٣٥٠ - سِتْدِيَان هَاكِي *

Quercus aquatica (S). *Chêne aquatique* (F).

شجرة جامدة ترطب في للمواقع القريبة وقرب مجاري الماء .
تملو من ١٥ الى ٢٥ م . اوراقها صغيرة اللد ، صغيرة
العتق ، مفردة . نصلها يطول من ٤ الى ٨ سم . وهو
اسوط البشرة حل صفته || تقرونها صاجي الشكل .
بلوطها غليظة ، قصيرة ، حادة الشذام .



سيتيان لبناني

١٤٣٥١ - سِتْدِيَان صَدْبَب الزَّوْك *

Quercus acuta (S). *Chêne à feuilles aiguës* (F).

شجرة سروتية مهدا الشرق ، ترطب في المراض الجنوبية
المتضررة . تملو من ٨ الى ١٠ امتار . اوراقها عروقة ،
يضية ، مديبة اقزام الاخير . نصلها حادم التفتين يطول
من ٧ الى ١٤ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ سم . ينو احمل
اللون كثيف الزغب ثم ينصرف الى الخضار الاصفر .
تقرونها متراكب السافات الحرفية البنية .



سيتيان مرز

١٤٣٥٢ - سِتْدِيَان مَرْكِي *

Quercus mirbeckii (S). *Chêne de Mirbeck*, Zâne (F).

Overcup oak, Mirbeck's oak (E). *Quercus alba* (D). *Quercus aquatica* (F).

شجرة سروتية ترطب في المناطق المعتدلة للتحرة نحو
الحارة . مهدا افريقية الشالية واسبانيا . تملو من ٣٠
الى ٣٥ م . بانقها زاء . اوراقها عابلة ، مستطيلة .
نصلها جامد النسيج مفصص الحافة || تقرونها جامد
الاذان ، ثخين الحراشف القصيرة .

١٤٣٥٣ - سِتْدِيَان مَرْكَل * ، سِتْدِيَان مَرْطَاي ، وَوَر *

Quercus pedunculata, *Q. robur* (S). *Chêne pédonculé*, Rouvra, Gravelin (F). British oak, Female oak, Red oak (E). *Stefeiche*, *Roteiche* (D). *Rovra*, *Quercus pedunculata* (F).

نوع سروتي عديد القربوب . اجماره هرية الشكل تملو
اوراقها منتنة من ٥٠ سم . اوراقها عابلة معتدلة طويلة الزناد .
نصلها ريامي او خلجي التفتيس ، ازغب البشرة ينو
اخضر اللون ثم ينصرف ويختير ان ينتهي بالاحمر .
تقرونها عجب الحراشف الصغيرة .

من ١٥ الى ٢٠ سم . وتعرض من ١٢ الى ١٥ . نصلها
جامد النسيج ، سنن الحافة ، فسخ الاضلاع ، خلي
الصفة السفل || تقرونها قلنسوي الشكل . بلوطها
صغيرة وصغيرة لونها الى السرة الخنطية .

١٤٣٤٧ - سِتْدِيَان صَفَصَايِي الزَّوْك *

Quercus phellos (S). *Chêne saule* (F).

شجرة رقيقة ترطب في المراض الجنوبية وفي الاثرية للمتصلة
الانماج الميعة القنور . تملو من ٢٠ الى ٢٥ م .
اوراقها مستطيلة مديبة اقزام الاخير ، حسيكة الصفة .
نصلها يطول نحو ١٠ سم . ويعرض ٢ سم . وهو اسوط
البشرة حل صفته . ينو اخضر اللون وينتهي ، في
الخريف ، الى الحمرة الصفراء المراح || تقرونها
قلنسوي الشكل ، فخي الحراشف ، لونه الى الجوزة .
بلوطها صغيرة اللد ، سمراء اللون .

١٤٣٤٣ - سِتْدِيَان صَيْبِي *

Quercus chinensis, *Q. variabilis* (S). *Chêne de Chine*, *C. variable* (F).

شجرة جامدة مهدا الصين ترطب في للمواقع الباردة تملو
من ٢٠ الى ٣٥ م . اوراقها عابلة طول من ٨ الى ٢٠ سم .
وتعرض من ٣ الى ٧ . نصلها جامد النسيج . سنن
الحافة ، خلي الصفة السفل التي تنو نفسية اللون .
تقرونها متعرض الحراشف القصيرة الصلبة .

١٤٣٤٤ - سِتْدِيَان طَرْزَا * ، سِتْدِيَان اَلْوَرَكْس *

Quercus toza (S). *Chêne cauzin*, *C. doux*, *C. brossa*, *C. angoumois* (F).

شجرة جامدة ترطب في المراض الجنوبية . تملو من ٣
الى ١٥ م . جلودها مدادة ، فائضة ، فاسلة . اثنائها
زياه اللحاء وديبة اللون . اوراقها عابلة طول من ٦
الى ٢٥ سم . وتعرض من ٢ الى ٧ . نصلها خلي الصفة
السفل || تقرونها سدير اللد متعامد الحراشف القوية .
بلوطها صغيرة ، لونها الى السرة الزرنيضة .

١٤٣٤٥ - سِتْدِيَان هَاكِي الزَّوْك *

Quercus laurifolia (S). *Chêne laurier* (F).

شجرة جامدة مهدا امريكة . تملو من ١٥ الى ٢٥ م .
اوراقها تشبه اوراق النار . نصلها يطول من ٨ الى
٢٠ سم وهو اسوط الصفتين ، بجبل الخضار الباي .
تقرونها قلنسوي الشكل ، صير الحراشف القوية .
بلوطها صغيرة اللد ، متخيلة اللون ، يملوها مراح اسمر زيين .

١٤٣٤٦ - سِتْدِيَان كَبِير التَّحْمَر *

Quercus macrocarpa (S). *Chêne à gros fruit* (F).

شجرة سروتية جملة الشكل مهدا امريكة الشالية .
تملو من ٢٠ الى ٣٥ م . اوراقها عابلة طول من ١٠
الى ٤ سم . نصلها حل التفتيس ، صفته البليا
جملة الخضار الزلامي اما السفل فخنطية البشرة لونها
الصعبة || تقرونها عيطي الحراشف التي تنو كالادحاب .
بلوطها كبير اللد طوله يراوح من ٥ الى ٦ سم . لونه الى
الجوزة .

١٤٣٤٧ - سِتْدِيَان كَسْتِي الزَّوْك *

Quercus castaneifolia (S). *Chêne à feuilles de châtaignier* (F).

شجرة سروتية مهدا القوقاز تملو من ٢٥ الى ٣٠ م .
اوراقها عابلة اشرابية الشكل كاوراق الكستنة . نصلها

الجلد والافاندا . اوراقها غليظة اي انها تغلب من مركبة ريشية ، في عهد الفترة ، الى فلد بسيطة مبطنة في عهد البلوغ || جميعها من النباتات الراملة مهددا بالبلاد الحارة . احرف واشهر انواعه ما يتبع .

١٤٣٦٤ - سَنَطُ الْبَيْضِ ، هَرَكاس . *Acacia albida* (S). *Acacia blanc*, *Mimosa blanc* (F). *White acacia* (E). *Weisse akazie* (D). *Albero bianco* (I).

شجرة زينة سبروتية . ساقها مغطاة الحاء اوراقها مركبة عابلة . ازهارها زبدية اللون .

١٤٣٦٥ - سَنَطُ اَزْرَقُ *Acacia cyanophylla* (S).

Acacia bleu, *Mimosa bleu* (F). شجرة زينة سبروتية تملو من متريين الى ٦ امتار . فلدها مستطيلة الشكل ، نصلها لإمع السنج الاخضر اللون ، الازرق المواج . حنايقها الزهرية صغيرة القد . ازهارها كروية متوسطة الحجم جملة الصغار الازبدية للتاج || ازهارها يستمر طوال شهر اذار .

١٤٣٦٦ - سَنَطُ اَزْغَبِ *Acacia pubescens* (S). *Acacia pubescent*, *Mimosa pubescent* (F).

جنية زينة جادسة تملو من متريين الى ثلاثة امتار . لسانها وراشها زباه . اوراقها عابلة مركبة . اشطاطها غطية الورقيات قد من ١٥ الى ١٠ زوبا . حنايقها الزهرية محورية وتاجية الاوتكار . ازهارها خلية المالحق لونها الى الصفرة النائية || ازهارها يدوم طوال شهر اذار .

١٤٣٦٧ - سَنَطُ اسْتَقْبُولُ

هو ابيزيا الحرير ، اطلبا .

١٤٣٦٨ - سَنَطُ اسْوَدُ

Acacia nigricans, *A. rufaefolia* (S). *Acacia noirâtre*, *Mimosa noirâtre* (F).

شجرة زينة جادسة مظلية الشكل . افاندا وراشها مضلمة الزوايا . وراشها غنية . اوراقها عابلة ، مركبة ، اشطاطها خيفة الورقيات المستطيلة ، نصلها الى الخصار العايق الاسود المواج . ازهارها فردية او خسية التجميع ، فواصة العرف اللذي ، لونها الى الصغار الكبري . ازهارها يستمر طوال شهر نيسان .

١٤٣٦٩ - سَنَطُ اسْوَدُ الْخَشْبِ

Acacia melanoxylon (S). *Acacia à bois noir*, *Mimosa à bois noir* (F). *Black wattle*, *Green wattle* (E). *Schwarze akazie*, *Schwarzwattle* (D). *Acacia nera* (I). شجرة جادسة هريية الشكل . كبيرة القد تملو من ١٥ الى ٣٠ م . افاندا مضلمة الزوايا . فلدها سناية مستطيلة ، نصلها عايق الخصار الاسمر المواج . ازهارها كروية الشكل ، كبيرة القد ، فواصة العرف ، صفارها كبري . ازهارها يستمر من اذار الى نيسان .

١٤٣٧٠ - سَنَطُ السَنغال ، قَتَاد ، هَسَابُ

Acacia senegalensis, *A. verek* (S). *Acacia du Sénégal*, *Gommier blanc* (F). *Gum tree* (E). *Weissliche akazie*, *Vereksbaum* (D). *Acacia del Senegal* (I).

شجرة مهددا بالبلاد الافريقية تكثر في السنغال يستخرج منها اجود الصمغ العربي .

١٤٣٧١ - سَنَطُ الْعَنَابِيْدِ *Acacia pycnantha* (S).

Acacia à pompons, *Mimosa à pompons* (F). شجرة كبيرة الحجم ، غميية الشكل ، تملو من ١٥ الى

١٤٣٥٤ - سَنَطُ يَكان مَسْنَن الْوَرَقِ

Quercus dentata (S). *Chêne denté* (F).

شجرة سبروتية جملة الشكل مهددا باليابان تملو من ١٥ الى ٢٠ م . ساقها مستطيلة غليظة زباه الحاء ، زغبها اسفر اللون . اوراقها عابلة ، كبيرة ، تملو من ١٥ الى ٣٠ م . وتعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . نصلها سميكة السنج الجامد ، سباعي او ثنائي التضيق . هروقة بارزة خلية البشرة . صفته السفل زباه طلاء . تفرقها مستطيل الحرافش الخيلية البنية . بلوطها يبيضي الشكل ، متوسط الحجم .

١٤٣٥٥ - سَنَطُ يَكان مَسْنَن وُلي

Quercus macedonica (S). *Chêne troyen* (F).

شجرة سبروتية مهددا بالبلقان تملو من ١٥ الى ١٢ م . افانها خفيفة صغيرة . اوراقها عابلة ، قصيرة المتق ، تملو من ٤ الى ٦ م . وتعرض نحو ٤ . نصلها جامد السنج الاخضر على صلفيته ، سنن الحافة ، عدد هروقة يراوح من ٨ الى ١٢ زوبا || تفرقها شيق الحرافش المستطيلة المقوية .

١٤٣٥٦ - سَنَطُ يَكان مَسْنَن عَجَري

Quercus palustris (S). *Chêne des marais* (F).

شجرة سبروتية تجرد في المناطق ولا تغطي الرمال القاحلة تملو من ٢٥ الى ٤٠ م . اوراقها تملو من ٨ الى ١٢ م . نصلها ثلاثي التضيق ، ازغب البشرة . خلي الصلح والورق || تفرقها صاجي الشكل ، دقيق الحرافش الرقيقة البريمة الطب . بلوطها متوسطة القد ، كستنية اللون .

١٤٣٥٧ - سَنَطُ يَكانِيَاتِ

Cupulifera (F). هي فصيلة ابيليات من ذوات الفلقتين المديسات الفصالات .

١٤٣٥٨ - سَنَطُ يَكانِيكُ

Syndes de filices (F). *Assignes in bankruptcy* (E).

هو الوكيل القانوني عن المفلس وعن كتلة الدائنين .

١٤٣٥٩ - سَنَطُ يَكانِيكُ

Anemirta paniculata (S). *Anemirta*, *Coque du Levant* (F). *Cockles plant*, *Cocculus indicus* (E). *Kokkalkörnerstrauch* (D). *Anemirta*, *Coccola di Levante* (I).

نبات بري وزراعي ممر وحيد الجنس والوتق من فصيلة التمريرات . مهدد بالبلاد الحارة اخضاها الاسوية . ثمار طيبة غفيرة ، مسهلة وبقيته شاملة الاستعمال تسمى سم السمك اطلبا .

١٤٣٦٠ - سَنَطُ يَكانِيكُ

Marte commune (F). هو السمور اَشامع ، اطلبا .

١٤٣٦١ - سَنَطُ يَكانِيكُ

Plant enraciné (F). *Rooted slip* (E).

كل فصيلة او عطفة وما اشبه استقلت بمجولها وجزاؤها .

١٤٣٦٢ - سَنَطُ يَكانِيكُ

Pointe des vertèbres du dos (F). حرف فقار الظهر سنان .

١٤٣٦٣ - سَنَطُ يَكانِيكُ

Acacia جنس اشجار وجريرات ونبات برية وصناعية ويزينة من فصيلة القرنيات . انواعه زهاء ٤٠٠ مظهرها شائك



سَنَطُ يَكانِيكُ



سَنَطُ اسْوَدُ الْخَشْبِ

١٤٢٧٨ - سَطَّ صَمْعِي، طَلَح، أم غيلان، بَنَك

Acacia gummifera (S). *Acacia gommier* (F). *Marocco gum tree* (E). *Berberische akazie*, *Talchbaum* (D). *Acacia gummifera* (I).

شجرة من المصا كثرية الشوك الحاد المنفرد بهذا إفريقية الناحية وقد انتشرت في جميع الاطراف الحارة . يستخرج منها صمغ السط الطيب الرائحة الكثير الاستعمال .

١٤٢٧٩ - سَطَّ عَرَبِي، قُرْظ، شَوْكَة لَيْطِيَّة

Acacia arabica (S). *Acacia arabique*, *Mimosa arabique*, *Gommier rouge* (F). *Gum-arabic tree*, *Egyptian acacia* (E). *Arabischer gummibaum* (D). *Acacia arabica* (I).

شجرة برية وزراعية مبدولة في الشرق العربي . يستخرج منها الصمغ الاخر وهو خفيف الصمغ ينسج دون صمغ الطلع والحشاب .

١٤٢٨٠ - سَطَّ حَرَّعَرِي،

Acacia juniperina (S). *Acacia-génévrier*, *Mimosa-génévrier* (F).

جنية تزيينية مبروتية تملو من مَرِّين الى ثلاثة امتار . افتادها اسطوانية زهاب الحام . فلندا صغيرة اللقد ، عرصرية الشكل ، صلبة اللصل ، شاككة القصة ، لونها الى الخضار المالح . ازهارها سبيلة التجميع لونها الى الصفار البهوني || ازهارها ينسج من اذار الى نيسان .

١٤٢٨١ - سَطَّ حَسَكِي، فُطْبَة

Acacia mellifera (S). *Acacia mellifera*, *Mimosa mellifera* (F).

شجرة تزيينية مبروتية جميلة الشكل تملو من ٣ الى ٥ امتار . مهادا اللون وهايم بحر القلزم . اوراقها حابطة مركبة . ازهارها عقودية التجميع ، صلبة اللون . صمغها قليل الذقارة جيب الصمغ .

١٤٢٨٢ - سَطَّ كَاذِب

هو البروييلة السطية ، أطليا .

١٤٢٨٣ - سَطَّ كَاشُو، كَاد هندي ، غبريا

Acacia catechu (S). *Acacia au cachou*, *Cachoutier*, *Catéchu* (F). *Catechu tree*, *Khair tree* (E). *Katechu akazie*, *Kaco-mimosa* (D). *Acacia di cachou* (I).

نوع من السط الزراعي يستخرج منه الكاشو .

١٤٢٨٤ - سَطَّ لَوْتِي، صَمْر

Acacia spicarpa (S). *Acacia à spirales*, *Mimosa à spirales* (F).

شجرة برية وزراعية كثيرة الشوك تستعمل للتسج ساقها قصيرة . قرومها واقتادها عديلة متدلية الاطراف . اوراقها مركبة ، حابطة . ازهارها صفراء اللون ، قليلة الكثافة ، خفيفة الورد .

١٤٢٨٥ - سَطَّ مُجَنِّح

Acacia alata (S).

جنية تزيينية رفاة تملو نحو المتر . اوراقها البالية . فلندية ، قنفا ، جناسية الشكل تنهي بمسكة حادة . ازهارها الى الصفرة البالية || ازهارها ينسج ٥ اسابيع ابتداء من اواسط اذار .

١٤٢٨٦ - سَطَّ حَمَّح

Acacia rousseana (S).

شجرة مبروتية تملو من مَرِّين الى ٦ امتار . اقتادها مضلعة متدلية الاطراف كالقرب . اوراقها فلندية

٣٠ م . فلندا منجل الشكل ، مالم الصفحة الالامة الباقية اخضر . عتاقدها الزهرية جامدة مستطيلة . ازهارها كبيرة اللقد ، عطرية الورد ، لونها الى الصفرة اللحية || ازهارها ينسج من نيسان الى ايار .

١٤٢٧٢ - سَطَّ العُثْر

Acacia farnesiana (S). *Acacia farnésa*, *Mimosa farnésa*, *Cassier*, *Cassie* (F). *Cassia*, *Popinac*, *Sponge tree* (E). *Antillen-akazie*, *Schwammbaum* (D). *Acacia farnésa*, *Farnesia odorosa* (I).

جنية مبروتية تزيينية وصناعية تملو من مَرِّين الى ثلاثة امتار . اوراقها حابطة مركبة . امشاطها وزرة ثلاثية او خماسية او مصابية . وزيقاتها غطيلة تد من ١٥ الى ٢٠ زوبا || ازهارها كروية ، كبيرة اللقد ، فواحة الورد الطري يستخرج منها بالتقطير صمغ العنبر المشهور || ازهارها ينسج طوال الصيف واخره .

١٤٢٧٣ - سَطَّ عَطِي الْوَرَق

Acacia linearis (S). *Acacia à feuilles linéaires*, *Mimosa à feuilles linéaires* (F).

شجرة تزيينية تملو من مَرِّين الى ٥ امتار . فلندا ثلاثي الورق ، نصلها عطلي الشكل يطلو من ١٥ الى ٢٥ سم . ويرض نحو ٢ م . ازهارها صغيرة اللقد ، سبيلة التجميع ، زاهية الصفار الكبريتي || ازهارها ينسج طوال شهر شباط .

١٤٢٧٤ - سَطَّ دَمَّاع، صَيْتَال

Acacia seyal (S). *Acacia seyal*, *Arbre à gomme*, *Dellé* (F). *Shittah tree*, *Shittim wood*, *Thirsty thorn* (E). *Seyal akazie* (D). *Acacia seyal* (I).

شجرة برية وزراعية كثيرة المصارة المسلية . صمغها ينسج دون صمغ القُرْظ .

١٤٢٧٥ - سَطَّ وَالْبَنِي، سَطَّ كَثِير الزَّهَر

Acacia resinodes, *A. floribunda* (S). *Acacia floribond*, *Mimosa résineux* (F).

شجرة تزيينية مبروتية دائمة تملو من ١٥ الى ٣٠ م . اقتادها انصصة دقيقة طوية . اوراقها فلندية ضيقة مستطيلة وسيدة الورد . عتاقدها الزهرية تاجية الاينكاز . ازهارها كروية ، فواحة الورد ، صفراء اللون . ازهارها ينسج طوال السنة .

١٤٢٧٦ - سَطَّ صَرَح

Acacia cultriformis (S).

جنية تزيينية جامدة تملو من متر الى مَرِّين . ساقها وزيقاتها واوراقها مرسة . فلندا يفسية الشكل ، جامدة اللسج البحري اللون . ازهارها عقودية التجميع ، عتاقدها ردة مستطيلة || ازهارها ينسج ٥ اسابيع تبتدئ في اوائل ايار .

١٤٢٧٧ - سَطَّ شَالَع، سَطَّ عُنْبَرِي، مِيحُوزَا

Acacia decurrens, *A. dealbata* (S). *Acacia parfumé*, *Mimosa commun* (F). *Silver wattle*, *Wattles* (E). *Silberakazie*, *Weissliche akazie* (D). *Acacia dealbata* (I).

شجرة مبروتية مبدولة تملو من ٨ الى ١٢ م . اقتادها واقتادها خلية الحام . اوراقها حابطة مركبة . امشاطها عديلة . وزيقاتها حرشية . نصلها منسج الصفحة في البهار ، ثنا في الليل || ازهارها فواحة الورد ، لونها الى الصفرة الزاهية . يستخرج منها بالتقطير صمغ العنبر || ازهارها ينسج من كانون الى اذار .



سَطَّ شَالَع



سَطَّ عَرَبِي

تقابل الظهيرة . زعنفتها اللبيلة فاقدة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

١٤٤٠١ - سفنقيات
مرتبة اسمك بحجرة من رتبة الاطلاق تشمل القترنيات والشفنقيات البحرية .

١٤٤٠٢ - سفنقيات هو العرن ، اطلبه .

١٤٤٠٣ - سينفوروكه هيرجكة

Ctenophora festiva (S). *Ctenophora agréable* (F).
حشرة لافنية من ذوات الجناحين وفصيلة القنصيات . جسمها معتدل القد قريب الشبه ببعض البقون يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . قرونها الى انسرة السطاس يملونها بمجذع وتبيج اصفر . زباناها فلاقديا الشكل ، عذما التهديب . رؤسها الى الصغار الخفي تملو بقية سمراء في وسط التزام الانخير || الاتي اكبر قدماً من الذكر . بطنها مردي الشكل . تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى تشرين الاول . تألف الحراج والقبابات والحدائق والبساتين || تمتع الاشر مكها في غاء الاجار الحرة المظلمة . يرقاتها تمشي حل المولد النباتية والمضوية المنحلة .

١٤٤٠٤ - سفنقيات

في القنريات فصيلة نباتية ، اطلبها .

١٤٤٠٥ - سفنقياتالته *Sanvitalia* (S). *Sanvitalia* (F).
جس نباتات عشبية حولية تزينة من الشرونيات وفصيلة المركبات . انزواه ثلاثة . اوراقها منتقة متقابلة . تصلها يضي للشكل مهدب للقاعدة لونه الى الخضار الاطلل . اثمارها جزوية الرؤيس الوسطي ، يرتقالية البنيات الحاربية . يزورها مجتمعة ثنائية او ثلثية الحكد . انزواها يستمر طوال الصيف .

١٤٤٠٦ - سنفور ، **سنفور** ، **سنفور** ، **سنفور**
Hierofalco (S). *Gerfaut* (F). *Gerfalcon*, *Gyrfalcon* (E).
جس طير من عازة الصقور وفصيلة الصقريات . موطنه البلاد الباردة . انزواه ستة جميعا من الجوارح الكبيرة الجئة . الجسيمة الشكل والمندمام . طولها يراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم . ويصلها من ١٣٥ الى ١٥٠ سم || انزواها تختلف مع النوع والعمر يغلب فيها الياض . مناسرها قرية منتقاة البرج الدرية الحادة . سواقلها كبيرة القد ، ذلثة الاطراف . انزواها مستطيلة جالسة . خالها قوية . تألف الاشرار والجبال المشرقة الى البحر . تصيد السمجاب والاراب ويختلف القرواصم والبطل والاوز والندرس . تمشي في الاجمار الباسقة او بين شماليات الصقور البورة . انزواها تبيض وتخصن من ٤ الى ٥ رفنات نحو ٤ اسابيع . اما انزواه الستة فهي :

Gerfaut blanc (F). سنقر ابيض
Gerfaut de Norvège (F). سنقر النروج
Gerfaut d'hlande (F). سنقر ايلند
Gerfaut du Groenland (F). سنقر غروينلند
Gerfaut de Hailball (F). سنقر هليل
Gerfaut du Mexique (F). سنقر المكسيك

١٤٤٠٧ - سفنقيات
Egretta garzetta (S).
Aligrette garzetta (F). *Little egret* (E).
طائر من الباشونيات يحرب المناطق الجنوبية الممتدة من

اليابان الى اوروبية وافريقية واسترالية || طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه الى البياض الصافي . منقاره اصفر الانتشاب . اسود الجسم . يتميز بريشه الخافي الفاخر الصنف . يعيش اسراباً كبيرة . يألف النافع . قوته الاسماك والصفاد وخلف الحشرات . يثن بين الامل والقصب . اناته تبيض وتخصن ثلاث يبيضات .

١٤٤٠٨ - سنكالي
Cénomanian (F).
Canomanian (E).

صاف حصيلي يجتر قاعة سافات الطبقة الطباشيرية العليا .

١٤٤٠٩ - سنمكة
Sommet d'une plante (F).
Summit of plant (E).
ارفع بيزة في النبات .

١٤٤١٠ - سنمكة
Zébu (F). *Zebu*, *Indian ox* (E).
السنة ج سم هي الابقار الهندية الرقية الحاروية السامي الشكل . اطلب دربابي .

١٤٤١١ - سنمي
Cyme
شكل من الانزوار النوري قوله ان المالحات الزهرية تتشأ في نقطة واحدة وتبلغ علوا واحدا متساويا في الانتشاب والازكازن .

١٤٤١٢ - سنمكة
Arbre à production alternative
نمت تعريف يطلن في كل مجرة تعمل سنة وتضع اخرى كما في الزيتون .

١٤٤١٣ - سنوني
Sénonien (F). *Senonian* (E).
صاف حصيلي يشمل النضيب الاوسط من الطبقة الطباشيرية العليا .

١٤٤١٤ - سنوت هو الكسون ، اطلبه .

١٤٤١٥ - سنور
Felis (S). *Chat* (F). *Cat* (E).
جس حيوانات صغيرة القد من فصيلة السنوريات ورتبة القوام منها رية وحشية ومنها انيسة البرية لا يملو منها بيت || اسماء السنور كثيرة اشهرها القبط والفر والعربون واليس واليسين والخليد والخيول والحمرن والدم واليزون والككيس والحارون والفتناري || اما كته فابو خداني وايو فزوان وايو الميتم واماو خاب .

١٤٤١٦ - سنور الزيكاد هو الزبادة ، اطلبها .

١٤٤١٧ - سنور بيري
Chat tigré (F).
حيوان لاسم مغرر يدمي مرقى ، اطلبه .

١٤٤١٨ - سنور بيري ، **هينون**
Felis catus, *Catus ferus* (S). *Chat sauvage* (F). *Wild cat* (E).

اكبر انواع السنابر واشدما بطناً واصفها حرداً . طوله الكمال يراوح من ٧٠ الى ٨٠ سم . جسمه من ٣٨ الى ٤٤ وذيته من ٣٢ الى ٣٦ اما علوه الى الحاروك فافرح من ٣٧ الى ٤٣ سم . ثوبه الى الصبغة الصفراء والسمراء يملو تخطيط وتجزع اسود || يألف الاشرار ويرح في الليل وينسلق الاجمار . يمتد على كل حيوان وطائر يستطع اليه سيرا .



سنقر



سنيل



سنور بيري

١٤٤٣٠ - سَهَيَات المَنَاقِير

هي مشروبات المَنَاقِير ، اَطْبَا .

١٤٤٣١ - سَهَيَاتَة

Epillet (F). Spikelet (E). هي وحدة التَزْمِير في شكل الازدهار السُيْلِي . يجموها المَرْصُوف المتتابع الازتكاز حل محور واحد يؤلف السُيْلَة .

١٤٤٣٢ - سَهَيَاتَة

Paraside (F). Paraside (E). السُيْلَة جزء من الحلقة الصُدْرِيَة الثالثة ، عند الحشرات ، توصل لَمِلَة اليرباج بالجناتح وتثبتها فيه . وهما اثنتان يُمْنَى ويسرى .

١٤٤٣٣ - سَهَيَات

السيق كوكب ثير ابيض الضوء .

١٤٤٣٤ - سَهَيَاتَة

Mitra (S).

Mitra (F). Mitra (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربيل فضيلة السليمانيات . انواعها المرفولة كثيرة العدد والمعاصر منها يتناثر ٢٥٠٠ اعطانها بحار البلاد الحارة والاستوائية . معظمها يعيش على مدائع المرجان || اصداؤها حُرَاسِيَة الشكل ، غُرُوبِيَة الاقطاب المخلزة مستطيلة الفرج القسيية . اجسامها عادمة للشعور ، صغيرة الرؤوس ، ثنائية الفراس ، مستطيلة الاضراس || انواعها المرفوعة في البحر الابيض المتوسط صغيرة القد باعثة الالوان ، اما انواع بحار المناطق الاستوائية فكبيرة القد ، جميلة الزخارف والالوان الزاهية || يعيشون في الحند « مأذنة » .

١٤٤٣٥ - سَهَيَات

Mitridae (S).

Mitridae (F). Mitridae (E).

فضيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربيل اماسيات الحياض . اجسامها وانواعها عديدة ، بعضها من متحسسات الاراضي المائية والبيض الآخر معاصر || اصداؤها بليغة المخلزة ، مدببة الاقطاب ، خفيفة التجويف القاعدي اللانسوب الاستدارة || اعرف اجسامها واشهرها السنية .

١٤٤٣٦ - سَهَيَات ، سَهَيَات

السها والسهي نجم من كوكبة بنات نكش الصغرى .

١٤٤٣٧ - سَهَيَات ، قَهَيَات

Steppe البرية والقلادة وكل منبس سهل يبعد الاطراف القسيية الممراتية .

١٤٤٣٨ - سَهَيَات

Squame (F). Squama (E).

حشفة صغيرة طبيعية او حافرة .

١٤٤٣٩ - سَهَيَات

Squameux (F). Squamous (E).

لمت تعريفي وصي يطلق على الاشقية الحيوانية الحشفية السطح .

١٤٤٤٠ - سَهَيَات

Squamates (F).

Squamata (E).

رُتِيَة من الزحافات . التصنيف الحديث يقسمها الى مرتبتين : مرتبة الحيات ومرتبة العظائيات .

١٤٤٤١ - سَيُور دَاجِن *

Felis domestica, Catus domesticus (S). Chat domestique (F). Domestic cat (E).

هو القط المعروف باليس وأخر والحجل والحيح والبيسن . شروبه كثيرة السدد اعطائها السلام ، الاتي اصغر قدأ من الذكر ، عيها يوم نحو ٩ اسابيع وفي تضع من ٢ الى ٦ جراء تبصر النور بعد وضعها باسبوعين .

١٤٤٤٠ - سَيُور شِيرَازِي * ، قَطْ اَنگَرَة

Catus angorensis (S). Chat angora (F). Angora, Angora cat, Persian cat (E).

فرب من السُور الداجِن هي الخلق مستطيل الورب الجليل الناعم .

١٤٤٤١ - سَيُور مَصْفَد * ، سَيُور مَرْيَن ، سَيُور مَهْرِي

Catus maniculatus (S).

Chat ganté (F). Egyptian cat (E).

نوع من السانير البرية والداجنة مهد بلاد التوبة . قعمه المصريون في عهد الترامنة وانتقل مع الرحالة وقوافل التجار من بلاد الى بلاد فوصل الى اوروبا عن طريق الجزيرة وسورية وتركيا ووصل الى الاندلس عن طريق ليبيا وتونس والجزائر . طوله الكمال نحو ٧٨ سم . جسمه ٤٤ وذنيه ٢٤ ثوبه سوي اللون يمتد عند الظهر . فروجه رفيعة مجزعة .

١٤٤٤٢ - سَيُور مَنُول *

Catus manul (S).

Chat manul (F). Manul cat (E).

نوع من السانير البرية القوية الشديدة النشاط . مهد جبال وبياني المنديل . طوله الكمال ٧٨ سم . جسمه ٥٥ وذنيه ٢٨ اما طول فمحو ٤٥ سم . ثوبه مزيج من الاصفر والابيض والامبر رأسه مبقع بالاسود . غذاء مجزأ بالامر السابق . اذناه قصيرتان . ذنبه مطوق التجزيع بالاسود .

١٤٤٤٣ - سَيُورِي

Félin (F). Feline (E).

لمت تعريفي يطلق على كل حيوان ينتمي الى فصيلة السُوريات .

١٤٤٤٤ - سَيُورِيَات

Felidae (S).

Félidés (F). Felidae (E).

فضيلة حيوانية من رُتِيَة القوام تشمل السنور والاسد والبر والثر والرشق والمانك الخ .

١٤٤٤٥ - سَيُورَة

Nidicola (F).

لمت تعريفي يطلق على فراخ الطير التي تنقف بيثة مريضة لا تستطيع الاستغناء من ابوها بعض الوقت .

١٤٤٤٦ - سَيُورَة

هو الخفاف ، اَطْبَا .

١٤٤٤٧ - سَيُورَة المَاء

هو الزبح من كليات القدم ، اَطْبَا .

١٤٤٤٨ - سَيُورَة

صفة الاشجار المختارة للحل . يقال ثبات سنو وجريرة سناء .

١٤٤٤٩ - سَيُورِي ، سَيُورِي

Annual (F).

Annual, Yearly (E).

هو كل نبات يزهر في الحول الذي ينبت فيه ثم يذبل ويموت عقب الامار .



سنور داجِن



سنور شِيرَازِي



سنور مصفد



سنور منول



سنية

١٤٤٥٥ - **سَهْلُون** (F). **Vive**

جنس اسماء بحرية مشهورة باسم ترخون ، اغلب ترخون .

١٤٤٥٦ - **سَهْلُون صَغِير** (F). **Vive pacifica**

سمكة بحرية تدعى أيضاً ترخون صغير ، أطلها .

١٤٤٥٧ - **سَهْلُون عَشْكَبُونِي** (F). **Vive assignée**

سمكة بحرية تدعى أيضاً ترخون عشكبوني ، أطلها .

١٤٤٥٨ - **سَهْلُون مَبْدُول** (F). **Vive commune**

سمكة بحرية تدعى ترخون مبدول ، أطلها .

١٤٤٥٩ - **سَهْلُون مَشْعِ الرَّاس**

Vive à tête rayonnée (F).
سمكة بحرية تدعى أيضاً ترخون مشع الرأس ، أطلها .

١٤٤٦٠ - **سَهْلُونِيَّات** (F). **Trachinidae**

فصيلة اسماء بحرية تدعى ترخونيات ، أطلها .

١٤٤٦١ - **سَهْلُوج** (S). **Haliastur vocifer**

Pygargue vocifer (F). Also called **hurd**, **African sea eagle** (E).

طائر من الشياط يقتني إلى حمارة العقبان وفصيلة الصقريات . يقال أنه من أجل العقبان وأجها وأجها ، موطنه القارة الإفريقية . طوله نحو المتر . ثوبه أبيض فاقص . رأسه وقفنه وصنقه وبجسته وبطنه سفلي واثنيكه إلى البياض الثلجي . ظهره وظاهر سفليته وسدره إلى السواد الأزرق اللامع . مخالبه صفراء . قوته الطير والاسماك والحيوانات الصغيرة ولا يفت من اللسر أبناً شاهده كأن له في اقتناصه لذة خاصة .

١٤٤٦٢ - **سَهْلُوك** ، **عَقَب مَزُورَة**

Pseudoeuco, Aquila fasciata (S). **Pseudoeuco, Aigle à queue barrée** (F).

طائر من العقبان وسيد الجنس والفرع . جسمه مستطيل القند وصنقه كاسي الريش . مخالبه طويلة . فوهه إلى السمرة الصفراء . سفله موزر بالأبيض . ذنبه مشوح بخطوط متعرجة لوناً إلى البياض الباهي || وهو من العقبان الأوابد موطنه يمتد من الهند إلى الشرق الأوسط واليونان وإيطاليا وإسبانيا وإفريقية الشمالية . يألف الثعالب والأرانب ويجاري الله وصفاته والحيوانات يصيد البيط والثور والبعير والحمار والجمال والطيور . يفتن حبه في صيد السمور اللينة الناعية . أثناء تبيضه وتبين تحضنها وحدها نحو ٥ أسابيع .

١٤٤٦٣ - **سَهْلُوم** (F). **Pseudoeuco**

السمور ضرب من العقبان يدعى أيضاً **السُوك** ، أطلها .

١٤٤٦٤ - **سَهْلِير أَشْكَال** (S). **Sehirum dubium**

Séhiru doux (F).

حشرة من السهر وفصيلة القامشيات . جسمها صغير القند ، مبط ، أطليجي اللون ، يطلي نحو ٨ مم . || ثوباً إلى الزرقة البليغية يعلوها موج شكل يسود فيه الأخضر فالبسود فالأخضر || وأنها معتدل الحجم ، قليل التكاثر . غطتها منتدل الطول . ميناها صفيرتان ، ماحتان . زباناها مستطيلتان . كرسها محبب الظهور .

١٤٤٤١ - **سَهْل** (F). **Plaine**, **Plain**, **Flat country** (E).

سهل ج سهل : هي الاراضي المستوية السطوح . ممدداها يمد إلى عاتلين اساسين : الارباب والتمدات والتربة .

١٤٤٤٢ - **سَهْم** (F). **Action**, **Share** (E).

هو حصة احد الشركاء في شركة مساهمة . وهو يبادل جزئاً من مجموع الاجزاء التي قسم لها رأس مال الشركة .

١٤٤٤٣ - **سَهْم** ، **حَصَة** (F). **Part**

هو جزء من ذمة مالية .

١٤٤٤٤ - **سَهْم الإِثْتِغَاع** ، **سَهْم التَّمَتُّع**

Action de jouissance (F).

هو السهم التي دخلت قيمته وما زال حامله يتقاضى ربحاً سنوياً عنه .

١٤٤٤٥ - **سَهْم الرَّمِي**

كوكب تير من برج الرامي المعروف ببرج القوس .

١٤٤٤٦ - **سَهْم المَاء** (F). **Sagittaire**

هو القطعة جنس لباتات مالية من المزاريات .

١٤٤٤٧ - **سَهْم التَّصَاب** (F). **Action de quotité**

هو كل سهم لا يشارك فيه إلى قيمة معينة من القود .

١٤٤٤٨ - **سَهْم إِثْتِغَاع** ، **سَهْم مُتَمَتُّع**

Action de préférence, A. de priorité (F).

هو السهم الذي يمتني بالأسبقية إلى السهام الأخرى إما بزيادة حصته في الأرباح أو في اقتسام الشركة عند حلها أو في حق التصويت أو في هذا كله مجتمعا .

١٤٤٤٩ - **سَهْم دُو حَلَاة** (F). **Action à prime**

هو السهم الذي يصدر بسعر أقل من سعره للمسي .

١٤٤٥٠ - **سَهْم رَأْس المَال** (F). **Action de capital**

هو السهم الذي تقابله حصة في رأس المال سواء أكانت عيناً أم نقداً يقابله سهم العمل أو سهم الصناعة الذي تكون أخصه فيه عمل بديلي .

١٤٤٥١ - **سَهْم مَبْتَنِي** (F). **Action d'apports**

هو السهم الذي يسلم إلى الشريك مقابل تقديم حصة عيناً .

١٤٤٥٢ - **سَهْم حَامِلَة** (F). **Action au porteur, Titre au porteur**

certificat, B. bond (E).

هو السهم الذي لا يبين فيه اسم شخص معين وتكتفي بإيثاره لأليات ملكيته .

١٤٤٥٣ - **سَهْم مَدْفُوع القِيمَة** (F). **Action libérée**

هو السهم الذي دخلت قيمته كاملة أو كان ممدداً لحصة قدما حله عيناً .

١٤٤٥٤ - **سَهْم مُتَمَتُّع** ، **سَهْم مُتَمَتُّع دَافِعُ الصَّوَات**

Action à vote plural, A. privilégiée (F).

هو من السهام التي تحوز حلتها في الجمعيات العمومية أسبقاً من غيرها لحصة السهام الأخرى التي تتبادل معها سراً .



سَهْلُوج

١٤٤٧٥ - سَوَاعِد Vaisseaux mammaires (F).
Mammary ducts (E). هي مجاري الحليب في القرسح .

١٤٤٧٦ - سَوَالف Epizootie (F). Epizooty (E).
مرض المال وملاكه من آفة تصيبه .

١٤٤٧٧ - سَوَام فَتُوح * Cyanocitta cristata (S). Cyanocitta huppé (F).
Blue Jay (E). طائر من فصيلة القران . يصير من أجل طيور أصرية الشالية . يأتي الإبراج والنباتات . قوته أخشاب والبوط والناهار والبورو ويصنع المصانير ويحلبها || جسمه متصلب القدر بطول نحو ٢٢ سم . صفته العليا ، من قراس إلى الذهب ، زرقاء اللون صفاء المخرج . صفته السفلى من الزور إلى الأبيض ، ورياء اللون يضاء المخرج . عند أسد يمتاز بجهته وقلادة سوداء قتلون عنقه . جناحاه وذنبه مقلعة بالاسود والاربد . رأسه متوج بكثرة سوداء يطولها مواج أزرق || يدشن عنه في الأشجار الرقيقة . الاق تحضن وضعها من ٤ إلى ٥ بيضات بينا الذكر يؤمن لها الغذاء .

١٤٤٧٨ - سُورِ فُسْفَات Superphosphate من الاسمدة الكيماوية الرئيسية . يشتمل عنصر الفسفور الذي يدخل في تركيب جميع الحوامض والمواد الزلالية الموجودة في الخلايا النباتية || خواصه وصفاته عديدة أمبرضا : - سفس جلود النبات على الانشباب والتكاثر . - سح الثبات على أتران الأتزار وجودة التوليع وحسن التأثير والمقد ومع الانعكاس . - تشييط وحماية المادة الحبية في السماء وبرادة الجلود وتقوية المناعة الذاتية ومكبتها من السموم في وجه الاوصام الجرثومية . - الحلول دون شلوك الأزوت وعواقبه الرئيسية فيا لو زادت نسبتة من المعدل الأقصى . - والبورفسفات على أشكال منه المادي والمزدوج والمثلث وهذا يمدد إلى نسبة ما يحوي من الحامض الفسفوري القابل الذوبان في الماء وفي سيترات الامونيكا || يدر على التربة كالبوتاس قبل الأتزار ببعض الوقت ويظهر جيدا ذلك لتتمكن الحماض الطبيعية مع انفعالها الكيماوية من تحويلة إلى غذاء قابل التشييط منه حاجة النباتات إليه .

١٤٤٧٩ - سُورِ فُسْفَات العظام Superphosphate d'os من الاسمدة الفسفورية الفضية الجزيلة النفع يحوي من ١٢ إلى ١٨٪ من الحامض الفسفوري القابل الذوبان في الماء وفي سيترات الامونيكا || وهو بجلي الانفعال ينشط البيئة الجرثومية ويحياها على التكاثر النظمي .

١٤٤٨٠ - سَوَجَر Oléastre (F). هو خللاص الفيق الورق ، اطليه .

١٤٤٨١ - سَوَجَر هو الصفصاف ، اطليه .

١٤٤٨٢ - سَوَدَق * ، صَقَر البَعْد Falco nigriceps (S). Faucon des canards, Aléte (F). طائر من الصقور الفواطع التي تجوب البلاد الممتدة الحرارة . جنته تقارب جنة الشاهين وهو أغمر الريش ،

جنتها وحشبا ظهراها متعادلا الطول . قشرانها شفاف . بطنها إلى السمرة . قوتها مباشرة الحلب القصير || وأعتها كريمة .

١٤٤٨٦ - سَهِير مَطْلَع * Sehirus maculatus (S). Séhíre maculé (F). حشرة من السهير وفصيلة النسيانيات . جسمها صغير اللد ، مقلطح ، شبه بيضي اللون ، وطول نحو ٧ م . || ثوربا إلى الزرقاء الحديثة المخرج يطولها تلطيخ أفسر اشهب . رأسها صغير الجسم . غطتها متدل الطول . زباناها مستطيلة . عينها صغيرتان ، غارتان . كسلها قبي الثورن . جنتها وحشبا ظهراها متعادلا الطول . قشرانها شفاف . بطنها إلى السمرة القلقة . فوائها مباشرة الحلب || مرتعا الكثير من الاعشاب اغصها الشفويات || وأعتها كريمة .

١٤٤٨٦ - سَهِيْمَة Opercule (F). Operculum, Cover (E). هي الغلاف الرقيق الذي يسد مخاريط النحل . وهي غطاء اجنات الحطاب . وهي اللشاء النفروني الذي يلفس مناخير البير اللع ...

١٤٤٨٧ - سَهِيْل Canope (F). Canopus (E). نجم من كوكبة السيفية يتميز بريق لماله الذي يأتي بمد البرجيس والأبرق . يمد من الأرض نحو ٢٠٠ سنة سوية أي نحو مليونين مليار كيلومتر .

١٤٤٨٨ - سَهِيْمَة ، بِسْمِيْت * Belemnites (S). Bélemnites (F). Belemnites (E). جنس حيوانات بحرية من الرغويات وأسيات الارجل مزدوجات الحماض . وفصيلة السهييات . أترها المعروفة عديدة ، جميعها من حافير الحقية التريامية . حياكلها صغيرة سهمية الشكل .

١٤٤٨٩ - سَهِيْمَات Belemnitidae (S). Bélemnitidae (F). Belemnitidae (E). فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات وأسيات الارجل مزدوجات الحماض . اجناسها وأترها المعروفة قليلة العدد جميعها من متجمرات الأتية الفائرة . يبدو ان ظهورها يمد إلى العصر البليوسيني وانقراضها كان في العصر الطلياسيني .

١٤٤٩٠ - سَوء النِيْمَة Mauvaise foi (F). Dishonesty, False-hood (E). هو معرفة الانسان ما ينظر عليه عمله أقتانوني من حيرب وأجرام .

١٤٤٩١ - سَوَاك هو الزاموب ، اطليه .

١٤٤٩٢ - سَوَاكِيَة هو زورور البادية ، اطليه ومن اسمائه أم سليمة .

١٤٤٩٣ - سَوَاكِيَة هو البركتس ، اطليه .

١٤٤٩٤ - سَوَاكس غير واحد سواة . قال ابو جنيفة : السواس من

النفاء وهو شبه بالمرح له سفة مثل سفة المرح وليس له شك ولا ورق ، يطول في البقاء ويحتل تحت وقال أيضا السواسي والمرح والمجن متشابه .



سهيمة



سوام مرج



سودق

تطول من ٥ الى ٧ سم. اوراقه متصبغة بتلو من ١٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ٢٥ الى ٥٠ سم. ازهاره ليلكية اللون، كبيرة القند، قطر فيها يراوح من ٨ الى ١٢ سم. وطول انبوتها من ١٥ الى ٢٥ سم. وهو السورتيان الطبي المشهور الذي يستخرج منه الكاشينين.

١٤٤٩٠ - سَوْرْتَجَان الشَّرْقِي

Colchicum byzantinum (S). *Colchique d'Orient*, C. à feuilles de varail (F).

نبات سروتي مهدد الشرق. غروب زراعية حديثة. دوفسته كبيرة القند، كروية الشكل، مغلفة القواعد. اوراقه تطول من ٢٢ الى ٣٥ سم. وتعرض من ٧ الى ١٠ سم. نصلها مخطط الصفحة كمثل الخربوق. ازهاره كبيرة القند مستطيلة الانبوب الابيض، خلية البتلات الوردية اللون. ازهاره يستمر طوال الشتاء.

١٤٤٩١ - سَوْرْتَجَان الحَصْبِي

Colchicum hausknichti (S). *Colchique d'Hausknicht* (F).

مهدد جبال الحصى. يربط في الاماكن الصخرية. دوفسته شبه بيضية قطرها نحو ٦ سم. يملأها حتى يبلغ ٧ سم. اوراقه شبيهة النصل الغند الصفحة، ازهاره خلية البشرة، صفراء اللون، وردية الفروق، مستطيلة الانبوب. ازهاره يدمر طوال شهر تشرين الاول.

١٤٤٩٢ - سَوْرْتَجَان پَرْكِينسون

Colchicum perkinsoni (S). *Colchique de Parkinson* (F).

نبات سروتي مهدد غابات الشرق الادنى. دوفسته متوسطة الحجم. اوراقه اهلجية مستطيلة، نصلها متراوح الخشار قارش التربة. ازهاره متوسطة القند، انبوبا ابيض اللون، بتلاتها مضطربة ومزينة بالابيض والاربعاني، مآبرها زرق. ازهاره يستمر من آب الى ايلول.

١٤٤٩٣ - سَوْرْتَجَان دَكْسِي

Colchicum decalnei (S). *Colchique de Decalene* (F).

مهدد الشرق الاوسط. يزرع للزينة. يستمر من النباتات الرقيقة. دوفسته متوسطة القند قطرها نحو ٤ سم. اوراقه الاول سنانية النصل ثم ثلثا اوراق شبيهة، دلفق اقزام الاخضر. ازهاره صلبة القند، وردية اللون خلية البتلات يستمر من تشرين الى كانون الثاني.

١٤٤٩٤ - سَوْرْتَجَان حَرَبِي الشَّرْقِي

Colchicum latifolium (S). *Colchique à larges feuilles* (F).

نبات سروتي مهدد الشرق الادنى. دوفسته متوسطة الحجم. اوراقه كبيرة قارضة تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. وتعرض من ٥ الى ٩ سم. ازهاره مستطيلة الانبوب، بتلاتها مدببة اقزام الاخضر، خلية البشرة، لونها الى الليمون يملأها موج اربعاني، مآبرها صفراء. ازهاره يستمر من آب الى ايلول.

١٤٤٩٥ - سَوْرْتَجَان فَاحِر *

Colchicum speciosum (S). *Colchique superbe* (F).

مهدد الشرق الاوسط. يزود الزينة. دوفسته كبيرة القند، قطرها نحو ٦ سم. اوراقه تطول من ٢٠ الى

اصغر الرأس، اسمر الظفر المزدهن، اسمر البطن. راسه وصفته وظفره وسفمها وذنبه سفح المزاج. منفره وضالعه سودا. ينش في الانجرار الباسقة الثانية. يصيد للزينة والبر. اعصابها الجردان والبط.

١٤٤٩٢ - سَوْدَقِي، مِيَزُوكَرَب

Mesocarpus (F). *Mesocarp* (E).

هو الجزء المتصل من غلاف الثمرة يعرف باللب في ثمار القرع. تلتفه الخلة ويلتصق بالانوكرب حيث المجدة او البثور.

١٤٤٩٤ - سَوْرْتَجَان

هو الزوائد الدائم الخضرة، اطليه.

١٤٤٩٥ - سَوْرْتَجَان، سَرَاخِ الفُوكِ

Colchicum (S). *Colchique* (F). *Colchicum*, *Meadow saffron* (E). *Lichtblume*, *Zeislose* (D). *Colchico* (I).

جنس نباتات يصلية معمرة من فصيلة السورتيانيات. ازهاره زده ٢٠ منظرها بري ويضاهي زراعي. نصلها الكلية صلبة اعصابها در البول وتسهيل للمعدة وتكسين الاصاب والحث على السن. ويستخرج منها مادة قلوية تدعى كلشينين شائعة الاستعمال الطبي. ازهارها قرصية الانتساب سنانية النصل المستطيل. ازهارها كبيرة القند مستطيلة الانبوب مدببة البتلات المتساوية. ثمارها كسائر حقبة الشكل تظهر مع الارواق بعد ذبول الزهر واكثال ذيله. اشهر انواعه ما يتبع.

١٤٤٩٦ - سَوْرْتَجَان اَبْيَض

Colchicum candidum (S). *Colchique blanc* (F).

نبات سروتي مهدد جبال الشرق الاوسط. دوفسته برمية الشكل متوسطة الحجم. اوراقه شبيهة مستطيلة فارضة. ازهاره صغيرة القند، بيضاء اللون، طويلة المآبر الصفر. ازهاره يستمر من آب الى ايلول.

١٤٤٩٧ - سَوْرْتَجَان اصْفَر

Colchicum luteum (S). *Colchique jaune* (F).

نبات سروتي مهدد الجبال والافان. دوفسته صغيرة الحجم اجاسية الشكل. اوراقه شبيهة مستطيلة، نصلها مغلب المساحة الزاهية الخضار. ازهاره صفراء اللون، بتلاتها بيضية الشكل خلية البشرة الداخلية. ازهاره يستمر من نيسان الى ايار.

١٤٤٩٨ - سَوْرْتَجَان الجَبَلِي، قَرْجِ الاراضِ، حَكَنَة

Colchicum montanum (S).

Colchique de montagne (F).

نوع من السورتيان مهدد المناطق الجبلية ذات الاربية البرية. دوفسته صغيرة القند قطرها نحو ٢ سم. اوراقه تطول من ٨ الى ١٥ سم. وتعرض من ٧ الى ١٢ سم. ازهاره صغيرة القند قطرها نحو ٥ سم. طولها يراوح من ٦ الى ١٢ سم. وهو السورتيان الطبي المشهور دوفسته تدعى خيرة العطار وراز القطة ولينة برية.

١٤٤٩٩ - سَوْرْتَجَان اخضرِي *، حَمَل، قَاتِل

Colchicum autumnale (S).

Colchique d'automne, *Veilleuse*, *Tue-chien*, *Safran des prés*, *S. léopard* (F).

نوع من السورتيان الملبد. دوفسته بيضية الشكل



سورتيان الحريف



سورتيان فاحر

١٤٥٠٢ - سُوْمَة اَبِيَسْ

Schizanthus candidus (S). *Schizanthus blanc* (F).
عشبة حولية تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم. اورانها وريشية
قليلة الالهبية والكتنين . ازهارها كبيرة القند مستطيلة
الانبوب ، مفرقة الصفحة السفلى ، لونها ال ابيض
الباجي || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٤٥٠٣ - سُوْمَة غَرَاهَم

Schizanthus grahami (S). *Schizanthus de Graham* (F).
عشبة حولية او حولة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقها
معتدلة القروع . زلفها مبشر التجسيم . اورانها وريشية
مهدي . ازهارها كبيرة القند ، وردية اللون ، صفراء
التبيج ، يرتقالية الزواكش || ازهارها يستمر من
حزيران الى ايلول .

١٤٥٠٤ - سُوْمَة هَدَدَب

Schizanthus pinnatus (S). *Schizanthus penné* (F).
عشبة حولية او حولة تملو من ٢٥ الى ٦٠ سم. ساقها
قراء ، فروصها كثيفة التجسيم زباء الحام . اورانها
وريشية مهدي . ازهارها كبيرة القند بتلسمية اللون صفراء
التبيج والبرق || ازهارها يستمر من حزيران الى
ايلول .

١٤٥٠٥ - سُوْمَة تَحِيل

Schizanthus gracilis (S). *Schizanthus grêle* (F).
عشبة حولية تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اورانها زباء
للتصل . ازهارها صغيرة القند ليلية اللون يملوها بتبيج
بتلسمية حماره اصفر || ازهارها صبي .

١٤٥٠٦ - سُوْمَة *Charançon* (F). *Weevil* (E).
كلمة شاملة تطلق على معظم الحشرات التي تقرب الى
فضيلة السويات . ج سوس || هي يمسكها خنافس
صغيرة القند تقرب الحبوب وتوقع بها اشد الانفس .

١٤٥٠٧ - سُوْمَة الْأُرْزْ *Calandra oryzae* (S).
Charançon du riz (F). *Rice weevil* (E).
Reiskäfer (D).
حشرة من السويات ملوفا من ٣ الى ٤ سم . جسمها
مستطيل الشكل . لونها ال السرة الخنقية تحمل على غدها
اربع بقع حر || تركب شلب الارز وتقرضه قبل
قشره .

١٤٥٠٨ - سُوْمَة الْبَرَاغِم

Peritelus sphaeroides (S). *Pértèle gris* (F).
Peritelus griseus (E). *Grauer Rüsselkäfer* (D).
حشرة من السويات ملوفا براوح من ٥ الى ٧ سم. ثوبها
حنطي اللون يملو زغبة غيرة ومواج اسف || تركب
برام الاجنار والشجيرات المختلفة الاجناس والانواع بما
لها التفاح والبرت والكرت والبيج تقرب اطرافها او تنقبها
وتوقع بها اشد الانفس || يرقاتها تعيش في التربة على المواد
الضوية للنبات .

١٤٥٠٩ - سُوْمَة الْقَتَب *Hylobius abietis* (S).
Charançon du sapin, *Hylobus du pin* (F). *Fir-tree*
weevil, *Pine weevil* (E). *Grosser branner Rüssel-*
käfer (D).
حشرة من السويات . ملوفا نحو ١٠ سم. ثوبها ال السرة
الكتنية يملو توش مسنوب الزواكش اصفر اللون .
تركب الاقان والياتاق الحولية لتفني عليها . تمري

٣٠ سم. وتعرض من ٧ الى ١٠ ، ازهارها كبيرة حيلة ،
انوبها مطول من ١٥ الى ٣٥ سم. لونها ال الابيضاني
المليح بالاصفر || ازهارها يستمر نحو ٧ اسابيع
يشتغل في اواسط ايلول .

١٤٤٩٦ - سُوْرَجَانْ كَلِيْف

Colchicum amabile (S). *Colchique gracieux* (F).
نبات جاحج مهد الشوق . ودفسته صغيرة القند ،
اوراته خلية للتصل لبات الخصار . ازهارها نخيلة ،
مستطيلة الانبوب ، خفيفة القوية ، اهليلية التلات .
تلتها زباء البشرة الداخلية يملوها تحطيط وتيزع وبدي
وارجلاني || ازهارها يستمر طوال شهر ايلول .

١٤٤٩٧ - سُوْرَجَانْ مَرْزَنْ

Colchicum variegatum (S). *Colchique panaché* (F).
نبات مبروي مهد مروج وبرامي اليزان . ودفسته
معتدلة القند . اوراته متصبية تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم .
وتعرض من ٢٥ الى ٣٥ سم . ازهارها مستطيلة الانبوب
الايض اللون ، تلتها خلية البشرة ، وردية اللون ،
يملوها مواج اسر || ازهارها يستمر من آب الى ايلول .

١٤٤٩٨ - سُوْرَجَانْ كَلِيْف

Colchicaceae,
Melanthaceae (S). *Colchicaceae*, *Mélanthacées* (F).
Colchicaceae, *Melanthaceae* (E).

فضيلة نباتية من ذوات الغلظة تشلب السوذجان والمربوي
وفيرها .

١٤٤٩٩ - سُوْس ، عَرِكْسُوْس ، شَجَرَة السُوْس ،
وَلِكَلِيْس *Glycyrrhiza*, *Liquiritia* (S).

Régisse (F). *Liquorice plant* (E). *Süßholz* (D).
Regolizia (I).
جنس لباتات مخشوبة مسرة من فضيلة القرنيات القرشية .
انزله مهديه يفسها زراحي صناعي . تتميز باستطالة
جلوريا الجلمورية . اورانها متعاقبة مركبة وربة .
وريقاتها يغبية للتصل ، عابقة الخصار . ازهارها
سابل . التجسيم ، ابلي الانكاز . ازهارها صغيرة القند
لونها يختلف مع النوع ، فيها الايض والازرد والبنفسجي .
تأمرها قرن صغيرة مبطلة . بزورها مستديرة مقلطحة .
احرف واشهر انزله السوس الخنزري .

١٤٥٠٠ - سُوْس مَحْزَنْزِي ، عَرِكْسُوْس مَحْزَنْزِي

Glycyrrhiza glabra, *Liquiritia officinalis* (S). *Régisse*
officinalis (F).

جنية صغيرة تملو نحو ١٥٠ سم . جلوريا جلورية
معدة اسطوانية الشكل ، جرادتها سراء اللون ، لها اصفر ،
سكري الطم . مادته القمالة تسمى « ريسوس » وهو
مهل خفيف يناسب المرش والشرع والحوليل . يفتح
الصدر ويقي لكبة . مسحوته شائع الاستعمال الطبي
ويصنع منه شراب حرق السوس المستحب النافع .

١٤٥٠١ - سُوْمَة *Schizanthus* (S). *Schizanthus* (F).

جنس لباتات عشبية حولية او حولة من فضيلة الخنازريات
انزله ٨ جميعها ربيية . اورانها متعاقبة مركبة وريشية .
ازهارها منسي التجسيم ، تاجي الانكاز . ازهارها
حيلة الشكل ، مفرقة ، زاعية الالوان الشلعة || احرف
انزله واشهرها ما يلي .



سوس غزني



سوس ابيس



سوسة الارز



سوسة البرام



سوسة القنوب

جميع أنواع التوب والسنوبر || يرقاتها تعيش على الجملوح الملقومة اليابسة .

١٤٥١٠ - سوسة الجزر *

Liparus coronatus, *Molytus coronatus* (S), *Charançon de la carotte* (F), *Carrot weevil* (E).

حشرة من السوسيات طويلة براوح من ١٢ إلى ١٤ سم. ثوبها إلى المواد اللامع || يرقها صغيرة القدر سمراء اللون، سوداء الرأس . تركيب جلود الجزر فتقرضها وتؤذيها .

١٤٥١١ - سوسة الخطلة *

Calandra granaria (S), *Charançon du blé* (F), *Granary weevil* (E), *Kornkäfer* (D).

حشرة من السوسيات طويلة براوح من ٣ إلى ٤ سم. جسمها مستطيل الشكل . ثوبها إلى السمرة الخشبية . تقرض البر وتلتهم وقد تصيب السلت والشعير والده . يكثر وجودها في الأجرار والمخازن .

١٤٥١٢ - سوسة الزيتون *

Otiorynchus meridionalis (S), *Charançon de l'olivier* (F).

حشرة من السوسيات طويلة براوح من ٧ إلى ٨ سم. ثوبها إلى السوداء القمعي يملو حلب مبرق وصغير . أرجلها حمراء تركيب أوراق الزيتون فتقرض ساقه النصل || يرقها تعيش في التربة على جلود النباتات البرية .

١٤٥١٣ - سوسة الصليبيات *

Ceuthorrhynchus assimilis (S), *Ceuthorrhynchus des crucifères*, *Charançon de la rave* (F), *Turnip seed weevil* (E), *Kohlstotenrüßler* (D).

حشرة صغيرة من السوسيات طويلة نحو ٣ سم. جسمها يفيي للشكل ، حنطي اللون . تركيب ذرور الصليبيات اغصانها الفت والسلم والجرد والمخلوط .

١٤٥١٤ - سوسة القليل *

Lixus algeris (S), *Charançon de la fève* (F).

حشرة من السوسيات طويلة براوح من ١٣ إلى ٢٢ سم. لونها اسود لامع يملو مزاج حنطي || تركيب مع ريقها الاوراق والازهار والحبوب .

١٤٥١٥ - سوسة القرعة *

Amalorrhynchus melanarius (S), *Ceuthorrhynchus du cresson* (F).

حشرة صغيرة من السوسيات طويلة نحو ٥ سم. ثوبها إلى الحنطي اللامع يملو تجزير أحمل القرن مستطيل المخلوط ومتقرضها || تركيب أوراق القرعة وتمتص سبكها على الزهر ينفض عن ريقات تلثم الحرقينات والبروز .

١٤٥١٦ - سوسة الكاشم *

Otiorynchus ligustici (S), *Charançon de la livèche* (F).

حشرة من السوسيات طويلة براوح من ١٠ إلى ١٢ سم. ثوبها أغشى اللون ، اسفح المزاج || تركيب الكاشم وبعض النباتات الاخرى كالكرمة والكشندر والقمح حيث تقضم البرام والاوراق || يرقها تعيش في التربة على جلود النباتات .

١٤٥١٧ - سوسة الخندقة *

Otiorynchus sulcatus (S), *Charançon sillonné* (F), *Vine weevil* (E), *Dickmaulrüssler*, *Gefurchter* (D).

حشرة من السوسيات طويلة براوح من ٨ إلى ١٠ سم. ثوبها إلى السوداء القاتم يملو مزاج حنطي . زيانها زيا

الفاصول ، زفها ذهبي اللون . تركيب مخلف نباتات الخلفية والكرمة حيث تعيش على البرام . ريقها فتفك بالجلود وبقارص النباتات الزينية .

١٤٥١٨ - سوسل *

Schizandra (S), *Schizandre* (F).
جنس نباتات جنينة عارضة من فصيلة السوسيات . انواعها ١٢ منها البرية والزرينية . اوراثها عابطة متعاقبة متعقة ، ستانية . ازهارها ابطية او محورية الارتكاز || اشهر انواعها الزينية ما يلي .

١٤٥١٩ - سوسل البحر *

Schizandra rubriflora (S), *Schizandre rouge* (F).
جنينة سبروتية عارضة تطول من ٣ إلى ٥ امتار . اوراثها احليجية الشكل تطول نحو ١٥ سم . ازهارها عنقيد مستطيلة ، متعاقبة ، لونها إلى الحرة البنية || ازهارها يستمر طوال الصيف .

١٤٥٢٠ - سوسل الصين *

Schizandra chinensis (S), *Schizandre de Chine* (F).
جنينة سبروتية عارضة تطول من ٤ إلى ٦ امتار . اوراثها يفسية ذائقة ، نصلها سنن الحافة يطول نحو ٨ سم . ازهارها عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز ، مدينة البتلات ، من ٩ إلى ١٢ ، حرة العرف ، لونها إلى الحرة . ثمارها عنينة ، ليمزية اللون ، حامضة الطعم ، مأكولة || ازهارها يستمر من ايار إلى حزيران .

١٤٥٢١ - سوسل كبير الزهر *

Schizandra grandiflora (S), *Schizandre à grandes fleurs* (F).
جنينة جاذحة ، عارضة ، حلقية ، تطول من ٤ إلى ٦ امتار . اوراثها عارضة حلقية الشكل ، حادة التسنين . ازهارها كبيرة القدر ، عنقودية التجميع ، لونها إلى الحرة الوردية . ازهارها يستمر من نيسان إلى ايار .

١٤٥٢٢ - سوسل مرمرى *

Schizandra marmorata (S), *Schizandre marbré* (F).
جنينة عارضة حلقية تطول من ٤ إلى ٦ امتار . ريقها اسطوانية ، حراء اللون . اوراثها يفسية ، نصلها عاين الخفسار . امتانها جزوية . ازهارها صغيرة القدر مبرية ، متعاقبة || ازهارها يندم طوال شهر ايلول .

١٤٥٢٣ - سوسل هنري *

Schizandra henryi (S), *Schizandre de Henry* (F).
جنينة سبروتية عارضة تطول من ٣ إلى ٥ امتار . ريقها لثائية الاغصان الخفيفة . اوراثها احليجية ، ذائقة الزام الاخير . نصلها جيل الخفسار الزاوي ، قليل التسنين . ازهارها ابطية ، فردية ، كبيرة القدر ، مدينة البتلات ، يفساء اللون ، حرة الرائحة || ازهارها يستمر طوال الصيف .

١٤٥٢٤ - سوسليات *

Schizandraceae (S), *Schizandrées* (F), *Schizandraceae* (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مدينة القملات . اجناسها وانواعها المعروفة لا يتجاوز عددها ١٧ . جميعها نباتات جنينة عارضة . بعضها بري والبعض الآخر تربي . اوراثها عابطة ، متعاقبة ، متعقة ، ستانية اتصال الجميلة الخفسار . ازهارها محورية او ابطية الارتكاز ، الانثوي . سننيل التجميع ، أما الذكري فقروي . ازهارها صغيرة ،



سوسة الجزر سوسة الخطلة



سوسة الزيتون سوسة الصليبيات



سوسة القرعة سوسة القليل



سوسة الخندقة سوسة الكاشم



سوسل

أوراقه شيقة للتصل المحسن . أزهاره ثلاثية أو رباعية
التجميع تطلو نحو ٦ سم . قناتها متعاقبة لونها الى الصفار
البايت . بتلاتها الى الصفار الباقى يملو تعريق تنجسي
اللون ، حنطى المواج || أزهاره يستمر من نيسان
الى ايار .

Iris fulva (S).

١٤٥٣١ - سوسن أحمر

Iris brun-roux (F).

نبات جلمودي سبروتي يرغب في الأماكن الرطبة .
ساقه نحيلة تملو من ٦٥ الى ١٥٠ سم . أوراقها تطلو
نحو ١٥٠ سم . وتعرض في ٢ الى ٣ . أزهاره متوسطة القد ،
حامدة العروق والمرق . بتلاتها الخارجية والداخلية مستطيلة
اللون يملوا توشج تنجسي واخضر ، والداخلية منها
ثنائية التفصيص || أزهاره يستمر من حزيران الى
تموز .

Iris unguicularis (S).

١٤٥٣٢ - سوسن الجوزاكر

Iris à onglet (F).

نبات جلمودي حامد الساق ، وسيد الزهرة ، يرغب
في المراض الجنوبية والاماكن الدافئة . أوراقه عسقية
الشكل ، لتصلها جامد التجميع ، اخضر الصلحة العليا ،
بحري السفلى . زهرته مستطيلة الانبوب ، كبيرة القد ،
فواحة العروق ، بتلاتها الخارجية والداخلية الى البياضي
الزاهي . حنطها ابيض || أزهاره يستمر من كانون
الثاني الى نيسان .

١٤٥٣٣ - سوسن المتألم * ، برييت ، سيات

Iris pseudacorus (S). *Iris faux-acore*, l. des marais,
Fimbe d'eau (F). *Yellow Iris*, *Yellow water flag* (E).
Gelber schwertel, *Wasserschwertelilie* (D). *Iride*
gialla, *Spadella d'acqua* (I).

نبات جلمودي سبروتي يميل الى المواقع الرطبة
وحل مجاري الماء وصفاف الانهار . يملو من ٥٠ الى
٢٥٠ سم . أوراقه نصليّة الشكل ، بحرية التصل .
أزهاره كبيرة القد خافتة العروق حامدة المرق . بتلاتها
الخارجية والداخلية الى الصفار الزاهي يملو تعريق حنطى .
أزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

Iris tigré (F).

١٤٥٣٤ - سوسن أنمر

نبات قزوين من فصيلة السوسنيات مشهور باسم سوسنة ،
اطبا .

Iris pallida (S).

١٤٥٣٥ - سوسن باهت

Iris pâle (F).

نبات جلمودي سبروتي يملو من ٦٥ الى ١٥٠ سم .
ساقه نحيلة متطرفة ، شراناه ابيض اللون . قناتها
تقبل التبلج الزهر . أزهاره متوسطة القد ، حنطها ليموني
الرائحة . بتلاتها الخارجية والداخلية زرقاء اللون الباهت .
حنطها اصفر الانتشاب ، ابيض اللون || أزهاره
يستمر من ايار الى حزيران .

Iris halophila (S).

١٤٥٣٦ - سوسن بحري

Iris maritime (F).

نبات جلمودي سبروتي يرغب في المواقع الساحلية البحرية .
يملو من ٣٥ الى ٦٥ سم . أوراقه زياء التصل ، بحرية
اللون . أزهاره متوسطة القد حامدة المرق . بتلاتها الخارجية
بيضاء اللون ، برتقالية العنق ، بتلاتها الداخلية مرقعة
بالاصفر || أزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

ملونة ، الذكورية تحمل اربع بتلات والاثوية ثمانية ||
اشهر اجناسها السوسل الذي كان يعتبر في التصنيف
أسابق من فصيلة المفلوات .

١٤٥٣٥ - سوسن

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة السوسنيات انتواعه
زهاء ١٥٠٠ منظمها جلمودي وبهشما ديفسي . جمياتها
غلظية . أوراقها متعاقبة ، مثالية السطح ، لتصلها
مستطيل الصلحة متصل أو حصي الشكل . أزهارها
كبيرة القد ثلاثية الانقسام تتميز بانجرأتها الخارجية
المنخفضة الاطراف بينما الداخلية منتصبة وباتلامها
القضيرة التي تملوها سمات نامية ملونة || اشهر انواعه
الزراعية ما يتبع .

١٤٥٣٦ - سوسن أبيض * ، سوسن فلورنسة

Iris florentina (S).

Iris de Florence (F). *Florentine Iris*, *Orris-root*
plant (E). *Florentinische Iris*, *Velichschens-*
wertel (D). *Iris florentina*, *Giglio bianco* (I).

نبات جلمودي سبروتي مهله شرق العربي . يملو من
٦٥ الى ١٥٠ سم . أزهاره كبيرة القد ، فواحة العروق
الطرية . بتلاتها الخارجية بيضاء اللون ، زرق الرصاص ،
مرقها اسفر . بتلاتها الداخلية حامية البياض . جمياتها
مستطيلة وحيدة اللون الكبريتي || أزهاره يستمر من
نيسان الى حزيران . يستخرج من جذاميره مواد عطرية
نافحة ويستخلص من أزهاره مواد عطرية تشتغل في صناعة
الطيب .

Iris imberbis (S).

١٤٥٣٧ - سوسن أجرد

Iris imberbe (F).

نبات ديفسي جادح . مهله افريقية النشائية . ساقه تملو
من ٣٥ الى ٥٠ سم . أوراقه مستطيلة شبه اسطوانية .
أزهاره متوسطة القد ، صفراء اللون ، بتلاتها الخارجية
مستترة أما الداخلية فقضيرة ومغطوية || أزهاره يستمر
من ايار الى حزيران .

١٤٥٣٨ - سوسن إسباني *

Iris xiphium (S).

Iris d'Espagne (F).

نبات ديفسي جادح . ساقه تملو من ٣٥ الى ٦٥ سم .
أوراقه مستطيلة ، اسطوانية ، غندة بحرية اللون . أزهاره
كبيرة القد مستترة العروق . بتلاتها الخارجية الى الصفار
الزاهي ، بتلاتها الداخلية تنجسي اللون اللامع يملو مواج
أربواني || أزهاره يستمر من ايار الى تموز .

Iris lurida (S).

١٤٥٣٩ - سوسن أنمر

Iris brunstea (F).

نبات جلمودي سبروتي يملو من ٤٥ الى ٦٥ سم .
أزهاره كبيرة القد ، حار قناتها يجمع قبل التبلج
الزهر . بتلاتها الخارجية زرق القاطعة واقدام الاول ،
صفر سائر الصلحة للمقبة بالنجسي . مرقها اصفر
الجسم . اسود اللون . بتلاتها الداخلية صفر الانتشاب ،
زرق الصلحة تملوها رشفة جذوية || أزهاره يستمر
من ايار الى حزيران .

Iris lutescens (S).

١٤٥٤٠ - سوسن أصفر

Iris jauntre (F).

نبات جلمودي سبروتي يملو من ١٥ الى ٣٥ سم .



سوسن ابيض



سوسن اسباني



سوسن المتألم

١٤٥٣ - سَوَسَن رُوذْبَاح Iris rosenbachiana (S).

Iris de Rosenbach (F).

نبات دوفسي ، عادم الساق ، رطب . أوراقه قصيرة . أزهاره قليلة العدد . بتلاتها الخارجية زبدية الانتصاب ، بنفسجية الصفعة ، حامية الختار . بتلاتها الداخلية إلى البنفسجي الباقين ، يملو تجنيز برتقالي || أزهاره يسمر من شباط إلى آذار .

١٤٥٤ - سَوَسَن سِينْجَار Iris sindjariana (S).

Iris du Sindjar (F).

نبات دوفسي جادح . مهد جزيرة ابن حامر . ساقه قصيرة تملو نحو ١٠ سم . أوراقه جيلة الخضار الزاهي . أزهاره كبيرة القند ، خافتة البرق . بتلاتها الخارجية زرقاء اللون ، صفراء الحرق ، بتلاتها الداخلية اعليجية الشكل سمجوتية اللون || أزهاره يسمر من آذار إلى نيسان .

١٤٥٥ - سَوَسَن سُورِي Iris lortetii (S).

Iris de Lortet (F).

نبات جلمودي سبروتي مهد الجبال اللبنانية السورية . يملو من ٢٥ إلى ٤٥ سم . أزهاره متوسطة القند خافتة البرق ، بتلاتها الخارجية إلى الزرقاء السهوية للنمشة والمرقة بالجزء بالجزء . مرقتها ذهبي اللون . بتلاتها الداخلية وردية يملوها تمرير بنفسجي || أزهاره يدم طول شهر ايار .

١٤٥٦ - سَوَسَن سِيْبِرِيَّة Iris sibirica (S).

Iris de Sibérie (F).

نبات جلمودي سبروتي رطب في المناطق الباردة . ساقه اسطوانية جفاه تملو من ٥٥ إلى ١٠٠ سم . أوراقه انشامية حراء اللون ثم تستقر عند اكتمال نموها حل الاخضر الباقين . أزهاره صغيرة القد سميكة الزواجر . قناباتها مدوية ، بتلاتها متدوية الشكل ، الخارجية منها يضاء البياض تشوها زرقاء زاهية ، والداخلية إلى الزرقاء البنفسجية . غروبها الزراعية عديدة ، فأزهارها الباقيا || أزهاره يسمر من ايار إلى حزيران .

١٤٥٧ - سَوَسَن شَكَلْب Iris versicolor (S).

Iris versicolore (F).

نبات جلمودي سبروتي مهد أمريكا الشمالية . يملو من ٣٥ إلى ٦٥ سم . أوراقه زاه انتصب . أزهاره كبيرة القند عادية اللون والمرق . بتلاتها الخارجية يضيء الشكل بنفسجية اللون حامية الوسط . بتلاتها الداخلية وردية ارجوانية او يضاء اللون || أزهاره يسمر من ايار إلى حزيران .

١٤٥٨ - سَوَسَن شَبَكِي Iris reticulata (S).

Iris réticulée (F).

نبات دوفسي جادح . غروبها الآريزية عديدة فوارقها بالوانها واسطالة انايبها . سيقانها اريية او شديدة القص . أزهارها كبيرة القند عادية اللون والمرق . بتلاتها الخارجية يضيء الشكل بنفسجية اللون حامية الوسط . بتلاتها الداخلية وردية ارجوانية او يضاء اللون || أزهاره يسمر من ايار إلى حزيران .

١٤٥٩ - سَوَسَن شَوْشَان Iris sustiana (S).

Iris de Suse, l. douli, l. tigré, l. crapaud (F).

نبات جلمودي رطب مهد بلاد فارس . يملو من ١٥ إلى ٥٥ سم . أزهاره كبيرة القند عادية البرق . بتلاتها

١٤٥٣٧ - سَوَسَن بَصَكِي ، سَوَسَن دَوْقَمِي ،

Iris asyriacum (S).

نبات دوفسي جادح مهد حوض البحر المتوسط . ساقه تملو من ١٠ إلى ٣٠ سم . أوراقه خفيفة ، منبسطة . أزهاره صغيرة القد . اسديتها ملتحة الاقدام ، لوناً إلى الزرقاء الليمونية بتلاتها الخارجية موشحة بالاصفر . أزهاره يسمر من نيسان إلى ايار .

١٤٥٣٨ - سَوَسَن بِيْرْمَرْك Iris bismarkiana (S).

Iris de Bismarck (F).

نبات جلمودي سبروتي مهد الشرق الاوسط . يملو من ٣٠ إلى ٤٥ سم . أزهاره متوسطة القند عادية البرق ، بتلاتها الخارجية إلى الصفرة المنسقة والمرقة بالجزء يتوسطها بقعة كستية . مرقتها اصفر اللون . بتلاتها الداخلية إلى البياض الزهري يملوها تمرير أزرق . أزهاره يدم طول شهر ايار .

١٤٥٣٩ - سَوَسَن بُورُوس Iris teurti (S).

Iris du Taurus (F).

نبات دوفسي جادح . مهد جبال تورس . أزهاره صغيرة القند ، ضيقة النصل ، فتحة الخضار . أزهاره متوسطة الحجم . بتلاتها اعليجية الشكل ملوكة . صفحتها العليا لليمونية اللون يملوها تجنيز ابيض ، صفحتها السفلى إلى الخضار الباهت || أزهاره يدم طول شهر نيسان .

١٤٥٤٠ - سَوَسَن جِرْمَانِي * ، كَفَّ الصَّبَاغ Iris germanica (S).

Iris d'Allemagne, Flambe, Flamme, Iris des jardins, Iris armes de France, Glaieul bleu (F). German Iris, Blue Flower de Luca (E). Deutsche Iris, Blaue Iris, Schwertlilien (D). Iris germanica, Giglio celeste azzurro (I).

نبات جلمودي سبروتي لاقامي الشكل والانتظام يملو من ٦٥ إلى ١٠٠ سم . ثمران أزهاره ثني اللون بنفسجي الرصاص . أزهاره كبيرة القند ، حطرية اللون . بتلاتها الخارجية بنفسجية ، مرقتها اصفر . بتلاتها الداخلية إلى الزرقاء الزاهية ، ساقها مستقيمة ملونة || أزهاره يدم طول شهر آب . جذورها طيبة . أزهاره صناعية كالسوسن الابيض .

١٤٥٤١ - سَوَسَن خَشَاش Iris humilis (S).

Iris humble (F).

نبات جلمودي سبروتي عادم الساق . وحيد الزمرة . أوراقه صفحية الشكل ، ضيقة ، مستطيلة ، جامدة انصل الباهت الخضار . زهرته لليمونية اللون الزاهي . بتلاتها الداخلية لسالية الشكل ، اما الخارجية فاعليجية . أزهاره يسمر من نيسان إلى ايار .

١٤٥٤٢ - سَوَسَن خَشَمَاتِي العَرَف Iris sambudica (S).

Iris à odeur de saureau (F).

نبات جلمودي سبروتي يملو من ٤٥ إلى ٦٥ سم . حصار قناباته يبيع قبل انبلاج الزهر . أزهاره كبيرة القند ، خاتية اللون الفواح . بتلاتها الخارجية تملو نحو ٦ سم . صفحتها زرقاء اللون يملوها تجنيز ابيض وارجواني . مرقتها اصفر . بتلاتها الداخلية جمدة الصفعة ، صفراء اللون ، يملوها تجنيز بنفسجي وولج اسفح || أزهاره يسمر من ايار إلى حزيران .



سَوَسَن جِرْمَانِي



سَوَسَن سِيْبِرِيَّة



سَوَسَن شَبَكِي

الزيتونية حديثة. يملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. اورثه زياه النصل البحري اللون. ازهاره متوسطة القد، متعددة الالوان، بتلاتها ملوكة الشكل، حنطية الحار، حاملة المرق || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

١٤٥٥٧ - سَوَسَن مَشْنَن * قَسْوَس

Iris foetidissima (S). *Iris fetida*, l. gilot, l. à l'ail, Xyrin plant (F). Gladdon, Gladwin, Stinkingiris, Roast-beef plant (E). Korallenschwertel, Stinkende Iris (D). *Iris fetida*, *Fiamma fetida*, *Ricottaris* (I).

نبات جلمودي سبروتي يرغب في المواقع الظليلة. يملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه مفصلة. لوراته متصلة الشكل، نصلها بأهد الخضار، متن الرائحة عند الفرك. ازهاره متوسطة القد حاملة المرق. بتلاتها الخارجية ضيقة الصلصة، زرقاء اللون. بتلاتها الداخلية الى الصفار الموشح بالبنفسجي || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

١٤٥٥٨ - سَوَسَن مَهْدَب

Iris japonica (S). *Iris frangé* (F).

نبات جلمودي سبروتي مهد الصين واليابان. يملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. اوراته حيلة الخضار الزاهي الالام. ازهاره صغيرة القد، حاملة العرف والمارق. بتلاتها الخارجية مهدبة الحار، ليلكية اللون، موشحة بالابيض والاصفر. بتلاتها الداخلية موية اللون اليلكي الزاهي. ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

١٤٥٥٩ - سَوَسَن مَوْشَح

Iris variegata (S). *Iris panaché* (F).

نبات جلمودي سبروتي حديد الضروب الزراعية. يملو من ٣٠ إلى ٦٥ سم. ازهاره عديدة متوسطة القد، قنابها خضراء اللون. بتلاتها الخارجية الازرقية الى الصفار بالبنفسجي، مرقها حنطي. بتلاتها الداخلية الى الصفار. ازهاره يذوم طولك شهر ايار.

١٤٥٦٠ - سَوَسَن تَجِيلِي الْوَرَق

Iris graminea (S). *Iris à feuilles de gramin, l. avoine* (F).

نبات جلمودي سبروتي يملو من ١٠ إلى ٣٠ سم. اوراته صغيفة الشكل، جامدة النصل، بحرية اللون، تطول من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ازهاره متوسطة القد. بتلاتها الخارجية وللداخلية مستدرة الشكل، كبيرة الظفير لونها الى البنفسجي الموشح بالاصفر || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران.

١٤٥٦١ - سَوَسِنَات

Iridaceae, Iridae (S). *Iridaceae, Iridées* (F). *Iridaceae, Iridae* (E).

فصيلة نباتية من وصيدات الفللة، اجناسها وانواعها كثيرة المد. اشهرها السوسن والزعفران والديلوث الخ.

١٤٥٦٢ - سَوَسِي

هو القوقان الحزني، الحلبه.

١٤٥٦٣ - سَوَسِنَات

Curculionidae (S). *Curculionidae, Rhynchophores, Charançons* (F). *Weevils* (E). *Rüsselkäfer* (D).

فصيلة شحات من رتبة حنطيات الاجنسة. عوارثها واجناسها وانواعها المنودة حتى الان زعاج ٥٠٠٠٠٠. جميعها صغيرة القد. رؤوسها عظيمة الشكل لتتبي منك قاضم قلب. قرونها الاستشارية صولبانية أو مرقية. فواصلها تراوح من ١٠ إلى ١٢. ارساغها خاسية التكون، رباحية المظهر || مكنا صغير الحجم، كروي الشكل تحتمه الاثني فروديا في ثوب تعددا

الخارجية وللداخلية ودية اللون ملعلاء الرخاض يملعوا تجرع وتنشئ اسره، وتوسط الخارجية منها بقسح فصيلة قسبية السواد || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار.

١٤٥٥٠ - سَوَسَن شَبَقِ الْوَرَق

Iris stanophylla (S). *Iris à feuilles étroites* (F).

نبات دوقسي جاح. مهد الشرق الاوسط. ساقه اثرية. اوراته ضيقة النصل. ازهاره كبيرة القد بنفسجية او زرقاء اللون يملعوا ترشح عابث شديدة البسة || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان.

١٤٥٥١ - سَوَسَن طَنْجَمَة

Iris tingitana (S). *Iris de Tanger* (F).

نبات دوقسي جاح. مهد افريقية الشالية. ساقه رفيعة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. اوراته صغيفة الشكل والنصل. ازهاره كبيرة القد، بتلاتها متساوية الحجم، بنفسجية اللون يملعوا في صلتها بقع صفر || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان.

١٤٥٥٢ - سَوَسَن عَكْرَبِي

Iris plantifolia (S). *Iris scorpion* (F).

نبات دوقسي جاح. ضروب الزيتونية حديثة، تميزها يرتكز على قد الشراخ ولون الزهرة || شاربعتها الزهرية تملو من ٨ إلى ١٥ سم. ازهارها كبيرة القد، فواصة العرف المطر، بتلاتها ليلكية اللون الزاهي الالام. اصنافها الى الصغرة. اوراتها صغيفة الشكل، جامدة النسيج، تطول نحو ٣٠ سم. || ازهاره يستمر من كانون الاوّل الى اذار.

١٤٥٥٣ - سَوَسَن قَارِي

Iris persica (S). *Iris de Perse* (F).

نبات دوقسي جاح. مهد بلاد فارس. ساقه اثرية. اوراته صغيرة وقصيرة. ازهاره كبيرة القد، فواصة العرف البنفسجي. البويها يطول نحو ٦ سم. بتلاتها الخارجية ليلكية اللون، شمرة الحار الازرق. بتلاتها الداخلية صغيرة القد حنطية اللون || ازهاره يذوم طولك شهر اذار.

١٤٥٥٤ - سَوَسَن لَقْم

Iris pumila (S). *Iris pygmée* (F).

نبات جلمودي سبروتي حديد الضروب الزراعية. يملو من ١٠ إلى ١٥ سم. اوراته ضيقة النصل البحري اللون. زهرته وسيدة تطول نحو ٢٥ سم. قنابها عالميا بنفسجية بتلاتها ملوكة تختلف مع الضروب. مرقها ازرق الجسم اصفر الطرف || ازهاره يستمر من اذار الى ايار.

١٤٥٥٥ - سَوَسَن مَهْدَب

Iris aurea (S). *Iris doré* (F).

نبات جلمودي سبروتي يرغب في المناطق الجبلية. يملو من ١٠٠ إلى ١٢٠ سم. اوراته زياه النصل لونها الى الخضار الباهت. ازهاره كبيرة القد، شاربها اخضر. بتلاتها الخارجية يضيئة الشكل، حنطية الحار، ملحية اللون. بتلاتها الداخلية سنانة الصلصة، زاهية الصفار الاصل || ازهاره يذوم طولك شهر حزيران.

١٤٥٥٦ - سَوَسَن مَلَوَكِي

Iris spatulata (S). *Iris an spatule* (F).

نبات جلمودي سبروتي ميلو في المروج الرطبة ضروب



سوسن مشن

Pied du champignon (F). **سَوْتِجَ ١٤٥٧٤**

Tigel of mushroom (E).
السوقة من الفطر والطراثيم ما كان أسفل الكتمة وقد يؤم مقام الساق في النبات ويعرف أيضاً بالفزروج.

Foire des bestiaux (F). **سَوْتِجَ الْخَوَاتِي ١٤٥٧٥**

Cattle-fair (E).
سوق يجتمع فيها أناس في أيام مملوكة لبيع وشراء اللحية.

Aloë (S). **سَوْتِجَ ١٤٥٧٦**

Aloë (F), Aloes (E), Aloe (D), Aloe (I).
جنس نباتات لحية ممررة من فصيلة الزنبقيات. أنواعه عديدة بعضها عديم الرائحة. أوراقها خضراء، مستطيلة النصل، ضيقة التجميع. أزهارها عنقودية يصلحها شربها بسيط أو مشعشع. يستخرج من أوراق بعض أنواعه صمارة طيبة مرة الطعم، مذهبها القلابة تدعى سورلين (Aloïne) مشهورة الاستعمال الطبي. || أعراف وأشهر أنواعه ما يلي

Aloë africana (S). **سَوْتِجَ الْإِثْرِي ١٤٥٧٧**

Aloë africana (F).
شجرة تملو من ٦ إلى ٧ أمتار. ساقها عديمة الأوراق. أوراقها تطول من ٤٥ إلى ٦٠ سم. نصلها باهت الخضار، شائك الحافة والمقمة. || أزهارها عنقودية لينة تطول نحو ٣٠ سم. لونها إلى الصفرة الزاهية. || أزهارها يستمر من آذار إلى نيسان.

Aloë glauca (S). **سَوْتِجَ بَحْرِي الْبَن ١٤٥٧٨**

Aloë glauca (F).
نبات عديم الساق. شراخه الزهري يملو نحو ٣٠ سم. أزهارها عنقودية التجميع، وردية اللون، يملو موج قريزي. || أوراقها تطول نحو ٢٠ سم. نصلها بحري اللون، ذلك الزم أبيض، عديم الحشف، أسود للشام القصير. || أزهارها صفي.

Aloë zaponaria (S). **سَوْتِجَ عَرِيضِ الْوَرَقِ ١٤٥٧٩**

Aloë à larges feuilles (F).
نبات عديم الساق. شراخه الزهري يملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أزهارها حلقة التجميع كبيرة الله، جميلة الحمرة الزاهية. || أوراقها مستطيلة، مسطرفة، نصلها باهت الخضار يملو بحري أبيض، حبات شائك الحافة، مذهب الطرف الحاد الشام. || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

Aloë arborescens (S). **سَوْتِجَ الْقَرْنِ الْكَبِيرِ ١٤٥٨٠**

Aloë cornu de beller (F).
جنية تملو من ٤٥٠ إلى ٥٠٠ سم. ساقها منتصبة مشعبة الفروع. || أوراقها مستطيلة على الباق بين النظام. نصلها مخمّن النسيج، بحري الخضار، يطول من ٤٥ إلى ٦٠ سم. صفته محبة، حارّة الانتزاع على شكل قرن الكبش. || أزهارها عنقودية لينة لونها إلى الحمرة المربانية. || الأزهار يدوم من كانون الأول إلى آذار.

Aloë brevifolia (S). **سَوْتِجَ قَصِيرِ الْوَرَقِ ١٤٥٨١**

Aloë à feuilles courtes (F).
نبات عديم الساق يربح في الملقح اللذات. || أوراقها تطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم. نصلها إلى الخضار الأزرق، أحشف الحافة، مذهب المقمة، مستطيل الشام. || شراخه الزهري يملو نحو ٣٠ سم. أزهارها حمر تطول نحو ٤ سم. || أزهارها صفي.



سورلين



سورلين بحري اللون

لاحتضانه || يرقاها حديد الارجل، مقحة، مدية الطرف. تيش على غفلت الاضمار والمواد النباتية والعضوية.

Flagelliforme (F). **سَوْتِجَ ١٤٥٦٤**

Flagelliform (E).
نمت تعريفي يطلن على ما كان كالسوط شكل ولذات

Flagella (S). **سَوْتِجَ ١٤٥٦٥**

Flagellés (F), Flagella (E).
شعبة حيوانات ديا وسيدات الخلية من صف النقبات.

Enflagella (S). **سَوْتِجَ أَصْلِيَّة ١٤٥٦٦**

Enflagellés (F), Enflagella (E).
رتبة حيوانات دنيا من السوطيات.

Rhizoflagella (S). **سَوْتِجَ جَدْرِيَّة ١٤٥٦٧**

Rhizoflagellés (F), Rhizoflagella (E).
رتبة حيوانات مجهرية من السوطيات.

Cystoflagella (S). **سَوْتِجَ مَكَلِيَّة ١٤٥٦٨**

Cystoflagellés (F), Cystoflagella (E).
رتبة حيوانات دنيا من السوطيات.

Choanoflagella (S). **سَوْتِجَ مُطَوَّرَكَة ١٤٥٦٩**

Choanoflagellés (F), Choanoflagella (E).
رتبة حيوانات مجهرية من السوطيات.

Marché (F). **سَوْتِجَ ١٤٥٧١**

Market, Market-place (E).
هو المكان الذي تباع فيه الحيوانات والخاصيل الزراعية فتقول سوق الخيل وأشم والخضر والزهر ...

Halle, Marché des légumes (F). **سَوْتِجَ الْبُخْشَر ١٤٥٧٢**

Market-hall (E).
سوق تباع فيها البقول والخضراوات والفواكه.

Laburnum (S). **سَوْتِجَ ١٤٥٧٣**

Aubour (F).
جنس شجيرات ونباتات برية وزييلية من فصيلة البقوليات القراشية. أنواعه عديدة بعضها سرورية. || أوراقها عايلة، مركبة، ثلاثية الورديات. || أزهارها حلورية الرائحة، عنقودية التجميع، طويلة الخالق، متدلية || أشهر أنواعه المسمى الشائع المعروف بالانثوس الكاذب، أصله.

Solena (S).

* ١٤٥٨٩ - سولن

Solen (F). Solena (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم
وخصلة السولنيات. أنواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في
جميع بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جسمه اسطوئي الشكل
مستطيل تلحفه صدقة بالقرب مشطوة المؤخر المنفرج .
يمش مشطاً عمودياً في الرمال المقصورة بالماء || لحمه جيد
الصنف مرغوب فيه .

Solénidae (S).

* ١٤٥٩٠ - سولنيدات

Solénidae (F). Solénidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم .
اجناسها وأواعها قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم ||
اجسامها مستطيلة ، أرجلها اسطوانية ، أصلها شبه
عديدة الشكل ، ثنائية المصارع المتساوية || أعراف
اجناسها وأشهرها السولن .

Fagaceae (S).

* ١٤٥٩١ - فوغيكيات

Fagaceae (F). Fagaceae (E).

هي فصيلة السنبليات من ذوات الفلقتين العديات
الغلات . تشمل السنديان وإلزان والكسنة .

Eurygaster integriceps.

* ١٤٥٩٢ - سولكة

E. maurus (S). Souné, Sen (F). Soun pest (E).
Asiatique Getreidewanze (D).

وتسمى أيضاً بقسمة الزرع . حشرة خاد من فصيلة
الافاسيات . طولها براوح من ٨ الى ١٢ م . جسمها
مفلطح الشكل مسطح . ظهرها مجهز بخرس صفيحة درقية
الشكل لونها الى الصفار الازرق تملوه خطوط مستطيلة قليلة
الوضوح ويكتنف جليتان عند انتباهه || موطنها بلاد
الشرق الأدنى ، تركب الحفلة والشعر وتوقع بها اشد
الاذى لانها تمص السقم تخضع الاسباب ويسبب الذبول .
تظهر الحشرة الكاملة في اواخر نيسان ثم تتزاوج بعد
ظهورها باسبوع . كويها يدمم يضع سادات . وبعد كويها
باربعة ايام تمتح الاثى مكها الصغير ، الكروي الشكل ،
الاذير اللون ، حل صفحات المصنف العليا ، لطفاً
متساوية براوح عندها من ١٢ الى ١٤ وكل لطفة
تحتوي من ١٢ الى ١٤ مكنة تنفخ ، بعد متنها ينمو
١٠ ايام ، من يرقات دقيقة تبلغ طولها الحشري بعد
انقضاء أربعة أسابيع تكون غلظاً قد مرت باربعة
انسلخات || والسوة خاد في جميع ادوارها لا سيما
في الدور الحشري . تكافح لما يستهلك اسد الحوشر
الفعالة تمفيرا حل الزرع فيفشي عليها بكاملها . وأما
بحرها بعد جمعها ضمن احباب خاصة تستعمل لهذه الغاية .
ومن الطرق الناجمة استبدال انواع الحفلة البلدية بانواع
باكورية تمكن الزرع من الاسباب والمهج قبل ان تستكن
من الحشرة .

* ١٤٥٩٣ - سوليد الفصية * ليفريل الفصية

Colaspidea atrum (S). Négril de la luzerna, Colaspide, Colaspide, Babotte noire (F). Luzerna grub (E). Colaspidea atrum (D).

حشرة من التفريل من فصيلة التفريليات جسمها بيضي
شكله كحطب الطهر . طولها براوح من ٤ الى ٦ م .
لونها الى السواد اللامع . تمتح مكها حل الفصة فيتم
من يرقات تلثم الارواق || تظهر في نيسان وتستر
الى ايلول . تكافح بامتلاك الريتينون .

Aloë officinal

* ١٤٥٨٧ - سولك غزني

يمرف بالالوة ، اطلها .

Aloë stricta (S).

* ١٤٥٨٣ - سولك مُحَطَّط

Aloë strict (F).

نبات حاد الساق شراخه الزهري يطول من ٤ الى ٦٠
سم . ازهاره مظلية التجميع ، حمراء اللون . اوراقه قليل
من ٤ الى ٦٠ سم . أصلها ثخين التجميع ، حاد الحشف ،
عظمت الصلصة . عطلوها بتاجعة لونها الى الجوزية .
ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

Aloë plicatilis (S).

* ١٤٥٨٤ - سولك مِرْوَحِي

Aloë éventail (F).

جنية تطل من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها متعاقبة ،
ثنائية التصفيف ، مروحية الهيئة ، تصلها بطول من
٢ الى ٤٠ سم . لونه الى الخضرة البحرية . حذارة مسن
الحافة . استانه نخيلة ، يضاء اللون . ازهاره ورقالية ||
متوسطة القد ، طولها براوح من ٤ الى ٥ سم . || ازهاره
يستمر من ايار الى حزيران .

* ١٤٥٨٥ - سولك مُسْتَن

Aloë grandidentata (S).

Aloë à grandes dents (F).

نبات قادم الساق ، شراخه الزهري يطول من ٣٠ الى
٤٠ سم . ازهاره مستطيلة الشكل برقالية اللون || اوراقه
تطل من ٣٠ الى ٥٠ سم وتعرض نحو ٧ تصلها قليل
التضيق يتلوه انضمار الازرق ، مسن الحافة ،
شاذلة الانسان الحادة المتعاقبة || ازهاره يستمر من
حزيران الى تموز .

Aloë ciliaris (S).

* ١٤٥٨٦ - سولك مُهْدَب

Aloë cilié (F).

جنية سرعية نخيلة الساق المستطيلة التي تطل نحو ١٠
اشار . اوراقها خيفة التصل الذي يطول من ١٠ الى
١٥ سم . ويعرض نحو ٣ سم . حذارة مهدب الحافة حسنة
ابيض اللون || ازهاره عتقوية التجميع لونها الى الحمرة
الزاهية اللامعة || ازهاره يستمر من آذار الى حزيران .

Torekia (S).

* ١٤٥٨٧ - سولم

Térékie (F). Torekia (E).

جنس طير من طول الساق وخصلة الزرقايات . انواعه
المعروفة ثلاثة جميعها من الصوارب القاطرة مشاعا البلاد
الحارة الاسيوية والافريقية ، مصيغها البلاد المعتدلة الحرارة
من آسية الشمالية الى اوروبا || اعراف انواعه وأشهرها
السولة الشهاب .

* ١٤٥٨٨ - سولمكة شهباء

Torekia cinerea (S). Térékie gris (F).

طائر من السولم قريب الشبه من البوقية السلطانية . جسمه
متوسط القد ، منبر الرأس ، مستطيل المخاد النقي
التليل الانتفاخ . رأسه وظهوره وبنجاءه وذنبه الى الكهبة
الشهاب . زوره وصفته وجوشه وبعته واتنيكه الى الشهباء
البيضاء المواج . ذنبه غزولي الشكل ، قصير . سادات
الى السرة المظلمة || قوته الاضباب والبروز والحشرات .
انتفا تثن منها في انموس تقويه بين الاضباب التجيلية
المستطيلة القليلة البعد من الماء . حشفتها اروع يضاء .



سولك محطط



سولة شهاب



سولن



سولمة



سوليد الفصية

تتميز باستطاعة الفك الأمامي التي ينتهي بمشط صلب ،
ستقبل الجرم ، منبسط الطرف . وتتميز أيضاً بجمرة
انتقالها التي تبلغ نحو ١٠٠ كيلومتر بالساعة .

١٤٦٠٧ - سِيَانِيَّة
Par série (F).
From series, Standardized (E).
هو في البرق الاقتصادي الانتاج الآلي بالجملة .

١٤٦٠٨ - سِيَال
Sial (F). Sial (E).
اسم اصطلاحي يطلق على القشرة الأرضية الجمامدة المكونة
بمطعمها من صخور صوانية وبازلتية ، تقدر سماكتها بنحو
٩٠ كيلومتر ، تلاف الطعن فيه المانع الذي يعنى سيمه .

١٤٦٠٩ - سِيَالَة
هي السط الامناع شجرة لها ذوك ابيض طويل لذا نزع
مال منه ومن تلك صفاة لبني طية . ج سبال .

١٤٦١٠ - سِيَالَة
Fascie, Liste en tête (F).
السيلة والسائلة شبة مستطيلة الشكل كالقند .

١٤٦١١ - سِيَانِكَا
Siamang
هو الجبين السند كليل ، اطليه .

١٤٦١٢ - سِيَانِيَامِيد
Cianamide, Cyanamide
السياناميد او الكلس الازوتي من الاصمدة الكبرية
التركيبية التي يستحصل عليها بتثبيت الازوت الجوي
على كربور ، الكلسيم . اشكاله التجارية الشائعة
الاستعمال ثلاثة :

١ - السياناميد المبرغل . يحوي من ٢٠ الى ٢٤٪
ازوت مع ٧٠٪ كلس . حبيباته سوداء اللون ، ثوبية
الرائحة .

٢ - السياناميد المسحوق للزيت . يحوي من ١٨
الى ٢٠٪ ازوت مع ٩٠٪ كلس ويضاف اليه نحو
٢٪ من الزيت للمدلى تسهيل لثمة . مسحوق اسود اللون ،
دهني الملمس ، ثوبى الرائحة .

٣ - السياناميد الموزلي او نيتراسياناميد . يحوي ١١٠٪
ازوت اميدي و ١٠٥٪ ازوت نيتريكي . نوح كروي
الحبوب ، حاد الرائحة . اسود اللون .

١٤٦١٣ - سِيَانِيَلَة
Cyanella (F). Cyanella (E).
جنس نباتات جنمووية برية وحرثية من فصيلة الزنبقيات.
انواعها المروفة ستة منها بعض مناطق افريقية الجنوبية ||
جلانديرا دودية او دوفسية . سوطها شراعية فراء . اوراقها
حاجسة ، مستطيلة ، متعاقبة ، زاهية الخضار . ازهارها
عقودية التجميع . ازهارها صغيرة جميلة ، زرقاء اللون او
صفراء || تزور في المازكن انما تنضج البرية .

١٤٦١٤ - سِيَانُوجِين
Cyanogène (F). Cyanogen (E).
غاز شديد التفاعلية قتال مركب من الكبريت والازوت .

١٤٦١٥ - سِيَانُور
Cyanure (F).
اتحاد السيانوجين مع جسم بسيط .

١٤٦١٦ - سِيَانُطُس
Ceanothus (S).
Ceanothus, Ceanous (F). Blue tea bush, Red root
tree (E). Säckelblume (D). Ceanoto (I).
جنس نباتات برية وحرثية من فصيلة النبقيات . انواعه

١٤٥٩٤ - سُوَيْدَاهُ

Albumen, Albumina, Endosperma, Périsperme (F).
Albumen, Albumin, Endosperm, Perisperm (E).
مادة نشوية او دهنية او آسية تكون في البزرة تحتلي
مها للملحقة .

١٤٥٩٥ - سُوَيْدَاة
هي الدلو ، اطليه .

١٤٥٩٦ - سُوَيْقُ سَفْطِي
Hypocotyle (F).
Hypocotyl (E).
هو الجزء السفلي من الجنين مركزه بين السنج والفلتين .

١٤٥٩٧ - سُوَيْقُ عَشْقَرِي
Epicotyle, Tigelle (F).
Epicotyl (E).
هو الجزء الامل من الجنين مركزه فوق الفلتش ونوق
الفلتين تحمّل الباق من نمو .

١٤٥٩٨ - سُوَيْمَكْتَة
Phlebocome (F).
هي السمكة نوع من البوض الصنبر الساكت .

١٤٥٩٩ - سَوِيل
Egal, Pareil (F). Equal, Like (E).
السرل او المديل .

١٤٦٠٠ - سِيَانَج وَشَيْع
Hale (F). Hedge (E).
فاصل من اشجار او جنبات حية يفصل الحديقة او
الحقل من غيرها .

١٤٦٠١ - سِيَانَاة
Planète (F). Planet (E).
السيارة او الكوكب السيار جرم فضائي كبير القدر
يدور حول الشمس ويسمى منها النور كالارض وضارة
والمرعب والشمسي ...

١٤٦٠٢ - سِيَانَج
Ben (F).
هو ابان ، اطليه .

١٤٦٠٣ - سِيَانَف
هو سون المنافع ، اطليه .

١٤٦٠٤ - سِيَانَف الْبَحْر
Xiphias (S).
Espadon (F). Swordfish (E).
جنس اسماك بحرية كبيرة القد من فصيلة الاسقمريات .
انواعه مدينة يكثر وجودها في بحار المناطق الحارة .
تتميز باستطاعة حطب فكها الامل الذي يدور كالسيف .
اشهر انواعها سياف البحر للمروء .

١٤٦٠٥ - سِيَانَف الْبَحْر الْمَعْرُوف
Xiphias gladius (S). Espadon commun, Poisson
épée (F). Common swordfish (E).
نوع من سياف البحر كبير الجثة والسيف والزئفسنة
الظهورية . طوله يبلغ حدة امتار . موطنه المتوسط
والاطلي .

١٤٦٠٦ - سِيَانِيَات
Xiphidae (S).
Xiphidae (F). Xiphidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من رتبة شائكات الزعانف كانت في
التصنيف الماضي من توابع فصيلة الاسقمريات || انواعها

المروفة قليلة العدد اشهرها سياف البحر والرماح والسارية .
جميعها من الاسماك البنية التي لا تقترب كثيراً من المياه
والساحل || موطنها بحار البلاد الحارة غير انها لا تمتنع
من تغيب اسراب الزئفة والسردين حتى في بحار البلاد
المعتدلة الحرارة || اجسامها كبيرة القد وشمية الشكل .



سياف البحر للمروء



سيانلة

الاحنة . وهي صورة ريبيل قائم على رجله اليسرى وقد رفع رجله اليمنى ويده اليمنى فوق رأسه ويده اليسرى رأس فؤاد .
حده تجوهرها . ٩٩ أشهرها « المرقق » و « رأس الفؤاد »
و « عاتق الثريا » .

Pommier (F).

١٤٦٢٤ - صَيْبُ

هو التفاح ، الحلب .

١٤٦٢٥ - سَيْتْرِيسُ الزَّوْرَجُ *

Scythris temperatella (S).

فراشة صتيرة اللند من فصيلة الباتريات ثورجا إلى السمرة اللدانة . اجتمعتها هدية الاطراف . زياتهاا عبيطان مستطيلان . جيلها الحولي واحد . رقبها تدعى دودة الزرع ، الحلبا .

١٤٦٢٦ - سَيْكْسُسْ هو الزران ، الحلب .

١٤٦٢٧ - سَيْفُورْ * ، فُكْمَةُ مُتَوَجِّة *

Cystophora (S). Cystophora, Phoque & capuchon (F). Hooded seal (E).

سيران بحري لبين من فصيلة الفقديات . اصطنه مجاح بحار البلاد الباردة من التروج الى القطب والارض الجديدة || طوله نحو ثلاثة امتار . قوته الى السواد الارزق المخرج تلوذ رقبته يضاء . رأسه اطرافه سود . يتميز الذكر عرجا فياجة تلوذ الرأس فزيده تيجا || الاثني تقصع جيرا واحدا في الحول . ابيض اللون ثم يسمر مع العمر ويأخذ ثوبه اذهالي عند اكتمال ثلاث سنوات || قوته الاصمأك والمقشرا ثوبه والريشواث || يصاد من اجل فروته الفاخرة الصنف . وينهم من أكل اللحم واستعمل الزيت والامعاء والسمام .

١٤٦٢٨ - سَيْفُكْلْ « كَلْبُ الْبَحْرِ » Mustelus (S).

Emissale (F). Smooth hound, Prickly head (E). لا يمكن ايجاد اسم « كلب البحر » لانه يطلق على اكثر من عشرة انواع من الاصمأك الكبيرة المغترية || والسيتل جنس اصمأك بحرية ولودة من فصيلة البنيكيات . انواعه المعروفة قليلة . اصطنها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة جميعها مفترسة بطاشة لا تأف من شيء . سرسها الم صغره كالسم || اجسامها ودية الشكل . طولها من ٦٤٠ الى ٢٠٠ سم . اذواها تراوح بين الكسلة والريفة المتفاوتة الماجات . رؤوسها مخروطية . اشدتها السفل قصيرة متأخرة . اسنانها صغيرة ، حادة ، متأسكة الرصف . نوسهاا مجهزان بصمات سادة تشفع وتفتلق عند الطلب . فمورة التيس تتأخر مؤخرة العين || زعانفها متباينة الترتيب والاشكال . الذيلية كبيرة . مستطيلة . ثنائية التفرين السفل || اعرف انواعه واشهرها السيتل المبدول والسيتل الاسن .

١٤٦٢٩ - سَيْفُكْلْ أَمْلَسْ * Mustelus laevis (S).

Emissale lisee (F). Smooth hound (E). نوع من السيتل . سمكة بحرية ولود . اصطنها البحر الارض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي اعصها المظلة المستدة من جبل طارق الى كوناكري || جسمها وشعي الشكل يطوله من ١٤٠ الى ١٦٠ سم . ثوبها الى الاربدة الخطية تزرق وتسر في الظهور وتبيض في البطن . مسكها مالمس البشرة عادم التشبيب || لحمها كاعن الصنف ، قل من يرض فيه . مسكها شائع الاستعمال الصناعي . زيتها جيد الصنف .

المرفوعة ٢٠ منبها المناطق الامريكية الحارة . اوراتها عابلة متعاقبة بسيطة . ازهارها خشوية ، خامية التركيب ملونة التويج . ثمارها جراء ثلاثية التلق || أشهر انواعها مالملي .

١٤٦٢٧ - سِيَانُطُونُسْ أَمْرِيكِي Ceanothus

americanus (S). Céanothe d'Amérique (F). جنبة معمرة تملو نحو ١٠٠ سم . اوراتها اعليلجية ، ذلقة ، ملية . تصلها نام النسج ، ضمن الحلقة ، بحري الصنعة العليا ، ازغب السفل ، ازهارها حلقة التجميع ، قيمة البتلات الباصمات اللياض . || ازهارها يستمر من حزيران الى آب . يستخرج من جلود مواد طيبة كثيرة التفع تصلح في معالجة النسل والازحار وبعض الحيات .

١٤٦١٨ - سِيَانُطُونُسْ عَمَلِي

Ceanothus velutinus (S). Céanothe velouté (F). جنبة معمرة تملو نحو ١٨٠ سم . اوراتها مستطيرة القامة ، مستطيلة التصل الاذق الحامل البشرة على صفحتيه . ازهارها يضاء اللون ، حثكولية التجميع ، صغيرة اللند . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٤٦١٩ - سِيَانُطُونُسْ صَنْجَرِي

Ceanothus azurus (S). Céanothe azuré (F). جنبة معمرة جادة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروعها اسطوانية ، زياء اللحاء . اوراتها ستانية قليلة التسنين . تصلها اغصن الصنعة العليا ، خلي السفل الصلابة اللون . ازهارها كابية التجميع ، سيلية الشكل ، صتيوية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٤٦٢٠ - سِيَانُطُونُسْ فَنْدِلْ

Ceanothus fendleri (S). Céanothe de Fendler (F). جنبة معمرة فراء شائكة ، تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . فروعها بحرية اللون . اوراتها يضية ، صغيرة اللند ، حادة التسنين . تصلها مالمس الصنعة العليا ، خلي السفل الغضبية اللون . ازهارها عثوية التجميع لونها الى اللياض اليلكي || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٤٦٢١ - سِيَانُطُونُسْ قُثْوِي الزهر

Ceanothus thyrsiflorus (S). Céanothe en thyrses (F). شجيرة تملو على ٣ الى ٦ امتار . فروعها سفلة مالة اللحاء . اوراتها اعليلجية ، حادة التسنين . تصلها ازغب المروق ، ياحت الحصار . ازهارها قنوية التجميع ، سيلية الشكل ، زرقاء اللون || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٤٦٢٢ - سِيَانُطُونُسْ مَسْتَنْ

Ceanothus dentatus (S). Céanothe denté (F). جنبة مبروتية معمرة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . اوراتها اعليلجية مسنة ، تصلها مالمس الصنعة العليا ، مكفون الحار السنن ، خلي الصنعة السفل للتبراء اللون || ازهارها غصية التجميع ، زرقاء اللون . ازهارها يدوم طوال شهر ايار .

١٤٦٢٣ - سِيَاوُسْ ، فِرْسَكُوسْ Persée (F).

Persée (E). سياوس او فرسوس وتدعى ايضا حامل رأس الفؤاد ، كوكبة نجوم شمالية الميخ مركزها بين ذات الكرسي وسك



سَيْتْرِيسُ الزَّوْرَجُ



سَيْفُورْ



سَيْتِلْ أَمْلَسْ

أولاً إلى الجؤرة تركب تشرد أليار قرب أدراكها فتقشرها.
يكافح عند ظهوره باستمال احد الفواير التحمية
الخففة .



سجل ميدول

١٤٦٣٨ - سيجولوجية ، علم الخلايا

Cytologie (F). Cytology (E).
علم يبحث في ماهية وحياة الخلايا من جميع النواحي إن
جسموية أو كيميائية أو خلافاً .



سيتوان الزرع

١٤٦٣٩ - سيتومورفولوجية

Cytomorphologie (F). Cytomorphologie (E).
الدراس القياي (المورفولوجي) الخاص بالفجوية أو الخلية .

١٤٦٤٠ - سيتون * Sitona (S). Sitona (F).

جنس حشرات صغيرة القند مستقيمة الجسم من فصيلة
السويات . أنوعه عديدة تطول من ٥ إلى ١٦ م .
أنوعها مختلفة الألوان السوية يكثر فيها الأظلم والخضلي.
تركب مختلف نباتات الفصيلة القرنية . أضرارها زديدة
لا تتجاوز طلب بعض الأرواق .



سيتوان زيم

١٤٦٤١ - سيتون مُختلط * Sitona lineata (S).

Sitona du pois (F). Sitona lineata (E).
حشرة خاضعة مؤذية من فصيلة السويات وذوئة مفدمات
الاجنة . خنافسها تعيش على أوراق القطايات البرية
والزراعية . يرقاتها تركب الجذور لتصلها إلى جسمها صغير
القند يطول من ٤ إلى ٥ م . ثوبها إلى الشبهة الخضراء تملوها
ماجة كسكنية جزوية تغلب مع انعكاس البنزور . رأسها
مستعرض الجرم . عنانها كيرتان . زئانها رقيقان .
متكها مشد الطول . ظهورها مستدير الطرف الكلاص .
عدها كيفا الخمل ، غليفتها التحزير القاطب . أضرارها
رباعية العقل القاطرة إلى ما جيل واحد في الحقل .
الحشرة الجملانة من نباتها الشوي في اوائل الربيع وتعيش
حتى أواخر تموز . تدرج في الكبار . تتغذى بعد ظهورها
باسويين . تمتع الحكن على فصل الأرواق وفي القرية .
أما متوسط ما تنحه من سكن فنحو ١٤٠٠ إلى البقرة عند
بلوغها الإدراك التام تطول نحو ٦ م . جسمها مقوس
الشكل عادم الأرواج ، ثني الحزن ، اسمر الرأس إلى طور
الاكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في القرية
ضمن جراب من الطين والمواد النباتية .



سيتوان لمحية

١٤٦٤٤ - سيتون * Cétina (F). Cétin (E).

السيتين مادة دهنية تستخرج من بعض أنواع الحياتن أعصها
السبر .



سيتين

١٤٦٤٣ - سيججان Scarus alginus (S).

سمكة بحرية من بنات مصغار مأكولة طية العلم كان
لها شهرة في الصور النابرة .



سيتون غمك

١٤٦٤٤ - سيج Run off surface (F).

مقدار الماء الذي يسيل على مسلة معينة من الأرض .

١٤٦٤٥ - سيج ، صهر ، أساخ ، أصاع ، سبك Fondre (F). To melt. To cast (E).

قادر أو درج التي إلى حالة اللاتية .

١٤٦٣٠ - سبستل سبستول * Mustelus vulgaris,

Mustelus mustelus (S). Emissale commune, Moutalle (F). Prickly hound (E).

نوع من السيل . سمكة بحرية ولين . أطاها فصية
الارباء تشكل معظم المناطق الحارة والمتحدة الحارة من
البحر الاطلي والبحر الأبيض المتوسط تعتبر من
الاسماك البنية . سرورها عرض البحر إلى جسمها وشي
الشكل يطول من ١٧٠ إلى ٢١٠ سم . ثوبها إلى الكلبة
تزرقة وتقف في الظهر وتدير في البطن . سبها مبشر
التصيب وأثليل الصخرة النسية الحين إلى سبها شائع
الاستعمال الصناعي . زيتها جيد الصنف . لها كاهن
قل من يربط فيه .

١٤٦٣١ - سيتوان Cétina (F). Chafer (E).

جنس خنافس من فصيلة الحليبات أنواعه المروفة نحو
٢٠٠ جميعها حيلة الألوان الزاوية تعيش على وحيق
الانزاد وصل العصارة النباتية التي تمتصها سبها استطاعت .
يرقاتها تعيش على المواد العضوية المتحللة . أشهر أنوعه
ما يلي .

١٤٦٣٢ - سيتوان الزرع * Oxythres funesta (S).

Cétina stictica (F).
نوع من السيتوان طولها نحو ١٠ م . ثوبها إلى السواد اللامع
تملوه رشفة يشاه إلى تركب الزروع قبل الأسبال
تفتحي على اقلاها . وتركب الانزاد على اختلاف
أنوعها وقد لا تمتع في زمامت الكربة في أباان الارياق .

١٤٦٣٣ - سيتوان زيماء * Epicomets hircella (S).

Cétina valus (F). Blossom feeder (E).
نوع من السيتوان طولها يراوح من ٨ إلى ١١ م . جسمها
ازغب البشرة . ثوبها إلى السورة المايقة تملوه رشفة غليقة
من البياض . عدها مشويان يوشع زفي اسهم الحزن .
تركب انزاد الاجبار المنرة فتقشرها ولا تمتع من
الوردة والانزاد الخفلة .

١٤٦٣٤ - سيتوان مذبةكة * Cetenia aurata (S).

Cétina dorée, Hanneton des roses (F). Flower beetle, Sap chaffer, Green rose chafer (E). Goldrosenkäfer, Goldkäfer (D).
نوع من السيتوان طولها يراوح من ١٤ إلى ٢٠ م .
ثوبها إلى الخضار النحاسي تملوه ماجة ذهنية إلى تركب
الانزاد وأثليل الناضجة ، يكثر وجودها في الوردة والمان
والمرارة إلى رقتها تعيش على المواد العضوية أعصها
جلود الصفصاف المقطوعة .

١٤٦٣٥ - سيجو بلازيمه Cytoplasma (F).

Cytoplasm, Cytoplasma (E).
هي المادة الأولى أي المادة البروتوبلازمية التي تحرق
بجولة الخلية النباتية .

١٤٦٣٦ - سيجو سبورينه * Cytosporina (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . يكتيها
ضمية التجميع تحضها وريمة درزية الشكل نائنة . شفوها
اسطوانية . بويقاتها غليقة مستقيمة شفانة إلى أنوعه
قليلة أعرفها النوع الذي يمتري القيدن الجيني .

١٤٦٣٧ - سيجو سبورينه البوليوي * Cytosporina citripeda (S).

فطر مجهرية يصيب ثمار البوندي الجيني فيمطها . مظهره
الخارجي يقع مستديرة متخلفة السطح قطرها نحو ٧ م .

١٤٦٥٢ - سيراسيس هو الأرجس البري ، اطلبه .

١٤٦٥٣ - سيراسيوم Cerastium (S). Céraiste (F).
Starry grasswort (E). Hornkraut (D). Cerastio (I)
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القرنفليات . أنواعه
عديدة معظمها بري وبعضها زراعي . تعيش . سورها
وفرعها مزخرفة القمم ، زغبها أبيض || أوراقها متعاقبة
نصلها ضيق الصفحة . أزهارها عديدة ، كبيرة القد ،
بيضاء اللون || تزهر على حافة الممرات وفي المواق
الصخرية || أشهر أنواعه ما يلي .

١٤٦٥٤ - سيراسيوم أبيض *
Cerastium candidissimum (S). Céraiste blanc pur (F).
يعلم من ١٢ الى ١٥ سم . فروعه عديدة متراكبة زغبها
كثيف التجميع ، فني اللون || أوراقه طول نحو
٢ سم . وتعرض نحو ٣ سم . أزهاره صغيرة القد شديدة
البياض الثلجي || أزهاره يستمر من أيار الى حزيران .

١٤٦٥٥ - سيراسيوم كبير الزهر *
Cerastium grandiflorum (S). Céraiste à grandes
fleurs (F).
يعلم من ١٥ الى ٢٠ سم . زغبه افرق الانتشاب .
أوراقه غليظة طول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض نحو ١ سم .
أزهاره قد من ٧ الى ١٥ ، قطر الزهرة يراوح بين ٣ و ٥ سم .
أزهاره يستمر من نيسان الى تموز .

١٤٦٥٦ - سيراسيوم مزخرف - أذن القارة
Cerastium tomentosum (S). Céraiste tomentaux,
Argentine, Oreille de souris (F).
يعلم من ٢٠ الى ٣٠ سم . زغبه كثيف التجميع مجعد
أوراقه منتصبه طول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض من ٤
الى ٦ سم . أزهاره مستطيلة ، بتلاتها سنائية الشكل لونها
الى البياض الاقبر || أزهاره يستمر من أيار الى
حزيران .

١٤٦٥٧ - سيرة ، سيلة ، مضمورة Silo
حفرة مستديرة خاصة أو بناء مصوف اسطواني الشكل
ملسوق الارتفاع تحفظ فيها ، بعض الوقت ، الحبوب
والجنود والسائل والكلاء الخ .

١٤٦٥٨ - سيرثيس Syris
هي بقعة الفل ، اطلبه .

١٤٦٥٩ - سيرج ، شيرج Huile de sésame (F).
Sesame oil (E).
هو دهن السسم اي زيت يستخلص من بذور
بعد نقعها بالماء ، وتصفيها وتحميصها وطحنها لانتاج
الطعمية ثم ترسب الطمينة لفرد السرج عن الكسب .

١٤٦٦٠ - سيريس ، سيريس Carcus (S). Clerge (F). Hedge cactus, Torch thistle
(E). Kerzenkactus, Säulenkactus (D). Cero (I).
جنس نباتات برية وتربلية من الصباريات الشولية .
أنواعه زهاء ٣٠٠ تتميز بتلاتها الجسودي الانديسي .
معظمها من نباتات المناطق الحارة الارامية . أزهارها
جميلة الشكل وكبيرة القد || اعرف انواعه وأشهرها
ما يلي .

١٤٦٦١ - سيدك Sidá (F).
هو الخورق جنس نباتات عشبية من الخليات يات .

١٤٦٦٢ - سيدكوية صكره *
Cidaria fulvata (S).
Cidaria jaune (F). Cidaria fulvata (E).

حشرة من فصيلة الاقربيات وربة سرشقيات الاجنسة .
مرتبها يشمل بعض اقارب حوض البحر الابيض المتوسط
والمناطق الكاخلية المتاخمة . فراشها جارية قوتيا رقيق
الانزار . سرقتها غائصة تعيش على اوراق العوج
والنسرين || جسمها صغير قصيف يطول نحو ٩ سم .
بسطها نحو ٣١ سم . رأسها مستد الجرم اصفر اللون .
جناها صغيرتان . زياتها غليظتان . مرشها متوسط الطول .
جونها اصفر اللون ، اكلف المواج . قطبا اصفر اللون
افتح المواج . وراشها . عند النقصين ، الى الصفار
الكبريتي تملو في الزوج الامامي ثلاث بقع برتقالية ||
طاويل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح
من المص من اذن فصمة الليل . تعاطل بعد ظهورها بنحو
سنة اسابيع وتضع المكن صيداً على الصفحات السفلى
من نصال الاوراق || السرعة طول من ٢٠ الى ٢٤ سم .
جسمها اسطواني الشكل ، ماس القشار . ثوبها يمان
البطة التي تموش فيها . وراجها البطنية اللبلى ماصة ما
يحدو بها الى القنوس والشب عند الانتقال || طور
الاكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوماً يتغني في الجلالة
فمن صلبة معتدلة الحبلك .

١٤٦٦٨ - سيداق ، سيداق قلى فيه : حجر ذو ساق قوية تنشر حراق ورياح حريق
غشبه يبيض به فرك الكتان .

١٤٦٦٩ - سيدو ، عتمر القشاح Cidre (F).
Cider (E).
خر تصنع من صير قشاح السير .

١٤٦٧٠ - سيرة ، قيطير Tegmen, Secondine (F).
Tegmen, Secundine (E).
هو القشاش الشفاف الباطي الذي ينفث البنيضة والبرزة .

١٤٦٧١ - سيركوفريس * Ceratophrys (S).
Cératophrys (F).
جنس سفادغ جامة من فصيلة الكدايات . أنواعه المعروفة
عشرة مهدها معظم بلاد امريكا الجنوبية || اجسامها كبيرة
القد طول من ١٨ الى ٢٢ سم . عند الذكور ومن ٢٠ الى
٢٥ سم . عند الاناث . رؤوسها غليظة مستديرة تملوها
تسومات غشورية جبهة الشكل تكثف الرأس والحلق وتحت
كاجدة عبر الظهر الى العجز . هيوتا كبيرة مستديرة
جاسنة . اجفانها متوسية بقرن مدية الاطراف غشورية
المادة . فركها السفلى حادة الاسنان . بلاغها الهوائية
الصوتية كبيرة القد ليموية الشكل والقدر . اصابع قوائمها
الامامية طليقة . اصابع القوائم الخلفية نصفية الخناب .
جلودها شاذة || اثنائها متراكبة الالوان يكثر فيها الحنطي
والاغمصر والامر المايق والصنابي والاخر || تعيش معظم
سحباتها التي لا تقل عن ١٥ سنة في البر . تسرح في الليل
وتبيت في النهار داخل افاق سطحية تحفظها في التربة ||
قوتيا الحشرات والقار والجوران والظاء والزرغ والاساربع
والديدان .



سيدارة صفراء



سيرثيس



سيراسيوم أبيض



سيراسيوم كبير الزهر

١٤٧٥٠ - **سيلوري** (E). Silurian (F).
نمت ترينيفي بطلق للحقبة الثانية من الاباج القديم .
فيقال العصر السيلوري والاراضي السيلورية ، وهي
تتميز باحتوائها على الكثير من الاسماك المصنفة الرؤوس
أي على اول فقاريات .

١٤٧٥١ - **سيلوفان**
ملدن سيلوري شفاف قابل للتلون .

١٤٧٥٢ - **سيمليات**
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مهيئات الارجل
عظلمات الخياشيم ، اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة
قليلة العدد ، اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها
عريضة ، حلالية ، مستطيلة ، رباعية الزوايا الجانبية
الشكل . رؤوسها صغيرة . ملاصقتها صلبة || اعرف
اجناسها السيلة والثريرة .

١٤٧٥٣ - **سيليس ، صون**
جسم مركب من السيليوم والسكيبين وهو من اكر
الاجسام لينة واعما انتشاراً يوجد في الارض اما على
ساحل او على شكل سيليكات .

١٤٧٥٤ - **سيلسيوم ، سيلكون**
فلزات ثلاثي التكافؤ (سي - Si) ينصهر في ١٢٠٠
°سج . ويتحد مع الكبريت في ٦٠٠ °سج . ومع الاوزون
في ١٠٠٠ °سج || يستخرج من السيليس او من
فلوسيليكات البوتاسيوم .

١٤٧٥٥ - **سيمليكيات ، صوانات**
ملح يحصل من امتزاج الحامض الصواني بأحدى القواعد
كالبيوتاس والكلس . يقال سيليكات البوتاس وسيليكات
الكلس .

١٤٧٥٦ - **سيلينيك هلالية**
Selenia lunaria (S). Sélénie lunulée (F).
Selenia lunaria (E).

حشرة من فصيلة الارقيات ورثية حرشيات الاجنحة .
موطنها عنه من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها جارية
قوتها رقيق الانهار . مرتعها خاضعة قوتها اوراق النباتات
البرية اعصها البرق || جسمها متوسط القده يطول نحو
١٤ م . سبطها نحو ٢٨ م . رأسها مستد الجرم . عيناها
كبيرتان . زلماتها شحيتان مزيجيان عنه الذكر ، شحيتان
عنه الانثى . جوشها وعلتها كبدا تحمل ، حشيتا القرن ||
وراشها عنه الشقين ، الى الخلفي الاصهب المفلج تملو
في الزوج الاسامي جده وصل سرها وضط مقوس اسير
وبقعة حمراء وتملو في الزوج الخلفي جده سمره || لها
جبلان في الحول . تظهر فرائس الجبل الاول في نيسان
وتظهر فرائس الجبل الثاني في تموز . تسرح في الليل
تعاظم بعد ظهورها بنس اربعة اسابيع وتتممكن لطفها
تطفها مادة غريبة تنبت على الصفحات السفلى من نيمال
الاراك || البرقة تطول من ٢٨ الى ٣٦ م . جسمها
اسطوان الشكل يبدو كانه قطعه من قصب نالس القشار
تملوا ثلاثة ازواج من الثعلب المتعاقبة . ثوبها الى الكسني
الاشفع . ثوبها شديدة السرة . رأسها اسود . وراجها

البلقية الرطبة ماعدا ما يسطرها الى التفتير والشب عند
الانتقال || طود الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوماً
ينقضي فمن صلبة تحبها السرعة بين الاراك التي تجسمها
بحيوط حزيرية .

١٤٧٥٧ - **سيمباه**
Simaba (S). Simaba (F).
جنس اثمار برية طيبة من فصيلة السورويات . انواعها
المعروفة قليلة العدد مهدا بعض مناطق امريكا الحارة ||
اجمارها ترتفع من ٦ الى ١٥ امتار . اوراقها متعاقبة
مركبة ، وثقيرة التجميع ، خاصة او اسباعية او تساعية
الورزيقات السنانة النصال || انعامها نظرية الارتكاز ،
سليبية التجميع ، ثمارها حبوب لوزية .
اشهر انواعها الطيبة الثلاثة التالية :

١٤٧٥٨ - **سيمباه حد يدية**
Simaba ferruginea (S). Simaba ferrugineux,
Cédon du Brésil, Calunga (F).
نوع من السباه . ثمرتها تملو نحو عشرة امتار . مهدا
البرازيل وأخصها مقاطعة باها || تستعمل في معالجة
الحشيات وشدة الاسهال وعسر الهضم .

١٤٧٥٩ - **سيمباه صيدونية**
Simaba cedron, Quassa cedron (S).
Simaba cédrón, Cédrón, Cédronelle (F).
Cedron tree (E).
نوع من السباه . ثمرتها تملو نحو عشرة امتار . مهدا
البلاد الامريكية الحارة والاستوائية || ثمارها شائعة
الاستعمال الطبي . يملحن بها الكسك وبذغ الاناعي وبعض
الحشيات || مادتها القمالة تدعى سيدون (Cédrine)
مرة الملاق كالكتيا .

١٤٧٦٠ - **سيمباه قلد ريفيا**
Simaba valdivia, Picrostemma valdivia (S).
Simaba de Valdivia (F).
نوع من السباه . ثمرتها تملو نحو ثمانية امتار . مهدا
البلاد الامريكية الحارة والاستوائية || يستخرج من ثمارها
مادة شمعية شديدة الرائحة تدعى فلديفين (Valdivine)
٢ مليون م من هذه المادة تقضي على الاربث || تستعمل
طياً في معالجة الحشيات المعادة . مسحوق قشور ثمارها
مقوي فقال .

١٤٧٦١ - **سيمباكية**
Sémétiologie (F).
Sémetology (E).
فرع من علم القلب يختص بدراس طراز واعراض الامراض
واسهل لالاتها .

١٤٧٦٢ - **سيمينديس**
Cymindis (S).
Cymindis (F). Cymindis (E).
جنس حشرات قاتصة من فصيلة الحبيبات ورثية مخفيات
الاجنحة . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار
البلاد المستقلة الحارة والباردة || اجسامها هيضاء ، متدلة
التبليط ، تطول من ٨ الى ١٢ م . رؤوسها صغيرة .
عينها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستعارية خيطية .
ثآليلها وتكونها ولاصها قياسية . كولاسها عضوية .
بطونها مستطيلة . اعانها لائحة وبضها شبه لاصح .
قوامها نشيطة . انثاها متباينة الاروان الجسدية الزائرة ||
الحشرة الجملانة قاتصة والبرقة ايضا .



سيمية حلالية



سياه

ساقها وفروعها منتصبة ، عمدة ، زباد ، الحام متفقق الزغب . اوراقها اهليجية مستطيلة مفلقة التصل . ازهارها زرقية صفراء اللون || احرف انواعها ما يتيم .

١٤٧٧٢ - سِيُونَان قَتَرِي * Cephalaria catarica (S).
Céphalaire de Tartarie (F).

نوع من السيوان للمسمر مهد روسية الشرقية . يملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . يقال انه ارفع عشية منتصبة مرفوعة . ازهارها متصلة القد ، صفراء اللون تجمعها رؤيات كبيرة ثلاثية او خاسية الشكل .

١٤٧٧٤ - سِيُونَان سوري * طَرْدَان Cephalaria syriaca (S). Céphalaire de Syrie (F).

نوع من السيوان للمسمر . مهد البلاد السورية . يكثر بين الزروع . يملو من ٨٠ الى ١٥٠ سم . || ازهارها عذوق الشكل ورقيساته خاسية او سباعية التجميع . ازهارها صفر .

١٤٧٧٥ - سِيُونِي * Sicyos (S).
Sicyos (F). Sicyos (E).

بلجة معمرة عارفة من فصيلة القرقيات . منبها بفض المناطق الامريكية . ساقها تطلو نحو عشرة امتار . حوافها ثلاثية او خاسية للشعب . اوراقها قلبية الشكل ، خاسية القصص . ازهارها الى الحصار الاصفر . المتكية منها عشوية التجميع ، المغنية خسية ، مستطيلة الحافيق . ثمارها يفضية تطلو نحو ١٠ سم . وتقرض نحو ٧ سم . لونها الى الحصار البصري الازيد الملوخ ويملو سطحها حصف ذرب قليل الصلابة . تؤكل مطبوخة .

١٤٧٧٦ - سِيُونَة ، صِيَع Liquidité (F). Liquidity (E).

صفه المواد الباسلة المائنة .

١٤٧٧٧ - سِيُون * Clonus (S). Clone (F).

جنس حشرات من فصيلة السوسيات . انواعها عديدة جميعها صغيرة القد تطلو من ٣ الى ٥ سم . انواعها مختلفة الالوان يكثر فيها الخطي الاصفر الملوخ . الحامدة مديجة وبزركية ونها الحامدة والمهدبة || يرقاتها مؤذية تركب نباتات الفصيلة الحامدة فتتقم الارواق وتقرضها .

١٤٧٧٨ - سِيُون المَرَّان * Clonus fraxini (S).
Clone du frêne (F). Clonus fraxini (E).

حشرة غاصلة من فصيلة السوسيات ورقية صفيدات الاجنحة . تألف البراري والزارعين . غناضها ويرقاتها تقيض على اوراق الزيتون والمَرَّان || جسمها صغير القد يملو من ٤ الى ٤ سم . ثوبها الى السمرة المتكتنية تملوها في طوارها قصوص وتزاقق مختلفة . رأسها صغير الحجم ، مستطيل الملك المستقيم القاصم القالب . عيناها صغيرتان . زباناها مرفقتان صولجانان . ظوارها بيضي اللون . الحامدة صلتها التمزير القاطب . ارساها رباعية العقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تخرج الحشرة الجلجلة من مكانها في اوائل نيسان . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة ، عند بلوغها الإدراك التام ، تطلو نحو ٥ سم . جسمها اهليجي الشكل ، مدب الرأس والطرف ، حنكي اللون الاصفر الملوخ ، اسمر الرأس والتسرح .

١٤٧٧٣ - سِيَمَة * Sina (F). Sina (E).

اسم اصطلاحي يطلو على القطع المختزني شبه المائع الموجود في وسط الكرة الارضية بين الطبقة السطحية المعروفة بالسيال وبين النواة المركزية . تقدر حرارة هذه الطبقة أي السيمه بنحو ١٥٠٠ درجة ستيفراد . يابس حزام مشتل .

١٤٧٧٤ - سِيَمِيَة Facié (F).

هيئة الوجه .

١٤٧٧٥ - سِيَمِيرِيس Salmiris

هو الكركيز ويكثر فرد من فصيلة السوسيات .

١٤٧٧٦ - سِيَمَارَكِيَا Cintracta (S).

جنس فلور مجهرية طفيلية من فصيلة الراوييات تتميز بجهدا الباتر البارز الانتشاب ، الايدي الشكل . انواعها قليلة العدد تصيب بعض الاسليات والسديات فتصلها .

١٤٧٧٧ - سِيَمَنَام * ، دُوْدَا مَزْدَوَجَة ، دُوْدَا خَرَا Syngame

جنس يديان سلكية طفيلية تعيش على جهاز تنفس بعض الطيور اصحابها الحجل والتلوج || تمت بالفودة المزدوجة لان الذكر منها يلاصق الانثى ولا يفرق منها .

١٤٧٧٨ - سِيَمَكُونَة Quinquina

هي لكنكتينا التي يستخرج منها الكينا ، اطليا .

١٤٧٧٩ - سِيَمُونِيَة Cénocya (F).

اسم يطلق على جميع الكائنات الضويرة المركبة من حزام .

١٤٧٨٠ - سِيَمُونِيَس * Cynomys (S).

Cynomys, Chien-rat, Chien des prairies, Marmotta des prairies, Ecureuil jappant (F).
Prairie dog (E). Präriehund (D).

جنس سيوانات لبونة قاضية من فصيلة السنجابيات . انواعها خمسة جميعها امريكية . اجسامها وبة تطلو من ٢٧ الى ٣٥ سم . اذانها من ١٠ الى ١٢ سم . رؤوسها فليظة . عيونها مستديرة . اذناها عريضة وقصيرة . جرائرها قوية . اصابعها خالية . اطرافها حادة . انواعها سوية اللون يكثر لها الرمادي الاصعب || ساقها جمالية . تألف الحشباب حيث تركز قراها التي يراوح عدد اجسامها من ٥٠ الى ٢٠٠٠ جمرة قللوسية الشكل قشرها نحو ١٢ سم . وطولها ٦٠ تبد للراولة عن الاخرى من ١ الى امتار . مدخلها وغاريها اتفاق مستقيمة عمقا نحو ٣٠ سم || بيتها للثوري يدوم ما دام الصقيع والجليد . قراها الاعشاب والحبوز والبزور والحبوب والفار والجرذان .

١٤٧٨١ - سِيَمَكَنك

التراب الذي لطيره الريح عن الارض .

١٤٧٨٢ - سِيُونَان Cephalaria (S). Céphalaire (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الديليسيات .



سِيَمَان



سِيَمِيرِيس



سِيَرَان تَرِي



سِيَوَان سوري




سِيُون




سِيُون




سِيُون الزان



- 1 اعطوب - 2 حنقير - 3 حنقير - 4 كثار مبال - 5 كثار لورب - 6 حنقير - 7 فوشة - 8 موزة - 9 دوكمت - 10 تشابة - 11 حارون عري - 12 سلون
 ريش، فوشة - 13 سلون سش - 14 بولس - 15 اشابة - 16 حنقير - 17 انة - 18 دوس - 19 قرة - 20 لوبدة - 21 علة - 22 كوك - 23 سلة - 24 شير -
 25 لوبدة - 26 كركيز - 27 كركيز موزير - 28 طرب - 29 غلقة - 30 بديك - 31 قنوت شوق - 32 حنقير - 33 رودة سطل - 34 رودة حني - 35 شك - 36 بول شير -
 37 بول سطل - 38 طرقة - 39 مرقع مرقع - 40 مرقع ابو دوتار - 41 مرقع قنوت - 42 يلسوع - 43 ملب - 44 حواء - 45 يلة - 46 دعة اربون - 47 دعة جهاد -
 48 دلاع - 49 جلاوب - 50 صير - 51 حنقير - 52 مروت - 53 كركيت - 54 بركمت - 55 مابنة - 56 بديك - 57 بديك - 58 حنقير - 59 لوبدة - 60 قبة حنقير - 61 لوبدة
 62 لوبدة - 63 حنقير - 64 لوبدة - 65 مابنة مروت - 66 مابنة حنقير - 67 مابنة حنقير - 68 مابنة حنقير - 69 مابنة حنقير - 70 حنقير - 71 لوبدة - 72 حنقير -
 73 حنقير مابنة - 74 حنقير مابنة - 75 حنقير - 76 حنقير - 77 حنقير - 78 حنقير - 79 حنقير - 80 حنقير - 81 حنقير - 82 حنقير - 83 حنقير



1 قباب - 2 فرخ - 3 النبال - 4 كبدية جارية - 5 كبدية - 6 طريخ - 7 صيداء - 8 سمون - 9 حوك - 10 جدادة - 11 جناح - 12 وساجة - 13 قد
بحري - 14 شطيرة مبلونة - 15 نعل - 16 ديك البحر - 17 دلاغ - 18 خضائف الماء - 19 شكة البحر - 20 نوري - 21 غصنة - 22 حنيك - 23 أبو طبق -
24 نعل - 25 طروق القرن - 26 طريخ حجري - 27 زبر بحري - 28 زبر أبو شوكة - 29 زكير - 30 لغ - 31 لم قوس - 32 ليمدة - 33 بريس المتوسك - 34 كيرور - 35 أبو منقار -
36 طراغور - 37 تون - 38 سيف البحر - 39 أبو سيف - 40 أنفاس



1. بوم - 2. قيتوت - 3. دوح صبي - 4. بقلس - 5. لعل - 6. سلون - 7. زنجور - 8. سمك الكراكي - 9. لساك - 10. كراخ - 11. ملجوم البحر - 12. دنكة - 13. ابر غبيط - 14. زركانة - 15. حمامان البحر - 16. دفر - 17. سمك الكراكي - 18. ابر صغور اسيل - 19. جيلكي - 20. جيرة - 21. ديب الموت - 22. اناك - 23. حشش - 24. حويل - 25. غراء - 26. قران - 27. وشادة - 28. حورية - 29. علق البحر - 30. مارفون



1. شاجير - 2. صقر قريش - 3. عقاب ذهبي - 4. عقاب شمسية - 5. عقاب القلبي - 6. بومة - 7. بومة - 8. أم الحيسر - 9. قيقب - 10. ككتور - 11. نسلح - 12. لوري - 13. نوبة - 14. امارونية - 15. حوتية بحرية - 16. ككتور حراء القنطرة - 17. ككتور حراء القنطرة - 18. ككتور ديدندر - 19. ككتور وديك - 20. قريش - 21. بوم - 22. بطيخة - 23. بطيخة - 24. قنطرة صفراء - 25. حوج - 26. بوم صفيرة - 27. آرا صفراء - 28. آرا صفراء - 29. آرا بفسجية - 30. دفتاش - 31. سكرتون - 32. بقاء - 33. نسلح - 34. مداس - 35. مداس - 36. طوق - 37. طوق - 38. قنطرة كير - 39. قنطرة موي - 40. قنطرة موي - 41. سنور - 42. غشاش - 43. بوم حوتية - 44. حوت - 45. أم الح - 46. دسكة - 47. عقاب - 48. بطور ابيض الجناح - 49. بطور احمر الجناح - 50. دسكة - 51. قنطرة ازرقة - 52. ديدك الجبل - 53. صر - 54. قنطرة كير - 55. قنطرة السنور - 56. دودو احمر الجناح - 57. بطور - 58. دودو



- 1 غار العرويس الاسود - 2 رفاة سعادى - 3 طائر القردوس الاحمر - 4 طائر القردوس الكبير - 5 كيايه (الاسم المثلج) - 6 كليل - 7 سكود - 8 ربيع العروق الصغير - 9 ربيع العروق الاسود - 10 طائر النبال - 11 فراخان جهوري - 12 فراخان غلوم كالث - 13 فراخان موز - 14 ديكاش - 15 ابو طير - 16 قمراني - 17 زمناري - 18 ابو ديج - 19 تير شعاع الشمس - 20 تير راج - 21 تير سوليا - 22 حطيط احمر اللهب - 23 حطيط تانك - 24 حطيط احمر العلي - 25 حطيط جلي - 26 ابو ديش اسع - 27 طرود - 28 شرة زرقاء الصعد - 29 تيرة سكمت - 30 ملكيين - 31 مدلب دان - 32 مدلب صاعر - 33 لاورودية زرقاء المراج - 34 ام حرة - 35 لديرية ماعقة - 36 دسفر طويل اللهب - 37 فكلدي - 38 ام ربال - 39 تيرة جوردان - 40 تيرة طنكة - 41 قراع ابو علة - 42 حيشنت بوانرت - 43 ديش دسك - 44 سكشور - 45 طيوريس دان - 46 قريش احمر الرود - 47 طرولوس اردق - 48 حريس ابيض القيل - 49 خريس زيردي - 50 لغريش يني - 51 لغريش طاروسي - 52 لغريش مجيرد - 53 لغريش سوك - 54 لغريش شوق - 55 ذكر - 56 طلوران - 57 سول طويل المشار - 58 تيرة كليوب - 59 دمك



- 1 طابوس - 2 اردوس - 3 تاجر فاني - 4 تاجر بلبل - 5 تاجر مهرست - 6 تاجر لفي - 7 تاجر ايلو - 8 تاجر سرخوف - 9 تاجر ازرق - 10 حرجيل - 11 تاجر بودابوس - 12 سيمه شمين - 13 سيمه مير - 14 تاجر ازن - 15 حنط - 16 كيت - 17 غرغر لسي - 18 كولانه - 19 حريان - 20 ديك بري - 21 ديك مقابل - 22 ديك كوششي - 23 ديك هيروغ فرسته - 24 حنط دانه - 25 حنط طلاء - 26 حمار راسل - 27 حمار حركار - 28 حمار طوك - 29 حمار كيرني - 30 حمار بشنوق - 31 حمار ورك - 32 حمار راجين - 33 حمار طان - 34 حمار امل - 35 اكس حرق - 36 ارز - 37 تم ايش - 38 تم اسود - 39 فريول - 40 ايشه - 41 بوغل واث - 42 بوغل ذرب الدف - 43 حمار - 44 ديك طوك - 45 زيم لاجام - 46 كمار - 47 قزور ميط - 48 قزور برتقال الحمر - 49 قزور اكه - 50 پندال لاجيل - 51 پندال احمر - 52 برور







ش

لاحت. قوائمها مستطيلة ، دقيقة || ثوبها الى الصفرة السوداء باستثناء قاعدة الرأس والقوائم فانها زنجارية اللون || تعيش من قنصها على سطح المياه الراكدة وعلى الضفاف حيث تنمو بين النبات وذات الرشاقة التي تنظفها على سطح الماء .

١٤٧٧٩ - شايكرات الماء
Hydrometrinae (S). Hydrometrinae, Water striders (F).
فصيلة حشرات من نصفيات الاجنحة . حشراتنا هوام طراخ الاربل تقمص فوق الماء كأنها تدرسه || اجنحتها وانواعها عديدة اشهرها الجوريس وشايكة الماء .

١٤٧٨٣ - شاييل
Aloose (S). Aloose (E).
جنس اسماء كثيرة القند من فصيلة الصابونيات . انواعها قليلة العدد موطنها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . اجسامها مقلطحة مستطيلة ، حازر بطنها شائك الخرافش || أشهر انواعها الشاييل المبلبل والقاصيرة .

١٤٧٨٠ - شايكره الماء *
Hydrometra (S). Hydrometra (F).
جنس هوام من فصيلة شايكرات الماء . انواعه المعروفة نحو ١٠ جميعها نحيلة الاجسام ، دقيقة الارجل المسطيلة . تعيش من قنصها فوق المياه الراكدة . تنمو على سطح الماء بنفة || موطنها جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة.



شايكة الماء

١٤٧٨٤ - شاييل مبدول *
Aloose vulgaris (S). Aloose commune (F).
نوع من الشاييل وهو سمكة كبيرة القند تطفو من ٧٠ الى ١٠٠ سم . موطنها المتوسط والاطلسي . تمرد في اواخر العذب وقد يتم ذلك في اربع م ثم تعود الى البحر في اواخر الصيف || لحمها اللين الطعم . لكنها كثيرة الحسك .

١٤٧٨١ - شايكره الماء الرمادية
Hydrometra cinerea (S). Hydrometra gris (F).
حشرة من فصيلة شايكرات الماء . جسمها صغير مستطيل بطول من ١١ الى ١٤ سم . || رأسها دقيق ، مكور الطرف . غطتها نحيل ، زباناها مسطيلان . عينها جانبيتان ، قاضراتان . كسلها شبه يرمي الشكل . ظهراتها ضيق وقصير . قوائمها مستطيلة . ارجاعها ثلاثية القبل || ثوبها الى الوردية البتراء يمتد في الرأس وفي كل حرقنة ومرد || تعيش من قنصها على سطح الماء حيث تنمو بسرعة ممتعة .

١٤٧٨٥ - شايين.
Gros et gras (F). Stout and fat (E).
صفه الحيوان السمين الكازر .

١٤٧٨٢ - شايكره الماء المتعصبة

Hydrometra stagnans (S). Hydrometra des étangs (F).
حشرة من فصيلة شايكرات الماء . جسمها مستطيل الجسم بطول من ٩ الى ١٣ سم . رأسها دقيق مستطيل . غطتها قصير . زباناها مسطيلان . عينها جانبيتان كبيرتان . كسلها اسطواني الشكل ويطنها ايضاً . ظهراتها ضيق

١٤٧٨٦ - شاكين ، شرسوف
Imperméable à la lumière (F). Light-tight (E).
نمت تعريفي يطلق على كل مادة لا يتغلل منها النور .

١٤٧٨٧ - شاكجر
Arboricole (F). Living in trees (E).
نمت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة مباشرة بالاشجار او يعيش من الاجمار ويطها .



شاييل مبلبل

١٤٨٠٤ - شاكري هو ذائع الصاعقة ، اطلبه .

١٤٨٠٥ - شاكيب ، شاكيف Maigre, Sec (F).
المهزول من الحيوان شمرأ أو خفلاً ما مربأ .
Meagre, Dry (E).

١٤٨٠٦ - شاش الشافي
هو البليس وهو الكانج ، اطلبها .

١٤٨٠٧ - شاص ، شوتّر Raide (F). Stiff (E).

١٤٨٠٨ - شاصير Faon (F). Fawn (E).
الشاصر والشصر ؛ ولد الطيبة .

١٤٨٠٩ - شاطيب Anomoure (F).
نمت تمريني يعلق عل كل ذنب يشك شكله عن المألوف .

١٤٨١٠ - شاطيرة هي البطونقا الطيبة ، اطلها .

١٤٨١١ - شاطط Anomal (F). Anomalous (E).
شاذ ، غالف نوابس الطيبة او قواصدا .

١٤٨١٧ - شاطي Bord, Rivage (F).
هو شط البحر او النهر .
Edge, Shore (E).

١٤٨١٣ - شاكيب ، شغيب Rameux (F).
الشجر للكثير الفروع .
Branching (E).

١٤٨١٤ - شاعث Sparsile (F). Sparsile (E).
الشاعث هو النجم المنرد في الفضاء . كل نجم لا يدخل
في مجموعات الابراج او المجموعات الكوكبية يعتبر من
الشواث .

١٤٨١٥ - شاعر Asymétrique, Inégal (F).
Asymmetrical, Unequal (E).
صفة الشيء اللاتناسق الاجزاء . م. شغوا وشغيا . ج
شراغ وشرو .

١٤٨١٦ - شاف Curatif (F). Curative (E).
صفة العلاج الذي يقضي عل المرض فيسبب الشفا .

١٤٨١٧ - شاف Ulcère (F). Ulcer (E).
هي القرحة او القرحة الداملة .

١٤٨١٨ - شافير هو الشفر ، اطله .

١٤٨١٩ - شاليع Bélior (F). Ram (E).
الشافع من النسان كالتيس من المعزى .

١٤٨٢٠ - شالولة مطمّر ، لادن
Fil à plomb (F). Plumb-line (E).
جهاز مركب من قلعة من النحاس او الحديد عمودية
للشكل ، معلقة بخط قوي ، يستعمله البناء لتثبت من صفة
عمودية اتجاه ما ينشئ .

١٤٨٢١ - شاكّة Acena (S).
Acéna, Acéne (F). Burr, Rosy spined bur (E). Wier-
derhaken, Acéne (D). Acena (I).
جنس نباتات برية وزراعية تربيتين من فصيلة الورد يات .
انواعه قليلة جميعها صغيرة القد . سيقها وفروعها شاككة .

١٤٧٨٨ - شاح Autotrophe (F).
Autotrophic (E).

شاح م. شاحية ج. شراغ . نمت تمريني يعلق عل جميع
النباتات التي تمتص مواد الغذاء من الطيبة فتصردا وتغلبها
بواسطة الطاقة الشمسية .

١٤٧٨٩ - شاحبة ، فاكحة Déchaumouse (F).
محرث الشب او الفلاح .
Stubble-plough (E).

١٤٧٩٠ - شاحن
الشاحن من كلاب الصيد الذي يبعد الطريد ولا يصيد .
ج شواحن .

١٤٧٩١ - شاحنة ، كميّون Camion (F).
سيارة مجهزة لنقل الاحمال .
Dry (E).

١٤٧٩٢ - شادل Mimétique (F). Mimetic (E).
نمت رسن تمريني يدل عل النبات الذي يسم شكلها
ولها مع البيئة التي يعيش فيها .

١٤٧٩٣ - شادين Faon (F). Fawn (E).
ولد الفتيبة .

١٤٧٩٤ - شادنج Hématose (F). Hæmatose (E).
هو سحر الدم ، اطله .

١٤٧٩٥ - شادوب Chadouf (F). Well-sweep (E).
الشادوف او الشالبة آلة بسيطة قديمة الماه والاستعمال ،
قوامها دلو وثقال . كانت لا تزال تستعمل في رفع المياه
من مجاريها المنخفضة .

١٤٧٩٦ - شادي Cercopithèque de Saba
هو حبرس سبأ ، اطله .

١٤٧٩٧ - شادّ Héteroците (F). Heterocite (E).
ما خرج من قواصد الحماشة او من مأوف نومه .

١٤٧٩٨ - شارّ شارّ الموضع المليظ الكثير الحمازة .

١٤٧٩٩ - شارّ Désoeperculer (F). To uncap (E).
شار واشتار اعمل ؛ استخرجه من الرقية واجتناه فهو
مشهور .

١٤٨٠٠ - شاركو ، لرون Ion
الشارد والايونات هي لوانج التحليل وتكون بدورها لوانج
التحليل الكيماوي الناتج عن مرور التيار الكهربائي في
الجسم المقصود . رابع لرون .

١٤٨٠١ - شاركوّي Ionique (F). Ionic (E).

١٤٨٠٢ - شاركوّات الاجنحة * Planipennes (F).
رتبة حشرات نافعة من طبقة حسيات الجناح . فصائلها
واجنسها كثيرة العدد . تتميز برووضها السوداء . يخافها
ممتدة القد ، اجنحتها مستطيلة ، تأكلها مجهزة للعض .

١٤٨٠٣ - شاركوّات الاسنان Acrodontes (F).
Acrodontes (E).

نمت تمريني توصف به الاسنان من فواث الاسنان الشاركة
المتركة في الحالة الفارسية من الفك الاعل . يقابلها
قابعات الانسان .



شاركات الاجنحة

اوراقها مركبة . وريقاتها خضية النصل المسن الحافة .
ازهارها حلقة التجميع صغيرة القند يندب فيها الاصفر
والاخر || انزهارها صفي .

١٤٨٢٧ - شاكيس *
Apogamique (F).
Apogamical (E).

كل نبات يتكاثر بالبرعمة او القمعة لانه فقد خاصية
التكاثر بالانصاب الطبيعي ابي بتفطخ الازهار يدعى
شاكس .

١٤٨٢٣ - شاكلة
Flanc (F). Flank (E).
هي الاصل والخامسة . ج شواكل .

١٤٨٢٤ - شال *
Synodoneta (S). Synodonta (F).
جنس اسماك ثورية من فصيلة السلوريات انواعه نحو ١٥
جميعها من اسماك مياه المناطق الاستوائية والحارة . أشهر
انواعه شال النيل وارتزوق والسبي والقرقور . جميعها
ماكولة ، غليها متوسطة السمك .

١٤٨٢٥ - شاتم
Selig (F). Rye (E).
هو الشيلم ، اطلبه .

١٤٨٢٦ - شالوف
Cascade (F). Waterfall (E).
هو الشلال صغر حجمه وارتفاع منحدرو .

١٤٨٢٧ - شامغة ، شم *
Odorat (F). Smell (E).
اسمى حواس الجسم الحاسة لاسيا منه الحيوان الذي يمتد
عليها في فذاته || عضو الشم هو الاثنت يلمسه الامل
مذلف بفشا ضابطي يلمس الاصابع التي تنقل الاحساسات
الشمية الى المراكز الخاصة بها في المخ .

١٤٨٢٨ - شامكة
Membre (F). Limb (E).
الاشنة : قائمة آداة . ج شوامت . ويقال لها الداربة .

١٤٨٢٩ - شاصد * ، شياذ *
Thérédion (F).
جنس حناكب من فصيلة التناذيات . انواعه عديدة جميعها
متوسطة القند او صغيرة . اجسامها شبه يفسية الشكل ،
جرائزها دقيقة مستطيلة . تحبك لوسها حل النبات وفي
تجارييف السمور والجندور والابلية الممجرة .

١٤٨٣٠ - شاميلات الكتف
Totipalmes
بنية طيور من شكايات القدم فيها البجع والفاق وبقيرها .

١٤٨٣١ - شان
Suturs du crâne (F).
Suturs from the cranium (E).
هو درز التجمف وفوريشل الدرز الالكلي والسهم والذم .

١٤٨٣٢ - شاكبية *
Fregata, Atagen (S).
Frégate (F). Frigate-petrel (E).

جنس طير من كليات القدم وفصيلة البجيات . له ثومان
مرفوفان : الشاذية النقاوية والشاذية الحذية || اعطاهما
بماجن البلاد الحارة والاستوائية . تألف المواقص الصخرية
والسمور والشارقة حل البحر || اجسامها - مستطيلة .
اذنابها فارقة . مناقبها متدلة التبطيط ، محبة للانطاف
البليا اللزدة . متنفقة الملائط- السفل . ارساغها قصيرة .
شائر اجسامها نصفية الكثاف . غالبها محبة ذرية ||
طيرانها شديدة السرعة . قوتها الاسماك تنقض عليها من الاجواء
كاسهم وتقتلها من مناقب ارنج والاخلل والقرور ||

تدثر في صدوع شنف السمور وفي اوقايها العام تلو
العام والشم قرب المش . شفتها مؤلفة من يفتين لونها
الى البياض الاثير تملو ماجة غضراء او حمراء وبض
الفتط الجفوية . القترشم يستمر نحو اربعة اشابيع تقوم
به الاثني دون الذكر الذي يثون لها القند .

١٤٨٣٣ - شاكبية عفاكية * ، شاكبية افرقية *
Fregata marins, Atagen aequil (S).
Frégate-Aigle, F. marine, Grande frégate (F).

نوع من الشاذية . طائر كبير القند ، مستطيل الجسم ،
طوله نحو ١٠٠٠ سم . وبسته نحو ٢٢٠ سم . اما وزنه
فلا يتجاوز ١٥٠٠ غرام || ثوبه اسود اللون ، اغضر
المزاج . زوره وينقاده الى الحفرة . حقة عته شديدة
السواد . رجلاه الى الجفوة || قوته الاسماك بصلطها من
البحر ويقتلها من مناقب طيور الماء || اعطاه بماجن
افريقية الاستوائية والحارة ان على المحيط الاطلسي على كل
المحيط الهندي .

١٤٨٣٤ - شاكبية هندية *
Fregata minor, Atagen minor (S).
Frégate indienne, Petite frégate (F).

نوع من الشاذية . طائر متوسط القند ، مستطيل الشكل ،
يطول نحو ١٠٠ سم . ويبلغ بسته نحو ١٢٠ سم . وزنه
لا يتجاوز ٧٥٠ غراما || اعطاه تمتد من بماجن جزر
الترابج الى الهند والبحر الاحمر || ثوبه الى السواد ابيض
المزاج . مقدم عنقه الى البياض الاثير . حقة عته
كسكية اللون . مناقده شديدة السرعة . رجلاه الى السرة
يطولها مزاج بحري || قوته الاسماك بصلطها كالكاشية
العفاكية ويدثر مثلها في صدوع السمور ووقايها .

١٤٨٣٥ - شاه اسيرم ربي
Querrellet (F).
اطلب خزامى بحرية .

١٤٨٣٦ - شاه باكل
Autour commun (F).
Goshawk (E).
هو البازي ، اطلبه .

١٤٨٣٧ - شاهبباتج
Aunée conyze (F).
هو البرنوف ، اطلبه .

١٤٨٣٨ - شاهببكرط
Châtignier (F).
هو لكسنتا ، اطلبا .

١٤٨٣٩ - شاهبكرط الحصان
Marron d'Inde (F).
Horse-chestnut (E).
ثمرة للتدلي الهندي ويقال لها ايضا قسطة الحصان
وقسطة مرة .

١٤٨٤٠ - شاعترج * ، كسكرة الحمار
Fumaria (S). Fumeteria (F). Ramping fumitory (E).
Erdrauch, Rankender druch (D). Fumosterno, Fuma-
ria di flor blanca (I).

نبات عشبي حولي بري من فصيلة الشاعترجيات . اوراقه
مستطيلة ، متفالة ، مركبة . نصلها كبير انضغيفي ،
باحث اخضر البعري ، يفوح منه عطره اكلة مادة طيارة
تقتل قبل اللسان تأخذ الالف وتدمع العين || ازهاره
لاقلية التجميع ، صغيرة القند ، لونها الى البياض
الاخضر يملو مزاج ودي .



شال



شامط



شاذية



شاعترج



شاي المزوج



شاي بنسلفانية



شاي صيني



شَبَّ اللَّيْلِ

تزارح من ٣ الى ٥ استر || استرار اوراقها يبدأ بمد
الفرس بثلاث سنوات واجود الاوراق ما تنج من الاثان
الغنية || اشهر البلاد المنتجة لشاي : الصين واليابان
والهند واثنتا عشرة جزيرة جزر الترابيز وسرنديب .

١٤٨٦٦ - شَايِين
Théine (F).
المادة القلوية الموجودة في ورق الشاي وهي مضطمة من
البينين .

١٤٨٦٧ - شَبَّ
Alum (F), Alum (E).
الشب او حجر الشب، ملح معدني بلوري التركيب
ابيض اللون حاصر الطعم يتكون في الطبيعة من بعض
الكبريتات انحصار كبريتات الالومنيوم والبريتيوم .
يأوب في الماء وينصهر في حرارة ٩٢° س || يستعمل
في عدة صناعات انحصار الصباغة القطنية والصوفية حيث
يثبت الالوان ويكسها . ويستعمل في ترويض المياه الملوحة
وفي حفظ الجلود من الاضمحلال ... كما يستعمل في الشب.
وهو من القواض التي توقف الزئبق والرواح .

١٤٨٦٨ - شَبَّ اللَّيْلِ * ، ثَوَائِل اللَّيْلِ ، شَوَائِل ،
شَبَّ الظريف

Mirabilis (S), Nyctage, Belle-de-nuit (F), Four o'clock
plant (E), Wunderblume (D), Bella di notte, Me-
ravaglia, Gelsomino di notte (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة النرجس . انواعها
عديدة تتميز بجمورها الغنية الشكل . اوراقها متعاقبة و
السفلية منها مقعقة اما العلوية فغلظة . ازهارها بيضاء
الشكل ، زاهية الالوان ، تنفتح في الليل وانبلاجها يعم
من طروب الشمس الى سطوع التبرج || اشهر انواعها
الزينة ما يتبع .

١٤٨٦٩ - شَبَّ اللَّيْلِ الْإِثْرِي ، شَوَائِلْ إِثْرِي
Mirabilis dichotoma (S), Nyctage dichotome, Belle-
de-nuit dichotome (F).

نوع من شب الليل وهو عشبة معمرة تملو من ٦٥ الى
١٢٥ سم . ساقها نحيلة . اوراقها لائقة ، بيضيه . ازهارها
صفيرة اللثة ، عطرية العرف ، يضاء اللون او حمراء .
ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

١٤٨٧٠ - شَبَّ اللَّيْلِ الْجَلْبِي ، شَوَائِلْ جَلْبِي
Mirabilis jalapa (S), Nyctage faux-jalap, Belle-
de-nuit faux-jalap, Merveille du Pérou, Herbe triste (F).

نوع من شب الليل وهو عشبة معمرة تملو من ٥٥ الى
١٠٠ سم . اوراقها بيضيه الشكل ، نصلها ازغب اصفه
السفل ، ذلق الزمام الاخير . ازهارها حادة العرف
تطول نحو ٣ سم . لونها يفتح من الازهر الى الاحمر
والاصفر والمزيج || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .
بقودها تستعمل في غش الجلب .

١٤٨٧١ - شَبَّ اللَّيْلِ الْمُسْتَطِيلُ الزَّهْر ، شَوَائِلْ
مُسْتَطِيلُ الزَّهْر
Mirabilis longiflora (S), Nyctage à longs
fleurs, Belle-de-nuit odorante (F).

نوع من شب الليل وهو عشبة معمرة تملو من ٦٥ الى
١٢٥ سم . اوراقها زباد النصل دقة . ازهارها مستطيلة
الانبوب ، خلية البشرة ، فولية العرف ، يضاء اللون ،
حرارة القاعة الداخلية || ازهارها يستمر من تموز الى
ايلول .

١٤٨٥٩ - شَاي
Thé (F), Tea (E).
هو ورق جنبة الشاي يعني يجمع ويصف في الشمس .
ثم يلف ويحمس في مجاميف خاصة . ثم يمد للاستهلاك
يعد تحضيره وزينه بنسب متعارفة القدر بين مختلف
انسان الاوراق || عصبه العالي المحولي زهاء ٥٠٠٠٠٠
طن || اما تركيبه المتصني فهو :

ماء ٨٥٠٠ الى ١٠٧٥٠ %
رمد من ٨٥٠ الى ٧٠٦ %
مواد ازوتية من ٢٣٠٢٥ الى ٢٧٧٤٠ %
مواد دهنية عطرية من ٠٣٨ الى ٠٧٨ %
عطان من ١٥ الى ١٥٢٥ %
شايون (بين) من ١٥١٠ الى ٣٨٠ %
وبعض الحامض الضوية والاملاح المعدنية ينسب يراوح
بمجموعها من ٣ الى ٧ %

١٤٨٦٠ - شَاي الْعَرَبْ هو الفات ، الحلبه .

١٤٨٦١ - شَاي الْمُرُوج * ، قَسُوس
Ledum (S), Ledon, Romarin sauvage (F), Crystal-tea,
Marsh cytus, Marsh rosemary (E), Sumpporae, Wil-
der rosmarin (D), Ledone, Rameiro di palude (I).

جنس نباتات معمرة ابيدة من فصيلة الخنجنيات . انواعها
قليلة يعضها بري وبعضها زينة . ساقها فرعاء تملو من
٧٥ الى ٢٠٠ سم . اوراقها كاملة متعاقبة عطرية العرف .
ازهارها شكلية التجميع ، تاجي الازنكار . ازهارها
خامسة البلات ، نجمة الشكل ، يضاء اللون ، حرة
الرائحة || اوراقها حيدة المنافع الصحية تستعمل استعمال
الشاي || اشهر انواعها ما يتبع .

شاي المزوج المختص
Ledum palustre (S).
Ledon des marais (F).

شاي المزوج العريض الورق
Ledum latifolium (S).
Ledon à feuilles larges (F).

١٤٨٦٢ - شَاي الْكَسْكِك هو الزريع ، الحلبه .

١٤٨٦٣ - شَاي بَرَاظَوِي هو بحشة الشاي ، الحلبه .

١٤٨٦٤ - شَاي بَنَسَلْفَانِيَّة * ، مَوْزَرَّة أَوْ جَوَانِيَّة
Monarda purpurea, M. didyma (S), Monarde pour-
pura, Thé d'Oswego, T. de Pensylvania (F), Oswego
tea, Mountain tea (E), Oswegott, Doppelblauen-
balsam (D), Monarda crenata, M. scaberrima (I).

نوع من الموزده . وهو نبات عشبي معمر من فصيلة
الشفويات . ساقه كثيرة الازداد تملو من ٦٥ الى ١٠٠ سم .
اوراقه مقعقة ، نصلها كامل الصفة ، ساني الشكل ،
منشاري الحافة و زغب البشرة ، عطري الرائحة . ازهاره
شكلية التجميع ، مستطيلة اللثة ، ارجوانية اللون ،
فواصة العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .
اوراقه حمية ناعمة تستعمل استعمال الشاي .

١٤٨٦٥ - شَاي صِينِي *
Thea chinensis, T. viridis (S), Théier de Chine (F).

Tea plant (E), Toerauch (D), Té, Thé (I).

اشهر انواع الشاي واعمالها اكثرها زراعة واكثرها ضروريا واجودها
انتاجا . وهو شجيرة معمرة تملو من مترين الى ستة اعمار .
متوسط طولها نحو ٣٥٠ سم . ترغب في الغمام وفي الاثرية
المروية القليلة الانساج . تحب رطوبة التربة المستحكة
ولا تتأثر بالبرد || تدرس قشور في مستطرها على ابعاد



شَبَّ النِّهَار

١٤٨٧٧ - شَبَّ النِّهَار * شَبَّاب مَعْلَكَة الأَلْوَان

Convolvulus tricolor (S). Belle de jour, Liseron tricolore (F). Three coloured bindweed (E). Dreifarbiges Winde, Kriechwinde, Winde (D). Bella di giorno, Emarocalle (I).

نبات عشبي حولي ترابي من فصيلة البلياتور أوراقه اعليجية الشكل ، تصلها خلى البشرة . ازهاره كبيرة لثقة ، زرقاء البوق يضاء الانبوب ، صفراء للقلعة . تنتشر في النهار وتطلق في الليل || غروبها الليزيتية مدينة جميعا زاية الالوان || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٤٨٧٣ - شَبَّاب هو الطبل ، اطلبه .

١٤٨٧٤ - شَبَّاب * Coleophora, Eupista (S). Coleophora, Eupista (F). Cassebeaters (E). Fackermotten, Sackmotten (D).

جنس فراش من المصفيات . انواعه عديدة اصنافها الاقاليم المنتدة والباردة . جميعها غميلة الجسم صغيرة لثقة ، يغطها رايح من ١٦ الى ٢٢ م . اجسامها حنطية . رواشها الانامية الى الصفرة تعلوها الزواش المختلفة الالوان . رواشها الخلفية الى البياض الاخير يعلوها رايح مختلف مداه ولونه مع الانواع . اطار رواشها عريض الشدب تكثر فيه الالوان الغامقة كالاحمر || رواقها تحمل قرابا لانياس الشكل والذين تلجأ اليه كما تقفل الحلائين . وهي حاصلة وثامة تركب النباتات البرية والاشجار للشرية تقضم الارواق والياتر .

١٤٨٧٥ - شَبَّابَة

الشبابة : المقرب سامة تولد . ويقل مقرب صفراء . وقيل حة المقرب .

١٤٨٧٦ - شَبَّابُوس

هي الشبارس ممكنة من المرفوس ، اطلبها .

١٤٨٧٧ - شَبَّابُوس * شَبَّابُوس ، شَبَّابُوس ، شَبَّابُوس

Ononis antiquorum (S). Ononide antique, Suggiane, Arrête-bœuf (F). Tall rest-harrow (E). Södlische Haschael (D). Bullimacola, Arresta bovi (I).

نوع من البنين وهو جنية متوسطة لثقة حلقة الجذور المستطيلة . الاقنية الامتداد . اوراقه مركبة ، عابقة الخمار . ازهاره متفرقة الجمجم حيلة الشكل صفراء اللون يعلوها رايح وردي || يقال انها من النباتات الطبية نفع ازهارها ينفع الصدر .

١٤٨٧٨ - شَبَّابُوس

يعرف ايضا برباط و فبراير . الشهر الثاني من السنة الشمسية مركزة بين كانون الثاني وآذار . وهو من استحداث الربيع وكان معتم شهر التطهر واخر شهر السنة . ثم اسبح في ريشه الخالي من قشره الخامس قبل الميلاد . عدد ايامه ثمانية وعشرون يوما الا في السنين الكبيسة فهو تسعة وعشرون || في السابغ منه تسقط الجمرة الاول ثم يجري الماء في السد . وفي الربيع حشر تسقط الجمرة الثانية وفي الحادي والعشرين تسقط الجمرة الثالثة . ومنى مقرب الجمرات ان الناس كانوا يخطون في قديم الزمان اخية لثقة في الشتاء يحيط بعضها ببيض وكان الخيل الاول ملى لنواجم الكبار كالحيل والابل والبقر . والحيات الثاني لنواجم الصغار كالتمم وهم كانوا في الحياه الثالث . وكانوا يخطون جرات النار في كل غياه ويخطون



شَبَّابَة



شَبَّابُوس

الجمر للاصطلاح . فلما كان السابغ من شباط اجربوا دواجم الكبار الى الصحراء وجعلوا الصغار مكانها وهم سكنوا مكان الصغار فنبغت سقطت من الجمرات الثلاث جرة . فاذا مضى اسبوع آخر اجربوا البنين ايضا الى الصحراء وهم سكنوا مكانها فسقطت جرة اخرى . فاذا مضى اسبوع آخر اجربوا الى الصحراء وتركوا اشمال النار لثقة البرد وغيى الحمار فسقطت الجمرة الثالثة || وفي السادس والعشرين من شباط اول ايام المنجوز واسباس المنجوز سبعة : ثلاثة من شباط واربعة من آذار وهي لاخضر من البرد والرياح .

تقوم به الزراعي . اعماله الزراعية عديدة . اغصها :

١ - في الزراعات الغلة الموسمية - توزيع الاسمدة الازوتية النيتراية على الزروع بمعدل ٢٠ كيلو لثقة الواحد وذلك لتنشيط النمو الخضري الذي يقرر جودة الاسبال ووفرة الانتاج . بلز الخردل . الاعتناء بمشائل البقول والتبوير وراقبها من تغليات المولل الجرية ومن حيث الحشرات والاصنام . المباشرة ، عند اواخر الشهر ، بتوزيع الاسمدة الكاوية للمركبة على الاربة لمدة لزراعة البقول والخضار .

٢ - في الاشجار المثمرة - متابعة فرس لتسرب الاجبار المثمرة على اختلاف انواعها . ومتابعة التشذيب والتقليم ثم رفع القلاعة وسرقتها بكاملها . متابعة نفض الاشجار بالزيوت البياض الخفيفة وبالواكين الفعالة .

٣ - في الحمضيات - تهيئة فرس مشائل التارنج والليمون الحلو . تنظيف سوق وفروع الاشجار من الماء الصلابة والبقايا اليابسة والكشف على جعلود الاجبار للممرضة والحارث ونفسها بمحلول سلفات النحاس والكلس .

٤ - في الزيتون - ايجاز جميع الاعمال الزراعية التي تملز القيام بها في الشهر الماضي اغصها بالتسميد والحارث والتقليم والتقليم .

٥ - في الكروية - حراث الكروية وتقليمها ثم نفضها بمحلول سلفات النحاس . متابعة الدرس ان في المشائل او في المستقر بعد مراعاة سيق التربة ونظروها الحكيمة ومقدورها الاندماجي .

٦ - في الموز - المباشرة بفرس تصوب الموز في الاربة الخفيفة القليلة الاندماج . تسميد الزراعات القائمة بالاسمدة الكاوية للمركبة والانتباه الى اصنافه الكلس حيث تدمر احاجية .

٧ - في الاشجار الحديقة والحرجية - متابعة فرس الاشجار النافضة والسرور والكروية والاكاليبتوس الخ .

٨ - في الخضار والبقول - متابعة زرع البقول التي صار تدمرها في الشهر المنصرم بضاف اليها التقريب والتكمين والفرج . تسميد زراعات الباذنجان لتفهي على استمرار النمو والاشجار . المباشرة بزراعة الخيار والتكوى والفرج في المواعيد البانعة .

٩ - في الزهور - عرق التربة وتشيدها ونثر الاسمدة الكاوية للمركبة . تقليم الورود والمباشرة بفرس الزهور القصيفة على اختلاف انواعها .

١٤٨٧٩ - شَبَّابَة

الشبابة تربية الشبوط ، وقد تم ذلك في غدران فسيحة متوسطة الفود .

١٤٨٨٠ - شَبَّابُوس

حيط يشد البني . لاستقراره في مكانه .

Carpiculture (F). Carp-breeding (E). Cordon & fixer (F). Fasten-string (E).



شيام



شيث الصيلات



شيث



شيث بري



شيان



شيع

١٤٨٩٠ - شَيْتَالِيَّات * Geophilidae (S).

Geophilidae (F), Geophilidae (E).

فصيلة دويبات من النخاعيات الشفويات الاسماك . اجناسها واوراقها كثيرة العدد اشهرها الشيتان .

١٤٨٩١ - شَيْتَكِيَّات * Demodicidae (S).

Demodicidae (F), Demodicidae (E).

فصيلة حشرات جلدية مجهرية من رتبة اترديات . لا ترى بالعين المجردة ، اجناسها مسطلة ، ارجلها صغيرة . تعيش على فخذ وبصيلات الشعر . تكاثر جميع الحيوانات الثديية ولا تنف من الانسان .

١٤٨٩٢ - شَيْدَع * Buthus (S).

Scorpion jaune, Buthus (F), Yellow scorpion (E). ج شياوع . جنس عقارب متصلة اللد او كبيرة ، مسطلة اللون ، صفراء المزاج . تتميز بملامحها المزدوجة الانسان الناضجة . اصطناعها البلاد الحارة . تكثر في الارضية الرملية . صرحها دجوي ، راجع عقرب .

١٤٨٩٣ - شَيْدَع اصْفَر * Scorpion laune (F).

نوع من العقارب يدعى عقرب اصفر ، اطلبه .

١٤٨٩٤ - شَيْدَع حُمْطِي * Scorpion brun (F).

نوع من العقارب يدعى عقرب حُمطي ، اطلبه .

١٤٨٩٥ - شَيْدَعِيَّات * Scorpionidae (S).

Scorpionidae (E).

فصيلة دويبات ولد خيش من رتبة العقربيات . اجناسها واوراقها عديدة . اصطناعها البلاد الحارة . جميعها دجوية . تسمى في الجبل وتسريع في الجبال في غباري تألفها بين الحجازة وتحتا .

١٤٨٩٦ - شَيْدُوع * Talitrus (S).

Talitrus (F), Talitrus (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات الملبيا وفصيلة النخاعيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الباردة والمعتدلة الحارة . تعيش على السطوح الرملية . جميعها لاصقة وتنتن في الرمل يسهرة || اجسامها صغيرة . طولها من ٥ الى ٧ سم . اوتواها الى الشفة الزرقاء يطولها موج مرجاني يتخلله الخطي عند حنا السكم || جميع انواعها مأكولة كالاربيان .

١٤٨٩٧ - شَيْدَو * Trèfle (F), Clover (E).

هو الخشخاش . وقد جاء في لسان العرب : نبات شيه بارطلة الا انه اجل واعظم ورثا عرب شيدو بالفارسية .

١٤٨٩٨ - شَيْر * Empen (F), Spen (E).

الشير المساة الواقعة بين طرفي الابهام والخصر عند كامل نحبها . متوصلها ٢٢ م .

١٤٨٩٩ - شَيْرَمَص * Chamelon (F).

هو الجمل الصغير لا يزال يتبع امه .

١٤٩٠٠ - شَيْرَق * Young camel (E).

شَيْرَق هو الشبارق ، اطلبه .

١٤٩٠١ - شَيْرَكَة * Chaton (F), Cackin (E).

ازهرار شيل قذي الشكل صغير الازهار الزركية المتجابهة .

١٤٨٩١ - شَيْكَم * Skimmia (S), Skimmie (F).

جنس نباتات برية زرقية من فصيلة البشيات . اوراقها قليلة العدد جميعها جنبات سرورية ترطب في المناطق المعتدلة المنحرة نحو الحارة . سوقها متضبة قرياء . اوراقها عرونة متعقبة متعاقبة . فصلها جامد المسفة الاحليلجية توشم اللند البقية الشفافة . ازهرارها حشركلي الشكل طرفي الانكسار . اثمارها صغيرة اللند ، كثيفة التجميع ، فواكه العرف المشحب . ثمارها غنية ، كرزوية الحميم ، حارة البين ، مأكولة .

١٤٨٩٢ - شَيْكَلَك * هو البرنوف ، اطلبه .

وقد تكتب ايضا شايلاك .

١٤٨٩٣ - شَيْب * Taureau (vieux) (F).

الشيب والشرب : لمن من الليران .

١٤٨٩٤ - شَيْت * Aneth (F).

هو الشيت ، اطلبه .

١٤٨٩٥ - شَيْت * Demodex

جنس حشرات من الشيتيات الجلدية المجهرية . انواعها عديدة تعيش على فخذ الشعر وبصيلاته . تنقل على جميع الحيوانات الثديية وقد تصيب الانسان فتصيب سقوط الشعر وما لا يطاق من الحكاك .

١٤٨٩٦ - شَيْت البُصِيَّات * Demodex follicularum (S), Demodex folliculairis (F).

نوع من الشيت المجهرية يركب المراهي اجسامها الايقار والاذنان وركب الكلاب والسانير تلتف شعرا ويلوحها ويضع بها اللد الاذى . ومتسا يصبب الانسان يتركز عادة في وجهه .

١٤٨٩٧ - شَيْت * Anethum graveolens (S), Aneth, Fenouil bâtard (F).

Anet, Dill, Dill-seed (E), Gerandill, Dill fenichel (D). Aneto, Aneto odoroso, Neco (I). نبات عشبي معمر من فصيلة الشيبات . قريب الشبه من الثيار وقد يستعمل استعماله في التوابل . اوراقه متعاقبة مركبة شريطية . يستخرج منها وين يزور زيت طيار له استعماله الطبي || تنبع اوراقه وجذور ينفذ المدة والاماء ويعرف التنازات ويدعى الاصاب .

١٤٨٩٨ - شَيْت بَرْي * Meum athamanticum (S), Aneth sauvage, Meum (F).

Mes, Bold-money, Spignel (E), Wilder dillen, Feine Bärwurz (D), Meo, Meo barbuto, Finocchio (I). نبات عشبي بري طيب معمر من فصيلة الخشخيات . وجور وسماته واوراقه وزرود تقيد المدة وتوقي القلب وتعرف النازات وتوقي الفواق . يستخرج من جميع اجزائه زيت طيار نافع له استعماله الطبي .

١٤٨٩٩ - شَيْتَان * Geophilus (S).

Géophila (F), Geophilus (E), Erdläufer (D).

جنس دويبات مفترسة من فصيلة الشيتانبات . انواعها عديدة اجسامها مبطلة بيقة مسطلة مركبة من فترات الخلفات . جراسها تد من ٤٢ الى ٧٣ زوجا لكل حلقة زوج . اصطناعها الحار . تألف الارضية الرملية . تعيش تحت البيل والعلاب . تسرح في الليل . فواصلها فسفورية مضية . انفاها مسطحة . قوتها الحارطين والديدان . تعتبر من الدويبات الفاصرة لانها تقضم الجوز والسيارود .

14917 - **شَبَن** - Engraissement (F). Fattening (E).
حلف البواجن لتسمينها. وهي عملية اقتصادية تُعزّز
حل قواعد تقنية وريقة الارتباط بالنواصر الغذائية المختلفة
للمفاهيم التي تحوّلها الاكلات من الاعشاب الى الحبوب .

14918 - **شَبَن** - Casarius (S).
Casuar (F). Casowary (E).

جنس طير من الشبنيات قريب الشبه من النعام . انواعه
٦ جميعها كبيرة الجثة . كناية الرأس ، جالسة المتقاد ،
قصيرة العنق ، زغبية الريش . بحيلة الاطوار الزاوية
الاولان ، ذكورها واناثها تحمل بالثوب نفسه بين ميزاتها
ان الذكر يحضن البيض دون الانثى || اعطانه بلاد
الهند وجبواها . يأنف القنابات الكثيفة وضفاف الأنهر
الذخلة . قوته الحشرات والطفاد والضفادع .

14918 - **شَبَنِيَّات** - Casuaridae (S).
Casuaridae (F). Casuaridae (E).
فصيلة بطور من الموردي قريبة الشبه من النعام الا انها
اصغر حجماً واقل صفاً وصفاً . تتميز بقناباتها الكناكية،
بناتيها الجالسة ، باجنحتها القصيرة ورياحها الزاوية وشبهها
اللاحع . جميعها خيفة الخلق نفور وعقور .

14919 - **شَبَن** - Cuivre jaune (F). Brass (E).
هو النحاس الاصفر .

14920 - **شَبَن** - Métalloïde (F). Metalloid (E).
اشياء المادان مواد بسيطة تتميز بقلة ايصالياتها الحرارية
والكهربية ، كما تولدت مع الاكسجين الحماض
والاكسيدات الانتمتة .

14921 - **شَبَن** - Quasi-usufruit (F).
صيغة فقهية مناهة الانتفاع بالممتلكات وحل المستع
الذي استهلكها او باعها فربما ان يرد اشغالها وزناً وصفة
ومثلاً حين زوال الانتفاع .

14922 - **شَبَن** - Quasi-possession (F).
هي حيازة حق ارتفاق .

14923 - **شَبَن** - Alcaloïde (F).
Alkaloid (E).

مادة عضوية ازرقية تستخرج غالباً من بعض النباتات
التامة لتناثبات القلوة . راجع قلويد .

14924 - **شَبَن** - Lalton (F). Brass, Latten (E).
هو النحاس الاصفر .

14925 - **شَبَن** - Pallurus (S).
Pallure (F).

جنس اثمار وجنبات شاكدة من فصيلة البقيات .
انواعه عديدة تملح من مرتين الى ١٥ م . اثمارها كثيفة
مراكبة . اوراقها مصاقبة ، معتقة ، بيضية النصل .
انزعارها حشوكلي التسجع ، ابطي الارزكاز . انزعارها
صغرة اللقد صفراء اللون . ثمارها قبيحة الشكل ، مرتفعة
الاطراف المجنحة . يقال انها لا تخلو من المنافع الطبية .
اشهر انواعه الشبان الشالك .

14926 - **شَبَنِي** - Amentiforme (F).
Amentiform (E).

ما كان شكله شكل الشجرة .

14927 - **شَبَن** - Euphorbe pityuse (F).
هو الشرب من النباتات الجحالية المؤذية ، اطلبه .

14928 - **شَبَن** - Vague hémipère (F).
حشرة مؤذية من الجليليات تسمى فلقوس ، اطلبه .

14929 - **شَبَن** - Renouée des oiseaux (F).
هو البطباط ، اطلبه .

14930 - **شَبَن** - Persicaire Indigotier (F).
هو البطباط النيل ، اطلبه .

14931 - **شَبَن** - Polydesmus (S).
Polydesme (F). Polydesmus (E).

جنس دويبات من فصيلة الشبريات . انواعه المروقة
خفة اجسامها مبطلة مسطيلة مركبة من ٢٠ حلقة
ضمورة الفواصل . طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم .
تألف الخدائق والياثل . تعيش تحت المبل مكررة كالحاتم .
قرباً المواد النباتية . تسرح في الليل تقضم الجزر وسائر
البقول الرخصة .

14932 - **شَبَنِيَّات** - Polydesmidae (S).
Polydesmidae (F). Polydesmidae (E).

فصيلة دويبات من الشبنيات الشفويات الارجل ،
اجسامها وانواعها عديدة اشهرها الشبير .

14933 - **شَبَن** - Nymphomanie (F).
Nymphomania (E).

هو الانتماء والفتنة يمد الى هيجان الشفر واستمرار حالة
الوبان في الانثى .

14934 - **شَبَن** - Turgescence (F).
انتفاخ وتور في الاربعة يصلها ويؤذيها حبساً .

14935 - **شَبَن** - Filet (F). String (E).
هي الخزقة تصاد بها الاسماك .

14936 - **شَبَن** - Canalisatión, Réseau de canaux (F).

مجسمة الانثى في تئين لري في مزرعة او منطقة او بلاد .

14937 - **شَبَنِيَّات** - Raphidiopères (F). Raphidiopteri (E).

رتبة ششرات نافذة من طبقة عصيات الجناح . تشمل
فصيلة واحدة وبعض الاجناس والانواع . اجسامها
متوسطة القد ، رؤوسها نافذة ، بجناحتها مسطيلة . وهي
من الحشرات النافذة للآحمة في دورها البري والحشري .

14938 - **شَبَنِي** - Résine (F). Resina (E).

احدى طبقات البين الداخلية تأتي بعد القلوة والقرنية .
تتكون من وحدات صلبة تبدو كاللشاه الرقيق ينفذ
سلح البين الباطني . مركزها وراء العنسة وهي تستقبل
الاشعة الضوئية فتنتج عليها للمزيات التي تنقلها شبكة
الاصحاب الى المنطقة البصرية بالمخ .

14939 - **شَبَن** - Lionceau adulte (F).

ولد الأسد اذا ادرك الصيد ج اشبال وشبال .



شَبَن



شَبَن



شَبَن

١٤٩٢٦ - شبهان شائك، صامور شائك

Paliurus aculeatus, *P. spina-Christi* (S). *Paliurus spinosus*, *Epine du Christ*, *Argolou*, *Porte-chapeau* (F). *Garland thorn*, *Christ's thorn*, *Jerusalem thorn* (E). *Südlicher Stechdorn*, *Christdorn* (D). *Paliuro*, *Spina di Christo*, *Porto capello* (I).

نوع من الشبان الكثير الشوك المركب المستطيل الاعفد. جنبته تملو نحو ٣ ابرار . يستعمل في السياجات . سياجه لا ينعم . يعيش في جميع الاثرية الزراعية ولا يخشى الرطوبة .

١٤٩٢٧ - شبيهة

Adulte (F). *Adult* (E).

هو من البقر والغنم والماعز ما تم نموها واكتست لسانته . ويقال له شيب .

١٤٩٢٨ - شبيهة

Chellifer (S).

Chellifère, *Scorpion des livres* (F). *Chellifer* (E). جنس مشرط ثمانية من العنارب الكاذبة تعيش في البيوت وفي شقوق الاخشاب اليابسة قربها الحشرات الصغيرة اعصها التي تفرس الارواك والنبات .

١٤٩٢٩ - شبيهة سرخسية

Chellifer caneroide (S).

Chellifère canéroïde, *Scorpion des livres* (F). *Book scorpion* (E). *Bücherskorpion* (D).

نوع من الشبيهة ، دودية من فصيلة الكرنيسيات ودية القربيات الكاذبة . موطنها جميع اسقاع البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم . جسمها صغير اقله

يطول من ٤ الى ٦ سم . نوحها الى السرة الخفية . صدرها مزلالي . مقبها مستطيلان ينتهيان بحلقطين كلاط المقارب . بطها عادم الذنب . عيناها مركبتان صغيرتان . جرابها دقيقة مستطيلة . تألف المراتع المظلمة والبيوت الآلة والحرة . تعيش بين الاخشاب وفي شقوقها . قربها الحشرات الصغيرة اعصها التي تفرس الثياب والورق . تعتبر من الدويبات النافعة للاموية .

١٤٩٣٠ - شبوط ، سبوت ، سابوت ، سبوت

Cyprinus carpio (S). *Carpe* (F). *Carp* (E).

جنس اسماك مأكولة من فصيلة الشبوطيات . انواعه عديدة معظمها من اسماك المياه العذبة . جميعها كبيرة اقله طولها يراوح من ٣٠ الى ١٠٠ سم . تتميز بفستامة وسطها ، ودفه ذنبها وقصر رأسها ولين زانفها ورواس تكها الاسفل . قربها الاخشاب المائية . تعيش وتتكاثر في الاسماك البقية النور .

١٤٩٣١ - شبوطيات

Cyprinidae (S).

Cyprinidés (F). *Cyprinidae* (E).

فصيلة الشيايط من رتبة مفتوحات الخشاة . تشمل عدة اجناس اشهرها الشبوط والبيس والمطوعة .

١٤٩٣٢ - شبيات ، شوقليات

Nyctaginaceae (S).

Nyctaginacées (F). *Nyctaginaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقطين اجنتها وانواعها عديدة اشهرها شب الليل والبونفيلية والابروية .

Scorpionnet (F).

Young scorpion (E).

١٤٩٣٣ - شبيدع

صغير الشيدع والقرب .

Jabiru

١٤٩٣٤ - شبيرو

هو الكثير ، امله .

١٤٩٣٥ - شبيهة ، وتيلاء الاسبية

Segeteria (S). *Ségeterie*, *Araignée des caves* (F). *Coilar spider* (E). *Kellerspinne* (D).

دودية من العناكب الاسبية القاصة ثنائية الراويا عداية الماشان من فصيلة الشيايات . جسمها مستطيل اقله يطول نحو ١٦ مم . عند الذكر ونحو ٢٨ مم . عند الانثى . صدرها مستطيل الشكل ، اسر اللون ، بنسجي المواج . عيناها زوجيتان ، شيفها غليظان غليمان . فكها غليظان . جرابها شقية ، كثيفة الملب . بطها يفيش الشكل ، اسود اللون ، بنسجي المواج . تألف الكهوف والمناور والاقية والغاربان والسكن الاضية . سرورها دجوي . عضمها هكدية قراية الشكل تسجها في الشقوق . قربها الحشرات تسمى اليها بصره مدقة . لستها ملحة مؤذية تسبب حي خفيفة تستمر نحو ثلاثة ايام .

١٤٩٣٦ - شبيط

Xanthium (S).

Xanthium, *Lampourde* (F).

جنس نباتات عشبية برية سولية من فصيلة المركبات انواعه . اوراقها متعاقبة ، مدقة ، مغرفة النصل المنصع السفلة . ازهارها عكوكية التنج ، محورية الارتكاز . مناتها الطبية عديدة تشمل في عدة مستحضرات وتراكيب اشهر انواعه الحثي والسلي .

١٤٩٣٧ - شبيط حثي ، كور الحبيد

Xanthium abyssinicum (S). *Xanthium abyssinicum*, *Lampourde d'Abyssinie* (F). *Burdock*, *Cockle-bur* (E). *Spitzklette* (D). *Lappola* (I).

نوع من الشبيط . مهد بلاد الحبشة . مناته الطبية عديدة اعصها الامراض الجلدية .

١٤٩٣٨ - شبيط سلمي

Xanthium strumarium (S). *Lampourde des écrouelles*, *Petite bardane* (F). *Lesser burdock*, *Burweed* (E). *Echte Spitzklette* (D). *Lappa*, *Lappolone*, *Xantio*, *Bardana minore* (I).

نوع من الشبيط الملوك مهد البلاد المعتدلة الحارة اكثر في الاماكن المتوسطة الرطوبة . يستعمل في معالجة داء الحنازير .

١٤٩٣٩ - شبيق ، صنبور

Tuyau de pipe (F).

هو قصبة الفلوتين من اي مادة كانت .

١٤٩٤٠ - شبيك

Amaryllis

هو الاماريلس ، اطلبه .

١٤٩٤١ - شبيكة

Nassa (S).

Nassa (F). *Nassa* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربل وقصيلة الشبيكات . انواعها المتاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . جميعها شقية تعيش حل الشصاف والرمال المنصورة باللاء . اصدانها شبيهة بالسلال كشبيكة المتصلة للصدى . جميعها مغزلة الاغقاب للذرية ، متباينة المظهر الخارجي ، منها المالسة والمقرعة والهددة والمقرعة . اجسامها كبيرة . رؤوسها مبطقة ، مسترسمة ، ثنائية الفرائس المستطيلة المعينة القواعد . اصطلاحا انبوية مستطيلة . ارجلها قارئة ثنائية الاذنيات الصغيرة الطرفية الارتكاز .



شبهان شائك



شبيهة سرطانية



شبوط



شبيط



شبيك سلمي



شبيكة

Calypsozpora ١٤٩٥٢ - شجاعة * كليبتوسبورة *
جنس فطور مجهرية من فصيلة الشجيات . أنواعه قليلة
تتميز بدعاماتها الخيطية اللون ، المستطيلة الوترية ، الشفافة
الانقسام ، الثنائية أو الرباعية الاضية || أما دعاماتها
فتنمو وتتكاثر على الخلايا الادمية اعصها خلايا الاوراق
والتواقي .

١٤٩٥٣ - شجاعة السقام *

Calypsozpora goeppertiana, Aecidium columnare (S), Rouille de l'airelle (F).
فطر مجهرية يتطفل على الثقام فيسبب الاوراق ويؤذي
التواقي . وهو من الفطور التي تقضي طورها الايدي
على الثوب وتتطفل بطورها النحاسي على الثقام || مظهره
الخارجي اصفرار في الاوراق يشبه امطالة في التواقي
ثم جفاف في الغمام وصلاية في الاثبات تؤدي الى احتلال
الانزاع النشوي فتسقط الاوراق قبل زمن الاعمال وتبين
التواقي قبل اكتمال دورتها الحولية || يكافح باستعمال
مركبات النحاس .

Plant (F), Slip (E). ١٤٩٥٤ - شجاعة
هي كل نبتة جديدة ستؤلف الجذور يمكن نقلها وغرسها
في مستقرا . ج شتلي .

Hivernal, Nival (F). ١٤٩٥٥ - شتوي
Hiemal, Nival (E).
نمت تعريفي يطلق على كل نبات ينمو ويزدهر في الشتاء .

Plantule (F). ١٤٩٥٦ - شجاعة ، نبتة
Young slip (E).
كل شتلة في زمن النشوء الاول قبل ان يجرى اتلاصها .

١٤٩٥٧ - شت
الشت شجر مثل التفلح الصغير . طيب الريح . هو الطم .
يدعى بوفرة وهو كورق الخلاف . وله رمة موددة وستة
صغيرة فيها ثلاث حبات او اربع سوي مثل الشنيز رماه
الحمام اذا انتثر . واحده شتة (السان) .

Abeille ouvrière (F). ١٤٩٥٨ - شت
Working bee (E).
هي النحلة الصالة . ج شتات .

١٤٩٥٩ - شجباب هي السداة ، اطباء .

Arboriculteur (F). ١٤٩٦٠ - شجبار
Arboriculturiez (E).
ال عالم للمشتل بالبحث عن اسوال الشجر (ابن البطار) .

Dendrologie (F). ١٤٩٦١ - شجباركة
Dendrology (E).
علم يبحث في هوية الاشجار وتصنيفها وتقسيمها .

Echis carinata (S). ١٤٩٦٢ - شجاع
هو الاربعة افس عظيمة ضمة الرأس دقيقة المتق وقشاه
اعطاه . اذا غصبت وقشاه غلفها انتفتحت . اعطاه
البلاد الحارة تكثر في اواسط افريقية وفي الصحراء العربية
وفي اليمن .

l'Hydra femelle (F). ١٤٩٦٣ - شجاع أنثى
Hydra (E).

لشجاع هو انتفاخ الجسم الجنوبي المجوف مركزها تحت
الغراب والباطية والمنداس وقوق بروج السرطان والاسد

Nassidae (S). ١٤٩٦٢ - شجيات *
Nassidae (F), Nassidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربل .
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من مستحبات
الاراضي المائية والثانية والرخويات الآخر منتشر في معظم بحار
العالم || جميعها واجبة تعيش على جيف الحيوانات البحرية ||
اصداؤها مشابهة الاشكال ، يكثر فيها الشكل القوي
المستطيل الطرف الذري . جميعها ملونة ، بعضها خالص
الصفحة والبعض الآخر مشع او محرز او مخدّد ||
اصرف اجناسها واشهرها الشجكة .

Hiver (F), Winter (E). ١٤٩٦٣ - شجاعة
احد فصول السنة الاربعة يبدأ عندما تكون الشمس في
ذروة بعدها من الست وهو يوم ٢١ كانون الاول في
نصف الكرة الشمالي ويمتد الى ٢١ آذار || وهو يتبع:
١- بقلة سقوط الامطار باستثناء مناطق حوض البحر
المعتدل . ٢- بقلة الفر لا سيما عند الابتعاد عن خط
الاستواء وعند الارتفاع من سطح البحر . ٣- بكثرة الثلج
واستباب الجليد في المناطق الشالية . ٤- يسكن الطبيعة
واعمال الانجار الخفيفة وبيات الحيوانات والحشرات
لمستكنة وبهجرة الطيور القواطع الخ .

Hibernal ١٤٩٦٤ - شتالي
نمت تعريفي يطلق على ما هو مختص بقصر الشتاء .

Défectuosité, Malformation (F). ١٤٩٦٥ - شتور
Defect, Malformation (E).
يقال ثمار لا شتر فيها اي لا حبيب فيها .

Entropion (F). ١٤٩٦٦ - شتور داخلي
Entropion (E).
عارض قوامه تغير حالة الشئ وانقلابه من الخارج الى
الداخل .

Cetaceus (S), Cétérac (F). ١٤٩٦٧ - شتورقي
جنس نباتات سرخسية من فصيلة الباسجيات . أنواعه
مدينة يكثر ويوجد في المواق الرطبة بين الصخور وعلىها .
اشهر انواعه الشتراق المخرني .

١٤٩٦٨ - شترق كخنزوي * ، حشيشة الذهب
Cetaceus officinarum (S), Cétérac officinal, Du-
rade (F), Scale fern, Scaly spleenwort, Rusty-back
(E), Echter Volfarn (D), Cetaceus, Cetaceus, Erbe do-
rata (I).
نوع من الشتراق يعيش على الصخور والجدران . يستخرج
منه صباغ ذهبي اللون . يقال ان النبات يكلمه يقيد
السلطان ويحل الصدر .

Palmure (F). ١٤٩٦٩ - شتوركة
الشترة والشترة والحطاب واحد . راجع حطاب .

Espace entre 2 doigts (F). ١٤٩٧٠ - شتوركة
التفجيرة بين الاصابعين .

Carence (F), Deficiency (E). ١٤٩٧١ - شتقع
الشتع هو انتفاخ الجسم النباتي الى منصر من عناصر الغذاء
الرئيسية او الثانوية .



شتراق مخزلي



شتقة الثقام

والملءاء || مدد نجيبها ٦٠ والمرب تسمى القبر الذي على
آخر المئق والقرد والقرد من ابتاعه . وفيها نير آخر
من المرتبة الثانية يدعى « قلب الشجاع » .

١٤٩٦٤ - شجَرَة ذَكَر (F). l'Hydre mlie
Hydrus (E).

الشجاع الذكر كوكبة نجوم اقرب الى الجنوب من الشجاع
الانثى . مركزها بين الطوائن والشبكة والحرياء والطنن ||
عدد نجومها ٢٩ جميعها من المرتبة الرابعة ودونها .

١٤٩٦٥ - شَجَرَة (F). Arbre (F). Tree (E).

تجمع كل الشجر والاشجار والشجرات . والشجر من النبات
ما قام على ساق وما سما بنفسه دق او جل . يتميز بجلوده
المتسقة في باطن التربة تملوا جلوع غشية التركيب تستقر
عليها الاضنان والاشناد التراكبية || يقال في قصيدتها
شجرة وشيرة . اما الشجر فثبت الشجر . والشجرة ارض
تثبت الشجر الكثير . وهذا المكان اجبر من هذا اي اكثر
شجرا ويقال واد شجير ولا يقال اجبر .

١٤٩٦٦ - شَجَرَة إِبْرَاهِيم (F). Gettiller commun
في الارائه جنبه طيبة ممتدة .

١٤٩٦٧ - شَجَرَة الأنداء (F). Mammée
في الجلباس ، اطلبه .

١٤٩٦٨ - شَجَرَة الأشنى (F). Donnie
في اللورم ، اطلبه .

١٤٩٦٩ - شَجَرَة البثث (F). Clérodendro
في البختية ، اطلبه .

١٤٩٧٠ - شَجَرَة البركاز (F). Sterculier
في البرازية ، اطلبه .

١٤٩٧١ - شَجَرَة البق (F). Orme
في البرقيصا ، اطلبه .

١٤٩٧٢ - شَجَرَة البهاء (F). Calodendron
في الكالودندرون ، اطلبه .

١٤٩٧٣ - شَجَرَة التوليب* ، شَجَرَة الزنبق
Liriodendron tulipifera (S). Liriodendron, Tulipier
(F). Tulip tree, Lyre tree, Saddle tree (E). Echter
tulpenbaum (D). Liriodendron, Tulipifera (I).

شجرة مرددية الشكل من فصيلة المنيليات . مهدا امريكة
الشالية . تملر من ٢٠ الى ٣٥ م . اوراقها معتقة كبيرة
النعل الرباعي او السباعي النقصيص . ازهارها صفراء
الرائحة كبيرة القذبة تشبه التوليب ، لوها الى الصفار الاخضر .
غشيا نام الرقعة ، خفيف الوزن ، ثقي القون ، مرفوف
فيه || ازهارها ينسمر من اوائل حزيران الى اواخر تموز .

١٤٩٧٤ - شَجَرَة التيس (F). Liriodendron
في الهيرداريقون للطنن ، اطلبه .

١٤٩٧٥ - شَجَرَة التلج (F). Liriodendron
في زمره التيسك ، اطلبه .

١٤٩٧٦ - شَجَرَة الجرداد (F). Liriodendron
في الرويلية السلية ، اطلبه .

١٤٩٧٧ - شَجَرَة الجرج (F). Liriodendron
في اللوس ، اطلبه .

١٤٩٧٨ - شَجَرَة الجيغال (F). Liriodendron
في غافور الجيال ، اطلبه .

١٤٩٧٩ - شَجَرَة الجين* في اروز حلايا ، اطلبه .
١٤٩٨٠ - شَجَرَة الحرير
في الصقلاب السوري ، اطلبه .

١٤٩٨١ - شَجَرَة الحليثية في الانجلمان ، اطلبه .

١٤٩٨٢ - شَجَرَة الحشاش*
Oxydendron arboreum, Andromeda arborea (S).
Oxydendron in arbre, Arbre à Foselle (F). Sorrel
tree, Sourwood (E). Sauerampferbaum (D). Albero
ossale (I).

شجرة سربية وزينية من فصيلة الخليلجيات . مهدا
امريكة الشالية . تملر من ١٥ الى ٢٠ م . اوراقها
حاشية الطم ، عابطة ، متعاقبة ، نصلها ايليبي
للشكل ، مسن الحافة ، جميل الخضار اللامع . ازهارها
ملوكة للتجمع ، تاجي الازركاز . ازهارها جلجلية ،
مستطيلة ، حلبة البشرة ، يضاء اللون || تثورها واراقها
غضائية ، صلبها اسود .

١٤٩٨٣ - شَجَرَة الحمص
في المشران الكبير ، اطلبه .

١٤٩٨٤ - شَجَرَة الحنيكة في انتريا الشرقية ، اطلبه .

١٤٩٨٥ - شَجَرَة الخبيل في الجاكا ، اطلبه .

١٤٩٨٦ - شَجَرَة الدكن في البق للسول ، اطلبه .

١٤٩٨٧ - شَجَرَة الرهبان في البختية ، اطلبه .

١٤٩٨٨ - شَجَرَة الزبدكة في بامية السمن ، اطلبه .

١٤٩٨٩ - شَجَرَة الزنبق
Liriodendron
في شجرة التوليب ، اطلبه .

١٤٩٩٠ - شَجَرَة الساعو في السافقية ، اطلبه .

١٤٩٩١ - شَجَرَة السباء في الانطنس ، اطلبه .

١٤٩٩٢ - شَجَرَة السمين في خيرا الحاملين ، اطلبه .

١٤٩٩٣ - شَجَرَة السيوك في الاراك ، اطلبه .

١٤٩٩٤ - شَجَرَة السوس في السوس ، اطلبه .

١٤٩٩٥ - شَجَرَة الشمع*
Stillingia sebifera, Sapium sebiferum (S). Stillingia,
Arbre à suif (F). Chinese tallow tree, Vegetable tal-
low (E). Chinesischer Talgbaum (D). Albero dal
sego, Sevo vegetale (I).

شجرة صناعية من فصيلة التريبات تكثر زراعتها في بعض
المناطق الشرقية والامريكية . يستخرج منها شحم نباتي
ماكول يحفظ بعض البقث لانه لا يتأكسد بسرعة .

١٤٩٩٦ - شَجَرَة الشمع في الشمعية ، اطلبه .

١٤٩٩٧ - شَجَرَة الصابون في الرينة ، اطلبه .

١٤٩٩٨ - شَجَرَة الصنغ الاناثو
في البكسا ، اطلبه .

١٤٩٩٩ - شَجَرَة العرب في عتيق الحقل ، اطلبه .



شجرة التوليب



شجرة الحامض



شجرة الشم

١٥٠١٩ - شَجَرَة (F). Bush, Shrub (E).
هي من النبات كل شجرة صغيرة لقد تملو الجنبه ولا تترك
الشجرة .

١٥٠٢٠ - شَحَاج ، شَحِيج (F).
Bray of an ass (E).
صوت البهل والحمار .

١٥٠٢١ - شَحَاج (F).
Onagre (F).
حار الرش ، اطبله .

١٥٠٢٢ - شَحَاج (F).
Ectage (F).
هو البروش ، اطبله .

١٥٠٢٣ - شَحَارِيَّات ، شَعْرِيَّات
فصيلة نباتية تعرف بالسحليات ، اطبلها .

١٥٠٢٤ - شَحَب ، فَحَاح (F).
Déchaumage (F).
Digging up the stubble (E).
هي الحراثة للسطحية التي تمتع الحصاد للغاية منها هوية
التربة واقتلاع الجذام ونحوه .

١٥٠٢٥ - شَعْر (F).
الشعر والشعرة : الشط القصير ويجرى للماء في بطن الوادي .

١٥٠٢٦ - شَعْرُور (F).
Turdus (S).
Merle (F). Black bird (E).
جنس طير من القواطع وفصيلة الشحروريات ، أنواعه
عديدة تتميز بأصواتها الرخوة التفرده ، بعضها المستديرة
وبأصواتها البهجة المستطيلة التي تحكيها من الانتقال
على الأرض بسهولة كلية || قوتها الحشرات والديدان
والآثار . تألف الحدائق والسياحات والأغال والأحراج الصنوبر
والسنديان . تكثر في الأشجار . أنثاها تبيض من ٤ الى
٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو أسبوعين . الشعر
الزاهي ما يلي .

١٥٠٢٧ - شَعْرُور أَسْوَد * (F).
Turdus merula (S).
Merle noir, M. vulgaire (F). Common black bird (E).
Amsel, Schwarzdrossel (D).
نوع من الشحرور وهو طائر غريد له شتاء وصفه
دون أن يكون من القواطع التي تجرب البلاد . طوله نحو
٢٦ سم . ذكره أسود اللون ، بيروني الخنثار وسواجب
العين . أثناء فصيلة الظهر ، يراه العين الموشم بالأصفر
والأصاحب . مقارنا بهنر || قوته الحشرات والديدان
والحززون والآثار . يألف الحدائق والنباتات . ينش عشه في
الأدغال القليلة الارتفاع .

١٥٠٢٨ - شَعْرُور حَدَّاب (F).
Turdus aureus (S).
Merle doré (F). Gilded black bird (E).
نوع من الشحرور وهو طائر غريد من القواطع . ثوبه
الصفار الذهبي تملوه ريشه سوداء || يألف الأحراج
والنباتات الكثيفة . ينش عشه في سَم الأشجار .

١٥٠٢٩ - شَعْرُور مَطُوق (F).
Turdus torquatus (S). Merle à plastron (F). Ring-
ouzel (E).
نوع من الشحرور وهو طائر غريد من القواطع . ثوبه الـ
البردة الفضية المواجه . زوده أبيض اللون || يألف
الحدائق وأحراج الصنوبر والسنديان . ينش عشه في الأشجار
الانخفاض القليلة الارتفاع .

١٥٠٠٠ - شَجَرَة الْفَتَاكِيل هي قرطلة النويان ، اطبلها .

١٥٠٠١ - شَجَرَة الْفُلُفُل الْكَاذِب (F).
في الشكينوس ، اطبله .

١٥٠٠٢ - شَجَرَة الْفُلُفُل (F).
في اسطرافالين نوراس ، اطبله .

١٥٠٠٣ - شَجَرَة الْكَيْد ، بُلْدُش (F).
Boldou fragrans, Peumus boldus (S). Boldo, Boldu (F).
Boldo, Wood tree (E). Chilenischer Boldobaum (D).
Boldo (I).
شجرة من فصيلة الشيتات مهددة بلاد الشيل . أوراثا
مروعة ، طرية البرق ، طيبة ، تستعمل في علاجات
الكبد ويستخرج منها مادة تامة لكي بولدين (Boldine)
تستعمل كدوية وقوية وعاضدة . ثمارها سكرية الطعم
مأكولة وهي كازرور قذا وشكلا .

١٥٠٠٤ - شَجَرَة الْكَلْب (F).
في الأيسم اللحي ، اطبله .

١٥٠٠٥ - شَجَرَة الْبَن (F).
Brosimum galactodendron (S). Brosima, Galacto-
dendron utile, Arbre à lait, Piratinéra (F). Cow tree,
Milk tree (E). Milchbaum, Kuhbaum (D). Palo di
vacca, Albero del latte (I).
شجرة من فصيلة القرصيات . مهددة أمريكا الاستوائية .
منبتها الأماكن القاسية . تملو من ١٥ الى ٢٠ م . أوراثا
مستقيمة متضامة ، كبيرة الفرس . أنوعها ثنائية المسكن ،
قدية التجميع ، ثمارها جراء جلدية القشور ، مأكولة
الزور . يستخرج من ساقها غاز حصارية لبنة تشبه
الكأنة شكلها وركيا ، تتركب ملازمة ويصنع منها شيء
كالجين .

١٥٠٠٦ - شَجَرَة الله في الإيلنس ، اطبله .

١٥٠٠٧ - شَجَرَة الْمَسَاكِر في الرنالا ، اطبلها .

١٥٠٠٨ - شَجَرَة الْمَطَاط في الخفية ، اطبلها .

١٥٠٠٩ - شَجَرَة الْمُعِيد في الجينكو ، اطبله .

١٥٠١٠ - شَجَرَة الْفُلُفُل في الدوم ، اطبله .

١٥٠١١ - شَجَرَة التَّيْجَة (F).
Liquidambar à styrax (F).
في التبر القدام الأمريكي ، اطبله .

١٥٠١٢ - شَجَرَة التَّبَق في السدر ، اطبله .

١٥٠١٣ - شَجَرَة الرَّك في ايرتلون ، اطبله .

١٥٠١٤ - شَجَرَة عُيُور الْقُرُود في البوباب .

١٥٠١٥ - شَجَرَة لِسَان الْمَعْفُور في المران ، اطبله .

١٥٠١٦ - شَجَرَة مَوْه في الازرعت ، اطبله .

١٥٠١٧ - شَجَرَة مَرَم في قيقان نبات ، اطبله .

١٥٠١٨ - شَجْنَة (F).
Ramification (F).
جمل عروق الشجر من اغصان وفناد وإفان وخرايب .



شحرور اسود

أوراقه تطول نحو ٥ سم. وتعرض ٨ سم. نصلها جيل الحُصار الجريح. ثماره صغيرة أبيض اللون || أنثراره يستمر من نيسان إلى أيار.

١٥٠٣٧ - شُحُورِيَّاتُ الزُّوقِ

Phillyrea latifolia (S). *Filaria à larges feuilles*, *Phillyrée à larges feuilles* (F).

نوع من الشجيرات شجيرة تملو من ٦ إلى ٨ أمتار. أوراقه قليلة الشكل نصلها مستعرض للقاعدة، سنن الحافة، شائكة. ثماره عنية الشكل والقد، مغلفة القبط، عددة الطرف، لونها إلى البنية السوداء || أنثراره يستمر طوال شهر أيار.



شحورة

١٥٠٣٨ - شُحُورِيَّاتُ مَبْدُولَة الزُّوقِ

Phillyrea media (S). *Filaria intermédiaire*, *Phillyrée intermédiaire* (F).

نوع من الشجيرات شجيرة تملو من ٤ إلى ٥ أمتار. أوراقه اطليجية الشكل نصلها سنن الحافة عرقه نحو ٢٠ سم. ثماره عنية الشكل وراقه، جذيرة اللون || أنثراره يستمر من نيسان إلى أيار.

١٥٠٣٩ - شُحُورِيَّاتُ مَبْدُولَة

Phillyrea decora (S). *Filaria décorée*, *Phillyrée décorative* (F).

نوع من الشجيرات شجيرة تملو من متر إلى ثلاثة أمتار. أوراقه تطول نحو ١٥ سم. وتعرض نحو ٥ سم. نصلها جلدي السطح الباهت الحُصار. ثماره بيضية الشكل. لونها إلى البنيجي اللامع || أنثراره يستمر طوال شهر أيار.



شحم

١٥٠٤٠ - شُحُورِيَّاتُ

Fientia (F). *Dung* (E).

الشحط : ذوق الفائر.

١٥٠٤١ - شُحُورِيَّاتُ

Cyclopterus (S). *Cycloptère* (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الشحطيات شائكة الزعانف. انواعه عديدة معظمها من اسماك بحار المناطق المعتدلة الحرارة والشمالية الباردة || اجسامها حوضية الجسم، كروية الشكل، تطول من ٢٥ إلى ٩٥ سم. سوكها بحجمية ويشللة. رؤوسها مستديرة قصيرة الاعظام، رفيعة البنية، صغيرة الاشفاق || ألوانها تختلف مع الانواع، تكثر فيها الازياء السواد. زعانفها عددة السطح. تحمل في مقدمها بحجمية طباقية مستديرة مؤلفة من الزعنفتين الخروصيتين المتصقتين، تمكها من التمسك بالأسماك الصغيرة حيث تكمن رافدة قدم فرائسها || اعرف انواعه وأشهرها الشحطارة المبدولة.

١٥٠٤٢ - شُحُورِيَّاتُ مَبْدُولَة

Cyclopterus communis, *C. lumpus* (S). *Cycloptère commun*, *Lump*, *Lompe*, *Livre de mer* (F). *Lump-fish*, *Sea-owl*, *Cock-padd*, *Ha-padd* (E).

نوع من الشحطار. سمكة بحرية بيض. اصلها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلي || جسمها يضيء الشكل، معتدل الطول، بطول نحو ٥٠ سم. ويميلون من الرأس إلى الذنب سبعة صفوف من التعلل المتناوبة الاحجام. نوبها إلى الازياء يعلوها تسنج اذرق يسر في الغلغور وينير في الجانبين ويصفى في البطن || رأسها معتدل الجسم، مستعرض الشكل، قصيرة الخطم، صغيرة الشدق



شحطارة مبدولة

١٥٠٣٠ - شُحُورِيَّاتُ

Turdidae (S). *Turdidae* (F). *Turdidae* (E).

فصيلة طيور من الجوارح المشروبات الخافير منها الشحور والسنه.

١٥٠٣١ - شُحُورِيَّاتُ

في السليطيات، اطليا.

١٥٠٣٢ - شُحُورِيَّاتُ

Mantispa (S). *Mantispa* (F). *Mantispa* (E).

جنس حشرات مقترنة من فصيلة الشحوريات وربة شاربوات الاجنحة. انوعها المعروفة نحو ٥٠ مشتقة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جسمها صغير نحيل مستطيل يضيء بشكله شكل السمرة. رأسها صغير. خطمها عريض. مناهها بارزتان. زياتها دقيقان. كسلها فيه انبوي مستطيل. اجنتها اربعة. جميعها شفاقة كثيرة العروق والاعصاب. جرازها ثلاثة ازواج منها زوج امامي مخصص للقبض أو التقصص وهو كبير القده، ضلع القنوب المشاري الحافة الداخلية، مكن الرضع السنن الحاد والذي ينطق حل مشاري القنوب انصباك الملقط || الاثني اكبر قدماً من الذكر. والربة مقترنة كالخثرة الجملة. يقال ان الاثني جمع المكن في مكاديب الناكب واخصها الخثرف.

اعرف انواعها وأشهرها :

Mantispa pagana (S).

Mantispa palena (F).

التي يكثر وجودها في معظم مناطق الوسط الباني.

١٥٠٣٣ - شُحُورِيَّاتُ

Mantispidae (S). *Mantispidae* (F). *Mantispidae* (E).

فصيلة حشرات من مصيبات الاجنحة وربة شاربوات الاجنحة. | اجنتها وانوعها عديدة اصلها بعض اقاليم البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || تنيز باجسامها النحيلة المستطيلة وبجرازها الامامية الكبيرة المهجرة للقبص. اجنتها شفاقة كثيرة العروق. الزوايا تختلف مع الاجناس والانواع || اناها اكبر قدماً من ذكرها. بعض انواعها يهين نحو ٨٠٠٠ مكنه. مكنها اعليجي الشكل مذنب || اشهر اجنتها الشحورة

١٥٠٣٤ - شُحُورِيَّاتُ

والشمامة والشمامة والشمامة : شاة ذهب لينا كله. وقيل السنية. وقيل التي لاجل بها. وقيل التي لم ينز عليها قلد. ج. أحشاش وأحشاش وشامس.

١٥٠٣٥ - شُحُورِيَّاتُ

Phillyrea (S).

Filaria, *Alavert*, *Aouret*, *Phillyrée* (F). *Mock privet* (E). *Felnitzige Lorbeerlinda* (D). *Filaria* (I).

جنس شجيرات برية وربيونية من فصيلة التريونيات. قريبة الشبه بالثم اوراقها ابيدة. صغيرة النصل، متقابلة. انوعها صغيرة، عمودية اوراقها ابيدة. ثنائية المسكن، رباعية النصل والريالات وثنائية السداة. ثمارها عنية صغرية لونها إلى البنيجي الاسود || اجنتها شديدة الصلابة تستعمل في بعض الصناعات || اشهر انواعه ما يلي.

١٥٠٣٦ - شُحُورِيَّاتُ

Phillyrea angustifolia (S). *Filaria à feuilles étroites*, *Phillyrée à feuilles étroites* (F).

نوع من الشجيرات شجيرة تملو من مترين إلى أربعة أمتار

١٥٠١٤ - شَجَاب هو الحليب ، اطلبه .

طولاً نحو ٤ سم . تتميز بجسمها القوي الشكل ، زعنفتها الشريفة القارئة وبسيفها الرقيق الكبير .

١٥٠١٥ - شَجَابِدَة

Chrysididae (S). Chrysididae (E).

فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة المنصورة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، متصلة الجسم او صغرية . اولياها زاهية الالوان اللامعة الموج . رؤوسها صغيرة . جواربها غليظة . بطونها مركبة من اربع حلقات ورجلات ، حارها مسن الحافة . شواربها تتناسل ثلاثي الحلقات ، مدبب الاشارة || انها تتطفل عل سلايا النمل والزنايز وقد تحت سكنها في جوف الخنازير فينفذ من رقات قنصر الدجبة وتلق الشهه .

١٥٠١٦ - شَجِير

الشجير من اصول الخيل . قال الامسي : الشجير من القم والنشير من النشير والكريم من الصبر .

Discordant

١٥٠١٧ - شَجِيس

صفة لشيء لستهم الماد الانسجام .

١٥٠١٨ - شَجِيل

Diathermane (F). Diathermic, Diathermanous (E).

نعت ثريفي يطلق عل كل مادة تنفذ الحرارة دون ان تستمر منها .

١٥٠١٦ - شَحَاكَة * ، هَبِي شَحَاكَة

Tetraceros quadricornis (S).

Tétracère, Antilope tchikara (F).

حيوان لين يجت من الغطاء وحيد الجنبى والزوح ، موته الهند || يتميز بصغر جسمه وبقرنه الاربعة ، اثنان صغيران يطولان العينين واثنان متوسطان يطولان الرأس .

١٥٠١٧ - شَحَاكَلَة

Diathermanité (F).

Diathermancy (E).

الشفافة خاصة انفاذ الحرارة المشعة .

١٥٠١٨ - شَحْت

Fagot (F). Faggot (E).

هو الجزائل حلب دقيق .

١٥٠١٩ - شَحْدُوبُ اَزْزَقِي *

Stilbum (S).

Stilbe (F).

جنس حشرات من فصيلة الشخاد . انواعه قليلة تشبه الزنايز . طولها يراوح من ١٨ الى ٢٨ سم . لونها الازرق الغامق المائج . يكثر وجودها من ايار الى تموز .

١٥٠٢٠ - شَحْدُوبُ لَاصِيه *

Chrysis ignita (S).

Chrysis enflammé (F).

حشرة من الشخاد صغيرة القد طولاً نحو ١٢ سم . رأسها وبطنها الالوان الزرقاء . بطنها ذهبي اللون يملو موج اعرض . يكثر وجودها قرب مجاري الماء وفي جوار النمل والزنايز .

١٥٠٢١ - شَحْر

Etançonner (F).

To stay, to shore (E).

سند الاضغان المنشرة لثلا تنكسر .

١٥٠٢٢ - شَحْرَم

Pristipoma (S). Pristipome (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة القرغيات . انواعه عديدة معظمها من اسماك البحار الحارة || له نومان مرتمها المتوسط : التكروري والقرقوري .

١٥٠٢٣ - شَحْش

هي ثنات اليربع اي الحجارة الكلسية الرخوة (اين القلعا).

١٥٠٢٤ - شَحَل

Filter (F). To filter (E).

شغل الشراب : صفاة .

١٥٠٢٥ - شَحْرُورَة *

Caranx rhonchus (S).

Caranx ronfé (F).

نوع من الثيم وهي سمكة مأكولة توجد في المتوسط بيلغ



شَحَاة



شُفب اَزْرَق



شُفب لَاصِب



شَحْرَة



شُكَاة اَزْمَار

الخنثار الخاريجي بالفلسي أو بالازرق^١ || لهوها متوسطة
الصنف ، مأكولة .

١٥٠٩٢ - شَدَقِيل مَرَقُوش^٢ Schedophilus punctatus (S).
Schéophilie tacheté (F).
Schedophilus punctatus (E).

نوع من الشدقيل . يمكن بحرية يروض . أعطائها بحار
البلاد الحارة اغصنها البسر الاحمر وبعض مناطق البسر
الايض المتوسط || جسمها شبه بيضي الشكل ، معتدل
التخطيط يطول من ١٥ الى ٢٠ سم . ثوبها الى الطحلة
الفضية تملوها رقشة زرقاء تمتد الى الزعنفة الذيلية ، ظهرها
اعين خضاباً من جانبيها وبطنها . زعانفها الظهرية
والشرجية غضبية الخنثار الخاريجي^٣ بالازرق || رأسها صغير
الحجم ، خدروني الشكل ، قصير الخطم . فيها عمودي^٤
الثقل المعتدل الانفراج . فكها الاعلى يتقدم الاسفل
بعض الشيء . عينها كبيرتان ، مستديرتان ، ناشرتان ||
ممرسها معائب النفاق القريبة للور || لهاها متوسط
الصنف ، مأكول .

١٥٠٩٣ - شَدَن^٥ شَدَن الثوب وجميع ولد ذوات الثفل والغث : قوي
وهرع واستغنى عن امه .

١٥٠٩٤ - شَدَن^٦ Ceruana (S).
Céruane, Cerruane (F). Ceruana (E). Cerun-
blume (D). Ceruana (I).
جس نباتات خشبية برية صفائية من فصيلة المركبات .
انواعها قليلة البمد متبها الجزيرة وبعض المناطق المصرية
والافريقية . سوقها وفروعها منتصب متوزعة ، نورها
كاليامين .

١٥٠٩٥ - شُدَيْفَة^٧ Scœvola (S).
Scévole (F). Scœvola (E).
جس نباتات جينية معمرة من فصيلة الوبليات . مهدا
استرالية . سوقها منتصب صلبة تمل من ٥٥ الى ٧٠ سم .
اوراقها متعاقبة منتفخة . ازهارها بيضاء اللون . كورسها
وتوتيجاتها خاسية الفلق المشقوق من جهة واحدة فتبدو
كأنها شذاه || انواعها المعروفة قليلة البمد ، اشهرها
التالية :

١٥٠٩٦ - شُدَيْفَة صَغِيرَة الْوَرَق^٨ Scœvola attenuata (S).
Scévole à feuilles atténuées (F).
نوع من الشديفة . ساقيها تمل من ٥٠ الى ٧٠ سم .
اوراقها سنائية تطول من ٥ الى ٨ سم . نصالها مسنة
الخنثار . ازهارها بيضاء اللون تطول نحو ٢ سم . كورسها
شارقة مسعرة الفلق || تنويرها يستمر طوال شهر
سبيران .

١٥٠٩٧ - شُدَيْفَة عَظْرِيَّة^٩ Scœvola suaveolens (S).
Scévole odorante (F).
نوع من الشديفة . ساقيها تمل نحو ٩٠ سم . اوراقها
احليجية الشكل تطول نحو ٨ سم . نصالها سميكة الصنف ،
متعاد التستين الخنثاري . ازهارها بيضاء اللون ، طوطا
نحو ٢ سم . قطرها نحو ٣ سم . طرية الورد المنتحب ||
تنويرها يستمر طوال شهر آب .

Tirant (F). Tie (E).

١٥٠٩٣ - شَدَاد^{١٠} خنثرة او مرزقة يشدد بها البناء .

١٥٠٩٤ - شَدَقِيَّات^{١١} Membracidae (S).
Membracidae (F). Treshoppers (E).
Buckelstirpen, Buckelzikaden (D).

فصيلة حشرات من فصليات الاجنحة المتجانسة . اجناسها
وانواعها المعروفة متوسطة البمد اعطائها منظر مناطق البلاد
الاستوائية والحارة || اجسامها صغيرة ، يتكر فيها الشكل
الغروطي . رؤوسها وكواسلها مستعرجة . عينها ناشرة .
اجتمعتا جلوية الاستمرار ، لاحفة ، شغافة او صفراء
اللون || اقرباها واجتمعتا تمتاز بالمواقع الموسومة فيها .

١٥٠٩٥ - شَدَان^{١٢} Raphicerus (S).
Raphicère, Raphicère (F).
جنس حورانات عاشية بحيرة من الظباء . انواعها المعروفة
قليلة البمد . اعطائها القارة الافريقية اجسامها المناطق
الجنوبية || اجسامها متوسطة القد ، هيأة . اناتها جاء
الرؤوس ، ثنائية الاخلاف . ذكورها جالسة جالسة القرون
الصغيرة القصيرة . اقرباها الى الصهوة الخنطية تقيم مع
اقرباها من الظهر وتزهر عند البطن .
اعرف انواعها :

شَدَان الريف Raphicère champêtre (F).
Steenbok (E).
شَدَان اسود الاذن Raphicère à oreilles noires (F).
Gryabok (E).

١٥٠٩٦ - شَدَخ^{١٣} ، جَدَايِيَّة الْمَاء^{١٤} Hydrotropsia (F). Hydrotropism (E).
منسح بحيرة . الماء ويحصد غذاء . الماء ينشط شاغ التجمه
وازياد حجم الخلايا فيسبب اسدياباً في التسح التي تتجمه
وتقيرا في التسح الماكسة ينسح عنه اصراج شدي .

١٥٠٩٧ - شَدَخ^{١٥} هو القطيفة ، اطليا .

١٥٠٩٨ - شَدَخ هندي^{١٦} هو القطيفة الخضراء ، اطليا .

١٥٠٩٩ - شَدَكَة^{١٧} Segment (F). Segment (E).
هي السكة ، اطليا .

١٥٠٩٠ - شَدَتِي^{١٨} Entomozoaire (F).
Entomozoon (E).

نمت ترميفي يطلق عل كل حيوان من ذوات الاجسام
الشدية .

١٥٠٩١ - شَدَقِيل^{١٩} Schedophilus (S).
Schéophilie (F). Schedophilus (E).

جنس اسماك بحرية يورسة من فصيلة الاسقمريات شالكتات
الزعانف . انواعها المعروفة قليلة البمد اعطائها بحار البلاد
الحارة وبعض مناطق المتوسط || اجسامها صغيرة القد ،
احليجية الشكل ، تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . رؤوسها
خدرونية ، قصيرة الاخظام ، معتدلة الاشدان . عينها
كبيرة ، مستديرة ، ناشرة || اثوابها الى الرية او الطحلة
الفضية الموانج يملوها بقيق فصي^{٢٠} او رقشة زرقاء تمتد الى
الزعنفة الذيلية القارعة . ظهورها اعين خضاباً من جوانبها
وبطنها . زعانفها الظهرية والشرجية كبيرة القد غضبية



شَدَان



شَدَقِيل مَرَقُوش

١٥٠٩٨ - شديم * ، قرود القرب

قرود وحيد الجنس والنوع من فصيلة الميموريات. موطنه بلاد المغرب. جسمه قصوري الشكل بطول نحو ٧٠ سم. ويرتفع من ٥٠ إلى ٥٠٠ ثوبه إلى السرة الصفراء الملبس. رأسه وعصره إلى السرة الباهية. يلمه إلى البياض الأخر. ذنبه جملة || يمشي على الأشجار وبين الصخور. قوته الأعشاب والجنود والثمار.

١٥٠٩٩ - شديكة
Glossina (S).
Glossina (F). Glossina (E).
جنس حشرات من فصيلة الذباب تنقل إلى الحيوان الذي تلصقه طائفة من الأمراض الطفيلية الخبيثة المؤذية. أنواعها عديدة ، موطنها المناطق الاستوائية وجنوبها.

١٥١٠٠ - شديكة لاسيكة * ، زيمية ، ذبابكة
Glossina moritans (S).
تسمي
Glossina mordante, Mouche tsak-tsak (F).
Tsetse-flie (E).
أعيب أنواع الشاة وأكثرها انتشاراً تلصق الإنسان وتسبب له مرض النوم وتلصق الخيل والأبل وبقر تفلكتها. موطنها مستنقعات أفريقية الاستوائية والوسطى.

١٥١٠١ - شديك
Dard (F). Sting (E).
حقنة القرب والزيرو والنملة الخ.

١٥١٠٢ - شديك * ، صبري (S). Smaris (S). Picarel (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة اللتورليات ، أنواعه عديدة أعطانها بحار البلاد الحارة والمتدلة. أجسامها أحليجية الشكل. أعطانها غروبية مستقلة الأطراف. فتكرها عادمة السنتين. زعانفها الظهرية وسيدة مستطيلة. زعانفها الشرجية فارقة || أشهر أنواعه الشدانة المبلولة ، أعطانها

١٥١٠٣ - شديكة مبدولة * . Smaris vulgaris (S).
Picarel commun, Jaret, Gerrat (F).
نوع من الشدوم وهي سمكة مبلولة في المتوسط. طولها يراوح من ٢٤ إلى ٢٦ سم. نوبها فني اللون حنطي التجزيع والتوسيع يسر ويمنح مع اقترابه من ثبح النهر. سرها يسر على شكل مروحة. لحمها خوص الصف.

١٥١٠٤ - شديك
Paillettes d'or (F).
Grain of gold-dust (E).
الشد: قطع من الذهب الطبيعي لا تزال على حالتها البدائية || والشد: اللؤلؤ الصغير. النواصة شدة ج شلوات وشلور.

١٥١٠٥ - شديك
Anomalie (F). Anomaly (E).
هو الإبهام من الملسك النظامي المألوف.

١٥١٠٦ - شديك
Sirof (F). Syrup (E).
كل صير سكري الغلغم مستحب العرب.

١٥١٠٨ - شديكة الرامي
Nemopanthos (S).
Némopanthos (F). Mountain holly (E). Berghulst (D).
Nemopanto (I).
جنس نباتات برية وبرتينية من فصيلة البهليات. منها أمريكية الشالية. أنواعها قليلة جميعها جنبا وتجميرات تملو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. فروصها دقيقة مظلمة.

أوراقها أبيضه ، متعاقبة ، معتقة ، نصلها أحليجي الشكل مسن الحلقه. انضمامها أبغلة الإرتكاز ، قروية التجميع ، طويلة الزناد ، رباعية أو خماسية البتلات البيض. ثمارها عننية الشكل حراء اللون ، قطرها نحو ٧ مم.

١٥١٠٩ - شديك
Etincelle (F). Spark (E).
ما يتطاير من النار. ج شرار وشرور.

١٥١١٠ - شديكة
Dextrine
هو الكسرين ، أعطيه.

١٥١١١ - شديك
Rhizographie, Rhizologie (F). Rhizology (E).
الشرافة علم يبحث في تركيب جلود النبات وفي تحليلها وظائفها.

١٥١١٢ - شديكة
Véliforme (F). Véliform (E).
شديكة

١٥١١٣ - شديكة
Collectivité (F). مشتركة
Collectivity (E).
صفة ما هو مشترك. يطلق على الجماعات والفتات.

١٥١١٤ - شديكة ، مشتركة
Collectivité (F). مشتركة
Collectivity (E).
صفة ما هو مشترك. يطلق على الجماعات والفتات.

١٥١١٥ - شديك
مروم كالبروس تكثر قرب الماء ، تنشئ وجه الإنسان ولا تمض. الواحدة شديكة.

١٥١١٦ - شديك
Planche basse (F).
Low between (E).
هي السبكة المنخفضة التي يتم فيها بناء البحر. ج شرب وشربات.

١٥١١٧ - شديكة
Purge.
١٥١١٨ - شديكة
هي الدواء المسهل الذي يخلط البطن. أشهر الشربات البيطرية : سلفات الصوديوم وسلفات المنيثيا وزيت الخروع.

١٥١١٩ - شديك
Cirrhobarbis (S).
Cirrhobarbe (F).
جنس اسماك بحرية من شاكات الزائفت وفصيلة القرويونات. أنواعها المبرقة قليلة العدد أعطانها بحار الجنوب الأفريقي || أجسامها مستطيلة الشكل ، مستدلة الطول. رؤوسها غروبية ، صغيرة ، اندخاها ألبا والسفل بجرة بلوس دقيقة. حيوها ناشرة. زعانفها الظهرية قاطبة. الصدرية والحوضية صغيرة. الشرجية مستطيلة. الذيلية شبه مستديرة. أقرانها وردية اللون نفسية الموج || لحمها مأكولة ، عوصة الصف.

١٥١٢٠ - شديك
Kleinia (S). Kleinie (F).
جنس نباتات عشبية أو خشبية من فصيلة اللطحية. أنواعه عديدة منتشرة في معظم أقساع العالم. أوراقها لحمية النصل ، سنائية الشكل ، متعاقبة. وريساتها الزهرية حاملة للديانات والكسبات يطوقها سف من القنابات. بذوره مجزأة بقنابات خشبية || أعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع.

١٥١٢١ - شديك
شديك

١٥١٢٢ - شديك
شديك

١٥١٢٣ - شديك
شديك

١٥١٢٤ - شديك
شديك

١٥١٢٥ - شديك
شديك

١٥١٢٦ - شديك
شديك

١٥١٢٧ - شديك
شديك

١٥١٢٨ - شديك
شديك

١٥١٢٩ - شديك
شديك



شديم



شدة لاسيكة



شدة مبلولة



شربة الرامي



شريس

١٥١٣٩ - شُرْبَات حَمَلَا

Chourtika Himalayensis (S).
Chourtika de l'Himalaya (F).

مائل من الشرق. موطنه يمتد من جبال حملانا إلى الأندلس وإيران. يالغ البراري والأحراج على السواء. قوته يند وقصها والثلث ومازبا || جسمه غصص اللد ، يطول نحو ٢٥ سم. قوته إلى السواد الأخضر المراج. زوره ومقته إلى الربة يطولها طوق أسود يمتد حتى الحمر والين. صدره إلى الربة المنشة بالاسود. جناحه لافسان. قواده إلى الربة. ذنبه قصير ، مقطوع الطرف || يثنى عنه في أقصوص يقبض بين الأشعاب الكثيفة. الاثى تحسن من ١٢ إلى ١٤ بوصة. قرصها يستر نحو ٣ أسابيع تقوم به الاثى دون-الذكر الذي يؤمن لها الفداء.

١٥١٤٠ - شُرْبَات

Engelure (F). Chilblain (E).
عارض يصيب الأشجار في مختلف فروعها من جراء الصقيع فيسبب اللحاء ويبس جفائه || وهو في الحوان تقصيع الأطراف ويهني أخضر.

Rectum

١٥١٤١ - شُرْبَات
هو الجزء الأسفل من الأمعاء ينتهي عند الاست حيث يخرج البراز.

١٥١٤٢ - شُرْبَات ، شُرْبَات
هو الشُرْبَات ، الحلبه.

١٥١٤٣ - شُرْبَات
هي الشُرْبَات سبط من القصيلة الباذنجانية.

Anal

١٥١٤٤ - شُرْبَات
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بشرج الحيوان.

١٥١٤٥ - شُرْبَات
Galaxie (F). Galaxy (E).

الشرح ، حسب التعريف الفلكي الحديث ، هي أولاً الكرة المعروفة بدرب ثباته والطريق القبي. وهي بالثال وحل وجه الشمول ، كل مجموعة سمن في الفضاء. لذلك فهي متباينة الأشكال والحجوم. أسفرها حصباً بقدر طوعاً بمئات ألوف السنين الضوئية.

١٥١٤٦ - شُرْبَات
Canine du chameau (F).

Canine tooth of the camel (E).

١٥١٤٧ - شُرْبَات
Grenadille (F).
جنية حارثة مشرة تدعى آلامية مأكولة ، الحلبه.

١٥١٤٨ - شُرْبَات ، شُرْبَات
Cestrum (S).
Cestreau, Galant (F). Night blooming Jasmine (E).
Hammerstrach (D). Cestrea (I).

جنس جنات ونجيرات برية وزراعية سبط الشُرْبَاتيات وخصيلة الباذنجانيات. أنواعه نحو ٦٠ معظمها من نباتات المناطق الحارة بعضها يزرع للزين ومنها أنواع كريمة الرائحة لا تخلو من العناصر الجمالية القليلة || سورها تطول من ١٠٠ إلى ٣٥٠ سم. أوراقها كاملة متضامة. نصلها عاكس الخضرة ، مائل الصفرة العليا ، خالئ. أزهارها متوسطة اللد ، مستطيلة الأنبوب. ثمارها جوزية الشكل والحجم ، مختلفة الألوان.

الانثوية لونها إلى الزرقة البنفسجية يطولها مارج أصفر يتخلله لونه من الوردي || أكارنزا غروبية الشكل، قطرها يراوح من ١٢ إلى ١٦ م.

١٥١٣٤ - شُرْبِين نُسُونِيَّة
Chamaecyparis lawsoniana, C. boursierii (S). Cypris de Lawson (F). Port Orford cedar (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية ، كبيرة اللد ، سريعة النمو ، موطنها أمريكا الشمالية تطول نحو ٦٠ م. لحاء ساقها إلى الربة الخمر. بناتها موقرة لونها إلى الأخضر الجعري الاطبل المراج. أزهارها الذكرية قرمزية اللون بنفسجية التوشيع. أزهارها الانثوية إلى الربة الوردية المراج || أكارنزا صغيرة اللد ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ م. زراعها شائعة. يكثر استعمالها في صد الرياح.

١٥١٣٥ - شُرْبِين متفصية
Chamaecyparis thyoides, C. sphaeroides (S). Cypris faux-thuya (F). White cedar (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية متوسطة اللد ترطب في الأراضي المنخفضة. لحاء نحو ٢٥ م. لحاء ساقها إلى الربة السمر. بناتها متفصية. أوراقها الذكرية قرمزية اللون ، قرمزية التوشيع. أزهارها الانثوية لسنتية الاساس ، وردية المراج || أكارنزا سداسية الجرامات ، قطرها نحو ٦ م.

١٥١٣٦ - شُرْبِين نُسُونِيَّة
Chamaecyparis nutkaensis, C. nootkatensis (S). Cypris de Nutka, Nootka (F). Nootka sound cypress, Yellow cedar (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية كبيرة اللد ، أجنية الشكل ، موطنها أمريكا الشمالية. ترطب في المناطق الرطبة ، تطول نحو ٤٠ م. لحاء ساقها إلى الجوزة السمر. بناتها متدلية الأطراف ، شديدة الخضار الباهت ، عديمة المراج الغضي || أكارنزا رباعية أو سداسية الجرامات ، قطرها يراوح من ٦ إلى ٨ م.

١٥١٣٧ - شُرْبِين هينوكي
Chamaecyparis obtusa, C. breweriana (S). Cypris hinoki (F). Hinoki cypress (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية كبيرة اللد ، مردنية الشكل. موطنها أواسط وجنوب اليابان. تطول نحو ٤٠ م. لحاء ساقها إلى الجوزة الخمر ، بناتها موقرة ، مردنية التصليف ، غدية. أزهارها الذكرية بنفسجية اللون يطولها توشيع وردي وأصفر. أزهارها الانثوية إلى الربة الخضراء تطولها مشمة وردية وساجة زرقاء || أكارنزا غروبية الشكل ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ م.

١٥١٣٨ - شُرْبَات
Chourtika (S).
Chourtika (F). Chourtika (E).

جنس طبر من فصيلة البقوليات وربة الباجاجيات. أنواعه المعروفة نحو ٦ أصنافاً تمتد من الهند إلى الجبال سيرية. تألف البراري والأحراج. قوتها الحبوب والبرور البرية وبغض الحشرات ومكثها وأغصانها الجنادب والثلل || أجسامها ربة ، تطول من ٢٤ إلى ٢٨ م. رقوقها متوسطة الحجم. اعتاقها قصيرة. متاقها صغيرة. اجنحتها لافحة. أذناها قصيرة ، مقطوعة الأطراف. أولها متباينة الألوان ، جميعها معقوفة الزور والصدور || ملتها الحياتي حامي إلا في زمن الشتاء والحضانة أوفاجها تعدن من عشرة أزواج إلى خمسين زوجاً || اعرف أنواعها وأشهرها شُرْبَات حملانا.



شُرْبَات حَمَلَا

١٥١٥٧ - شُرُوحَاتُ مُسْتَحَبَّة *

Saurus fasciatus (S). Saure rayé, Lambert (F).
Saurus fasciatus (E).

سَمَكَةٌ مِنَ الشُّرُوحَاتِ ، أَصْلَانِهَا مَعْرِفَةُ الْقَائِمِ الْبَحْرِي الْأَبْيَضِ الْمُتَوَسِّطِ . جَسْمُهَا وَشَعْيُ الشَّكْلِ يَطُولُ مِنْ ٢٥ إِلَى ٣٥ سَم. تَوَجُّهُهَا إِلَى الرِّبْدَةِ الْقَضِيَّةِ يَتَّبِعُ عِنْدَ الظَّهْرِ وَيُزَيِّدُ عِنْدَ الْبَطْنِ . جَانِبَاهَا مَسْتَوِيَانِ بِثَلَاثَةِ عَطْرِيقٍ قَاعِيَةٍ زُرْقَاءَ الْوَلَدِ . زَعْفَنُهَا الْخَفِيفُ مُضَلَعَةٌ بِالْأَزْرَقِ ۥ رَأْسُهَا خُرُوطِي الشَّكْلِ ، كَبِيرُ الْقَنَمِ ، وَاسِعُ الشَّدَقِ الرَّحْبِ ، أَسْنَانُهَا كَثِيرَةٌ الْعَدَدُ ، ثَلَاثِيَّةُ الصَّفُوفِ فِي الْفَكِّينِ . صِيَانُهَا صَفِيرَتَانِ ، مَسْتَوِيَتَانِ ، مَامُحَتَانِ ۥ زَعْفَنُهَاا لَيْتَةً مَتَابِيئَةً الْأَشْكَالَ وَالْأَحْجَامَ . الظُّهْرِيَّةُ الْأُولَى شُرَاعِيَّةٌ ۥ الظُّهْرِيَّةُ الثَّانِيَّةُ جَدْعَةٌ . الصَّدْرِيَّةُ صَفِيرَةٌ . الْخُرُوفِيَّةُ كَبِيرَةٌ ۥ لَحْمُهَا جَيِّدٌ الصَّفْتِ لَكِنَّهُ كَثِيرُ الْحَسَكِ الْبَتَقِ .

Filicinas (F).
Filicinas (E).

١٥١٥٨ - شُرُوحَاتُ *

شُعْبَةٌ مِنَ مَسْتَوَاتِ الزُّهْرِ الْوَعَائِيَةِ . فُصْلَانِهَا وَأَجْنَاهَا وَإِنْوَاهَا كَثِيرَةٌ الْعَدَدُ ، مَعْظَمُهَا مِنْ أَصْنَافِ الْإِزْنَةِ الْغَائِرَةِ ۥ أَغْصَانُهَا الْحَقِيقَةُ الْدِفُولِيَّةُ ۥ ثِيَابَاتُهَا مَتَابِيئَةُ التَّرَكِيبِ الْحَبْكِي مِنْهَا الْمَشْيِيَّةُ وَالْيَابِيَّةُ وَالْمُخَشَّبَةُ . جَمِيعُهَا مَعْجَرَةٌ بِزَوَائِدٍ وَرِيقَةٍ تَدْمِي مَرَامِجَ .

١٥١٥٩ - شُرُوشُ

يَقَالُ هُوَ عَفَاءُ الْجَبَلِ وَلَهُ شُكْلٌ أَصْفَرُ . (اللسان) .

Epigastre (F) *Epigastrium* (E). شُرُوشُوكْ .
الْجُزْءُ الْأَوْسَطُ الْمَعْلُومُ مِنَ الْبَطْنِ يَتَدَنَّ مِنَ السَّرَّةِ إِلَى الْقَصْرِ ۥ

Chersins (S). *Chersine* (F). شُرُوشِينُ * .
جَنْسٌ مُصْلَحٌ مِنَ فَصِيلَةِ الشُّرُوشِيَّاتِ . أَنْوَاةُهَا عَدِيدَةٌ . مَهْدُهَا الْبِلَادُ الْحَارَّةُ ، جَمِيعُهَا أَرْضِيَّةُ الْمَرْحِ خَاضِعَةٌ . ذَلِيلُهَا شَدِيدُ الْاسْتِدْبَابِ وَالْعَصَالِيَةِ لَوْهٌ إِلَى السَّرَّةِ يَطُولُ تَبْيِيجُ أَصْغَبِ . طَوَّلُ أَجْسَامِهَا يَرَوِّجُ مِنْ ٣٠ إِلَى ٦٠ سَم. يَبْتَنُّهَا الشُّتَوِيُّ يَدْمِجُ نَحْرَ ۥ أَشْهَرُ .

١٥١٦٢ - شُرُوشُ هُوَ الْجَلَرُ ، أَلْطَبُ .

١٥١٦٣ - شُرُوشُ

يَقَالُ شُرُوشُ الثَّبَاتِ إِذَا ثَلَبَتْ شُرُوشُهُ فِي التُّرْبَةِ . وَاجِعٌ اسْتَعْرَقَ .

١٥١٦٤ - شُرُوشُ ، شُرُوشُ

وَقَبْتُ يَلْبَسُ حَيَالًا عَلَى الْأَرْضِ طَوَّلًا كَأَلْبَسِ الْقَطْبِ وَلَيْسَ لَهُ شُكْلٌ يُوَفِّي أَحَدًا تَسْمِينَ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ وَتَقَرُّهُ (أَبُو حَنِيفَةَ) وَهُوَ مِنْ لَبَاتِ الْبَادِيَةِ . وَاحِدَتُهُ شُرُوشَةٌ .

Rollier bleu (F). شُرُوشُوكْ .
هُوَ الشُّرَّاقُ الْأَزْرَقُ ، أَلْطَبُ .

Fringilla (S). شُرُوشُورُ ، شُرُوشُوكْ .
Pinson (F). *Finch* (E).

جَنْسٌ طَيْرٌ مِنَ فَصِيلَةِ الشُّرُوشِيَّاتِ . أَنْوَاةُهَا قَلِيلَةٌ جَمِيعُهَا صَفُورِيَّةٌ صَغِيرَةٌ الْقَدِّ . مَنَاقِبُهَا خُرُوطِيَّةٌ جَالِسَةٌ . أَجْنَبَتُهَا مُسْتَطِيلَةٌ ذَلَقَةٌ ۥ أَذْنَانُهَا طَوِيلَةٌ قَارَقَةٌ ، أَسْرَافُهَا ذَقِيقَةٌ . وَهِيَ مِنَ الْمَصَافِيرِ الثَّرِيدَةِ الْمُنَاسِيَةِ الْزُرْقَةِ . قَوَّتُهَا الْخَطَرَاتُ وَالزُّبُرُورُ الْبَرِّيَّةُ . تَكُنُّ فِي الْأَجْبَارِ . أَنْثَاهَا تَبْيِجُ مِنْ ٤

١٥١٦٩ - شُرُوحَاتُ اللَّيْلِ ، يَتَسَمِّينَ اللَّيْلِ

Cestrum nocturnum (S). *Cestrum nocturne*, Galant de nuit, jasmin de nuit (F). *Night scented castrum*, *Night jasmine* (E). *Nachtsbrauch* (D). *Galante di notte* (I).

نَوْعٌ مِنَ الشُّرُوحَاتِ يَزْرَعُ قَلْبَرَيْنِ ، يَطُولُ مِنْ ٢٠٠ إِلَى ٣٠٠ سَم. أَوْرَاقُهُ أَلْبَلِيبِيَّةٌ عَائِقَةٌ الْخُضَارِ الْأَخْفَرِ . أَنْوَاةُهَا حِمْلَةٌ الشَّكْلِ ۥ أَرْبُوعِيَّةُ الْوَلَدِ ، عُرْفُهَا دَجْوِي يَطُوحُ فِي اللَّيْلِ وَيُغْنِي فِي الْهَارِ ۥ وَهِيَ مِنَ اللَّيْلَاتِ السَّرُورِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ تَمِيشُ وَيُحْيِي فِي جَمِيعِ الْمَوَاقِعِ وَالْأَتَرَةِ .

١٥١٥٠ - شُرُوحَاتُ كَيْفِيَّةٌ ، شُرُوحَاتُ كَيْفِيَّةٌ

Castrindeas (F).
سَهْلٌ مِنَ فَصِيلَةِ الْبَاذَنْجِيَّاتِ ، أَشْهَرُ أَجْنَاسِهِ الشُّرُوحَاتُ .

Apophyse (F). *Apophysis* (E). شُرُوحُوبُ .
هُوَ عَظْمُ الْفَقَارِ . ج. رَاغِبِي .

١٥١٥٢ - شُرُوشُ هُوَ السَّرْسُ الذَّكَرُ ، أَلْطَبُ .

Dasyproctidae (S). شُرُوحَاتُ كَيْفِيَّةٌ * .
Subungulidae, *Dasyproctidae* (F). *Subungulites*, *Dasyproctidae* (E).

فَصِيلَةُ حَيَوَانَاتٍ لَبَنَةٍ قَاضِيَةٌ مِنْ مَرْتَبَةِ شُعْبَاتِ الشُّرُوبِ وَرَبِّيَّةِ الْقَوَامِ . أَجْنَاسُهَا وَأَنْوَاةُهَا عَدِيدَةٌ أَجْسَامُهَا مُخْتَلِفَةٌ الْأَشْكَالَ وَالْأَحْجَامَ . أَذْنَاهَا حَرِيصَةٌ . أَذْنَاهَا جَدْعٌ أَوْ قَصَارٌ . قَوَّتُهَا مُتَوَسِّلَةٌ أَوْ رَفِيعَةٌ . فُرُوفُهَا غَشَّةٌ الْوَبَرِ وَالصُّوفِ ۥ مَوْطِنُهَا أَمْرِيكَةُ الْوَسْطَى . وَالْجَنُوبِيَّةُ . جَمِيعُهَا دَجْوِيَّةٌ ثَوْرَةٌ سَهْلَةٌ الْأَدْبَانِ وَالرُّوَيْضِ . قَوَّتُهَا الْمَوَادِّ النَّبَاتِيَّةُ ۥ أَحْرَفُ أَنْوَاةُهَا وَاشْهَرُهَا الْإِغْرِقِيُّ وَالْبَاكْسُ وَالْمَارُ وَالْكَابِيَاءُ وَالْكَوْبِيَاءُ .

Cercidophyllum (S). شُرُوحَاتُ كَيْفِيَّةٌ * .
Cercidophylla (F).

جَنْسٌ لَبَنَاتٍ سَرُورِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ مِنْ فَصِيلَةِ الشُّرُوشِيَّاتِ . أَنْوَاةُهَا قَلِيلَةٌ الْعَدَدُ مَهْدُهَا الشَّرْقُ . أَشْجَارُهَا كَبِيرَةٌ الْقَدِّ حَرِيصَةٌ الشَّكْلِ تَعْلُو مِنْ ١٦ إِلَى ٣٠ م. سَوْقُهَا خَلِيطَةٌ . أَوْرَاقُهَا حَائِلَةٌ مَشَقَّةٌ مُتَعَابِلَةٌ . نَصْلُهَا قَلِيلَةٌ الشَّكْلِ ، مَفْرُوعَةٌ الْخُفَارُ ، بَارِزَةٌ الْفُرُوقِ ، مُتَسَاوِيَةٌ الطَّرْقُ وَالرُّعُصُ . صَفَحَاتُهَا الدَّلِيَّةُ جَمِلَةٌ الْخُفَارِ الْقَزَامِ ، صَفَحَاتُهَا السُّفْلُ خَلِيطٌ الْبَشَرَةِ ۥ نِيْرَاهُ الْوَلَدُ . أَجْنَبَتُهَا بَنْجَسِيَّةٌ . أَنْوَاةُهَا عَادِمَةٌ الْكَأَسِ وَتَوَجُّعٌ . الذَّكَرِيَّةُ مَبْنِيَّةٌ عَدِيدَةٌ الْأَسْدَةِ ۥ أَمَّا الْأُنْثَوِيَّةُ فَثَلَاثِيَّةٌ أَوْ رَابِعِيَّةٌ أَوْ مَدَاسِيَّةٌ الْأَسْدَةِ ، مُسْتَطِيلَةٌ الْأَقْلَامِ الْبَارِزَةِ . تَصْلُحُ قَصْرِيقٌ وَزُرْعٌ فِي الْحَدَائِقِ .

Cercidophyllaceae (S). شُرُوحَاتُ كَيْفِيَّةٌ * .
Cercidophyllaceae (F). *Cercidophyllaceae* (E).

فَصِيلَةُ ثَبَاتِيَّةٍ مِنْ مَسْتَقَلَّاتِ الْقِمَالَاتِ أَجْنَاسُهَا وَأَنْوَاةُهَا قَلِيلَةٌ الْعَدَدُ ، جَمِيعُهَا أَشْجَارٌ مُتَوَسِّلَةٌ الْقَدِّ أَوْ كَبِيرَةٌ مَعْظَمُهَا بَرِّيٌّ وَبَعْضُهَا سَحَابِيٌّ .

Saurus (S). شُرُوشُوكْ * .
Saure (F). *Saurus* (E).

جَنْسٌ أَسْمَاكٌ بِحَرِيَّةٍ مِنَ فَصِيلَةِ الشُّرُوشِيَّاتِ وَرَبِّيَّةٌ مَفْصُولَاتُ الْمَثَانَةِ ۥ أَنْوَاةُهَا الْمَعْرُوفَةُ سَمَةٌ مَعْظَمُهَا مِنْ أَسْمَاكِ بَحَارِ الْبِلَادِ الْإِسْتَرَايَةِ وَالْحَارَةِ ۥ أَجْسَامُهَا وَشَعْيُ الشَّكْلِ ، وَاسْتَطِيلَةٌ . أَلْوَابُهَا مُخْتَلِفَةٌ الْأَلْوَانِ . السَّادِكُ فِيهَا الرِّبْدَةُ الرَّاصِيَةُ الْقَضِيَّةُ الْمَوَاجِ ، تَسْمَرُ وَتَبْقَى فِي الظَّهْرِ وَتَزْهَرُ فِي الْبَطْنِ ۥ تَتَبَيَّنُ بِأَشْدَائِهَا الْكَبِيرَةِ وَبِزَعْفَانِهَا الدَّلِيلَةِ الْفَارَقَةِ ۥ خُوْطُهَا جَيِّدٌ الصَّفْتِ غَيْرُ أَنَّهُا كَثِيرَةُ الْحَسَكِ الْبَتَقِ ۥ أَشْهَرُ أَنْوَاةُهَا الثَّرُومَةُ الْمَسْمُومَةُ .



شُرُوشَةُ مَسْمُومَةٌ



شُرُوشُ

١٥١٧٧ - شُرُوطُ اسْتِثْنَاءِ الْاِخْتِمَاصِ

Clause attributive de Jurisdiction (F). Attributive clause of Jurisdiction (E).

شرط استثنائي يقتضي بطرح المنازعات التي قد تنشأ من العقد على محكمة معينة .

١٥١٧٨ - شُرُوطُ الْاِخْتِمَاصِ وَشُرُوطُهُ

Compromis (F). Compromiss, Mutual agreement (E).

المشاهدة هي اتفاق يبرمه كتاباً من يقض بفتح نزاع ، على أن يحكموا في فصله خصماً يتأخرون عليه بفتح حكماء . وتعتبر المشاهدة عقداً من عقود التراضي وهو لا يصح إلا من له أهلية الاداء المطلقة .

١٥١٧٩ - شُرُوطُ الْأَمْرِ شُرُوطُ الْأَمْرِ

Clause à ordre (F).

هو شرط يقتضي حتماً نص صفة أو لأمر وإذا ذلك يمكن تحويل الدين بالتظهير ، أما صيغة التظهير فهي : « ادفعوا لأمر فلان ... »

١٥١٨٠ - شُرُوطُ التَّفْضِيلِ

Pacte de préférence (F). Préférence clause (E).

اتفاق يلتزم المرء بمقتضاه إذا احتزم تحرير عقد معين أن يفضل الموجود به بنفس الشروط التي يبرمها التاجر .

١٥١٨١ - شُرُوطُ الْفَيْسَانِ

Clause de crocure (F). Garantie chuse (E).

شرط يلزم الكفيل أو الوكيل على دفع ثمن المشتري إلى البائع إذا تأخر الشاري من ذلك .

١٥١٨٢ - شُرُوطُ الْهَرَبَةِ

Clause de sauvegarde (F). Safe-guard clause (E).

شرط يربط إلى ويط الألتزامات المالية بعضها بعض فيصبح تنفيذ بعضها سلفاً على تنفيذ البعض الآخر .

١٥١٨٣ - شُرُوطُ تَهْدِيدِ يَدِي

Clause comminatoire (F). Comminatory clause (E).

شرط خاص يدرج في عقد التبرع يتم القيام بعمل معين ما ويصنع على انتفاع بمقدار معين ثباً إذا امتنع المتبرع له من القيام بالعمل المطلوب .

١٥١٨٤ - شُرُوطُ جَزَائِي

Clause pénale, Pénalité (F). Penal clause, Penalty (E).

شرط يفتق للمتعاقدون بمقتضاه على تقديم مبلغ جزائي للتعويض الذي يجب على المدين إذا لم ينفذ أو إذا أخر تنفيذ التزامه .

١٥١٨٥ - شُرُوطُ حِفْظِ الْأَسَدِ ، شُرُوطُ عَشْبَتَيْي

راجع اشتراط حصة الأسد .

١٥١٨٦ - شُرُوطُ وَقْفِ الْمُسَوِّلِيَّةِ

Clause de non-responsabilité (F). No responsibility clause (E).

شرط يفتق للمتعاقدون بمقتضاه على نفي المسؤولية عن المدين إذا تأخر في تنفيذ التزامه . وهو من الشروط المحظورة في عقد النقل .

١٥١٨٧ - شُرُوطُ غُلُقِ الرَّهْنِ

Pacte commissaire (F). Binding on pain of clause (E).

وهو اتفاق في التمديد للمدة الطرفين ينص فيه على أنه في حالة عدم تنفيذ أحد الطرفين الالتزام الذي استند عليه العقد فسح العقد بفتح القانون دون أن ترفع بشأنه دعوى

إلى . يضاف تحفظاً بتأدية الذكور || أشهر أنواع الشرشور الناتج والجبل والافريقي .

١٥١٧٧ - شُرُوطُ جَبَلِي

Pinson d'Ardennes, Pinson de montagne (F). Brambling, Mountain finch (E).

يعرف بالزغاري ، أهليه .

١٥١٨٨ - شُرُوطُ شَكْبَعِ

Fringilla coelebs (S). Pinas commun (F). Chaffinch (E). Buchfink (D).

نوع من الشرشور طوله من ١٦ إلى ١٧ سم . وجهه سودا الريش . رأسه وقفته يستند إلى الزرقة الرمادية الموج . ظهره اسمر اللون تلوها مابة زيتية . زيكاه إلى الخضرة . سقاء بلون ظهره يمتزجها خضان عاجيان . صدره إلى الجلالة الغسرية ، يك يمتزج إلى الصهبة ويتهي بالأبيض . الأني اسمر قدام الذكر واهت ثوباً .

١٥١٩٩ - شُرُوطُ رِيَّاتِ

Fringillidae (S). Fringillidae (F). Fringillidae (E).

فصيلة طير من الجوائم المحرطيات الناتية . منها الشرشور والحسون والتمار والكنكار .

١٥١٧٠ - شُرُطِيرِ

Sarcelle (F). Sarcelle d'hiver (F).

هو الخلد الششتوي من طيور الماء . أهليه .

١٥١٧٢ - شُرُطِيرِ صَيْبِي

Sarcelle d'été (F).

هو الخلد الصيفي من طيور الماء . أهليه .

١٥١٧٣ - شُرُطِيرِ

هو الصبغ . أهليه . ج حراس وشرسة .

١٥١٧٤ - شُرُطِيرِ

Imperméable à la lumière (F).

هو ما كان لا ينفله النور . راجع شاتن .

١٥١٧٥ - شُرُطِيرِ

Clausa

هو كل نص خاص يربط عمل قانونياً .

١٥١٧٦ - شُرُطِيرِ ، شُرُطِيرِ

Condition هو تطبيق انعقاد عقد قانوني على حدوث حدث في المستقبل مشكوك في حدوثه . وقد يكون الشرط :

١٥١٧٧ - شُرُطِيرِ

Condition casuelle (F).

Casual C. (E).

١٥١٧٨ - شُرُطِيرِ

Condition processative (F).

Proterter C. (E).

١٥١٧٩ - شُرُطِيرِ

Condition suspensive (F).

Suspensive C. (E).

١٥١٨٠ - شُرُطِيرِ

Condition résolutoire (F).

Abrogating C. (E).

Condition illicite (F).

illicite C. (E).

Condition défallible (F).

Failing C. (E).

Condition impossible (F).

Impossible C. (E).

Condition immorale (F).

Immoral C. (E).



شرشور شائع

١٥١٩٦ - شَرْطِيَّة اُنَيْكَة، بِسْرِيَّة اُنَيْكَة

Baeria gracilis (S). Baérie gracieuse (F).

نوع من الشرفية حشيشا زينة حولية . ساقها فرواء تملو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقها كاملة سانية التصل .
رويساتها الزهرية عديدة اللسنيات لها الى الاسفر الجليل || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

١٥١٩٧ - شَرْطِيَّة مَدْهَبَة، بِسْرِيَّة مَدْهَبَة

Baeria chrysostoma (S). Baérie dorée (F).

نوع من الشرفية حشيشا زينة حولية . ساقها فرواء تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقها كاملة سانية التصل .
رويساتها الزهرية عديدة اللسنيات الكبيرة المسطيلة ، لها الى الصغار المذهب || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

١٥١٩٨ - شَرْطِين

الشرفين منزل من منازل القمر الشامية ينزلها القمر في الليلة الاولى . ويقال لها قرنا الحبل والناطح . واما مترضان من النبال الى الجنوب . ولا جانب النبال منها كوكب صغير || رقيب الشرفين يدعى النفر .

١٥١٩٩ - شَرْعَاف ، شَرْعَان Spathe
قنابة حلقة للتخل وما اشبه . وهو الكانور .

Phellandrium (S).

١٥٢٠٠ - شَرْعَطَط Phellandrie (F).
جنس نباتات حشبية برية معمرة من فصيلة الخيليات .
انواعها قليلة العدد منها المناطق المتعددة ، جميعها ترهب في الموانئ المطرية . اوراقها متعاقبة مركبة قريبة الشبه من الشوكران || اعرف انواعها واشهرها الشرطط المتقي .

١٥٢٠١ - شَرْعَطَط مَتَقِي ، شَرْعَاف الماء

Phellandrium aquaticum, Ceanthe phellandrium (S). Phellandrie aquatique, Fenouil d'eau (F). Water drop-wort, Water hemlock (E). Wasser Fippendel, Wasser Piersaat (D). Felandrio, Finocchio aquatico (I).

نوع من الشرطط وهو نبات عشبي بري صعر يكثر في النائق والاراضي الرطبة . يعتبر من النباتات السامة التي تؤذي للماشي || استجنار انزاهه الغلية بالماء يفيد الربو ويستخرج من بزور مادة قوية جسمية لها استعمالها الطبي .

١٥٢٠٢ - شَرْعَف Etèter (F). To pollard (E).

شرف القصب : قطع رأسه انماي . والشرفة : قطع الرؤوس ثنائية في النبات .

١٥٢٠٣ - شَرْعَنَة Démagogie (F).

Demagogy (E).
الشرعة حالة اجتبابية تسود فيها فوضى اراء الذين يدعون مناصرة الجماعات او الشعب .

١٥٢٠٤ - شَرْعَنِي Démagogique (F).

Demagógic (E).
نعت شرمي يطلق على كل ما من شأنه تحريض اهواء الجماهير وشهواتها اللانظامية .

١٥٢٠٥ - شَرْعَنِيَّة Démagogisme (F).

Demagogism (E).
الشرعية ملهب الذين يشرنون بالشرعة .

النسخ . وهو ايضا اتفاق يبيع به اراضين للبرين الحاضر الرمن ، الاستيلاء على الرمن في حالة عدم وفاء الدين عند حلول اجله وهذا الشرط محظور قانونيا .

١٥١٨٨ - شَرْط مألوف Clause de style (E).

Style clause (E).
هو من الشروط التي تندرج في بيع العقود للمتناسبة بطبيعتها . مثال ذلك ما يرد في عقود الإيجار بان المستاجر قد عين الارض المؤجرة مبنية تني دعوى الجهالة شرعا .

١٥١٨٩ - شَرْط مَعْدِل ، شَرْط مَعَالِف

Clause dérogatoire (F). Derogatory clause (E).
هو كل نص يدخل بمقتضا تعديل على الاتفاق المقود او يصرح به عنه .

١٥١٩٠ - شَرْط مَكْتَسَمَة الْمُتَنَازَع لِه

Pacta de quota litis (F). Quota litis clause (E).
شرط يتخذ بين أطراف المتنازعي على ان اتأب القضية تكون جزءا من كسبها وهو محظور في اللوائح المهنية .

١٥١٩١ - شَرْطِيَّة Shortia (S).

Shortia (F). Shortia (E).
جنس نباتات حشبية زركوية معمرة من فصيلة القرقيات الفراشية معقودة التبريد على اسم العلامة وشروطها . وركبها مسطيلة . اوراقها جلدية الانتشاب مستديرة الشكل او كلوية ، جلدية التصل . انزاعها ملونة خالصة البتلات والاسدية الخضبة ، خالصة الاسدية المعقبة . انواعها المرونة قليلة اشهرها التالية :

١٥١٩٢ - شَرْطِيَّة كَبِيرَة الزَهْر * Shortia grandiflora (S).

Shortie à grandes fleurs (F).
نوع من الشرفية الزينة . مهدا بعض مناطق امريكا الشمالية . اوراقها كبيرة القند ، شبه مسطيرة الشكل ، قلبية التقاعدة ، مسنة الحنار . انزاعها يضاء اللون ، خافتة اللون ، قطرها نحو ٣ سم . || تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

١٥١٩٣ - شَرْطِيَّة وَحِيدَة الزَهْرَة * Shortia uniflora (S).

Shortie uniflora (F).
نوع من الشرفية الزينة . مهدا اليابان . اوراقها كبيرة ، كلوية الشكل ، مسنة الحنار المفركس . زهرتها وحيدة ، وردية اللون ، خافتة اللون ، قطرها نحو ٥ سم . || تنورها يستمر نحو اربعة اسابيع ابتداء من اواسط نيسان .

١٥١٩٤ - شَرْطِيَّة، بِسْرِيَّة Baeria (S). Baérie (F).

جنس نباتات برية وزينة من فصيلة المركبات . انواعها عديدة معظما امريكي المهد . ساقها فرواء . اوراقها متعاقبة . انزاعها رويسي التجميع ، قناباتها عديدة الفصل فردية الصف . تحنوا غبروية الشكل . بزورها مجنحة مسطيلة قليلة العرض || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

١٥١٩٥ - شَرْطِيَّة اِكْلِيَّة، بِسْرِيَّة اِكْلِيَّة Baeria coronaria (S). Baérie coronaire (F).

نوع من الشرفية الزينة الحولية للفراسة المرسب . ساقها زباز البشرة فرواء تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقها مفردة غطية التشرح . رويساتها الزهرية كبيرة القند عديدة اللسنيات المتوسطة الطول لها الى البرتقال . بزورها مجنحة كبيرة الحسك || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .



شرفية كبيرة الزهر



شرطط متقي



شروب حقل



شروب غربي



شرا



شروب أخضر



شرق



شرق

كروية الشكل قندرها يراوح من حجم البقلة الى الجوزة الصغيرة || اشهر انواعها وأعماها الشروب الاخضر .

١٥٢١٣ - شُرُوبٌ أَخْضَرُ* (S). *Hyla arborea* (S). *Rainette verte* (F). *Green Tree-frog* (E).

نوع من الشروب . اصلها يمتد من اليابان الى الشرق الاوسط واروبة الجنوبية والوسطى والغربية وافريقية الشمالية || جسمه صغير الحجم ، يطول عنه الذكر من ٤ الى ٥ سم . ويطول عنه الانثى من ٦ الى ٧ سم . جلده مائل القشور ، عديم اللون ، صيانه نازعان ، جاحشان . خطمه مستعرض الشفق . ذكك السفل عديم الاسنان . اصابع قوائمها الاسمية والخلقية طليقة اما اطرافها لجهزة بظباب محببة تمكئها من السير على السطح المائلا || ثوبه الى الخضار الزاهي ولكنه يحاكي البيئة التي يعيش فيها لذلك فهو عديم المالحات || يعيش معظم حياته متخفيا بين الاجنار والنباتات القريبة من الماء . يسبح في النهار ويبيت في الليل غنيبا بين الارواح . قوته الحشرات والحوام || الاثى تنمر نحو ٨٠٠ دملة في شلة متعينة المحرقت تقذف بها في الماء فتلقص بعض الباتات او القصباء المفرونة . تنفث بيم غالبا ، بعد التسلق ياسيرين وبلاصيح يلقى في الماء نحو ثلاثة اشهر ربنا يتم تطورها .

١٥٢١٤ - شُرُوبِيَّات* (S). *Hyliidae* (S).

Hyliidae (F). *Hyliidae* (E).
ومنهم من صاعا شفاذع الشجر . فصيلة حيوانات من لثة البقيات وبرتية السويات ورتبة الفراوات . انواعها المعروفة نحو ٢٠٠ متشرة في معظم اقطار العالم || جميع انواعها صغيرة القدة ، دراهم تحمل الاسنان في فكوكها اسليا . السنتها شقيقة ، مستطيلة . اطراف اصابعها مجهزة بظباب محببة تمكئها من تسلق السطح المائلا . تقارها الاسمية عادمة الاصلاح . اما اللثة الطلي التي يترقى فقرة البعير ويغطيها ويتجزأها من البين واليهام فربا التعدد اشهر اجناسها الشروب والشفعد والمجاة .

١٥٢١٥ - شَرْف، شَرْف*
الشرف : بيت اخر تصبغ به الثياب (ابن الاعراب) .

١٥٢١٦ - شَرْقَتْ* ، قَعَرُ الثَّلُوج ، شِلُونْدَكْسَه
Chionodoxa (S). *Chionodoxa*, *Gloire des neiges* (F). *Glorie of the snow* (E). *Schneestolz* (D). *Gloria di neve* (I).

جس نباتات حدسية من فصيلة الزنبقيات انواعها المعروفة نحو ٨ مبعها الشرق الاذ، ترب في المنطق المعروفة للشرق نحو الجارة . جميعها صغيرة القدة تلون من ١٠ الى ٢٥ سم . وهي قرية لثبه من الاطفال . انماها انبوية الشكل بتلاتها مدعجة الزمان الاول والثاني طليقة الثالث والرابع و اسديها سانية الشكل . اولها حديثة فيها الابيض والازرق والوردي والبيشمجي .

١٥٢١٧ - شَرْقُ* ، صَكْرُ الْغَزَال ، قُوْمَدِي

Falco chiquequa (S). *Falcon chiquequa* (F). *Falcon cherrug* (E).

طائر من فصيلة الصقريات طوله نحو ٤٠ سم . ويصلته ١٥٠ سم . وهو اجل الصقور ثوبا واحسنا تشيحا واسلمها تنيرا وللمها مواجا وصرها اقبلا وانماها مولك فسح الارباب يمتد من الهند الى الشرق الاذ والافريقية الشرقية والشمالية . يألف الصمران ويبتعد من الكفر المرش .

١٥٢٠٦ - شُرُوب*
Tordylum (S). *Tordyle* (F).
جنس نباتات عشبية برية حولية سحولة من فصيلة الخبيجات . انواعها المعروفة خمسة : اولها متعينة ، منعقة ، لاطة الاذينات ، كثيرة التفريخ . انماها صغيرة القدة ، يضاه الاذن || اشهر انواعها الشروب الغزي والشروب الحقل .

١٥٢٠٧ - شُرُوبٌ حَكَلِي* ، شُرُوبُ الْجَبَل

Tordylum suaveolens (S). *Tordyle suave* (F). *Hodge parley* (E). *Zirmet* (D). *Tordillo* (I).
نوع من الشروب الخولي البري يكثر في الحقول المزودة . لوراه وزاهاد مستعينة العرف المنعش . انماها يضاه اللون . جلوره طليقة يقال انها تقيد الصرع وتسكر اوجاع الرأس .

١٥٢٠٨ - شُرُوبٌ مَحْزِي* ، مَسْكَلِي* ، سِيَسْتِيَسْ

Tordylum officinale (S). *Tordyle officinale*, *Séséli de Crète* (F). *Small hawwort* (E). *Kretschcher Saesl* (D). *Tordillo*, *Seseli de Crète* (I).

نوع من الشروب البري المحلى . لوراه منعقة ، متعينة . صلها كثير التفريخ والتشريح . انماها الى البياض الوردي || يثبت في الاربة الطينية المتصلة الانساج والرطوبة . جلوره طليقة تفيد الصرع يذاه النعقة .

١٥٢٠٩ - شُرُوبِي* ، قَهْطِي*

Juridique (F). *Juridical* (E).
نعت ترمي يعلق حل ما كان مطابقا لمقتضيات الشرع .

١٥٢١٠ - شَرْع ، شَرْفُوع ، شَرْوُوع

Tétard (F). *Tadpole* (E).
هو صغير الضفادع . وقد يطلق ، تعسما ، حل الضفادع في دورها البوملي القائم بين ثقب البصل وكال الشكل النهائي .

١٥٢١١ - شِرْهَال*
Chirogalus (S). *Chirogalus* (E).

جنس حيوانات لبونة من الجيوريات . انواعها المعروفة خمسة موطنها جزيرة مدفسكر . تألف النباتات والاحراج . ملجئها الحياني جماعي . جاعاتها قليلة العدد || اجسامها ويرة ، رشيقة ، صغيرة ، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . بما فيه الاذنان التي يراوح طولها من ١٠ الى ١٥ سم . رؤوسها يرمية الشكل . اذنانها صغيرة مستعينة كاسية . موطنها كبيرة متعينة متعينة . اولها فراوح بين السرة المتابقة والسرة الخنطية || قربها الثمار والحبوب والبلور والصل والمصابير والخشرات الكبيرة . يبيتها التنوي حيث تستكن في غيبوبة تامة يستمر من ١٠٠ الى ١١٠ أيام .

١٥٢١٢ - شُرُوبُ

Hyla (S). *Rainette* (F). *Tree-frog* (E).

جنس ضفادع من فصيلة الشروبقيات . انواعها المعروفة نحو ١٣٣ متشرة في معظم اقطار العالم القديم . من اليابان الى اطراف ااروبة وافريقية الشمالية باستثناء الهند واروبة الشمالية || اجسامها صغيرة القدة تطول من ٣ الى ٧ سم . اولها الى الخلف المنفوت المالحات والزاهي تعيش معظم حياتها التي تطول نحو عشر سنوات في البر تملو الاجنار وتقيم عليها || ذكورها مجهزة بلغة صوتية

١٠٢٢٧ - شَرْم قَلْبِي الْوَرَك

Carpinus cordata (S). Charme à feuilles en cœur (F). نوع من الشرم مهدد اليابان. شجرة سرية تجرد في جميع المواسم والأماكن. تملو من ١٢ إلى ١٨ م. أوراقها تملو نحو ٨ سم. تصلها ينشئ الشكل، قلبى، اللقاعة، مدب الطرف. خشبها جامد الرقعة، شديد الصلابة، شائع الاستعمال الصناعي.

١٠٢٢٨ - شَرْم كَرْوَلِيَّة

Carpinus americana (S). Charme de la Caroline (F). نوع من الشرم جبل الشكل. مهدد البلاد الأمريكية. يملو من ٦ إلى ١٠ أمتار. يتميز برامحه الغليظة القصيرة. أوراقه تحمر في أواخر الصيف وتبقى على أحمرها حتى الإحلال الذي يتم في أواخر الخريف || يعتبر من الأنواع الجالبة التي لا تجرد في أي موقع كان.

١٠٢٢٩ - شَرْم. *Fendu* (F). Clef, Split (E). صفة ما كان مشقوق أو مفكوك أو مصعد.

١٠٢٣٠ - شَرْمَلَف، عَصَلَمَة. *Pampe* (F). Blade (E). ورقة الحنطة والشعير ومظم النباتات الجبلية.

١٠٢٣١ - شَرْمَب، شَبْرَم، بَوْرَم وَفَح

Euphorbia pithyusa, *Tithymalus cutifolius* (S). *Euphorbia pithyusa* (F). Wild pesty spurge (E). Tenebrum (D). *Pidusa*, *Scabram* (I). نوع من الغريبون وهو نبات عشبي بري، ممر يكثر في الأودية الرملية الرطبة. لا شأن له في الزراعة إلا أنه من النباتات السامة الشديدة الضرر. كان يستعمل في الماضي للبعد كسول جارف. وقد جاء من ابن البطار قوله: «وقد قتل به الجملاء اللواتي شغلن من الناس». عشيته فرحاً لعلو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. ساقه لينة الصاعدة. أوراقه متقابلة، سنائية الشكل، تصلها بطول نحو ١٠ سم. وهو وحيد الفلج، عديم المرقق والشرايين، لونه إلى الخضار المائى. أزهاره سنبلية التجميع تاجي الارتكاز، أزهاره صغيرة اللقد زرقاء اللون || ساقه ووروه ميتة لدقة تستعمل في صناعة السلال.

١٠٢٣٢ - شَرْمَبَكِيَّات. *Andraceae* (S). *Andracées* (F). فصيلة من الطحالب تنتمي إلى رتبة السفانات.

١٠٢٣٣ - شَرْمَنِي. *Falcinellus* (S). *Falcinelle* (F). *Falcinellus* (E).

جنس طير من طول الساق وقصيلة التنظليات. أنواعه المعروفة أربعة، ثلاثة منها أمريكية الموطن وواحد مهدد العالم القديم || أجسامها كبيرة. أعتاقها وصوفها مستطيلة. مناقبها حقيرة. ألوانها مختلفة الألوان السبعة المواج || جميعها من القواطع. تألف الحياة الجماعية. مربيها عند الرعي لا يقلل من الفد زوج. تسير شطوط متناوبة متتالية لا تتصرف إلا عند الهرب حيث تأخذ شكل الأقواس المتتالية || قوتها اللبدان والخشرات المائية والقرشريات || اعرف أنواعه وأشهرها الشرقي البهي.

١٠٢٣٤ - شَرْمَنِي بَهِمِي. *Falcinellus leucans* (S). *Falcinelle ignorant* (F).

طائر من الشرقي خلق عليه العالم يوفون، فيها مضي، اسم كروان إيطالي (*Courla d'Italie*). أعضائه تشمل بعض المناطق الآسيوية والشرقي الأوسط وأوروبا الجنوبية الشرقية

يصيد القوامس والمصاير. يثنى في أصالي الأشجار البقلة. أثنائه تنبع أربع وفات تحسبها وحلها.

١٠٢٣٨ - شَرْمَرَق. *Rollier* هو الشراف، الطلح.

١٠٢٣٩ - شَرْمَكَة. *Société, Compagnie* (F). *Society, Company* (E).

مقد بين شخصين أو أكثر يتفقون به على أن يقدم كل منهم شيئاً للسل به وانقسام أرباحه.

١٠٢٣٠ - شَرْمَكَة إِرْتِقَابِيَّة. *Tontine* شركة يؤلفها أشخاص متقاربين في السن عادة يقدمون فيها ودوس أموال ويشترطون توزيعها على الأحياء منهم بعد وزن معين.

١٠٢٣١ - شَرْمَكَة أَلْيَان. *Fruitière* (F). *Fruiterer* (E). شركة أو جمعية تعاونية تجمع الحليب وتصنعه.

١٠٢٣٢ - شَرْمَكَة مَخَاصِمَة. *Société en participation* (F). *Profit-sharing society* (E).

شركة تجارية مسترة وجوباً فصولها أن يتفق اثنان أو أكثر على أن يقتسبا بنسبة معلومة ما تنتجها بعض الأعمال التجارية التي يقوم بها أحد أو بعض الشركاء أو ما يدره استغلال تجاري منه للأجل يقوم به الشركاء جميعاً بهمهم.

١٠٢٣٣ - شَرْم، شَرْمَبَنِيَّس، لِيْرَبَة

Carpinus (S). *Charme* (F). Horn beech, Yoke elm, Hornbeam (E). *Hagebuche*, *Hainbuche*, *Hornbaum* (D). *Carpine*, *Carpino* (I). جنس اشجار حرجية من فصيلة البتوليات رغب في الأراضي الرطبة. أغصانها صلبة صلبة الكسر تستعمل في صناعات عديدة أخصها الأنيار وما أشبه || سوقها متضخمة قفورها ملي. أوراقها نانضة، متعالية، متفحة. أزهارها وحيدة المسكن. شواربها الذكورية متأخر من حرارها الأنثوية أكثر من أسبوع || أشهر أنواعه الخمسة التالية.

١٠٢٣٤ - شَرْم الشَّرْقِي. *Carpinus orientalis* (S). *Charme d'Orient* (F).

نوع من الشرم مهدد الشرق الأوسط. شجرته صغيرة اللقد تملو من ٦ إلى ٧ أمتار. ساقها متراكبة الأضلاع، معمر اللحاء. أوراقها صغيرة اللقد. تصلها قلبى اللقاعة، مسن الحافة || خشبها شديد الصلابة، حنطى اللون.

١٠٢٣٥ - شَرْم اليابَان. *Carpinus japonica* (S). *Charme du Japon* (F).

نوع من الشرم مهدد اليابان. شجرته شبه هرمية الشكل تملو من ١٠ إلى ١٥ م. أوراقها تملو نحو ١٢ سم. تصلها مستدير اللقاعة، ذلق الطرف متباعدة التسنين. متجعج الصفة || يعتبر من الأنواع الجادة التي تتطلب بعض المواسم الخاصة.

١٠٢٣٦ - شَرْم بَتُولِي، شَرْم مَبْدُول. *Carpinus betulus* (S). *Charme commun*, *Charnille* (F).

نوع من الشرم السبروتي الهرسي الشكل، يملو من ٦ إلى ١٨ م. أوراقه مجعدة الاتصال، مسنة الحافة، صفحتها تملو نحو ١٠ سم. وتمرض نحو ٥ م. حرقها متساوية الانتساب معددا يراوح من ٧ إلى ١٥ زوجاً.



شَرْم



شَرْمَب



شَرْمَنِي بَهِمِي

١٥٢٤١ - شره * غلظون و غلظون

Gulo luscus (F., Glouton, Goulu, Carcajou (F.). Gluton, Wolverine (E).



شره عمراء

حيوان وسيد الجنس والنوع من السهرويات اللواحم . جسمه مستطيل الشكل طويلا الكمال يراوح من ١١٠ الى ١٣٠ سم . رأسه كبير القبة غروفي الشكل . اذناه مستديرتان . قوائمها قصيرة ، خالية البرازيل الحادة . ذنبه جتل الصفوف . يظل من ٣٠ الى ٤٠ سم . فروته لينة ناعمة لونها الى الصبغة الخفيفة اللامعة المبرج . موطنه البلاد الشمالية الاسيوية والامريكية . اثناء قمع اريمة جبراً تربتها نحو الحول .

١٥٢٤٢ - شرهاتيات * Acrasiae (S). Acrasidae (F).

فصيلة من الفطور الخاطئة . اجناسها وانواعها عديدة تعيش على بعض المواد الرطبة اغصانها خيرة كبيرة الرطبة وبراز الحيوانات المشابة كروث الدواب وصفان البقر || جهازها البوي منفوخ بمادة حلالية يختلف فيها الشكل والحجم واللون مع اختلاف الانجاس .



شره

١٥٢٤٣ - شرهولة * Melandrya (S). Melandryidae (E).

جنس حشرات من فصيلة الشرهيات ورتبة غديات الاجنحة انواعها المعروفة عشرة منتشرة في معظم سراج السويليات في العالم || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التسطيط ، تطول من ١٠ الى ١٦ مم . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة وقليلة للتشور . حيزها بارزة . تكثيرها معتدلة الجرم . ملابسها الفكية كبيرة . قرونها الانتشارية قلابية . كواسلها عديمة مقببة . بطنها مستطيلة وهدبة المؤخر . اغادها تلحف كامل كليلين باستثناء الطرف اللبب . قوائمها شطية . اثنائها وسيدة اللون منها الباذنجانى والازرق الاسود المبرج والجزوي والاسود الاصفر والعتابي || تألف الجملوع النشرة من مختلف انواع السويليات . كفسها دجوي . طراتها مربع الحركة . قوتها اوراق ثنبات والمواد النباتية المنحلة . يرقاتها غائبة وعادة .



شرهولة

١٥٢٤٤ - شرهوفيات * Melandryidae (S). Melandryidae (F).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متقاربة الجرم ، يتكرر لها الشكل المستطيل . اطوالها تراوح من ١٠ الى ١٦ مم . رؤوسها صغيرة . حيزها بارزة . ملابسها الفكية كبيرة ، متدنية . قرونها الانتشارية غليظة او صولطانية او قلابية واعد فصلها ١٠ او ١١ . كواسلها مستعرضة . اغادها لاحة . قوائمها شطية . اساقها رباعية العقل في الزوج الخلفي . خامستها في الزوجين الياشي والاصول . اثنائها ملوكة || جميعها خاضعة ودمانة تعيش على مختلف انواع النبات وعلى الاشعاب النخرة والفطور وتحت الحلاء . يرقاتها خاضعة والفاحة او شكاكة || اشهر اجناسها الشرهولة والدراسة والسمانة .



شره

١٥٢٤٥ - شرهسى * Leptosperme (F).

جنس اشجار ونباتات من الشرهيات وفصيلة الاسيات . انواعها عديدة ، نحو ٣٠ . اوراقها صغيرة متعاقبة سطرية . اغارها فردية التجميع غروية الاوتكار . اغارها كمبورية كثيرة البزور النقيقة || اوراقها وانواعها غنية تستعمل في عدة علاجات مقوية .

وافريقية الشمالية || جسمه كبير القبة يظل نحو ٧٠ سم . ثوبه الى الصبغة الورداء الغمام اللولج . رأسه عايق اللون . ظهوره ويتجاسه غصير اللولج . عنقه ويظهره ويظهر الى السمرة الخطية . متفاده وسدقة عنه الى السمرة الكستية . رجلاه الى الخضر البعري المايك || يأتلف الناقم والاعواد والاهوار وصفان مجاري المياه القليلة الانسياب . يقف البيدان والحشرات المائية واللباحيط والقشريات || يثقل الى الاشجار والشجيرات المائية على ارتفاع متر او اقل من سطح الماء . عته مجموعة من البيدان والقشبات والجذور والقش . اثناء قمع من ٣ الى ٤ يعضات لونها الى الخضر الازرق المادم القشيش تحضنها وحدها نحو ٣ اسابيع .

١٥٢٤٥ - شرثف Effaner, Effaumer (F). To strip of leaves (E).

فطر رؤوس الصف .

١٥٢٤٦ - شرثلكة Efanage (F). Stripping (E).

انتعاش رؤوس صف الزرع هته اغراض السنو وقد يتم ذلك قبل الاسبال .

١٥٢٤٧ - شرثلكة Cocon

في الصلبة ، اطلبا . ج شرانق .

١٥٢٤٨ - شرثلوع هو الشرغ ، اطلبه .

١٥٢٤٩ - شرثيصة حمراء * Pyrochroa coccinea (S). Pyrochre rouge (F).

حشرة وائمة خاضعة دامتة وانجته من فصيلة الشرثيصيات ورتبة غديات الاجنحة . تألف الاجراج والباري . غافقها تعيش على بنبات الازهار وعلى اوراق الثبات . يرقاتها في اول مهدها تعيش على المواد النباتية والمصفوة ثم على ما تقتنصه من اساريع الحشرات الخاضعة || جسمها متوسط القبة يظل من ١٢ الى ١٥ مم . ثوبها احمر الكنا اسود الرأس والبرامز . رأسها مستدير الجرم . فكلها شليحان . زباناتها مستطيلة ، مشطيان عند الذكر ، منشاريان عند الانثى . صينها بارزتان . ظهرها مستدير الطرف اللاحف ، كليل الحمل ، عادم التحزيز || لها جيل واحد في الحول . تقهر الحشرة الجملانة في نيسان ويثقى حتى تموز . تسرح في الربار . تساه في ايار . تمتع الممكن مبيدات تحت لاه الاشجار وقشورها || البرقة عند بلوغها الكلال الجسودي تطول نحو ٢٤ مم . جسمها مستطيل الشكل مبطل الجرم ، اخير اللون ، مستطيل الرأس البني ، ضيق التأثير الفكية ، سداسي الرواجب القسر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما ينقضي في آخر سرداب دخلته البرقة .

١٥٢٥٠ - شرثيصيات * Pyrochroidae (S). Pyrochroidae (F).

فصيلة حشرات وائمة وقائمة من رتبة غديات الاجنحة || اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف الخبوس والنباتات التريينية وازهار النباتات المصطرة والزراعية || جميعها صغيرة القبة مبطله الاجسام المستعرضة المؤخر . زباناتها مركبة من ١١ فصلة وهي مشطية الشكل عند الذكر ، منشارية الشكل عند الاناث . اساقها خاضعة للعقل باستثناء الزوج الخلفي هته يرقاتها || يرقاتها مبطله الجسم تعيش تحت غلاء الاشجار وقشورها المصفلة صاعية وراء يرقاتها الحشرات الخاضعة لقتضاء عليها || اشهر اجناسها الشرثيصية .

Senecio argentea (S). شَرَبَات فِضِّيَّة ١٥٢٥٥
Sénéçon argenté (F).
 نوع من الشربة وهي عشبة سربوتية معمرة تملو نحو ٢٠ سم. أوراقها سميكة التصل المتصلص والمسنن، خلية البشرة، فضية اللون. أزهارها إلى الصفرة الباهية. أزهارها يستمر من آب إلى أيلول.

Senecio doria (S). شَرَبَات مَدِيَّة ١٥٢٥٦
Sénéçon Doria, Herbe dorée (F).
 نوع من الشربة وهي عشبة سربوتية معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها أحليجية الشكل، لمبة التصل، مجرمة اللون، تطول من ٢٠ إلى ٣٠ سم. وتقرض نحو ١٠ أزهارها متوسطة القد، نازقة البلق، أبيض إلى الصفار المذهب. أزهارها يستمر من تموز إلى آب.

Senecio flammeus (S). شَرَبَات نَارِيَّة ١٥٢٥٧
Sénéçon rouge-feu (F).
 نوع من الشربة وهي عشبة سربوتية معمرة تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها الجذعية مسطحة المنق، سنانية التصل، المسنن الخافت. أوراقها السفلى قصيرة الإصقان وبضبة الشكل، عادمة السنن. أزهارها نارية اللون، حراء المراج، حقة التجميع. أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

Sénéclionides (F). شَرَبَات ١٥٢٥٨
 سبط من فصيلة المركبات نباتات عتة مئات مختلفة الأشكال والأحجام. أشهرها الشربة.

Truffe gâtée (F). شَرَبَات ١٥٢٥٩
Tainted truffle (F).
 الكنة الفاسدة التي قد استرخت (الساخ).

Cepola (S). Cépole (F). شَرَبَات ١٥٢٦٠
 جنس اسماك مجرمة من فصيلة المنجيبات. أزهاره المبرقة قليلة، أصنافها المتوسطة وبحار البلاد الحارة. أجسامها سوية الشكل حراء اللون. رؤوسها غليظة مقطوعة الاضطام. زعانفها الظهرية والبطنية تمتد من الفراس إلى الذنب. زعنفتها الشرجية غريزية الشكل. لحمها حادي الصنف قل من يرغب فيه.

Cepolidae (S). شَرَبَات ١٥٢٦١
Cépolidés (F). Cepolidae (E).

فصيلة اسماك مجرمة من الطنجات شالكات الزعانف. اجناسها وأزهارها المعروفة قليلة العدد جميعها من اسماك اساطم التناف. اصنافها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تعيش بين المشريات وفي الاساطل. اجسامها سوية الشكل تطول من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوتارها متباينة اللون. زعانفها الظهرية والشرجية قاطبة. رؤوسها فسيحة، غليظة. اشدافها رسة. مبيضا كبيرة. لحمها كاسنة الصنف، قل من يرغب فيها.

Artère (F). Artary (E). شَرَبَات ١٥٢٦٢

هو الرعاء الذي يحمل الدم من القلب إلى سائر اجزاء الجسم يقابله الوريد الذي يبعد الدم من اجزاء الجسم إلى القلب. اما اتصال الشريان بالوريد فيم بواسطة الاوعية الشعرية التي توصل الشريان بالوريد. يقيم الشريان في الجسم الحيواني إلى اربعة اقسام رئيسية: اولا الشريان الاخر (الاورطي) الذي ينبع من البطن

Leptospermées شَرَبَات شَرَبِيَّة ١٥٢٦٦
 سبط من فصيلة الآسيات، أشهر أنواعه الشري.

Miel (F). شَرَبَات ١٥٢٦٧
 هو العسل، اعطيه.

Mutation شَرَبَات ١٥٢٦٨
 هو الانتحار، أي القتل العفائي في الانتقال الوراثي لصفة أو لصفات نوع أو ضرب من الياحي.

Senecio (S). شَرَبَات ١٥٢٦٩
Sénéçon (F). Groundsel (E). Greiskraut, Kreuzflanze (D). Senecio, Senecione (I).
 جنس نباتات حولية وعمره من فصيلة المركبات. أنواعه زهاء ١٣٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم. معظمها بري وبعضها زراعي. منها الاصاب والجنبات والشجيرات المائيةة الاشكال والالوان. اعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع.

Senecio elegans (S). شَرَبَات الرِّيَقِيَّة ١٥٢٧٠
Sénéçon d'Afrique, S. des Indes (F).
 نوع من الشربة وهي عشبة حولية وعمره تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها سنانية التصل، زهاء البشرة. أزهارها وريدية أو ليلية البلات، اقراصها إلى الصفرة، قنابها موحدة بالاسود. أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين.

Senecio aurantiacus (S). Sénéçon orangé (F). شَرَبَات بَرَقَاتِيَّة ١٥٢٧١
 نوع من الشربة وهي عشبة ربية مصره تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها قليلة المنسل والزغب، فضية التصل، مدبة المقصة. أزهارها برقالية اللون، مبرم الاقرص، صغيرة البلق. أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

Senecio sagittifolius (S). شَرَبَات سَهْمِيَّة ١٥٢٧٢
Sénéçon à feuilles sagittées (F).
 نوع من الشربة وهي جنبة جادة معمرة تملو نحو ثلاثة امتار. أوراقها سهمية الشكل والسفل منها كبيرة فارشة تطول نحو ١٠٠ سم. وترقص ٤٠. أزهارها كبيرة القند، كثيرة العدد، حقة التجميع، قانية الارتكاز. قنابها تينة اللون، لسانها حابة. أزهارها يستمر طوال الخريف.

Senecio vulgaris (S). Sénéçon commun (F). Common groundsel (E). شَرَبَات شَالِكَة ١٥٢٧٣
 نوع من الشربة وهي عشبة برية حولية تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها سنانية التصل، مشرقة الحافة، زهاء البشرة على صفحتها السفلى. أزهارها صفراء اللون، حابة القرمص. يكثر ويصود في الاراضي المزدرة. قنابها المثلثية لحسونة أوراقها يورارها. يقرولن لها طية تنظم الحط وتقومه.

Senecio scandens (S). شَرَبَات عَاوِشَة ١٥٢٧٤
Sénéçon grim pant (F).

نوع من الشربة وهي جنبة سربوتية عائرة معمرة تملو نحو ٥ امتار. فروصها متراكبة فناء. أوراقها أحليجية مسطحة الزام الاغص، تصلها خلى البشرة على صفحتها وروصها الزهرية ثمانية التركيب، حقة التجميع، قانية الارتكاز. أزهارها يستمر طوال الخريف.



شربة شائلة



شرباط

Dessication totale (F). شَرْكَازَة ١٥٢٧٥

Total dessication (E). شربان شربان : كان يابساً جداً .

Encyrtus (S). شَرْأَف ١٥٢٧٦

Encyrtus (F). Encyrtus (E).

الواحدة شربان . جنس حشرات نافعة من فصيلة الكثرانيات .
انواعها متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة
الحرارة . جميعها تتطفل على الحشرات النافرة من الحرفشات
والمنهيات . اجسامها صغيرة ، أسطوانية الشكل ، تعلو
نحو ٢ م . اجنتها شفافة ، شفافة ، كبيرة عند الشقين .
ألوانها سوية الألوان القامعة .

Schizogonia (F). شَرْكَالَة ١٥٢٧٧

Schizogony (E).

الشربان ملوح تكاثري خاص تسلكه البويضات اللاشقية
حيث ان البويضات تتجرد الى قدة عددا يفيحي عدد
الجذلات .

Encyrtidae (S). شَرْأَفِيَّات ١٥٢٧٨

Encyrtidae (F). Encyrtidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة شربان الاجنحة المقصورة .
اجسامها وانواعها المرفوعة كثيرة العدد . جميعها نافعة
تتطفل على الحشرات المؤذية من ذوات الجناحين ومرشقات
الاجنحة . اسطوانات معظم اشكال العالم باستثناء المناطق
الباردة والاشمالية . حشراتها صغيرة القدة تطفل نحو
ملين واحد . اجسامها وقرونها الاشمالية شبيهة
الاشكال . رؤوسها مستديرة ، جوفائها اكبر من طولها .
مرفاتها صغيرة مستديرة . انوارها مختلفة ، وسيدة اللون ،
يطلب فيها المواجه الاسمح . أشهر اجناسها الانتشار
والعوس والبرية والشربان .

Schizocodon (S). شَرْكَوْد ١٥٢٧٩

Schizocodon (F). Schizocodon (E).

نبات عشبي من مصر من فصيلة الخليلجيات . منته الجبال
في المناطق المعتدلة الحرارة . ساقه جذعة . اوراقه ابيدة ،
قرصية الانتشاح ، شبه قلبية الشكل ، مستطيلة المالحق .
تصلها بقلبية مسنة الخنار ، لونها الى الخضار الاسمح
المواج يطبق حاشى اخر . ازهاره وردية اللون ، قطرها
نحو ٣ سم . تنموه ينمو من آذار الى نيسان .

Flanc abrupt (F). Abrupt flank (E). شَرْوَن ١٥٢٨٠

جنب الرادي الوبر الحادي .

Osselet (F). Knuckle-bone (E). شَرْوَكَة ١٥٢٨١

كل سطحية من اطراف القوائم تدعى شربان . ج شربان شربان .

شَرْوَب ١٥٢٨٢

المنسوب من الشربان قيل ان يصلح . ج شربان .

Schiste (F). Schist, Slaty rock (E). شَرْس ١٥٢٨٣

اسم شامل يطلق على الصخور المنفذة التركيب التي
تنقسم الى صفائح . ج شربان .

Oplidium (S). شَرْس ١٥٢٨٤

جنس طيور مجهرية من فصيلة السحريات . تكاثرا
لاشي ، تتميز بمقلها البوقية المستديرة . ينفخ كروي
الشكل يصلح حدة غليظة دقيقة . معظم ظهوره

الاسمر ليطوق جلع الرية اليسرى ثم ينحدر نحو الصدر
حيث يتفرع وينقسم الى ثمانية كثرانيات السباتي وهو
يقسم الى قسمين : الظاهري الذي ينطوي ظاهر الرأس
ووجهه وسطم القن ، والباطني الذي ينطوي وسطم باطن
الجسدية . ثلثا شربان الاطراف العليا والسفل وهي
الكثرانيات الاطلي والمعدني والحرفي . رابعا الكثرانيات
السطحية التي تسير تحت الجلد . انوارها الكبري والمعدني .

١٥٢٩٣ - شَرْبَان ، عَصَب (F). Nervus carialis (E). Tertiary nerve (E).

هو في نصل الاوراق النباتية ، الحرفي الشبي الذي يتفرع
من النرق .

١٥٢٩٤ - شَرْبَان سَبَاطِي هو البواج ، اطله .

Savageon, Franc (F). شَرْبَة ١٥٢٩٥

Wild stock, Ungrafted (E).

النبته الحاصلة من برة ولم تقطع ، ج شربان .

Radicle (F). شَرْبَن ١٥٢٩٦

هو الجذر ، اطله .

١٥٢٩٧ - شَرْبَط المَاء

Sparganium ramosum, S. erectum (S). Sparganier
rigide, Rubanier, Ruban d'eau (F). Common burd-
weed, Knop sedge (E). Astiger igalkoben (D). Blodo
Chlodo di Dio (I).

نوع من السافرة وهو عشب مائية معمرة من فصيلة البوطيات .
اوراقه متناوبة ، حاشية ، مصفحة الشكل ، جامدة للتصل ،
حادة الاطراف . ازهاره ابطية وعامية ، كروية الشكل ،
متناوبة . يوجد في مياه البلاد المعتدلة الحرارة .

١٥٢٩٨ - شَرْبَطِيَّات ، وَبَطِيَّات

Tsaniada (S). Tsaniada (F). Tsaniada (E).

لسيلة ديد من المنطقات اجسامها وانواعها عديدة تتطفل
على مختلف الحيران .

١٥٢٩٩ - شَرْبَط عَصْفَرِي

هو البط الحفاري ، اطله .

١٥٣٠٠ - شَرْبَكَة هي شكاية نية ، اطلها .

١٥٣٠١ - شَرْبَك

Associé (F). Associated (E).

هو كل عضو في شركة او جماعة منتظمة .

١٥٣٠٢ - شَرْبَك في الالتيك

Coobligé (F). Coobligant (E).

هو من كان ملزماً بمقتضى التناهد او القانون ان يشترك
في دفع دين بالتضامن مع غيره .

١٥٣٠٣ - شَرْبَكَة

Scissurella (S). Scissurella (F). Scissurella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مميزات الاويل
وفصيلة القبابيات . انوارها المرفوعة عديدة منتشرة في جميع
بحار العالم . اسنانيها صغيرة ، رقيقة ، شفافة ،
مشرية الحمار القاعدي المحاذي الرأس . اجسامها شبيهة
مستطيلة ، صلبة الرؤوس ، سداسية الواسم الملهبة .

١٥٣٠٤ - شَرْبَن هو الكشوث العربي ، اطله .



شربط الماء



شربة



شربو

١٥٢٩٣ - شَسَّسَة خَشَرَكَه * ، نَقَار أَخْصَر
Gecinua viridis (S). Gécine vert, Pic vert, Pivert (F).
Green woodpecker (E).

طائر من الشَّن مولى فِصَح الأرباء يمتد من الهند الصينية إلى أطراف أروبة || جسمه بطول نحو ٣٣ سم. ثوبه جميل الألوان الزاخرة، متناقل الأخضر والاحمر والاصفر والاسود والابيض. رأسه احر اللون. ظهره الى الاصفر الاصفر المارح. اذنيكه اصفر. يمتد الى الخشائر القاتع الزاهي. يحسره الى السواد اللامع يرتكز على خط اسمر يمتد من قاعدة المنار الى اعلى العنق. جناحه بجناح بالاسود والابيض والاصفر. منقاره خشبي اللون اسود البتج || يألف الاسراج والقنابات والرياض القريبة من مجاري الماء. قوته الحشرات واساريمها ويرقاتها ويكسها يلقنها بسرة البرق يحسكه عليها لسانه المنطق الاخاذ. يمتد منه في تجاريف الاشجار. اناء تصنع من ٥ الى ٨ يبيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٥ الى ١٨ يوما.

١٥٢٩٤ - شَسَّس *
Schletoex (F). Schistosa (E).

ما كان منفذ التركيب كالشس.
١٥٢٩٥ - شَسَّسِيَّة *
Curvularia (S).

جنس تطور مجهرية من الريديات وفصيلة الطليحات. انواعها قليلة العدد جميعها ربة قليلة الاذى تعيش على الانحاء النباتية اليابسة || اعراف انواعها شسسية الفروع (Cur. lucuta) التي تعيش على اللحاء السائرة نحو الياس في الفروع والمنا وبسيف الحفصيات.

١٥٢٩٦ - شَسَّسِيَّة *
Tamer (F).

هو الفلشرين ، املبه.
١٥٢٩٧ - شَسَّسِيَّة *
قال دارد الانطاكي: « ثبت يميل الى صفرة واصله الى الحسرة تته الطعم له حدة يسيرة واجوده الجلوب من دير النوبا. وهو ينفع من الاستقاء والجنين وعسر التنفس ويحل البلم ويبرئ البول ويزيل الريح ».

١٥٢٩٨ - شَسَّس * ، عَيْنِ الدِيلَك ، عَصْبَة السُّوس
Abrus pectorius (S). Abre à réglisse, Liane à réglisse, Arbre à chapelet, Pois d'Amérique (F). Bead tree, Wild liquorice, Rosary pea (E). Paternosterkraut (D). Falsa liquorizia, Liane regolizia d'America (I).

نوع من البروس وهو جنبة زراعية حارثة. جلورها صناعية تستعمل استعمال السوس. زهورها مستديرة الشكل وقشورها جامدة و صلبة ، جلورية اللون ، سوداء النقطه، تستعمل في صناعة النسيات والقلائد. لهاها دعي يبيد الامعاء وبهم من استخرج منه مادة الاربرين.

١٥٢٩٩ - شَسَّسِيَّة * هي الانموذج والبنية.
١٥٣٠٠ - شَسَّس *
Elaeochus (S).

جنس حشرات من عذبات الايخنة ولسيلة السوسيات. انواعه المروعة شره منتشرة في معظم اقطار البلاد المحذلة الحرارة. مظهره دامن يعيش على المواد النباتية المنحلة وبعضها يعيش على شياق الحور والصفصاف || اجسامها صغيرة الملمعية الشكل. كوتلتها مبدية نائقة ازرقاها. احماها لاسعة مخددة ، منها انواع ثنائية البتج وغيرها رباعية. قرونها الاستشارية صلبة الشكل. قرونها نشيلة مستديرة القد. اقواها ترارح الى السرة الشسقة الى السرة يطوا حل صناعي. يعجبها الى السرة القديمة.

حار يتطفل على النباتات الزراعية. اشهرها واضرها شس الثبوغ والمقوف والنقل.

١٥٢٨٥ - شَسَّس الثَبَوِغ *
Oplidium nicotianae (S).

نوع من الشس يسبب سنج الشتل الفنية ، مركب الزاها الكاشفة وغلاهاها فيلونها ويقضي عليها || يكافح بتطهير التربة قبل البذر او باستعمال اسد القواطير التنسية المخلقة منه ظهور القوم.

١٥٢٨٦ - شَسَّس المَقُوف *
Oplidium brassicae, Chytridium brassicae (S).

نوع من الشس مركب سنج اللقوف وقد يكثر في الشاتل الربوية فيعطب سوق الشتل عند سطح التربة ويسبب يلسها المزني ثم انتحاشها فوق بعضها ويرياها ومربا. يكافح باستعمال اسد القواطير التنسية او غيرها من القواطير الحديثة التي يزداد عددها كل يوم.

١٥٢٨٧ - شَسَّس الفُكَل *
Oplidium trifolii (S).

نوع من الشس مركب اوراق النفل فيزها ويسبب يلسها || يكافح باستعمال اسد القواطير التنسية وذلك بعد حش النفل عدة وبهيرة لا تتعدى ٢٤ ساعة.

١٥٢٨٨ - شَسَّسِيَّة * ، حَتَارِيَّة ، حَتَارِيَّة
Marginal (F). Marginal (E).

لمت تعريفي يطلق على ما هو في الحاد او ما جاءه حل الخاش.

١٥٢٨٩ - شَسَّسِيَّة *
Marginalisme (F). Marginalism (E).

الشسسية نظرية اقتصادية تقول بان تحديد قيمة الشيء منوط بعامل الحاجة اليه.

١٥٢٩٠ - شَسَّس *
الشس : القبر الذي يشق ويجحف.

١٥٢٩١ - شَسَّس *
Chasac (S).

Chasac (F). Chasac (E).

جنس حوالات بحرية من الرخويات مطنيات الاربل وفصيلة التيجنيات. انواعه الممارسة المروعة قليلة البد اسطها بعض مناطق المحيط الاطلسي || اصداها صتيرة القد ، مروية الشكل ، ملونة وزهرية. فواها يفسية مسطيلة ، مالة الاريفسة العادة الخضين || اعراف انواعه شسكس مديرا (C. maderensis) الذي يكثر ويوجد على شواطئ جزيرة مديرا.

١٥٢٩٢ - شَسَّس *
Gecinua (S).

Gécine, Chloropic (F).

جنس طير من فصيلة القناريات يتسلق جلوج الاشجار ويقبض قشورها وشكورها في طلب الحشرات واساريمها. انواعه المروعة قليلة البد. راسه شس || اجسامها طول من ٣٠ الى ٣٣ سم. اقواها متناقلة الالوان الجميلة يتنطب فيها الاصفر. متابعها غروبية ، مسطيلة ، مخددة. اجسامها صلبة الجسم والانتفراج. اذناها رباعية الريش. اقواها قصيرة. اجسامها قوية. غالبا مستقلة الاطراف المهدوبة الحادة || اشهر انواعه الشس الاخضر.



شس الثبوغ



شس الملقوف



شس النفل



شس غفرا



شس



شس

١٥٣٠٩ - شَصَب الكِثَان * (S). *Melampsora liri*

Rouille du liri (F).

فطر مجهرى يتطفل على جميع أنواع وُضروب الكِثَان من رية وزراعية فُطِب الأوراق ويَطْرَح بالانتاج . يتطفل أولاً بِشكله الاليدى في أوائل الربيع حيث يركب فصل الأوراق على صفحته . مظهره الخلابى يقع لا قياسية الشكل والحجم والترتيب لها إلى الصفرة البرتقالية . وعند اكتمال طوره الاليدى تملأ ضامته في طورها الدماي فتنشر البُشرة عن بورغ كالخشب لونه إلى الجوزة الزاهية . يكافح وقتاً أولاً باجتنب المواق الرطبة . ثانياً باجتنب الأرضة القوية الاندماج . ثالثاً باجتنب الاكثار من الاسمدة القسفاية . رابعاً باستعمال البورق بمعدل ٥ كيلو الدم الواحد .

١٥٣١٠ - شَصَب المُفَافِص * (S). *Melampsora evonymi-capreae*

Rouille du fusain (F).

فطر مجهرى يتطفل على أوراق وُضوبى للمفَافِص فيوشى بهشور الاليدى الكثيفة التسجيع التي تبهر صفراء اللون على صفحة النصل العليا يقابلها على الصفحة السفلى دمايل من السائغ ، لونها إلى الجوزة تطعب انسجة الأوراق وتسبب يلسها .

١٥٣١١ - شَصَبِيَّات * (S). *Melampsoraceae*

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الشصيات تتميز بتكوين أعضائها التناسلية (الناسل) تحت البشرة أو تحت القاعدة الأدمية . أثيراتها فارغة طليقة . ذاتها صغرة تبهر نطفة ثم تنفلق عن بويئات قوية التشوه كليفة التسجيع . اجناسها عديدة ، أشهرها وأضرها من الوجهة الاقتصادية للثة التالية : الشصب والشصاب والشصب والزينة والسلاج والشفنة .

١٥٣١٢ - شَصْدَقِي الرُوح * (F). *Rose des vents*

هو التصميم المَعرُوف به حالياً لبيان مصادر هبوب الرياح . يشمل ١٦ اتجاهاً منها أربعة رئيسية وهي الشمال أي الحنوا

١٥٣٠١ - شَصْن ، شِنَارَة * (F). *Hameçon*

Fish-hook (E).

خضائن أو كلاب صئير من فولاذ يثبت في عيط والخطب في صفا طوية . يستعمل لصيد السمك .

١٥٣٠٢ - شَصَاب * (S). *Melampsoriidum*

جنس فطور مجهرية من فصيلة الشصيات يتميز بلسائه البامدة الشكات وبهاماته الخيطية الجلول والنداء . أثيراته تركب الأوراق على صفحتها السفلى . مظهرها الخلابى بهشور صغرة ورتقالية اللون مبهمة بدون ترتيب إلى أن تدخل في طورها الدماي حيث تأخذ اللون الخليل ثم تنفلق || أنواعه قليلة أضرها شصاب البتلا وشصاب الشمر .

١٥٣٠٣ - شَصَاب البَتُولَا * (S). *Melampsoriidum betulinum*

Rouille des feuilles de bouleau (F).

فطر مجهرى يتطفل على أوراق البتلا فيأيلها ويسبب سقوطها الباكر || مظهره الخلابى ، في طوره الدماي ، يقع مضلعة مبهمة لونها إلى الصفرة تبهر على صفحة النصل العليا يقابلها على الصفحة السفلى بهشور مكنية من الخلائج الدماية الخيطية اللون || أضراره زهيدة لا تسبب المكائنة .

١٥٣٠٤ - شَصَاب الشَرْم * (S). *Melampsoriidum carpini*

Rouille des feuilles de charme (F).

فطر مجهرى يتطفل على أوراق الشرم فيوشى || مظهره الخلابى يقع لا قياسية الشكل والحجم والترتيب تركب النصل على صفحته السفلى . كلبو صفراء اللون ثم تنفلق إلى الخليل تطعب لسج النصل وتسبب الإجهال الباكر . لا يتسبب المكائنة .

١٥٣٠٥ - شَصَب * (F). *Scarifié des plantes*

Sterility of plants (E).

هو عدم إثمار النبات سببه عارض جسمورى يمنع النبات عن التثوير أو يحول الإثمار إلى أوراق من قرط السو .

١٥٣٠٦ - شَصَب * (S). *Melampsora*

جنس فطور مجهرية من فصيلة الشصيات يتميز بلسائه المبهمة بتكاث دوسية . دماياته ممراسة ، وشيعة الارتكاز لا تأثيرية || أنواعه عديدة لا تقل عن ٢٠ أشهرها ما يتبع .

١٥٣٠٧ - شَصَب الحَرَو * (S). *Melampsora rostrupii*

Caoma mercurialis (S). Rouille du peuplier (F).

فطر مجهرى يتطفل بشكله الاليدى على الحور فيركب الأوراق والسوق . وهو على الأوراق يقع شصرة عديدة مبهمة بدون انتظام تكثر عند الحرات النصل وفي زامه الاخير فتقلع وتسبب سقوط الأوراق وضعت الأشجار .

١٥٣٠٨ - شَصَب الصَّنَوْبَر * (S). *Melampsora pinitorqua*

Caoma pinitorquum (S). Rouille tordeuse des rameaux de pins (F).

فطر مجهرى يتطفل بشكله الاليدى على غرايبى وُضوبى الصنوبر كما يركب بشكله الدماي أوراق الحور . مظهره الخلابى على وُضوبى الصنوبر يقع صفو بفسية الشكل طولا نحو ١٢ سم وعرضها ١٠ ميليا قمبات شصرة شطولية تقرح اللحاء وتطرح بالبشرة قصب صجين النامية أن لم تقصر عليها .



شصاب الشمر




شصب الحور



شصب الصنوبر



شصب الكثان



مققة ، نصلها مالم البشرة شديد الخضار . تزوع لثريا
المرطبة للشكل ، الشديدة الحرارة والغنية بمسراتفيتامينات
الترئيسية اعصبا الفيتامين « ث » .

Partager en 2 parties égales (F). **شَطَر** ١٥٣٢٢
To share in equal division (E).

قسم الشيء الى جزئين متساويين .

١٥٣٢٣ - **شَطَطَتَا كَتِي** *

Sarcidornis melanotos (S).

Sarcidornis noirtre (F).

طائر من فصيلة البليات . اصغاه تمتد من افرقية
الاستوائية الى برمانيه في الهند لا جسم كبير القد
مستطيل المتق يعمل في الصفعة العليا من متفاده لخصه
لمعية جزوية اللون . جناحاه كبيران لا لافان . ذنبه
جمد . ثوبه متراكب الاضمر والبنيض والاسود .
مؤخر عنقه وصدره وبطنه الى البياض الاخير .

Excédant (F). Exceeding (E). **شَطَطُ** ١٥٣٢٤

هو ما زاد او ثقي او فاض . يقال لا وكس ولا شطط
اي لا نقصان ولا زيادة .

١٥٣٢٥ - **شَطَطُ السُّطَّة** **تَجَارُ السُّطَّة**

Excès de pouvoir (F). Excess power (E).

هو ان يتجاوز احد القضاة او المأمورين الاداريين
حدود سلطته .

Discope ١٥٣٢٦ - **شَطَب** *

جنس اسماك بحرية من فصيلة الفرخيات ورتبة شالكتات
الزحائف . انواعها عديدة جميعها كبيرة القد . حيلة المنظر
مازكة ، لليلة اللحم . طولها يراوح من ٤٠ الى ١٢٠
سم . اشهرها من اسماك المحيط الهندي وبعضها يعيش في
البحر الاحمر || من انواعها المشهورة البهار والشطف
والشطف الوردي والشطف الاسمر والمبر .

Discope nigra ١٥٣٢٧ - **شَطَفَ اسْمَر**

سكتة من الشطف ، كبيرة القد طولها نحو ٩٠ سم . ثوبها
الى الطلعة السمر . مرتدتها من البحر الاحمر الى
الخليج الفارسي والهند وسريلنبي .

Discope sebas ١٥٣٢٨ - **شَطَفَ وَرْدِي**

سكتة من الشطف كبيرة القد طولها نحو ١٠٠ سم . ثوبها
الى الوردي المذهب المواج يطوي خطوط احمر قاطب يمتد
من القراس الى الفرج . لحمها اللين الطعم مرغوب فيه .
تكثر في المياه المعتدلة والاسرائيلية .

Chetomys (S). ١٥٣٢٩ - **شُطُوس** *

Chetomys (F). Chetomys (E).

حيوان لبون قاتم ورشد الجنس والنوع من فصيلة الشجيات
مرحلة البرازيل . طولها نحو ٥٠ سم وذنبه ٢٥ . راسه
غليظ فلفظ . ذلقوبه شطوط . خنثاياه مفرطتان عيناه
واذناه صغير . جرماته معتدلة القد . اظافره قوية سادة .
ذنبه كاسي القامة . حشيش الباني ، لا اخاذ . شعره
هلي حدي فخر يتخلله شوك قصير كالسلك يتفقه عند
الدفاع من اللبس لا يائث اللبايات والاحراج والمرامي
والحقول . يسرح في الليل . يتسلق الاشجار . قوته المواد
النباتية على اختلافها .

والجنوب اي القليلة والشرق اي الصبا والغرب اي الدبور .
واربعة ثانوية وهي الشمال الشرقي اي الحيف والشال الغربي
اي الجرياء والجنوب الشرقي اي الازيب والجنوب الغربي
اي الصاية . وثمانية ثالثة وهي الشمال الشرقي اي
حيث الشمال ، والشرق الشرق الشمال اي حيث الصبا
والشرق الشرق الجنوبي اي ازيب لصبا ، والجنوب الجنوبي
الشرقي اي ازيب الجنوب ، والجنوب الجنوب الغربي اي
صايت الجنوب ، والغرب الغرب الجنوبي اي صايت الغرب ،
والغرب الغرب الشمال اي جرياء الغرب ، والشال الشمال
الغربي اي جرياء الشمال .

Petit de la gazelle (F). **شُوسَر** ١٥٣١٣
Young gazelle (E).

هو صغير الغزال ويحني بداية . ج اشمار وشمارس .

Mauvaise litière (F). **شُوس** ١٥٣١٤
Bad milk (E).

انثى البائم القليلة الدر . ج شصص وشصاس .

Melampsorella ١٥٣١٥ - **شُوب** *

جنس طغوز بحرية من فصيلة اللصصيات . ينحدر بلناضه
الديمية الشكات ويحملها الشفافة الجلول والشفاه . طوره
الاثدي يتصل بمسلان شارب || انواعه قليلة امرتها
شصوب الشوب .

١٥٣١٦ - **شُوبِيَتِيَتِي** *

Melampsorella curyphylloacearum, Melampsorella
cerastii, Acidium elastinum (S). Rouille véculaire
du sapin. Balai de sorcière des rameaux de sapin (F).
فلر مجهري يتصل على الشوب لويذه ويقوده الى السكة
(سكتة السامر) . ظهوره الخارجى بفور صغيرة عطية
انتصبي والرتب لا لياية الشكل والحجم تركب الفصل
على صفحت السط بلوازة الفصل تصطب الاعداد والثنائي
وتسبب السكة الذي يشو الاشجار ويؤثر نموها .
يكافح بالتطاع وسرق الافناد المكودة .

١٥٣١٧ - **شَقَّ** هو الشاطي . ج شَطَر وشطان .

Talle (F). Sucker (E). ١٥٣١٨ - **شَقَّة** ، **شُنيَّة**

اشترط ج طوره واشطاه على فراخ الزرع . يقال شقا واشقا
الزرع فهو مشطلي .

Trisetum (S). ١٥٣١٩ - **شُطاس**

Trisetum (F). Trisetum (E).

جنس نباتات عشية ، برقة ، سولية من فصيلة النجيليات .
انواعها المشروقة قليلة البلد منها جبال حوض البحر
الايض المتوسط || شكلها قريب للشي من الخرفال .
بعض انواعها شاتي . صفها مستطيل ، باثت الخضار .
ازدهارها مفرج متعاهد النجيلات .

Radiation (F). ١٥٣٢٠ - **شُطَب**

عمر من جدول او سبل .

Capeiscum conicum (S). ١٥٣٢١ - **شُطَة** *

Piment à bouquet rouge (F). Cone pepper (E).
Kleine Beisbeere (D). Pepe d'Arabie, Pepe
rosso piccolo (I).

نوع من القليلقة وهي بقة عشية سولية من الفصيلة
الباذنجانية . تلغز من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها سهمية



شصب الشوب



شقة



شطط كتي



شطط



شطوس

Toile d'araignée (F). Cobweb (E). **شُعْنة** ١٥٢٤١ -

هو بيت الشبكات الموشى بالنس.

Andouiller (F). Tine (E). **شُعَاب** ١٥٢٤٢ -

هو الانشعاب الطبيعي الذي يحصل في قرون الايل والاريل واليسود. ومن هذه الشعاب يمكن تحييد عمر الحيوان.

Endroit boisé (F). **شُعَار** ١٥٢٤٣ -

Wooded side (E).

الشعار: مكان ذو شجر. وهو الشجر اللثف او ما كان من الشجر في اين ووطه من الارض.

Rayon de lumière (F). **شُعَاع** ١٥٢٤٤ -

Ray of light (E).

عمره الشمس المنسكب الذي تراه مشتركا كالحال.

Barbes (F). **شُعَاع** ، **شُعَاع** ، **شُعَاع** ١٥٢٤٥ -

Beard, Bristles (E).

هو سنا السنبل اذا يس وما زال حل السبله || يقال لشع الزرع اذا اخرج شعاعه.

Actinomeris (S). Actinomère (F). **شُعَاع** ١٥٢٤٦ -

جنس نباتات حشوية معمرة من فصيلة المركبات. انواعه ثلثة. اوراقها فنداء الشكل، السفل منها متعاقبة وأعلىها متعاقبة. ازهارها صفر. تحتها كروي الشكل اسف. يزورها فلفطة مجننة ثنائية المحك || اشهر انواعه الشعاع الطبي وشعاع سكرودا.

Rayon Incident (F). **شُعَاع سَائِق** ١٥٢٤٧ -

Incidental ray (E).

شُعَاع سَكْرُودَا ١٥٢٤٨ -

Actinomeris squarrosa, A. alternifolia (S). Actinomère à feuilles alternes (F).

نوع من الشعاع وهو نبات عشبي معمر يصل من ١٢٠ الى ١٨٠ سم. اوراقه متعاقبة، مسطحة، مدبة، لائفة، جلدية الصل، مسنة الحافة. ازهاره رؤسية عديدة، قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. || ازهاره خمرغي.

شُعَاع طَبِي، حَشِيَّة الشَّكْرِي ١٥٢٤٩ -

Actinomeris hallanthoides (S). Actinomère-Soleil, Herbe au diabète (F). Diabète weed (E). Strahlblume (D). Erbe du diabète (I).

نوع من الشعاع وهو نبات عشبي معمر يصل نحو المتر. اوراقه بيضية لينة لائفة، لصلها اذينة الصلحة السفل. ازهاره رؤسية قطرها من ٥ الى ٨ سم. لونها الى الصفار الشهي || ازهاره يسمر من نحو الى المثل. يقال انه يقيد السكري.

شُعَاع مَا وَرَاة التَّنَسُّجِي ١٥٢٥٠ -

Rayon ultra-violet (F). Ultra-violet ray (E).

شُعَاع مَخْرُجِي ١٥٢٥١ -

Rayon cathodique (F). Cathodic ray (E).

Radiateur (F). Radiator (E). **شُعَاع** ١٥٢٥٢ -

جهاز كهربائي يزيد مساحة الاشعاع.

Actinouxisme (F). **شُعَاعَة** ١٥٢٥٣ -

Actinourism (E).

الشعاعية تأثير الاشعاع ان شعاعا او وضعا في نحو النبات.

Diformisme (F). Deformism (E). **شُعْنة** ١٥٢٣٠ -

هو اليب التناسلي او الخلو من التماسق للألياف والانسجام للمقول او الخلق.

Cespiteux (F). Cespitose (E). **شُعْشِي** ١٥٢٣١ -

نمت تروصف به النباتات الكثيرة الاشطاء اعصها النباتات النجيلية.

Dissident (F). Dissident (E). **شُعْشُوس** ١٥٢٣٢ -

الشعشوس من خالف او ناقض الغير.

Squalius (S). **شُعْشُوف** ١٥٢٣٣ -

Chevaline, Chevasse, Chevenne (F). Chub (E).

جنس اسماك نهري من فصيلة الشبوطيات مفتوحات الفمثة. انواعه عديدة منتشرة في معظم بحيرات وانهر البلاد المحتلة الحارة || اسمائها وشعية الشكل. زعانفها الظهرية فردية، متوسطة الحجم تقابل الزعانف الشرجية المنقسمة الى شطرين || افراسها ثمانية الالوان المختلفة تكثر فيها الربعة والزرقة البنفسجية. جواربها ويطونها فضة اللون. زعانفها الى الصفار الاخضر الملوأ الى ال احمره السمراء اعرف انواعه واشهرها الشطوفة الملهولة وشطوفة سوني.

Squalius soulie (S). **شُعْشُوفَة سُولِي** ١٥٢٣٤ -

Chevaline soulie (F). Bull-head (E).

سمكة نهريه يبيض من الشطوف. اعطائها الوراء والاهار الجراف السريعة التيار || جسمها صلب القذ يطل نحو ١٦ سم. ثوبها الى الزرقة البنفسجية. جانباها ويطنها الى اللقي. زعانفها الى الخضار الاصفر الملوأ || لجها كاحن الصنف، قل من يرب فيه.

شُعْشُوفَة مَبْدُودَة ١٥٢٣٥ -

Squalius cephalus (S). Chevaline commun,

Moulier (F). Miller's-thumb, Bull-head (E).

سمكة نهريه يبيض من الشطوف. اعطائها معظم انهر وبحيرات البلاد المحتلة الحارة || جسمها كبير القذ. طوطا نحو ٥٠ سم. ثوبها الى الربعة الزراعية. ظهرها اصفر من بطها. زعانفها الى الخضار الاصفر الملوأ || الاثن تسرا من نيسان الى ايار || لجها متوسط الصنف، مأكول.

Allosome (F). Allosome (E). **شُعْشِيْب** ١٥٢٣٦ -

اسم يطلق حل كل نية فردية كانت ام اكثر مرجوعة في جيلة اللامة انما تختلف شكلها وقدأ من التشب العملية. وقد يترى لها التبايز الشقي.

Sectile (F). **شُعْشِير** ١٥٢٣٧ -

نمت تعريفي يطلق حل ما هو قابل الانقسام.

Bistourneage (F). **شُعْشَف** ١٥٢٣٨ -

Castration by torsion (E).

عمر خصيتي الكرش بين حودين وشدها بقبب حتى تذبل.

Péroné (F). Fibula (E). **شُعْشِيْة** ١٥٢٣٩ -

قصة الساق السفرى.

Racorni (F). Harden (E). **شُعْشِيْف** ١٥٢٤٠ -

الشعشيف من الشجر: ما لم يجد ربه صلب من غير ان تدب نواته.



شطوفة مدودة

الى السرة الخفيفة بالاسفر. تركب الأيل والاديل والبحور والفر.

١٥٣٧٧ - شُعْرَاكَ الْبَشُون

Ornithes metalica (S). *Ornithes du héron* (F).
نوع من الشعراء غليظة الجثة ، قصيرتها ، طولها نحو ٤ م. رأسها مستعرض الشكل ، هوائياتها كبيرة ، عظمها حلي الخاز. ثوبها الى الخلف اسفح الموج ، تركب البشون والقيق .

١٥٣٧٨ - شُعْرَاكَ الْحَتَام

Pseudolynchia maura (S). *Mouche du pigeon* (F).
نوع من الشعراء جثتها مستعرضة مضمورة ، طولها من ٥ الى ٦ م. ثوبها الى السرة الخفيفة ، هوائياتها كالقنق . تركب الحمام عل اختلاف انواعه .

١٥٣٧٩ - شُعْرَاكَ الْخُطَف

Craetichina pallida (S). *Anaspère pile* (F).
نوع من الشعراء. طولها نحو ٦ م. ثوبها حشلي اللون ، اغبر الموج . جناحها مدنية الشكل ، صيرة القد ، يظنها غليظ المزخر فارق الطرف . تركب الخطف .

١٥٣٨٠ - شُعْرَاكَ الْخَيْل

Hippobosca equina (S). *Hippobosque du cheval* (F).
نوع من الشعراء جثتها غليظة الشكل مضمورة ، طولها نحو ٧ الى ٨ م. ثوبها الى الصهية السراء . جناحها مستطيل شفاف . يظنها مستعرض الشكل مدبب الطرف . تركب الخيل والافهار والكلاب .

Stenoperyx
hirundinis (S). *Mouche de l'hirondelle* (F).
نوع من الشعراء طولها نحو ٥ م. ثوبها الى السرة العابقة . جناحها مستطيل ضيق . يظنها فارق الطرف ، تركب السنوق وقد تصيب الانسان فتذله .

Ornithomyia
avicularia (S). *Ornithomyia aviculaire* (F).
نوع من الشعراء غليظة الصدر ، نحيلة البطن ، طولها نحو ٦ م. ثوبها الى الزيدة السراء . تركب الطير حل . اختلاف فصائله وانواعه من الكواسر الى الجوامم والواجن .

Melophagus ovinus (S). *شُعْرَاكَ الْغَنَم* *
Mélophe du mouton (F).
نوع من الشعراء العادة الاجنسة . طولها نحو ٥ م. ثوبها الى السرة الخفيفة الثراء الموج . رأسها صدير القد ، مقلع الشكل ، غائر في الصدر ، عظمها دقيق مستطيل ، يظنها وسيد التربة المستعدة عدم التحيزر . قوائمها زبله الجسم ، حادة الخالب . تركب الغنم فتؤذيها .

Hippobosca
capensis (S). *Hippobosque des chens* (F).
نوع من الشعراء طولها نحو ٨ م. ثوبها الى الطحلة الثراء . يسلوها موج اسفح . جثتها مستطيلة ، جناحها متوسطا الطول ، هوائياتها بلون المناب ، تركب الكلاب والذئاب والثالب .

١٥٣٨١ - شُعْرَاكَ

مشب اغفر يقرب الى الذبابة (ابو حنبله) .

١٥٣٨٢ - شُعْرَاكَ

هي اللير ، اطليه .

Radié (F). *Radiant, Radiate* (E). *شُعَاعِيَّة* *
نمت تعريفي توصف به الاثمار والحلوانات الدنيا الشاعية الشكل .

Radiaire (F). *Radiate* (E). *شُعَاعِيَّة* *
ما كان تنظيمه او ترتيبه او تجهيزه شعاعي الشكل .

Radiolaires (F). *شُعَاعِيَّات* *
Radiolarian (E).
رئة كائنات حيوانية دنيا من الحفريات .

Radiées (F). *شُعَاعِيَّة* *
Radiant, Radiate (E).
سط من فصيلة المركبات منه الاسطر والاصونان البهار وحشيفة السمال .

Section *شُعْبَة* *
الثبة في تصنيف الاحياء تأتي بعد الطائفة وقبل الطبقة .

شُعْبَر *
هو ابن اوى الهندى ، اطليه .

Plasmode (F). *Plasmodium* (E). *شُعْبَة* *
ركبة في السج النباتية الحية يسببها تجميع بعض الغلور الدنيا .

Palage (F). *Coat* (E). *شُعْر* *
هو القرب الذي يغطي جلده الحيوان الثديي وقد يكون من الشعر او الصوف او الور .

Poll (F). *Hair* (E). *شُعْر* *
هو ما ينبت من مسام البدن . الواسعة شجرة وهي مركبة من جزين : ا. جلد المظنن في الجلد وهو الذي ينبت بالصلة تظنها غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، ويسم الشرة الحارضي الحيطي الشكل المختلف الطول والحنية واللون .

شُعْر الْأَوْه *
هو كزرة البئر ، اطليه .

شُعْر الْأَرْكَب *
هو ذيل الارنب ، اطليه .

شُعْر الْبَيْت *
هو الصفصاف الرومي ، اطليه .

شُعْر الْجَيْن *
هو كزرة البئر ، اطليه .

شُعْر الْغُول *
هو كزرة البئر ، اطليه .

شُعْر الْهَتَار *
هو التام الساني ، اطليه .

Hippobosque (F). *Hippobosca* (E). *شُعْرَاكَ* *
جنس ذباب لاسع من فصيلة الشعراويات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد . قوتها الدم متحصه من الثدييات والطيور . بعد ان تلهب الجلد يلدغها المولم .

Hippobosca camelina (S). *شُعْرَاكَ الْإِبِل* *
Hippobosque du chameau (F).
نوع من الشعراء السراء اللون طولها نحو ٦ م. تركب الايل فتؤذيها وقد تسبب لها الجرب .

Lipoptena cervi (S). *شُعْرَاكَ الْأَيْل* *
Lipoptène du cerf (F).
نوع من الشعراء غليظة الجثة طولها من ٤ الى ٦ م. ثوبها



شعراء الايل



شعراء الحمام



شعراء الخيل



شعراء الغنم



شعراء الغنم



شعراء الكلاب

١٥٣٨٢ - شَعْرَائِيَّات

هي البرديات لفصيلة شحرات من ذوات الجناحين، اطبا.

١٥٣٨٣ - شَعْرَائِيَّات

Hippoboscidae (S). Hippoboscidae (S).
فصيلة حشرات ذبابية من رتبة ذوات الجناحين، اجنحتها وانواعها زهاء ١٠٠ اجسامها صلبة. اجنتها، عند وجودها، مستطيلة، وروصها صغيرة مفلسة، اعطائها لاقية ماصة. قرونها الاستعمارية اسادية الفاسلة، دقيقة، غائرة. صدورها غليظة. بطونها مبطنة، مغالها سادة. مكها ينقف في جيب الزكة تحته الاثني ارب بالاسرى تنصه برقات كاملة تخرج بعد وضعها بساعة ثم تتحول الى حمارى بعد بضعة ساعات || تعيش طليقة ما لا تحصى من دم الطير والثدييات.

١٥٣٨٤ - شَعْرُور

هو القريون المغزني، اطبا.

١٥٣٨٥ - شَعْرُورَة

ثمرة القشاة الصغيرة القد.

١٥٣٨٦ - شَعْرِي شَامِيَّة، شَعْرِي شَمِيضَة

ثلاثة اسماء لنم نير من كركية الكلب الاصفر يمد من الارض نحو حشر سوات شوية. وهو من منازل القمر. راجع شميداء.

١٥٣٨٧ - شَعْرِي يَمَانِيَّة، شَعْرِي عَيُور، اُتْرُق

Canicula, Sirius (F). Canicula, Sirius (E).
الشعرى البانية والشعرى البجور والأبرق ثلاثة اسماء لنم واحد من كركية الكلب الاكبر يعتبر للم نجم في الفضاء من اساطير الاقدمين ان سهيل اقل من ناحية اليمين واقلبت الشعران، البانية والشامية، من ناحية الشام حتى انتهى السير الى اخرها. فوقف كل من الفريقين على شاطئ المجرة وضبطها سهيل فاجابته على الزواج وجررت اليه البانية منها قليل لما الشعرى البجور. ولم تستطع الشامية ان تمبر فوقفت تبكي وتقول السموع الحارة من حينها العاصفين قليل لما الشعرى الشامية.

١٥٣٨٨ - شَعْرِي

Capillaire (F). Capillary (E).
نمت وصني وتسمى يلقن على ما له علاقة بالشعر ويقل ما يشبه الشعر كالانابيب الشعرية والشرين الشعرية الخ.

١٥٣٨٩ - شَعْشَعَة *

Caryota urens (S). Caryota brilane (F).
نوع من نخل الكريته مهدد الهلاك والكنوشئين وجزر الزايج. ساقه منتصبه اسطوانية تملو نحو ٢٠ م. قطرها يراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم. سفها ثنائي التركيب، مؤسسي الشكل، غليظ الكرب، يطول نحو ٥ امتار ويبرس من ٢ الى ٤ || ثماره مأكولة لكنها حريفة الثفور يستخرج منها دهن الكريته || وقد يزرع للزئين وهو من النباتات البليقة النمو الجميلة اخضار اللسني.

١٥٣٩٠ - شَعْشُور

Cocotier commun (F).
هو الجوز الهندي. اطبا نارجيل معروف.

١٥٣٩١ - شَعْف

Ecorce de prosopie (F).
هو قشر الناف.

١٥٣٩٢ - شَعْكَة

Culmen (F). Culmen (E).
الشفة من كل شيء اعلاه ومن الكمامة رأسها ومن الجبل رأسه. ج. شعث وشعوف وشعفات وشفات.

١٥٣٩٣ - شَعْكَة، نَعْكَة، قَطْرَة

Goutte (F). شَعْكَة، نَعْكَة، قَطْرَة.
قطرة الواحدة من المطر او من اي سائل كان. ج. شعث.

١٥٣٩٤ - شَعْكَل

يبيض في ناحية القرس او ذنبه وقد يكون في التذلل.

١٥٣٩٥ - شَعْن

Fane (F). Haulm, Dead leaf (E).
ما تثار من ورق الشب ويختلف النبات بعد ذبوله.

١٥٣٩٦ - شَعْبَر

هو ابن آوى الصحراء، اطبا.

١٥٣٩٧ - شَعُور مَصَكَة

Pois absorbants (F).
شعور دقيقة في اطراف الجذرات تحبس بالتحال الباعلي المواد المعدنية الذائبة في ماء التربة فتضللها وتصيرها لتتسج الباهل اي التسخ الساعد.

١٥٣٩٨ - شَعْبَجَات

Bronchies (F). Bronchia (E).
اعضاء التنفس في الحشرات تقوم مقام الرئة في الحيوان.

١٥٣٩٩ - شَعِير، شَعِيرُور، شَعِيرُور

Hordeum (S). Orge (F). Barley (E). Gersta (D). Orzo (I).
جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة النجيليات. ينبت من اقدم النباتات الزراعية وراسها انتشاراً نظراً لقوته على احتمال المناخات المتطرفة فهو يزرع وينتج في البائرة القطبية الشمالية كما يزرع وينتج في بطن الصحراء || انواعه ١٢ منتشرة في جميع اصقاع العالم. منها نوع زراعي هو الشعير المعروف بأخر كركي يبيض الشعر الاخر وطرفة انواع برية اعرفها ما ينتج.

شعير القمح

H. murinum (S).

شعير المروج

H. secalinum (S).

١٥٤٠٠ - شَعِير اِنْبِلِس

Eglopie (F).
هو العوسج، نبات عشبي بري من النجيليات.

١٥٤٠١ - شَعِير اَعْقَر

Hordeum jubatum (S).
نوع من الشعير البري الحولي يزرع لآزين وهو كثير الاضطراب يملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. ساقه مستقيمة متدلية تطول نحو ١١ سم. شعاعها كثيف التجميع، تحيل لثده، وودي للذن || اسبالة يذوم من حزيران الى تموز وأب.

١٥٤٠٢ - شَعِير الكَثْبَان، اَلْيَمُوس الرَمَال

Elymus armerius (S). Elyme des sables (F). Lyme grass, Mue-grass (E). Sandhaargras, Strandhafer (D). Elymo delle sabbie (I).
نوع من الالبيوس وهو نبات عشبي جليدي معمر من فصيلة النجيليات يعيش في الرمال القاحلة ويستعمل لاستقرارها وتثبيتها.

١٥٤٠٣ - شَعِير شَعْرُوف *

Hordeum vulgare (S).
نوع من الشعير البري الحولي يزرع لآزين وهو كثير الاضطراب يملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. ساقه مستقيمة متدلية تطول نحو ١١ سم. شعاعها كثيف التجميع، تحيل لثده، وودي للذن || اسبالة يذوم من حزيران الى تموز وأب.

١٥٤٠٤ - شَعِير شَعْرُوف *

Hordeum vulgare (S).
نوع من الشعير البري الحولي يزرع لآزين وهو كثير الاضطراب يملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. ساقه مستقيمة متدلية تطول نحو ١١ سم. شعاعها كثيف التجميع، تحيل لثده، وودي للذن || اسبالة يذوم من حزيران الى تموز وأب.

١٥٤٠٥ - شَعِير شَعْرُوف *

Hordeum vulgare (S).
نوع من الشعير البري الحولي يزرع لآزين وهو كثير الاضطراب يملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. ساقه مستقيمة متدلية تطول نحو ١١ سم. شعاعها كثيف التجميع، تحيل لثده، وودي للذن || اسبالة يذوم من حزيران الى تموز وأب.

١٥٤٠٦ - شَعِير شَعْرُوف *

Hordeum vulgare (S).
نوع من الشعير البري الحولي يزرع لآزين وهو كثير الاضطراب يملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. ساقه مستقيمة متدلية تطول نحو ١١ سم. شعاعها كثيف التجميع، تحيل لثده، وودي للذن || اسبالة يذوم من حزيران الى تموز وأب.

١٥٤٠٧ - شَعِير شَعْرُوف *

Hordeum vulgare (S).
نوع من الشعير البري الحولي يزرع لآزين وهو كثير الاضطراب يملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. ساقه مستقيمة متدلية تطول نحو ١١ سم. شعاعها كثيف التجميع، تحيل لثده، وودي للذن || اسبالة يذوم من حزيران الى تموز وأب.



شعاع



شعير الكثبان



شعير مشروف

1٥٤٠٦ - شَعَكَار *Désahérénce (F), Escheat (E)*.
هي صفة الموراث التي لا يرث فيها أحد خصوصاً ألى بيت المال أو الحكومة .

1٥٤٠٧ - شَعَكَارَة *Silex (F), Silex, Flint (E)*.
حجر منظر قسمة يولد شرارة .

1٥٤٠٨ - شَعَرُور *Cyrtandrus (S), Cyrtandre (F)*.
جنس نباتات شبيهة وجنبية من فصيلة الشفرويات .
أنواعه المروفة نحو ٦٥ معظمها بري وبعضها زراعي .
يزرع في مهدها المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية .

1٥٤٠٩ - شَعَرُورِيَّات *Cyrtandraceae (S), Cyrtandraces (F), Cyrtandraces (E)*.
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدة النعالة .
أجناسها وأنواعها كثيرة البلد تجمعها خمسة أرباب .
جميعها من نباتات المناطق الحارة والاسيوية || أروانها كاملة منتعكة لا تقبلية الترتيب ، ثمارها سقية الشكل .

1٥٤١٠ - شَعَف ، شَعَفَات ، شَعَفُور ، شَعَفُوث *Perleard (F), Perleardium (E)*.
غلاف القلب .

1٥٤١١ - شَعَنْب ، شَعَنْبُوب *Pousse anticipée (F)*.
هو الفصن الرطب النضر الحلو العمر . ج شنانيب وشنانيب .

1٥٤١٢ - شَعَوَكَ *Aigle (F), Eagle (E)*.
هي العقاب سميت بذلك لفصل سقارها الاقل حل الاسفل .

1٥٤١٣ - شَعِيْرَة *Aiguille à enfiler (F)*.
مير جهانس مستطيل ، مبطل النصل الحاد ، مدبب الطرف ، يستعمل في شك أوراق التبع .

1٥٤١٤ - شَعَكَارَة الْمُتَوَسَّطَة *Chellinus mediterraneus (S), Chelline de la Méditerranée (F), Chellinus mediterraneus (E)*.
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الكيديات شاذكات الزمانف .

اصطانتها منظر اقاليم البحر الابيض المتوسط || سرسها المباح وسماط النعاف .
قوتها النباتات البحرية والبدانف والمعادن الصغوية || جسمها اعطليجي الشكل ، معتدل التبيطط ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم .
سرافها كبيرة .
نومها الى الترتبة السراء يملوها ملاح آخر يقب الى الرأس والظهر ويبرز ويبيض في البطن .
زماضها الى الربرة البحرية يملوها تلجيج ممترض آخر في الظهرية والشرجية والذيلية ||
رأسها مخروطي الشكل ، غليظ الشفة العليا المنتمطة .
فتحتها معتدل الانفرج .
استانها قاطعة مثلمة الجلد .
عينها صغيرتان ، مستديرتان ، ماسحتان .
زماضها الظهرية والحوضية والشرجية تحوي بعض المناسخ الحادة .
زماضها الذيلية محدبة الطرف || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

1٥٤١٥ - شَعَكَارِي *Dipus gerboa (S), Gerboise (F)*.
نوع من الزبابيع الافريقية .
يقال لها شأن البراييم وزقلاو كقبيط وهي اسمها وانفصلها .
يكون في اذنانها طول وصليا بعض الملب .
اجسامها ربة المنة تطول نحو ٢٠ سم .
اما اذنانها فتطول نحو ٢٢ سم .
انوارها الى السمكة الربداء يملوها ملاح اسمر .

القربوب والاصرام ، شائع الزراعة ، معتدل الانتاج حبه يحوى ١٠ ٪ من النشا يستعمل في غذاء الانسان والحيوان وفي صناعة الجملة (كبيراً) وبزوها من الصناعات الكسورية .
ينبت في جميع اقاليم الحنطة ويفرقها قدرة حل مقاومة الحر والقر .
يرغب في الاربة التي لا تقتصر الى الكلس ودو في الاربة المتوسطة الاندماج ، السمينة النور ، اوفر انتاجاً واحسن صفاتاً .
وفي حالة امتثال القوة الزراعية يحصد حطب الحنطة والبطاطا والشندر والقمطن ويغطف التقايات ، ومن خصائصه انه لا يكثر من تعليل النعلاء الا في فترتين من دورته الحياتية .
لفترة الاول تستمر من الاطهاد الى الاسيال والفترة الثانية من الانزهار الى النضج || ساقه جوفاء مستطيلة السلايات .
اوراقه صغيرة الشكل ، اذنوية الهند .
مستطيلة النصل .
سنبلة متوسطة اللذ ، ثلاثية الصف والسيليات .
زهرة ثلاثية الالامية و رباعية الصفات المقسوة الى جدلتين وجرشكين ||
غروبها كثيرة البلد تقسم الى ثلاثة اقسام :
- قسم الشير السلاي الحب وهو الذي تنضج جميع ازارها فيكون صف سنبلاته من ثلاث حبات يقابله صف مائل من ثلاث حبات .
- قسم الشير الرباعي الحب وهو الذي تقم فيه الزمرة الوسطى فيكون صف سنبلاته من حبتين يقابله صف مائل من حبتين .
- قسم الشير الثنائي الحب وهو الذي تنضج وتخصب فيه الزمرة الوسطى دون غيرها فيكون صف سنبلاته من حبة واحدة يقابله صف مائل وحيد الحبة .
اشهر غروبها وصماها زراعة ما يتبع .

الشير الاجرد ، شير سماوي *Hordeum coeleste (S), Orge céleste, O. nue (F)*.
مداسي الصف ، اجرد الحبة يرغب في الاربة التنية والاقاليم الرية .

الشير الاسود *Hordeum nigrum (S), Orge noire (F)*.
رباعي الصف .
كبير الحبة ، اسود الحسكة ، يحصد في جميع الاربة المعتدلة الحصب .
وهو من الانواع المرافة الانتاج .

الشير المصص ، شَمِيرَاز *Hordeum hexastichum (S), Orge hexagonale, O. à six rangs (F)*.
مداسي الصف ، حديد الاصرام جميعها وافر الانتاج .
يرغب في الاربة الحسبة التي لا تقتصا الرطوبة اللينة .

الشير المروحي *Hordeum zeocritum (S), Orge en éventail (F)*.
رباعي الصف ، كبير الحبة ، منظر الانتاج في الاراضي المروية جيد في الزراعات البلية .
لكنه يرغب في الاربة الحسبة السمينة النور .

الشير التثوي *Hordeum tetrastichum (S), Orge à quatre rangs (F)*.
رباعي الصف ، متوسط الحبة ، معتدل الانتاج يحصد في جميع الاربة البلية وسماها الخفيفة والقليلة النور .

1٥٤١٥ - شَمِيرَازْ ، اَمِيلَاز *Amylase*
خبرة سمحلة تربد في الرضاب وفي النبات ولذا تصح خيرة الشير التانس .
تذوب في الماء دون الكحول وتستعمل في تحويل النشا الى ملزوز .

1٥٤١٥ - شَعَكَه *Asymétric (F), Asymmetry (E)*.
هو عدم التانسق أو التامدل .



شَعَارَة الْمُتَوَسَّطَة



شَقَارِي

١٥٤٢٧ - شَقِيرِيد فَطِيي

Shepherdia argentea (S). Shépèrdie argéntée (F). Silver shepherdia (E).

نوع من الشفيرة ، شجيراته تملو نحو ٥ أمتار. اغصانها شائكة . اوراقها ضيقة ، سائبة ، مستطيلة ، نصلها حورني البشرة النضية على صفحتيه . ثمارها حامضة مأكولة . تزود القرزين .

١٥٤٢٨ - شَقِيرِيد كَنَدَا

Shepherdia canadensis (S). Shépèrdie du Canada (F).

نوع من الشفيرة ، جنبه تملو من متر إلى ثلاثة أمتار. اغصانها سرسة . اوراقها بيضية الشكل . نصلها اخضر الصفصعة العليا ابيض السفل بشرتها حريفة خلية . ثمارها نقية . تزود القرزين .

Umbra

١٥٤٢٩ - شَكَشَش

جنس اسماك نهرية ترمو بالفلاء ، اطليا .

١٥٤٣٠ - شَكَشَف

Umbra (S). Ombrine (F). جنس اسماك بحرية من فصيلة البهاريات . انواعه المعروفة قليلة ، اقلها يمتد من المحيط الهندي الى البحر الاحمر فالتوسط فالبحر الاطلسي الجنوبي || أشهر أنواعه واعما الشفشف البلبل .

١٥٤٣١ - شَكَشَف صَبْدُلِي ، كَرْبَل

Umbra cirrheosa (S). Ombrine commune (F).

نوع من الشفشف وهو سمكة مأكولة كبيرة اللقد ، اطليجية الشكل ، ودية لذلك الاسفل . مستطيلة الزمعة الطهرية . ظهرها اصفر اللون ، ازرق التشعب . يميل الى الرودة النضية . ترمها على حدود المياه الاقلية . يمتد من المحيط والشرطاني في فصلي الشتاء والربيع .

١٥٤٣٢ - شَكَشَفْ هُو الضمير ، اطله .

Palr (F). Even (E).

١٥٤٣٣ - شَع

الزوج من اللد . ضله وثر .

١٥٤٣٤ - شَعْمَكَة

Prémption (F). Preemption (E). حق ينزله التأتين في شراء مال معين . راجع حق التلمعة .

١٥٤٣٥ - شَعْمِيَة التَرْكِيْب

Paripinnate (F). Paripinnate (E).

نمت وصفي يطلق على الاوراق المركبة المنتبة بورقطين متقابلين .

١٥٤٣٦ - شَكَنِي

Crépuscule (F). Twilligh (E). هو الضوء الذي يشاهد بعد الغروب نتيجة لانكاس ضوء الشمس على تحت الاقح على السحب أو ذرات التراب المنتشرة في الجو . وقد تختلف شدة الشفق مع المكان فينبأ هي قصيرة جداً عند خط الاسواء اذ هنا تمتد بضع ساعات عند القطبين .

١٥٤٣٧ - شَكَنِي ، شَكِي

Crépusculaire (F). Crépuscular (E).

نعت يطلق على ما هو متعلق بالشفق كتركيب الضوء الشفقي وشفرة شفافية المرتع أي انها ترتع في ذن الشفق .

١٥٤٣٨ - شَكَل ، شَكَلَة

هي القانصة ، اطليا .

١٥٤١٦ - شَقَاف

Hyalin (F). Hyaline (E).

ما كانت غلارمه كالزجاج .

١٥٤١٧ - شَقَان

Coquette (F).

سمكة بحرية تسمى كيمدة ملونة ، اطليا .

١٥٤١٨ - شَقَان

Vent froid (F). Cold wind (E).

الريح الباردة معها كان مهبا .

١٥٤١٩ - شَكَة ، شَكَة

Labium, Labre, Lèvre

الشفة من الحيوان والخرقة : طبق له . وهما شفتان عليا

وسفل تستران الفم وما فيه .

١٥٤٢٠ - شَكَنَة

Syngénésie (F). Syngenesia (E).

هي لتتصام الاضدية بواسطة المآبر .

Raiecto

١٥٤٢١ - شَكَدَع

هو للشرغوف .

١٥٤٢٢ - شَكُر

Lèvre de la vulve (F).

سرف الفرج من ناحيته الخارجية وهما شفران .

Lip of vulva (E).

Stachelin (S). Stachéline (F).

جنس شجيرات وجبات معمرة من فصيلة المركبات . انواعه المعروفة قليلة اللد منهاها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سقها متصببة ترتفع من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها عابلة و متعاقبة و معققة ، سائبة اتصال الخلية البشرة ، النضية الصفصحات السفلى . ازهارها حنكولي التجميع . ازهارها صغيرة اللقد و متباينة الالوان منها البنفسجي الوردى المزاج ومنها الازرقاني || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

١٥٤٢٤ - شَقْرُوسِ اصْفَر

Ursinis lutea (S).

Sphénoogyne jaune (F).

عشبة تزدينية حولية ، من فصيلة المركبات . مهدا افريقية الجنوبية || ساقها فراء تملو نحو ٦٠ سم . اوراقها متعاقبة مفرقة وسنة . وديساتها الزهرية الى الصفار الكبري الزاهي . طباها ارجواني || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٥٤٢٥ - شَقْرُوسِ اَبْيَق

Ursinis pulchra (S).

Sphénoogyne élégante (F).

عشبة تزدينية حولية من فصيلة المركبات . ساقها فراء تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقها متعاقبة مفرقة شعبة باوراق الجابونج . ازهارها طري . ازهارها رؤسية . رؤساتها برتقالية القسبات ، صفراء الطبا ، مطوقة بالاسود || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٥٤٢٦ - شَقِيرِيد

Shepherdia (S).

Shépèrdie (F).

جنس شجيرات حرجية وزدينية من فصيلة الخلاقيات . انواعه المعروفة اربعة ، تملو من متر الى ستة أمتار . اوراقها كاملة ، مستطيلة ، عابلة . ازهارها سنبلي او عنقودي التجميع . ازهارها ثنائية المسكن ، صفراء اللون . ثمارها كروية الشكل ، برتقالية اللون ، طرها من ٤ الى ٨ سم . || أشهر أنواعها ما يلي .



شفشف بلبل

Aclaste (F). Aclast (E). ١٥٤٤٦ - **شَقْرُف** *
نمت ثمرتي يطلق على الاجسام التي تحترقها او تنفذ منها اشعة النور دون ان تنكسر .
Labiab ١٥٤٤٧ - **شَقْرِيَّ**
ما كان له صلة بالشفة .

Labiatae (S). ١٥٤٤٨ - **شَقْرِيَّات**
Labiées (F). Labiatae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . انواعها المعروفة زهاء ٢٦٠٠ تنتمي الى ١٤٠ جنساً تجسدها ستة اسباط . منظرها نباتات عشبية وبعضها جنبات مفصلة السوق . اوراقها زياه ، كاملة ، متقابلة ، جميعها عطري ومنظرها طلي .

Chilognathes (F). ١٥٤٤٩ - **شَقْرِيَّةُ الْأَحْشَكَة**
رتبة دويبات من كثريرات الارجل تشمل خمس فصائل . جميعها اسطوانية الشكل ، مستطيلة . منظرها من النويبات القليلة الغمر العادة السم .

Chilopoda (S). ١٥٤٥٠ - **شَقْرِيَّةُ الْأَرْجُل**
Chilopodes (F). Hundred-legged worms, Centipedes (E). Hunderfüßler (D).
رتبة دويبات من كثريرات الارجل تشمل اربع فصائل ، جميع دويباتها من الحشرات السامة المؤذية وقد يبلغ طول بعض انجاسها نحو ٣٠ سم .

Stérigmate (F). Sterigmaté (E). ١٥٤٥١ - **شَقْرِيْرَكَة**
زائدة قرنية التركيب تغلف الشوار لحايتيه في بعض الحشرات .

١٥٤٥٢ - **شَقْرِيَّةُ صَهْبَاء** * ، **عَكَّة** * ، **فَلَايَا**
Omphalia flavida,
Stilbella flavida (S). Mancha, Viruela (F).
نظر من الفاريفرديات يتطفل في طوره الكندي على اوراق وثمار ونواحي ابن فيليزيا || مظهره على الاوراق يقع قيسية لا قيسية الشكل والحجم تسبب جفاف النصل وذبوله الباكر . وهو على الجار يقع مستديرة منخفضة مدنية الاطراف الاجر . ويكون على النواحي اروح مستطيلة تسبب جفاف النماء وانفلاته ويدهام || يكالغ بانتفاضة وجمع وعرق الاضداد المصابة وينضج الاشجار بعد اصحابها بالوسائل النحاسية .

١٥٤٥٣ - **شَقْرِيْف**
مطر يتخلله خشف او ينسر مع الخشف .

Labelle (F). ١٥٤٥٤ - **شَقْرِيَّة** * ، **شَقْرِيَّة**
Labellum (E).
هي البتلة العليا من توزيع السحليات وابوابها . وهي ايضا الطرف للغلوب في الاصداف .

Chavica (S). Chavique (F). ١٥٤٥٥ - **شَقْلِيْك** *
جنس نباتات طيبة من فصيلة الفلقلات . انواعها مدنية جميعها عارشة معمرة . اوراقها متعاقبة ، حاضنة ، سنائية الشكل متصبية النصل . انزعارها قدي التجميع ، ليد التركيب . ابني الاركاناز . ثمارها حنية ، بيضيه الشكل عطرية المرق || يتكاثر بالتفصيل يرغب في الارربة القليلة الانساج الربطة .

Section anguleuse (F). ١٥٤٢٩ - **شَقْلَج**
Angulous section (E).
نمت ثمرتي توصف به مقاطع سوق النباتات المضلعة . وقد شاع استاده الى السوق الرباعية الاحرف .
١٥٤٤٠ - **شَقْلَج** هو الكرنفة ، اعطابها .

Pousse nouvelle (F). ١٥٤٤١ - **شَقْلَجَة**
New growth (E).
هي الفصن الجديد الربط قبل بلوغه الحول . ج شفن .

Nicobar ١٥٤٤٢ - **شَقْلَجِيْن** *
طائر وسيد اجنسى والنوع من فصيلة الحماميات . جمه شقائين . وهو مربوط الجثة : قوي المنقار ، معتدل الساق . مستطيل الجناح . قصير الذنب المستدير ، رجل الريش الكثيف || طوله نحو ٣٨ سم . ثوبه الى الخضار الزاهي والباقي يطوق مواج اسف . عنقه ملتصق ببعض الريش الطويل الذهبي اللون . انفيكه ابيض . سقاره اسود . ميناء وقائعه بلون القيقق || يعيش على الارض كالخيل يرغم استطاعة جنانه . طيرانه بعلي وتقل . يسبح في الماء . قوته الجيوب . يدق عشه في الفصوص بين الاشجار او في الادغال الكثيفة . انشاء تصنع بيضتين تحضنها بجانوبة الذكر نحو ١٧ يربا .

Raja (S). ١٥٤٤٣ - **شَقْلَجِيْن بَحْرِي** *
Rale (F). Ray, Skate (E).

جنس اسماك بحرية غسورية من مرتبة السفنجيات وفصيلة الشفنجيات البحرية || انواعها المعروفة ٤٠ جميعها كبيرة الله مغلفة للقدم المربع الزوايا الذي يشمل الرأس والصدر . اطرافها تراوح من ٦٥ الى ٢٢٠ سم . انبوابها تختلف باختلاف الانواع . مرتما المعادي في قام الماء لتلصق الرجل بانتشار ما تفرقه من القشريات والاسماك . وهي على سطح الماء سرية الحركة تنتقل بصفة الطير . لحومها مأكولة لكنها لا تخلو من طعم خاص يشبه الامنيلاك || اعراف انواعها واشهرها ما يتبع .

Raja clavata (S). شقنين أبو مهباز

Rale bouclée (F). Thornback (E).

R. alba (S). Rale blanche (F). شقنين أبيض

R. oxyrinchus (S). شقنين السمق

Rale à bec pointu, Alène (F).

R. torpeda (S). شقنين رصّاد

Rale torpille (F). Torpedo ray (E).

R. marginata (S). شقنين ساطع

Rale mirayes, Fumat (F).

R. chagrines (S). شقنين حمير ، فرش

Rale chagrinée, Flossade (F).

R. circularis (S). Rale ronde (F). شقنين مستدير

R. batis (S). Rale شامق ، كركك (F). شقنين معروف ، شقنين شامق ، كركك

commune, R. candrée, Collart (F). Common ray (E).

radista (S). Rale radée (F). شقنين نقر ، رهرمة

Rajidae (F). ١٥٤٤٤ - **شَقْلَجِيَّات بَحْرِيَّة**

Rajidae (E).

فصيلة اسماك من مرتبة السفنجيات ورتبة الاشلاق . تشمل الشفنجين البحري والمودنه وتيرها .

Güpe orientale (F). ١٥٤٤٥ - **شَقْلُور**

الشفور الزبور الشرقي . ج شقائين .



شقنين



شقنين بحري



شقية صهباء



شقلج

flower (E). Gartenanemone, Krönenwindröschchen (D). *Anemone coronaria*, *Anemone scapulo* (I).
نوع من الشقار عديد الشروب والاسرام . يملو من ٢٥ الى ٤٥ سم . ابروته مبدلة اللين . ساقه فناء . لوراته قلبية التفريص . ازهاره كبيرة القند ، مسطرة البتلات . نبتها الابيض والاخر والاروق والبفسجي والوردي والبنفسج . ازهاره يندوم طولا الربيع .



شَقَاة

١٥٤٦٦ - شَقَار الجَدَاوِل *Anemone rivularis* (S). *Anémone des ruisseaux* (F).
نوع من الشقار يملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . جذعه جني الشكل . اوراقه لائقة . ازهاره خاسية البتلات الزرقاء اللون ، الصفراء الاسدية ، متباعدة عن الجدار . ازهاره يندوم طولا شهر نيسان .



شَقَار اكْبِل

١٥٤٦٧ - شَقَار العَاب *Anemone nemorosa* (S). *Anémone des bois, Fleur du Vendredi-Saint, Sylvie* (F).
نوع من الشقار يملو نحو ٢٥ سم . ساقه مدادة . اوراقه معتقة . ازهاره سداسية البتلات ، يضاء اللون أو حمراء وبه شروب زرقاء اللون زاهية || ازهاره يستمر من آذار الى نيسان .



شَقَار التَاب

١٥٤٦٨ - شَقَار المَصْح *Anemone japonica* (S).
هو شقيق التين المبلول ، اطله .

١٥٤٦٩ - شَقَار اليابَان *Anemone japonica* (S). *Anémone du Japon* (F).
نوع من الشقار المكسب يملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . لوراته مركبة ، شقيقة القصوص المسننة الحافة . ازهاره مكسبة ، كبيرة القند ، كبيرة البتلات التي يراوح حدها من ١٨ الى ٢٤ سم . لونها الالباسي الثلجي أو الباس الوردي للوراج || ازهاره يستمر من آب الى تشرين .



شَقَار اليابَان

١٥٤٧٠ - شَقَار بَرِّي *Anemone sylvestris* (S). *Anémone sauvage, A. sylvestre* (F). *Snowdrop anemone* (E). *Groses windröschchen* (D). *Anemone salvatica* (I).
نوع من الشقار يربط في الآرية الكلسية وهو من نباتاتها الطوعية . يملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . ساقه فردية منتصبة وسيدة الزهرة . اوراقه معتقة . ازهاره كبيرة القند ، يضاء اللون أو وردية ، خلية البشرة ، زياه الكراجل التي تبو كندف القطن || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

١٥٤٧١ - شَقَار كَرْمِي لَوْرِي *Anemone vitifolia* (S). *Anémone à feuilles de vigne* (F).
نوع من الشقار يملو من ٦٠ الى ٨٠ سم . ساقه فناء . اوراقه قلبية الشكل ، خاسية التفريص ، نصلها مشاوي الحافة ، خلي الصنفعة السفلى . ازهاره كبيرة القند ، ثنائية البتلات البيض شكل ولونا || ازهاره يندوم طولا شهر ايلول .



شَقَار بَرِّي

١٥٤٧٢ - شَقَار كَوَكْبِي *Anemone hortensis* (S). *Anémone des jardins, A. étoilée, A. oeil de paon* (F). *Garden anemone, Star anemone* (E). *Sternwindröschchen* (D). *Anemone stellato* (I).
نوع من الشقار عديد الشروب والاسرام . يملو من ٢٠ الى ٣٥ سم . اوراقه ثلاثية أو خاسية التفريص ، مسنة الحافة . ازهاره نجمية الشكل ، شقيقة البتلات لغائرة المختلفة الالوان الاسود الاسدية || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

Cheviot
سلالة شأن مهددا البلاد البريطانية تتميز بئرارة صولها وبيودة صنفه .

١٥٤٧٧ - شَقِيَّ *Sexe* (F). *Sex* (E).
هو جلة الصفات الخلقية التي تكون الذكر أو الانثى . وهو ايضا مجموعة الأفراد من ذوات الاصنام التناسلية المائلة .

١٥٤٥٨ - شَقَاة هو الكبر ، اطله .

١٥٤٥٩ - شَقَاة ٥٠ حَضَاب *Pigment*
كل مادة صناعية عضوية تلون النتج . ج شقاقات وغطابات وشرايط وغواصب .

١٥٤٦٠ - شَقَاة ٥٠ *Pteropus* (S). *Roussette* (F).
جنس حيوان من فصيلة الطوطيات . ازهاره نحو ٦٠ جيبها ثائرة ، يهراء ، كبيرة القند ، مسطيلة القرطوسة اللقطة المدية . ازهارها تختلف مع الانواع لكنها موية الاالوان وظهورها امين من اكتافها وامثالها || قليبها الهند واfricanية الشرقية ويجزو المحيط الهادي حتى استراليا . اشهر انواعها ما يتبع .

١٥٤٦١ - شَقَاة الهند ٥٠ *Pteropus medius* (S). *Roussette de l'Inde* (F).
نوع من الشقاقات ، طولا نحو ٢٣ سم . رأسها الى الجزء . جسمها حنلي اسمر يملو موانج بجوي يخفف البسرة أو زيكها || موطنها فسيح الأرجاء يمتد من الهند الى شط العرب ومن الهند الى سرنييب وبلقعة وانام . تعيش جماعات كبيرة يراوح حدها من ٥٠٠ الى ٢٠٠٠ . تألف اسراج الحور وغابات الخيزران تتلصق بقضبانها وافتادها طولا النهار . تسرح في طلب قوتها من الثروب الى الثروب . قوتها اثار حل اختلاف اجناسها والوامعا ما عدا البرتقال .

١٥٤٦٢ - شَقَاة مأكولة ٥٠ *Pteropus edulis* (S). *Roussette comestible* (F).
شقاة كبيرة القند طولا نحو ٤٥ سم . وبسطنها نحو ١٦٠ جيلها ششن اللمس . قرطوسها اسفي الشكل . اذنها مسطيلة ذاتة . لونها الى الخنطلي الاسمر عابق الظاهر والراس ، زاهر البق والصد والبن || موطنها الهند وصومال وجارا وبلقعة . تعيش جماعات متفرقة يراوح حدها من ٥٠ الى ٢٠٠ . تألف الاسراج الطويلة . مسرعا من اللسق الى الفجر . قوتها اثار وبض الحبوب . لا تقرب البرتقال . لديها ما كوك يفاعرون به .

١٥٤٦٣ - شَقَاة هو البهار ، مسكة طويلة التمام من الشط .

١٥٤٦٤ - شَقَار ، شَقَارِي ، شَقَر ، اَلِيمُون *Anémone* (F).
جنس نباتات حشبية ، سبروتية ، معمرة من سبط الشقاريات وفصيلة الشقيقيات . انواعه عديدة مظهرها بري وبضها زراعي زديي جميل الازهار المتعددة الالوان || اشهر انواعها ما يتبع .

١٥٤٦٥ - شَقَار اِكْلِيكِي ٥٠ *Anémone coronaria* (S). *Anémone des fleuristes, A. à couronne* (F). *Crown anemone, Poppy wind-*

هامة ، متكونية التجميع ، مستطيلة المالحق || يقال انه مروج لرفية الجلسية لانه يثير المراكز العصبية المختصة بها . وهو مدر للثقل وقد يسقط الحمل في اولى عهده . ويقال ان كثرة استعماله تسبب ردة فعل ناكسة ، مظهرها وزن شامل ويعرود حصي مفنك .

١٥٤٨٢ - شَكَل * شَوَكَل

Prasium (S), Praslon (F), Great hedge nettle (E), Klippenlippe (D), Prastine, Praslon (I).

جنس نباتات جنينة برية من فصيلة الشفويات ، انواعه قليلة مرقها لفرع . اوراقها متعاقبة ، مدقة ، نصلها قلبي الشكل ، مسن الحافة ، عطري الرائحة ، ازهارها عطرية العرف ، تاجية الانكازن . قالوا لا تخلو من للنفخ الطبية دون ان يعيدوها .

١٥٤٨٣ - شَكَاكِي النَحَا

هو الخزان الاسوي ، اطبه .

١٥٤٨٤ - شَكَب

شجر جنات كالنبق ، واحسنه شعبة . وهو شجر له خصبة وورق ، يثبته الكارمان وورقه كورق البدر وجناته كالنبق وفيه ثوبى . (ابو حنيفة) .

١٥٤٨٥ - شَكَب

مهواة ما بين كل جبلين . وقيل مدح في كهوف الجبال وضربها الشارقة على الادوية يوكر فيه الطير . ج شقَاب وشقُوب .

١٥٤٨٦ - شَكَبَان * Mégapode (F), Megapod, Mound-bird (E).

جنس طير من فصيلة الشقباتيات ، انواعه عديدة جميعها كبيرة الجثة طويلا من ٦٠ الى ٩٠ سم . وورسها واضعها صلبه ملطاف . اجنتها مستعرة ضعيفة . ارباغها وخالها قوية . اثوابها الى السرة السوية المختلفة المالحق || تأتف الاحراج القريبة من الشواطئ . تعيش ذكرا وانثى كالحمام . ارباغها كثيرة العدد . قوتها الثار والحبوب والديدان والحشرات || انثاها لا تحضن البيض بل ترصفه في حفن خاص من الرمل والرش والورق تقيمه قرب الشاطئ على حدود مرمى المد . شكله كالقنصوة الكبيرة حلوه نحو ٤ اشارة وقطره من ٤٠ الى ٤٥ م . || والانثى تبيض في موضعها من ١٢ الى ١٥ بيضة بين الواحدة والاخرى ١٣ او ١٤ يوما || اما البيضة فتتفت بعد وضعها باسبوعين عن فرخ نشيط كاسي . الريش يدبر امر نفسه بدون عناء مستنفا من امه التي يجهلها .

١٥٤٨٧ - شَكَبَاتِيَاَت Mēgopodidae (S), Mēgopodidae (F), Mēgopodidae (E).

فصيلة طير من رتبة التنباجيات اجناسها اربعة . طيورها متوسطة القد او كبيرة . قوية المنظر الاحسن . غالبها مستطيلة . اجنسلها الشقان والطيطاب والنبق والينترس . طيورها تتميز بدم حسنها البيض وبالخاصن التي تقيها .

١٥٤٨٨ - شَقَّة Quartier (F), Quarter (E).

ربع الحيوان الكذوب .

١٥٤٨٩ - شَقَع شَقع المجوزة : استخرج ما فيها .

١٥٤٧٣ - شَقَار تَرْجَمِي * شَقَار صَوَالِي

Anemone narcissiflora (S), Anémone à fleur de narciss, A. en ombelle (F), Narcissus flowered anemone (E), Bergwindröschen, Narzissen-Anemone (D), Anemolo narciss (I).

نوع من الشقار يملو نحو ٤٠ سم . اوراقه ثلاثية او خماسية التفريغ ، نصلها خلى البشرة حل صفحته . ازهاره صوبانية التجميع ، مستطيلة الامن ، بيضاء اللون ، ودية الصبغة الخارجية || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

١٥٤٧٤ - شَقَارِي هو الشقار ، راجعه .

١٥٤٧٥ - شَقَارِي * Psammophis schokari (S), Couleuvre schokari, Schokari (F), Schokari sand snake (E).

الاسم النوبي العلمي والفرنسي والانكليزي مأخوذ من العربي . حية بيوض من البرمائيات وفصيلة الخشقيات خلفيات الاغلايد || جسمها مستطيل الجسم يطلو نحو ٦٥ سم . ثوبها الى الزبدية الخفيفة يملوها اربعة خطوط بيض جانبية مما يجعل مابنها تتصرف بالنسبة الى النور من الشقرة الصبائية الى الخفية . مدنها اغير اسمر . رأسها لوزي الشكل . عنانها صديقات فرحان . زاوية شفتها متوسطة الانسراج . مدد استنابها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعل من اصلها اربعة عظام ثابتة غلظية الانكازن || تأتف اليراق والبراري . قوتها كل ما دب وتمكنت منه . تعتبر من الثابين المؤذية .

١٥٤٧٦ - شَقَارِيَاَت Anémonées (F), سبط من فصيلة الشققيات ، اشهر اجناسه الشقار .

١٥٤٧٧ - شَقَارِين Anémone (F), Anemonin (E). مادة جمالية صالحة ، بيضاء اللون ، لا عرف لها ، تستخرج من اوراق الشقار . وهي قليلة اللويان في الماء والانكازن والايار . تلون وتنفل في السوائل القلوية فيصم صبا الحامض الشقاري .

١٥٤٧٨ - شَقَاكَاة Partibilité (F), Partibility (E). قابلية الانقسام .

١٥٤٧٩ - شَقَاك جَافَر Javart (F), Ulcer on pastern (E). شَقَق في اللسع اللبائية والفسرفوية من الاجزاء السفلى في قوائم الخيل . والشقاق قد يكون :

- شَقَاك جَلْدِي Javart cutané (F).
- شَقَاك غُضُرُونِي Javart cartilagineux (F).
- شَقَاك وَتَرِي Javart tendineux (F).

١٥٤٨٠ - شَقَاك Ranchage (F), Dressing (E). الشقاق او الفتح هو حشر الارض حراثة متعاقبة الاتلام .

١٥٤٨١ - شَقَاكَل * جَزَرُ اللَّيْطِي، حَرْمُصُ النَّيْل

Pastinaca schekakul (S), Sécacul (F), Rough parsnip, Secacul (E), Schekakul (D), Pastinaca (I).

نوع من البسبارون البري وهو نبات طبي عشبي ممر غليظ الجذر . ساقه اسطوانية فرعاه تعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم . اوراقه مركبة ، متعاقبة ، لائحة الصلع . ازهاره



شَقَار جَرَجِي



شَقَارِي



شَقَال



شَقَال



شَقَال

1٥٥٢١ - شُقِيص Copropriétaire (F).
Joint-proprietor (E).
شريك في ملك المغار . يقال هو شُقِيص في المغار .

1٥٥٢٢ - شُقِيصَة Rose des vents (F).
في الشصق ، امله .

1٥٥٢٣ - شُقِيصُ آخَرُ
هو الخشاش المشترى ، امله .

1٥٥٢٤ - شُقِيصُ الجبل
هو الحوذان التني ، امله .

1٥٥٢٥ - شُقِيصُ النَمَانِ و هَوَاكِيَة Pulsatilla (S).
Pulsatilla (F). Pulsatilla, Pasque-flower (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من سبط الشقاريات ونباتات
الشقاريات . انواعه قليلة الكند جميعها جميلة المادة
الغلاية . سيروية ، تمشي في جميع المواقع والاربية .
جلودها حنابية غليظة . اوراقها جلدية الالتشاب .
اشهر انواعه الثلاثة التالية .

1٥٥٢٦ - شُقِيصُ النَمَانِ الجبلي Pulsatilla alpina (S).
Pulsatilla alpine (F). Mountain
pulsatilla (E).

نوع من شقيق النمان ، يملو من ٢٠ الى ٣٠ سم .
يكثر في الاربية الرليلة الجبلية ، ازهاره كبيرة القدة ،
بضاه اللون ، زرقاء المواج حل صفحتها الخاربية .
ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

1٥٥٢٧ - شُقِيصُ النَمَانِ الربيعي * Pulsatilla vernalis,
Anemone vernalis (S). Pulsatilla
printanière (F).

نوع من شقيق النمان ، يملو من ٢٠ الى ٣٥ سم .
مهد جبال الجبلية للمعتد . اوراقه ابيدة ، لاطقة ، قدية
الترفيس ، نصلها على البشرة . ازهاره متوسطة القدة
بضاه اللون حل صفحتها الداخلية ، ليلكية الصفحات
الخاربية || ازهاره يستمر من نيسان الى تموز .

1٥٥٢٨ - شُقِيصُ النَمَانِ المبكول * ، شُقَار المصنح Pulsatilla vulgaris,
Anemone pulsatilla (S). Pulsatilla
commune, Fleur de Pâques, Herbe au vent (F). Pasque
flower, Pass flower, Blue money (E). Echte kuhnschelle,
Küchenschnecke (D). Pulsatilla comune,
Fiore di vento, Erba del vento (I).

نوع من شقيق النمان ، يملو من ١٥ الى ٣٠ سم .
يكثر بين الزروع وفي الاراضي البور . اوراقه نافضة
تبدو بعد الاطراخ وتميل في اواخر الخريف . ازهاره
كبيرة القدة ، قريزية اللون ، بنفسجية المواج ، فضية
الزغب || ازهاره يستمر من اذار الى ايار .

1٥٥٢٩ - شُقِيصُ النَمَانِ
هو الحوذان الحريف ، امله .

1٥٥٣٠ - شُقِيصُ حَكَلِي هو الحوذان الحقل ، امله .

1٥٥٣١ - شُقِيصُ مَائِي هو الحوذان المائي ، امله .

1٥٥٣٢ - شُقِيَّات Ranunculaceae (S).
Ranunculacées, Ranunculacées (F).
Ranunculaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . انواعها المعروفة زهاء
١٢٠٠ ، اجناسها ٣٥ تنجمها صفة اسباط اشهرها

1٥٥٠٧ - شُقُرُق هو الشقراق ، امله .

1٥٥٠٨ - شُقُقَة هي فلة البير وهي شيء كالبلغة العظيمة للراكية الجيوب
يجريه البير من فيه اذا حاج .

1٥٥٠٩ - شُقِص Part, Portion (F).
Share, Allowance (E).
الشصق : النصيب والسهم والقطعة من الارض .

1٥٥١٠ - شُقُف هو الاقتنا السنية ، امله .

1٥٥١١ - شُقُقَة Pot, Vase (F).
هي الايصيص او المركان انا من عزف او فخار او
غير ذلك يستعمل لزروع النباتات التزيينية البيتية .

1٥٥١٢ - شُقُل Pesée (F). Weighing (E).
الشقل الوزنة والوزن . يقال اشقل في هذا الدنار اي ننه .

1٥٥١٣ - شُقِيل * ، اصابع هرئيس ، حاكير المهر Hermodactylus tuberosus, Iris tuberosa (S).
Hermodactyle tubéreux (F). Finger of Hermas (E).
Hermodactyl (D). Hermodactylus, Iris vallutata (I).

نبات عشبي صفوي بري وزراعي من فصيلة السوسنيات .
يكثر في المواقع الرطبة . صقله طية تستعمل استعمال
السورجان ويستخرج منها سادة الخربطين . ساقه
خضراوية مبرقة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . تنشي زهرة
وسيدة عطرية الرائحة ، كبيرة القدة ، لويها الى الصفار
الحظلي يملو مواج بنفسجي . بتلاتها الخاربية املجية
الشكل مستديرة الطرف . بتلاتها الداخلية نسيقة النصل
الذلق المندي . ساقها مبرزة ، خضراء اللون || ازهاره
يدوم من اذار الى نيسان .

1٥٥١٤ - شُقُمَة Papion chasma (F).
هو القردوح الخريزي ، امله .

1٥٥١٥ - شُقَن Herzer (F). To harrow (E).
شقن التربة : سلفها وبسطها .

1٥٥١٦ - شُقَوَاص هو اللادن الاسباني ، امله .

1٥٥١٧ - شُقِي Sexué (F). Sexuality (E).
كل ما هو ذات شق يمكنه من التماسك ان ذكراً
او انثى .

1٥٥١٨ - شُقِيَّة ، جِنْسِيَّة Sexualité (F).
Sexuality (E).
مجسمة المناسر والفرق الجنسية الشكسية الخاصة
بالذكور والاناث .

1٥٥١٩ - شُقِيح Diforme (F). Deformed (E).
نمت وصني يطلق على الحيوان القبح الشكل .

1٥٥٢٠ - شُقِيحَة Chromatophore (F).
Chromatophore (E).

الشقحية خلية ملونة بصبغات من الشفاح عديدة الالوان ،
انتشارها او انتشارها منوط بالخريف . لذلك يفيض
الزهورات تمانق الملقح الموجودة فيه بمرسة فائقة لانها
تحمي بعض هذه الخلايا .



شُقِيل



شُقِيصُ النَمَانِ الربيعي



شُقِيصُ النَمَانِ المبكول

Polymorphisme (F). ١٥٥٤١ - شَكَاة ٥

Polymorphism (E).

تعدد الأشكال في مادة واحدة ، أو تعدد أشكال مادة وحدة تركيبتها الجزيئي لا يتبدل .

١٥٥٤٥ - شَكْب ، شَنْكَب ، يَكْسَاين

Bécassine (F). Snipe (E).

جنس طير من دجاج الارض . أنواعه ستة جميعها من القواطع . تتميز بأجسامها الصغيرة القذ الحياء الشكل . أنوفها إلى السرة الخنطية المرطقة المرقشة . منقارها مسطيلة دقيقة . أوسانها حبيبية الجهة الامامية ، سرية الخلفية . اصرت أنواعها وأشهرها الشكة الصغيرة والكبيرة والمفلولة ، الحلبا .

Centriscus (S).

Centriscus, Bécasse de mer, Palkson trompette (F). Trumpet-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شاكات بحرية من انواع قليلة مرتعها مياه البحر المتوسط . جميعها صغيرة القذ طولها يراوح من ١٥ الى ١٥ سم . تتميز بشكاتها المستعربة وباعطائها الانبوبية الدقيقة الاطراف . أنوفها وردية اللون ، ظهورها ملحية اللون ، جوانبها صفمية ، بطونها فضية .

١٥٥٤٧ - شَكْبَة الْبَحْر الْمَجْبِيَة

Centriscus scolopax (S).

Centriscus bécasse, Bécasse de mer, Trompette de mer (F). Bellows-fish, Trumpet-fish (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة شاكيات البحر وردية شاكات الزمائن . اصطلحها معق اقام البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من اسماك التقاف المتوسطة القو . جسمها قريب الشبه بالشكة ١٢ جميعها برية مهددة حوض البحر المتوسط . اورتقا متغالبية ، مستقرة ، اذنية الزناد المتطيل ، تصلها ثلاثي القصيص ، ذات الطرف ، حاكب الخصار . ازارها فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، خاصة البيلات ، لونها مختلف باختلاف الانواع ، فيها الاخر ومشتقاته ثم البنفسجي ثم الاسفر .

الحذائيات والحرقيات والشقاريات والملمريات . جميعها نباتات عشبية أو شبه ليفية ، منتشرة في معظم اسماق العالم . منها نباتات جمالية وأخرى طبية وبعضها زراعي تربي .

١٥٥٣٣ - شَكْ

Prise (F). Setting (E).

الشك هو مقدار سرعة تماسك جبلة الامنت . فهو سريع اذا تماسك بين ١٥ و ٣٠ دقيقة || وهو متوسط اذا تماسك بين ٣٠ دقيقة وساعتين || وهو بطيء اذا تماسك بين ساعتين وسبع ساعات .

١٥٥٣٤ - شَكْ

Enfilas, Enguirlander (F).

To string, To engarland (F).

نقب نصال التيج بصلبوسها وقد يتم ذلك بواسطة الشفرة التي تخترق الصلح لتسهل مرور الخيط .

١٥٥٣٥ - شَكَاة ٥

Diédétique (F).

Dietetics (E).

علم يبحث في قيمة المواد الغذائية والعامل الناتجة من سو الاندفاع مع تحديد الاشكاد اللازمة لكل مستهلك من حيوان أو نبات .

١٥٥٣٦ - شَكَار

Lignivore (F).

Lignivorous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان أو شجرة قوتها الشكير والخشب .

١٥٥٣٧ - شَكَاة ٥

كل قسم من أرض المزرعة خصص لزراعة معينة . يقال شكاكة لبح وشكاكة فوق لبح ... ج شكاكر .

١٥٥٣٨ - شَكَاة ٥

Fagonia (S). Fagonie (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الباذيات . انواعها ١٢ جميعها برية مهددة حوض البحر المتوسط . اورتقا متغالبية ، مستقرة ، اذنية الزناد المتطيل ، تصلها ثلاثي القصيص ، ذات الطرف ، حاكب الخصار . ازارها فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، خاصة البيلات ، لونها مختلف باختلاف الانواع ، فيها الاخر ومشتقاته ثم البنفسجي ثم الاسفر .

١٥٥٣٩ - شَكَاة اِكْرِيَّة ، شَكَاة عَرَبِيَّة ، شُرْمَان ، عَاتِل الْفَرَات

Fagonia arabica, F. eretica (S). Fagonie de Crète, Trèfle épineux de Candie (F).

نوع من الشكاكة منبها حوض البحر المتوسط . ازارها قمرية اللون . قالوا انها طيبة دون ذكر مناعتها .

١٥٥٤١ - شَكَاة التِيَّة ، شُرْمِيَّة

Fagonia sinatica (S). Fagonie de Sina (F).

نوع من الشكاكة منبها صحراء سيناء وبيوارها . ازارها وردية اللون . يقال انها طيبة .

١٥٥٤١ - شَكَاة ٥

Onoporde, Onopordon (F).

هي الاسون من النباتات الطبية ، اعلمه .

١٥٥٤٢ - شَكَاة

Enguirlander (F).

Engarland (E).

هي علية شك اوراق التيج بنظام وترتيب .

١٥٥٤٣ - شَكَاة

Abot, Entrave (F).

Clog, Hobbie, Shackle (E).

وثاق تربط به يدا الفرس أو اسدي يديه بأحدى رجليه .



شكة



شكب البحر



شكة صغيرة



شكة كبيرة



شكة مبدولة

١٥٥٤٨ - شَكْبَة صَغِيرَة ٥

Gallinago gallinula (S). Bécassine sourde, Petite bécassine, Bécot, Jaquet (F). Jack snipe (E).

طائر من الشكب صغر القذ طوله نحو ١٧ سم . قوته إلى الصهبة الخنطية ويلوحها مزاج اسود ورقعة بيضاء || مشتات منافع وضفاف بحيرات وأهوار البلاد الحارة . مصيفه يمتد من سوريه إلى أوروبا الشمالية .

١٥٥٤٩ - شَكْبَة كَبِيرَة ٥

Gallinago major (S). Bécassine double, Grande bécassine (F). Great snipe, Solitary snipe (E).

طائر من الشكب طوله نحو ٣٢ سم . قوته إلى الصهبة الخنطية ويلوحها مزاج اسود ورقعة بيضاء || مشتات منافع وضفاف بحيرات وأهوار البلاد الحارة . مصيفه يمتد من سوريه إلى أوروبا الشمالية .

١٥٥٥٠ - شَكْبَة مَبْدُولَة ٥

Gallinago scolopacina (S). Bécassine ordinaire (F).

Common snipe (E).

طائر من الشكب طوله نحو ٢٥ سم . قوته متراكم

Reclamation (F). **شكوى، مطالبة**
Claim (E).
هي مطالبة المره الاعتراف بحق مجيد له . او اقرار
حقه في حالة كان يجب ان تكون له .

Aubier (F). **شكير**
Alburnum, Sap-Wood (E).
هو القسم من الهيكل الخشبي الكائن بين اللحاء والخشب
الصلب .

Polymorphe (F). **شكل**
Polymorphic (E).
متعدد الاشكال .

Mors (F). Bit (E). **شكمة**
مدينة اللجام الممتدة الفم .

1٥٥٦٦ - **شكينوس* شجرة الفلفل الكاذب**
Schinus (S). Schine, Faux pölvrier (F). Pepper tree.
Mastic tree (E). Mastixbaum (D). Aibero da pepe (I).
جنس اشجار وشجيرات برية وتربينية من فصيلة البطيانيات.
اوراقها متعاقبة ، مركبة ، وريشة . وريقاتها بيضيه
الشكل ، تصلها سميكة الصفحة . جيل الخفسر الاسمر
المايق . ازهارها عبقودية التجميع ، حراء اللون او بيضاء .
ثمراها غنية الشكل ، حصى اللد تبدو حراء اللون ثم
تسمر || اوراقها وازهارها تتحلل رائحة الفلفل . يستخرج
من اوراقها عطر شامع الاستعمال يدخل في عدة تركيب
وستحضرات || انواعه المعروفة اثنان .

1٥٥٦٧ - **شكينوس بطيحي الأوراق**
Schinus terebinthifolia (S). Faux pölvrier du Brésil
(F). Brazilian pepper tree (E). Brasilianische pfeffer-
baum (D). Pepe del Brasil (I).
نوع من الشكينوس شجيرة تملو من ٣ الى ٤ امتار .
يزرع للزينة ويستعمل من اوراقه عطر الفلفل .
يستخرج من ساقه صمغ رائحته يدخل في بعض المركبات .
ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

1٥٥٦٨ - **شكينوس رليج**
Schinus molle (S). Faux pölvrier molle, Pölvrier du Pérou (F). False
pepper, Weeping pepper tree (E). Mollebaum,
Amerikanische Pfefferbaum (D). Pepe del Perú,
Falso pepe, Mole (I).
نوع من الشكينوس ، شجيرة تملو من ٧ الى ١٠ امتار .
وردياته وثرية التجميع عذدها يراوح من ١٥ الى ٢٧ .
تصلها سناني الشكل مسن الحافة . ازهاره مجهرية الانبعاث
بيضاء اللون . ثمارة حصى الشكل واللذ ، حراء اللون
تبقى حائلة الى الشتاء || يستخرج من اوراقه عطر
الفلفل ويستخرج من ساقه صمغ رائحته يدخل في
المعدة || ازهاره يستمر من اوائل تموز الى اواخر آب .

1٥٥٦٩ - **شيل**
Docynia (F).
هو الدوسينه شجيرة مشرة ، اطليا .

1٥٥٧٠ - **شلاب**
Leersia (S). Léersie (F).
جنس نباتات عشبية ، برية ، حولية ، مرغوبة من فصيلة
التيجليات . انواعها المعروفة ثمة منها في بعض مناطق
البلاد الحارة من الشرق والغرب || سوقها شطاف فرعاء .
مصفاة فيق تستعمل . ازهارها سليل التجميع . سبيلاتها
متراسة . ازهارها عشوية .

الصبة والسرمة الحنطية المرققة بالايض ، يسر ويبقى
في الظهر ، ينسرف الى الصبة الشفراء في الصدر . عقه
يرطبه الى البياض الاغبر ، متغاره مستطيل اسمر || اثناء
تحمل الثوب عنه . يألف المتاع والمرامي والاراضي الرطبة .
قوته اللبدان والحشرات والرخويات . يدخن اضمومه فوق
الرحل الناشف بين الاعشاب المنقية . الاثني تبين من
٤ الى ٥ يضاف تخفصها رجعا من ١٥ الى ١٧ يوا .

1٥٥٥١ - **شكيات البحر**
Centriscidae (S). Centriscidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شاكلات الزعانف . اجنسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز العشرة || اصطنها
معظم بحار البلاد الحارة ويصنف بحار البلاد المعتدلة الحارة .
سرعها الاخطا والتفاف || تتميز باجسامها الربعة التي
تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وباعظامها الخروطية الاثيوبية
الالاف ، وبأذيها ومجتمتها الظهريه الصلبة ،
وبالتناسخ القوية الحادة التي تتقدم الزعانف الظهريه ،
وبزمارتها الحويضية المتناسقة || انوارها تراوح من البردي
الى المرجاني الاسف ومن الغني الى النحبي || اشهر
اجنسها شكب البحر .

1٥٥٥٢ - **شكدة**
Ration quotidienne (F).
Daily allowance (E).
ما يكتفي اليه يوميا كاملا من الملف . حج اشكاد .

1٥٥٥٣ - **شكدة الصيانة ، شكدة العيش**
Ration d'entretien (F). Maintenance allowance (E).
الملف الذي يكتفي الحيوان يوميا ليش يلا عمل .

1٥٥٥٤ - **شكدة العمل ، شكدة الانتاج**
Ration de production (F). Production allowance (E).
الملف الضروري لحيوان العامل او الذي يمسّن او
يدر الحليب .

1٥٥٥٥ - **شكدة النشوء**
Ration de croissance (F).
Growth allowance (E).
الملف الذي يكتفي الحيوان للنشوء وانمو .

1٥٥٥٦ - **شكدي***
Diétéétique (F).
Dietetic (E).
نعت تمريلي يوصف به ملجن الحمية او طريقة التشكيد .


1٥٥٥٧ - **شكدة**
الشكدة : اثناء الفرح من الحليب .

1٥٥٥٨ - **شكع**
شكع الزرع : كثر حبه فهو شاكع وشكع وشكوع .

1٥٥٥٩ - **شكل**
Forme (F). Form, Shape (E).
الحية الخارجية .

1٥٥٦٠ - **شكمة ، بزمعة ، علكة**
Ration (F).
جزء من الشكدة وهو النصف الواحدة من الملف البوي
المترصب لحيوان .

1٥٥٦١ - **شكوة*** ، **نحي** ، **سقاء**
Baratte (F).
Churn (E).
وعاء تخفف فيه الكثرة لاستخراج الزبدة .



شكوة



شكينوس



شَلَح

Chalaza (F). Chalaza (E).

١٥٥٨٣ - شَلَحْزَ٥

عقوبت سرقة البيضة .

Stillation, Egouttement (F).
Dripping (E).

١٥٥٨٤ - شَلَحْزَلَة ٥

التقطر نقطة قطرة .

Prangos (S).

١٥٥٨٥ - شَلَحْزَلَة ٥

Prangosier, Foin du Thibet (F). Prangos, Hay plant (E). Tibetanisches Heu (D) Prangos (I).

جنس نباتات عشبية برية مرعوية صمرة من فصيلة الحبيبسيات . جنوبها عودية ، سيقانها نجيلية قليلة القروح . اوراقها فارشة ، كبيرة القعد وبيضة . ازهارها صفراء اللون صنية || انواعها المعروفة قليلة اشهرها ما يلي .

١٥٥٨٦ - شَلَحْزَلَة الحَرَمُون ٥
Prangosier de l'Hermon (F).

نوع من الشلطة منبها جبل الشيخ والحرمون . اوراقها صنية القعد ، غنية النصل . تستلها للماشية ويسمى عليها الحليب .

١٥٥٨٧ - شَلَحْزَلَة عَشْبِيَّة ، قَوْش الضَّبَّع ٥

Prangos asperus (S). Prangosier âpre (F).

نوع من الشلطة منبها الجبال اللبنانية السورية المعتدلة الارتفاع . اوراقها كبيرة ، مستطرفة ، صميكة الصفحة الخشنة . لونها ابيض الفخار البحري الباهت .

١٥٥٨٨ - شَلَحْزَلَة ٥ * ٥ غَرَالِيوم ٥ Graphium

جنس بطوط مجهرية من عصارة المديانبات وفصيلة الكعبسيات . انواعها قليلة العدد ملونة الكرميات . منبها الزرية التي تعيش على بعض الاشجار الحرجية انحصار الفراار ومنبها الشفوية التي تتركب التآر الخشونة كالتفاح والاجاص اذا واقفها ونشلتها حولل البيئة .

١٥٥٨٩ - شَلَحْزَلَة ، شَلَحْزَلَة ، شَلَحْزَلَة ٥

Sésciens (F). Salachil (E).

رتبة اسماك غضروفية الزمانف . فضالها وابجانها كثيرة العدد جميعها متوسطة وكبيرة القعد . اشهر اجناسها القروش والكوجج والشار والياض والرمادة ، الخ .

١٥٥٩٠ - شَلَحْزَلَة ، شَلَحْزَلَة ٥

Eufs de lézard (F). Eggs of the lizard (E).

بيض النطاة واشباها .

١٥٥٩١ - شَلَحْزَلَة ٥

Anguille (F). Eel (E).

السلك وسلك الشلك والزلز . هو الانقليس ، اطبه .

Paralyse (F).

١٥٥٩٢ - شَلَحْزَلَة ، شَلَحْزَلَة ٥

Paralysis (E).

عارض يسبب التهاب اللسانغ او التضاع الشوكي فينجم عنه الشلل .

١٥٥٩٣ - شَلَحْزَلَة وَرْدِي ، مُسَكَّرْدِين ٥

Muscardine

مرض خبيث منه لا علاج له يسبب دود التفر سبيه قطر مجهرى من الطلوسيات يدعى طلوة باسبانا (Botrytis) غيراته ذرية تتفحلها الربيع وتسلل جسم الود من طريق الاكل تخففى على الدم بعد أن تحوله الى سواض صضوية || مظهره الخارجي لمان في بشره الجلد يبقيه اصفرار وردي ثم ارتقاه في الجسم زياد حتى الموت عنه ذلك يتصلب الجسم ويسمى ثم تلوه ماجة صفراء اذا كان

١٥٥٧١ - شَلَحْزَلَة ٥

نبات يعرف بحبيشة البركة ، اطلبا .

١٥٥٧٢ - شَلَحْزَلَة ٥

Sphaerites (S).

Sphérite (F). Sphaerites (E).

جنس حشرات من فصيلة الشلاليات ورتبة غديات الاجنحة . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، شبه بيضية اللون ، تطول من ٦ الى ٧ م . رؤوسها شبه مكورة . عيونها صنية ، بارزة . قرونها الاستشعارية صولجانية . تأثيرها وفكوكها غليظة . ملاسها كبيرة ، مسنة الحافة الداخلية . كواسها مستعرجة ، سادة الاطراف الجانبية والامامية . الحادها لاسخة . قوائمها شديدة النط . اثارها سوية الاولان ، تكثر فيها الجوزة السوداء المراج || تعيش على البراز والمواد العضوية المتحللة .

١٥٥٧٣ - شَلَحْزَلَة ٥

Sphaeritidae (S).

Sphéritidae (F). Sphaeritidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صنية ، شبه بيضية الشكل . تطول من ٥ الى ٩ م . رؤوسها مكورة . عيونها بارزة . تأثيرها وفكوكها انشعابية . ملاسها الفكية كبيرة وصلبة . قرونها الاستشعارية صولجانية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسها مستعرجة ، سادة الاطراف . الحادها لاسخة . قوائمها نشطة . ابرافها خمسية المقل || تعيش على البراز والمواد العضوية والتبائية المتحللة || اشهر اجناسها الشلح .

١٥٥٧٤ - شَلَحْزَلَة ٥

Cataracta, Chute d'eau (F).

Cataract, Waterfall (E).

منحد مرالى يتحرس مجرى النهر .

١٥٥٧٥ - شَلَحْزَلَة ٥

حب الرز قير المشور ومنى زمت عنه جداته فهو الرز . واحده شلح .

١٥٥٧٦ - شَلَحْزَلَة ٥

Schilbe (S). Schilbá (F).

جنس اسماك ثورية مأكولة من مفتوحات لكثافة وفصيلة السلوريات . انواعها عديدة جميعها من اسماك مياه البلاد الحارة والستوائية . اجسامها صغيرة القعد ، جلودها صاحة . رؤوسها مسطحة . ومنبها قصير . اوارها الى الربعة التبراد يطولها تنجبع اسود || تصنيف طوبها يالى دون التوط .

١٥٥٧٧ - شَلَحْزَلَة عَرَبِيَّة ٥

شَلَحْزَلَة ٥

١٥٥٧٨ - شَلَحْزَلَة ٥

شَلَحْزَلَة ٥

١٥٥٧٩ - شَلَحْزَلَة ٥

Sperma animal (F).

Animal sperm (E).

هو اقراز اللند التناسلية الذكرية عند الحيوان .

١٥٥٨١ - شَلَحْزَلَة ٥

Spermatologie (F).

Spermatology (E).

الشلحية بسحت الشلح اي المنى .

١٥٥٨٢ - شَلَحْزَلَة ٥

شَلَحْزَلَة ٥

هو جلهم الحينة ، اطبه .



شَلَحْزَلَة

انواعها المعروفة قليلة اعطائها الشرق الاوسط . سقيا فراء .
اوراقها للسفل قشائرية التصل والنبات صغيرة مفردة او
مستنة . زمارها صفراء اللون ، ارجوانية اللون . ثمارها
خمرينية . يزورها فردية . احرف انواعها ما يلي .

- E. tyraeus (S). شلوة قشائرية ، ابو قرن
E. pterocarpus (S). شلوة جعنة الثمر
E. stragulatus (S). شلوة غنقة
E. arcuatus (S). شلوة مقرة

١٥٥٩٩ - شَلَوُف
هي البرعمة النامية على الساق الارضية في الحليون والعليق
وما كان على شكلها من النبات .

١٥٦٠٠ - شَلَوُف ، سَمُوم
وعج لامة مضينة مهمها ازهر الجنوب .

١٥٦٠١ - شَلَوُكَات
هي المواد القلوية الموجودة في نسيج الحيوانات الحية ،
راسدها شلوة .

١٥٦٠٢ - شَم راجع شامة .

١٥٦٠٣ - شِمَاع ، شَمِيع
استمرار تقدم لثني التدرجي في مختلف اعضاء النبات .

١٥٦٠٤ - شَمَالَة هو الشاهد ، راجع .

١٥٦٠٥ - شَمَالِيَّات
Therididae (S).
Therididae (F). Therididae (E).

فصيلة عنكب من رتبة الريتلالات . اجناسها وانواعها
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم البلاد الحارة والمعتدلة
الحارة . جميعها مفترسة . منها الصغيرة الحجم والمتوسطة
والكبيرة . تتميز بطولها المتضخمة المؤنثة وجزائرها
المتعددة الأطراف || شعما دقيقة الحبلك تتسببها على
النبات وبين الحمازة وفي شقوق الصخور || اشهر
اجناسها الشبابة والنداسجة .

١٥٦٠٦ - شَمَار ، شَمَرَة ، شَوَمَك ، وَابَالِج
Feniculum (S). Fenouil (F). Fenekel (D).
Finocchio (I).

جنس نباتات عشبية برية طيبة معمرة من فصيلة الخيميات .
انواعها عديدة . سقيا كثيرة الفروع خضراء اللون .
اوراقها مركبة شديدة الخضار الباق ، كثيفة المسام
والندد النطرية ، فواصة العرف الذي || اشهر انواعه
الثمار الحلو .

١٥٦٠٧ - شَمَار المَاء
Phellandria aquatique (F). هو الشرط المسقي ، اعطيه .

١٥٦٠٨ - شَمَار حَلَو
Feniculum officinale (S). Fenouil officinal, Aneth
doux (F). Common fennel (E). Echter Fenchel (D).
Finocchio officinale (I).

نوع من الشيار وهو من البقول المأكولة الاوراق .
خواصها الصحية والطبية جزيلة التبع توجد في جزوره
ووراقه . وهو منه معوي يصرف المغازات ، يدر البول
ويحسن للتشنج . ادمان شره يثني عند الفلد الجليسة .

الحل جافاً ، او خلة يضاف كالكلس اذا كان الحل
ربطاً || القوية منه تنحصر بالتطهير بالفمبول وبقرق
القيان الرطبة فور اصابتها .

١٥٥٩٤ - شَلَم ، فَلَاش
Flash
ويش نور موقت يستعمل التصوير في الغلام .

١٥٥٩٥ - شِلَنُوس مُتَقَبَس
Chlaenius spoliatus (S). Chlaenius spoliator (F).
Chlaenius spoliatus (E).

حشرة راجمة قانصة من فصيلة القليسيات ورتبة عمديات
الاجنحة . تألف المواقع الرطبة وصفات مجاري الماء .
انقراضها ويزيادها تعيش على المواد العضوية وعلى ما تستطيع
اقتراضها من الحشرات الدنيا || جسمها متوسط القد يطول
من ١٤ الى ١٦ سم . ثوبها الى الخضار الجليل اللامع
يكتنه خط عايش اصفر يطرق الظهران ، رأسها متوسط
الجم . زباناها عظيمات مستطيلات . عيناها صغيرتان
ناشرتان . ظهرانها مستدير الطرف اللامع ، تسامي
الاعايد القلبية القاطبة . ارساغها خالية العقل || الاثني
اصفر قدا من الذكر واثني ثوبا منه وقصر زبانا || لها
جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في مطلع
حزيران وتعيش حتى اوائل ايلول . تسرح في النهار وتبيت
في الليل || البرقة مردنية الشكل ، تطول عند تمام ادراكها
نحو ٢٤ سم . جسمها اخضر اللون ، اسر الرأس والشرج
والدب || طول الاكمال ينشر نحو ٣٥ يوا .

١٥٥٩٦ - شِلَنُوس مَدَّ هَب الرَأْس

Chlaenius chrysocephalus (S).
Chlaenio à tête dorée (F).
Chlaenius chrysocephalus (E).

حشرة راجمة قانصة من فصيلة القليسيات ورتبة عمديات
الاجنحة . تألف يسامين السواحل . قوتها المواد العضوية
وما تستطيع اقتراضها من الحشرات الدنيا || جسمها صغير
القد يطول من ٧ الى ١٠ سم . ثوبها ثنائي اللون ، رأسها
وكولها الى الحرة النحاسة للذبة المراج ، عمدا الى
الزقة السمر الخضار المراج . زباناها عظيمات دقيقان .
عيناها صغيرتان بارزتان . ظهرانها مستدير الطرف اللامع
تسامي الاعايد القلبية القاطبة المتوازنة الابعاد . ارساغها
خالية العقل || الاثني اصفر قدا من الذكر واثني ثوبا
منه وقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول . تظهر
الحشرة الجملانة في اواخر آذار وتعيش حتى اواخر حزيران .
تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند تمام ادراكها
تطول نحو ١٣ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، اسر
الرأس والشرج ، اخضر المدب .

١٥٥٩٧ - شِلَنُوس
Anisochilus (S).
Anisochèle, Anisochile (F). Anisochilus (E).

جنس نباتات طيبة برية حولية ومعمرة من فصيلة الشقيويات .
انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها الهند || الحولية منها
عشبية اما المصرة فخشوية متصبية . اوراقها متفكة
متعاقبة ، ثلاثية . فصلاها بيضيه الشكل ، خبزا الخضار .
ازهارها سبلي التجميع ، اسطواني الشكل ، طرفي الزنكاز
انواعها صغيرة حمراء اللون || حصر اوراقها وزمارها
شائع الاستعمال في معالجة الزلزة الصغرية عند الاولاد .

١٥٥٩٨ - شِلَوُكَة
Enarthrocarpus (S).
Enarthrocarpe (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات .



شلوس عفس



شلوس ملقب الرأس



شلبس



شمار حلو

شباط ١٥٦٠٩

Pyrgargues (F). Osprey (E).

جنس طير من العقارب وفصيلة العقربيات. انزاعه عديدة اشهدا الشبيبة الشائنة وشبيبة الأنهر والرخاء والسهج . تتميز بأرأسها الكاسية حتى نصفها الأعلى . منقوشة من القواطع ، تأتلف الخطوط البحرية وضفاف الأنهار والبيمرات . قريبا الاسمك والطيور المائية والنبوتات المصيرة.

١٥٦١٠ شَمَاعِلَة

Chaetostroma

جنس فطور مجهرية من مارة اللطحانيات وفصيلة الكنكيات . يلبسته بجية الشكل ، حلقة السطح ، ولها دقيق كثيف أسمر اللون . جريه الكندية متتشبة مرامسة ، كشافه طرفية الارتكاز بضيئة او مردنية الشكل . انواعه قليلة جميعها روية تركب المواد العضوية المنحلة .

١٥٦١١ شَمَال ، شَمَال North-wind (E).

هي الخنوء : الريح التي تهب من قبل البحر إلى مطلع الشمس ونبات تمشي ويقل من مطلع الشمس إلى مسقط الترس . ويكون اسما وصفة يقال حيث الشمال وريح شمال .

١٥٦١٢ شَمَالِي Septentrional (F). Northern (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو من الشمال او مركزه الشمال .

١٥٦١٣ شَمَالِي Boreal (F). Boreal (E).

نعت وصفي يطلق على ما هو خاص بالشمال القطبي .

١٥٦١٤ شَمَام

Cucumis melo (S).

Melon commun (F). Melon, Musk-melon (E). Melone (D). Melone, Popeno (I).

ويدهي ايضا البطيخ الاصفر . نبات حليبي حولي زراعي من فصيلة القرعيات . ضروريه واصرامه عديدة . ساقه اسطوانية مدادة زياها البثرة خشنة للمس . اوراقه زنادة مختلفة الاشكال منها المستديرة والكلوية والمفصصة . نصلها مزهر المصفحة الخشنة ، ياهت الخضار البحري . ازهاره وحيدة المسكن ، الذكري تظهر قبل الانثوية بهشة ايام . ثماره مختلفة الاشكال والاحجام منها المستديرة والبيضة والاحليلجية والكبيرة والصغيرة ، قدشورا ناعمة للمس ، صفراء اللون ، مضطمة . لهاها سبيك السيوق ، جانبه المكسر ، اصفر اللون ، سكري الطعم ، ذكي العرف . يزده مستطيلة الشكل ، تبتية اللون ، كثيرة العدد || يحدد في جميع الاثرية الفنية بالمواد العضوية والناصر المدنية بشرط ان لا تكون شديدة الاندماج . يزده على مسافات تراوح ابعادها من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . تنضرف ساقه الرئيسية (الام) على وقتين . وتنضرف ساقه الثانوية على ثلاث اوراق ثم تنضرف سيقه الثانية على خمس اوراق . كما وتعيشيه ضروريان ، اما الارتكاز من ديه ففصر .

١٥٦١٥ شَمَام اخضر ، شَمَام كَتَلُو

Cucumis melo cantalupensis (S). Cantalupo, Melon galeux (F). Cantaloupe melon (F). Cantalupa, Beulen-melons, Rippen-Melons (D). Cantalupo, Melone cantalupo (I).

نوع من الثام الزراعي المأكول ، اسرامه عديدة مختلفة الاحجام والاشكال تلب لها الاستدارة . قدشوره مضطمة مبرطة بجمرة اللون حطية التآليل . لهاها سبيك السيوق ، لذيق الطعم ، مسطحة الحلاوة ، ذكي العرف ، لونه الى الخضار الاحمر || مملته زراعية لا تختلف من معاملة الثام .

١٥٦١٦ شَمَام عَجَمِي

Cucumis melo dudaim (S). Concombre dudaim (F). Apple cucumber, Queen Anne's melon (E). Apfel-melone (D). Cocomero melo (I).

نوع من الثام الزراعي الزبني ، ثماره ضخمة اللون ، مستديرة القد ، حجبها حجب البرتقالة وهي نواحة الرائحة الذكية . قدشورها ملساء البثرة ، مدامة التضلع ، لهاها قليل الباكة كثير الالياف اللزوية || يزده للزرين .

١٥٦١٧ شَمَام مصري

Cucumis odoratissimus (S). Melon égyptien (F). Sweet melon (E). Aegyptische melone (D). Popone, Poponcino d'Egitto (I).

نوع من الثام الاصفر المستطيل الشكل ، مهد البلاد المصرية وقد اشتر بكنهته ولدة طعمه وقوة رائحته الذكية المستحبة || يزده ويعمل كثير من الثام وهو اجد صنفًا في الاثرية غير المزوية .

١٥٦١٨ شَمَازِي Chimpanzé (F).

هو الجملة : جنس قرود كبيرة القد من فصيلة اشباه الانسان ، راسع يامة .

١٥٦١٩ شَمَازِيَا

نوع من الحور القزوة الفانعة . راسع غير شياها .

١٥٦٢٠ شَمَبَقِي

Michelia champaca (S). Michélie champac, Champac, Sompac (F). Champaca, Champ wood (E). Champakbaum (D). Champaca (I).

نوع من المشاليه من فصيلة المفلويات . وهو شجرة يرية طيبة مهدها الهند الصينية ، تحوي بعض الاصول المرة والطرية ، تدخل في عدة تركيبات وبغويات مديدة ويستخرج منها عطر الشيق المشهور .

١٥٦٢١ شَمَبَقِي راسع شامخ .

١٥٦٢٢ شَمَد

الشد : رفح الذئب فهو شامة وهي شامة .

١٥٦٢٣ شَمَدَكَة

شجرة قمرس وتندس الى الكثرة لترتفع عليها .

١٥٦٢٤ شَمَر الجبَل

Tordyle suava (F).

هو الثروب الحقل ، اطليه .

١٥٦٢٥ شَمَر اختارو

هو يتور الاكراد ، اطليه .

١٥٦٢٦ شَمَر الكَلْب

هو قابايغ البتن ، اطليه .

١٥٦٢٧ شَمَرَاخ

Hampe (F). Stem, Flower-stalk (E).

عضو نباتي قمرس الانتساب متصبا الجلبوس يحمل الزهار وقد يتوب من الساق في بعض النبات .

١٥٦٢٨ شَمَرَاخِي

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ساقه كالمشروع او الزناد .

١٥٦٢٩ شَمَرَاخِي الزهر

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ازهاره شمراخية الارتكاز .



شام



شام اصفر



شام حبي



شام مصري



شبن

١٥٦٣٧ - شَمْرُوسٌ لَدِيدٌ * طَرْنَائِيَّةٌ لَذِيذَةٌ
Tornelia delicosa (S). Tornélie délicate (F).

نوع من الشمرس الشائع الاستهلاك الزراعي المركزي. ساقه مدادة تطول من ٦ إلى ٨ أمتار. أوراقه شبه قلبية الشكل عريضة التفريغ والتشريح ، مستطيلة الزناد. نصلها مائل أبشرة ، جامد التشريح ، شديد الخضار . ثماره أكرار غروبية طولا نحو ٢٠ سم. وقطرها ٤ سم. ثمره خضراء اللون ثم تتحول مع الإدراك إلى الاصفر فإلصاف. وهي سكرية المذاق لذيفة الطعم فواصة العرف الطري المستحب .

١٥٦٣٨ - شَمْرُوسٌ مُشَامِسٌ
Marsdenia (S). Marsdenia (F).

جنية ممررة جاحدة تملو من ١٢٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها منتصبة فراء ، أوراقها معتقة ، متعاقبة ، بيضبة الشكل ، مقطوعة القاعدة ، ذلقة الزام الأخير . نصلها جبل الخضار اللامع . أزهارها ضمية التجميع ، عابجة اللون ، عطرية العرف الفواح للمستحب || أزهارها يستمر من أيار إلى تموز .

١٥٦٣٩ - شَمْرُوسٌ الْكَندُورُ
Marsdenia condurango, Genolobus condurango (S).

Marsdenia del condor, Genoloba del condor (F). نوع من الشمرساض. جنية ممررة طيبة من فصيلة السقليات. منتبها بعض مناطق أمريكا الجنوبية المتاخمة لخط الاستواء. يكثر وجودها في البر و جبال الكونديليبار على ارتفاع يراوح من ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ م. عن سطح البحر || ساقها سريعة مدادة ومسلقة تطول نحو أربعة أمتار. أوراقها معتقة ، معتقة ، قصيرة الاذنق. نصلها أحليجية الشكل ، مدبة الاطراف. أزهارها ثوردي التجميع ، أبطي الانتكاز. أزهارها صغيرة معتقة ، خاسية البتلات ، وردية اللون ، مستحبة العرف الفواح || خلاء جلورها مواد مقوية مرة للمذاق تدعى كنديريت وكنديورجين تستعمل في معالجة الملل السرطانية .

١٥٦٤٠ - شَمْرُوسٌ *
Drymoxa (S). Drymoxa (F).

جنس طير من الجوارم سفيات المنابر ينتمي إلى فصيلة البجعيات. أنواعه المعروفة نحو ٧٠ أعطائها تمتد من إفريقيا الشرقية إلى الجزيرة العربية والشرق الأوسط وأروبة الجنوبية. جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، قريبة الشبه بالبعسل. أثوابها ثنائية اللون. ظهورها إلى الكهبة أو الريدة الزرجونية المولج . بطونها إلى الصفرة أو البياض النقي || مستطها من الطيور المحيولة الصارفة . تدن في الانجار الزرقية وبين الصخور الناتقة . عاشائها قدسية الشكل ، متينة الرباط . أتاها تقص من ٤ إلى ٦ بضات تحضنها نحو ١٥ يوماً بمثابة الذكر .

١٥٦٤١ - شَمْرُوقِيَّيسٌ *
Thyaira batis (S). Thyaira batis (F).

حشرة من فصيلة الشمروقيات وردية سرفقيات الإبتحة. موطنها الإقليم المتدلة الحارة من العالم القديم. فراشها جارية قوتها رقيق الاوزار . سرفقا خاضعة تموش على أوراق العوج والسريرين || جنبها متروسة القد يعول نحو ١٧ م. يسقطها نحو ٣٨ م. رأسها معتدل الجرم . عيناها

١٥٦٣٠ - شَمْرُوعِيَّةُ الشَّكْلِ
Scapiforme (F). Scapiform (E).

نمت تعريفه يطلق على كل ساق نباتية شكلها كالشمرغ أو الزناد .

١٥٦٣١ - شَمْرُوعِيَّةٌ هِي الشَّار ، اطلبه .

١٥٦٣٢ - شَمْرُوعِيَّةٌ بِحَرِيَّةٌ *
Crithmum (S). Crithme, Fenouil marin, Perce-pierre, Passe-pierre (F). Samphire, Sea fennel, Peter's cress (E). Soebazilkraut, Meerfenchel (D). Erba corda, Finocchio marino, Baciola (I).

نبات حشبي. يري معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة النجيات ينبت على حصور الشواطئ البحرية . أوراقه سنائية خلية شبيقة النصل البحري اللون تظل وتستعمل كاشئ الحلاثل .

١٥٦٣٣ - شَمْرُوعِيَّةٌ هَرَّةٌ ، أَثَلُ شَمْرُوعِيَّةٌ هَرَّةٌ
Thlaspi arvense (S). Thlaspi des champs, Herbe aux écus, Térapic amer, Monnoyerre, Tabouret (F). Mithridate mustard, Penny-cress, Wild-cress, Feldpfennigkraut (D). Tispi, Erba stars, Mil-le flore (I).

نوع من الاندلسية من فصيلة الصليبيات ، وهي من النباتات العشبية البرية التي تكثر في البر ووتيد في الحقول المزروعة . أوراقها خلية النصل الكامل . أزهارها عطيفة التجميع ، ناجية الانتكاز ، وردية اللون ، يقال أنها لا تغل من بعض المناخات البلية .

١٥٦٣٤ - شَمْرُوسٌ
Metrosideros (S). Metrosideros (F).

جنس نباتات جنية برية ممررة من فصيلة الأسيات. أنواعها المعروفة مدبة ، مهدها يمتد من الهند إلى جزر الزايج || ساقها منتصبة ، فراء . أوراقها متعاقبة معتقة ، بيضبة النصل الصغيرة الجامدة . أزهارها لاقياسية التجميع ، محورية أو أبيلية الانتكاز ، طرية الاذنق ، خاسية البتلات الصفرة ، مستطيلة الاسدية ، مستحبة العرف .

١٥٦٣٥ - شَمْرُوقِيَّةٌ
Hymenocarpus circinatus (S). Hymenocarpa (F). Hymenocarpus, Circular Medick (E).

نبات عشبي ، بري ، حولي ، وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرنيات القرائية . منته بعض اصقاع سواحل البحر الابيض المتوسط انحصا المدة من انطاكيا إلى غزة || ساقها فراء زباد تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها خلية النصال ، الصغر كاملة ، عطيفة الشكل ، قرصية التجميع ، أما العليا فركبة ، وقرية ، خاسية الورديات أو قاسية . الوردية الانتهائية دائما أكبر من رديقاتها || أزهارها أبيلية الانتكاز ، مستطيلة المالحق ، صفراء اللون || تنويرها يستمر من آذار إلى أيار .

١٥٦٣٦ - شَمْرُوسٌ ، طَرْنَائِيَّةٌ
Tornelia (S). Tornélie (F).

جنس نباتات سريعة مدادة ممررة من فصيلة التلقليات. أنواعه المعروفة ١٢ ، ساقها اسطوانية متتابة السلايات القصيرة ، المنتسبة ، الجفريه المقه . أوراقها مستطيلة الزناد ، كبيرة النصل الفارش المزروع والتصنيف والمتابع التشريح . ثماره أكرار خضراء اللون ، غروبية الشكل ، مستطيلة وتتركز حل مالحق أبيلية الانتكاز غليظة .



شوة بخريه



شوة مرة



شمرس لذيد



شمر



شمروقي بيس

١٥٦٥٠ - شَمْبِيل رَوَّاح

Trogophloeus riparius (S). *Trogophléen russe* (F).
Trogophloeus riparius (E).

حشرة نائلة قانصة من فصيلة الدَّيَّانِيَّة وَرَبَّة مُعدَّات الاجنحة. تألف شفاه مجري الماء. قوتها المواد الصُّفوية والديَّان || جسمها صغير القُد يُطول من ٥ الى ٦ م. ثوبها اسود باستثناء الظفرون والجرانز وثوبها قانها بـجُوية. وأُصها صغير الحجم قصير المنظر. زيانها عيطان. عيناها كيرتان جاسطان. ظفروها صغير القُد لا يلمس أكثر من حسي البطن. ارسافها خمسة السفل || لما جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في نيسان وتعيش حتى آب. تسرح في البهار. تصاد بعد ظهورها بنصر اربعة اسابيع وتضع للمكان لثغراً مستطيلة تتلفها مادة غروية تصلبها بالصمغيات السفل من نصال الاوراق || الشكل = ماس الشفار. ثوبها الى الطحلة السوداء طولها سبعة عسوط متعرجة جانبية جُوية. وأُصها الى الجارية. السرعة تطول من ٣٥ الى ٤٠ م. جسمها شبه اسطواني ينصر نحو ١٥ يوماً يتغني بين وقتين تصبها السرعة وتربطها بجيوط حريرية.



شمبيل رَوَّاح

١٥٦٤٢ - شُرُوبِيَّات

Thytridae, *Cymatophoridae* (S).
Thytridae, *Cymatophoridae* (F). *Thytridae*,
Cymatophoridae (E).

فصيلة حشرات فراثية من حرشفات الاجنحة. اجناسها وانواعها المروقة نحو ١٥٠ معظمها من حشرات الاكامل المعتدلة الحرارة المنزوعة نحو الباردة || اجسامها رشيمة متوسطة القد او صغيرة. وذووسها صغيرة. عيونها زنجية جرداء. قرنها الاستشعارية خيطية او شطبية. ملاسها صغيرة مرطاة الاطراف. مراضها مستطيلة. بطونها كثيفة الخمل والذب. حذائها جانبية الارتكاز تقع عند قاعدة البطن. ورائنها الامامية الحول من الخلفية وأقل استدارة منها وأكثر بقبجياً وزركمة. جراثمها وباعية المناسخ. مكثها مذكور. اساريها عريضة. خادراتها تلتصق بنصال الاوراق التي تجمعها الى بعضها البيض يجيوط حريرية || اشهر اجناسها المشروق والروش والقيتل والهروسين.

١٥٦٥١ - شَمَط

Coupage (F). *Diluting* (E).

خلط بعض السموم ببعضها لفرس ما.

١٥٦٥٢ - شَمْع عَسْكَي عَسُو

Cire (F). *Beeswax* (E).

هو موم النسل مادة شمعية يفرزها النحل لبناء خلاياه.

١٥٦٥٣ - شَمْعَدَان ، مَالِكَة

Candéfabre (F). *Candelabrum* (E).

شكل من اشكال التشلوب غامس بالانجار المسند.

١٥٦٥٤ - شَمْعَكَة

هي الاغراب ، اطليه.

١٥٦٥٥ - شَمْعِيَّات

Myricaceae (S). *Myricacées* (F). *Myricaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. انواعها نحو ٣٠ ،

يجمعها جنس واحد. نباتاتها اجار وشجيرات فراء السوق.

اوراقها صغيرة القُد ، جامدة التصل ، تفرز مادة شمعية

تستخرج بقل الاوراق في الماء.

١٥٦٥٦ - شَمْعِيَّة ، شَجَرَة الشَّع

Myrica (S). *Myrica*, *Cirier*, *Arbre à la cire* (F). *Bayberry*, *Candle berry myrtle* (E). *Wachsgel*, *Wachsmirica* (D). *Mirica*, *Albero della cera* (I).

جنس اشجار وشجيرات من فصيلة الشقيبات. انواعها

المعروفة ٣٠ ، جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة.

اوراقها ابيدة ، متناحية ، مستطيلة الشكل ، صغيرة القُد.

تصلها جامد التسنج ، كثيف المسام الشمعية. انزوارها

سنبلي التجميع ، متراكب السفيالات. انزوارها صغيرة

القد خضراء اللون. ثمارها نووية لحية رشيمة السمية.

انجارها سريية للسوق ترطب في الاراضي الرطبة وتستعمل

في اصلاح منامات المنافع || اشهر انواعها الشمعية

الثالثة والعشرين والمطر والقالية القوق.

١٥٦٥٧ - شَمْعِيَّة

هي لبدة النين ، اطليه.

١٥٦٥٨ - شَمْعِيَّة الحُمْفِيَّات

هي لبدة الحُمْفِيَّات الصفيّة ، اطليه.

١٥٦٤٣ - شَمْس

Soleil (F). *Sun* (E).

الشمس جرم سماوي تدور الارض في فلكه حل بمد

١٧١٣١٠٠٠٠ كيلومتر. والشمس التي تعتبر مصدر

الحياة حل الارض بما تبته من حرارة وضوء هي جسم

ناري يقدر قطره بنحو ١٦٠٠٠٠٠٠٠ كيلومتر وتقدر

حرارة الباطنية بنحو اربعين مليون درجة وحرارة السطحية

بنحو سبعة الاف درجة || ويتنقد بعض الفلكيين ان

مصدر هذه الحرارة الرواجية الطانصة هو الطاقة الحرارية

الناتجة من تحطيم جزئيات العناصر التي تتكون منها والتي

تتوف بالكهرباء || اما مدة دورة الشمس حول محورها

من الغرب الى الشرق فتتم في ٢٥ يوماً.

١٥٦٤٤ - شَمْعِيَّات

رَبَّة كائنات حيوانية مجهرية من الجذريات.

١٥٦٤٥ - شَمْعَدَان

هو البقس ، اطليه.

١٥٦٤٦ - شَمْعَدَان الحُمْفَر

هو البقس الدائم الخضرة ، اطليه.

١٥٦٤٧ - شَمْبِيل

هو الغيل ، اطليه.

١٥٦٤٨ - شَمْبِيم

هو المنزور البري ، اطليه.

١٥٦٤٩ - شَمْبِير

هو البقس الدائم الخضرة ، اطليه.

١٥٦٥٩ - شَمِيَّة شَامِيَّة *

Myrica communis (S). *Cirier commun*, *Myrica commun* (F).

نوع من الشمية وهي شجيرة سريرية تملو نحو ٤ أمتار. ثمارها نورية صغيرة للقد، بإذنيان اللون، شمية الغشاء، أوراقها عطرية تستعمل في صناعة الحبر الأسود. أما ثمارها فيستعمل كالشعير ويدخل في صناعة الصابون. يقال أن جنودها لا تلحق من المنافع الطبية.



شمية شامية

١٥٦٦٠ - شَمِيَّة صِيَّة *

Myrica edulis (S). *Myrica comestible*, *Cirier comestible* (F).

نوع من الشمية وهي شجيرة سريرية تملو نحو ٤ أمتار. مهدا البلاد الصينية، ورتب في المواقف المشدلة الرطوبة. ثمارها مأكولة مستحبة الطعم، صغرة اللون أو صفراء.



شمية صيية

١٥٦٦١ - شَمِيَّة عَطْرَة *

Myrica gale (S). *Galé*, *Piment royal*, *P. aquadque*, *Myrce bicard* (F).

نوع من الشمية وهي شجيرة سريرية كبيرة اللد تملو نحو ٨ شرة أمتار. أوراقها عطرية تستعمل في غسيل الثياب ولغظ الإثنية من حبث بعض الحشرات كالعث.



شمار

١٥٦٦٢ - شَمِيَّة قَلْبِيَّة الْوَرَق *

Myrica cordifolia (S). *Myrica à feuilles en coeur* (F).

نوع من الشمية وهي شجيرة مشدلة اللد تملو نحو ٨ أمتار. أوراقها قليلة الشكل، يستخلص منها شع أحمر اللون يستعمل كالشعير المادي ويدخل في صناعة الصابون.

١٥٦٦٣ - شَمِيَّة *

Biophylaxie (F). *Biophylaxie* (F).
الشمق يبرولوبيا مجموع وسائل المقاومة الممكن أن يجمها الجسم لفصان عاقبة ونشاطه.



شمندر بري

١٥٦٦٤ - شَمِيل *

ما يتبي في اللخل بعد قطفه. ج. شاميل. والثاليل هي طوق النمل الباقية.

١٥٦٦٥ - شَمِيلِي *

Palaearticque (F). *Palaeartic* (E).

نمت تعريف يطلق على كل ما هو خاص بالمنطقة الشمالية من العالم القديم، أي من آسيا وأوروبا.

١٥٦٦٦ - شَمِنْدَر *، شَوَكْدَر، بَشَجَر، صَوَطَلَة *

Beta vulgaris rapa, *B. rapa* (S). *Betterave* (F). *Bent-root* (E). *Echter Mangold*, *Rübe* (D). *Barbabetola* (I).

نبات عشبي زراعي يحول من فصيلة السرمقات. ضروب وأصنافه كثيرة للعد تقسم إلى ثلاث فئات. فئة الضروب البقية التي تستعمل للأكل وللحلات وفئة الضروب السكرية التي تستعمل لاستخراج السكر والثنا وفئة الضروب الملحية التي تستعمل لنداء الماشية || جنوده ضمة لبانية مختلفة الأشكال والأحجام، ساقه لينة فراء تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقها الجفينة قرصية الانتساب كبيرة النصل، غليظة الصلح الحمر، متعجبة التسنج، مائة البشرة، عاقبة الخضار. أثماره خنثوية خاصة للتركيب.



شمولة

ثمار حبوب مقرقة، جافة، شاذة، تلتف بعض البزور الصغيرة للقد، الكلولية الشكل، السراء اللون. والثوادر رغب في الآرية للتوسط الانتماج والرطوبة الميعة الثور وهو ينشئ الآرية الجسية والصلصالية للتعجدة وكل تربة جافة عادية الاحتفاظ بالرطوبة. يزرع عادة في أول الثروة الزراعية مها كان قوامها



شميلة

أن ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. وهو في الزراعات الكبيرة يغزو مباشرة في التربة على خطوط مساوية الإبعاد. أما في الزراعات البستانية فينبذ في شتات خاصة ثم ينقل إلى مستقره عندما يبلغ ارتفاع شتله (بوارشه) نحو ١٥ سم. أما معاملته الخاصة في الفترة الثنائية بين الفرس وبني الحصول فمهادها حرق وتعشيب وري.

١٥٦٦٧ - شَمِنْدَر بَرِي *، شَوَكْدَر بَرِي *

Beta silvestris (S). *Betterave sauvage* (F). *Wild beet* (E). *Wildier mangold* (D). *Bietola selvatica* (I).

هو الشوادر البري الذي ينشأ في المناطق والأراضي الرطبة. وهو من النباتات الحولية، جنوده صغيرة دقيقة تكاد تكون متفرقة. أوراقه القرصية ضيقة النصل المستطيل، ساقه منتسبة قليلة الفروع تملو من ٤٠ إلى ٧٠ سم.

١٥٦٦٨ - شَمِيْدَاد *

Laminoir (F). *Flattening-mill*, *Rolling-mill* (E).

الشهادة آلة لتصفيع المدن وتحميده.

١٥٦٦٩ - شَمِيْدَكَة *

Laminage (F). *Laminating*, *Flattening* (E).

الشهادة طريق المدن لتصفيعه أو تحميده.

١٥٦٧٠ - شَمَوَا *، قَدَر، قَادَر *

Rupicapra tragus (S). *Chamois* (F). *Chamois* (E).

حيوان من الظباء الحشرية، وسيد الجبال والفرع شبه بالمر والأوربي يتميز بقرنيه المجولين الأضيقين. أذناه منتصبان. عقه مستطيل. جرمه ضخمة قوية، ذنبه شديد القص. أثناء ثنائية الخلف. ثوبه يتغير مع فصول السنة والسن إلا بطة الدائم البياض لا موطنه جبال أوروبا وآسية الصغرى. يأنف الأماكك الوصر، يعيش على حدود الثلج، أثناء قطع جدياً واحداً رصمه ٣ أشهر وتحضنه حولاً كاداً.

١٥٦٧١ - شَمُور *

Diamant (F). *Diamond* (E).

هو الماس، أطلبه.

١٥٦٧٢ - شَمُول *

Mûre (F). *Mulberry* (E).

هو ثمرة التوت وما شاكلها من الثمار كاشليك... أما ثمرة العليق وأتباعه فتدعى مصة.

١٥٦٧٣ - شَمِيدَلَة أُسُوبِيَّة *، الْوَلِيل *

Allophylus, *Schmidella* (S).

Allophylus, *Schmidella* (F). *Allophylus* (E).

جنس نباتات مشجرة معمرة من فصيلة السابنديات. أنوعها المعروفة خمسة أصنافها البلاد الحارة من الماين القديم والجنيد. يسميها أثمار صغيرة الحجم، مظلية الشكل. أثمارها متعاقبة مركبة ثلاثية الوريقات. وريقاتها بيضيه النصل المسن الحارة. أثمارها أبلي الارتكاز، سبلي التسجيع. ثمارها كروية الشكل واللد، مستحبة الطعم، سكرية المذاق || أشهر أنواعها الزراعية الثلاثة التالية:

١٥٦٧٤ - شَمِيدَلَة أُسُوبِيَّة *، الْوَلِيل *

Allophylus cobbe, *Schmidella serrata* (S).

مهدا البلاد الآسيوية الحارة. ثمارها برتقالية اللون، مأكولة.

Allophylus, *Schmidella* (F).

على غصن الأنهر والبحيرات. يشن وكه الذي يبلغ قطره نحو ٢٠٠ سم. حل القربة وصل السنور وفي ثم الإبحار اليابسة. أثناء تبويض من الرقتين إلى الثلاث رقتات تحضنها بسدح نحو ٥ أسابيع.



شبة البحر

Chen (S). Chen (F). ١٥٦٨٢ - شين °
جنس طير من فصيلة القدم فضيلة الخريزات. انواعه المعروفة ثلاثة موطنها المناطق القطبية تجرما كل عام وقد تقترب من المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة لكنها لا تقيم فيها أكثر من أسبوعين أو ثلاثة || أبيضها كبيرة القد. إرسافها أطول من إرساخ الورق العادي. مناديلها رقيقة الأطراف المنددة هرا. أنوبها سوية اللون الأبيض تملوه بعض الزخارف التي تختلف باختلاف الأنواع || تدفن في أعاصيص تحفنها بين صخور الجبال. التي تقع في ١٠ إلى ١٢ بوصة تحفنها بمناديل للذكر نحو ٣٠ يوما. أشهر أنواعه شن الشمال الأصبي.

١٥٦٨٣ - شين الشمال الأصبي ° ورة

Chen hyperboreus (S). الدميك °
Chen hyperborea, Oie des neiges (F).
Snow goose (E).

نوع من الشن وفصيلة الخريزات. أعطانه مسط مناطق القطب الشمالي، ملجته الحياتي جاعي || جسمه كبير القد، أبيض الثوب، أسود أطراف القوائم، أنهب الحجمة، أحر الالك الملوي من المنقاد، أبيض السفلى، إرساخ الملقط أي الطرف. أحر الجفون. كشي الخدقة. أصفر الزرع والقدم.

١٥٦٨٤ - شتار Bartaville, Perdrix bartavelle
هو الجبل الربوي، أطله.

١٥٦٨٥ - شتاش ° موكيدي

Naturaliste (F). Naturalist (E).
الشتاش العالم بالطبيعات أو التاريخ الطبيعي أو علم المواليد.



شن شمال الأصبي

١٥٦٨٦ - شينافه ° Polymerisation (F).
Polymerization (E).
هي انقسام أو امتزاج ذرات متشعة في مركب تنتج عنه خواص طبيعية وكيميائية مختلفة.

١٥٦٨٧ - شينافه ° Pleurs (F). Tears (E).
الذبح الذي يقطر من الشجرة عند حز ساقها أو تقليم أغصانها وقصبتها. ويصق أيضا للدماغ.

١٥٦٨٨ - شينافه °
والأمانة الإلميسية ليس لها نوى وأما هي ماء في قشر على شقطة الحب من غير حجم °. (اللسان).

١٥٦٨٩ - شينافه ° Fleurs de coquelicou (F).
Flowers of colchicum (E).
هو زهر السورتيان

١٥٦٩٠ - شتوت أسود الرأس °
Amphimallus ater (S). Amphimallus ater (E).
شجرة غاصلة عضوية المرح من فصيلة الجبلديات وريقة مفصلات الاجنحة. موطنها مسط اقالم البلاد المعتدلة



شتوت أسود الرأس

١٥٦٩٥ - شينافه أفريقية °، أفويل أفريقي °

Allophylus zayanicus, Schmidalia africana (S).
مهددا أفريقيا الشرقية وسرديله والمند. ثمارها ابروانية اللون مستحبة اللحم.

١٥٦٩٦ - شينافه مأكولة °، أفويل مأكول °

Allophylus edulis, Schmidalia edulis (S).
مهددا البرازيل. ثمارها حراء اللون لذيذة اللحم.

١٥٦٩٧ - شينافه ° ميكروميريا

Micromeria (S). Micromerie (F). Micromeria (E).
Barcaurel (D). Micromeria (I).
جنس لبيانات عشبية برية وريدينية من فصيلة الشفويات اوراقها صغيرة القد متعاقبة. ازهارها معتدلي التجميع، ابلي الارزكاز. ازهارها صغيرة الحجم، تصيرة الحائلي، دقيقة الامن. فيها الابيض والاخر والازرق والمرط. أشهر أنواعه التريدينية ما يلي.

١٥٦٩٨ - شينافه الوعر °

Micromeria rupestris (S). Micromeria rupestris (F).
نوع من الشينافه المعمرة تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ساقها قرمضا مزغيرة. اوراقها بيضيه التصل المقرق المتعاقبة تطلو نحو ٨ سم. ازهارها الك الابيض المرط بالازرق. ازهارها يسمر من حزيران إلى تموز وهي من لبيانات التي ترضب في الاراضي الوعرة تعيش بين الحجارة والصخور وفي جميع الاماكن المعرضة للشمس.

١٥٦٩٩ - شينافه كرواتي °

Micromeria croatica (S). Micromeria de Croatie (F).
نوع من الشينافه المعمرة تملو نحو ٢٠ سم. ساقها قرمضا زاه. اوراقها قلبية الشكل، لائحة البق، تطلو نحو ١٠ سم. ازهارها حراء اللون او وردية، مستطيلة الامن المعققة || ازهارها يسمر من ايار إلى تموز.

١٥٦٩٠ - شينافه الأذهر

Pygargus leucorhynchus (S). Pygargus leucorhynchus (F).
Sea eagle (E).
طائر من الشياط ينتمي إلى عمارة العقاب وفصيلة الصقريات. موطنه الشرق يحميه من تركيا إلى الصين ومن الهند إلى سيبيريا، طوله نحو المتر. الانثى أكبر حجما من الذكر. ثوبه إلى السرة البيضاء، رأسه وذنبه إلى الأبيض الباهي، بطنه متشن الريش بالأبيض || يألف غصنات الأجر والبيهرات. يشن هن في ثم الإبحار اليابسة.

١٥٦٩١ - شينافه شاككة °، عقاب الشط °
Haliastur albicollis (S). Pygargue vulgaire, P. à queue blanche (F). White tailed eagle (E).

طائر من الشياط ينتمي إلى عمارة العقاب وفصيلة الصقريات. طوله نحو المتر. ثوبه يختلف مع السن يرتكز حل كسرة. بطنه متشن بالأبيض ونسبة الأبيض في الريش تزداد حولا بعد كل تخير. رأسه ومقبعه إلى السرة البيضاء، ذنبه أبيض، منقاره وفخاذه صفر || موطنه فسح الاجراء بحوب البلاد الآسيوية والاوربية والأفريقية الشمالية والامريكية. يألف السنور البحرية والإبحار القائمة

مهددا وروي حوض البحر المتوسط . توجد في الاراضي المذابة . جذورها غضائية يستخرج منها صباغ احمر شائع الاستعمال البيولوجي والصناعي .

١٥٦٩٧ - شنجبار مَثَلَتِ الزُّرْنَان

Onosma albo-roseum (S). *Orcanetta tricolora* (F).
نوع من الشنجبار الترنيني الممرس . يعلو نحو ٢٥ سم .
اوراقه اعليجية الشكل ، نصلها مقطوم القاعدة اخضر اللون .
ازهاره كبيرة اللد تطلو نحو ٥ سم . تلو يفسد اللون
ثم يتصرف الى الاحمر الدموي وتتغير حل الازرق .
انفران يستمر من ايار الى حزيران .

١٥٦٩٨ - شنجبار تجمبي

Onosma stellulatum (S). *Orcanetta étoilée* (F).
نوع من الشنجبار الترنيني الممرس . ساقه فراءه تطلو نحو
٢ سم . اوراقه اعليجية ، مستطيلة ، ملتفة اختار .
نصلها الى الخضار البحري الباهت تلو يبق من الزغب
كالحطب نجمية الشكل . ازهاره الى الصفرة الكبريتية يعلوها
مواج اخضر || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

١٥٦٩٩ - شنجبار هرمي

Onosma pyramidale (S). *Orcanetta pyramidale* (F).
نوع من الشنجبار الترنيني الممرس . هرمي الشكل ، فصي
اللون ، يعلو من ٥٠ الى ٦٥ سم . ساقه فراءه زباد للحاء .
اوراقه الجلمعية سنائية النصل تطلو من ٢٥ الى ٣٥ سم .
وتعرض نحو ٢٥ سم . ازهاره خلية البشرة تبدو ارجوانية
اللون ثم تتصرف الى الليملي || ازهاره يستمر شهراً واحداً
يبتدىء في اوائل تشرين الاول .

١٥٧٠٠ - شنجبار أنجبيا

Lithospermum (S). *Grémil* (F).
جلس نباتات شدية برية وترينينة مصر من فصيلة
الحسبيات . انولمه ٣٠ سمها اشباب فراءه السوق .
اوراقها متعاقبة صغيرة اللد ، ضيقة النصل . ازهارها
مقنودة التجميع ، محورية وطريقة الارتكاز ، مختلفة
الالوان . بزورها صلبة ، فباءه اللون ، لامة كالكولم .
اشهر انواعه ما يتبع .

١٥٧٠١ - شنجبار أبيض

Lithospermum canescens (S). *Grémil blanchâtre* (F).
نوع من الشنجبار الترنيني . ساقه وفروعها زباد للحاء .
تطلو من ٢٥ الى ٤٥ سم . اوراقه لائقة خيطية مستطيلة .
ازهاره الى الصفار التبي . ثماره بيض || ازهاره يستمر
من نيسان الى حزيران .

١٥٧٠٢ - شنجبار الحقل ، حكمة

Lithospermum arvense (S). *Grémil des champs*, *Lithosperme* (F). *Corn-gromwell*, *Bazard alkannet* (E).
Ackersteinssame, *Korngift* (D). *Lithospermo*, *L. del camp*, *Strigolo selvatico* (I).
نوع من الشنجبار البري يعلو نحو ٥٠ سم . اوراقه
لائقة ضيقة ومستطيلة . ازهاره حمراء اللون . بزورها طرية .
جلوره غضائية ، صباغها احمر اللون .

١٥٧٠٣ - شنجبار مخزني * حبة القلب ،

كأسر الحنجر ، حادوم

Lithospermum officinale (S). *Grémil officinal*, *Herbe aux perles* (F). *Common gromwell*, *Pear Plant* (E).
Echter steinsame, *Perlenkraut* (D). *Lithospermo*
officinale, *Erbe della parte* (I).
نوع من الشنجبار البري يعلو من ٢٥ الى ٤٥ سم .
اوراقه ضيقة النصل المزهر الصفرة . ازهاره ودية اللون ،
خلية البشرة . بزورها لؤلؤية طرية قدر اليل .

الخامرة من الشرق الاوسط واروية . تأت الحشاب والاراضي
المذابة التي يغطي عليها عنصر الجبس . غنائها تمش
حل اوراق الاعشاب . يرقاتها تقضم جلور التجليات
ويغرها من النباتات السمية || جسمها متوسط اللد ، يطلو
من ١٢ الى ١٤ سم . ثوبها ثنائي اللون اسود الرأس والكول
والعين ، بني الظهر والجرايز . رأسها صغير الجرم ،
زنانها مرقبة التركيب ، شاربيا الفص ، وبقيا الاطراف .
كوسها خلي الصفحة . اسافها خاسية الفل ، عصبة
الحالب || الاثني اميز قدماً من الذكر واهت ثوباً منه
واضح بلفاً واعطى سراً || لها جيل واحد في الحل .
تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار ويبقى حتى اوائل
آب . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند تمام
نموا قريبة للشبه بالودعة البيضاء . جسمها مقوس الشكل ،
مستطيل الرأس الامور ، مستصم الطرف ، ابيض اللون ،
اغبر الموج ، صلب التكنين ، اسمر الرواجب المهدبة
الاطراف || طور الاكمال يستمر نحو ثمانية اسابيع .

١٥٦٩١ - ششركة ، ششركة

Palmure (F). *Web-footed* (E).
هي الخياط مادة جلدية او غشوية تجمع ما بين
اصابع الطير وبغيره من الحيوان . ج شتار .

١٥٦٩٢ - شنجبار

Oncosma (S). *Orcanetta*, *Orcanète* (F). *Orcanet* (E). *Orcanetto* (D). *Organetta* (I).
جلس نباتات برية وترينينة من فصيلة الحسبيات . انواعه
٢٠ سمها . ساقها فراءه مهدبة للحاء . اوراقها متعاقبة
نصلها خلية البشرة او نجمية الزغب . ازهارها خلية
البرقيات مختلفة الالوان فيها الالبيض والاحمر والوردي
والازرق || اشهر انواعه المعروفة ما يلي .

١٥٦٩٣ - شنجبار أرميني

Oncosma bourgasi (S). *Orcanetta d'Arménie* (F).
نوع من الشنجبار الترنيني السروتي . منته ارمينية يعلو
نحو ٣٥ سم . ساقه فراءه . اوراقه سنائية الشكل نصلها
مقنود القاعدة ذات الطرف . ازهاره مدلاية يفسد اللون .
ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٥٦٩٤ - شنجبار البر

Aikanna tinctoriale (F). *ششركة* (F).
هو الكتان الصباغي ، اعطيه .

١٥٦٩٥ - شنجبار حوريري

Oncosma sericeum (F). *Orcanetta soyaute* (F).
نوع من الشنجبار البري الممرس . ساقه مسطحة تطلو نحو
٣٥ سم . اوراقه اعليجية الشكل ، زباد للنصل . ازهاره
صفراء اللون ، خلية البشرة في جميع اعضائها || موطنه
خضاب وسبال الشرق الاوسط . يمتد من الاناضول الى
جبال ايران || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٥٦٩٦ - شنجبار صباغي * ، أنشوركة صباغية

Oncosma echinoides, *O. tinctoria* (S). *Orcanetta*
viperine, *O. tinctoriale*, *O. de Provence* (F). *Dyer's*
bugloss, *Dyer's orcanet* (E). *Färbereichsenzunge* (D).
Organetta tinctoria (I).
نوع من الشنجبار البري والزراعي الممرس . جلوره ليمية
عشوية لونها الى الجفوة . ساقه فراءه تطلو نحو ٤٥ سم .
اوراقه صنية ، لسة ، مقنودة القاعدة . ازهاره خضرية
ابنية متعاقبة الارتكاز يعلو فيها الاصفر الالبيض الموج .



شنجبار صباغي



شنجبار مخزني

١٥٧٠٤ - شَجِيرَا مُسْتَح

Lithospermum prostratum, *L. diffusum* (S). Grémil couché (F).

نوع من الشجيرات الزينية البروتية المعمر. يعلو من ١٠ الى ٥٠ سم. ساقه غشوية، مسطحة، حموية. اوراته خفيفة، نصلها يمرض من ٢ الى ٤ سم. ازهاره خلية الصفرة الاخادية، لونها الى الازرقه البنفسجية. ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

١٥٧٠٥ - شَجِيرَا مَلُون

Lithospermum purpureo-coeruleum (S). Grémil pourpre et bleu, Thé d'Europe, T. des bois (F).

نوع من الشجيرات الزينية البروتية المعمر. يعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم. اوراته خفيفة النصل تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ سم. ازهاره تبدو قرمزية اللون ثم تتحول الى الساجوني المايق. اوراته تتصل استمال الشاي ويعد مادة ليل. يعيش في جميع الارية وقد يجود في المراتع المعتدلة بالتعرض للشمس || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران.

١٥٧٠٦ - شُتُلُوب

فقرة ظهر البعير. *Vertèbre dorsal du dromadaire*.

١٥٧٠٧ - شُتْدَاب *

Eryngium (S). Panicaut, *Eryng. Eryngion, Chardon Roland* (F). *Eryngo* (E). *Mannstreu* (D). *Eringo, Cardo stellaris, Socere* (I).

جنس نباتات عشبية شائكة معمرة من فصيلة الخيليات. انواعها كثيرة العدد، بعضها فراءة متشعبة. اوراتها مفردة شائكة شديدة الحصار. ازهارها وريسية التجميع مختلفة الالوان فيها الازرق والايضا والاخضر || اُعرف انواعها واشهرها مايلي.

١٥٧٠٨ - شُتْدَاب اِكْرِي

Panicaut de Crète (F). هو القرصمة، اطلبها.

١٥٧٠٩ - شُتْدَاب اَلْبِي

Eryngium alpinum (S). *Panicaut des Alpes* (F).

نوع من الشتداب، يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراته قليلة الشكل تطول نحو ٢٥ سم. وتعرض ٢٠ سم. نصلها عايق الحصار، ازرق المواجه، اشراك حصار دقيقة متبادلة. ازهاره قليلة العدد زرقاء اللون || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.

١٥٧١٠ - شُتْدَاب اَتْناسِي اَلْوَرَك

Eryngium bromeliaceifolium (S). *Panicaut à feuilles de broméliacées* (F).

نوع من الشتداب، يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقه غليظة ريانة الانشاب. اوراته انناسية الشكل واللون تطول نحو ٥٠ سم. ازهاره الى الياض يعلو مروج اخضر || ازهاره يدم طول شهر تموز.

١٥٧١١ - شُتْدَاب يَحْمَرِي، غِيَّة العَتَر

Eryngium maritimum (S). *Panicaut maritime* (F).

نوع من الشتداب، يعيش على الشواطئ البحرية، يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراته مسنقة، عميقة التفريغ، جامدة النصل المسن الشائك. لونه الى الحصار البحري الازرق المائج || ازهاره الى الزرقه الساجونية الباهتة. ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

١٥٧١٢ - شُتْدَاب جَبَل

Eryngium giganteum (S). *Panicaut géant, Grand chardon* (F).

نوع من الشتداب، يعلو نحو ٢٠٠ سم. ساقه خرامه متشعبة. اوراته مفصصة وبغرفة. نصلها جامد الصلابة، متباد التسنين، قوي الشوك. ازهاره كبيرة لينة، وريساتها قليلة التجميع، لونها الى الزرقه الزاهية || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

١٥٧١٣ - شُتْدَاب جَمْسِي، شَوْكَة زَوْكاه

Eryngium amethystinum (S). *Panicaut améthyste* (F).

نوع من الشتداب، يعلو نحو ١٠٠ سم. اوراته خامة التفريغ، جامدة النصل البحري اللون، حار. متباد التسنين مستطيل الشوك. ازهاره ويواج اوله الى الزرقه الجسيتية || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

١٥٧١٤ - شُتْدَاب عَاجِي

Eryngium eburneum (S). *Panicaut ivoirin* (F).

نوع من الشتداب، يعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراته تطول نحو ١٠٠ سم. صقلها البيا خلية خيشرة، عايقه اللون. ازهاره صغيرة الرؤيات، كثيرة العدد، يضاء اللون || ازهاره يستمر طول الصيف.

١٥٧١٥ - شُتْدَاب مَنَبَسَط اَلْوَرَك

Eryngium planum (S). *Panicaut à feuilles planes* (F).

نوع من الشتداب، يعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. اوراته يفضية الشكل جامدة النصل المنبسط الصلابة يعلو نحو ١٥ سم. ويمرض نحو ٧ حار. لاقيامي التسنين، اسناته قصيرة المذهب الشائك. ازهاره الى الزرقه الزاهية. ازهاره يستمر من تموز الى آب.

١٥٧١٦ - شُتْدَاب مَتَنَجِي، شُتْدَاب مَائِي

Eryngium aquaticum (S). *Panicaut aquatique* (F).

نوع من الشتداب، يربط في المنطق والمواقع الرطبة. يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراته شرفانية مسنقة القاعدة والطرف تطول نحو ٧٥ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها جامد الصلابة، عايق الحصار البحري، شائك الحصار المذهب. ازهاره يضاء اللون يعلوها مروج اخضر || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.

١٥٧١٧ - شُتْدَل

Locustella (S). *Locustelle* (E).

جنس طير من فصيلة البغليات. انواعها المروقة ثمانية. موطنها الشرق الاقصى واروپا. اجسامها صغيرة القد. متاقها غزوية الشكل. اجنتها واذناتها متوسطة الطول. تألف المراسي والمنطق وصفاف الانهار، قربها الحوام واليزود البرية. تدن في الادغال وفي الانجار للثديفة. اناثها تقص من ٤ الى ٥ يضايات تحضها بتناوبة الكور: اعرف انواعها واشهرها الشتل الامر.

١٥٧١٨ - شُتْدَل اَلْمَر *

Locustella naevia (S). *Locustelle tachetée* (F). *Grasshopper warbler* (E).

نوع من الشتل. طوله نحو ١٤ سم. قوه متناقل الالوان. راسه وظهوره وبنجاحه وذنبه الى الطلحة الخطية الزيتية المواج تملوها رشفة سوداء. زوره وصدره الى الصفار المغطى. يلمه واذنكه الى الصفار الباهت الاخير المواج || تألف صفاف الانهار والحدائق والجنان والمراي. ينش عنه في الادغال. اناده تقص اربع يضايات تحضها بتناوبة الذكر من ١٤ الى ١٥ يما.



شتداب



شتدل ائمر

انفادها حزيلة ، محببة ، خلية الباء ، يطولها بعض الحسف
الثالثك . أوراقها سنانية الشكل ، نصلها مسنة الحمار ،
خلية البيرة . أزهارها وردية اللون متقطعة بالاصفر ||
تؤثيرة يستمر من حزيران إلى آب .

١٥٧٧٧ - شسْتوم كَنَافِي الْوَرَق

Chaenostoma linifolium (S).

Chénostome à feuilles de lin (F).

نوع من الشستوم . ساقه تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم .
أوراقها قرنية للشبه بأوراق الكتان . أزهارها جرسية
الشكل ، بيضاء اللون أو صفراء || تؤثيرة يستمر من
الصيف إلى الخريف .

١٥٧٧٨ - شسْتوم كَثِير الزَّهَر

Chaenostoma polyanthum (S).

Chénostome multiflora (F).

نوع من الشستوم . ساقه تملو نحو ٣٠ سم . أوراقها
سواءية الشكل . نصلها جبراء المصفحات العليا ، خلية
السفل . أزهارها عتقودي التجميع . عناقدها تطول من
١٥ إلى ٢٠ سم . أزهارها إلى البيضاء الوردي المواج ||
تؤثيرة يستمر من حزيران إلى ايلول .

١٥٧٧٩ - شسْرُوح

Passerina (S).

Passerina (F). Sparrow-wart (E). Spatzenzunge (D).

Passerina (I).

جنس نباتات حنينة معمرة برية ورتبية من فصيلة
المازويديات . أنواعه قليلة مهدا أفريقية الجنوبية ،
هيتبا تشبه الخنج . أوراقها صيرة متقابلة . أزهارها
سنبل التجميع ، تاجي الايكاز . أزهارها صيرة القد
جيلة الشكل مختلفة الألوان ، يلب فيها الأزرق .

١٥٧٨٠ - ششَلَة

Chinchilla
جنس حيوانات كيرة قاضة من فصيلة الششليات .
موطنها الاربيستين والشلي ويليغية والبيرو . أجسامها
متوسطة القد يراوح طولها من ٢٥ إلى ٣٥ سم . وأذناها
من ١٢ إلى ١٥ سم . رؤسها مخروطية الشكل . سبالها
مبشرة الحلب الاسود . حينها مكحلة مستطيلة . آذانها
كبيرة وحريفة . جرائرها الانامية قصيرة خالية الاسابع .
اما الخلفية فسطلية ودرباحية الاسابع . راثها قوية
سادة . فرونها قصيرة الور شديدة النعومة فاخرة الصنف .
أثوابها إلى الصهبة اللؤلؤية يطولها مواج فضي تبقع مع
أثوابها من ثنج القنفر وزهو وتميل إلى البيضاء عند البطن .
قوتها الاثباب والجلود والطحالب . أنثاها تحمل ٨
أطباء وتضع من ٤ إلى ٦ ادراس على ثلاث موات في
السنة || وهي نوعان :

ششلية صفوة *Ch. lanigera* (S). *Ch. lanigère* (F).

ششلية قصيرة الذنب *Ch. brevicauda* (S).

Ch. brevicauda (F).

١٥٧٨١ - ششَلِيَّات

Chinchillidae (S).

Chinchillidés (F). *Chinchillidae* (E).

فصيلة حيوانات لينة قاضة من رتبة ششليات الثورب
وردية القواصم . أجسامها لثة وأذناها خسة . جميعها
قرنية الشيه من الارلب يتفرأها بقراثها الناعمة الحريرية
وبأذناها المستطيلة الجيلة || موطنها امريكا الجنوبية .
تعيش جماعات كبيرة البند ، ألقبها المناطق المرتفعة .
أجسرها رداء عديدة الانفاق والتعايز . المتشعبة تتخلها

١٥٧٩١ - شسَس

Nérine (F). *Nérine* (E).

جنس نباتات حشبية دوفصية من فصيلة الترسجات .

أنواعه عديدة ، أوراقها خيفة مستطيلة . أزهارها بجلة

الشكل سيوانية التجميع تركز على شراخ مستطيل .

اشهر أنواعه ما يلي .

Nérine undulata (S).

Nérine ondulée (F).

نوع من الشس ، أوراقه دقيقة تطول نحو ٤٠ سم .

وتعرض من ١٠ إلى ١٥ سم . نصلها إلى الحصار الزامي .

أزهارها لا تقياسية الشكل ، يطلها سبابة جملة . أمديها

والقلاها خجلة . لوها إلى الوردي الزامي . تعد من ٨

إلى ١٢ زهرة يجمعها شراخ يملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم .

أزهارها غريبي .

Nérine humilis (S).

Nérine humble (F).

نوع من الشس . أوراقه تناغر من أزهار وهي خيفة

التصل التثالي الامتلاف ، الحليل الحصار الزامي . طوله

يراوح من ٢٠ إلى ٣٠ سم . وعرضه نحو ١٠ سم . سيوانه

الزهرى بعد من ١٠ إلى ٢٠ زهرة يجمعها شراخ يملو من

٣٠ إلى ٥٠ سم . لوها إلى الحرة القوردية يطولها مواج

اخضر || أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين الاول .

Nérine pudica (S).

Nérine pudique (F).

نوع من الشس . أوراقه تسبق أزهار وهي خيفة الشكل

نصلها حايق الحصار يطول نحو ٢٠ سم . ويعرض نحو

٢ سم . سيوانه الزهرى بعد من ٤ إلى ٦ أزهار يجمعها

شراخ يملو نحو ٣٠ سم . لوها إلى البيضاء الناصع يملو

تخطيط مستطيل احمر || أزهارها يستمر طوال شهر تشرين .

Nérine curvifolia (S). *Nérine à feuilles arquées* (F).

نوع من الشس . أوراقه مستطيلة محببة لتصل البحري

اللون . أزهاره ارجوانية تعد من ٨ إلى ١٢ || أوان

أزهاره يختلف باختلاف زين غرسه . يقرس في المراكز

ويحيو في جيع الارابة الحوارة الغنية بالمواد النعومة .

Nérine flexuosa (S).

Nérine flexueuse (F).

نوع من الشس . أوراقه تطهر مع أزهار وهي خيفة

التصل تطول نحو ٣٠ سم . وتعرض من ١٠ إلى ٢٠ سم .

ضروبه وأمراده عديدة ، سيوانها الزهرى يد من ١٠

إلى ٢٠ زهرة ارجوانية أو قرنية لو موحية يجمعها شراخ

يملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . || أزهاره يستمر من ايلول

إلى تشرين .

١٥٧٨٥ - شسْتوم

Chaenostoma (S).

Chénostome (F). *Chaenostoma* (E).

جنس نباتات حشبية وعشوية معمرة من فصيلة الحنازيريات .

متنها بعض مناطق افريقية الحارة والمتحدة الحرارة . سيقها

تملو من ٢٥ إلى ٥٠ سم . وأوراقها متقابلة ، مسنة الحمار .

أزهارها ملونة ، خاسية الفلق المتساوية || أنواعها المحروقة

قليلة العدد ، أشهرها التالية :

Chaenostoma hispidum (S).

Chénostome hispide (F).

نوع من الشستوم . ساقه تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم .



شسْرُوح



ششلية

والاحجام . جميعها مستطيلة القرومات القرنية الشكل || اعرف اجناسها واشهرها الشك وهو من الاصداف المقدسة عند بعض جماعات الهند .

على اعماق تراوح بين ٥٠ و ١٠٠ سم . || قوتها الاصاب والجلود . اما اجناسها الثلاثة فهي الششيلة والبيديوم واللغسوم .



شك

١٥٧١٢ - شُتْكيس * ، طُكُوس التبت

Polypetron chinquis (S). Chinquis, Paon du Tibet (F).

طائر وحيد الجنس والفرع من فصيلة التتريجات . موطنه التبت . قريب الشبه بالطالوس والتلوج لكنه اصفر جميعاً ولقل روصة وبيلاً . ثوبه مراكب الالوان المزركشة الزاهية . ذيله فلي التتيم .

Ratel de l'Inde (F).

هو الراتل ابر كيم . حيوان راسي بشمار قريب الشبه بالزوب . يتخذ لنفسه نفقاً في الارض يخرج منه ، في طلب القوت ، بعد التروب ويود اليه في الصبح الباكر .

Bruyère (F). Hesth (E).

١٥٧٣٣ - شُطُط

هو الخلع ، اطليه .

١٥٧٣٤ - شُغُوب ، شُطُوف

ما بني على الساق من الفصن بعد قطفه .

١٥٧٣٥ - شُغُف الديك

هي دلبرية شغ الديك ، شجرة حرجية خشبها احمر اللون فانس الصف ، اطلبا .

١٥٧٣٦ - شُغُف هو الشك ، اطليه .

١٥٧٣٧ - شُغُف ، شُغُور هو السفر ، اطليه .

Hydrobates asiaticus (S).

Cincle de Pallas (F). Asiatic water-ouzel (E).

طائر من دجاج الماء وفصيلة التفلقيات ، يعيش قرب المياه العذبة يسبح وينوس ويصطاد الحشرات والحرار .

١٥٧٣٩ - شُك * ، شُك

Turbinella (S). Turbinella, Schanck (F). Shandk (E).

جنس اصداف حلزونية كبيرة القصد من الرغويات المدليات . انزومه كثيرة البدن تعيش في مجار الاقاليم الحارة . اشهرها الشك الهندي المعروف بصفت الحنوس المقدس .

١٥٧٤٠ - شُكُولة

Triblidium (S). Triblide (F). Triblidium (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مدليات الاريل اماميات الخياشيم وفصيلة التقيصيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مجار البلاد الحارة والاراضي والمحيط الهادي . تعيش على صخور المجاذع والشطوط || اصدافها وحيدة المناسير و عديدة السطوح و نائشة للقتن ، متباينة الاشكال يكثر فيها التقرين الحثاري وروحية الاصولج . اغشيها الداخلية لؤلؤية . قشادها الخاربي كلتي للمادة || اجسامها رحية الارادية التي يراوح قطرها من ٣ الى ٥ سم . رؤوسها صغيرة ، ثنائية القواس اغرطوية الش || المعرنة القواعد الخارجية . عجايشها اريم مجموعوات متتالية تلتق الجسم وبجسمه خمسة مشطية الشكل مركزها قرب الرأس ومن يمينه || جميع انواعها مأكولة مرغوب لها .

١٥٧٤١ - شُكُيَات * ، شُكُيَات

Turbinellidae (S). Turbinellidae (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مدليات الاريل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة البدن منتشرة في بعض مجار المناطق الاستوائية ومنها الهند || اصدافها صغيفة الشكل ابر يرمية ، متفاوتة البنية

١٥٧٤٣ - شُتْم * ، شُتْم

جنس اسماك بحرية من فصيلة الششيات . انزومه قليلة البدن جميعها من اسماك البحر الابريقي . اجناسها مستطيلة القصد ، اسطوانية الشكل ، متباينة الزخانات الظاهرية المفردة كالمنشار . تعيش في غث وخالل البحر . دفنها تحوي كلف الحيات .

١٥٧٤٤ - شُتْمُول * ، شُتْمُول

جنس شجيرات مشرة من فصيلة الورديات . انزومه قليلة البدن فيها السرة والشاتكة . سيقها قصيرة الجلع . اوراقها بسيطة متعالية ، قصيرة العنق . ثمارها كروية تشبه السفرجل . لياها جامد للكسر سائر العلم || اشهر انزومه الزراعية ما يلي .

١٥٧٤٥ - شُتْمُول الصين * ، سَقرَجَل الصين

Chaenomeles sinensis (S). Chaenomele de Chine, Cognassier de Chine (F).

نوع من الششول مجرته تملو من ٤ الى ٥ م . ساقها سرسة . اوراقها اطليجية الشكل ، فلية القاعدية تطول من ٥ الى ٩ سم . وتعرض من ٣ الى ٦ سم . نصلها ازغب الصغرة الشغل ، منشاري الحافة . ازهارها فردية ، كبيرة القصد ، وردية اللون ، فواصة الرب . ثمارها كروية ، قطرها نحو ١١ سم . لياها متوسط الصلابة طاهر المغوصة ، حازر العلم .

١٥٧٤٦ - شُتْمُول اليابان * ، سَقرَجَل اليابان

Chaenomeles japonica (S). Chaenomele du Japon, Cognassier du Japon (F).

نوع من الششول مجرته تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقه واغصانه شاتكة . اوراقه سنائية الشكل تطول من ٧ الى ١١ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ سم . نصلها منشاري الحافة ، غلي البشرة على الصغرة الشغل . ازهاره لوروية ، شمية التجميع ، متوسطة القصد ، لونها الى الازرقاني || ثماره كروية ، صغيرة القصد ، قطرها نحو ٥ سم . لياها الى الخضار الاصفر . لياها جامد للكسر ، متوسط الصلابة ، طاهر المغوصة وسائر العلم .

١٥٧٤٧ - شُتْمِيَات * ، شُتْمِيَات

Polypetridae (S). Polypetridae (F). Polypetridae (E).

فصيلة اسماك من اللامعات كثيرات الزخانات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها من اسماك المياه العذبة تعيش في اللث والاسمال .

١٥٧٤٨ - شُتُوص ، قُتُوص

Lutodeira salmonus (S). Chanos salmoné (F).

سمكة بحرية من مفتوحات المنانث فضيلة البيرغيات اعطانها البحر الاحمر والمحيط الهندي || جسمها وشي



شك



شكيس



شتم



شتمول الصين

١٥٧٥٧ - شَهَادَةُ التَّسْجِيلِ

Certificat de transcription (F). Certificate of transcription (E).

شهادة القيد التي يمررها أمين المكتب العقاري موضحاً فيها تاريخ تسجيل العقد ورقه الخ.

١٥٧٥٨ - شَهَادَةُ التَّفْرِيجِ

Certificat de décharge (F). Unloading certificate (E).

هي الشهادة التي تعطي لأليات وصول البضائع وتفرجها .

Parère (F). Opinion (E). - شَهَادَةُ الْعَادَةِ

شهادة تدفعها الذرة التجارية لأليات عادة تجارية معينة .

١٥٧٦٠ - شَهَادَةُ الْعَمَلِ

Certificat de travail (F). Labour certificate (E).

هي الشهادة التي يجوز للعامل أن يطالب بأعطائها له حين انقطاع العمل عنه . فلا يثبت فيها إلا نوع العمل الذي كان يقوم به وتاريخ دخوله وانفصاله .

١٥٧٦١ - شَهَادَةُ الْكَفَافَةِ

Brevet de capacité (F). Capacity brevet (E).

راجع برامة .

١٥٧٦٢ - شَهَادَةُ الْمَصْدَرِ

Certificat d'origine (F). Certificate of origin (E).

شهادة يمررها المصدر وتثبت السلطة صحبتها تفيد عن منشأ البضاعة موضوع الشهادة .

Script - شَهَادَةُ رَحِيدِ

تحرير يقدمه المسافر والشركات الى احد الدائنين او احد طلة التسات الذي لم يقبض كل القروض او رأس المال المسدد والمستحق له وبهذه الشهادة يقدم مستندة ليقبض باقي المستحق له .

١٥٧٦٤ - شَهَادَةُ عَقْدَارِيَّةِ

Certificat hypothécaire (F). Mortgage certificate (E).

هي التي يمررها أمين المكتب العقاري ليثبت وجود أو عدم وجود رهن أو حق عيني آخر على مقرر معين .

١٥٧٦٥ - شَهَادَةُ قَيْدِ

Certificat d'inscription (F). Certificate of inscription (E).

شهادة تثبت فيها السلطة المختصة كل ما سجل على الصيغة العقارية .

١٥٧٦٦ - شَهَادَةُ مَحَوِّ الرُّهْنِ

Certificat de radiation (F). Irradiation certificate (E).

هي الشهادة المفروضة للدلالة على محو قيد الرهن كله أو بضعه .

١٥٧٦٧ - شَهَبَانِ

Orang-Outan هو السلالة ، أكلها .

١٥٧٦٨ - شَهَبَانِ * Clivia (S). Clivie (F). Caffre lily.

Natal lily (E). Riemenblatt (D). Clivia (I).

جنس نباتات عشبية مسمرة أليفة جنسورية لا يصلية من فصيلة التريجيئات . أنواعه المعروفة قليلة . أوراقها متعاقبة

قديمة ، مستطيلة ، ثنائية التصفيف تصلها عروق الخشخار اللامع . أزهارها كبيرة القند حواء اللون أو برتقالية و

صوبانية الاوتكار يحبسها شراخ منسوب مستطيل . ثمارها كروية الشكل كروية اللون || أزهارها يستمر من ايار الى ايلول .

الشكل . طول نحو ٣٦ سم . رأسها صغير الحجم . عيناها كبيرتان ، ماصحتان . خطمها صغير الشدة . فكها عديم الأسنان . زعنفتها الظهرية شراعية الشكل تقابل الحوضية . زعنفتها البالية قوسيان متقابلان كالكلاية . قوسا الى الربعة النفسية يمتد في الرأس والظهر || لحما جيد الصنف و مرغوب فيه .

١٥٧٦٩ - شَيْطِيط Polymère (F). Polymer (E). متضمن حلة اصول . اصطلاح يطلق على كل مركب كيميائي تكد ظواهره على الشائطة .

١٥٧٧٠ - شَيْطِيطَة Culleren (F). Winglet (E). صفيحة قرنية صغيرة القند ، نصف دائرية الشكل ، توجد عند قاعدة الرزان في الحشرات من ذوات الجناحين .

١٥٧٧١ - شَيْطِيطَة Spheceloma (S). جنس تطور شجرية من فصيلة الرنيئات . أنواعه المؤدية

قليلة تركيب الاوراق والاناث والجار تغطيتها || يتميز بمرغولاته التي تتشأ خضيرة في البقعة الامامية ثم ترى حتى

البشرة فتصلحها وتزهرها . جرابه الكندي قصير القند ، بسيل التركيب . كئالده يفسية الشكل شفاقة || أصف

أنواعه ولشهرها شنية الورد .

١٥٧٧٢ - شَيْطِيطَة الْوَرْدِ *

Spheceloma rosarum (S). Anthracnose du rosier (F).

فطر مجهرى يصيب الوردي في أوقات وفضائنها || مظهره الخارجي ، على الاوراق ، يقع مستدرة او مستطيلة

تركيب النصل ليبدو لونها الى القفرة ثم ينصرف الى الجزء

يطول موج رصاصي ، يقضي على التسج للتجارة فيلذيلها

ويجها || وهو على القصبان طلع قرنية مستدرة قفرها نحو ٢ سم . تملط اللحاء وتنور فيها حتى الكبر || يكافح

باحتلال المركبات المركزة على الكبريت والنحاس .

١٥٧٧٣ - شَيْنِيُوم * Chennium (S).

Chennium (F). Chennium (E).

جنس حشرات مفترسة من فصيلة البسلافيات ورثة حديدات

الاجنحة . انواعه المعروفة سبعة اصنافها معظم مناطق البلاد

الممتدة الحارة || اجسامها صغيرة ، تطول نحو ٢ سم .

وروسها صغيرة ، شبه مزوانية الشكل . صوبان بارزة .

قرونها الاستشارية صوبانية . كثرةاها وتكونها قياسية

ملاصها مستطيلة ، كواسلها خفيفة . يطونها مستعرضة

مغلطحة . اغمارها غدة و قصيرة ، تلمف نصف البطن .

قوائمها شنيطة . انبوبها وسيدة اللون يكثر فيها الجفوي

والاسود النفسية || سرسها دجوي . تموش في الجحالة

وفي قري التسل . قوتها ما تستطيع تنصه او ما يتور لها

من مواد ضوية .

١٥٧٧٤ - شَهْ

انه : طائر يشبه الشامين يأكل الحما (السان) .

١٥٧٧٥ - شَهَادَةُ

راجع اشهاد .

١٥٧٧٦ - شَهَادَةُ Certificat (F). Certificate (E).

جارة اقرار يمررها احد الافراد او المؤسسات يثبت فيها

امراً معلوماً عنه .



شنية الورد



شيط



شهبان

١٥٧٨٢ - شَوَاكِبِ عُنْطَرُ هو القرم البري ، املبه .

١٥٧٨٣ - شَوَاكِسْ * Pavetta (S). Pavetta.

Baconia (F). Pavetta (E). Pavetta (D). Pavetta (I).
جلس نباتات جينية معمرة من فصيلة الطويات . انواعها
مدينة سطحا بري وبعضها ترابي . اوراتها ممتدة
متعاقبة . نصلها جامد الصلصة ، لام البشرة الزاهية الخضر .
انزعارها عقودي التجميع ، ابطي وتسامي الارتكاز .
انزعارها رباعية البلات والاصدية ، مسطحة الياسم ،
يضاه اللون او غصراه ، فواصة الكرم السطري || اشهر
انواعه الثولس الهندي الكلي الرائحة البطرية . يزرع
لترزين وهو من النباتات القليلة اوراته مدرة للبل .



شهران

١٥٧٨٤ - شَوَاكِسِيَات Erubidae (F).

سبط من القويات آجناته تقارب لثة وانواعه زهاء ألف .

١٥٧٨٥ - شَوَاكِبِ Anomours (F).

الشواطب مرتبة دويات من الفشرات عشاريات الابليل .
تتميز بتكوص بعض اعضاء اجسامها من الحافة المثلث
الى حالة ادق .



شواس

١٥٧٨٦ - شَوَاكِبِ ء فلوكس Phlox (S). Phlox (F).

Phlox (E). Flammenblume (D). Phlox, Flamma (I).
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة البقياس
انواعها مدينة سطحا ترابي . اوراتها كثة . انزعارها
طرية الارتكاز ، متكونة التجميع او حلقة || اشهر
انواعه ما يلي .



شواطئة سرحة

١٥٧٨٧ - شَوَاكِبِ بِهَيْبِ الوركي Phlox ovata (S). Phlox à feuilles ovales (F).

نوع من الشواطئة وهي عشبية ترينية معمرة تملو نحو
٥٠ سم . اوراتها بيضيه الشكل . انزعارها رودية اللون
متصبغة البلات مستعرضة التفصل || انزعارها يمتد
من حيزان الى آب وهو متكون التجميع ، مبستر
الزبدات القليلة .

١٥٧٨٨ - شَوَاكِبِ درومند Phlox Drummondii (S). Phlox du Drummond (F).

نوع من الشواطئة وهي عشبية سرافية ترينية حولية تملو
من ٢٠ الى ٥٠ سم . ساقها منتصبه فروعاً مزينة النعام .
اوراتها لالحة متنامية . نصلها قلبي الشكل ، خلي الصلصة
السفل . انزعارها تختلف باختلاف القسروب منها العاديه
والكثيه ومنها الحمره والبيضاء والوردية والاريجانية والصفراء .
الخطية المزاج || انزعارها يمتد طوال الصيف والحريف .

١٥٧٨٩ - شَوَاكِبِ سَرَحَة Phlox glaberrima (S). Phlox glabra (F).

نوع من الشواطئة وهي عشبية سرافية ترينية معمرة تملو
من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراتها سنانية ذلعة تملو نحو
١٢ سم . نصلها خلي البشرة . انزعارها حولي اللون او
وردية ، نصلها شيقة وبيعية || انزعارها متكون التجميع
قليل الكثافة ، يمتد من حيزان الى آب .



شواطئة متكونية

١٥٧٩٠ - شَوَاكِبِ عُنْكَبِيَّة Phlox paniculata (S). Phlox paniculé (F).

نوع مدينة القسروب والاصرام جميعها معمرة ترينية تملو
من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراتها كبيرة ، متعاقبة ، سنانية

Grise, Erinose

وسم يصيب بعض النباتات سببه حشرة تسمى اريئوز ،
راجع اريئوز .

١٥٧٧٠ - شَهْد ، شَهْد Rayon de miel (F).

هو النسل لا يزال في تخاويب اقراصه .
Honeycomb (E).

١٥٧٧١ - شَهْدِ اَنْج ، قُنْبُر Chênevis (F).

هو بذر القنب .
Hemp-seed (E).

١٥٧٧٢ - شَهْرَكِ العَجَر Achaladage' (F).

هي اشجار سمه المتعبر بين الحرفاء والزبائن .
Custom (E).

١٥٧٧٣ - شَهْرَمَان * Tadorns (S).

Tadorns (F). Sheldrake (E).

جنس طير من فصيلة البليات ، انواعه قليلة العدد جميعها
من القوام التي تجوب البلاد في طلب الرزق . اجسامها
رشيقة القوام . انواجها متراكبة الالوان الجميلة المايقة .
روسيها سيد او غفر . غاطمها قصيرة ، مبطلة ،
جوزية اللون || تألت البجيرات والشرط البحرية عند
مصبات الانهر . قوتها الاشباب المائية والقشريات وبعض
الاسماك الصغيرة || تنثن افاحيصها في الاجمار والاصرة
المهجرة . اناثها تضع من ١٢ الى ١٥ بيضة تحضها
بمناوبة الذكور نحو ٤ اسابيع .

١٥٧٧٤ - شَهْوَةِ الطين Pica, Picage (F).

زيفان في اللوق يقعد بعض الحيرانات الداجنة كاتيل
والقير والغفر الى اكل التراب والسموت والجلود والريش
وما اشبه . سببه المقدور نقص في الجسم وانقذاره الى بعض
المواد المعدنية الثاقبة .

١٥٧٧٥ - شَهِيْقِي Inspiration (F). Inhaling (E).

حركة من حركتي التنفس قولها ادخال الهواء الى الرئتين .
وقد يحدث ذلك بتوسع تجويف الصدر من اهل الى اسفل
ومن الوراء الى الامام فتضمد الرئتان وتلتصقان بالهواء حتى
يصل الى الحويصلات الرئوية فتأخذ منه الاكسجين
وتتخلص من ثاني اكسيد الكربون .

١٥٧٧٦ - شَوَاة ، شَوِي Périrène (F).

غلاف القحف اي صمغ الجبسمة .
Pericranium (E).

١٥٧٧٧ - شَوَادِن Intempéries (F).

Inclemency (E).

عختلف العوامل الجوية غير المألوفة او غير العاديه .

١٥٧٧٨ - شَوَار Entraineur (F). Trainer (E).

من تعامل ترويض خيل السباق .

١٥٧٧٩ - شَوَاكِر اُنْثَوِي Organe femelle (F).

Female organ (E).

هي الاعضاء التناسلية الانثوية في الحشرة .

١٥٧٨٠ - شَوَاكِر ذَكَرِي Organe mâle (F).

Male organ (E).

هي الاعضاء التناسلية الذكرية في الحشرة .

١٥٧٨١ - شَوَاكِبِ اَقْطُ هو الجلبان الإناء ، املبه .

١٥٧٩٦ - شَوَاعِيَّات * *Eresidae* (S).*Eresidae* (F). *Eresidae* (E).

فصيلة حناكب من رتبة الرتيلاوات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اصطناعها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من الملائين القديم والجديد . اجسامها متباينة القد ذكورها اصغر من انثاهما بما لا يقل عن ثلاثة اضعاف . جميعها رباعية الاريا والمشتات تنسج بطنها بطيها من الصفائح البنية التي تتخلل المشتات . الارباع مغطاة بالاروان والتركيب . تعيش تحت الحجارة وعلى الادغال والجنات البرية . عكادب الاجناس الارضية ابيض تحتضر في التربة تحت الحجارة وبطنها يفلت من الناس انبوي الشكل . عكادب الاجناس الشجرة صلبية الشكل . تنسجها بين قضبان النبات . اشهر اجناسها الشواع .

Nyctage (F).

١٥٧٩٧ - شَوَاق

هو شب الليل ، نبات عشبي ترابي مسر ، اطله .

١٥٧٩٨ - شَوَالِيَّات

هي الشيات فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين .

Pitchou

١٥٧٩٩ - شَوَالَةٌ

طائر من الدحل ، اطلب دخلة شواله .

Grainier (F). *Seedsman* (E).

١٥٨٠٠ - شَوَان

خازن القلة وبانها .

Schorie (F).

١٥٨٠١ - شَوَت *

شجرة بيرة وتزيينية من القرنيات العندميات . مهدا افريقية الجنوبية . ساقها بطيئة النمو فروع . فروعها صلبة الالياف والخشب . اوراقها مركبة ويشية بترية التجميع . وريقاتها بيضيه الشكل . مجنحة النصل الجليل الخصار اللام . ازهارها ضمية حمر اللون تنشق في الفروع القديمة التي يبقى حمرا المحول . ثمارها متابل مبطة متوسطة الطول كستية اللون . بزورها احادية الصف ، كلوية الشكل ممره اللون .

١٥٨٠٢ - شَوْح

هو الثنوب الاناضولي ، اطله .

١٥٨٠٣ - شَوْحَةٌ

هي الرخسة ، اطله .

١٥٨٠٤ - شَوْحَط

الشوط ، شجر تنخل منه القسي وقيل نوع من التين وقيل هما والشرايين واحد ويختلف الاسم بحسب كرم مناهيا فا كان في قلة الجبل فنبع وفي سفحه فشران وفي الحضيض فشوط . وأحدته شوشة (اللسان) .

١٥٨٠٥ - شَوْحَلَةٌ قَرَاءَةُ الذَّبِّ *

Cerura furcula, *Harpys furcula* (S).*Harpys fourchue*, *Petite queue fourchue* (F). *Cerura furcula* (E).

حشرة من فصيلة الشوطيات ورتبة حشرشيات الاجنسة . موطنها معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من العالم القديم . فراشتها جارسه قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق الحور والصفصاف . جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ سم . بطنها نحو ٣.٥ سم . رأسها معتدل الحجم . عينها كبيرتان . زناهاا مشطيان عنة الازن ، مشطيان مزدوجان عنة الذكر . جوشها الى الردة تتوسط بقعة

الشكل ، مزينة النصل . ازهارها حديدية الالوان مستطيلة الفلعل المدية الاطراف . ازهارها حشكلي التجميع كبير القد يستمر من آب الى ايلول .

١٥٧٩١ - شَوَاعَةُ لَيْفِيَّة *

Phlox amana (S).*Phlox gracieux* (F).

نوع من الشواعة وهي بجلة سبروتية تزيينية معمرة تملو نحو ٤٠ سم . اوراقها اعليجية تطلو من ٢ الى ٦ سم . النفل سها مقطوع اما العليا ذلقة . ازهارها وردية او يضاء اللون . فصلها مهدية تغذية الشكل . ازهارها يستمر طوال الربيع والصيف .

١٥٧٩٢ - شَوَاعَةُ مَدَاكَة *

Phlox reptans (S).*Phlox rampant* (F).

نوع من الشواعة وهي عشية ذكوية مدادة معمرة . اوراقها اعليجية مغلفة الطرف . ازهارها حمره اللون او وردية او بنفسجية . بطنها بيضيه الشكل . فصلها خروطية مدية الاطراف . ازهارها يستمر من سزيران الى ايلول .

١٥٧٩٣ - شَوَاعَةُ مَرْحِيَّة *

Phlox pilosa (S).*Phlox polli* (F).

نوع من الشواعة وهي بجلة سبروتية تزيينية معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ساقها وريصها مزينة . اوراقها ضمية النصل تطلو من ٣ الى ٨ سم . وتقرض من ٣ الى ٨ سم . ازهارها يضاء اللون او حمره او وردية . بطنها خلية البشرة دقة . فصلها غرزية الشكل . ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٥٧٩٤ - شَوَاعَةُ مَطْحَكَة *

Phlox maculata (S).*Phlox macul* (F).

نوع من الشواعة وهي عشية سبروتية تزيينية معمرة تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم . اوراقها متعابلة سنائية الشكل . نصلها ماس الصفحة المظلمة يختلف للمجات المنصر . ازهارها حلوية الرائحة لونها الى الحمره او البياض . ازهارها قنوي التجميع . يستمر من تموز الى آب .

١٥٧٩٥ - شَوَاعَةُ سَوْدَاء *

Eresus niger, *Er. cinnabarinus* (S).*Erèse noire* (F). *Eresus niger* (E).

دورية من الحناكب الساعية القانصة رباعية الاريا والمشتات من فصيلة الشوابعات . جسمها يتيز ببقرة القد الكبير بين الذكر والانثى . الذكر يطول نحو ١٠ سم . ثوبه الى الصبهة الحمره يملوها بتجميع ابيض واسود . الانثى تطلو نحو ٢٧ سم . ثوبا الى اللواد المايق يملو خلل الحبل وتديب في الاطراف ويملو صفحة بطنها كشة رباعية المظلمات سفراء اللون . صداسها كبير القد . مقطوم الطرف . مينها زئيرتان . شيفها صغيران ذريان . فكها مجنعا الاطراف . كليلها الحلب . جبرامزها قوية . بطنها بيضي الشكل . مبطل الجرم . تألف البراري . سرحها بدوي . قوتها الحشرات والذباب والحوام . عكديتها يشي اسطواني الشكل . عمودي الازنكار . بعيد القنور تحتضر في التربة تحت الحجارة . بيئاتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر . تعيش نحو ثلاث سنوات . ملجئها الحياقي لا ملجن غيرها من الحناكب . تعتبر من الدويبات النافعة للاروفية .



شَوَاعَةُ سَوْدَاء



شَوَالَةٌ



شَوْحَلَةٌ قَرَاءَةُ الذَّبِّ

منقطة خاسية الاعية النتامية الثنائية أو الثلاثية السام
للخساسة || أشهر أنواعها واضرها شوك الورد وشوك
القرامبوز .

١٥٨١٠ - شَوَّكُ القَرَامْبُوزِ *

Phragmidium rubi-ideae, *Uredo rubi-ideae*, *Caecomyces* (S). Rouille du framboisier (F).

فطر مجهرى يتطفل على الأوراق فينبها ويسبب سفوطها
الباكر || مظهره الخارجى ينور قرحية لا قياسية الشكل
تركب الأوراق على صفحتها العليا . تبدو صفراء اللون
ثم تتحور نحو البرتقالي فتسبب جفاف التسبيج وذبول
الأوراق وسقوطها الباكر || اغراضه زينة لا تسترهب
المكافئة وإن كان لا يدها غشمال اخضر النحاس على
ذمة أو ذفتين كأنه قفصاه عليه .



شوك

١٥٨١١ - شَوَّكُ الْوَرْدِ *

Phragmidium subcorticium (S). Rouille de rosier (F).

فطر مجهرى يتطفل على معظم الزهور المزروعة . مظهره
الخارجى يقع صغيرة لا قياسية الشكل لونها الى الصفرة
البرتقالية ، تركب الأوراق على صفحتها العليا يقابلها
على الصفحات السفلى ينور ممر مبيطة بدون انتظام تكثر
قرب الفروع || وقد يسبب عماليق الانزهار وكوسها
فيستغلها يروح على اللبس يرتقالي اللون || يكافح
بأخضر النحاس أو بالاكسيكلوربر .



شوك القرامبوز

١٥٨١٢ - شَوَّكُة ، شَمَكَتِكَة ، Mimétisme (F). Mimésis, Mimicry (E).

خاصة كائنة في بعض الحيوانات واخضرأت تحكما من
للتشابه بالاشياء التي تحيد بها .

١٥٨١٣ - شَوَّرْ

هو اجتناء النمل أو السمل المشغور اى المستغفر من
القوسية .



شوك الورد

١٥٨١٤ - شَوَّرِبْ هو غاطف الذباب ، الملهب .

١٥٨١٥ - شَوَّرُكَة Rucho (F). Bee-hive (E).

هى مأوى النحل كالحلية والقفير ، الخ .

١٥٨١٦ - شَوَّرُود Cystopteris (S).

Cystopteris (F). *Cystopteris* (E).

جنس نباتات عششاية ، برية ، معمرة من الراس .
انواعها المعمرة عديدة منتشرة في معظم انحاء العالم القديم
والجديد || اوراقها مركبة تتكون من ٢٥ الى ٤٠ سم .
ورقاتها شبه المثلجية النصل . راجعها حرشفة البشيرة .
زكاتها عريانة بطيخة حار كفيف لزغب ، ثني اللون .



شورى

١٥٨١٧ - شَوَّرُوى Avicennia officinalis (S).

Palteuvier (F). *White mangrove* (E). *Salzbaum* (D). *Avicennia* (I).

شجيرة سرجية متدبة من فصيلة ربي الحام مدها البلاد
الاستوائية . تشوبها حاضرة طيبة يقال انها تقيد للمعدة .
لوراقها وانزاعها صباغية .

١٥٨١٨ - شَوَّرُوبَة ، قَالِفَة Morphologie interne (F). Internal morphology (E).

درس هيئة الاجسام الحية وتركيبها في الحيوان ولبنات .

جوزية . بطنها جزوي اللون ، اربه اللاتي السكنية ||
رواشنها عند الشقين الى البياض الساجي تملو في الزوج
الاسامي زخارف جوزية وجماء || لها جيلان في الحور .
تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل
الثاني في تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها
ينحو اربعة اسابيع وتضع اللفن مبيدا على الصفحات
السفل من نصال الاوراق || السرة تتكون من ٢٨ الى
٣٠ م . جسمها ماس انتشار ، اكهب اللون ، مستطيل
الرأس ، مسطح البطن ، مستطيل المنخر الذي ينتهي
بقترنين منمقين اسودين || طور الاكمال الذي يستمر
نحو ١٤ يوما ينقضي ضمن صليحة مهدلة التسبيج تحبها
السرة بين شرق غلاء الحور والصفحات .

١٥٨١٦ - شَوَّكِيَّات *

Ceruridae, *Notodontidae* (S). *Ceruridae*, *Notodontidae* (F). *Ceruridae*, *Pro-mimeta* (E). *Zahrapinner* (D).

فصيلة حشرات فراشة من حرشفات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المعروفة نحو ٢٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع
العالم || تسرح في الليل . طياتها طويل الشوط . اجسامها
متوسطة القد . رؤوسها مستدلة الجرم . حوزها كبيرة .
قرونها الاستعارية مشطية مزدوجة عند الذكور ، غطية
او مشطية عند الاناث . ملاسها صغيرة ونحيلة . مرانها
ضامرة قليلا تجاوز الادمة . بطونها كثيفة الحمل والارتب .
سكها الشرجية مغطاة بألمر من الملب المستطيل . حلانها
تقع على جانبي البطن . رواشنتها كبيرة ، جلوفية
الاستمرال عند الرأحة ، الامامية منها مزغرة ، الخلفية
وحيدة اللون ، جزامها تامة النمو . ظانبيها الخلفية ثنائية
المناسخ او رباعيتها || اساريها عريانة او مبيطة الملب
الصغير . اجسامها ثنائية الاجسام والاشكال المستعيرة .
سكها الشرجية لتتني بقرون صغيرة || غادراتها طبقة
او ملحقة ببالع مهدلة التسبيج || أشهر اجناسها الشول
والمرسوة والنفيط والقالبوا والفيجيرة والديكراتور .

١٥٨١٧ - شَوَّخَم * Aeschynanthus (S).

Aeschynanthus (F).
جنس نباتات مدادة من فصيلة اللشورويات . مدها
البلاد الحارة . سوطها نخيلة ، ملتوية ، مدادة وصارئة .
اوراقها لحية متعاقبة . انزاعها فردي التسبيج ، محوري
او حامي الانكناز . انزاعها كبيرة القد ، مستطيلة ،
ثنائية اللون ، زاهية الحمرة .

١٥٨١٨ - شَوَّوْخ Physospermum (S).

Physosperme (F). *Physospermum* (E).
جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة النجيليات .
انواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من ثبوت الشرق الاطل
واروبة || سوطها رفيعة قليلة الفروع . لوراقها متعاقبة
مركبة ، صغيرة الورقيات الدقيقة ، انزاعها صولاني
التسبيج ، حامي الانكناز . انزاعها صغيرة يضاء اللون .
تنويرها صفي .

١٥٨١٩ - شَوَّوْك Phragmidium

جنس فطور مجهرية من فصيلة السحليات . انواعها نحو
٥٠ تتطفل على نباتات الفصيلة الوردية || يتميز باليدانة
(الفائة) التي تركب لوني النبات وأغصانها || نكاته
صغية الشكل مستطيلة الانكناز يملوها دعمة مفردة

١٥٨٢٦ - شَوْشَة مَدَهَبَة ٥ Lonchaea surea (S).

Lonchaea dorée (F).

نوع من الشوب ، طولها من ٢ الى ٣ م. رأسها واربعها سود ، جسمها زبرجدي اللون ، مذهب المراج . رقاتها تمشي على الكبار الناضجة الساقطة من اي نوع كانت .

١٥٨٢٧ - شَوْشَة بَيَات Loncheidae (S).

Loncheidae (F). Loncheidae (E).

فضيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، طولها يراوح من ٢ الى ٦ م. انبساطها مختلف القد يندب فيها الازرق والاضضر . معظمها من الحشرات الناتلة الخلفية . رقاتها تمشي على المواد المنصوبة في الكبار الناضجة وفي التزبل وتحت لحاء الاجشجار .

١٥٨٢٨ - شَوْشَة ٥ Enteromorpha (S).

Enteromorpha (F).

جنس نباتات بحرية من الخفيات الخضرة . انواعها المعروفة نحو عشرة . اصنافها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جميعها اعطانية او دوسية القواعد . قصيرة الكلاب . عيطية او قدية الاذواق المستطيلة ، ثولوية المراج .

١٥٨٢٩ - شَوْشَة Amome (F).

في اقال ، اطله .

١٥٨٣٠ - شَوْشَة ٥ هو الشص ، اطله .

١٥٨٣١ - شَوْش Course (F). Ride (E).

هو الجري مرة الى الناية .

١٥٨٣٢ - شَوْشَة ٥ Anomia (S).

Anomie (F). Anomia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفضيلة المحاربات . انواعها المعروفة عديدة معظمها من مصحيرات الطبقة الجهورية السفلى . اما الانواع المعاصرة لانتظامية الشكل ، يندب فيها الاحليجي . مصارعها لامتبوية ، دائمة الانفراج ، قليلة الشغاة ، شبه شفافة ، ثولوية التداخل . ومصارعها السفلية اي اليسارية مقوية قرب الرباط ومن حله تقويب تمتد الفضلات التي يمكن الحيوان من الالتصاق بالاجسام الخارجية || حورمها مأكولة جيدة الصنت ، مغروبة فيها .

١٥٨٣٣ - شَوْش Ben oléifère

هو شجر البان واسمته شوية ويقال لشمره حب البان وزيتوه دهن البان وسطر منشر .

١٥٨٣٤ - شَوْش Sarcloir (F). Hoe (E).

الشوف : الحبر تسوى به الارض المحروقة (القاموس) .

١٥٨٣٥ - شَوْش ٥

هو الحمرطال ، اطله . وهو بري وسقلي وزراعي وعريان .

١٥٨٣٦ - شَوْش ٥ هو الشقال ، اطله .

١٥٨٣٧ - شَوْش Choucas

في غراب الزرع ، اطله .

١٥٨٢٩ - شَوَرَز مَرْغَب ٥

Cryptophagus pilosus (S). Cryptophage poilu (F). Cryptophagus pilosus (E).

حشرة دامة ونجحة من فصيلة الشفوذيات ورية معدنات الاجنحة . تألف الاجنية والغاور والسكان الارضية . خنفساها ويرقاتها تمشي تحت القش والجشاة على المواد المنصوبة والنباتية المنحلة || جسمها صغير القد يطول نحو ٣ م. ثوبها الى الصخرة الشفراء المراج . عريتها كيرتاز . زياتها صوفانيان . رأسها مستطيل الجرم . ظهرها مستدير الطرف اللامع ، كيف الحمل والزرع . ارسافها خضابية المعقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الخريف وتمشي حتى اوائل الشتاء . تسرح في الليل . تمتع المكان صمادياً وتلقب بين القش والبدل || البرقة عند بلوغها الاذراك تمام تطول نحو ٤ م. جسمها اسطواني الشكل سداسي الرؤوب . تنهي القرن ، اسر الرأس ينهي ، في مؤخر شرجها ، بكلايتين قريتنا الشبه بكلايتين اليهك .

١٥٨٢٠ - شَوَرَزِيَّات ٥ Cryptophagidae (S).

Cryptophagidae (F). Cryptophagidae (E).

فصيلة حشرات خاضعة وداسنة من رتبة خفيات الجناح || اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف المواقع الرطبة والاماكن الظليلة والاجنية والغاور والكهوف . قوتها المواد الخاضعة والذاتة || جميعها صغيرة القد قلما يتجاوز طولا ٤ م. اجناسها خلية التشاور . مصعرفة الرؤوس ، مستطيلة التزايال الصرجانية الاطراف المركبة من ١١ فصلة || انحادها لاحقة . جرانزما نشطة . ارسافها خضابية المعقل || اشهر اجناسها الشفوذ والاتيواريه .

١٥٨٢١ - شَوَرَز Gabari, Gabarit (F).

Mould, Full-sized model (E).

عشط الشية بقايبه التنية الصمحية .

١٥٨٢٢ - شَوْش ٥ Zancus (S). Zande (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات . انواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، مستديرة الشكل ، مغلطحة الجسم ، لامة الاذران . تكثر في بحار البلاد الحارة . وهي من الاسماك للمأكولة المتوسطة الصنف .

١٥٨٢٣ - شَوْشَة ٥ Lonchaea (S). Lonchée (F).

الشوشية ج. شوب ، جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة الشفوذيات . انواعها عديدة جميعها ثائلة وعشائية تمشي على مختلف المواد المنصوبة الحورانية والنباتية || اشهر انواعها الثلاثة التالية .

١٥٨٢٤ - شَوْشَة البَيْكَة ٥ Lonchaea chorea (S). Lonchée sociale (F).

نوع من الشوب . طولها من ٢ الى ٤ م. رأسها سحلي ، انبساطها سود ، جسمها ازرق لامع . رقاتها تمشي تحت صلف طاء الاجشجار .

١٥٨٢٥ - شَوْشَة حَقَمَرَكَة ٥ Lonchaea aristella (S). Lonchée verte (F).

نوع من الشوب . طولا نحو ٤ م. ثوبها الى الخضرا المايق يطول مروج اسود . رقاتها تركب ثمار التين فضطجا .



شورز مرغب



شوش



شوشة البكة



شوشة عفراء



شوش

١٥٨٣٨ - شَوْكَة شَرِيَّة ٥

Canonympha pamphilus, *Chortobius pamphilus* (S), *Procris* (F), *Procris* (E).

حشرة من فصيلة الحماقيات ورتبة حرشيفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقيا الشمالية. قرنتها جارية قوتها رقيق الازهار. سرتها تميش على حصف النجيليات || صمغ صدير اللؤلؤ نحو ١١ م. يستخرج نحو ٢٨ م. راسها صغير الحجم. عيناها كبيرتان. زياتها صليبياتان. مرشها ثنائي اللون. جوشها ويطها الى الحطلي الكسني المولج || وراثتها، عند التلقيح، الى الصمغ الصغرى يطوقها حمار صمغ ويملأها في الزوج الامامي بقعة عديدة السمرة، خيرا الاطراف وطرية الارزكان || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في تموز. تماثل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتمتد الممكن لطعام مربية الشكل على نصال حصف النجيليات || السرعة طول نحو ٢٥ م. ثوبا الى الخضار الاخر الزيتي المولج يطول خط ثوبي ويطان جانتين وعشرة اطواق جميعا كسنية اللون. قشارها مائل البشرة راسها والقوق الذي يليه الى الجوزة مدنيا ورواها الى السمرة || طول الاكمال الذي يستمر في الجبل الاول نحو خمسة اسابيع يستمر في الجبل الثاني نحو ٢٢ اسبوعا.

١٥٨٣٩ - شَوْكَة، شَهِيَاة *Chardon* (F), *Thistle* (E). اسم شائل يطلق على عدة نباتات مختلفة من فصيلة المركبات وطيورها يحسبها شبه في شكل الاوراق وسا يطوها من ابر دقيقة حادة.

١٥٨٤٠ - شَوْكَة أَجْرَ هو الحرس، اطلبه.

١٥٨٤١ - شَوْكَة الْجَمَال * *Cardus dipascus* (S), *Cardere*, *Chardon* (F), *Thistle* (E), *Distel* (D), *Cardo degli uini* (I). نبات حشبي بري من فصيلة المركبات يكثر في الحقول المزروعة وحل الطرائق. ساقه مسطحة تكلو من ٤٥ الى ٨٠ سم. اوراقه كبيرة اللثة مفروسة النصل المتصبع الضمعة اشالك الحافة. ازهاره تاجية الارزكان لونها الى الليموني العايق || يستمر من النباتات البرية الفسادة خاصة بالزرع. اما الايل فلطيمه يمشو.

١٥٨٤٢ - شَوْكَة الْجَمَال هو الاقتنا السورية وهو ذي الايل، اطلبها.

١٥٨٤٣ - شَوْكَة الْحَلِيب * *Galactium* (S), *Galactia*, *Chardon laitux* (F), *Milk pea*, *Milk thistle* (E), *Milchdistel* (D), *Galactite*, *Scarline* (I).

نبات حشبي بري شالك من فصيلة المركبات. ساقه اسطوانية تكلو من ٦٥ الى ١٠٥ سم. صمغها لبنية يضاء اللون. يقال انها طيبة تقيء الصدر. اوراقه كبيرة اللثة مفروسة، متصعبة. نصلها انغصر للضمعة الجبرية المولج يملأها تقيع ابيض، حمارها متراكب التعاريج، شالك الحافة || ازهاره تاجية. بتفسيبة اللون، يملوها شيء من الاحمر والازرق.

١٥٨٤٤ - شَوْكَة الدُرُوج هو مسط الراعي، اطلبه.

١٥٨٤٥ - شَوْكَة الدِيَسَن هو الحرف البري، اطلبه.

١٥٨٤٦ - شَوْكَة الصَّبَّ هو الاثنا السفية، اطلبها.

١٥٨٤٧ - شَوْكَة الْعَلِك هو الاخيض، اطلبه.

١٥٨٤٨ - شَوْكَة الْقَسَم هو ابر تيلون ابن سيناء، اطلبه.

١٥٨٤٩ - شَوْكَة النَّار * وُحُرُورٌ وَحُورٌ، زُحُرُورٌ *Pyracantha coccinea* (S).



شوك الجبال

سبينا *Bulson ardent acariate*, *Pyracantha*, *Arbre de Moise* (F), *Fire thorn*, *Firebush* (E), *Echter Farnedorn* (D), *Rovo ardente*, *Spina ardente* (I). شجرة شاككة فراء من فصيلة الورديات. تكلو من سترين الى خمسة امتار. فروجها الشوك الحاد. اوراقها مسقة اذنية. ازهارها حلقة المتصبع، يضاء اللون. ثمارها منية الشكل، وارتوائية اللون، لثافة السيوق الرقيق.

١٥٨٥٠ - شَوْكَة الْيَهُود هو الاثنا لقرعة، اطلبه.

١٥٨٥١ - شَوْكَة عَقْرَبَاتِي هو القرمصة، اطلبه.



شوك الحليب

١٥٨٥٢ - شَوْكَة فَرِيكْس * لِسَان الصَّبَّ

Cardus pycnoccephalus (S), *Chardon à têtes plates* (F), *Slender thistle* (E), *Slender distel* (D), *Cardo del camp* (I).

نبات حشبي بري من فصيلة المركبات ينبت في المواتع لقرعة وحل جوانب الطرائق. ساقه تكلو نحو ٦٥ سم. اوراقه مسطحة كثيرة التفريغ والتشريح والشوك. اكارها الزهرية شاككة الحواف المتفرسة. ازهاره بتفسيبة اللون يملأها تشيع ابيض.

١٥٨٥٣ - شَوْكَة لَفِي * شَوْكَة عَقْرَبَاتِي

Cardus argentatus (S), *Chardon argenté* (F), *Silvered thistle* (E), *Silber distel* (D), *Cardo argenteo* (I). نبات حشبي بري من فصيلة المركبات يتميز بكثافة حل اوراقه وسوق الذي يرمها بجلياب اخضر اللون، فني المولج. ساقه تكلو نحو ٨٠ سم. اوراقه مسطحة، متجاعة التفريغ، متراكبة المتصبع والتعاريج، كثيرة الشوك. ازهاره بتفسيبة القاعة، زرق الجسم، يفض الاطراف.



شوك النار

١٥٨٥٤ - شَوْكَة مَسْكِي

Cardus nutans (S), *Chardon penché* (F), *Musk thistle* (E), *Nickdistel* (D), *Cardo rosso* (I).

نبات حشبي بري من فصيلة المركبات ساقه فراء، تكلو نحو ١٠٥ سم. اوراقه الجلمية سانية النصل المشددة المتصبع. اوراقه القرعية صغيرة اللثة، لا قياسية التفريغ، كثيرة الشوك. اكارها الزهرية افنية الاضواء وبضها مسدل || ساقه وازهاره ويجلوها مسكية الحرف.



شوك فسي

١٥٨٥٥ - شَوْكَارِي *

Graeculus (S), *Choucri* (F).

جنس طير من الجوارح سنيات المتانير وفصيلة الترفيحات انواحه المعروفة نحو ٢٥ سلطانها فصيلة الانبياء تمتد من الهند الى جزر الزايغ واستراليا. تألف النابات والاحراج وتتسلق الاشجار بحفة. قوتها الارابع والديدان وبعض الامار البنية || اجسامها متوسطة اللثة تكلو من ٢٢ الى ٢٨ سم. اجنتها رتاجية، مسطحة، لاخفة. متعلية ضلعية مسنة معتلة الطول مستوية الاطراف. متعليةها ضلعية مسنة القاطم العليا. قوائمها معتلة الجبل. اصابعها نشيطة. غزالها كبيرة حادة الاطراف. انواها متعلقة الاالوان

ساقه قوية فراءه ترتفع نحو ١٠٠ سم. بشرتها منتشة ورقية أرجوانية بجوية لا قياسية الانتظام. أوراقه مركبة تشبه أوراق البقدونس، نصلها شديد الخضار المابق نسيجه غزير اللددة الجمالية الفعالة. أزهاره صغيرة القد، ينفصه اللون. ثماره كروية صغيرة || منبتة للمناطق المعتدلة الحرارة يقرب في الأراضي البور المتوسطة الرطوبة. يكثر قرب السباحيات وجوانب الأودية. وهو في البلاد الكثيرة الأشعاع الشمسي أغزر مادة وادئ فاعلية. وهو من النباتات الطبية الخفيفة التي يستخرج من عصارته مادة الشوكارين التي تدخل في عدة تركيبات ويستحضرات ناعمة || كان شائع الاستعمال في المصوور الغائرة لتسميم الناس وقد أمر سقراط بشرب نقيته فانت.

١٥٨٦٦ - شوكران سام * - شوكران مشين، قاتل البقر

Cicuta virosa (S), Cicutaire, Cigu virose, C. des marais (F), Cow-bane, Water hemlock (E), Echter wasserschierling, Wütherich (D), Cicuta, Finocchio acquatico, Cicutarla (I).

نبات عشبي بري طلي جعالي من فصيلة الحميميات. يكثر في المنطق وحل ضفاف مجاري الماء. جلوده خضراء غليظة. ساقه فراءه تملو نحو ٦٠ سم. أوراقه مركبة، متعاقبة، وريّة التجميع. ورقها لينة، حادة الغصّة. نصلها حاد الخضار اللامع، مسنّن الحافة. أزهاره صغيرة القد. ثلثة اللون، خضراء الموالج. والحة أزهاره وأوراقه منتنة. عصارته غزيرة للمادة الجمالية الفعالة المسببة، تستعمل في الطب استحال الشوكران.

١٥٨٦٧ - شوكران صغير * - شوكران البستاني، بقند ولس كاذب

Aethusa cynapium (S), Aethusa, Petite ciguë, Ciguë des jardins, Ache des chiens, Faux-perill (F), Asse's parsley, Fool's parsley, Lesser hemlock (E), Hundsgleisse, Hund's Petersilla (D), Piccola cicuta, Przemeno bastardo (I).

عشبة برية جميلة طيبة من فصيلة الحميميات تكثر في الأراضي المزروعة المتوسطة الرطوبة، ساقها تملو نحو ٥٠ سم. فروصها أغنية الانتشاب. أوراقها تشبه البقدونس. عصارته جميلة مينة.

١٥٨٦٨ - شوكروت، ورق الملفوف المحفوظ المالح.

١٥٨٦٩ - شوكرين، مادة جميلة فعالة تستخرج من عصاره الشوكران والشوكران المشين والصغير.

١٥٨٧٠ - شوكل، هو السوج. واحدته شوكلة وثمرته شمول.

١٥٨٧١ - شوكي، شكل من الزئبان قومه فواصل أسطوانية مستطيلة متناوبة تستحق تدويجاً مع ابتعادها عن السكية ورأس الحشرة.

١٥٨٧٢ - شوكيات، الشوكيات قسم من الحيوانات البحرية. رقبها وفصائلها وأجناسها وأنواعها عدة آلاف تبعها خمسة صفوف ||

يكثر فيها الاسود والاشهب || اعرف انواعه واشهرها شوكاري الهند.

١٥٨٥٦ - شوكاري الهند *

Gracula indicus (S), Choucarri des Indes (F).

نوع من الشوكاري. موطنه الهند. يألف الغابات والاحراج قوة الاسراع واللبدان ينتبذ الاثمار في طليها ان لم يجدها سارة || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٨ سم. ثوبه الملوي متراكب الاسود والاشهب. عيناه مطوختان بالاسود القاسم زوود وصدره وبطنه الى الفيرة. متفاده اسود. قائمتها واصابعه الى السرة المابقة. جناحه رتاجي و ذلق، لاحت. ذنبه معتدل الطول خفي الطرف المختار || يذنب عفه في الاثمار الدامية. الانثى تحضن بتناوبة الذكر من ثلاث الى خمس بيضات مرة واحدة في الحول.

١٥٨٥٧ - شوكان، هو الشكامة، اطليا.

١٥٨٥٨ - شوككة، Epine (F), Spine, Thorn (E).

عضو خشبي صلب الجسم حاد الطرف يحصل من تحول ورقة أو رزمة أو زئمة أو اذنة. والشوككة تكون دائمة الاتصال بنشب الحياة.

١٥٨٥٩ - شوككة الصباغين، هي لبن الصباغين، اطليا.

١٥٨٦٠ - شوككة حادة، هي الزرعور الشائك، اطليا.

١٥٨٦١ - شوككة زرقاء، Panicaut améthyste (F)، هي الشنداب الجسبي، اطليا.

١٥٨٦٢ - شوككة صفراء * - سكوليبيس، قرنون Scolymus (S), Scolyme, Epine jaune (F), Spotted golden thistle (E), Labgoldkorn (D), Scardiacione, Spina gialla (I).

نبات عشبي بري وزعري من فصيلة المركبات. ساقه مضطمة تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. أوراقه كبيرة القد، كثيرة التفريغ والتشريح والتمسج، قليلة الشوك، نائنة الازرة الطويلة الصفراء اللون || اكوازه الزهرية كوية القاعده، أزهاره بنفسجية الانتشاب زرق الزام الثاني والثالث، ليلكية الزام الاخير || يزود جلوده المأكولة السكرية الطعم.

١٥٨٦٣ - شوككة قبطية، هي السنت العربي، اطليا.

١٥٨٦٤ - شوككة مباركة *

Cnicus benedictus (S), Chardon béni (F), Blessed thistle (E), Benedikten distel (D), Cardo benedictus (I).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة المركبات. ساقه مضطمة فراءه تملو نحو ٦٠ سم. أوراقه الجمالية كبيرة القد منتنة، نصلها ثنائي التفريغ، أخضر اللون، اصفر الموالج، ابيض المروق، غليظ الشوك الطرية. أوراقه القوية لائنة، مستطيلة، مفرصة، مسنّة الحافة، شائكة. اكوازه الزهرية صغيرة القد مستطيلة. أزهاره صفراء اللون، طيبة، تستعمل كقوية ومبرقة ودائمة الجرح ومقبلة للأكل.

١٥٨٦٥ - شوكران * - طحطاء، يسئيس

Conium maculatum (S), Ciguë, C. tachetée, Grande ciguë (F), Hemlock, Poison hemlock, Herb benet (E), Echter schierling (D), Cicuta, Erba grande (I).

نبات عشبي بري طلي جعالي حول من فصيلة الحميميات.



شوكاري الهند



شوككة صفراء



شوككة مباركة



شوكران



شوكران سام



شوكران صغير

حل الشاملي* باتجاه الجنوب || له ثوصان امرئها الشوش الابيض .

١٥٨٨٣ - شَوْلِيْز اَبْيَض *
Chionis alba (S).
Chionis blanc, Pigeon antarctique (F).
نوع من الشوش ملونه نحو ٣٦ سم. ثوبه الى الابيض الناصع. متفاده اخضر الجسم اسود الطرف. حبه الى الزرقه يجمعها اطوار اخر. وسله قصير قلند. جذوي اللون، سردي الجلد. شتره اسبابه بيقة مستطيلة.



شولط

١٥٨٨٤ - شَوْلِيْزِيَّات *
Chionidae (S).
Chionides (F). Chionidae (E).
فصيلة طير وسيطة الجنس من رتبة الطيور الساق. انواعها المروعة قليلة العدد. اشكلها تجمع بين اشكال الزنراق والتوروس والتفلق. تتميز باجسامها الربعة وبمنايها المغلفة بنجاد يحميها من القاعده الى طرف اللفق. موطنها العالم. تكثر في البلاد الاسريكية. تألف الشولط السحرية. قوتها الحشرات والقشريات والاسماك.



شوش ابيض

١٥٨٨٥ - شَوْلِيْز ، شَيْشِيْل *
Nigella (S). Nigella (F).
جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة الشفويات. انواعه ٢٥. مهدا البلاد المعتدلة الحارة اورثها مركبة غيطية. ازهارها فردية ، تاجية ، مختلفة اللونان ، ثمارها جراء صغيرة اسطوانية الشكل ، جذورها دقيقة مستطيلة مراء اللون || اشهر انواعها ما يتبع .

١٥٨٨٦ - شَوْلِيْز اِسْبَانِي *
Nigella hispanica (S).
Nigella d'Espagne (F).
نوع من الشوليز البري الحولي ينمو في الاراضي خشوية واصرامه عديدة طول من ٥٠ الى ٨٠ سم. ازهارها كبيرة قلند ، حامدة القباب ، حميدة اللونان ، يعلب فيها الازرق والازرق والبيكي واللويح || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

١٥٨٨٧ - شَوْلِيْز الحقل *
Nigella arvensis (S).
Nigella des champs (F).
نوع من الشوليز البري الحولي ينمو في الاراضي المكسبة وهو من نباتاتها الطويلة. يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. ازهاره متوسطة قلند ، زرقاء اللون ، كماره غروية الشكل مغشوة الطرف || ازهاره بري .



شوليز دمشق

١٥٨٨٨ - شَوْلِيْز دَمَشْقِي *
Nigella damascena (S). Nigella de Damas (F).
نوع من الشوليز الزراعي الذي الحولي. خشوية واصرامه عديدة طول من ٣٠ الى ٥٠ سم. ازهارها متوسطة الحجم ، زرقاء اللون ابيض ، قنبا حديد الاسم المستطيلة الضيقة للمركبة || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٥٨٨٩ - شَوْلِيْز زِرَاعِي *
Nigella sativa (S).
Nigella cultivée, N. romaine, Cumin noir (F).
Common fennel flower, Black cumin (E).
Echter Schwarzkümmel (D). Nigella, Cuminella (I).
نوع من الشوليز وهو نبات عشبي حولي زراعي يعلو من ٤٥ الى ٦٥ سم. ساقه فراء. اوراقه مركبة . ازهاره كبيرة قلند ، زرقاء اللون . ثمار جراء مستطيلة عديدة البذور || يزده تنمو حبة البركة والحب السوداء وهي صغيرة قلند ، مستطيلة الشكل ، ملونة اللون يستخرج منها زيت طيب يفيد في الصدريه ويسكن المعال العصبي . وحب البركة يستعمل كالتوابل والبهارات وهو مقو مرموق ينه الحمض ويهد القلب والكلب .



شوليز زراعي

ينبتا شماعية . جهازها الهضمي وجهازها الدوري مستقلان. هيكلها الاسمي كلي التركيب مجهز ، غالبا ، بانوك مفصيلة متحركة . ثنوب دروعها تسمح بمرور الياس التي تستعملها اما للانتقال او للثقب . افواها مجهزة بادوات صلبة تحكها من اللغص . اسماها ثنائية التلافيف || اما صوفها الخمسة فهي : زنايق البحر ، النجويات ، الكروانيات ، الاقويادات ، قنانيات البحر .

١٥٨٧٣ - شَوْلَة
الشولة منزل من منزل القعر اليابية . وهما كوكبان نيران متقاربان يكادان يمسان ذنب القرب . ويقال لما حدة القرب || رقيب الشولة يدعى المغعة .

١٥٨٧٤ - شَوْلَة
Dard du scorpion (F).
Sting of the scorpion (E).
هي حدة القرب .

١٥٨٧٥ - شَوْلَة بَيْضَاء هي السنج ، اطليه .

١٥٨٧٦ - شَوْلَط *
Macrorhamphus taczanowski (S).
Macrorhamphus Taczanowski (F).
طائر من طوال الساق الضروب وفصيلة الزنراقيات . اصله الشرق الاقصى . يابث المناطق الباردة في الصيف والدافئة في الشتاء . ملجته الحياتي جامي . جماعته في الزين المادي لا يتجاوز ١٠ ازياج ويتجاوز الخمسة الاف عند الرحيل . قوته الحشرات وبيضها والديدان وبعيل الضفادع ... جسمه متوسط القد ، يطول نحو ٣٥ سم. رأسه صغير الجرم . متفاده مستطيل جالس . جناحا لثقلان لاسفل . ذنبه قصير مقعوم الطرف . ثوبه متركب اللونان ، رأسه وزرور ودوا وجناحه الى الكهية السوداء ، صدره وظهره الى القزرة المنمشة بالبردة . جناحه مرقان بالبرة . يدين حشفه بين اعشاب وأصل المنافع في المواقع الرطبة غير المنسورة بالماء . الاتي تحفن وحدها اربع بويضات ينبت الذكر يولن لها اللذاه .

١٥٨٧٧ - شَوْلَم هو البيلم ، اطليه .

١٥٨٧٨ - شَوْلَمَر هو الشبار ، اطليه .

١٥٨٧٩ - شَوْلَمَج
Cephalanthus (S).
Cépalanthère (F).

جنس نباتات جذومرية برية معمرة من فصيلة السحليات . انواعه المروعة قليلة العدد || يوجد منها في لبنان الشوش الحامسي (C. cuneifolia). ينبت من ارتفاع ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ م. من سطح البحر . اوراقه سنانية الاتصال مستطيلة كالحسام . ازهاره يضاء اللون ، شريفاتها ملطحة بالاصفر .

١٥٨٨٠ - شَوْلَة هي الأنبار ، اطليه .

١٥٨٨١ - شَوْلَدَر هو الشمندر ، اطليه .

١٥٨٨٢ - شَوْلِيْس *
Chionis
جنس طير من فصيلة الشوليات . موطنه شاملي* البلاد الباردة . وهو قريب الشبه بالهام يتميز بقلادة متفاده المغلف الحولي الشكل ، باستطاعة اسبابه وضيق شترتها وبذنبه المقعوم المربع الشكل || قوته الاعشاب والحشرات ويض الفلق والطروح . انهاء ثمن في النصوص تثيره

جروى القرن . عينها زهيتان . شيلها شيطان ، عينا
العقاف اللرية . فكها مستطيلان . جرانها سمره القرن ،
كثيفة الحلب يعلها يفضي الشكل ، احر القرن تملو خمسة
خطوط يفضي مفرقة يقطها خط مستقيم ابيض || تألف
الاساكن القرية من المساكن الريفية ، عكدها قرب
يطول من ٣٥ الى ٤٥ سم . تقسمه تحت الحمارية وبنيها .
سمرها دجوي . قوتها الحشرات الصغيرة || بيتها الشتوي
من ١٨ سبوتا ١٨ اسبوتا . تموش حول ثلاث سنوات || والاق
تصح للمكن في فضاء متين الحيك قلده وتحمله لاصفاً
عشاتها حق التف . ثم تحضن الصغار على ظهر يعلها
نحو اربعة اسابيع || تنبت من البوديات النافذة اللازوردية .

١٥٨٩٨ - شيباقيات ٥ Dysderidae (S). Dysderidae (F).

فصيله عاكب من رتبة الزيدلات . اجناسها وانواعها
المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في جميع البلاد المعتدلة الحرارة
من الممالق القدم || جميعها مفترسة ، متوسطه القد او
صغيرة . تتميز بما يعلها من رسوم متشابهة الاشكال .
ومركز حيويتها الزيمية الست التي لا تشرق حل ساقه
الجبهة بل تتأخر عنها بعض الشيء . شيلها قوية
نشيطه ، مستطيلة العقاف . انولها متباينة الالوان يكثر
لها الاحمر والاسمر || سمرها دجوي . تخصبي || النهار
ضمن كسادب قرابية الشكل ، متينة الحيك ، سمره
القرن || اشهر اجناسها الشياحة والشيصة .

١٥٨٩٩ - شيبا ٥ Schema (F).

١٥٩٠٠ - شيلكة ساعية ٥ Sciara nuntia (S). Sciara messagora (F).

حشرة لازودية من فصيلة الشياريات . جسمها صغير القد
يطول من ٦ الى ٧ سم . رأسها مكور ، مستقل . عينها
متلاصقتان عند الذكر ، متفارتان عند الانثى . زلاناها
عيطيان . قوتها مستطيلة ، قصيرة . طنائها مجهزة
بمناسخ ذرية . روشاها مستطيلان . قوتها الى الخطي
مستطيلة الشكل . روضها مكورة ، مستقلة . اعطامها
المايق الاطحل المواج || الاثى اكبر قد من الذكر ،
تصح للمكن في الجلالة لينتف عن يرقات تموش على المواد
النباتية المنحلة .

١٥٩٠١ - شيلريات ٥ Scleridae (S). Scleridae (F).

فصيله حشرات من رتبة ذوات الاجناس . اجناسها وانواعها
المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة .
تموش على رسيق الازهار || اجسامها صغيرة ، نحيلة
مستطيلة الشكل . روضها مكورة ، مستقلة . اعطامها
صغيرة . حيويتها زيمية ، متقاربة عند الذكور ، متباعدة
عند الاناث . قوتها الاستشارية عيطية تتألف من ١٦
فصلة . قوتها مستطيلة ، نحيلة . طنائها مجهزة بمناسخ
ذرية || يرقاتها انبوبية الشكل ، صغيرة القد ، سوداء
القرن ، تموش على المواد النباتية المنحلة .

١٥٩٠٢ - شيباكة ٥ Diagmètrie (F). Diagmetry (F).

الشياحة علم يبحث في لوصاية المواد المختلفة .

١٥٩٠٣ - شيلكة ٥ ١٥٩٠٤ - شيبب ٥

هي الاسوخ ، اطله .
هو وشق الناقع ، اطله .

١٥٨٩٠ - شوبيل ٥ Dipteronia sinensis (S). Diptéronie de Chine (F).

شوبل هو الاسم الصيني . شجرة شبه مظلية الشكل من
فصيلة التفقيتات . منبتها الصين . ساقها مائنة الماء ،
منبسطة الاضغان والاغصان ، تملو نحو ستة امار . اوراقها
عابلة ، متعابلة ، مركبة ، وريقة التجميع تمتد ١١
الى ١٥ وريقة . نصالحا سنانية الشكل ، لانظامية التنسبن
الحاربي ، تطول من ٧ الى ١٢ سم . وتعرض من ٢ الى ٤
سم . انزهارها شوكولي التجميع ، طرفي الارتكاز ،
مستتب . انزهارها صغيرة القد ، صفراء القرن ، خاسية
التركيب || ثمارها جناحية يفضي الشكل ، ثنائية الكرايل ،
وسيدة البذرة ، تطول نحو ٢٥ مم .

١٥٨٩١ - شوبار ٥ Tetaso (F).

هو الكزاز مرض خبيث .

١٥٨٩٢ - شوبب ٥ Porc-épic à queue blanche (F).

هو الشيم الايفيش اللب ، اطله .

١٥٨٩٣ - شوبكة ٥ Agénale (F). Agency (E).

الشوية اعتراف ضوي شاذ سبه عجز في الطاقة المبدية .

١٥٨٩٤ - شوبكي ٥ ١٥٨٩٥ - شوبلاد ٥

، شوبكة ، عيبثوران
مبدل ، بركتجاسف ، بكتجاسف ،
حبث فراعي

١٥٨٩٦ - شيباكة ٥ Artemisia vulgaris (S). Armoise commune, Herbe de St. Jean, H. à cent goûts (F). Mocher wort, Mugwort (E). Echter Belfuss, Mugwurz (D). Artemisia vulgaris, Erba di S. Giovanni, Amarelle (I).

نوع من الشيب يكثر في الاساكن المغفرة وحل جوانب
المساك الجبلية . ساقه عشوية ، غضة ، جزوية الماء
تمل من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها ضالية ، نصالحا
اخضر الصفحة العليا المبرزة الزغب ، اخضر السفلى الحلية
البشرة . انزهاره عشوية التجميع ، حربي الشكل . انزهاره
سطرية ، مرة الطعم ، طيبة مضادة للتشنج والصرع
والرقص السنجي .

١٥٨٩٦ - شيباكة ٥ Dysdera (S). Dysdera (F).

جنس عاكب قانصة بطاشة تموش في المراتق الظليلة وفي
الاثية وتحت الحمارية || انواعها المعروفة نحو ٤٠ اصنافها
البلاد المعتدلة الحرارة والحرارة || اجسامها صغيرة القد تطول
من ٨ الى ١٥ سم . جرانها مستطيلة ، حقيقة الاطراف .
انولها الى الحرة الخطية للمواج يعلها خط قلاب ابيض
واربعة خطوط مفرقة يفضاه القرن || سمرها دجوي .
ترك عكدها في طلب التفتن عند حلول الظلام . وهي
لا تفت من حشرة تستطع اليها سيب من النمل الى عديدات
الجناح .

١٥٨٩٧ - شيباكة حركه ٥ Dysdera erythrina (S). Dysdera érythrine (F).

نوع من العاكب الساعية القانصة ثنائية الروايا سداسية
المخاشق تنتمي الى فصيلة الشياقيات || جسمها متوسط
القد يطول نحو ١٢ سم . عند الذكر ونحو ١٨ سم . عند
الانثى . صدرها موزوني الشكل ، مقوس الصفحة العليا ،



شوبلاد



شيباكة حمره

Décembre (F).

١٥٩٠٥ - شَبَان

هو شهر كانون الاول .

١٥٩٠٦ - شَبِيكة هي قن الشبح ، اطلبه .

١٥٩٠٧ - شَبِيكة المَجْرُور هي سزار الصخر ، اطلبه .

١٥٩٠٨ - شَبِيكة Scutigera (S). Scutigères (F).

House centipedes (E). Spinnenasseln (D).

جنس دويبات من الديدان الحياتية الخزانة . اترابه المعروفة عديدة منتشرة في منطيق اصقاع العالم . جميعها مفترسة ، دسوية المسير ، تدخل المنازل اغصها الارضية تقضي على الكثير من الحشرات المزعجة وغير المزعجة ومنها الذباب على اختلاف اجناسه .

١٥٩٠٩ - شَبِيكة عَمَكُوتِي *

Scutigera araneoides, S. Coleoptera (S).

Scutigère aranéide (F).

دويبة مفترسة من الشبث وصيغة الديدان الحياتية شفوية الاكل . تألف المراتب الربطية والاقضية والكهوف . تسرح في الليل وتدخل المنازل الارضية وتقضي على الكثير من الحشرات اغصها المزعجة وديدان الجناح والذباب || جسمها سكي التركيب ، مبط ، مستطيل ، كثير الجرامز الدقيقة التي يبلغ عددها ١٥ زوجاً . الذكر اصغر من الانثى ، يطول نحو ١٦ سم . والانش ٢٤ سم . رأسها صغير ، شفاها لافان ، عينها مركبتان ، ثلاثيا الزنار . زباناها نحيلان . الزوج الاخير من جهازها بالغ الطول الذي يفوق طول الجسم || تنجب من البويضات الناعمة .

١٥٩١٠ - شَبِيكة Particularité (F). Particularity (E).

هو كل لون يتألف اللون الشامل ان في الجمل او في الابقار . فائدة والتسجيل والتخديم من الشيات .

١٥٩١١ - شَبِيكة العيجان Escisson (zoet.) (F).

Escutcheon (E).

علامة في البئر الحلو يتشبه في اواسط او اعالي مظهر الغمرع وتنتهي عند شارب الدرج او في محيط . يستعمل منها ، بالنسبة الى شكلها وسحبها وانفراجها ، من قابلية الدير في البقرة .

١٥٩١٢ - شَبِيكين ، دُورَكة Chitine (F). Chitin (E).

هي المادة القشرية التي يتركب منها جلده الحشرات واعمامها وهي باسطة شديدة المقاومة لاحتوائها على بعض المواد الجارية .

١٥٩١٣ - شَبِيكين Gymnogramme (S).

Gymnogramme (F). Gymnogramme (E).

جنس نباتات خشبانية ، برية ، عمرة ، من فصيلة اليبسباجيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منها بعض اصقاع البلاد الحارة من العالم القديم || اوراقها كبيرة ، مركبة ، وتربية التجميع ، جميلة الخضار الزاهي . مزاجها عطية . زكاتها شبه سطوسنة باصباح النصال || منها انواع قصرية تدور في المراكب .

١٥٩١٤ - شَبِيكة اُرُطَمَاسِيَا Artemisia (S).

Armoise (F). Wormwood (E). Salfuss (D).

Artemisia (I).

جنس نباتات عشبية خشبية برية وزراعية من فصيلة

المركبات الابوية الزهر . انواعه عديدة منتشرة في منطيق العالم منها البرية والنباتية والصناعية والبرية . فروصها نجلة خشبية . اوراقها صمغية زبد الخضار . ازهارها دقيقة ، وريسية ، يبلب فيها اللون الاصفر الموشع بالاصفر || اعرف انواعه واشهرها الانسين والقصوم وكشوريلد والبيتران ، جميعها من النباتات الطبية التي تنقطع اليكف وتخرج البهتان وتنبق الفواق والغصن . يقال ان تقع ازهارها واوراقها يقيد البيل السكري . واحداه مع اي دهن كان زيل داه التلب واخراش . سريق اوراقها في المنزل يطردوا ويغسلوا العينين والحشرات والمولم . ماذها البعالة تسمى ستينين .

١٥٩١٥ - شَبِيكة اَبِيص الزهر

Artemisia lactiflora (S). Armoise à fleurs blanches (F).

نوع من الشبح وهو جينة عمرة هبروية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساها وروصها ملس للحاء ، سحر اللون . اوراقها سنانية النصل ، خلية الصفنة العليا عريضة الزاوية . ازهارها متفرقة تجمرها النصل . قناياها وحرشها يبيض اكليل || ازهارها ينشر طول الحرف .

١٥٩١٦ - شَبِيكة اُرُصِي Artemisia pontica (S).

Armoise pontique, A. du Pont, Petite absinthe (F).

Roman wormwood (E). Römischer Belfuss (D).

Asenzio pontico, Piccolo asenzio (I).

نوع من الشبح وهو نجلة عمرة تملو نحو ١٠٠ سم . ساها وروصها زبد للحاء ، قلبية الشكل . اوراقها لائقة الخضار ، ثلاثية الانقسام ، ضيقة العرف . ازهارها عشوية ، مستقيمة ، مثلية || ازهارها ينشر من آب ال تشين .

١٥٩١٧ - شَبِيكة اُسَمَر Artemisia strata (S).

Armoise brune (F).

نوع من الشبح وهو نبات بري وزراعي ممر رطب في المواق الجبلية . يملو نحو ٢٠ سم . اوراقها ثلاثية الانقسام ، خضراء اللون ، حادة العرف . ازهارها عشوية التجميع ، وريسية الزهرية كروية الشكل ، مثلية ، قناياها زبد البشرة سحر الحنار || ازهارها ينشر من نحو الى آب .

١٥٩١٨ - شَبِيكة البجر *

Ascophyllus nodosum (S).

Ascophyllus noueux (F).

نوع من الفطس . اصله بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || كلاليه صغيرة ، ساه مبطلة فقاء . اوراقه عطية . مرجحة شبه يشية الشكل . لونه ال السمر .

١٥٩١٩ - شَبِيكة اليهودية * ، شَبِيكة ، حَبَشَان

Artemisia judaica (S).

Armoise de Judée, Absinthe de Judée, Semen-

contra (F). Judaea wormwood (E). Warmut aus

Judäa (D). Seme zanto (I).

نوع من الشبح وهو نجلة برية طيبة عمرة تملو نحو ١٢٠ سم . مهدا البلاد الفلسطينية . اوراقها وازهارها تنصل بصفات سائر انواع الشبح الا انها غيرة المادة البعالة . ينسفر منها اصل الستينين .

١٥٩٢٠ - شَبِيكة حولي Artemisia annua (S).

Armoise annuelle (F).

نوع من الشبح وهو نبات حولي فلاح العرف البطري



شيب حكيبي



شبح بحر



شبح اليهودية



شجيرة خرساني

يصلون من ٥٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقه خلية النصل، مستعرضة التفرع. قنابته شائعة، حروفها خضراء اللون || أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

١٥٩٢١ - شجيرة خرساني، قيصوم طيبي

Artemisia sanconium (S). Armoise santonica (F). Holy wormwood (E). Heiliggen Belfuss (D). Santonico (I).

نوع من الشجيرة وهو بحجم برية طيبة مسمرة تملو من ٤٠ إلى ٨٠ سم. ساقها بقرورها زاهة اللون. أوراقها مفصصة النصفية، تملأها خلية البشرة عاكس الخضار، قوي العرف. أزهارها منفردة، كثيفة التجميع، فواحة اللون. أزهارها وأوراقها طيبة وتستخرج منها مادة المستنق.

١٥٩٢٢ - شجيرة زوفاي، هو الابست، عطلة.

Artemisia frigida (S). Artemisia rustica (F).

نوع من الشجيرة وهو بحجم صغيرة مسمرة تملو نحو ٥٠ سم. ساقها بقرورها مزرقة اللون، كثيفة الزغب التي اللون. أزهارها وحيدة القنطرة، ثلاثة التفرع، خلية النصل، عادية العرف || أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين.

١٥٩٢٤ - شجيرة ليفي، هيبيركان أبيض

Artemisia argentea (S). Armoise argentée (F). Silvery wormwood (E). Silber Wermut (D). Assenzio argenteo (I).

نوع من الشجيرة وهو بحجم مسمرة تملو من ١٠٠ إلى ١٧٠ سم. ساقها بقرورها كثيفة الزغب الكفشي اللون. أزهارها متدلية عادية العرف، قنابها مزرقة البشرة، زغبها أبيض اللون، فني المولج || أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

١٥٩٢٥ - شجيرة كافوري

Artemisia camphorata (S). Armoise camphrée (F).

نوع من الشجيرة وهو نبات معمر فواح العرف الكافوري يملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه متفكة النصل، غنية النصفية الحولية البشرة. أزهارها منفردة التجميع، رطلة. أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

١٥٩٢٦ - شجيرة مكانيسي

Artemisia scoparia (S). Armoise à balais (F).

نوع من الشجيرة وهو نبات محلي يملو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها بقرورها مملوءة اللون، سمراء الزغب. أوراقه ملهية البشرة. قنابته أزهاره جوية اللون، شائعة الخمار اللامع || أزهاره يستمر من تموز إلى تشرين.

١٥٩٢٧ - شجيرة البحر، هو حبيج البودية، عطلة.

Armoise de Judée (F).

١٥٩٢٨ - شجيرة البحر، شجيرة اليهود، أبو مريكة

Leptonyx monachus (S). Leptonyx, Phoque moine, Moine (F). Leptonyx, Monk-seal (E).

حيوان بحري لونه من زعفران القدم فضيلة النعيمات. موطنه البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. ملجته الحيواني جماعي، جماعات قليلة العدد. قوته الاسماك والقشريات والرخويات || جسمه معتدل يطول عنه الذكر من ٢٤٠ إلى ٢٦٠ سم. رأسه متوسط الحجم يتميز بكثافة سباله. ذيله سائي الشكل. قوته الملوي إلى.



شجيرة البحر

السرة المملوءة يملوها مولج اسود. يملو إلى البيضاء المائي. أبطاء مرقشان بالاسر الاسود || الاثني اصفر قدام الأكر. طويلا يراوح من ١٨٠ إلى ٢٠٠ سم. تمنح جرراً واحداً ترصه نحو ستة أشهر ويبقى بمعيتها من ٢٠ إلى ٢٢ شهراً.

١٥٩٢٩ - شجيرة الربيع، هو الارينارون، عطلة.

١٥٩٣٠ - شجيرة، هو السرج، عطلة.

١٥٩٣١ - شجيرة، Antilope thibétaine (F).

الشجيرة حيوان لبون مجرّ يدهى طيبي اثبتت، عطلة.

١٥٩٣٢ - شجيرة، جنيفست، Genista (S).

Genêt (F). Genista (E).

جنس نباتات جنينية وبحجم مسمرة من فصيلة القرنيات للقرائية. أنواعها المرفوعة قليلة العدد اصطناعيا بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || ساقها فواحة. فروعها متباينة الاشكال وسببها الشائك. أوراقها بسيطة أو ثنائية التجميع، صغيرة النصل الجامدة. أزهارها منفردة التجميع أو فردية أبلي الانكاز. أزهارها صفراء اللون. اشهر أنواعها:

شجيرة أفرية، G. cassia (S).

شجيرة لبنانية، G. libanotica (S).

شجيرة ليدية، G. lydia (S).

شجيرة شوكية، G. scanthocida (S).

١٥٩٣٣ - شجيرة شوكية، Schizocappa

جنس نباتات عشبية صغرية من فصيلة النكيات. أنواعها قليلة، منها البلاد الحارة، تزرع للزينة. أزهارها كثيرة القد بحجم المنظر مختلفة الألوان الزاهية.

١٥٩٣٤ - شجيرة زنبقة، Schizoneilla

جنس فلور مجهرية من فصيلة الراوييات تتميز بطولها النقي الشكل ثم ينفجها الكفيف، الفسي التجميع وبهرقها الشفوية الثنائية التركيب || يصيب السدييات حل اختلاف أنواعها.

١٥٩٣٥ - شجيرة، هو المرمر، عطلة.

١٥٩٣٦ - شجيرة، عتلة، شس، Schiste (F).

Schist, Slaty rock (E).

خضار مجهر صفيي التركيب احابه غطط شديد في اعماق الارض. يرجع منه الى ما قبل الاراضي الطباشيرية في الحقبة الثلاثية.

١٥٩٣٧ - شجيرة، Chélicère (F).

Chelicer (E). شيفها الحشرة أو الكودية عا كلابتا مقصفا الشفوي.

١٥٩٣٨ - شجيرة، Chélicères (F).

Cheliceræ (E). فئة من المفصليات حيواناتها عادية الزباني تستعصى منها بزوج من الشيلاف. يصفها غشويي التنفس كما في صف المرصويات، والبعض الآخر زواي أو قسيمي التنفس كما في صف المتكوييات.

الرقابة تركت على اجتناب بطرية التربة وكثافة الانحجار .
ثم استعمال الاسدة الموزونة التركيب والصيغة واجتناب
نقص الادوية في الاوقات الحارة .



شيش

Marginella (S). * شيشع ١٥٩٤٥
Marginelle (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربل
وفصيلة الشيشيات . انواعها المروفة نحو ٣٠٠ وبها
من متحجرات الاساقب الثالثة والياتي منتشر في معظم
بحار البلاد الحارة . بعض انواعها يعيش على رمال الشطوط
المغمورة والبعض الآخر على حشائط المرجع || اصداؤها
مائلة متباينة الاشكال والاحجام يكثر فيها الشكل
البيضي ثم الخدوني . فوهات مستطيلة و غبيقة .
اريقاتها اليسرى ملتوية الى الداخل اما اليتى قال الخارج ||
اجسامها كبيرة ، ورووسها واضحة ، ثنائية الالوان للمجموعة
اغصانها صغيرة ، اريدتها ضفافة . اربطها عادمة الغطاء .
اشهر انواعها الشيش السرديني (Marginella sarda) الذي
يشبه السردين شكلا وحجما والذي يكثر وجوده في البحر
الايض المتوسط .

Marginellidae (S). * شيشيات ١٥٩٤٦
Marginellidae (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربل .
اجناسها وانواعها المروفة عديدة ، بعضها من متحجرات
الاساقب الثالثة والبعض الآخر مخصص منتشر في معظم
بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اعراف اجناسها
واشهرها الشيشع .



شيشع

١٥٩٤٧ - شيشعج هو الصاب ، اطلبه .

١٥٩٤٨ - شيشس الزفرين *

Gonapteryx rhamni (S).
Gonapteryx citron, Citron (F).

حشرة من فصيلة الكرنبيات ورتبة جرشفات الانجسة .
اصطانتها صباب وجبال الشرق الاذل واروية وافريقية
النشالية . غراشها واضحة قوتها عنث الازهار . مرتباتها
على براعم النبقيات ونوايسها || جسمها يطول نحو ١٩ م .
سقطها نحو ٥٦ م . رأسها مستدلل الجرم . احر اللون .
ميناها كيريتان . زباناها صولجانان بيضيان كيف الخمل
احمل اللون . يعلها اريد اللون عند الذكر ، املحه عند
الانثى . وروشنا الاسمان الى الصفار البيوتي عند الذكر
والى الخضار الباهت الازرق للمراج عند الانثى . وتعلوها
نقطة برتقالية في كل ووشن وبعض نقط حاشية فمسية
اللون . لزوج الخلفي بلون الانامي وتعلوه عند الشقين
نقطة برتقالية كبيرة واربعة نقط صغيرة فمسية اللون ،
حاشية || غا جيل واحد في الحول . الانثى تمتع المكان
زويجا زويجا حل زيمات الزفرين والنبق والصاب || السرة
الخضراء يملوها غطان جانبيا اسفرا وسمة خطوط
كستنية يحدها اطار اسود . رأسها اسود ملها ورواجها
الى الطملة الداكنة || طرور الاكمال يستمر نحو ٣٦ م . فوها الى الطملة
ويبدأ ويتقضي ضمن غشاء عضوي المادة ويبلغ غيط
حريري تمشده الحفصة .



شيشس زفرين

١٥٩٣٩ - شيشس *
Rumlea (S).
Rumleé (F). Rumleá (E).

جنس نباتات ديصية من فصيلة السونيات . منبتها
ساحل حوض البحر الايض المتوسط . انواعها المروفة
سنة . سوقها غمرائية ، قرصية الانتشاب ، لاقامية الازراع ،
منها الوحيدة ومنها الفمية . اوراقها متماثلة غبيقة اتصال
المستطيلة . زهارها فردية ، طرفية الازكار . الوانها تختلف
من نوع الى نوع ، منها البنفسجي والوردي والاصفر
والبيكي والمزلق .

١٥٩٤٠ - شيشيان Fourmi mila (F). Ant male (F).
هو ذكر النمل .

١٥٩٤١ - شيشس *
Lonchoptera (S).
Lonchoptère (F). Lonchoptera (E).

جنس حشرات من فصيلة الشيشريات ورتبة ذوات
الجناحين . انواعها المروفة نحو ٣٥ منتشرة في معظم مناطق
البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة هيفاء ، تطول
من ٣ الى ٥ م . ورووسها كبيرة ، مسررة . حوتها كبيرة ،
ناشرة ، غايقة عند الشقين . قرونها الاستعمارية قصيرة ،
ثلاثية الفصل ، تنهي بنسيلة دقيقة . اغصانها فمسية .
ملاسها وحدة العلة . كوسلها وبلطنها متساوية العرض .
رواشنها فيه شغافة . قرونها مبررة الحلب الثالث .
الوتها ملوة || تألف النباتات وشفات مجاري الماء .
جسمها واضحة ، قوتها رسيق الازهار وطلها . يرتقاتها تعيش
على المواد النباتية الجزئية الاصل في الجلالة وفي كل
مكان آخر .

١٥٩٤٢ - شيشريات *
Lonchopteridae (S).
Lonchopteridés (F). Lonchoptéridés (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
المروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض اصقاع العالم ||
تألف الحراج والغابات وبعضها يعيش قرب مجاري الماء ||
اجسامها صغيرة ، هيفاء ، تطول من ٣ الى ٥ م . ورووسها
كبيرة . حوتها غايقة عند الشقين . قرونها الاستعمارية
قصيرة ، ثلاثية الفصل . اغصانها فمسية تتدرج في
التجويع اللثقي . شفاهها السفلى لافقة . تآكدها غامرة .
رواشنها شبه سنائية الشكل . قرونها نقطة ، مبررة الحلب ||
يرقاتها مبطلة تعيش في المراتع الرطبة على المواد النباتية
الجزئية الاصل || اشهر اجناسها الشيشر .

١٥٩٤٣ - شيشط Brûlure (F). Scald (E).
احترق النبات من الصقيع . يقال شيشط الصقيع النبات .

١٥٩٤٤ - شيشط البشركة ، شيشط النيار
Rousissement de l'épiderme, Rousissement des
fruits (F).

الشيط تشويه عايط يحل بجذبا الادة فيفرض عليها ويجب
استبدالها بمادة فلفية . اسبابه عديدة احصاها :
١ - العوامل الجوية اللاوائية كالبرد والرطوبة وتغي
الحرارة التي تقب البقد وتستمر نحو ٤ اسابيع .
٢ - الاختلال في توازن الغذاء .
٣ - الهش الناتج من استعمال بعض الادوية الكاوية .
٤ - الازماد الباكرك اذا امتري الثار قبل الاوراق او
ركب الاوراق والثار في آن واحد .

من الذيلية الى السمة الخطية يطوقها حصار اسود . رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخط . شفاها متوسط الانفتاح . فكها متعادلان . اسناتها متراصة وحيدة الصف في الفكين . عينها مستديرتان ، ولشفتان . زعانفها الظهرية اثنتان . زعنفتها الذيلية فارقة . لحما وديك ، ابيض اللون ، مستحب العلم .

١٥٩٨١ - شيم طرخوري * ، طرخورة

Trachurus trachurus (S). Saurel, Chinchard (F).
Scad, Horse-mackerel (E).

سمكة بحرية بيضاء من الشيمات الاسقرقيات شالكتات الزعانف . اصطلها جميع بحار البلاد المحيطة بالحرارة من البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي والمحيط الهادي من جسمها اعليجي الشكل بطول من ٤٥ الى ٦٥ سم . ثوبها الى الربعة انزواء ينصرف ويسمر عند الظهر ويترعد الزيل . رأسها مخروطي الشكل مستدل الحبر . فكها الاسفل يتقدم الاعلى . تتميز باستطالة زعانفها الظهرية والشرجية . زعنفتها الذيلية فارقة . حراشف عظمها الجانبي جنانية الشكل تملأها مناس متتفة تتجسم وتكثر مع الاقتراب من الذنب . لحما متوسط الصنف ، مأكول .

١٥٩٨٢ - شيم قراب * ، قراب

Caranx korab (S). *Caranx korab* (F).
Caranx korab (E).

سمكة بحرية بيضاء من الشم . اصطلها جميع اقالم البحر الاحمر وبعض مناطق البحر الابيض المتوسط . تتميز من اسماك اللقاف واليم . جسمها اعليجي الشكل ، مستدل التبطيط . بطول من ٤٥ الى ٥٥ سم . ثوبها الى الفضة الفضية المالح . ظهرها الى الزرق . زعانفها الصدرية والحوضية الى الفضة . الظهرية الى الخضار البحري ، الشرجية شفاة يطوقها حصار اصفر . الفلقة العليا من الذيلية الى الزرقه الخضراء الموح . الفلقة السفلى الى الصفار الباهت . لها في ظهرها زعنفتان . زعنفتها الذيلية فارقة . لحما جيد الصنف ، مغروب فيه .

١٥٩٨٣ - شيميات

Carangidae (S). *Carangidae* (F).
Carangidae (E).

عارة اسماك من الاسقرقيات الشالكتات الزعانف .

Caractérologie (F). *شيمية* (S).
Characterology (E).

الشيمية قسم من السيكلوبية يتبع في الطباع الخلقية .

١٥٩٨٥ - شيميتير هو الشونيز ، امله .

١٥٩٨٦ - شيم

Hystrix (S). *Porcupine* (F).
Porcupine (E).

جلس حيوانات لينة قاضمة من فصيلة الشيميات انواعه سة . جميعها غليظة الاجسام تتنفس بالصمورة . رؤوسها مكدرة . مقاضها مقشوة . خنابها مستعرضة . حيدها وأذنها صلبة . اسناتها قصيرة . جرابها مستدلة اللد قوية . اخافها مقوسة حادة . اذنانها جذع بارزة . عليها كثيف التسجع قصير اللد يتخلله شوك كالسائل متين الطول والفلط يملو الجسم من قة للراس الى طرف الذنب . اعرف انواعه الشيم اللبلول والشيم الابيض الذنب . قال فيه الجاسط : « من شاته انه يمدد قائما واذا رأى ما يكره انقبض وتتضخ فيخرج منه شوك كالسائل يبرح من اصابعه . »

كل مستطيلة . الكتلة تشمل من ٢٤ الى ٢٦ مكنة تنقف بعد منها بنسبة اربعة ايام نسبة الى عوائل القوس من رفات صغيرة نمة تنقل الى الارواق وتنظر السوق وتبلغ كامل نمجا البرقي بنحو ثلاثة اسابيع ثم تتحول الى عذارى وبها الى حشرات كاملة . طورها القلدي يدمج في الربيع والصيف من ٤ الى ٦ ايام . اما البرقة الكاملة فطولها نحو ٢٥ سم . لونها الى الجوزة الخطية يطوقها حسة غلوط ارجوانية مستطيلة كتكتف الظهر والجانين . عوائلها عديدة اهمها قصب النسر والارز والذرة الصفراء والبيضاء والذخن والتجبل . اضرارها شديدة القبح لنها تحفر السوق وتقضي حل التوايح .

١٥٩٧٧ - شيلينة *
Chilina (S). *Chilina* (F). *Chilina* (E).

جنس حيوانات مائية من الرغويات مدييات الاربيل وفضيلة الشيمات . انواعه المعروفة قليلة العدد اصطلها اثير ويابيح لأمريكة الجنوبية . ثوبها الثبات المائلة . اصطلها نصف كروية الشكل ، قصيرة الارب ، كبيرة القوة المستطيلة . اجسامها مستطيلة . رؤوسها قليلة الزوض مبطلة . لواسها مزوانية الشكل . اربطها وحيدة . مستعرضة عادمة السقاط .

١٥٩٧٨ - شيم ، شيم
Caranx (S). *Caranx*, *Carangue* (F). *Scad*, *Cavally*, *Horse-mackerel* (E).

جلس اسماك بحرية من فصيلة الاسقرقيات . انواعه عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الحارة والمعتدلة . جميعها من الاسماك المأكولة . كبيرة القد طولها يراوح من ٤٥ الى ٧٥ سم . تتميز بخط جانبي من الحراشف الحلالية الشكل ، السوداء اللون ، يقطعها من الق الى التخرج .

١٥٩٧٩ - شيم ارب *
Caranx glaucus (S). *Caranx glauque* (F). *Glaucous scad* (E).

سمكة بحرية بيضاء من فصيلة الشيميات وربة شالكتات الزعانف . اصطلها بعض اقالم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي ... تتميز من الاسماك البنية . جسمها اعليجي الشكل ، مستدل التبطيط . بطول من ٥٥ الى ٦٥ سم . ثوبها الى الربعة يطوقها موج انزرق يتخلله الاخضر البحري يمتد في الظهر ويترعد في البطن ويملو جميع فصي منه قاعدة الزعنفة الظهرية الثانية والزعنفة الشرجية . رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخط . شفاها واسع الانفتاح . فكها متعادلان . اسناتها صغيرة وحيدة الصف في الفكين . عينها مستديرتان ، مستديرتان . زعانفها الظهرية اثنتان . زعنفتها الذيلية فارقة . لحما وديك ، ابيض اللون ، مستحب العلم .

١٥٩٨٠ - شيم صمن * ، صمن

Caranx sansun (S). *Caranx sansun* (F).
Caranx sansun (E).

سمكة بحرية من الشم . اصطلها جميع اقالم البحر الاحمر وبعض مناطق البحر الابيض المتوسط . تتميز من اسماك اللقاف واليم . لنسبها الحياتي حاجي بعد الادراك . جسمها اعليجي الشكل بطول من ٤٥ الى ٥٥ سم . ثوبها الى الفضة الفضية المعادة الفس . زعانفها الصدرية والحوضية غبراء اللون . زعنفتها الشرجية والفلقة السفلى من الذيلية الى الصفار الخشن المالح . زعانفها الظهرية والفلقة العليا



شيلينة



شيم اريد



شيم صمن



شيم طرخوري



شيم قراب

ورقية للقوائم . اجناسها وانواعها عديدة تتميز باجسامها الفسحة المنقضة . رؤوسها غليظة . مقامها مقنونة . اذنانها قصيرة او طويلة اخاذة . جرابها مقنونة للطول رباعية او خمسية الاصابع . انظرها قوية ذرية . جلودها حسية التركيب يطوها طب دقيق وشوك كالمسك متباين القلط والطول || موطنها المناطق الحارة من الملائن القديم وال جديد . وهي بطيئة الحركة تسرح في الليل قريبا تختلف المواد النباتية والظواهر والورق والافاعي .

تقسم هذه الفصيلة الى فئتين :

— فئة الشياهم الشاجرة المتسلقة وهي تشمل ثلاثة اجناس الاروين والكتنوس والشمسوس .

— فئة الشياهم الارضية وهي مؤلفة من جنسين الشيم والامورور .



شيم ملول

١٥٩٩١ - شبههميات الشوزب

Hystricomorphus (F).

مرتبة حيوانات لبونة من رتبة القوائم تشمل اربع فصائل الشبهيات والادافيات والشنفيليات والثيردنيات .

١٥٩٩٢ - شيروط

Chayota (F).

هو الشوكيوم نبات زراعي من القرعيات ، اكلية .

١٥٩٩٣ - شيوخ ، علكية شائعة

Indivision (Jur.) (F). Joint-possession (E).

حالة قانونية يوجه فيها من يملك حقاً مشتركاً مع غيره في مال او عقار لم يقسم بين مالكيه ويكون كل مشتاع شريكاً بقدر نصيبه في كل جزء من اجزاء المال المشترك على الشيوخ ويكون نصيبه متنوعاً محصاً بغير عه بالارقام كالتصنف والربع والثلث في حين يبقى المال الذي ينصب عليه هذا الحق شائعاً .

Chlonodace (F).

١٥٩٩٤ - شينودكة

هي الثرثوث ، اكلية .

١٥٩٨٧ - شبههم أبيض الذئب ، شوهب ، مدكك
Hystrix leucura (S). *Porc-épic à queue blanche* (F).
نوع من الشيم كبير الجثة غليظا بطيء الحركة ، طوله يراوح من ٧٥ الى ٨٥ سم . وذنبه من ٧ الى ١٥ سم . ثوبه الى الصبغة البيضاء . عليه اثنان اللون وشوكه كلك . ذنبه ابيض الملب والشوك || موطنه الهند ويران والبراق وحضانات بحر قزوين . يأنف المناطق القترية من العراق . جمره ردة فسيحة مستديرة يحفرها على عمق ٧٥ سم . يارعي اليها في النهار . يسرح في الليل . قوته الجلود والساق والاصحاب || اثناء تضع من ٢ الى ٤ ادراس تخلف باصرة كاسية .

١٥٩٨٨ - شبههم بحري

Hérission de mer (F). *Porcupine fish, Sea hedgehog* (E).

هو قنفذة البحر من الفقريات ، اكلية .

١٥٩٨٩ - شبههم ميدوني ، شيطم ، دككك

Hystrix cristata (S).

Porc-épic commun, Porc-épic à crête (F).


نوع من الشيم غليظ الجثة الزينة الصمورة . بطيء الحركة . طوله يراوح من ٥٥ الى ٦٥ سم . وذنبه ١٦ . شوك فقرته ومنتعه دقيق مستطيل منطون اقزام الاخير . طوله نحو ٣٣ سم . شوك ظهره كثيف التجميع مستقيم الشكل غليظ القذ ذرب الاطراف بطول من ١٥ الى ٢٥ سم . يلفسه الطيران لنفاخ عن النفس فينفذ ويؤذي حيث يفرز || موطنه فسح الارباب يعم كامل مروض البحر المتوسط || يأنف الاحراج والمغاب والاماكن البعيدة عن الممران . جمره ردة لسيمة يحفرها في التربة على عمق ٦٥ او ٧٥ سم . مدخلها ويخرجها نفق واحد . طوله نحو ٥ امار || يسرح في الليل . قوته الاصحاب والجلود وجميع انواع الشوك والصباه وبعض الحشرات والبهذان والورق والظواهر والافاعي || اثناء تضع من درسين الى ٤ ادراس تخلف باصرة كاسية .

١٥٩٩٥ - شبههميات

Hystriidae (S).

Hystriidae (F). *Hystriidae* (E).

فصيلة حيوانات لبونة قاعسة من مرتبة شبههميات الشوزب



صابنة



صابوغة



صابونية ربحانية

١٥٩٩٩ - صابونيات ، قروشيات
Clupeidae (S), Clupeidae (S), Clupeidae (S).
فصيلة اسمك حديثة الاجناس والانواع، متفانية القد وقد
الاسراب. اشهر اجناسها الصابوغة والشابل والسردين
والرذكة الخ.

١٦٠٠٠ - صابون
Savon (F), Soap (E).
مادة صناعية تستخدم للتنظيف تتكون من تفاعل بعض
المواد البعنية مع بعض المواد القلوية .

١٦٠٠١ - صابونيات
Sapindaceae (F).
هي فصيلة السبنديات ، اطباها .

١٦٠٠٢ - صابونية
Saponaria (S).
Saponaria (F), Saponaria (E).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القرنفليات .
انواعها نحو ٢٠٠ جميعها منقطة . اوراقها كاملة متعاقبة .
ازهارها ثورية التجميع . تاجية الارتكاز ، زائفة الاكوان
التي تختلف با اختلاف الانواع || اعرف انواعها واشهرها
سا بل .

١٦٠٠٣ - صابونية داقية
Saponaria glutinosa (S), Saponaria visqueuse (F).
نوع من الصابونية وهي عشبة سبوتية محولة تملو من ٢٥
الى ٥٠ سم . ساقها مرعاه مزغبية . اوراقها كبيرة القد ،
تصلها ثلاثي او خماسي المروق ، ازغب البشرة ، دابق
المسام . ازهارها هربي الشكل . ازهارها قرمزية اللون ،
صغيرة البلات الجزلة .

١٦٠٠٤ - صابونية زبحانية
Saponaria ocimoides (S), Saponaria faux-basilic (F).
نوع من الصابونية وهي عشبة سبوتية معمرة تملو من ٢٠
الى ٤٠ سم . ساقها مرعاه . اوراقها منقطة ، اطليجية ،

١٥٩٩٥ - صادة
Délivre (F), After-birth (E).
ما يخرج من رحم انثى الحيوان من القذى بعد الوضع .
يقال القت البقرة صاتها .

١٥٩٩٦ - صابة * ، مكسيلة
Hippomane manchinella (S), Mancanillier, Arbre
poison, A. de mort (F), Manchinel tree (E), Man-
cinellenbaum (D), Mancanilla, Mancinella, Noce
venenoso (I).

شجرة من فصيلة السبوتيات تملو من ٥ الى ٧ أمتار ،
شكلها على هيئة الجوز . ساقها سرسة صهبوية . اوراقها
مدعقة ، متعاقبة ، قلبية ، مستطيلة . لصلها شديد الحصار ،
متسحق الصفحة ، سميك التسيج . ازهارها وسيدة المسكن ؟
الذكورية قدية الشكل ، غدية التجميع ، والانثوية فردية .
ثمارها كالتفاح الصغير شكلًا وحجمًا وهي مأكولة ، لذية
الطعم ، والشجرة تفرز شئانة اي عصارة لينة حريفة ،
كاوية ، سامة . ومنهم من قال ان كل من نام في ظلالها
كان نصيبه الموت . ج صاب .

١٥٩٩٧ - صابوغة *
Alosa finta (S).
Alose, Feinte (F), Shad (E).

سمكة من الصابونيات كبيرة القد ، تملو نحو ١٠٠ سم .
تكثر في المتوسط وعلى شواطئ الاطلسي . تتسلل الاغوار
وتصعد الانهار في زمن السره ثم تعود الى البحر في اواخر
الصيف || ملها لذية الطعم غير انه كثير الحسك .

١٥٩٩٨ - صابوغة النيل
Clupea nilotica (S).
Alose du Nil (F), Nile Shad (E).

سمكة بحرية ونهرية من الشابلات الصابونيات ، موطنها
المتوسط . يكثر بجودها في النيل من آذار الى تموز وهي
كبيرة القد ، كثيرة الحسك ، مأكولة .

١٦٠١٤ - **صَادُور** Echalas (F). Vina-prop (E).
الصناديد ما يمرض عليه الكرّم .

١٦٠١٥ - **صَاكُوَة** Empaqueueteuse (F).
جهاز آلي يصر تلقائياً ما جيل يشتركه من الأشياء .

١٦٠١٦ - **صَاكُوَة** Shunt
سلك ينصرف إليه قسم من التيار الكهربائي فيضف .

١٦٠١٧ - **صَاكُوَج** ، **صَرَج** Pisolthe, Pisolite
تربة جصية سميها تسمى التلّ تقدرها يراوح من حجم
برّة النرد إلى الحصة .

١٦٠١٨ - **صَاكُوَخ** Fusée (F). Spindleful (E).
سهم شديد الانفجار رشق به بعض السحب فيحول بلدا
إلى ماء يسقط حل الأرض مفرأ بدلاً من البرد .

١٦٠١٩ - **صَاصَاَة** Couture (F).
Falling off, Dropping off (E).
سقوط الزهر بعد التآير والإصحاب ، راجع تحشف .

١٦٠٢٠ - **صَاصَل** هو الأشراس ، أطلبه .

١٦٠٢١ - **صَاصَل الحنّش** هو إشراس الحنّش ، أطلبه .

١٦٠٢٢ - **صَاصَل عَيْمِي**
هو الأشراس الأسابي ، أطلبه .

١٦٠٢٣ - **صَاصَاَة** ، **صَتَاصَاَة** Ascendant (F).

١٦٠٢٤ - **صَاصَاَة** Stalagmite
صاصة ج . صاصة : راسب كلسية متجمعة فائقة تقطر
أرض الغاور ويوتناين .

١٦٠٢٥ - **صَاصَاَة** Foudre (F).
Lightning, Thunderbolt (E).
افراخ كهربائي جوي بين حماية مكهربة والأرض أو
بين صهائين . والصاعقة يصحبها برق ورعد .

١٦٠٢٦ - **صَاَص**
صاف الكرّم : يذت نوايه بعد الصرام .

١٦٠٢٧ - **صَاَص** Clair, Limpide (F).
Thin, Limpid, Clear (E).
ما كان لا دس فيه .

١٦٠٢٨ - **صَاَصِر**
الصافر : كل ما لا يصيد من الطير . والتسر يصفر .
وفي التلّ : أجبن من صافر وأصفر من ليل .

١٦٠٢٩ - **صَاَصِرَة** Couleuvre-chapelet (F).
الصافرة اسم ثلث لثمان المرقط ، أطلبه .

١٦٠٣٠ - **صَاَصِلَة** Evénement (F).

Opuntia ovata (S). صَبَّار بَيْضِي
Raquette ovoïde (F).
 زرع للزَّيْن ، غِله يملو نحو ١٢ سم. ساقه ملسية
 اللوح البيضي الشكل المبط. سائر رافعة ، مضفرة ،
 صفراء اللون ، حاتها مستقلة مفصلة || ازهارها جزئية ،
 جيلة ، كبيرة ، قطرها نحو ٦ سم.

Opuntia inermis (S). صَبَّار صَرَح
Raquette sans épines (F).
 زرع للزَّيْن ولأهل المأكولة . مهد بلاد الاقليل ونلورنيا
 غيله يملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ألواحها اهليجية الشكل ،
 بحرية اللون تطلو نحو ٢٠ سم. سائرها قليلة ميمرة سمراء
 اللون ، عادمة اللون || ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو
 ٧ سم. لوها الى الصفرة الباهتة . ثماره يرتقالية الشكل
 متوسطة الحجم ، سكرية اللب ، حواء البزور المراسمة .

Opuntia stanleyi (S). صَبَّار سَتَنْكِي
Raquette de Stanley (F).
 زرع للزَّيْن ، غيله يملو نحو ٣٥ سم. ساقه مفصلة .
 ألواحها صفية الشكل تطلو نحو ١٥ سم. سائرها رافعة
 مخددة بيضاء اللون . حاتها كثيفة التجميع مشربة السمرة
 تطلو من ٣ الى ٦ سم || ازهارها كبريتية الصفار ، زاهية
 اللون ، قطرها نحو ٥ سم.

١٦٠٤٩ - صَبَّار شَنْغْدِي * ، كاكوس شوكي
Echinocactus (S). Echinocactus (F). Spine cactus (E).
Igelkaktus (D). Echinocacto (I).
 جنس نباتات زربية شاككة ميمرة من فصيلة الصباريات.
 ألواحها عديدة منها البلاد الامريكية الراسي . ساقها
 لحسية واسعة القطعة ، يرتقالية الشكل مخددة الجسم ،
 مقبولة الرأس والمقب . سائرها كثيرة العدد ، منتظمة
 الابعاد ، سطحية اللون ، ترتكز كل فوج الاغصان .
 حاتها ، قوية صلبة ، منبسطة ، متجاككة || ازهارها
 حلالية ، كبيرة القد ، جيلة اللون الوردية . زرع في
 المراكز لأنها تخشى البرد .

١٦٠٥٠ - صَبَّار مَعْرُوف * ، صَبَّار ، لَبَن شوكي
Opuntia vulgaris (S). Raquette commune, Figuler
de Barbarie (F). Barbary fig (E). Gewöhnlicher Fel-
genkaktus (D). Fico di Barberia (I).
 نبات سبوتي شائع الاستعمال يزود قسيسنج ولأهل
 المأكولة . غيله كثيف التجميع يملو نحو ٢٠٠ سم.
 ألواحها كبيرة القد ، بحرية اللون ، سائرها سطحية شاككة ،
 حاتها غليظة سادة || ازهارها كبيرة القد ، زاهية الصفار
 الجليل . ثماره مأكولة ، يضيء الشكل مقبولة الرأس
 والمقب . قشورها الى الخضار الاصفر تملو عند الادراك
 مسحة حراء . وهي منتظمة السائرها الشاككة . شوكها
 كثيف التجميع شديد الصلابة والقد . لهاها سكري العلم
 مرصوف البزور ، يقال انه لا يخلو من بعض العناصر
 الاندائية المفيدة ونها الحامض التسريفي الجزيل المنفع .
 يعيش في جميع الارربة من البردية القاحلة الى الحسية
 المندجة . يتكاثر بفرض ألواحها او بجزء منها .

١٦٠٥١ - صَبَّار مَعْنَصَن
Opuntia tunicata (S). Raquette à tunique (F).
 زرع للزَّيْن . غيله يملو نحو ٣٠ سم. ساقه وفروها
 اسطوانية ، مراسمة ، قليلة التبطيط ، تطلو نحو ٥ سم.
 ألواحها صفيرة القد ، بحرية اللون . سائرها سطحية سميرة
 حاتها قوية تلبه اللون تطلو نحو ٦ سم . || ازهارها الى
 الخضار الاصفر الزاهي الملوّج .

١٦٠٣٣ - صَبَّارِي الحَسَاب
Décompte (F). Deduction, Allowance (E).
 هو تمين رصية الحساب المطلوب .

١٦٠٣٤ - صَابُور
Eplureur (F). Cleanser (E).
 الصابون او المند آلة تنقع الحجارة من الارض ويجمها .

١٦٠٣٥ - صَابُورَة
Fosse cérébelleuse (F). Cerebellar fossa (E).
 الصائرة : بطن القحف لشرف على الدماغ .

١٦٠٣٦ - صَال
 الصال : الحار الرشي الحاد الصوت ، ج. صالة .

١٦٠٣٧ - صَاعِغ ، لَصِي
Gommeux (F). Gummous (E).
 ما كان معني المادة او ما كانت تملو مادة صمغية .

١٦٠٣٨ - صَامِل ، صَمِيل
Sec, Desséché (F). Dry, Withered (E).

١٦٠٣٩ - صَامُور
 هو الشبان ، نبات شاكك من التبقيات ، اطليه .

١٦٠٤٠ - صَائِرَة
 هي لُثْن ، اطليه .

١٦٠٤١ - صَبَّا
Vent de l'Est (F). Easterly wind (E).
 هي الريح الشرقية ميمها من مطلع اقربا الى نبات تش .
 يقابلها المديور .

١٦٠٤٢ - صَبَّار
 هو كتير المعني ، اطليه .

١٦٠٤٣ - صَبَّار
Opuntia (S). Raquette, Opone (F).
 جنس نباتات لحسية من فصيلة الصباريات . ألواحها عديدة
 معظمها بري وبسها زرامي وزربي . يتميز بسوقه
 فروه المركبة من عدة ألواح متتابة ومنشعبة ، يضيء
 الشكل ، صمكة النصل ، بحرية اللون تملوها بعض السائرا
 الشاككة الانطالية الارتكاز . هذه الالواح تظهر وتنمو
 مبطلة ، عادمة الصلابة ، خزيمة المادة الفروية ثم تنصلب
 وتشتد بانها مع كر الزمن تنجد وتتحرف نحو الشكل
 الاسطواني || ازهارها كبيرة القد ، زاهية الالوان المختلفة .
 ثماره متباعدة الاحجام ، شاككة القشور ، نذرة اللب ، كثيفة
 البور الهلالية الشكل ، الصغيرة القد ، الشديدة الصلابة
 والسمرة || احرف انواعها واشهرها ما يتبع .

١٦٠٤٤ - صَبَّار الصَّرُوع
 هو الضرمية ، اطليه .

١٦٠٤٥ - صَبَّار الهِنْدِي * ، صَبَّار هِنْدِي ، لَبَن
الهِنْدِي
Opuntia ficus indica (S).

Raquette des Indes, Figuler d'Inde, Nojral (F). Indian
fig, Prickly-pear (E). Indischer Felgenkaktus (D).
Fico d'India, Fichidindia, Pero pungente (I).
 نبات سبوتي شائع الاستعمال . مأكول الثَّار . غيله يملو
 من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم. ألواحها حلوية يضيء الشكل
 تطلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. وتعرض من ٢٠ الى ٢٥ ،
 نصلها بحري الخضار يسك نحو ٤ سم. سائرها ميمرة
 بدون انتظام ، شوكها خيل مستند || ازهارها كبيرة القد ،
 صفراء اللون . ثماره كتير الصير الا أنها اقل استدارة
 وشوكا . لهاها سكري العلم مستحب المذاق ، زروها
 كثيفة التجميع ، سمراء اللون || زراعتها شائعة الاستعمال .
 ألواحها الحلوية مملو تأكلها الابل والابقار ويربون عليها
 نوع من الكوكشيل قريزي الخصاب .



صبار المند



صبار تشندي



صبار معروف

صغير القند ، جبل الازهار المتتابعة الثلاث المرجانية اللون . لا ينشئ سوى كثرة الازوت والرطوبة المستحكة .
١٦٠٦٦ - صَبَّوَيْنِ هو الفشاخ الحزني ، اطلبه .



صبرة القزوز

١٦٠٦٧ - صَبَّوَيْنِ * Saprinus (S). Saprina (F).
جنس حشرات مقترنة من فصيلة الحسبريات . انزاهه للمعرفة نحو ٣٠٠ جنسها صغيرة القند بيشية الشكل طويلا براوح من ٣ الى ٧ م. انزاهها مختلفة الالوان منها الاسود المنقط بالاحمر ومنها الازرق الاخضر المارح ومنها الاخضر الالوس الاسفلح اللواح || يرقاتها وانجته وقانصة .

١٦٠٦٨ - صَبَّكَاة
نبات قريب الشبه من البام ، ابيض الثمر ، يألف الرمال ويتألف الطلح .



صبرة المرجان

١٦٠٦٩ - صَبَّج * Sepiols (S). Sépiola (F). Sépiola (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الازبل ثنائيات الخياشيم ، حشائريات الجرامز بفصيلة الصبريات . انزاهه المعرفة قليلة البدأ اصطلاها بعض بحار البلاد الممتدة الحرارة || اجسامها فيه اسطوانية الشكل مستديرة الاقواب . زعانفها خلفية مستديرة . جرابها خاصة ، عادة الهامج ، منها ثمانية متساوية الطول ولتنتان مستطيلتان || اشهر انزاهه الصبور الجبل (Sopiola vulgaris) الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط . لحه مأكول جيد الصنف .



صبرين

١٦٠٧٠ - صَبَّجِيَّات * Sapididae (S). Sépididae (F). Sépididae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الازبل ، ثنائيات الخياشيم ، حشائريات الجرامز || اجسامها صغيرة القند جرابية الشكل او اسطوانية . اجناسها المعرفة اربعة اشهرها الصبور الذي يعيش في بحار البلاد المعتدلة الحرارة . اما الاجناس الاخرى فاصطلاها بحار المناطق الشمالية .

١٦٠٧١ - صَبَّوَرَة Barilius (S).
جنس امسك ثورية من الشبايط . انزاهها المعرفة ٧ جنسها من امسك المناطق الحارة وفي منطقة القند او صغيرة . اشهرها صبرة الازدن المعرفة بالاشري وصبرة النيل وصبرة القرات .
١٦٠٧٢ - صَبَّيْب ، تَجَج ، تَجَر * Débit (F). Gauging (E).
كية للماء المنفعة التي تنصب من بحر وربع وقناة وتقطط وغيرها في ثانية أو دقيقة او ساعة .
١٦٠٧٣ - صَبَّيْدَج هو الحجار ، اطلبه .



صبرج

١٦٠٧٤ - صَبَّيْر ، هَبَّيْد * Cumulus
نوع من النجوم الكثيفة التجميع المايعة للترابكة المستديرة الاطراف المتوسطة الارتفاع القزيرة للحر .

١٦٠٧٥ - صَبَّيْر هو الصبار المعروف ، اطلبه .

١٦٠٧٦ - صَبَّيْرَة Figue de Barbario (F). Barbary fig (E).
ثمرة الصبر المأكولة .

١٦٠٧٧ - صَبَّامَة Pétrographie (F).
هي علم الصخور .

١٦٠٥٢ - صَبَّارٌ وَرَقِي هو القليلوكاكوس ، اطلبه .

١٦٠٥٣ - صَبَّارَة اسم شائع الاستعمال يطلق على الصبار والالوة والامعة .

١٦٠٥٤ - صَبَّارِيَّات Cactaceae (S). Cactacées (F). Cactaceae (E).
ومنهم من قال شوكلات . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة الفصائل منخفضة اليبس || اجناسها ١٣ تشمل زهاء ٢٠٠٠ نوع ، مهددا البلاد الحارة ، معظمها امريكي اللبنت .

١٦٠٥٥ - صَبَّاع Colorant (F). Colouring (E).
كل مادة ملونة تستعمل في التذهيب .

١٦٠٥٦ - صَبَّاب Nutation (F). Nutation (E).
الصَّبَب ، فلكيا ، اتايل المحصور في قطب الارض . دورته الكاملة في المدار الشمسي تستغرق نحو ١٨ سنة و٧ اشهر || والصَّبَب ، نباتيا ، الانحراف الظاهر الذي يطرأ على اوراق بعض النباتات او ازهارها في اوقات معينة من النهار او في ظروف خاصة من الاشعاع .

١٦٠٥٧ - صَبَّاب Proclivité (F). Slope, incline (E).
الصَّبَب حالة التي المنحدر او المائل الى الامام .

١٦٠٥٨ - صَبَّاب Troupeau de 20 à 40 bêtes (F).
قطع من الشاء والامر ما بين العشرين الى الاربعين .

١٦٠٥٩ - صَبَّار هو الآلة ، اطلبه .

١٦٠٦٠ - صَبَّار Diète (F). Diet (E).
هو احتباس البنية بلا حلف بعض الوقت في سبيل صحتها . والصبر هو الجهد ، اطلبه .

١٦٠٦١ - صَبَّارٌ لَفْشِي ، لَفْشِي ، مَلْجَح Givre (F). Hour-frost, Rime (E).
طبقة خفيفة من الجليد تتكون في عمس الاجسام الصلبة بتجمد قطرات ماء الغمام .

١٦٠٦٢ - صَبَّارَة Sabéra (F).
هو الجلمع الضفلة ، اطلبه .

١٦٠٦٣ - صَبَّارَة ، كَاكُوس Cactus (S). Cactus, Cactier (F). Cactus, Torch thistle (E). Kaktus (D). Cacto (I).
جنس نباتات لحية برية ووربية من فصيلة الصباريات . انزاهه عديدة مهددا البلاد الحارة . معظمها صغير القند ، شائك النصل || تزوح في المراكز والمصارى . مجموعاتها نفيسة غالية الثمن يقوم بها بعض الحواة .

١٦٠٦٤ - صَبَّارَة الْقَرْمُز * Cactus coccinellifera (S). Cactus à cochenille (F). Cochineal bearing opuntia (E). Nopal (D). Cacto da cocciniglia, Nopal del giardin (I).
نوع من الصبرة الزراعية الصناعية منتبها البلاد الحارة . يزدهنوا ويربون عليها مادة القزير الصبغية .

١٦٠٦٥ - صَبَّارَة الْمَرْجَان * Epiphyllum truncatum (S). Epiphyll (F). Christmas cactus, Wintercactus (E). Blattkaktus (D). Epifillo (I).
نوع من الصبرة وهو نبات تزويجي ، مركبي ، معمور ،

Surface de la terre (F).

١٦٠٧٣ - صحيف

هو الارض ، اطلية .

Placuna (S).

١٦٠٩٤ - صَحِيفَة *

Placuna (F), Placuna (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيصيات الخياشيم
وخصلة الحاربات . انواعها الماصرة المرفوعة خمسة ،
اسطيا تحت من: شرايلى الخليج الغربي الى الهند فالصين ||
اصداها كبيرة لانظامية الشكل ، لاقياية المصاريع ،
مصاريعها ثلاثة الاضلاع ، رقيقة الاصداف الشبه شفافة ،
تؤلولية لشفاء الناعلى || اصفاها شائعة الاستعمال الصناعي .

Feuilles foncer (F).

١٦٠٩٥ - صحيفَة عَنَكَرِيَّة

Landed leaf (E).

شهادة يمررها امين المكتب القماري موصفاً فيها كل
ما له علاقة بقمار معين كالساسة والحلوى والمشتلات
والارتفاع واللين والرخن .

Lamellée, Lamellaire (F).

١٦٠٩٦ - صحيفِيَّة

Lamellar, Scaly (E).

شكل من الزباني ينتهي بخواصل صخيفية رقيقة مسطلة .

Bombycilla (S).

١٦٠٩٧ - صَحَّاد

Jaseur (F), Waxwing (E).

جنس طير من فصيلة الصغاديات ورقية الجوانم غروطيات
المناقير . انواعها المرفوعة قليلة الدم جميعها متوسطة القد ،
ربعة الجسم ، مناقبها قصيرة غروطية الشكل ، مسنة
الافلاك العليا ، غائسة السفل . اجنحتها ذلقة ، اذناها
متوسطة الطول ، مقطوعة . اسرارها قوية ، رؤوسها متوجة
مطررة من الريش الناعم المسترسل الى الوراء . اشهر
انواعها الصغاد الارويى والاسويى والامريكي .

١٦٠٩٨ - صَحَّاد اُروبي *

Bombycilla garrula (S), Jaseur d'Europe, J. de

Bohème (F), European Waxwing (E).

نوع من الصغاد . موطنه يشمل جميع مناطق اوروبا المعتدلة
الحارة ويغتن مناطق الشرق الادنى || جسمه ربيع اللقاعة
يطول نحو ٢٢ سم . ثوبه الى الاربعة الصبانية تقرب عنه
الظهر والجيش وتزهر عند البلوغ . زوره وجهته تقرب عنه
السوداء . جناحه اسود اللون يجلجج بالابيض والاصفر
والاخر . ذنبه اسود اللون ، اسفر الطرف المنطوم ||
وهو من الضواري التي تجوب البلاد في طلب الفرقة والمصيف
والشقى . يائس الغابات والكروم . قوته الشفارت على
اختلاف انواعها وفضائلها واكتارها الهامة وسها العنب ||
يدئن حشه في الاشجار الدائسة على ارتفاع قليل لا يتجاوز
عشرة اقدام من سطح الارض . الاثنى قطع من ٦ الى ٧
بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوما .

١٦٠٩٩ - صَحَّادَات

Bombycillidae (S).

Bombycillidae (F), Bombycillidae (E).

فصيلة طير من الجوانم غروطيات المناكير . اجناسها
وانواعها المرفوعة عديدة . موطنها يتعد من البلاد الاسيوية
الى الاوربية والامريكية || تتميز باجسامها الربعة
وبطيرها المسترسل الى الوراء ويتناقصها غروطية المسنة
الافلاك العليا || اشهر اجناسها الصغاد .

١٦٠٧٨ - صَئَع هو حمار اليرش ، اطلية .

١٦٠٧٩ - صَئَعَة

Roche dure (F), Tough rock (E).

الصخرة والصعيبة هي الصخرة الصلبة .

Sueur (F), Sweat (E).

١٦٠٨٠ - صَئَكَر

هو عرق الجسم وفي التنصيص عرق الخيل وقيل حيلما .

Santé (F), Health (E).

١٦٠٨١ - صَئَحَة

حالة الجسم السليم من المرض .

Validité (F), Validity (E).

١٦٠٨٢ - صَئَحَة العَقْد

هي ان لا يكون مشوباً بسبب من اسباب البطلان .

Désert (F), Desert, Waste (E).

١٦٠٨٣ - صَئَرَاء

سهول مزارية الاطراف شاسعة المدى تتميز بجفاف مناخها

وبالنداء الحياة النباتية والحيوانية فيها الا في بعض الواحات

والاوادي حيث تنشر وتقبل بعض العيون .

Désertique (F).

١٦٠٨٤ - صَئَرَوِيَّة

لمت تعريفي يطلق كل ما هو مخصص بالصحرارة

كذلك لثوب صحرافية ومناطق صحرافية .

١٦٠٨٥ - صَئَلَب ، صَئَلَب المتاع

Sphagnum (S), Sphagne (F), Bog moss, Gold beach

Tarfmoos (D), Ségno, Muschio di palude (I).

جنس طحالب من فصيلة الصليبيات تعيش في المناطق

والماء الرائدة الصافية . انواعها قليلة العدد . سوطها غليظة

تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . فروصها دقيقة متباعدة وريمية

متفابلة الانتشاب تكسوها اوراق عسقية مدهية مرصوة .

١٦٠٨٦ - صَئَلَبَات ، صَئَلَبَات

Sphagnaceae (S), Sphagnaceae (F), Sphagnaceae (E).

فصيلة نباتية من الطحالب اجناسها وانواعها قليلة العدد

جميعها احشاب مسرة متفاعة تكثر في القرب وتعد باعضائها

المنسلة .

١٦٠٨٧ - صَئَعَاء

الصماء بقلة (السان) .

١٦٠٨٨ - صَئَعَة

Jeune terne (F).

١٦٠٨٩ - صَئَعِيَّات

Leptotrichaceae (S).

Leptotrichaceae (F), Leptotrichaceae (E).

فصيلة من البكتيرياات تتميز بشكلها الاسطوانى المستطيل .

خلاياها مغلقة ، وحيدة الاجزاء ، عمودية الانقسام .

اجناسها وانواعها عديدة لكن علاقتها بالاقتصاد الزراعي

لا تتجاوز بعض الاضرار النباتية .

١٦٠٩٠ - صَئَن

Sole

هي الصفيحة الفترية الباطنية السفلى من الحافرة عند الخيل

والبغال والخيبر .

١٦٠٩١ - صَئَن الحَصْرَكَة

Cavité coxale (F).

Coxal cavity (E).

هو موضع اتصال المرفقة بالخصر .

١٦٠٩٢ - صَئَعَاء ، صَئَاخ ، صَئَعَة

Tympan (F), Tympanum, Ear-drum (E).

تجويف الاذن حيث نصب ووتر الغشاء الطمان المعروف

بالغشاء الطبل .



صَلْب



صَحِيفَة



صَحَّاد اُروبي

١٦١٠٠ - صَخْرَة ٥

Lithogénésie (F).

Lithogenesy (E).

الصخرة علم يبحث في الملل والموجبات التي هيئت على تكوين الصخور .

١٦١١٠ - صَدَأ ، صَدَأ

هو شقران أزرق من الفطور الجهرية الشقرانية التي تتركب الأزروع .

١٦١١١ - صَدَاح

Chant des oiseau, Gazouillement (F). Chirping, Warbling, Tittering (E).

صوت الطائر . صلح الطائر : صلح وفرد وزرق .

١٦١١٢ - صَدَأَحَات

Bee-fins (F). Warblers (E). وتسمى الطيور الصالحة . طيور مفيدة من الجوارح وفصيلة الدنليات .

١٦١١٣ - صَدَأَحَة الْغَاب

Lusciniole à moustaches (F).

طائر من الجوارح يلقى نداعة ، أظليا .

١٦١١٤ - صَدَأَد

Tokal هو الزوزفة ، أظليا . ج صدائه .

١٦١١٥ - صَدَأَكَة

Proletariat (F). Proletarianism (E).

حالة الذين لا يستطيعون الايتراف إلا بواسطة علمهم .

١٦١١٦ - صَدَح

شجرة ثمرتها أشد حرة من العنب . (اللسان) .

١٦١١٧ - صَدْر ، جَوْش ، جَوْشَن

Poitrine, Thorax (F). Chest, Thorax (E).

جزء من الهيكل العظمي يحسن القلب وقرتان يقع بين المتق وسط القصر . وهو تقص عظمي غربي الشكل يتكون من عدة خلوع مقوسة متحدة الأطراف .

١٦١١٨ - صَدْر

الصدر نجم ثير من كوكبة الدجاجة .

١٦١١٩ - صَدْرَاس

Céphalothorax (F). Cephalothorax (E).

الصداس التام الصدر بالرأس في جزء واحد كما هي الحال عند بعض القويبات كالنماتك .

١٦١٢٠ - صَدْرِي

Pectoral تمت وصفي يطلق على كل ما له صلة بصدر الحيوان .

١٦١٢١ - صَدْع

Faille (F). Fauts (E).

١٦١٢٢ - صَدْع

Tempe (F). Temple (E).

ما هو من الرأس ما بين العين والاذن وهما صدغان .

١٦١٢٣ - صَدَف ، صَدَف

Coquillage, Mollusque ostacé (F). Shell-fish, Testaceous mollusc (E).

حيوانات في البحر من القشريات الخشريات . ج أصداف وأصداف .

١٦١٢٤ - صَدَقَة ٥

Conque, Coquille (F).

Conch, Shell (E).

ج صدغان . ضياء ضوي ثلاثي الطبقات صلب للمادة ينفذ أجسام بعض الرغويات . داته مركبة من كرويات الكلسيوم ، أما طبقاته الثلاث تصرف بالماخرية المزعقة



صخرية



صدفة

١٦١٠١ - صَخْد

الصخد : صوت المام والصد .

١٦١٠٢ - صَخْر

Roche (F). Rock (E).

كتلة خضنة وسيدة اللؤل من الحجر . والصخر في العرف البادي يطلق على كل مادة صلبة تدخل في تكوين التلال الأرضي . لما في العرف الجيولوجي أي الحسلي الذي لا

يتمير الصلابة شرطا لازما ، فالصخر يطلق على اللرو والحجر الجصي والرمل والصلصالي || وقد تقسم الصخور

حسليا بنسبة الى تكوينها الطبيعي الى ثلاثة أقسام :

(١) الصخور النارية وهي الاسلابة أو المتبلورة التي تكونت من مواد معدنية مصهورة تصلبت بالبرودة كالنفسه (البرلت).

(٢) الصخور الارسوبية وهي الثانوية التي نتجت من تراكم وتماثلت فالت ذرات الصخور الاسلابة مع مختلف المواد

الحيوانية والنباتية كالحجارة الجسية .

(٣) الصخور المتحولة وهي التي كانت في اول امرها اما نارية او رسوبية ثم تحولت بتأثير عوامل طبيعية خاصة

الى حالة عينة جديدة كالرخام .

١٦١٠٣ - صَخْرَة

Rocher (F).

Steep, Crag (E).

كتلة من الصخر . ج صخر وصخور وصفا وصفوات .

١٦١٠٤ - صَخْرِي

Pétreux (F).

Stonelike, Petrosal (E).

لمت تعريفي يطلق على ما هو من الصخور أو يشبهها .

١٦١٠٥ - صَخْرِيَّات

Empetrescées (S).

Empetrescées (F). Empetrescées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الملقطين، اجناسها ثلاثة وانوامها خسة . لياتانها جنات وأصناف معمرة . تنبت بين الصخور وفي الاماكن القاحلة .

١٦١٠٦ - صَخْرِيَّة ٥ ، صَخْرِي ، عَشَب الْغُرَاب

Empetrum nigrum (S). Empêtre, Camarine, Camarigne (F). Crowberry, Black-berryed heath (E). Echta krahenbeera, Ranchbeera (D). Empetro, Erica bacicifera nara (I).

بجلة برية طيبة معمرة وسيدة اللؤل والنوع من فصيلة الصخريات ، ينبتا جبال البلاد المعتدلة المنرفة نحو

البرد . ماثها متسبة تملر نحو ٣٠ سم . أوراقها ابيدة ،

غنية ، صغيرة القد ، ضيقة الفصل || ازهارها حراء اللون . ثمارها مأكولة لوردة الشكل ، مابقة السوداء ،

حازمة الطعم ، مفاداة لداء الحقر ، تدر البول وتفتح في علاج بعض الحيات .

١٦١٠٧ - صَخْم

Brûler (soleil) (F).

١٦١٠٨ - صَخْمُور أَف

Roches-mères (F).

Basio-rocks (E).

هي الصخور الاساسية الاولى .

١٦١٠٩ - صَدَأ

Rouille (F). Rust (E).

مادة ميكروية القذرات جزوية اللون حمراء المواج تتكون على سطح الحديد من جراء تعرضه لطرية الهواء حيث

يصد الأكسجين والماء مع الحديد .

الجزر فيضيه ويؤذيه || مظهره الخارجي يشور صغيرة مستعرة متتابة متراصة حلالية الصبغ تتباعد اللون ثم تتحول نحو الجلود تركب السوق والأوراق والماليق القزمية || يكالغ بتطهير التربة وتجديد البذار وبإستنباط تكرار الزراعة في الموقع نفسه .

١٦١٣٥ - صَدَنِيَّة الجِيرَانِيوم

Uromyces geranii (S). Rouille du géranium (F).
فطر مجهري يصيب أوراق الجيرانيوم فيضها . مظهره الخارجي يقع صغيرة قليلة الاستدارة والكثافة تركب الأوراق، لونها ال الشفرة الباهية يعلوها دواج آخر يشو الأوراق بتغير بشره نصلها ثم يقودها الى الذبول . يكالغ بانتزاع الشتل الموصلة وتطهير التربة بالكلس والكبريت بمعدل ١ الى ٢ .

١٦١٣٦ - صَدَنِيَّة الحِمَص

Uromyces rumicis (S). Rouille des rumex (F).
فطر مجهري يصيب أوراق الحماض فيطعها ويجعلها خمر صالحة للاستعمال || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستعرة تبدو حطية اللون ثم تتحول نحو الكستاني تركب لشل الأوراق على صفحتيها || أضراره قائمة على مدى انتشاره لان الأوراق الموصلة لا قيمة لها || يكالغ حين ظهوره بسائل بوردو الحليل ١ % .

١٦١٣٧ - صَدَنِيَّة الحِمَص

Uromyces pisi, Aecidium euphorbiae (S). Rouille du pois (F).
فطر مجهري يصيب الحمص والقرين || مظهره الخارجي على الحمص يقع صغيرة كثيفة التجميع تركب النصل على صفحتي النفل . تبدو صفراء اللون ثم تتحول نحو الخيطي فالأحمر ويضع منها اذ ذاك رائحة كريهة يمتعها انفجار البشرة فظيل النسيج والنصل يسقط الأوراق . وهو على القرين يقع صغيرة ممتدة بدون انتظام تركب الاذنات تقسب فيها الاطرام والشحمة مع قصر الأوراق وسماكة النصل . وهو على الأوراق اوضح شكلا واكثر توشعا ، يركب النصل على صفحتي وقه بغسل السليا . يفوح منه عند كاله دورته الحياتية ، اي عند تفجير الجيوب البقية ، رائحة حلية مستحبة لا تتعمل الحمص وان حصرت فسلت وانقلبت الى كرية || يكالغ بالكلس التربة وتسميدها مع الاكثار من عصر الازوت .

١٦١٣٨ - صَدَنِيَّة الدَكْتِيل

Uromyces dactylidis (S). Rouille du dactyle (F).
فطر مجهري يصيب جميع انواع وضروب الدكيل فيلذي الأوراق ويحميها || مظهره الخارجي يشور صغيرة مستعرة لونها الى اللمعة ممتدة بدون انتظام او مرصوة بتتابع وتناسق . فطر نصل الأوراق تقسب بياها بعد احملا غصبي . يكالغ بقتلح النباتات الموصلة وتطهير التربة قبل اعادة بلدها او غرسها .

١٦١٣٩ - صَدَنِيَّة الشُّوَنَدَر

Uromyces betae, Aecidium betae (S). Rouille de la betterave (F).
فطر مجهري فسج الشيوخ يركب اوراق الشوندرو فيلذيها . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستعرة تحمل بالاوراق النفل وتنتشر على صفحة النصل النفل ممتدة بدون انتظام . لونها الى الجلود || أضراره قليلة لانها محصورة بتغير ذبول الأوراق النفل التي تضال نشاطها الحيوي .

والنصل الاساسية ثم الداخلية الصدفية الباردة المساء . والصفقات على تبيين : الصفقات ذات المصراعين كما في الحار وهي فيضية الشكل ، مربوطة المصراعين ، رباطها غشروي التكوين يلفف خضرا حاملا يدعى القلياء وظيفته افراز المادة الصدفية || والنوع الثاني يشمل الصفقات الحلزية التي تتميز بخطوطها واعاديعها المتنازلة المعروفة بخطوط واعاديع النور .

١٦١٣٥ - صَدَنِيَّة

Ostracé (F). Oysterous (E).
نمت تعريفي يطلق على ما هو صدفى التركيب او الشكل .

١٦١٣٦ - صَدَنِيَّة الجِلْد

Ostracoderme (F).
نمت تعريفي يطلق على كل حيوان جلده صدفى المادة .

١٦١٣٧ - صَدَنِيَّات

Ostracodes
رتبة من القشريات الحريات الصف .

١٦١٣٨ - صَدَنِيَّات الجِلْد

Ostracodermes (F).
فئة من الاسماك المتحجرة ظهرت في الحقبة السيلورية وانقرضت في الحقبة الكربونية .

١٦١٣٩ - صَدُونِيَّة

Impénétrabilité (F). Impenetrability (E).
حلم قابلية التسلل .

١٦١٤٠ - صَدُونُوع ، شَطْبُونُوع ، كَتَم

Crevasses (F). Chape (E).
عوارض وشوالب تحصل في جلد ارساخ الدواب والطيور وفي لحاء سوق النبات تقسب انصداعها وتشققها .

١٦١٤١ - صَدَنِيَّة

Uromyces
جنس فطور مجهري من فصيلة السحابيات يتميز بعلاماته الوحيدة الحالية || انواعه عديدة تركب النباتات المختلطة الملائكة الى القرينات والقرنليات والنبيليات والسرنيقات والزنبقيات والبسبابيات والسطويات .

١٦١٣٢ - صَدَنِيَّة الإِسْكِيل

Uromyces scillarum (S). Rouille des scilles (F).
فطر مجهري يصيب بعض نباتات الفصيلة القرنيكية اخصها الاشقل والحصل || مظهره الخارجي طلع قدية لا قياسية الشكل والحجم ، تملو الأوراق والانسلاط الخارجية . تبدو حطية ثم تتحول نحو الجلود وتنتهي بالمرسة عند انفجار بشره النسيج || يكالغ بتطهير التربة بالكبريت والكلس او الفرمول بعد التتابع وحقن النباتات الموصلة .

١٦١٣٣ - صَدَنِيَّة النُّوم

Uromyces ambiguus (S). Rouille de l'ail (F).
فطر مجهري يصيب الثوم ياروثة ويزناده يضره . مظهره الخارجي يقع صغيرة لا قياسية الشكل والحجم ، تركب الاوراق فتلويها بعد ان تقضي على الخصب فيصبح النصل عادم اللون || وهو على افران يقع قرنية كسفائية يحيطها اطمار تقلص غصبي ، لونه كالتين . يستحسن اجتناب تكرار الزراعة في ذات المكان المووب .

١٦١٣٤ - صَدَنِيَّة الجَمْرُور

Uromyces lineolatus, U. scripi (S). Rouille de la carotte (F).
فطر مجهري يصيب بعض نباتات الفصيلة الحسية اخصها



صدنية الاشقل



صدنية النورم



صدنية الجزر



صدنية الجيرانيوم



صدنية الحماض



صدنية الحمص



صدنية الشوندرو



صدئكة اللوز

١٧١٤ - صدئكة اللوز * *Uromyces musae* (S).
Rouille du bananier (F).
نظر مجهري يصيب اللوز في أفراته || مظهره الخارجي يشور فسمية الشكل والحجم، تركب النسل حل صفته السفلى. تبدو حطية اللون ثم تتحول نحو الجوزة السوداء. أضراره زرة لا تستجيب للمكافحة.

١٧١٤٦ - صدئكة الفستق

Uromyces trifolii, *Aecidium trifolii-repentis* (S).
Rouille des trèfles (F).
نظر مجهري يركب جميع أنواع النفل الزراعي والبري. مظهره الخارجي بقع صغيرة قليلة ممتدة على صفته النسل العليا. تبدو صفراء اللون ثم تتحول نحو ألبي الكستالي. وهو رسم لا يستجيب للمكافحة لانه يسلط النبات حل. لتسوء وازدياد المحصول الورقي ولكنه يذني نسبة الكروتين نحو ٢٠٪ مما يؤدي الى انخفاض عين القيتامين ٥٠٪.



صدئكة القرفل

١٧١٤٧ - صدئكة

الصدي كوكب مرتقي سيار اكشفه وفروغن * عام ١٨٦٠.



صدئكة القرنيات

١٧١٤٨ - صدئكة
هو الصوت الناتج من انكماش صوت اصلي حل سطح عاكس.



صدئكة الفرياء

١٧١٤٩ - صدئكة
جاء في تحديدا: سمكة طويلة سوداء (السان).

١٧١٥٠ - صدئكة * أم السهر، أم قوسق
Athena noctua, *Carline noctua* (S). *Chavêche*, *Chavêche commune* (F). *Little owl* (E).

طائر من البويات وحمرة التفاديات. روج الحجة صغيرة. طوله نحو ٢٣ سم. منزه قوي الانقراض. حاد البصر. سقطاه وذنيه قصيرة مستوية. أرسائه كاسية، غالية مدنية حادة، ثوبه الى الريشة المنشة بالارد || مرونه فيسح الاجزاء يسم جميع البلاد الممتدة الحاررة. يأنف الاجزاء ويثن في صونع الانجار الصويتانية وفي الخراب والاطلال. اثناء قطع نحو ه يضاقت تحضبا ١٦ الى ١٨ يوما || وهو من الراس يثنس قوته من القروب الى القجر، يصيد الجرد والقراب والزياب والجلان والجراد.



صدئكة اللوز

١٧١٥١ - صدئكة
هو قبح الفروج والجبب السارة الى الاعمال السوي.



صدئكة النفل

١٧١٥٢ - صدئكة
حليب وضع فريد ضله النواية وهي القشرة الرقيقة حل وجبه.

١٧١٥٣ - صدئكة، قبيح *
Gallif (F).
Frost-delf (E).
تمت حال توصف به الاشياء المغلقة أو القابلة للانصاع والقلع من تأثير فعل الصقيع فيها.



صلى

١٧١٥٤ - صدئكة *
Fissurella (S).
Fissurella (F). *Fissurella* (E).
جنس حيوانات بحرية من الغرويات مبديات الازبل امانيات الخياشيم الحبيفة وصلبة الصدفيات. انزاعها

يكتلح بقلع ويلس الارواق الصابة وباجتباب اخذ للبلار من الامهات الموصية.

١٧١٤٠ - صدئكة الفستق
رسم فطري يمتري الفستق (اطلب ايرويس).

١٧١٤١ - صدئكة الفول

Uromyces fabae, *Aecidium album* (S). Rouille de la fève (F).
نظر مجهري يصيب عدة نباتات من القصبية القترية، اخصها الفول ومنها البقية والجلان والبيسة والكرسة. مظهره الخارجي بقع صغيرة مستوية ممتدة على صفته النسل الصفراء اللون ثم تتحول نحو القشرة السوداء. وقد يصيب السرق والمالين نباتات العوارض. يكاتفح عند ظهوره لما يسهل سال بورود المحلول ١٪ او غيره من الفوطير الفعالة اللاكلوية.

١٧١٤٢ - صدئكة القزقش

Uromyces caryophyllinus (S). Rouille de l'aillet (F).
نظر مجهري يصيب القزقش في جميع فصل السنة ليلسب الارواق ويؤخر التسو ويؤذي الانزهار والازهار. مظهره الخارجي بقع صغيرة يضاة الشكل بنة اللون تركب نسل الارواق حل صفحتها العليا تقسب تجسب بشرة النسيج وتقرقل العورة النضية ان لم تحول دون انجازها وسيرها الطبيعي.
يكاتفح أولا: باجتباب ريش الماء حل الارواق لان الماء يذني نشاط الفطر ويسبب انتشار الروص.
ثانيا: بانزاع وسرق الارواق للذابة والياية مسع الثليل للذابة.
ثالثا: بنسج النباتات للصابة بسائل بورود المحلول ١٪ او بسلول بمسمنات البوتاس او غيره من املاح النحاس.

١٧١٤٣ - صدئكة القرنيات

Uromyces anthyllidis (S). Rouille des légumineuses (F).
نظر مجهري يصيب بعض النباتات القرنية سها القزقش والكرسة والقصة والخندقوق والحلبة والولس والامروس. مظهره الخارجي بقع مستوية صغيرة تركب نسل الارواق حل صفحتها العليا قتبسو ممتدة بدون انتظام. لونها الى الشبه ثم يتحول تدريجيا نحو الكستالي || أضراره زديدة. يكثر وجوده في بلاد صوف البحر المتوسط وفي اروقبة الثرية واليابلية.

١٧١٤٤ - صدئكة اللوبياء

Uromyces appendicatus, *U. phaseoli*, *Aecidium phaseoli* (S). Rouille du haricot (F).
نظر مجهري يصيب معظم انواع وضروب اللوبياء. مظهره الخارجي بقع لا تباية الشكل والحجم تظهر نسل الارواق فتوشها برقشة لا متجانسة الكثافة تبدو تلبية اللون ثم حطية لسنراء، تؤذي الارواق تقسب جفافها وصقوها بالكر. وهو حل القرون بقع قترية قتلها فيها الانتعارة تقضي حل الانسجة البليبة دون ان تصل الى الحب || يربغاته يضاة الشكل طويلا يراوح من ٢٢ الى ٢٥ سم. ويضرها من ٢٠ الى ٢٣ سم. || يكاتفح بانسحال اوكسيكلودور النحاس تفعيرا حل النبات بعد العصر عمدا تحف وطاة لثة الشمس.

1٦١٦٥ - صرّادي *
Orographique (F).
Orographical (E).
نمت تمرّني، يطلق على ما له علاقة بالمرصاد أي وصف الجبال.

1٦١٦٦ - صرّار
Achète (F).
اسم يطلق على جمع الحشرات المرصدة اخصها الجديد والزئير.

1٦١٦٧ - صرّار الليل هو الجديد، المطبخ.

1٦١٦٨ - صرّاركة
Circaetus (S).
Circaète (F). Serpent eagle (E).
جنس طير من عائلة السقاوت وفصيلة الصرقيات. أنواعه ١٢، موطنها جميع المناطق المعتدلة من العالم القديم. اجسامها رفيعة متوسطة القد تطول من ٥٥ إلى ٧٠ سم. وبسنتها تراوح من ١٢٠ إلى ١٨٠ سم. ورونها كبيرة، اصنافها قصيرة، مناسرها قوية البرهة النزبة الحادة. ارسافها سرسة، غالبها دقيقة الاطراف الحادة. اثارها كدراء اللون، يملوها توشم لطيف حايق، صدرها وبطونها اتشم واذني من ظهورها وساقها. تألف الجبال والأحراج ويجاري الماء والادخال والبروج والغياي. قوتها الزحافات من الطاء الى الانفاي والصفادح والاسماك والصائير والحشرات. اناثها تضع من ريفتين الى ثلاث رفاتن تحضنها بمناوبة الذكور نحو ٤ اسابيع. اشهر انواعه صرارة المتوسط.

1٦١٦٩ - صرّاركة المتوسط * أبو صوي
Circaetus gallicus (S). Circaète Jean-le-Blanc (F). Short-toed eagle (E).
نوع من المرصاد كبيرة الجثة طولها نحو ٧٠ سم. وبسنتها ١٨٠ سم. ثوبها الى الريدية السماء تعلوها نمشة مابغة. زورها وبطنها وبصرانها الى البياض الاخر يملو تقيج اسمر. مفرها الى الزرقه السوداء. حناها الى الصفرة الكالسة. رساها واصابها بنية اللون، غالبها سود. وهي من الطيور القواطع تجوب البلاد رنحوم فوق الماء. تألف الجبال والأحراج والمناقع ويجاري الماء والسهول وكشواطئ. قوتها الانفاي والطاء والصفادح والاسماك والصائير.

1٦١٧٠ - صرّاركة
Sauropodes (F).
Sauropoda (E).
المرصايد رتيبة من الزحافات المنقرضة، النفاصير، جميع اجناسها وانواعها جبارة، وبهاية القوائم، عايشة في الحفنة الجوردة. وانقرضت في الطباشيرية. اشهرها المرصود الجبلي (Atlantosaurs) الذي كان طول جسمه لا يقل عن ٤٠ مترًا، ثم المرصود الصغير الرأس (Brontosaurus) الذي كان طوله من ٢٠ الى ٢٢ مترًا.

1٦١٧١ - صرّار، صرّار
Cuellietta (F).
Gathering (E).
هو جني الثمر في اوان أدراكه.

1٦١٧٢ - صرّان، حركه
Serranus (S).
Serran (F). Serranus (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرانيات ورتبة شاككات

المعرفة قليلة العدد. اصنافها معظم يجار العالم تمش على حصور المحادح. اصنافها شبه قمية الشكل مصنوعة النمة. وصدورها التي تسمح بمرور الماء اللازم لتنفس، تسمح ايضا بخروج البراز. اجسامها مستطيلة الشكل. ورونها مقطوعة المقدم، حينها تتركز عند قواعد القوائم الخروضية. عياشها مشطية في القسم العلوي. اوديتها ضففاضة تمتد خارج الاصداق. ارجلها وعية مستعرة وعية.

1٦١٥٥ - صرّيات *
Fissurellidae (S).
Fissurellidés (F). Fissurellidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارسل اماريات الخياشيم الحفجية. اجناسها وانواعها المعرفة عديدة بعضها من متحجرات الاراضي التائوية والثالثة والبرص الآخر من صلج يجار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. اصنافها وعية المصاريح ريفية الثوزن او مستعرة، معتدلة الاحساس، بصيرة القن، يكثر في صدفها الشكل المسطلي. اشهر اجناسها الماصرة الصليمة والمربيتنة.

1٦١٥٦ - صرّ
Empaquetage (F). Packing (E).
جمع الشيء وشده وتقليبه.

1٦١٥٧ - صرّ
Tichodroms (S). Tichodrome (F).
جنس طير من فصيلة المتقولات. انواعه قليلة تميز باضطالة المنقار وقوته وبلافة الجناح، بقصر الارباع وبخفافة وسر القاطب الحادة. اثارها عديدة تختلف مع الانواع وصدور البسة. يأنف المناطق الصخرية الجبلية. ينشر من الاحجار. قوته الحشرات والتماكب. يئن حه في صدف الحشخور. اناك تحضن وجدها من ٥ الى ٧ بيضات نحو اسبوعين وذلك في شهر ايار. احرف انواعه واثرها صر الحشخور.

1٦١٥٨ - صرّ الصخّور *
Tichodroma muraria (S). Tichodrome de murailles, Echolette (F).
نوع من الصر. ثوبه متراكب الالوان المنمقة المنخنة الجبلية. طوله نحو ١٧ سم. وبسنته ٣٠. يأنف الجبال الصخرية الجرداء. يكثر في صرود لبنان مشاء الاديبة السليقة والمقاصب الصخرية.

1٦١٥٩ - صرّاب
الزور يئن في الخريف يمه اول مطر.

1٦١٦٠ - صرّاج
Pur (F). Nest (E).
الحاصل من كل دس او غش، يقال بحر صرّاج وزيت زيتون صرّاج.

1٦١٦١ - صرّاج
الصرّاج طائر يؤكل (محيط المحيط).

1٦١٦٢ - صرّاركة
هي الدجاجة تبسجل لحفظ الغمر.

1٦١٦٣ - صرّاد
صحاب باردة ندي ليس فيه ماء.

1٦١٦٤ - صرّاركة *
Orographie (F).
Orography (E).
علم يبحث في وصف الجبال وتجليتها.



صليبة



صرّ الصخّور



صرّارة المتوسط

١٦١٧٨ - صُرَّاب ، صُرَّاب (F). Lat caillé (F).
اللبن الرائب إذا اشددت حوته . Curdled milk (E).

١٦١٧٩ - صُرَّاب (F). Gomme d'acacia, G. rouge (F).
صمغ القزط والطلع والمرتبط يمي حر كآبها سباتك
تكرس بالمجبرة .

١٦١٨٠ - صُرَّابَة هي التنداء ، اطلبها .



صُرَّان كاتب

١٦١٨١ - صُرَّابَة * Sorbite
مادة غذائية لا طعم لها تراقق السكر لكنها عادمة للقودور
التسليط . وهي توجد في معظم الفاكهة وسببها تراوح
من ٥ الى ١٢٠ غرام في الكيلو .

١٦١٨٢ - صُرَّابَة * Serjanie (S).
Serjanie (F), Serjanie (E).
جنس جنبايات سرعية عارضة من فصيلة السانديات ، أنواعها
المعروفة نحو ١٠٠ منظرها من ثوبت أمريكا الإشتراكية
والبيض الآخر ينبت في جزر المحيط الهادي ويشمل ولسه ||
سوقها سرعية . أوراقها متعاقبة ، مركبة ثلاثية التجميع .
نصلها مسننة الحوافي ، غائرة الفلر والبرق . أزهارها
أبيض اللون الزكازة ، عفودي التجميع ، ثمارها جناحية ،
ثلاثية التركيب .

١٦١٨٣ - صُرَّابَة * Bryum (S).
Bryum (F), Bryum (E).
جنس طحالب معمرة من فصيلة السرخسيات . أنواعها
المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم || تعيش
على الصخور وفي التربة . أكامها البولية سقية الشكل
طرية الارتكاز .



صُرَّابَة

١٦١٨٤ - صُرَّابِيَّات * Bryaceae (S).
Bryaceae (F), Bryaceae (E).
فصيلة من الطحالب تنتمي الى رتبة السبخيات .

١٦١٨٥ - صُرَّة ، صُرَّة (F). Froid (grande) (F).
حر البرد الشديد . Cold (extreme) (E).

١٦١٨٦ - صُرَّة ، صُرَّة (F). Epter (F). To ear (E).
صدر القمح والشمع . طلع سداما .

١٦١٨٧ - صُرَّة ، صُرَّة (F). Lanus (S).
Pie-grièche, Piegriche (F), Shrike (E).

ج صردان . جنس طير من الجوارث وفصيلة الصرديات ،
أنواعه ١٨ ، موطنها بلاد الشام القديم . جميعها يقام
الثوب . ضمة الرأس . منابها غليظة مسنة الحوافي
العلوية . سواطعها متصلة الطول مجتمعة . أذنابها رنانجية
الريش . أرسافها جصيفة الجمل . غنابها سادة || لا ترى
الأى في سفة أو جيرة وهي شرسة الطباع ، قلقة ، شديدة
التنقور . قوتها الحشرات والديدان والأفاعي والسنائير .
تنش في الأشجار الغناء . أناتها تنبع من ٤ الى ٧ فيضات
تحسها وسعدا نحو أسبوعين .



صُرَّة أُرْدِي

١٦١٨٨ - صُرَّة أُرْدِي * Lanus excubitor (S).
Pie-grièche grise (grande),
Bolesaltière (F), Great grey shrike (E).

نوع من الصرد الأبد الشائع . يخر من الطيور الضارة .
طوله يراوح من ٢٣ الى ٢٤ سم . ثوبه الى أربعة الفلحلام .

الزنايف . أنواعها المعروفة نحو ١٢٠ منظرها من املك
بجار المناطق الحارة - اجسامها اعليجية الشكل ، متصلة
الذو أو صغرة . ألوانها مختلفة الألوان يكثر فيها الاصفر
الاحمر الملح يملو تجليج متفرق لانياسي الانتظام والألوان
منها مبراشة الشكل . زانفها الظهيرة شاذكة في الجزء
الامامي ، سرسة في الجزء الخلفي || بعضها يبر اغوار
الانهار ويسير في المياه العذبة || طوبها بين للتصطف
الصنف والجمدة || أشهر أنواعها الصران الكاتب والصران
المبج .

١٦١٧٢ - صُرَّان جَبَّار Serran géant (F).
سمكة بحرية بيوض تسمى لقس جبار ، اطلبها .

١٦١٧٤ - صُرَّان كَاتِب * Serranus scriba (S).
Serran écriture, Serran
scribe (F), Serranus scriba (E).
نوع من الصران . سمكة بحرية يروض . اطلانها علبان
واضوح واغوار البسر الابيض المتوسط || جسمها
اعليجي الشكل ، متحد التبطيط ، يطول من ٢٥ الى
٢٠ سم . ثوبها متراكب الألوان يرتكز حل الاصفر
الحطلي ، رأسها وظهورها مجلجان بالاسمر . جانباها مشعان
بالأزرق والكتني . زانفها مزعقة بالاحمر . رأسها يرمي
الشكل قصير الأسط . شدقا قليل الرحابة . عيناها صيرتان ||
زانفها متباينة الأشكال . الظهيرة مستطيلة ، شاذكة
التنصف الأول ، سرسة النصف الثاني . الشرجية تقابل
النصف السرح من الظهيرة . اللبيلة مقوسة الطرف اغنودوب ||
طوبها متوسط الصنف ، مأكول .

١٦١٧٥ - صُرَّان مَبْجَج ، صُرَّان مَبْجَج * Serranus hepatus (S).
Serran maculé (F).
Serranus hepatus (E).

سمكة بحرية بيوض من الصران . اطلانها اضوح وظلجان
البسر الابيض المتوسط || جسمها صغير اللد ، اعليجي
الشكل ، متحد التبطيط يطول من ١٨ الى ٢٢ سم . ثوبها
يرتكز حل الاصفر الاحمر الحطلي المواج . رأسها وظهورها
مبججان بالكتني المايق . جانباها مجلجان وبغلمان بالاحمر
والأزرق . زانفها مضطعة وينتظة . رأسها غروبلي
والزرق . ذلق الحطلي . شدقا قليل الرحابة . عيناها كبرتان ||
زانفها متباينة الأشكال كما في الصران الكاتب || طوبها
متوسط الصنف ، مأكول .

١٦١٧٦ - صُرَّابِيَّات * Serranidae (S).
Serranidae (F), Serranidae (E).

فصيلة املك بحرية من رتبة شالكات ازعانت . اجسامها
وانواعها المعروفة نحو ٥٥٠ جميعها من املك بجار المناطق
الحارة والمعتدة الحرارة . تتميز بمودة الصبح وبقلة اجماعها
عن الهامد والملمجان والاضوح || اجسامها اعليجية
الشكل ، لأقياسها الطول الذي يراوح من ١٥ الى ٢٠٠ سم .
حراشقا مبراشة عشة متاسكة الاطراف ، زانفها
الموضعية سداسية الاشعة المرتفعة باستثناء شجاع واحد جامد
شاذك . اسناتها الفكية والحيكية متفحة الصنف المتابعة ||
اشهر اجناسها الصران والانتياس والقفس والقياب .

١٦١٧٧ - صُرَّابَة المخطل اذا اصفر .

١٦١٩٧ - صُرَر
الصُرَر: الزرع نصبت سقوه وأكملت منابله دون حبه .
الواحدة صُررة .

Coq (F). Cock (E).

١٦١٩٨ - صُرَصَر

هو القديك ، اطلبه .

Scymnus ilichia (S).

١٦١٩٩ - صُرَصَرَكَن

Liche, Gatta (F).
سمكة بحرية وسيدة الجنس والنوع من السمكيات ، تعلق
نحو ثلاثة أمتار . جنبها اسطوانية الشكل ، دقيقة المخز ،
كبيرة الزعنفة الشرجية . ثوبها الى السمرة الزرقاء المواج
يلوحها تجلج اسود . جلجها عادم الفلوس شائع الاستعمال
الصناعي . لحمها مأكول .

Cri du milan (F).

١٦٢٠٠ - صُرَصَرَة

Cry of the kites (E).

صوت اليازي .

١٦٢٠١ - صُرَصُور

حشرة مملوكة تعرف بيلت وردان ، اطلبها ، منبا
الامريكية والجرمانية والشرقية .

Epilepsy (F). Epilepsy (E).

١٦٢٠٢ - صُرَع

حالة عينية في الجهاز العصبي تصيب الحبل . تعرف
من حسيل القيروية والسقوط على الارض والتشنج في
المشمل .

Chrysobothris affinis (S). * صُرَعَانَة

Chrysobothris complice (F). Chrysobothris af-
finis (E).

حشرة خاضعة ناعمة من فصيلة القزبنويات ودية غمديات
الاجنحة . تألف الاجراج والنابات والحدائق . غمداتها
تمش على اوراقها الاجراج . يرقاتها مرقالة تمش على
الاجراج الحمراء فتسردب الحماة ولها كسطب الشكير
جسمها متوسط القد ، يطول من ١٢ الى ١٦ سم . ثوبها
الى السمرة الكستنية يملوها مواج اسفع . غمدها ثلاثيا
انقر ، خضره اللون عند الذكر ، خضره اللون عند
الانثى . رأسها مستدل الجرم . عينها كبيرتان ، ناشزتان .
زبانها عريضتان ، مشاوي التركيب . ظفوها شبه جلوني
الشكل ، ذلق المخز ، مطعوم الطرف . غمداه متبايعتا
التجزؤ الخفيف . ارجفها خاية العقل لل الانثى اميز
قدًا من الذكر وأكد ثوبًا منه واتقصر زبانا جيلها
ثنائي الحول . تظهر الحشرة الجبلانة في اوائل ايار وتميش
حق اوائل آب . تسرح في النهار ويبيت في الليل الى البرقة
بطيئة النمو تطول عند الادراك اتمام نحو ٣٠ م . جسمها
مستطال المقدم والرأس ، مستطال المخز . ثوبها الى اللعلة .

Aglo, Change (F). * صُرَق ، اصْطِرَاف

Aglo, Premium, Exchange (E).
القرق بين سر لتقد الاسمي وصدر المظن .

١٦٢٠٥ - صَرْقَة

الصرقَة منزل من منازل القمر الشامية يتزله في الليلة الثانية
عشرة . وهو نجم واحد نير تلقاه الزيرة حماط بكواكب
صغار طمس . ونحت صرقَة لانصراف الحر والبرد بطولهما .
ومن العرب من يسمي الصرقَة قلب الاسد الى رقيب الصرقَة
قرق الدلو المقدم .

ظهور هابك المراج الاسمر . يلقه الى البياض الاخير . سقطاه
الى السمرة الحالكه المبقية بالابيض الناصع . ذنبه اسود
الوسط ، ابقع الناعسة والطرف . يتقارح ويماق اسود .
يألف الرياض والاسراج القريبة من المروج والمرابي .

١٦١٩٩ - صُرَدُ الْجَنْبِ *

Lanius meridionalis (S). Pie-grièche méridionale (F).
نوع من الصرد ، موطنه افريقية الشالية وشراطي المتوسط
طوله نحو ٢٥ سم . ظهره اطمل اللون . سقطاه الى السمرة .
ذنبه ابقع الاطراف ، اسمر الوسط . صدره ويقله الى
البياض الوردي المواج . عيناه مكشفتان بالاسود الى يافت
الغنايات والمغنايات الخساة والشراطي الصخرية .

١٦١٩٠ - صُرَدُ الْخُصُوط * دُقْنَش شامي

Lanius senator, L. rufus (S). Pie-grièche rousse (F).
Woodchack shrike (E).

نوع من الصرد الجوال يحرب معظم مناطق العالم القديم .
طوله نحو ١٩ سم . ثوبه ابقع اللون كثر فيه الصبغة .
يألف الادغال والحدائق والمروج . قوته المظاء والفرزغ
والضفادع ويختلف الحشرات الى ينش في الجنبات الفتنة
القليلة الارتفاع من الثرة .

١٦١٩١ - صُرَدُ امْعَر * نُهَس

Lanius collurio (S). Pie-grièche écorcheuse, Pie-grièche
grise (F). Red-backed shrike, Butcher bird (E).

نوع من الصرد الجوال يحرب اكثر مناطق العالم القديم .
طوله نحو ١٧ سم . ثوبه امسر اللون يبق عند الظهر
ويبيض عند الزور والصدر . عسراه الى السمرة القائمة .
سقطاه الى السمرة الطحلاء الخطيئة المواج . ذنبه ابقع
الاطراف الى يافت الاسراج ويجاري الماء والحدائق
والمرابي . وهو شرس الطبع ، يسيق الخلق . قوته الحشرات
على اغصانها والوديات والصائير .

١٦١٩٢ - صُرَدُ وُرْدِي * دُقْنَش

Lanius minor (S). Pie-grièche à potrine rose, Pie-
grièche d'Italie (F). Lesser grey shrike (E).

نوع من الصرد الايد ، موطنه يمتد من بلاد فارس الى
اطراف اروب الجندرية . طوله نحو ٢٢ سم . ثوبه الى
الصبة الطلاء . رأسه اسود الطوق . صدره وردي اللون .
سقطاه الى الصبة الخطيئة العابقة الى يافت الادغال
وجاري الماء ، قوته الحشرات والوديات .

١٦١٩٣ - صُرَدُ كَاح

Terre meuble (F).
الصدراج والردراج والرسادة هي الثرة الية .

١٦١٩٤ - صُرَدُ حَكَة

Terre délaissée (F). Abandoned ground (E).
الارض الزراعية المهمله المتروكة لا تبت لها .

١٦١٩٥ - صُرَدُ حَي * ادَاقِي

Edaphique (F). Edaphic (E).
المسرب الى الصردح ، أي الثرة ، باختياره حاملا
من حوامل البيئة .

١٦١٩٦ - صُرَدِيَّات

Lanidae (S).
Lanidae (F). Lanidae (E).

فصيلة طيور من الجوائم المشرويات للتناير . اجنحتها
وانواعها عديدة تتميز بامتيازها القليلة ، القوة الجباله
المسنة الخاطم العليا ، اجتمعتها متوسطة القد من قوتها
ما تقتضيه من حشرات ووديات وصافير .



صُرَدُ الْجَنْبِ



صُرَدُ الْخُصُوط



صُرَدُ امْعَر



صُرَدُ وُرْدِي



صُرَدُ كَاح



صُرَدَان

وروشه الخلفيان سيقان بالازرق ويعدان بالبرقالي .
الانثى سمراء اللون ، ورشها الامامي يحمل بقعة غروبية
الشكل مقلدة للثعلب . ورشها الخالي يحمل من نقطتين الى
ثلاث نقط صفراء . ريشته تبيض على ورق الزعرور
والخوخ البري .



صرمون ابيض

١٦٢١٤ - صرمون السنديان * Strymon ilicis (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول من ٢٢ الى ٢٦ سم .
الذكر اصفر قدام الانثى ثوبه الى السرة لكستنية المواج .
وراشته مسنجة بالابيض والاحمر . الانثى سوية الثوب
الاحمر الباقي تحمل في طرف كل ورس من ورشها
الخلفيين نقطة صفراء اللون . ريشته تبيض على ورق
السنديان .



صرمون الخوخ

١٦٢١٥ - صرمون السط * Strymon scabies (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٢٧ سم . الذكر
حشلي الثوب المحلل الروشن . وراشته زرق الانتشاب
يلوحظ تسليح مفرس ابيض وتبيض طرفي اصعب . الانثى
سمراء اللون كسنية المواج . ريشته تظهر من نيسان الى
ايار تبيض على اوراق السط .



صرمون الزعرور

١٦٢١٦ - صرمون * Saururus (S).

Saururus (S). Saururus (F). Lizard's tail, Swamp
lily (E). Molchschwanz (D). Saururus (I).
جنس نباتات عشبية جنسوية مدادة معمرة من فصيلة
الصرويات . انولها عديدة جميعها متغيرة صرورية .
سوقها نحيلة سوية تملأ من ٢٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها
مستطقة ، متعاقبة ، نصلها قلبي الشكل ، متواجدة الصفة ،
خالي البشرة . ازهارها غشوية ، سفلية التجميع . ازهارها
يستر من آب الى تشرين .



صرمون السنديان

١٦٢١٧ - صرمون زبادية * Strymon tacheé (F).

هي الزينة الثراء ، الحلي .

١٦٢١٨ - صرمونيات * Saururaceae (S).

Saururaceae (F). Saururaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين حدية الثغالات . نباتاتها
عشبية معمرة . ازهارها غشوية . ثمارها جردا غطيفة
الاشكال .



صرمون السط

١٦٢١٩ - صرمون * Strymon albicus (S).

هو الصرم ، راجحه .

١٦٢٢٠ - صرمون ، صرمون ، صرمون ، صرمون * Purang (F). Thoroughbred (E).

نمت يطلق على كل صرمون احلي من مائة صانية لتسب
متنوعة .

١٦٢٢١ - صرمون * Glace (F). Ice (E).

هو الجليد ، الحلي .

١٦٢٢٢ - صرمون * Palmeria (F). Data-Garden (E).

هو الحصاد ، الحلي .

١٦٢٢٣ - صريمكة * Palmeria (F). Data-Garden (E).

الحاشي المتجمع من النخل في الربا .

١٦٢٢٤ - صريمكة الجدي ، سلطان الجبل * Lonicer (S).

Lonicer (S). Chèvrefeuille (F). Caprifoly (E). Geiss-
blatt (D). Caprifoglio, Capriola (I).
جنس نباتات معمرة برية وتربيت من فصيلة الحمانيات .



صرمون

١٦٢١٦ - صرمون ، صريمكة
Sous-variété Cultivar (F). Subvariety Cultivar (E).
الصرمون . اسرام هي افراد من صرم واحد تميزت بصفات
معينة خاصة مثالا صرم الانتشاب الساتركن ريش رده .

١٦٢١٧ - صرمون * Sauromatum (S).

Sauromatum (F). Sauromatum (E).
جنس نباتات عشبية صرورية معمرة من فصيلة الفلقانيات .
متنبا بعض مناطق البلاد الحارة المعتدة من الهند والافغان
الى شط العرب . صلاتها كبيرة الجرم تطول نحو ١٥ سم .
وتعرض نحو ١٥ سم . ازهارها يستيق الاوراق وله رائحة
كرية . شرعافها بطول من ٢٥ الى ٤٠ سم . وهو ضيق
غشبي غروبية الشكل . اوراقها مستطيلة للماليق الحفر
التي تطول نحو ٥٠ سم . نصلها قلبي الشكل تطول نحو
٢٥ سم . وتعرض نحو ١٥ سم . تزرع لتزين لكنها
تتخذ المواقع البادية . اعراف انواعها واثامها التالية :

١٦٢١٨ - صرمكة صرمكة صرمكة * Sauromatum venosum (S).

Sauromatum à nervures jaunes (F).

نبات صروري شائع الاستعمال التزييني ضمن البيوت .
عائلها مأكولة لكنها تحوي بعض المواد الحشوية التي
تلعب بالتحسين .

١٦٢١٩ - صرمكة صرمكة * Sauromatum guttatum (S).

Sauromatum tacheé (F).

نبات صروري شائع الاستعمال التزييني ضمن البيوت وفي
حدائق المناطق الحارة .

١٦٢٢٠ - صرمون * Strymon (S).

جنس حشرات فراشية من فصيلة الفلقانيات . انواعه عديدة
منتشرة في معظم اقطار العالم . ذكورها واناثها غطيفة
الاثواب . مظهر كروي الشكل ، رفاقها صغيرة القد
منخفضة الرؤوس ، مديبة الاطراف . تعيش على النباتات
الشجرية . اشهر انواعه ما يلي .

١٦٢٢١ - صرمون ابيض * Strymon albus (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٢٢ سم . ثوبها
الى السرة السوداء . رواشن الذكر حشلي اللون يلوها
تسليح ابيض مفرس وتبيض برتقالي طرفي يحده اطراف
اسود وخمس نقط سمراء . رواشن الانثى سوية اللون الاحمر
الداكن . يالفت الجناح والحدائق والنباتات . يصرح
من حزيران الى تموز . ريشته تبيض على ورق النيردار .

١٦٢٢٢ - صرمون الخوخ * Strymon pruni (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٢٤ سم . الذكر
حشلي الثوب ، رواشته الى الصفة يلوها تبيض وتشيخ
وتشيخ براوح من الابيض الى الاحمر والاحمر والاحمر .
الانثى سوية الثوب الكسني المتفاوت الازهار . ريشته
تظهر في ايار تتركب اوراق الخوخ .

١٦٢٢٣ - صرمون الزعرور * Strymon lynceus (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٢٢ سم . الذكر
احمر اللون ، حشلي الروشن المسنجة يحط مفرس ابيض .

الآخر يملو توشيع اصفر. ثمارها صغيرة القذ حراء اللون. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران || صدارة ثمارها مرة الطعم سهلة تذلل في حدة مستحضرات طبية معوية .

١٦٢٣١ - صَرِيحَةُ الْجَدِي الزَّرْقَاءُ الْقَتْمَرُ

Lonicera caerulea (S). Chèvrefeuille à fruits bleus (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها مثلية فراء .
فروعها زباه اللحاء ، يفيش المكاك . ازهارها ثروامية
الانتشاب . تويجها محبوس الانبوب الاكروش . لونها
الى البياض الاصفر تملو حلة ذهبية . اوراقها بيضيه
مقطوعة القاعدة ، زباه المسغة السفلى . ثمارها حصية
القد لونها الى الزرقاء المابقة || ازهارها يستمر من
ايار الى تموز .

١٦٢٣٢ - صَرِيحَةُ الْجَدِي الشَّالِكَةِ ، يَاسِين

Lonicera caprifolium (S).
Chèvrefeuille des jardins, C. commun (F).
جنية معمرة عارشة تملو نحو ٥ امتار . ساقها فراء .
فروعها عادمة المكاك . اوراقها عابطة يفضيه الشكل ،
مقطوعة القاعدة . تصلها مالى البشرة ، اخضر المسغة
اللبيا ، بجري السفلى . ازهارها كبيرة القذ فواحة العرف
الطري . لونها اريواني الخارج اصفر الداخلى || ازهارها
يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٢٣٣ - صَرِيحَةُ الْجَدِي الشَّالِكَةِ

Lonicera spinosa (S). Chèvrefeuille épineux (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها مثلية فراء .
فروعها تحيلة مثلية ، مكاكها ابيض اللون . اوراقها
خضية مستطيلة مسنة القاعدة . ازهارها ثروامية الانتشاب ،
انبوبية التويج ، ضيقة القنابات الطويلة ، وردية اللون ،
ثمارها الى الحمرة الزرقاء المزجج يملوها طيسل اخضر .
ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٢٣٤ - صَرِيحَةُ الْجَدِي الشَّرِيقَةِ

Lonicera orientalis (S). Chèvrefeuille d'Orient (F).
جنية معمرة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها مثلية
فراء . فروعها مثلية يفيش المكاك . اوراقها صغيرة
القد ، تصلها اخضر البشرة في صفحتها . ازهارها وردية
اللون يملوها توشيع بنفسجي . ثمارها الى السرة السوداء
اللامعة || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١٦٢٣٥ - صَرِيحَةُ الْجَدِي الْقَتْمَرِ

Lonicera myrtillus (S). Chèvrefeuille-myrtille (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها مثلية . مكاك
فروعها ابيض اللون . اوراقها اهليجية صغيرة القذ .
فصلها حاق الحصار خلى الصفحة السفلى . ازهارها ثروامية
الانتشاب ، انبوبية التويج ، جرسية الاطراف ، ضيقة
القنابات المستطيلة . لونها الى البياض التبي . ثمارها
مزدوبية ، لاصقة ، ثنائية الحد ، حراء اللون || ازهارها
يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٢٣٦ - صَرِيحَةُ الْجَدِي الْقَتْمَرِ

Lonicera pileata (S). Chèvrefeuille à cupule (F).
جنية معمرة صغيرة القذ تملو نحو ٦٠ سم. ساقها مثلية
فناء . لثانها زباه اللحاء . اوراقها ابيدة بقسية الشكل .
ازهارها صغيرة الحجم ، قمية القاطعة ، يضاء اللون .
ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

الوراء نحو ١٥٠ سم تميز بدم نظاميتها . ساقها مثلية
او عارشة . اوراقها متعابطة الارتكاز ، ابيدة او عابطة
التصل . ازهارها لا تقبسية الاوصام ، وشيقة الشكل ،
سطرية الرائحة || اعرف ازهارها واشهرها ما يتبع .

١٦٢٣٥ - صَرِيحَةُ الْجَدِي الْأَيْدِيَّة

Lonicera sempervirens (S). Chèvrefeuille toujours
vert, C. de Virginie (F).
جنية معمرة عارشة تملو ٥ الى ٥ امتار . ساقها مثلية
فروعها عادمة المكاك . اوراقها ابيدة يفضيه الشكل .
فصلها خلى البشرة بجري اللون . ازهارها مثلية التجميع
تاجية الارتكاز سطرية الرائحة ، لونها الى الازرقاء الاصفر
المزجج || ازهارها يستمر طوال الربيع والصيف .

١٦٢٣٦ - صَرِيحَةُ الْجَدِي التَّبِيَّة

Lonicera thibetica (S). Chèvrefeuille du Thibet (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٥٠ سم. ساقها مثلية فراء .
مكاك فروعها ابيض اللون . اوراقها صغيرة القذ ، فصلها
اخضر المسغة اللبيا ، الحبل للفل الكثيفة الزنب .
ازهارها ثروامية الانتشاب ، انبوبية التويج ، سطرية
الرائحة ، ليكية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى
حزيران .

١٦٢٣٧ - صَرِيحَةُ الْجَدِي التَّرْتَارِيَّة

Lonicera tartarica (S). Chèvrefeuille de Tartarie,
Chamécisier, Camériscier (F).
جنية معمرة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. فروعها
واصرها الزرقائية عديدة ، ساقها فراء . فروعها القتيبة
صمر المكاك اما الحولية قبيضة . اوراقها صغيرة القذ ،
قلبية الشكل مقطوعة القاعدة . تصلها حاد الحبل ،
اخضر اللون . ازهارها تختلف مع الضروب لنها
الايض والوردي والاجر ، كرونها خاسية التركيب .
ثمارها صفر او حر ، كروية الشكل ، مستطيلة الامن .
ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٦٢٣٨ - صَرِيحَةُ الْجَدِي الْجَبَلِيَّة

Lonicera alpigina (S). Chèvrefeuille alpestre (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٥٠ سم. ساقها فراء ، فروعها
عارشة يفيش المكاك . اوراقها كبيرة القذ اهليجية التصل
المهبط . ازهارها بجوية اللون تويجتها مزدوبية القصور .
ثمارها الى الحمرة اقترضية || ازهارها يستمر من ايار
الى تموز .

١٦٢٣٩ - صَرِيحَةُ الْجَدِي الْحَرَجِيَّة

Lonicera periclymenum (S). Chèvrefeuille des
bois (F).
جنية معمرة عارشة تملو نحو ٥ امتار . ساقها فراء .
فروعها عادمة المكاك . اوراقها يفضيه الشكل ، وثقة
ازرام الاشبر ، تصلها مالى الصفحة العليا اخضره ،
خلى السفلى اللحاء . ازهارها فواحة العرف القذ ، لونها
الى الصفرة الجيلة يملوها مزجج اريواني || ازهارها يستمر
من حزيران الى ايلول .

١٦٢٤٠ - صَرِيحَةُ الْجَدِي الشَّدْبِيَّة

Lonicera xylosteum (S). Chèvrefeuille des haies,
C. des buissons (F).
جنية معمرة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها مثلية
فراء فناء . فروعها جوف ، لثانها صمر المكاك . اوراقها
يفضيه مسطوية القاعدة خلية للتصل . ازهارها الى البياض



صَرِيحَةُ الْجَدِي الْحَرَجِيَّة

نحو ٢ سم. أزهاره وردية اللون. متكولة التجمع.
يستخرج من أوراقه وزهره دهن السمّ السّامّ الاستعمال.
١٦٢٤٤ - صَعْتَر البَرّ هو كَلْدَغ، اطلبه.



صتر ازغب

١٦٢٤٥ - صَعْتَر الجَيْلِجِل هو ندغ الجبل، اطلبه.
١٦٢٤٦ - صَعْتَر الْفَرْ هو الطُورِيون الكروبي، اطلبه.
١٦٢٤٧ - صَعْتَر يَرْي هو ستر البر، اطلبه.



صتر البراري

١٦٢٤٨ - صَعْتَر الْبَرْي *، فُودَنْج
Origanum vulgare (S). Origan commun, Marjolaine
bistarde, Fausse marjolaine (F). Wild marjoram,
Organy (E). Echter Dist, Wilder Marjoran (D).
Origano, Regano (I).
نبات عشبي طيب يري معمر من فصيلة الشفويات. ساقه
فراخ خشوية تملو من ٢٥ إلى ٦٠ سم. أوراقه منقطة،
متقابلة، فضية الشكل؛ نصلها خلى البشرة، مبر
الجيوب المطرية. أزهاره وردية اللون، حر التفاتبات
مكوكا الزهري عيمي الشكل. يستخرج من أوراقه
عطر السمّ.

١٦٢٤٩ - صَعْدَكَة. Tige dressée (F). Erect stem (E).
هي كل ساق تمكها البانفا القاسية من الانتصاب دون
وسيط أو تقفّف.

١٦٢٥٠ - صُورُوكَة، عَقِيكَة، قُصْمُوكَة
Boule de scarabée (F). Ball of beetle (E).
الصمرورة أو البفورة أو القمصوة صمرورة من ذبل
ولبن تصطبها بعض اناث الخنافس، أخصها الجبل لَرَو
المكن في داخها.



صَعْف

١٦٢٥١ - صَعْف *
Accipiter (S). Accipiter (F).
جنس طير من حارة الحدأ وفصيلة الصقريات. أزواجه
قليلة جميعها من القواطع الكبيرة الجفة. أنثاها إلى الصبهة
والرصاصية يملوها مولج أزرق، ورؤوسها زاهية، سواقها
وأفنانها عابقة. حيرها حر اللون، سود الأبار والاداب.
متاسرها إلى السواد الأزرق، أرباغها بطوية. قوتها
المظاء والذوويات والحشرات على اختلافها. لكن في الأشجار
الباسقة. أنثاها تقص من رفقتين إلى ثلاث رفقات تحفها
بمنوبة ذكورها نحو أربعة أسابيع.

١٦٢٥٢ - صَعْف
Rotor
نعت قنبري يطلق على القسم المتحرك الدوار من المحركات
الآلية.



صَعْف

١٦٢٥٣ - صَعْف *
Oxylophus glandarius (S). Oxylophus-Geal (F).
طائر من حارة البوقليات وفصيلة البقريات. أصاته
نسمة الأرجاء تشل الشرق الأوسط والجزيرة العربية
وأفريقية الشرقية والشيالية. وهو من الصقور التي تجوب
البلاد في طلب الرزق. جسمه متوسط القد، يطول نحو
٤٠ سم. ثوبه متباين الألوان. رأسه إلى الوردية. جوده
وزوره وعلاطه إلى الصبهة الصفراء. بطنه إلى البياض.
ظهره إلى الوردية الحنطية المولج. ريش فواده وناكبه
وأباهه وقتبه إلى السمرة الحنطية باسنتها الأفراف البيض.
مقاده أحر القاطدة. أسد اللالط. أختاه إلى السمرة

١٦٢٣٧ - صِرْمَة الجدي النجيلية

Loncera syringantha (S). Chèvrefeuille-llas (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٢٠ سم. ساقها متعصبه فراخ.
مككاً فروها أبيض اللون. أوراقها الحنطية صغرة القد.
نصلها مائل البشرة حيل الحصار. أزهارها قوابة الانتداب.
أفريقية التوجع، غنيقة القنابات، عطرية الرائحة
وردية اللون. ثمارها حنطية القد، حراء اللون، ثلاثية
الحفر. أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

١٦٢٣٨ - صِرْمَة الجدي اليابانية

Loncera japonica (S). Chèvrefeuille du Japon (F).
جنية معمرة عارضة تملو نحو عشرة أمتار. ساقها متعصبه
فروها متعصبه، عادمة للمكك. أوراقها أليدة، فضية
الشكل، مدية الزم الاخضر. نصلها خلى الصغنة السفلى.
أزهارها قوابة التجمع، كبيرة القد، حرية الرائحة.
لونها إلى البياض اللوح بالاحمر. أزهارها يستمر من
حزيران إلى تشرين.

١٦٢٣٩ - صَعْب

Quela (S). Quéta, Diach, Travailleur (F).
جنس طير من فصيلة التوطيات. أنواعه للمرة ثلاثة
موطنها أفريقية الشرقية من شواطئ بحر القلزم إلى ما
وراء الحنطة. أجسامها صغرة الحجم طولها يراوح من
١٢ إلى ١٥ سم. أنثاها قليلة الاختلاف من بعضها بكثر
فيها الأحر المناهي، رؤوسها وأعانها وأجنحتها سود.
حنار قوادها وأباهرها صفر. متاقرها سود أو حر.
أرباغها إلى السمرة الحنطية. قوتها الجيوب والذوور
والطوام. تدن في الأدهال. حشاشها عموكة القش
كروية الشكل، مقفولة الممثل. أنثاها تقص من ٥
إلى ٧ بياض تحفها بمنارية الذكور نحو أسبوعين.
ج صماب.

١٦٢٤٠ - صَعْبَر، صَعْبَر

Berchemia (S). Berchmia (F).
جنس نباتات معمرة من فصيلة البقيبات. أنواعه قليلة.
سوقها عارضة تطول من ٤ إلى ٣٠ م. أوراقها عابلة فضية
الشكل، مقفولة القاطدة. نصلها حديد البروق، بحري
اللون. أزهارها صغرة القد، غضراء اللون، حنفودية
التجمع، ثمارها زيتونية الشكل والقند واللون، تسود
عند الأذوك. أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول.

١٦٢٤١ - صَعْتَر

Frai (F). Spawning (E).
سره السمك قبل أن يخرج من الأنظام وهو الذي يحضر
فيمص من المأكال المقوية الذببة المعروضة بالطرخ
والجباري. أنواعه عديدة تختلف باختلاف مصدرو
وصيم البره ولونه وطريقة تحميره.

١٦٢٤٢ - صَعْتَر هو السمّ، اطلبه.

١٦٢٤٣ - صَعْتَر أَزْغَب *، زَيْغَر

Origanum hirtum (S). Origan hirsute, Marjolaine
hérissée (F). Hairy Marjoram (E). Kreitscher Doeten
(D). Origan of Crete (I).
نبات عشبي يري سطري معمر من فصيلة الشفويات.
يكثر في الأراضي الجبلية المدحاة. ساقه فراخ تملو نحو
٤٠ سم. فروعه دقيقة، خشوية، متعصبه، فضية اللحاء.
أزهاره منقطة، متقابلة، فضية الشكل، نصلها خلى
البشرة. كيف الجيوب المطرية، مسن الحافة، يطول



محل



صعلول ازغب



صعلول اهيف



صعوة حمره الرأس



صعوة قنبرية



صعوة مجذبة

الخضراء || قوته الحشرات والاسرار. انشاء كائن القوي
لا تخشى البس بل تقسمه في عشائ خبها من الطير
اعصها عشائ الزاغ. ج صيف.

١٦٢٥٤ - صَعْفَرُ
Frail (F). Spawning (E).
الصَعْفَرُ سره السلك ويدعى صَعْفَرُ، عليه.

١٦٢٥٥ - صَعْفَرِيَّات
Chyridiaceae
فصيلة ظهور مجهرية من مرتبة السرديات ورتبة البشيات.
اجناسها وانواعها عديدة. اشهرها من الوسيلة الاقتصادية
الزراعية: النش والوزم والرمغة.

١٦٢٥٦ - صَعْلَكَة
الصعلكة: نخلة فيها هوج واصل منها جرداء.

١٦٢٥٧ - صَعْلَكُ *
Galerina marginata (S).
Galerine marginée (F).

نظر كائن الصنف لاما كزل من فصيلة الناريقويات.
اصغاك اقله الصنوبريات حيث يعيش جموعها على
التقوس والاعشاب النخرة. جموعها لاقواسية العدد الذي
يبراج من ٦ الى ٢٠ يوجه الى البياض الاخير. ساقه
ممتدة الطول ثنية اللون، وطوقا الى السطح ارسوه
شبه صيرانية الشكل غمدة الحاشية، قطرها نحو ٤ سم.
لونها الى البسرة يعلوها موج اصفر. اطرافه ممتدة
لثلاثة بنية اللون. وانحته عند العنق قريبة الشبه من وانحته
التيق.

١٦٢٥٨ - صَعْلُولُ اَرْزَب *
Clytus pilosus (S). Clytus polli (F).
Clytus pilosus (E).

حشرة خاضعة غاشية من فصيلة القرنيقيات ورتبة مفدمات
الاجسمة. تألف الجنان وكروم اللين. غشائها تميش
على اوراق الاجار. يرتقاها تسردب الجلود اليابسة ||
جسمها متوسط القدر بطول من ١٢ الى ١٦ سم. ثوبها الى
الصفار الزيتي الاخضر الموج يملؤه في الظهران ست نقط
سود. رأسها معتدل الجرم. عينها صغرتان بارزتان.
زبانها غطيان، قدقان، فكاهها ذربان. ظهرها
حراشي الشكل لا يعلف السكة الشرجية. عندها كيتان
الحمل والزرغب. ارساغها رباعية المقل الظاهرة || الاثنى
اكبر قدما من الذكر واطول سرما منه واقتصر زبانا ||
لها جليل واحد في الحلق. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل
حزيران وتبقى حتى اواسط ايلول. تسرح في النهار وتبيت
في الليل || البرقة عند ادراكها الكوال الجسموري تقول
نحو ٢٢ سم. جسمها حيدى التركيب قليل التقوس،
عادم الرواجب، حنطي اللون، افرع الموج، اسود
الرأس، مبعثر الحلب للتيق.

١٦٢٥٩ - صَعْلُولُ اَهْيَت *
Clytus arcuatus (S). Clytus étroit (F).
Clytus arcuatus (E).

حشرة خاضعة غاشية من فصيلة القرنيقيات ورتبة مفدمات
الاجسمة. تألف اجراج الصنوبر والتنوب والشرين.
غشائها تميش على ازالها الشفويات والصنوبريات. يرتقاها
تسردب الجلود والاعصان اليابسة || جسمها متوسط القدر
اهيف الشكل بطول من ١٢ الى ١٦ سم. ثوبها الى البسرة
الاسود يعلوها في كوشها اربع بقع صفر ويعلوها في

ظهرها اربعة تزاويق متعاقبة صفراء اللون. رأسها كبير
الجرم. عينها كبيرتان جاحطتان. زبانها غطيان
قدقان || ظهرها فارقة للزغب لا يعلف السكة الشرجية.
عندها محتاتبا التميز الغليظ. ارساغها رباعية المقل
الظاهرة || الاثنى اكبر قدما من الذكر واطول سرما منه
واقتصر زبانا || لها جليل واحد في الحلق. تظهر الحشرة
الجملانة في اواخر ايار وتبقى حتى اواخر آب. تسرح في
النهار وتبيت في الليل || البرقة عند بلوغها الادراك الجسموري
تقول من ٢٥ الى ٢٤ سم. جسمها حيدى التركيب، عادم
الرواجب، اصفر اللون، اسمر الرأس والشرج، مبعثر
الحلب القصير النقيق || طول الاكامل الذي يستمر من
٤٠ الى ٥٥ يوما ينتهي في آخر نفق تحفره البرقة قرب
سلك الجلع او الفس الذي تقيم فيه.

١٦٢٦٠ - صَعْتَبَرُ

هو الصبر نبات عايش من النقيات، عليه.

١٦٢٦١ - صَعَوَة *
Regulus (S).
Roitelet (F). Wren, Kinglet (E).

ج صعر. جنس طير من فصيلة اللخليات، انواعه ٦
جميعها من العصافير الصغيرة القدر. رؤوسها مطلوقة.
مناظرها دقيقة مستقيمة. اوتواها متباينة الالوان وعلف
فيها الاطيل والاضغر الزيتوني. اجنسها متوسطة القدر.
اذنابها مقعرة الريش قصيرة || قوتها الحشرات والحوام.
تألف الادغال والارواح والسيجات. تمش في الاجار
القفاء. اناثها تبيض مرتين في العام. المرة الاولى في ايار
والثانية في تموز. حضنها يستمر نحو اسبوعين تقوم به
الاثنى دون الذكر.

١٦٢٦٢ - صَعَوَة الحَطَب *
هي الاطلان، عليه.

١٦٢٦٣ - صَعَوَة حَجَرَة الرأس *
Regulus ignicapillus (S).
Roitelet à tête rouge (F). Fire crest, Fire
crested wren (E).

نوع من الصعوة تألف الادغال والسيجات والحدايق.
طولها نحو ١١ سم. رأسها الى البسرة الصنابية. محسرها
الى الصفرة. ثوبها الى الريدة زهو في الصدر والطين،
يقطن في الطور يمدوله موج اصفر زيتي في الجناسين.

١٦٢٦٤ - صَعَوَة قَنْبَرِيَّة *
Regulus cristatus, R. regulus (S). Roitelet huppé (F).

نوع من الصعوة تألف الصنوبر والادغال. طولها نحو
١٠ سم. رأسها يرتقاها الريش المستطيل، اسود الطوق،
اصفر الحسرين، ظهرها الى الخضار الزيتوني. جناحها
الى البسرة القفء. صدورها وبطنها الى الريدة المخلدة.
تمش في الصنوبر والتنوب.

١٦٢٦٥ - صَعَوَة مُجَذَّبَة *
Regulus atricapillus (S). Roitelet triple bandeau (F).

نوع من الصعوة طولها نحو ٩ سم. رأسها اسمر اللون اسود
الطوق. محسرها بجلعان بلاييض. سائر ثوبها كالصعوة
القنبرية. قام الجليل في اوائل ايار فتقيم حتى ايلول
ثم ترسل الى الشواطئ هربا من البرد.

١٦٢٦٦ - صَعْلُول *
Acrocephale (F).
Acrocephalic, Acrocephalous (E).

الصعلول من كان رأسه ضيق القمة.

١٦٣٠٢ - صُفْرَايَةُ الشَّعِيرِ السُّورِيَّةِ

Bruant de Syrie (F).

طائر من الشراشير يدعى دُرَّةُ رِنداء ، اطلها .

١٦٣٠٣ - صُفْرَايَةُ الشَّعِيرِ سَوْدَاءِ الرَّأْسِ

Embrézie à capuchon (F).

طائر من الدُّرْس يدعى دُرَّةُ سَوْداءِ الرَّأْسِ ، اطلها .

Aubère, Obère (F).

With a white and chestnut coat (E).

من الثَّوَاب الخليل وهو اختلاط شعرات بيض بأخرى ضاربة إلى حمرة .

١٦٣٠٥ - صِفْرَدُ ، سَكْوِي .
Crex pratensis (S).
Crex des prés, Râle des genêts, R. terrestre, Roi des Cailles (F). Corncrake, Landrail (E).

نوع من التفلطح وهو طائر من القرواطح يشبه السباني ويأتي معها في زمن واحد . طول نحو ٥٥ سم . ثوبه إلى الصبغة السمراء تعلوها رقيقة سحطية عابطة . ظهره أغبر المواجه المابن . صدره وبلته إلى البسطة البيضاء ، جناحيه موشجان بالأحمر الصنابي . منقاره جهوري أعظم العلوي تبي السفلي || قوته الحشرات والديدان والحبوب . يطن في التربة بين الإشباق . أثناء قنص نحو ٧ يعضات تحضنها وسدحا ثلاثة أسابيع || يقال أنه جبان يفرح من الصمرة وفي المثل « أجبن من صفره » وقد قال الشاعر :

« تراه كالليل لدى أمته

وفي الوى أجبن من صفره »

١٦٣٠٦ - صُفْرِيَّ

الصُفْرِيَّ ثبات ينبت في أوائل الخريف (المان) .

١٦٣٠٧ - صُفْرِيَّات

Chalcididae (S).

Chalcididae (F). Chalcid Wasps (E). Zehrwespen, Erzwespen (D).

فصيلة حشرات من رتبة خشايات الاجنحة المضمصرة . اجناسها وأنواعها عديدة جميعها نافعة تتطفل على مختلف الحشرات الضارة أهمها ذوات الجناسين وحرقفايات الاجنحة .

١٦٣٠٨ - صُفْرِيَّةُ الْخَرَشِيَّاتِ

Chalcis stipes (S). Chalcide (F).

حشرة من الصُفْرِيَّات ، طولها نحو ٨ م . جسمها أسود اللون ، اربطها حر . حصرها انبوي الشكل مستطيل . ريقاتها تتطفل على جميع أنواع الخرشيات .

١٦٣٠٩ - صُفْرِيَّةُ الدُّودِ

Brachymeria femorata (S). Brachymère (F).

حشرة صغيرة من الصُفْرِيَّات ، طولها نحو ٤ م . ثوبها إلى السمر . زباناها وقوائمها إلى الصفرة . ريقاتها تتطفل على مختلف ديدان حرقفايات الاجنحة .

١٦٣١٠ - صُفْرِيَّةُ الحَنُوطِ

Phaenoglyphus conica (S). Phaenoglyphus (F).

حشرة من الصُفْرِيَّات ، طولها نحو ٨ م . رأسها وسدورها وعصرها سود ، بطنها أحمر . قوائمها الانامية سود . اربطها الخلفية حر . مرزها غليظ مستطيل . ريقاتها تتطفل على عدة حشرات اجناسها ذات الجناسين .

Caractère récessif
Recessive character (E).

هي الصفة المندرة المضمرة الممكن أن تبيد إلى الظهور .

١٦٣٨٨ - صُفَّةٌ ، سَكِيَّةٌ

Hangar (F).

Outhouse, Shed (E).

بناء زراعي مكشوف الجوانب أو بعضها تحفظ فيه الآلات الزراعية والعلات فيها من الشمس والمطر .

١٦٣٨٩ - صَفْدٌ

هو الصدف من حيوانات البحر ، اطله .

١٦٣٩٠ - صَفْدِيَّ

Testacé (F). Testaceous (E).

نمت تعريفي توصف به الاغشية الكلسية المادة التي تلحف الاصداف البحرية .

١٦٣٩١ - صِفْرُ

Zéro (F). Zero, Naught (E).

صلاة عديدة تعبر عن انعدام القيمة . والمفر عند وجوده عن عين عدد دل على شربه بشرة .

١٦٣٩٢ - صُفْرُ ، أَسْكِرِيْدُ ، أَسْكِرِيْسُ

Ascaride, Ascaris (F).

جنس ديدان طفيلية من رتبة السلكتيات . انواعه عديدة جميعها من الديدان الخيطية المعوية المؤذية ، يقضى عليها باستعمال بعض المهلثات النباتية اعصها البسترن .

١٦٣٩٣ - صُفْرُ الخَيْلِ

Ascaris megalocephala (S). Ascaride mégalocephale, A. du cheval (F). Thread-worms horse (E).

نوع من الصُفْر يصيب الخيل والحيد وابلال . يعيش في المشع وقد يسبب انزعاجاً يفسد الحيوان .

١٦٣٩٤ - صُفْرُ الكَلَابِ

Ascaris mystax (S). A. du chien (F). Thread-worms dog (E).

يصيب الكلاب والسناير يعيش في المني الدقيق .

١٦٣٩٥ - صُفْرَاكُ

« الصُفْرَاكُ من نبات السهل والويل وقد تنبت بالجله . »
قال ابو حنيفة : « الصُفْرَاكُ نبت من المشع تسقط على الارض وكان ورقها وود الخس » تأكلها الابل اكلًا شديداً . (اللسان)

١٦٣٩٦ - صُفْرَاكُ

Bile
حصارة تقترنا الكبد تتميز بلونها الاصفر الداكن وشدة مرارتها . هي ثلثة المتأصل تحوي بعض الاصلاح الضورية والمعدنية والمواد الملونة || وظائفها الجسدية عديدة اهمها : تثبيط عمل البنكرياس وسحب حركات الامعاء الميكانيكية وترتيب المواد المهضومة الى ان يتم انقسامها مع وقايتها من الاغيار والفسن .

١٦٣٩٧ - صُفْرَاكُ العُرُوقِ

هي الكستوريزا ، اطلها .

١٦٣٩٨ - صُفْرَاكُ القُرُونِ

هي الكستوبرا ، اطلها .

١٦٣٩٩ - صُفْرَاكُ

هو الزفران ، اطله .

١٦٣٠٠ - صُفْرَايَةُ ، صُفْرَاةٌ

هي الصُفْرَاةُ ، اطلها .

١٦٣٠١ - صُفْرَايَةُ الشَّعِيرِ

Verdière (F).

طائر من الشراشير يدعى صُفْرَاةٌ ، اطله .



صفر الخيل



صفره



صُفْرِيَّةُ الخَرَشِيَّاتِ



صُفْرِيَّةُ الدُّودِ



صُفْرِيَّةُ الحَنُوطِ



صَفَافَات ابيض



صَفَافَات ارجواني



صَفَافَات اريد



صَفَافَات السلاين



صَفَافَات الماعز



صَفَافَات فاخر

الاطراف . اسديتها ثنائية . ثمارها زباد القشور مستدة
الاحن الشديدة القصر || يعيش على الماء . زراعتها منتشرة
في جميع الاصقاع . قصبانها لينة صناعية شائعة الاستعمال .

١٦٣١٧ - صَفَافَات الماعز *
Salix caprea (S).
Sauce des chèvres, S. Marsault, Boursade (F).
Goat willow, Sallow (E). Salweide (D). Salice caprea,
Capraevic (I).

شجرة سريرية متوسطة القد ، تملو نحو عشرة امتار .
قصبانها وانفاتها حديدية اللحاء . اوراقها مستطنة ، بيضيه ،
صغيرة لينة تملو نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٢ . نصلها
خشن اللمس ، ازغب الصفحة السفلى . حراشف شبارتها
سود . اسديتها ثنائية || يعيش في جميع الاراضي والمواقع
الرطبة . اشخاصها صناعية . لحاء سوقه تصلح لدباغة .

١٦٣١٨ - صَفَافَات قَبِيْقُ القَلَم

Salix acutifolia (S). Sauce à feuilles aiguës (F).
شجرة متوسطة القد ، تملو من ٦ الى ١٠ م . فروصها
تحلة مستطنة خلية اللحاء . اوراقها ضيقة ، نصلها يطول
نحو ١٢ سم . وتعرض نحو ٢ . حراشف شبارتها لاسفة
خلية . اسديتها انفراديا ثنائية التجميع || يعيش في الوديان ،
يزرع في الكتبان لتثبيت رمالها للتمسكة .

١٦٣١٩ - صَفَافَات فاخر * Salix magnifica (S).

Sauce magnifique (F).
جنبة سريرية جميلة الشكل ، تملو نحو ٢٥ م .
قصبانها اربوبانية اللحاء . اوراقها بيضيه تملو من ٢٥
الى ٢٤ م . وتعرض من ١٥ الى ١٥ م . نصلها جامد
النسيج ، جميل الخضار الكزاهي . شبارتها الذكورية تطول
١٥ سم . والانثوية ٢٥ سم . حراشفها جزئية اللون ،
اسديتها ضفعية || يزرع لقرنين يحد في جميع الاراضي
والمواقع المتوسطة الرطوبة .

١٦٣٢٠ - صَفَافَات قَرَم Salix herbacea (S).

Sauce nain, S. argenté (F). Dwarf willow, Arctic
willow (E). Krautweide (D). Salice nano (I).
بجلة جبلية ترطب في المواقع الرطبة الباردة . تملو من ٦٥
الى ١٥٠ سم . فروصها وقصبانها زباد اللحاء . اوراقها
صغيرة لينة تملو نحو ٦ سم . وتعرض نحو ٢ . حراشف
شبارتها خلية فضية . اسديتها ثنائية .

١٦٣٢١ - صَفَافَات قصير Salix fragilis (S).

Sauce fragile (F).
شجرة فراءه ، تملو من ١٥ الى ١٥ م . فروصها متدلية ،
عامة لملل الازرق ، سريرية النسيم . اوراقها ستانية ،
مدية ، تطول نحو ١٦ سم . حراشف شبارتها صفر .
اسديتها انفراديا ثنائية التجميع ، مرطبة الاطراف || يزرع
لاشغاه وقصبانها الصناعية ، يرطب في المواقع المنتشرة
الرطوبة .

١٦٣٢٢ - صَفَافَات قَلْبِي الْوَرَق Salix cordata (S).

Sauce à feuilles en coeur (F).
شجرة فراءه منتصبه الاقصان ، تملو من ٢٥ الى ٤٠ م .
م . اوراقها قلبية الشكل ، نصلها مائل البشرة ذات الزام
الابخر المنشاري الحافة . حراشف شبارتها اسدية
انفراديا ثنائية التجميع مرطبة الاطراف || يزرع لقرنين
يرطب في المواقع الرطبة والاراضي العميقة النور .

١٦٣١١ - صَفَافَات سَوَحَر Salix (S).

Sauce, Osier (F). Willow (E). Weide (D). Salice,
Salico, Salido (I).
جنس اشجار وشجيرات ونباتية سريرية ورتبية من فصيلة
المصغيات . انوارها نحو ١٢٥ متشرة في جميع الاصقاع .
اوراقها مائلة معتقة صناعية تطيب فيها الاستعانة ، نصلها
ازغب الصفحة السفلى . انوارها ثنائية المسكن ، شريفة ،
وسيدة الشق || جميع انواعها ترطب في الاراضي الرطبة .
اشغاهها غنية لينة سهلة التصنيع لا تتغلغل ، لحاء سوقها
تصلح للدباغة . قصبانها تستعمل في صناعة السلال .
اشهر انواعها ما يتبع .

١٦٣١٢ - صَفَافَات اَبْيَس * Salix alba (S).

Sauce blanc, Osier blanc (F). White
willow, Swallow tailed willow (E). Silberweide (D).
Salice bianco, Salicastro (I).
شجرة كبيرة القد ، تملو زباد ٢٥ م . فروصها متوسطة
الانقباض ، قصبانها وانفاتها منتصبه ، لونها الى الخضار الزرني
يعملها ازغب ابيض . اوراقها ستانية الشكل ، مدية بطول
تطول نحو ١٢ سم . وتعرض ٣ . نصلها منشاري الحافة ،
خلي البشرة التي تبدو فراءه اللون . حراشف شبارتها صفر .
اسديتها ثنائية || زراعتها شائعة ، يرطب في المواقع الرطبة
اشغاهها طرية وصناعية . لحاء سوقه ولزومه دباغة .

١٦٣١٣ - صَفَافَات اَرْجَوَانِي * Salix purpurea (S).

Sauce pourpre, Osier rouge (F).
شجرة صغيرة القد ، تملو من مترين الى خمسة امتار .
فروصها جزئية اللحاء . اوراقها ستانية تطول نحو ١١ سم .
وتعرض ١٥ م . نصلها مائل الصفحة العليا ازغب السفلى ،
مسن حافة الزام الابخر . حراشف شبارتها قلبية ازغب .
اسديتها انفراديا لوردية ، مآبرها اربوبانية || يزرع لقرنين .

١٦٣١٤ - صَفَافَات اَرْمَد * Salix cinerea (S).

Sauce cendré, S. gris (F).
شجرة صغيرة القد ، سريرية ، جميلة الشكل . تملو من ٨
الى ٦ امتار . شكير ساتها اجوف التخديد السويدي .
اوراقها تطول من ٥ الى ١٥ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ .
نصلها خلي الصفحة ، مدية المعتقة المنعرجة . حراشف
شبارتها قلبية ازغب الازرق اللون || يكثر في الاقاليم
المحتلة قرب مجاري الماء .

١٦٣١٥ - صَفَافَات اَسْوَد Salix nigra (S).

Sauce noir (F).
شجرة كبيرة لينة داخلة تملو من ٢٥ الى ٣٥ م . اوراقها
معتقة ، اعليجية ، ضيقة ، تطول من ٨ الى ١٥ سم .
وتعرض من ١٥ الى ١٦ م . نصلها مائل البشرة ، خلي
العروق ، حلق الخضار القاتم . حراشف شبارتها سود .
اسديتها ورتبية التجميع ثلاثية او خلية او صناعية .
اقلها مرط . ثمارها غليظة القشور ، مستطيلة الاذن .
يرطب في المواقع الرطبة وفي الاراضي العميقة النور .

١٦٣١٦ - صَفَافَات السككين * Salix viminalis (S).

Sauce viminal, Osier vert, S. des
vanniers (F). Basket willow, Osier willow (E). Kob-
weide (D). Salice verice, Vingo, Scrops (I).
شجرة متوسطة القد ، تملو من ٤ الى ١٥ امتار . ساتها
فراءه ، عديدة القصبان اللينة المستطيلة . اوراقها ستانية
ضيقة ، نصلها يطول نحو ١٢ سم . وتعرض ١٢ م .
صفحة السفلى فضية الخمل . حراشف شبارتها سود

١٦٣٣١ - صَفَافٌ طَوِيلُ الذَّكَبِ *

Orthotomus longicauda (S). Orthotome à longue queue, Fauvette couturière (F).

طائر من الصفاف . أطناه تمتد من مالبزيه الى الحد وإيران والترك || ثوبه جميل الألوان الزاهية . ظهره الى الخضار الزرقى اللامع . عنقه بيضيه ويطغى الى البياض الأخضر الموشى بالأصفر . عزالان ذنبه مستطيلان || قوته الحشرات الخنثى والديدان والنمل . يألف الحدائق والقباض والمتاع وضفاف مجاري الماء || الأناث تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٢ يوما .

١٦٣٣٢ - صَفَافَةٌ * ، سَيْسَك

Saccotomus (S). Saccotome (F).

جنس حيوانات قاحصة جملة من القواريات . أنواعه ٤ موطنها البلاد الإفريقية . جميعها ربة الجفء ، صغيرة القد . الثوب الى السرة تسود مع اقترابها من الظهر والرأس وتبيض عند البطن . قوتهاها قصيرة . انفاها ذرية . رؤوسها غروبية . أذنانها كبيرة مستديرة . أذنانها دقيقة . قصيرة . كاسية || قوتها الجذور وجمع المواد الصبوية والحشرات . تألف الادغال الكثيفة وضفاف الأنهار والمروج المرتفعة والاراضي المساحة . مجارها انفاق مستطيلة تتخللها رداء قسيمة .

Menoque (F).

Hand, Plug (E).

الصفة من اوراق التبغ الجافة المروسة ، مبسطة كانت او غير مبسطة .

Lethrinus (S).

Léhrin (F). Lethrinus (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وتصلبسة الاسبوريات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض بحار البلاد الحارة || اعرف انواعه واشهرها الصنف المأكول وصنفه الاطلسي .

١٦٣٣٥ - صَفِيدٌ مَأْكُولٌ *

Lethrinus esculentus (S). Léhrin mangeable (F). Esculent lethrinus (E).

نوع من الصنف ، سمكة بحرية بيوض . أطناه تمتد من البحر الأحمر الى المحيط الهندي ، جسمه اعليجي الشكل ، عضود المذخر ، متدل التلطيط ، يطول من ١٦ الى ١٨ سم . رأسه كبير الجرم ، غروبي الشكل . شدة مستدل الانفراج . صباه متقاربتان ناشرتان . زعنفته الظهرية مستطيلة ، شائكة القسم الامامي . اما الشرسية فتلالية المنحاض الغربية . والذيلية فارة . ثوبه الى الخضار الغشي الموج . رأسه أصفر . زعانفه حر . وتعلو بقية جروية في أواسط الايمل من الجانبين || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه .

١٦٣٣٦ - صَفَقٌ ، تَصْفِيقٌ ، إِصْفَاق

Décantage, Décantation, Soutirage (F). Decantation Drawing off (E).

نقل الخمر وسائر السوائل من آنية الى اخرى لفصلها عن رواسبها .

Marché (F). Market (E).

١٦٣٣٧ - صَفَقَةٌ

إتفاق يتخذ على تسليم بضاعة .

١٦٣٣٨ - صَفَافٌ سَمَكٌ * ، صَفَافٌ رُومِيٌّ ، شَعَرُ الْبَيْتِ ، أَمُ الشُّعُورِ

Salix babylonica (S). Saule pleureur, S. de Babylone (F). Weeping willow, Mourning willow (E). Trauer weide, Babylonische Weide (D). Salice piangente, Salice di Babilonia (I).

شجرة مستوية الكبر ، تملو نحو عشرة امتار فرونها منبسطة . قضبانها وانفاتها دقيقة متعديلة . اوراقها سنانية ، ضيقة ، قصيرة المتق ، نصلها يطول نحو ١٧ سم . ويعرض ٢٥ سم . وهو مائل الصفة العليا ازغب السفل وزنبه اطول اللين . حراشف ضاربة خضلة . اسديتها ثنائية . زراثة شائعة ، يرغب في المواعظ الكثيرة للماء ، قضبانها صناعية ، خشبه متوسط اللينة .

Salix fluviatilis (S).

Saule fluvial (F).

شجرة سرورية ، تملو من ١٥٠ الى ٤٠٠ سم . فرونها منفرجة الزوايا . قضبانها شبه منبسطة . اوراقها ضيقة تطول من ٦ الى ١٠ سم . وتعرض من ٥ الى ١٠ سم . نصلها مشاري الحافة ، حلي البشرة على صفحتيه . حراشف شاربها وريدي اللون . اسديتها ثنائية . اقلها خلية ، ثمارها زنبية للشعور || يمشى على مجاري الماء وفي الحصباء وبين الصخور .

Salix elegantissima (S).

Saule pleureur du Japon, S. élégant (F).

شجرة متوسطة القد ، تملو نحو عشرة امتار . اغصانها انفية الانتشاج . قضبانها وانفاتها متعديلة ، زباه اللما . اوراقها ضيقة تطول نحو ١٥ سم . وتعرض ٢ سم . نصلها بارز الحروق المهدي . حراشف شاربها مستطيلة ، وريدي اللون . اسديتها ثنائية . ثمارها خلية للشعور ، قصيرة الامن . يزرع للزئين ، يرغب في الارربة الرطبة المتوسطة الانتماج .

Salicylate (S).

اسد املاح الحامض الصفصافي أي اخلتني .

Salicaceae (S). Salicées (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلتين حاملة الثملات تشمل الصفاف والوجور .

tsé (F).

١٦٣٣٨ - صَفَافِيَّةٌ

هي الاية نبات من اقلبيات ، اطليا .

Salicine (F).

Salicin (E).

غلوكوزيد يستخلص من شعور واوراق الصفاف والوجور وهو مقو نافع ويمتثل في معالجة داء المفاصل .

١٦٣٣٩ - صَفَصَفٌ *

Orthotomus (S).

Orthotome (F). Orthotomus (E).

جنس طير من فصيلة السليقيات وريبة الجواثم . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من طيور البلاد الاسيرية || تتميز بالزوايا الزاهية وبطريقة صنع اعشائها الجارية الشكل المولفة من روتين تجسمها وتبعكها يحيط من القطن او التيل الناعم تحده وتقتله قبل الاستعمال بمقارها الذي يتقدم مقام المفرك والايه واليه || اعرف انواعه واشهرها الصفصاف الطويل الذنب .



صفاف سمك



صفاف طويل الذنب



صفافة



صفاف مأكول

١٦٣٤٨ - صَفَرِيَّاتُ الْقُرُونِ

Lamellifornes (F). Lamellifornes (E).

نمت تقريباً على الخنافس لقضية الجليات
وذلك لأن قرونها الاستثنائية الزرقية الشكل تفتح
وتنطبق كصفحات الكتاب.

١٦٣٤٩ - صَفَرِيَّاتُ الْمَتَافِرِ

Lamellirostres (F). صَفَرِيَّاتُ الْمَتَافِرِ
نبية طير من كفيات السقدم تتميز بمناقيدها المطبقة
الصفيحية الشكل، من فصائلها البطيئات والوزيات
والنعلميات، الخ.

Glatissement (F).

١٦٣٥٠ - صَفِير

صوت السر.

١٦٣٥١ - صَفِيرٌ

هو المدن جنبه من البليات، اطلبه.

١٦٣٥٢ - صَفِيرَاك

Sophora (S). Sophora (F). Sophora (E). Sophora (D). Sofora (I).
جنس نباتات مسمرة برية زرقية من فصيلة
القرنيات القرشانية. أنواعها عديدة منها الانجار والشجيرات
والجنيات والاصطاب. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها
متفرقة التجميع يكثر لها اللون الاسفر، وهي مثمرة
تجربها التحل || الشجر انواعها ما پنج.

١٦٣٥٣ - صَفِيرَاكُ الْكُنْكِكِ

Sophora secundiflora (S). Sophora du Mexique (F).
شجرة متوسطة الحجم، تملو نحو ١١ م. ساقها سرسة.
اوراقها ابيدة. وريقاتها تد من ٧ الى ٩، لصلها ملس
البشرة جيل الخضار، حنايقها الزهرية ابطية وصانية
الارتكاز، ازهارها نفسجية اللون، فواحة العرف.
ازهارها يستمر طول الصيف.

١٦٣٥٤ - صَفِيرَاكُ الْيَابَانِ

Sophora japonica (S). Sophora du Japon (F). Japanese
pagoda tree, Sophora japonica (E). Japanese So-
phore (D). Sofora del Giappone (I).

شجرة سروية كبيرة القد، تملو من ١٥ الى ٢٠ م.
فروعها المشهورة اريسة. ساقها سرسة. اوراقها عابلة
تطلو نحو ٢٥ سم. وهي مؤلفة من نحو ١٥ وريقة لصلها
باحث الخضار. حنايقها الزهرية محورية الارتكاز،
هرمية الشكل تطلو من ٢٠ الى ٢٥ سم. ازهارها خافتة
العرف المستحب لونها الى الصفرة البيضاء المراج. ثمارها
قرنية يستخرج منها غصاف اسفر اللون كبير الثقلان
يستعمل في صباغ ثياب ملوك القس || اعشاب صناعية
ناعمة الرقة جيدة الصفت || ازهارها يستمر من تموز
الى آب.

١٦٣٥٥ - صَفِيرَاكُ امْرِيكِيَّة

Sophora affinis (S). Sophora d'Amérique (F).
شجرة تملو نحو ١٢ متر. ساقها سرسة. اوراقها عابلة
كبيرة مركبة من نحو ١٧ وريقة لصلها ملس البشرة
جيل الخضار. حنايقها الزهرية ابطية الارتكاز. ازهارها
الى النياض المبيض بالودي || ازهارها يستمر طول
الصيف.

١٦٣٥٦ - صَفِيرَاكُ يَبِيَّةُ الزَّرَقِ

Sophora viciifolia (S). Sophora à feuilles de vesce (F).
شجرة سروية مسمرة، تملو من ٢ الى ٣ متر. ساقها
شاككة. اوراقها عابلة صغيرة. وريقاتها مستطقة يراوح



صفيرة



صفراء اليابان

١٦٣٣٨ - صَفَن

Gaspier (F). Wasp's nest (E).

مبادة الزناير. بيت تنضد الزناير ونحوها لما ولقراها.

١٦٣٣٩ - صَفَن

Bourse, Scrotum (F). Scrotum (E).

الجراب الجدي الذي يلف الخصيتان الظاهرتان عند
الحيوان.

١٦٣٤٠ - صَفْرُوكَة ٥، زُؤِيَّت ٥

Zonitis immaculata (S). Zonitis immaculata (F).

Zonitis immaculata (E).

حشرة طيبة واثمة غاصلة وانجة من فصيلة اللوزيات وزيئة
مفصلات الاجنحة. موطنها الاقاليم المعتدلة الحارة من
الشرق الاوسط الى اوروبا. غشائها تعيش على بتلات
الازهار ونباتات الثبات وهي تفرز منه لسها مادة صفراء
اللون كريهة الرائحة ونحوي في شوارها وفي جهازها السوي
مادة ناعقة تهيج بشرة الجلد وتثير الباء. يرقاتها مقمرة ||
جسمها متوسط القد يطلو من ١٢ الى ١٥ م. قروها الى
الصفار الكائن، رأسها وبراميزها سود. حنايقها كيرثان
بارتزان. زناناها حيطان مستطيلان. ظواهرها ستالي
الارطاف القارضة اللاحقة || لها جيل واحد في الحول.
تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتميش حتى اواخر تموز.
تسرح في التبار. تساهل في حزيوان وتتمتع الممكن في كل
مكان يكون له الخفاء || البقعة عند بلوغها الادراك الثام
تطول نحو ٢٢ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، عاجي
الصفرة الداكنة، اسفر الحواشي الزهرية، اغبر اللب،
سداسي الترواج، بني الرأس. قليل الحب المجرى على
الجانين || طور الكمال الذي يستمر نحو ٤٥ يوما
ينقضي في التربة.

١٦٣٤١ - صَفِير

نمت يطلق على كل حيوان اعلى صريح السلالة الصافية
المتنبية. راجع صريح.

١٦٣٤٢ - صَفِيرَة

في الصل، اطلبه.

١٦٣٤٣ - صَفِيرِي

Lamelliforme (F).

Lamelliform (E).

ما كان كالصفحية شكلا.

١٦٣٤٤ - صَفِيرِيَّاتُ الْأَحْتَاكِ

Mysticetans (F).

مرئية حيوانات بحرية ليونة. راجع وريقات الاحثاك.

١٦٣٤٥ - صَفِيرِيَّاتُ الْأَرْجُلِ

Pélicypodes (F).

صف حيوانات من الرضويات يعرف أيضاً بصفيقيات
الخياشيم وبلوات الصمرايين.

١٦٣٤٦ - صَفِيرِيَّاتُ الْجُلُودِ

Placodermes (F).

Placodermata (E).

مرئية من الاسماك المتحجرة ظهرت في اواخر الحقبة
السلوردية وانقرضت في الكربونية. تميزت بجياكلها
الفقرية المادة الملوقة بصفتان عظمية التركيب.

١٦٣٤٧ - صَفِيرِيَّاتُ الْخَيْطَانِ

Lamellibranches (F). Lamellibranchiata (E).

صف حيوانات من الرضويات يسمونها ايضاً ذات الصمرايين
أو الصدفين (Bivalves).

مُسَوِّبَةُ الْقَوَامِ، سَرِيَّةُ الطَّيْرَانِ، حَادَةُ الْمَزَاجِ وَقُوَّةُ الشَّكِيمَةِ.
تَمْرُفُهَا : الصُّفْرُ وَصَفْرُ السَّجَمِ وَصَفْرُ الْمَرْجِ وَصَفْرُ
الْمُتَدِّ وَالحُرِّ والسُّودِّ والشَّاهِنِ والْبَرْقِ || أَمَا كَيْتُهُ فَأَبْرُ
شُجَاعٍ وَأَبْرُ الْأَصْبَحِ وَأَبْرُ الْحَمْرَاءِ وَأَبْرُ عَمْرٍ وَأَبْرُ عَمْرَانٍ
وَأَبْرُ عَوَانٍ .

١٦٣٦٩ - صُفْرَاءٌ * أَجْدُكُ وَجَدُكُ ، قُضَامِي
Falco sacer (S). Faucon sacre, Sacre (F).

طَائِرٌ مِنَ الْفَالْكَاسِ تَنْسَبُ إِلَيْهِ عِبَارَةُ الصُّقُورِ وَفَصِيلَةُ
الصُّقْرِاتِ . وَهُوَ أَجْفُفُ الْجَفَةِ ، حَسَنُ الشَّكْلِ ، مَجْدِلُ
الْبَدَنِ ، طَوِيلُ السُّقْلَيْنِ وَالذَّنْبِ ، عَارِي السَّاقَيْنِ ، حَادِ
الْمُخَالِبِ . مَسْرَعٌ قَصِيرُ الْقَدِّ ، أَصْفَقُ الْبَهْرَةِ ، مَسْنُوحُ الْخَطْمَيْنِ .
وَهُوَ أَحَدُ مِنَ الْبَايَزِيِّ وَأَقْنَعُ مِنْهُ وَأَبْرَدُ مَزَاجاً وَأَشَدُّ أَقْدَاماً
وَكَثْرُ الْفَقَّةِ || مَوْطُهُ الْبِلَادُ الْمُتَعَدَّةُ الْهَرَاةُ مِنْ آسِيَةِ
وَأَرْبُوعَةِ الشَّرْقِيَّةِ إِلَى بَايُورِ الْأَحْرَاجِ وَالنَّهَابَاتِ الْكَثِيمَةِ
وَالْجِبَالِ الْجُرَاءِ عَلَى السَّوَادِ . قُوَّةُ الطَّيْرِ مِنَ الْمَسْفُورِ إِلَى
الْبَطِّ . يَشُنُّ وَكَيْتُهُ فِي صَدُوحِ الصُّنُورِ النَّاتِيَةِ أَوْ فِي أَمَالِي
الْإِبْهَامِ الْبَاسِقَةِ . أَنَاءُ تَضَعُ مِنْ ٣ إِلَى ٤ زَفَاتٍ تَحْفَسُهَا
وَسَحَا نَحْوَ أَرْبَعَةِ أَصَابِعٍ .

١٦٣٧٠ - صُفْرَاءُ الْأَرْثَبِ هُوَ الْمَقَابِ السَّعَاءِ ، أَطْلَبُ .

١٦٣٧١ - صُفْرَاءُ الْبَطِّ هُوَ السُّودُّ ، أَطْلَبُ .

١٦٣٧٢ - صُفْرَاءُ الْجُرَادِ
هُوَ الْمَوْسِقُ ، طَائِرٌ مِنَ الصُّقْرِاتِ ، أَطْلَبُ .

١٦٣٧٣ - صُفْرَاءُ السَّجَمِ *
Falco orientalis (S). Faucon de Barbarie, Tartaret (F).

نَوْعٌ مِنَ الصُّقْرِ . أَطْلَانُهُ تَحْتَهُ مِنَ الْمِرْقَاتِ إِلَى التَّبِتِ .
هُوَ أَصْفَرُ قَدّاً مِنَ الشَّاهِنِ وَالْأَجْدَلِ لَكِنَّهُ أَشْرَسُ خَلْقاً
وَأَبْيَسُ مَزَاجاً وَأَشَدُّ بَطْشاً .

١٦٣٧٤ - صُفْرَاءُ الْفَرْكَلِ هُوَ الشَّرْقُ ، أَطْلَبُ .

١٦٣٧٥ - صُفْرَاءُ الْفَيْرُكَانِ هُوَ مَرْزَةُ الدَّجَاجِ ، أَطْلَبُ .

١٦٣٧٦ - صُفْرَاءُ الْمَرْجِ
Falco mexicanus (S). Faucon des prairies (F).

نَوْعٌ مِنَ الصُّقْرِ . أَطْلَانُهُ الْبِلَادُ الْأَمْرِيكِيَّةُ يَكْثُرُ فِي
الْمَكْسِيكِ . يَأْتِي الْمَنَاطِقَ الْبَادِيَّةَ بِمَبْدَأٍ مِنَ الشَّوْطِ
قُوَّةُ الصَّائِرِ وَالْقَوَاضِ وَالْحَشْرَاءِ .

١٦٣٧٧ - صُفْرَاءُ الْهَيْدِ *
Falco calidus (S). Faucon des Indes (F).

نَوْعٌ مِنَ الصُّقْرِ ، مَتَوَسِّطُ الْقَدِّ ، جَمِيلُ التَّوْشِيمِ الرَّزَامِيِّ ،
سَرِيعُ الْحَرَكَةِ وَالْإِنْفِصَافِ . مَوْطُهُ الْهَيْدُ وَهُوَ مِنْ
طَبَقَةِ الْهَيْدَةِ .

١٦٣٧٨ - صُفْرَاءُ يَازِ هُوَ الْبَايَزِيُّ ، أَطْلَبُ .

١٦٣٧٩ - صُفْرَاءُ جَرَّكَاحٍ هُوَ السَّقَاةُ ، أَطْلَبُ .

١٦٣٨٠ - صُفْرَاءُ حَوَامٍ هُوَ السَّقَاةُ الثَّالِثَةُ ، أَطْلَبُ .

١٦٣٨١ - صُفْرَاءُ كَبَّابٍ هُوَ الْجُرُودَةُ ، أَطْلَبُ .

١٦٣٨٢ - صُفْرَاءُ *
Cycchraque (S). Cycchraque (F).

جَنْسُ حَشْرَاتٍ وَاشِعَةٍ مِنْ مَحْدِيَّاتِ الْإِجْنَةِ وَفَصِيلَةُ

عَمَدَانِ مِنَ ١١ إِلَى ١٥ . لَصَلَهَا مَالِي الْبَشَرَةِ ، بَحْرِي
الْمَصْنَعَةِ الْمَعْلُومَةِ . حَتَائِقُهَا الزَّهْرِيَّةُ وَهَلَّةُ تَقَمُّ مِنْ ٦ إِلَى
١٢ . زَهْرَةُ لَوْنُهَا إِلَى الْبَيَاضِ الْمَوْشَحُ بِالْأَزْرَقِ || أَزْهَارُهَا
يَسْتَمِرُّ طَوَالَ شَهْرِ حَزْرِيَّانٍ .

١٦٣٨٧ - صُفْرَاءُ مُدْعِيَّةٌ

Sophora chrysophylla (S). Sophora doré (F).

جَنْبَةٌ تَعْلُو مِنْ ٢٠٠ إِلَى ٣٠٠ سَم . سَاقُهَا طَوِيلَةُ الشَّوْطِ .
أَوْرَاقُهَا مُسْتَدِلَّةٌ ، وَرَقَاتُهَا خَيْبَةُ الْفَصْلِ ، خَلِيَّةُ الْبَهْرَةِ ،
يَحْدِثُهَا رَيَاحُ بَيْنَ ١٧ وَ ٢١ . حَتَائِقُهَا الزَّهْرِيَّةُ لَيْدَةً .
أَزْهَارُهَا إِلَى الصُّفْرِ الْمُحْمَرِّ الْمُنَاجِبَةِ || أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ
مِنْ أَيْارِ إِلَى حَزْرِيَّانٍ .

١٦٣٨٨ - صُفْرَاءُ الصَّغِيرِ هُوَ الزَّرْعُ الْمَفْرُكُ .

١٦٣٨٩ - صُفْرَاءُ الْجَلْدِ
Pachydermes (F). Pachydermatous (E).

١٦٣٩٠ - صُفْرَاءُ
Méricarpe (F). Méricarp (E).

كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَخْبَةِ الشَّجَرَةِ النَّافِثَةِ الَّتِي لَا تَنْفَلِقُ مِنْ
بُزْرِهَا .

١٦٣٩١ - صُفْرَاءُ هِيَ الْإِبِلُ نَوْعٌ مِنَ الْعَمْرِ ، أَطْلَبُ .

١٦٣٩٢ - صُفْرَاءُ
Scathare (F).

صَكَّةٌ بَحْرِيَّةٌ تَدْعَى سَقَطَارَ . أَطْلَبُ .

١٦٣٩٣ - صُفْرَاءُ *
Egrisé, Egrisé (F). Bort, Diamond-powder (E).

الصُّفْرَاءُ مَسْحُوقُ نَازِمٍ مِنَ الْمَاسِ يَسْتَعْمَلُ فِي صُقْلِ الْحِجَارَةِ
الْكُرِيمَةِ وَبَنَاءِ الْمَاسِ .

١٦٣٩٤ - صُفْرَاءُ
Cri des oiseaux (F). Cry of the birds (E).

١٦٣٩٥ - صُفْرَاءُ مُدْعِيَّةٌ *
Cicadula (S). Cicadula (F).

جَنْسُ حَشْرَاتٍ صَغِيرَةٍ الْقَدِّ مِنْ فَصِيلَةِ الرُّزْدِيَّاتِ . أَنْوَعُهَا
عَدِيدَةٌ . أَطْلَانُهَا الْعَالَمُ . مَرْمَتُهَا الصَّفْرَاءُ وَالْمَرَارَةُ وَيَسْطَلُّ
الْبَهَائَاتِ الْمُتَغَيَّةِ وَالْمَائِيَّةِ . أَجْسَامُهَا أَلْوَانِيَّةُ الشَّكْلِ تَطْلُو
مِنْ ٣ إِلَى ٦ سَم . أَتَابِيهَا مُتَخَلِّفَةُ الْأَلْوَانِ حَادَةُ الزَّرْكَةِ
مِنْهَا الْأَصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ وَالْخَضِي وَالْبَنَاقِي ، الْخ .

١٦٣٩٦ - صُفْرَاءُ
Sucré (F). Sugared (E).

١٦٣٩٧ - صُفْرَاءُ
Substance sucrée (F). Sugary substance (E).

جُ سَقَطَارُ . كُلُّ مَادَّةٍ سَكْرِيَّةٍ .

١٦٣٩٨ - صُفْرَاءُ
Faucon (F). Falcon, Hawk (E).

الصُّقْرُ يَجْمَعُ مَقُورٌ وَصَفْرٌ وَصَفْرَاءُ وَالْأَفْئِ صَقْرٌ .
وَالصُّقْرُ بِالْأَرْفِ الْعَادِي كُلُّ طَائِرٍ يَصِيدُ مَا خِلَا الْعُقَابِ
وَالنَّسْرِ . فَالصُّقْرُ يَشْدُلُ الْبَايَزِي وَالشَّاهِنِ وَالْبَرْقِ وَالْحُرِّ
وَالْبَاقِ وَالْبَيْقِ وَالسَّقَاةَ وَالزَّرْقَ وَالْبَرْقِ... وَالصُّقُورُ
عِنْدَ الْبُزْأَةِ فَتَنْتَازِعُ : الصُّقُورُ وَالْبَزَاءُ . فَالصُّقُورُ سَوْدُ
الْبَيْنِ عِدَّةُ الرُّؤُوسِ طَوَالَ الْإِجْنَةِ قَصَارُ الْأَرْبِلِ .
وَالْبَزَاءُ صَفْرُ الْبَيْنِ مَدْرَةُ الرُّؤُوسِ قَصَارُ الْإِجْنَةِ طَوَالَ
الْأَرْبِلِ || أَمَا الصُّقْرُ بِالْأَرْفِ الْعَالِي فَهُوَ جَنْسُ طَائِرٍ
مِنْ عِمَارَةِ الصُّقُورِ وَفَصِيلَةِ الصُّقْرِاتِ . أَنْوَعُهَا ثَمَانِيَّةٌ
مَشْتَرَاةٌ فِي جَمِيعِ أَطْوَافِ الْعَالَمِ جَمِيعُهَا حَسَنُ الشَّكْلِ وَالْمَعْتَامُ ،



صَقْلَةٌ



صَقْرٌ



صَقْرُ الْمَحْمَدِ



صَقْرُ الْهَيْدِ

١٦٣٨٧ - صَفَلَاب سُورِي * صَيَكْرُورَا، صَيَكْرُورَا

الحوري

Asclepias syriaca, *A. cornuti* (S). *Asclépiade* de Syrie, *A. à ouate* (F). Silk cotton, Wild cotton (E). *Echte Soelenpflanze* (D). *Asclepiade di Siria*, *Falso cotone* (I).

جنتة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اورثاتها مقابلة او رمية التجميع. نصلها احليجي الشكل بطول من ١٠ الى ٢٢ سم. ويبرس من ٥ الى ١٢. ازهارها الى الصفرة الغبراء الزاهية يملوها مزاج احمر. ثمارها كمار احليجية الشكل، مدرة البشرة، فسقية اللون، وتلبها حوري، ابيض. يزورها صغرة مستطيلة مفلطحة سوداء اللون.

١٦٣٨٨ - صَفَلَاب عُسُوفِي * حَسْبِيَشَة ذَات الْجَنْبِ

Asclepias tuberosa (S). *Asclepias tuberosa* (F). Butterfly weed, Tuber root (E). *Echtes medarplanze* (D). *Asclepiade tuberosa* (I).

بجلة عمرة تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. اورثتها صفيولية. ساقها زباد اللحاء عادمة المصاراة البنية. اورثاتها لاطئة، احليجية، مستطيلة. ازهارها حامية، توجهاها برتقالية، لثاتها صفراء. ازهارها يستمر من عرذ الى ايلول. يستخرج من صقلتها مادة جهرية فعالة تستعمل في الطب. ويقال ان اورثاتها وازهارها تعيد المصاب بذهات الجنب.

١٦٣٨٩ - صَفَلَاب عُسُوفِي *Asclepiade officinale*

هو الغلقة من النباتات الطبية، اعطياها.

١٦٣٩٠ - صَفَلَاب عُدَقِي * زَهْرَة الدَّم

Asclepias curassavica (S). *Asclépiade de Curaçao*, *Ipecia sauvage*, *Herbá sang* (F). Blood flower, Wild Ipecacuanha (E). *Bastard Ipecacuanha* (D). *Ipecacuanha des Antilles* (I).

بجلة عمرة تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اورثاتها سنانية النصل تطلو من ٥ الى ١٠ سم. وتبرس من ٢ الى ٤. ازهارها صوانية التجميع، حامية الارنكاز، وردية اللون او حمراء. ازهارها يستمر من سبتمبر الى تشرين.

١٦٣٩١ - صَفَلَابِيَّات *Asclepiadaceae* (S).

Asclepiadaceae (F). *Asclepiadaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل الصقلاب والمخ والعش والشقفة والشتراسخ والمندب الخ.

١٦٣٩٢ - صَفَلَاب * *Cyclops* (S).

Cyclope (F). *Cyclops* (E). جنس ذوات مائة من القشريات الدنيا مجذائيات الاجل فصيلة الصقلويات. انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق ودعان البلاد الباردة والمعتدلة. الحرارة اجسامها سكية التركيب تطلو من ٤ الى ٧ سم. رؤوسها ملتصقة بالحلقة الصدرية الاولى. حورثها متعاطفة فيظها الناطر اليها حينا واحدة. بطورها جرابية الشكل. قوائمها ثنائية للمادف باستثناء الزوجين الاول والسادس. الانثى تراوح من الفترة القضيية الى الشيخة والطلعة البحرية للمخ.

١٦٣٩٣ - صَفَلَابِيَّات * *Cyclopidae* (S).

Cyclopidae (F). *Cyclopidae* (E). فصيلة ذوات مائة من القشريات الدنيا مجذائيات الاجل.

الوصفحات. انواعه المعروفة ستة اعطياها البلاد الباردة. تألف الحراج. قوتها الزمار اولاً ثم القصور. اجسامها صنية القد، شبه ييشة الشكل، زباد انتشار ديبية الزباني. اولها سوية الالوان الزاهية يملوها في كراسلها زوج او زوجان من النقط السود.

١٦٣٨٩ - صَفَرِيَّات *Falconidae* (S).

Falconidae (F). *Falconidae* (E).

فصيلة طير من قسم الصقور تقتني الى فئة كواسر النار وردية الحراج. تقلل عمارات وزهاد ٢٠٠ جنس ونوع. تتميز باجسامها الربية المسنونة التجانس الشكل. رؤوسها متوسطة الحجم كاسية الريش. حورثها نائضة، شهلة، مخبرية داخل اورثاتها الباردة الحليج. امتها قصيرة. سواقلها كبيرة وارة. مناسرها قصيرة تتميز بمخاطبها الطولية المسننة الاطراف. جهارها شديدة الانحناء، حادة المحاجن. امثالها متوسطة الطول تغلب فيها الكرولة ومثاها حارية. مخالبها درية قوية متضبية. انثاها في معظم الاجناس اكبر قدا من ذكرها. تقتنص الصيد وتقتله حرك مخالبها. تعيش ازواجا او افراد لا يجمعها سوى فطرة الانضمام الى الرجس في الانواع القواطع. وهي تشمل، برون ريب، اجسر الطيور وانها خلفا واقولها سكية واصليها عودا. اما عماراتها الست فهي: العقبان والحاد والمقور والبراة والسقاوات والمزريات.

١٦٣٨٤ - صَفَلَاب * *Scatopse* (S).

Scatopse (F). *Scatopse* (E).

جنس حشرات من فصيلة الصقلويات وردية ذوات الجنان. انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم. اجسامها صنية تطلو من ٢ الى ٥ سم. رؤوسها صغرة مزواوية الشكل. حورثها فارقة عند الشقين. مرافها قصيرة. ملابسها رسيمة الغلقة. قوتها الاستعمارية تحية قصيرة. كراسلها احليجية يملوها حل قصير. بطورها متضفية للزعر. مستطيلة الطرف المستدير. رؤوسها كبيرة، قسطانية التخفيف. قوائمها مستطيلة، عادمة الحلب والمناس. ملجئها الحجابي كرسعي. تألف الاماكن الرية. يكثر وجودها على الاحشاب والازهار. اساريها نائلة او دامتة.

١٦٣٨٥ - صَفَلَابِيَّات * *Scatopsidae* (S).

Scatopsidae (F). *Scatopsidae* (E).

فصيلة حشرات من رية ذوات الجنان. اجسامها وازهارها او نائلة. تألف النباتات والحراج والحدائق والمزاريق اربعة الى نائلة. تطلو من ١ الى ٩ سم. رؤوسها مفلطحة. حورثها كغوية الشكل. مرافها وملاسها صغرة. قوتها الاستعمارية تحية قصيرة. كراسلها احليجية. بطورها شبه مدنية الشكل. وراثها قسطانية التخفيف. قوائمها مستطيلة. يرقاتها دامتة او نائلة. اشهر اجناسها الصقلوب.

١٦٣٨٦ - صَفَلَاب * *Asclepias* (S).

Asclépiade (F). فصيلة الصقلويات. جنس نباتات برية وتريية من فصيلة الصقلويات. انواعه عديدة. جميعها جنات ومجلات واعقاب متعاطفة الاوراق الكاملة. ازهارها طبقية التجميع ابيطة او حامية الارنكاز. يزورها مفلقة زغب نام اثنية قصيرها شبه الحبر. اشهر انواعه ما يتبع.



صقلاب سوري



صقلاب عسولي



صقلاب ملس



صقلوب

١٦٤٠١ - صِلَاكَة (F). Dérictipole, Dérictiphe (F).
Dérictiphegus (E).

صفة الحشرة التي تعيش على النفايات العضوية من أي مصدر كانت .

١٦٤٠٢ - صِلَاكَة ، نَجْمَا ، كَوْبِرَا (S). Naja (S).
Naja, Cobra (F). Cobra (E).

جنس حيات خبيثة من أفاعيل الأفاعيد . أنواعه المعروفة عشرة ، سبعة منها أفريقية للمهد وثلاثة آسيوية ، أولها إلى الشقيقة يطولها تخميط أسمر ويقدح أصفر . أجسامها حادة الشكل طولها يختلف مع النوع وهو يراوح ما بين ٨٠ و ٤٥٠ سم . تتميز بأعناقها المبطلة المستعرة التي تنتفخ عند اليفض || جميعها سامة لدغتها بحيث لا تنفع فيها الرقية لأنها سريعة الطب والتفشي || أشهر أنواعها ما يتبع .

١٦٤٠٣ - صِلَاكَة أَسْوَدَ الثَّوْبُ ، رَحْمَة (F). Naja nigricollis (S). Naja à cou noir (F).

نوع من الصل يكثر في بعض مناطق أفريقية الشرقية اغصها أبيضاً والصيول . ثوبه إلى الشقيقة المبطلة بالأصفر والأسمر . عنقه أسود ، رأسه أخضر أسمر . لسته ميتة .

١٦٤٠٤ - صِلَاكَة الصَّحْرَا (S). Naja melanoleuca (S).
Naja du désert (F).

نوع من الصل موطنه الصحراء الكبرى وأفريقية الاستوائية . ثوبه إلى الصبغة المبطلة بتجديده أصفر . لسته قتالة .

١٦٤٠٥ - صِلَاكَة الثَّوْبَة (S). Naja flava (S).
Naja du Nubie (F).

نوع من الصل يكثر في لنوبة والسودان ثوبه إلى الصبغة النابية يطولها تجديده أسمر . لسته ميتة .

١٦٤٠٦ - صِلَاكَة مَصْرِي * ، لَاشِر (S). Naja hall (S).
Haje, Asp d'Egypte, Serpent à collier (F). Egyptian cobra, E. asp. (E).

نوع من الصل يكثر في البلاد المصرية . لسته ميتة . وقد أجمع المحققون على أن هذا النوع من الصل هو الحية التي كان يقسمها قضاة المصريين وهو الحية التي اختارها كليوباترة للقضاء على حياتها .

١٦٤٠٧ - صِلَاكَة هِنْدِي * ، لَاشِرَان (S). Naja tripudians (S). Naja à lunettes, Serpent à lunettes, Cobra indien (F). Indian cobra (E).

نوع من الصل يكثر في الهند . لسته قتالة . يقال إن محل ضحايا الحيتية السوداء ، مع الصل الحئي ، لا يقل عن ٢٥٠٠٠ لسته مقلعاً من الأوباد والساد .

١٦٤٠٨ - صِلَاكَة هِنْدِي ، صِلَاكَة الغاب ، صِلَاكَة قَارَمِي (S). Naja bungarus, N. hannah, N. morgani (S). Naja du Perse (F). Persian cobra (E).

نوع من الصل موطنه يمتد من الهند إلى بلاد فارس ، يألف المناطق الحارة الرطبة . يطول نحو ٤٥٠ سم . قوته الانامي والطاعة والصفاد . ثوبه إلى الشقيقة للنسبة بالأسمر يطولها بعض التفرخ الصفر . سمه شديد التفاعلية سريعها . لسته تقضي على الثور بنظر ثلاث دقائق .

١٦٤٠٩ - صِلَاكَة (F). Dureté (F). Hardness (E).

خاصية مقاومة الصخر للفتش .

اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في مياه البلاد الباردة والمعتدلة الحارة || اجناسها شديدة الصفر ، سكية التركيب . الزوج الانامي من قوائم الذكور ، عند جميع الأنواع ، بيضي || الثورن ، أعاذ || أصراف اجناسها وأشهرها الصلوقب .

١٦٣٩٤ - صِلَاكَة (F). Cincloides (S). Cincloide (F).

جنس طير من الجوامي ريقات المناظر وفصيلة الطيوريات . أنواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اقطار أمريكا الجنوبية || اجناسها رفيعة تطول من ٢٠ إلى ٢٤ سم . مناقبها مسطبة دقيقة ، أذنابها مستديرة الاطراف . أولها متباينة الألوان ، جميعها مكحلة اللون ، شبه مطوقة الاعتاق ، مرقوشة الصلور || قوتها الحشرات والديدان والتسل .

١٦٣٩٥ - صِلَاكَة (F). Falconiens, Faucons (F).
Falcors (E).

عمارة طير من فصيلة الصقريات تشمل سبعة اجناس : الصقر والسفر والكنج والساسوق والزلزل والكم واليوسي . أما أنواعها فكثيرة البند جميعها ربة الجئة المتصلة اللد . اعناقها قصيرة . سواتلها كبيرة مسطبة ذلقة . مناسرها قوية مسنة المخاطم ، جاريها شديدة الانكفات . ارباسها متوسطة الطول ، غالبها حارة ذرية . مهدا الماء تجو به أو تلد في بعض اصنافه . حي من أنظر طير الصقريات ، تلعب بسرعة فائقة تحلق في الأجواء الرقيقة وتقتص كالهم . تصيد مع الصباح ويصد الغروب . قوتها الطير والطيوريات وصار الحيوانات التي تنسكن منها .

١٦٣٩٦ - صِلَاكَة (S). Sacculine (S).
Sacculine (E).

جنس دويبات بحرية من الثقريات الدنبا جلموويات الرروس || أنواعه المعروفة قليلة العدد تنطفل على السرطان ويغره من الثقريات .

١٦٣٩٧ - صِلَاكَة (F). Massue (F). Club (E).

لست رمسي يطلق على ما كان شكله كالصق .

١٦٣٩٨ - صِلَاكَة (F). Froidure (F). Coldness (E).

هو البرد البسي الذي يهبه خاصة صرد الهواء .

١٦٣٩٩ - صِلَاكَة (S). Paracaryum (S).
Paracarye (F).

جنس نباتات عشبية معمرة زياه من فصيلة الحمصيات . أنواعه المعروفة قليلة العدد اصطلها تحت من الشرق الأوسط إلى الهند || سواها كيفية الخمل والزيب تطول من ٣٠ إلى ٧٠ سم . أولها الجذرية قليلة الشكل ، سنانها الاطراف . أولها الجلمية يفضي الشورن . ازهارها متباين الاشكال منه المتقوي والمتكوي . ازهارها عديدة الألوان يكثر فيها الاحمر والأزرق || أصراف انواعها وأشهرها الصفيفة المستعوية المتقوية الازهار الزرقاء اللون والصفيفة الكثيرة الشكلية الازهار الابوابية || تنوعها صيفي يستمر من حزيران إلى تموز .

١٦٤٠٠ - صِلَاكَة (F). Liophyle (F).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات أوراقه سالبة التصل .



صِلَاكَة



صل مصري



صل هندي



صلص



صلب



صلبانية بحرية



صلبانية مرودية



صلبة



صلصل الحبة

١٦٤١٨ - صَلْبَانِيَّة مَرُودِيَّة * صَلْبِيَّة مَرُودِيَّة، حَبَّة صَلْبِيَّة مَرُودِيَّة، حَبَّة صَلْبِيَّة مَرُودِيَّة

Crucianella stylosa (S). Crucianella à long style, C. stylée, Croisette (F). Crosswort (E). Kreuzblatt, Kreuzkraut (D). Barbazelle, Pittimbrossa (I).

عشبة ممرقة تنمو بين الصخور تعلو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ساقها فرعاء خالية. أوراقها غنية بالتجمع، سنانية الشكل. غصنها مزلفة من ٨ أوراق متصالبة. أزهارها وريدية اللون ثوبية الرائحة || أزهارها يستمر من أيار إلى آب.

١٦٤١٩ - صَلْبِيَّة Sclérotique (F). Sclerotic (E).

هي يبيض العين.

١٦٤٢٠ - صَلَّة، حَصَل، حَصَلَة

Rapport, Relation (F). Connexion, Product, Relation (E).

تفصيل نسب ونتائج البيان للمعرض.

١٦٤٢١ - صَلْبَجَة *، لَبْجَة، شَرْكَة

Cocou (F). Cocoon (E).

فشاء واق يحكي البد حروري للمادة تتسبب بعض الأساريع كدودة القز ليبتها وتحولها إلى غادرة.

١٦٤٢٢ - صَلْبُفُود Corbicula (S).

Corbicula (F). Corbicula (E).

جنس حيوانات مائية من الرضويات فصليتها أحياءم والأرجل ومن فصيلة البيرينيات. أنواعه المعروفة نحو ١٠٠ بعضها نهري وبعض الآخر يألف الأبحار في جميع مناطق البلاد الحارة || أصله مشتق من البحر، شبيه قوقعة الشكل، مقمرة القنن، ثنائية الألوان، مشعشة بالأخضر أو البني. مخاطها ثنائية طبقة معتدلة الطول، تنميش مقمرة في الأسماك.

١٦٤٢٣ - صَلَصَل، طَلَص، طِين Argile (F).

Clay (E).

الصصلال الصرغ، صخر طيني مركب من سيليكات الألويسيوم، حييانه دقيقة متجانسة، يتميز بشفافية ووجهه عند البلال وبهناك وصلابة لفراته. وهو إذا كثرت لحيته في التراب صيره متدحجاً صلماً || يوجد في الطبيعة عموماً باكسيد الحديد وأكسيد المنغنيز وغيرها || يستخدم في صناعة الآواني الخزفية. ومنه الصصلال الكاري الخالي من المواد القلوية والجيرية يستعمل في تجصين الآبارن الكهروية لانه يتصلل الكثير من درجات الحرارة العالية.

١٦٤٢٤ - صَلَصَل أَبْيَض Calamita

نوع من الصصلال يتميز بيباض لونه وبقلة المواد الثرية التي يحويها وهو دقيق اللزجة المتكاسكة. يستخدم في صناعة الآنية الخزفية.

١٦٤٢٥ - صَلَصَلِي Argilux (F). Argillaceous (E).

من التراب ما حوى نسبة لكيفية من الصصلال.

١٦٤٢٦ - صَلَصَل الحَبَّة Phalacrocorax

abyssinica (S). Colombar d'Abyssinie (F).

طائر من الصللصل وفصيلة الحماميات. أنشاده تنطق بصلصة. طوله نحو ٣٣ سم. ظهره أخضر زيتوني، بطنه أصفر، رأسه ووجهه وصدره إلى الخلف الرمادي، جناحاه إلى السواد الأصفر الأظفار. أنثىه لمد الانتشابه والزأم الأول والثاني، ففي الثالث والرابع || موطنه الحافة

Colombar (F).

جنس طير من الحماميات. أنواعه أربعة تتميز بأجسامها الربة وبشكل طيرانها. ألوانها مختلفة الألوان الزاوية، يكثر فيها الأخضر الأسفح للمزاج || أشهر أنواعه صلصل الحبة، أطله.

١٦٤٢٦ - صَلَّة Eau trouble (F).

Amande (F). Karmel (E).

١٦٤٢٧ - صَلَّم هو لب التلة واللوزة.

١٦٤٢٨ - صَلَّم Sphaerium (F).

Sphaerium (E).

١٦٤٢٩ - صَلَّم جنس حيوانات مائية سرلولة من الرضويات فصليتها

الحوام والأرجل ومن فصيلة البيرينيات. أنواعه المعروفة نحو ٩٠ أصلها من أبحار وبحيرات وأغوار المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة || أصنافها ثنائية الأحياءم والأشكال يكثر فيها الإلهيلي الثاني القنن. جميعها متصولة المضاريم. مخاطها ثنائية، طبقة، صلبة أو معتدلة الطول || تعيش متنميشة في الأسماك. لونها كاتعة الصف.

١٦٤٣٠ - صَلْب Chapcia (S).

Chaptia (F). Chaptia (E).

جنس طير من الحوام ثنيات المنقير وفصيلة الكرورييات أنواعه المعروفة ثلاثة موطنا بعض مناطق الهند وفرموة || مسرعا الغابات، ملجأها الحياتي زويي. قويا الحشرات والديدان || أجسامها تفلو من ٣٠ إلى ٣٢ سم. ألوانها إلى السواد الأسفح النقي المزاج أو إلى السواد المشوب بالأخضر. رؤوسها عادمة القنن، خفيفة السبال. أذنانها مستطيلة غائرة || تدن أصنافها في الأشجار الورقة الطل، الأنثى تحضن وضعها من ٣ إلى ٤ بيضات بينا الذكر يؤن لها الغذاء والحماية || أشهر أنواعه الصلص الأسفح الذي يكثر وجوده في الهند (Chaptia aenea).

١٦٤٣١ - صَلْبَان Saupa (F).

سكة بحرية تسمى بقة غشيمة، أطله.

١٦٤٣٢ - صَلْبِيَّة، صَلْبِيَّة، حَبَّة صَلْبِيَّة

Crucianella (S). Crucianella (F).

الصلبي جنس نباتات عشبية ليفية برية من فصيلة الفويات. أنواعه المعروفة ٣٦ منها حوض البحر المتوسط وأروبة الغربية. أوراقها غنية متصالبة. أزهارها حلقة التجمع، تويجها خالية الفصوص، وأصنافها تشبه النوم || يقال أن بعض أنواعه منافع صلبة جليلة، تقيد الأسماء وتنتقل الحغم || أعرف أنواعه ما يلي.

١٦٤٣٣ - صَلْبَانِيَّة بَحْرِيَّة * صَلْبِيَّة بَحْرِيَّة

Crucianella maritima (S). Crucianella maritima (F).

Senside crosswort (E). Färbewurz, Seeröte (D).

Robbie delle sabbie (I).

عشبة ممرقة تكثر بين الصخور قرب الشواطئ البحرية. ساقها فرعاء متضبة، رؤوسها مقبة الانتشابه، خالية السواد. ألوانها غنية الفصوص، وأصنافها تشبه النوم || يقال أن لها عثر المنلس، بحري اللون، أزهارها أرجوانية، ثوبية الرائحة || أزهارها يستمر من أيار إلى تموز.

بجدة البحر يقال انها تبصر البوصة على بعد مئة متر .
قوتها الذباب والبعوض والحمام والنمل النجس ومعظم الحشرات
الضئيلة . وتقيم وكثافتها في اوقاف الصخور الضئيلة .
وكثيرتها الرقيق الذي تفرزه لتلتصق بالصخر ويحمده بسرعة .
وكثافتها شبه حلاية الشكل . انماها تقع من يفتتن الى
ثلاث بضئات تحفها نحو اسبوعين لا اعرف انواعه
واشهرها الصلجان البيلو .

١٦٤٣٤ - صُلْجَانٌ صَبْدُولٌ *

Colocalla nidifica (S). Salangane commune (F).
Common salangane (E).

طائر من الصلجان . موطنه جزر الزانج وبعض مناطق
آسية الجنوبية . يألف الحورار والحياصم الثانية || جسمه
صغير القد اعين القوام ، يطول نحو ١٣ سم . يسته
نحو ٣٠ سم . توبه الى الطحلة يسمر في الرأس والظهر
وعين في الصدر والبطن والزعكي . جناحه وذنبه رقة رأسه
الى السمر السوداء . ذنبه فارق الطرف . عياده كيرتان .
سحقه عينه سوداء اللون . سباله معتدلة الكثافة والطول .
متقاربه شديد القصر . مستعرض الشداق ، اصطف البهرة
كما في الطيور الجارحة . ريشه قصيرة ، عارية ، حمراء
اللون || طيرانه فائق السرعة . قوته الحشرات الضئيلة
والذباب والبعوض والحمام || يقيم وكته في اوقاف الصخور
الضئيلة . وكته حلال . الشكل والتقدير يشبهه بالرقيق
المزوج بالطحاب البحرية والفوق والاشنة . الاثنى
تقع من يفتتن الى ثلاث بضئات تحفها وسدها نحو
١٤ بيتا بيتا الذكر يزين لها الفداء || وفي الصين ويجزو
الزبانج يتهاقن على اكل وكثات الصلجان ، مطبوخة
او مسلوقة ، لانها شايقة لا مؤذية .

١٦٤٣٥ - صُلْجٌ

Pack (F). Pack (E).
الصلج كتلة ضخمة من الجليد العائم المتراكم المالح الهائم
قرب القطب الشمالي .

١٦٤٣٦ - صِلْدُورٌ

هو السلور ، اطلبه .

١٦٤٣٧ - صَلْبِيُ الْبَحْرِ

هو كوكب البحر ، اطلبه .

١٦٤٣٨ - صَلْبِيُ الْجَنُوبِ ، نَعَم

la Croix du Sud (F). the Southern Cross (E).
صلب الجنوب ونجم اسمان لكركية نجوم واحدة مركزها
الجنوب فيها اربعة نجوم مزدوجة وضامة ونجم مثلث من
المرتبة الثانية يدعى « ثير نيم » .

١٦٤٣٩ - صَلْبِيُ الشَّمَالِ

Croix du Nord (F). Northern Cross (E).
صلب الشمال مجموعة من ستة نجم تلاصق كوكبة الدجاجة .

١٦٤٤٠ - صَلْبِيَكَةٌ

Scérîte (F). Sclerite (E).
الصلبية قطعة جامدة في هيكل الحشرات .

١٦٤٤١ - صَلْبِيٌّ

Crucial, Cruciforme (F).
Cross-shaped, Crucial, Cruciform (E).
حل شكل صليب .

وسائر افريقية الشرقية والوسطى . يعيش اسراباً صغيرة
برواح عددها من ٢٠ الى ٣٠ . يألف الغابات والاحراج .
قوته الجار والحبيب . يذنب عنه في تجاويف الاحجار .

١٦٤٤٢ - صُلْفَاةٌ *

Circothis (S).
Cirrocenthis (F). Cirrocenthis (E).
حيوان بحري مفتوح وحيد الجنس والنوع من الرضويات
ونصيلة الصلفاحيات . اصطناعه بحار البلاد الباردة اصطناعه
بحار الشمال || جسمه يبيض الشكل . زصانفه ضيقة
مستديرة الاطراف . رأسه مستعظم الجرم يحمل ثمانية
جرارم عظمية ، متساوية الطول ، مجزوة نصف واحد من
الحاجم . جرارمه واحطتها عنه انتشارها تشكل قماً كبيراً
قاعدة الفم .

١٦٤٤٨ - صُلْفَاَحِيَّاتٌ *

Cirrocenthidae (S).
Cirrocenthidae (F). Cirrocenthidae (E).
نصيلة حيوانات بحرية من الرضويات واسيات الارجل
مزدريات الخشوم || ثمانية الجرارم || لها جنس واحد
معروف حتى الآن يدعى صلفاثة .

١٦٤٤٩ - صُلْغُومٌ *

Glycymeris (S).
Glycymeris (F). Glycymeris (E).
جنس حيوانات بحرية من الرضويات صفحيات الخياشيم
وفصيلة الصلغومييات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد
منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها
كبيرة مستطيلة المنحاص . شتية الاصمداق المنقرضة من
الظروب . اصمداقها شبه يرفضة الشكل ، مستديرة التحزيز
الخفيف || تعيش منفعة في الرمال قرب الشطوط ||
لحمها مأكولة .

١٦٤٥٠ - صُلْغُومِيَّاتٌ *

Glycymeridae (S).
Glycymeridae (F). Glycymeridae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرضويات صفحيات الخياشيم .
اجسامها وانواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة
في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || تتميز بمخاطبا
المستطيلة وباصمداقها الصلبة المنقرضة من الظروب || اعرف
اجناسها واشهرها الصلغوم والسكويك .

١٦٤٥١ - صُلْغِيْنٌ

هو الخلق من النباتات الطبية ، اطلها .

١٦٤٥٢ - صُلْبِيَّانٌ ، صُلْبِيَّانٌ

هو الاقنيلس ، اطله .

١٦٤٥٣ - صُلْجَانٌ *

Colocalla (S).
Salangane (F). Salangane (E).
جنس طير من فصيلة البكاسيات . انواعها المعروفة قليلة
العدد جميعها من طيور الصين والهند وجزر الزانج . تألف
الموارق الرقيقة الكثيرة الامات والصلور || اجسامها
صغيرة القند ، ورشقة القوام هيفاء . اجنتها ذلقة خارقة
الطول ، اطول قواعدها الثانية . اذناها فارقة الطرف ،
عشارية القزاق . عريضا كبيرة . سبالها معتدلة الكثافة
والطول . منازيرها بالغة القصر . مستعرضة الاشداق التي
تحمل في وسطها . تحت رباط اللسان . جيباً وسبياً
يستوعب كمية من الحشرات والحمام . اسفلها متضيرة ،
عارية ، حمراء اللون . اصابعها نضيفة . غالبها متضيرة ،
مقوسة ، حادة الاطراف || طيرانها فائق السرعة . وتتميز



صلفاثة



صلغوم



صلجان بيلو

١٦٤٥٠ - صَلْبِيَّة * Alepocephalus (S).

Alépocephale (F). Alepocephalus (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الصليبيات. أنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الممتدة الحارة. جميعها لينة تعيش في الاعماق التي يراوح غورها من ٦٠٠ الى ٣٥٠٠ م. تحت سطح الماء. أجسامها مستطيلة ضيقة. تتميز ببروصها الرميطة الباردة الحراشف. أشهر أنواعها صليبة المتوسط (Alepocephalus rostratus).



صليبة

١٦٤٥١ - صَلْبِيَّات * Alepocephalidae (F).

Alépocephalidés (F). Alepocephalidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من مفتوحات المثانة. اجناسها المعروفة خسة اما أنواعها قليلة. جميعها لينة تعيش في الاعماق البعيدة للبحر ولا تقترب من السطح الا في زين التسمرة. جميع اجناسها مستطيلة الاجسام مستطيلة الرؤوس الباردة الحراشف.

١٦٤٥٢ - صَلْبِيَّات * Cynanorax chrysops (F).

Cyanorax capuchon, Cyanurus capuchon (F). Cynanorax chrysops (E).

ظاهر من فصيلة القرابين. اصنافه معظم مناطق امريكا الجنوبية. يألف القباب والاسراج المبحرة القبحار. قوته الحشرات والفاث والبروزر. جسمه ممتد القد بطول نحو ٤٠ سم. رأسه مع الففن والزور الى السواد الملبق يمتد مع حمار العين الأزرق. ظهره وبتاجاه ونبه الى الزرقه الجميلة الملبقة بالابيض. جوشه وبلطه وفتيحه الى الياض الناصع. يذبح عنه في الاجبار الرميطة. الاثن تحسن من ٣ الى ٤ يبيضات بينا الذكر يؤن لها الفداء.



صليبة

١٦٤٥٣ - صَلْبِيَّات * Céryle (F).

هو الزراف القاتم ، اطليا .

١٦٤٥٤ - صَلْبِيَّة * Lathridius (F).

Lathridie (F). Lathridius (E).

جنس حشرات من فصيلة الصليبيات وربة غمديات الاجنحة. أنواعها المعروفة نحو ١٥٠ اصنافها تمتد من الشرق الاقصى الى اطراف اروبى. أجسامها صغيرة ، طول من ٢ الى ٣ م. رؤوسها غروطة الشكل. حوتها ضيقة ، ناشرة. قوتها الاستشارية غلادية. تأثيرها نظامية. ملابسها مستطيلة. كوشلها ويطونها والمهادا مضطمة. امخادها لاسخة. فتية القدم والمؤخر. اولياها متباينة الالوان والماجات. جميعها دامة تعيش في الجنازة والبردي النباتي ومل الطحالب والفلطور وتحت القشور والحاء.

١٦٤٥٥ - صَلْبِيَّات * Lathridiidae (S).

Lathridiées (F). Lathridiidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم. أجسامها شديدة الصغر طول من ٢ الى ٣ م. رؤوسها غروطة الشكل. حوتها بارزة. تأثيرها نظامية. ملابسها مستطيلة. قوتها الاستشارية بالغة الطول. مهدبة. حركية من ١١ ضلة. كواشها مضطمة. امخادها لاسخة. قوتها شديدة. ارساها ثلاثية السفل. جميعها دامة تعيش في الجنازة والبردي النباتي والطحالب والفلطور. أشهر اجناسها الصليبية والدوشر.



صليبة

١٦٤٥٦ - صَلْبِيَّات * Cruciferae (S).

Crucifères (F). Cruciferae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة الفعالات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. معظمها عشبي. اورثاها متتابة. ازهارها نظامية رباعية الفسل والبتلات المتصلية. اصدنها سداسية. مغلفها ثنائية الكراويل. ثمارها خرونية. زهورها دقيقة زيتية المادة. وهي تشغل لكثير من النباتات البتلية المشهورة بغواصها المضادة للحفر كالفول والحدود والفجل والرشاد والقررة والجرجير.

١٦٤٥٧ - صَلْبِيَّة * Soliya (S).

Soliya (F). Soliya (E).

جنس نباتات جنينة معمرة من فصيلة الحليبيات. مهدا بعض مناطق استرالية. سوقها فناء ترتفع من متر الى ثلاثة امتار. اورثاها ابيدة. متتابة. كاملة. ستانية النصال الجلامدة. ازهارها سنويدي التجميع. حاح. ازهارها صغيرة القد. مستطيلة الحافلين النحيلة. لها نومان معروفان الصلي الحاتكة والصليبة الصغيرة الزهر.

١٦٤٥٨ - صَلْبِيَّة صَغِيرَة الزَّهْر * Soliya parviflora (S).

نوع من الصليبة. ساقها ترتفع نحو متر الى ثلاثة امتار. اورثاها متتابة. صغيرة النصال. جملة الحصار الاسمع المروج. ازهارها شديدة الصغر. تبنية اللون. تنويرها صيفي.

١٦٤٥٩ - صَلْبِيَّة هَاتِكَة * Soliya heterophylla (S).

نوع من الصليبة. ساقها ترتفع نحو ٢٠٠ سم. اورثاها جملة الحصار الاسمع المروج. نصالها هاتكة تطول من ٣ الى ٧ سم. وتعرض من ٥ الى ١٥ م. ازهارها مستطيلة الحافلين. صغيرة القد. يبيض اللون. تنويرها صيفي يستمر طوال شهر تموز.

١٦٤٦٠ - صَلْبِيَّة صَوْبَكَة * Argent pur (F).

Naked silver (E).

الفضة الصلغة الخالصة.

١٦٤٦١ - صَلْبِيَّة * Cardilla (S).

Cardille (F). Cardilla (E).

جنس حيوانات بحرية من الرمويات صقيحات الخياشيم وفصيلة الصليبيات. انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد اصنافها اطليا بمجامع البحر الاحمر والخليج الهندي. اصدنها شبه قمية الشكل محببة. ملوثة الففن المكورة. تعيش لاصفة بالصخور القليلة المنق. لينها كيف اللادة قتلها.

١٦٤٦٢ - صَلْبِيَّات * Cardillidae (S).

Cardillides (F). Cardillidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرمويات صقيحات الخياشيم وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد جميعها جنس واحد. اصدنها شبه قمية الشكل. مكورة الففن النقيقة. اجسامها صغيرة وطحامها كلك. متحصراتها كثيرة في الاراضي القليلة.

١٦٤٦٧ - صمغ * Mesodesma (S).

Mésodesme (F). Mesodesma (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم وفضيلة الصمغيات. أنواعها المماصرة المرفقة نحو ٣٠ منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. أجسامها صغيرة قصيرة الخشام. أصدانها عديمة الشوئن أو بيضية. تعيش لأسفل بالصخور القريبة من الشاطئ.

١٦٤٦٨ - صمغيات * Mesodesmatidae (S).

Mésodesmatidés (F). Mesodesmatidae (E).

فضيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم أجسامها المماصرة المرفقة قليلة المدد جميعها صغيرة القد، بيضية الشوئن أو عديمة. تتميز بقصر شحاطها وبصغر أصدانها الشديدة التطيل. أشهر أجناسها الصمغ.

١٦٤٦٩ - صمغور * Haplocerus montanus, Oreamnus montanus (S).

Haplocère montagnard, Oreamne montagnard (F). Haplocerum of Kennedy (E).

حيوان لبون مائش مجتر وحيد الجنس والنوع من ذوات الأضلاع، عجوزات القرن. موطنه الجبال الريفية النائية وبعض الأصقاع النائية ومنها ألسكا. جسمه صغير القد وبضع يطول نحو ٨٥ سم. ويرتفع نحو ٥٥ سم. قرنيه يطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. رأسه مع العينين والأذنين والقرنين كراس القنبر. جسمه كبش الماعز. أذناه مستطيل الأطراف. عيانه وقرناه إلى السواد الحالك. شعره مستطيل يغطي كامل الجسم. لونه أبيض الناصع. فرع الأذن ثنائي الخلف. يحملها يدوم نحو ستة أشهر تنقص عند تمامه طوراً واحداً. أجله قليل المدد أقر في فصل الشتاء الذي يستمر من تشرين الثاني إلى أواخر آذار.

١٦٤٧٠ - صمغ Gomma (F). Gum (E).

مادة لزجة دافئة عديمة الطعم والرائحة تفرزها بعض النباتات إنباً طبيعياً أو بتأثير حالة مرضية. لذلك فالصمغ عديدة الأشكال، مختلفة التركيب وهي تقسم عادة إلى قسمين: قسم الصمغ القابلة للذوبان في الماء. وقسم الصمغ التي تنقص الماء. أشهرها الصمغ العربي الذي يستخرج من السنط وهو شائع الاستعمال ويدخل في معظم المستحضرات الطبية الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي.

١٦٤٧١ - صمغ الدُّبَاب

هو الطلوك الآخر، أغلبه.

١٦٤٧٢ - صمغ Durclir (F). To harden (E).

صمغ الشجر: لم يجد ريباً فصح.

١٦٤٧٣ - صمغ * أبو الهول Sphinx (F).

Hawk-moth (E).

جنس حشرات من فصيلة الموليات، أنواعه نحو ٦٠ منتشرة في جميع الأصقاع المالحة. معظمها من الفراشات المصوية المتوسطة الحجم أو الكبيرة. أجسامها مدنية الشكل. وأصنافها كبيرة مزخرفة. قرونها الاستشعارية ثلاثية. برقاتها كبيرة القد، مرطبة الجسم. عاداتها عادية. أشهر أنواعها الاقتصادية التي تتركب النبات ما يتبع.

١٦٤٧٤ - صمغ الحنظل * Sphinx ocellata (S).

Sphinx demi-paon (F).

فراشة كبيرة القد خيلطة الجسم، تطول نحو ٤ سم. قرونها

١٦٤٧٤ - صمغ الأذن Conduit auditif (F).

Cavity of the ear (E).

قناة الأذن التي تشكل صلة الوصل بين القسم الخارجي والداخلي.

١٦٤٧٥ - صمغ Héliotropisme (F).

Heli-scrapsism (E).

أثر اتجاه الضوء في اتجاه النمو النباتي. لذلك فهو يسمى إيجابياً عندما يكون النمو باتجاه الضوء وسلباً عندما يكون في الحالة العاكسة.

١٦٤٥٨ - صمغ صمغ صمغ Picaret commun, Gerret (F).

صمغ بحرية تسمى شامة مبلولة، أغلبها.

١٦٤٥٩ - صمغ Soupage (F). Valve (E).

١٦٤٦٠ - صمغ Allos (F). Pan (E).

راق من القرب صلب الحبيكة نشطت صلاته بعض المواد الفسوية أو أكسيدات الليثيوم أو كربونات الكلسيوم أو هيدروكسيدات الحديد.

١٦٤٦١ - صمغ Sous-espèce (F). Subespecies (E).

تأتي الصمغ في تصنيف الأحياء بين النوع والفرد وقد تشمل عدة ضربات إن كان النوع يشمل بعض الصمغ.

١٦٤٦٢ - صمغ Lutrarie (S).

Lutrale (F). Lutrarie (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم وفضيلة المقتربات. أنواعها المماصرة المرفقة نحو ٣٠ معظمها من علم البحر الأبيض المتوسط. أصدانها أحليجية الشوئن، متساوية المصارع لاشعورية الأضلع، غمدية الصفة البيضاء المرفقة بالأضفر والآخر. تعيش منتشرة في القرب المغمورة بالماء. يكثر وجودها قرب مصبات الأنهر.

١٦٤٦٣ - صمغ Penase (S). Pénée (F).

جنس نباتات جنينية برية من فصيلة الصمغيات. أنواعها قليلة، منها البلاد الحارة جميعها دافئة يستخرج من حبل ماء سوقها عصارة صمغية طرية تستعمل في العلاجات الخارجية أعصها الجروح. ويقال أنها تشد الجلد وتزيل نجسها.

١٦٤٦٤ - صمغ Penase (S).

Pénécées (F). Penase (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القممات مرتفعة البيض. أشهر أجناسها الصمغ.

١٦٤٦٥ - صمغ صمغ صمغ

صمغ بحرية تسمى شامة، أغلبها.

١٦٤٦٦ - صمغ Aotus (S). Aote (F).

جنس نباتات برية معمرة من سبط البذرليات وفضيلة القربيات الفرافية. أنواعها قليلة جميعها جنبات قرها شاذكة قليلة الأوراق الملحقبة الشكل الصغيرة القد. أصدانها عديمة ثاجية صفراء اللون، ويقال أنها تقيء الجروح وتقيء حل ملعها.



صمغ



صمغور



صمغ الحنظل

أسود - سيجفها وردية المراج يطولها حصار بني يتبيح
 عند الرأس . رواشها موشحة وبجملعة || رقبها مستطيلة
 الشكل سمراء اللون تظهر في حمور وتبقى حتى اليل .
 تركب أهداب جميع الصنوبريات .



صمل الحور

١٦٤٨١ - صَمَلُ الصَّنوبريَّين هو صمل البيرس ، الحلب .

١٦٤٨٢ - صَمَلُ الْكَرْمَةِ* ، أَبُو الْهَوَكِ الْأَخْضَرِ
Pergesa elpenor, *Chaeocampa celery* (S). *Sphinx*
de la vigne (F). *White-lined sphynx* (E).

فراشة متوسطة القد طولها نحو ٢٢ سم . جسمها مردي
 الشكل ، ثوبها الى الصبغة الصنائية للسداة المراج .
 رواشها موشحة بالاسمر والوردي الليلكي ، توشبها قلبين
 مفرغين . رواشها الاياميان مهدبان بأطراف فضي || رقبها
 مستطيلة الشكل ، شديدة الحصار تحمل حل جانبي ترتبها
 البنية بقداً صدي يحيطها إطار اصفر . تظهر في حمور وتبقى
 حتى اليل . تركب أوراق الكرمة فتزنيها .



صمل النحل



صمل الزيزفون



صمل السندبان

١٦٤٨٣ - صَمَلُ الْكَرْمَةِ الْمُحَطَّط* ، دَلِيلَكَة

Dalephila ivornica (S). *Daléphilé de la vigne* (F).
 فراشة بجولة طولها نحو ٤ سم . ثوبها الى الصبغة السمره ،
 يغلب عليها أربعة خطوط متوازية صيد وبض . رواشها
 موشحة بخلف الالوان يكثُر فيها الاسمر || رقبها كبيرة
 القد خضراء اللون . تبيح ظهرها اسمر الخط يكشفه من
 حل جانبي خضبان أصفاراً يلعق سود نظامي تملو
 جميع التريبات . تظهر في أوامر حزينان وتبقى حتى
 أوامر آب . تركب أوراق الكرمة فتصطبها وقد تعمر الكرمة
 من روافها إذا كثر حصدوا .



صمل الصنوبر

١٦٤٨٤ - صَمَلُ الْهَلَالِ* ، أَبُو الْهَوَكِ الْأَنْفَعِ
Sphinx convolvuli, *Hera convolvuli*, *Protoparce*
convolvuli (S). *Sphinx du lieron* (F).

فراشة بجولة تجوب البلاد . طولها نحو ٤ سم . ثوبها الغالب
 وبداي اللون ، رقبها غسطة وبجملعة بالاسود ، ملتقى تجديدها
 يكون رقم ٨ || تركب أوراق الاليل والبطاطا وغيرها .



صمل الكرمة

١٦٤٨٥ - صَمَلُ النَّحْلِ* ، *Galleria* (S). *Gallérie* (F).
 جنس ششرات من سرشنيات الاجنحة فضيلة التاربات .
 انوامه عديدة بعضها يتدمل حل خلايا النحل فيدخلها
 ويضع تنكره اياً استطاع فيقتطع من رقات دقيقة فعمل
 سراديبها وانفاقها في النخاريب فتلف الرصع ويترق
 العمل || أشهر انوامه للزدي اثنان : صمل النحل الصغير
 وصمل النحل الكبير .



صمل الكرمة المخطط

١٦٤٨٦ - صَمَلُ النَّحْلِ الصَّغِير* ، لَوَاكِيَةُ الشَّمْعِ
 الصَّغِيرُ ||

Galleria alvearia, *G. grisella*, *Maliphora grisella* (S).
Alveicola, *Taigne de la cire* (F).

فراشة من فصيلة التاربات صغيرة القد ، كثيفة الحراشف
 طويلة الفراش ، وبداية التوب تقضم نخالت وتلاوي
 النسل حيث تحت مكنها حل النخاريب فيفتن من رقات
 نمة فتفك بالشمع وتغني حل الرصع والسمل .



صمل الالباب

١٦٤٨٧ - صَمَلُ النَّحْلِ الْكَبِير* ، لَوَاكِيَةُ الشَّمْعِ
 الْكَبِيرُ ||

Galleria cecilia, *G. mellonella* (S). *Gallérie*
de la cire, *Fausse-teigne* (F).

فراشة من فصيلة التاربات كبيرة القد ، كثيفة الحراشف

الى الصبغة الصنائية يطولها تجديع ، ارد اللون . جناها
 حستلة . رواشها الاياميان مزخرفان بوشبان . رواشها
 الخلفيان موشبان بالهرة وتقلو كل واحد منها بقمة
 بيضية الشكل ، سمراء اللون ، يضاء الحمار التاماني ، سود
 الحمار الخلفي المتعرض || رقبها خضراء اللون ،
 سوداء المتبدلج تظهر في أوامر حزينان وتبقى حتى أوامر
 تشرين الاول . تركب أوراق جميع الانجار للشمرة ، وقد
 شوهت حل الصفصاف والحور .

١٦٤٨٥ - صَمَلُ الْحَوَرِ* ، أَبُو الْهَوَكِ الْمَوْشَحِ

Amorpha populi (S). *Sphinx du peuplier* (F).
 فراشة متوسطة القد ، طولها نحو ٣ سم . ثوبها الى الحلة
 القنبراء . رواشها موشحة ومزخرفة بالاسمر والخطي والوردي
 والالوان || رقبها فراء اللون ، خضراء المراج ، تظهر
 في أوامر حزينان وتبقى حتى اوائل اليل . تركب أوراق
 الحور والصفصاف والبتولا .

١٦٤٨٦ - صَمَلُ الْفَلَكِي* ، أَبُو الْهَوَكِ الْمُبَجَّجِ

Daphnis nerii (S). *Sphinx du laurier-rose* (F).
 فراشة بجولة تجوب البلاد . كبيرة القد ، مودنة الشكل
 طولها نحو ٥ سم . ثوبها الى السرة الصنائية المراج يطولها
 تجديع وتوشح ومزخرفة وترسين وتجديع . جملة الاشكال
 والالوان يغلب فيها الاصفر || رقبها كبيرة القد خضراء
 اللون سمراء الظهر والمالب تظهر في أوامر حمور وتبقى حتى
 اوائل تشرين الاول . تركب أوراق النفل .

١٦٤٨٧ - صَمَلُ الزَّيْزُونِ* ، أَبُو الْهَوَكِ الْمُبَشَّحِ

Mimas eilias (S). *Sphinx du lilaut* (F).
 فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣ سم . ثوبها الى الصبغة
 الحستلة ، رواشها مبشمة ومزخرفة بالابيض والاسمر ،
 رقبها صغيرة القد سمراء اللون جملة بالاسود . تظهر في
 حمور وتبقى الى اليل . تركب أوراق الزيزفون والدرادر .

١٦٤٨٨ - صَمَلُ الْمَسْمُومِ* ، أَبُو الْهَوَكِ الْأَسْمَرِ

Acherontia atropos (S). *Sphinx tête de mort* (F).
Death's head moth (E). *Totenkopf* (D).

فراشة كبيرة القد طولها نحو ٥ سم . ثوبها الى الصبغة
 البنية يطولها تجديع مفرغ . سيجفها سمراء اللون يتوسطها
 فيه هيكل تملو جملة . رواشها غسطة وبجملعة ومزخرفة
 بشي الاوان || رقبها في الطارما الاول تكون خضراء
 اللون ثم تنكره نحو الزرق . تتميز بخلين اسودين يركبان
 الرأس من جانبيه . طولها عند اكتمال نموها يبلغ ١٠ سم .
 خادتها تطول نحو ٥ سم . لها الى البني المايق || الخشرة
 الكاملة تقضم المناسل الضعيفة فتمض النخاريب وتلتق
 السمل . اما فتركب أوراق السم والزيزين والبطاطا
 ومعظم لياتات الفصيلة الباذنجانية . تظهر عادة في حمور
 وتبقى حتى تشرين الاول .

١٦٤٨٩ - صَمَلُ الْمَشْدُوكِيَان*

Marumba quercus (S). *Sphinx du chêne* (F).
 فراشة كبيرة القد طولها نحو ٤ سم . ثوبها الى الصفار
 التبي . رواشها موشحة بالاسمر والوردي || رقبها مستطيلة
 الشكل حستلة اللون . تظهر في حمور وتبقى حتى اليل .
 تركب أوراق السندبان حل اختلاف انوامه .

١٦٤٩٠ - صَمَلُ الصَّنوبرِ* ، أَبُو الْهَوَكِ الْخُشِيِّ

Hylocius pinastri (S). *Sphinx du pin* (F).
 فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣ سم . جسمها صتاي اللون
 يمتدحه تجديع كستي ويقطعه خط حستي يتوسطه سلك

Bulbille (F).
Bulbil, Bulbilet (E).

١٦٤٩٥ - صَمُوع

اسم تعريفي يطلق على الزئمة الهوائية المحرقة الصلبة التي تظهر غالباً في ابط الورقة والتي يفصلها عن النبات الام ويزدهر في التربة تنمو وتنمو.

١٦٤٩٦ - صَمُوحَة شَهَبَاة. Elasmucha grisea (S).
Punalea gristrea (F).

حشرة من فصيلة القاصيات، جسمها صغير القد، مفلطح، بجني اللون، بطول نحو ٨ مم. ثوبها الى الصفار التني تملوه شحمة ارجوانية وتغير اسم ما يجعلها اشبه الموج. رأسها غروي. خطمها معتدل الطول. عينها صغيرتان، زباناها مستطيلتان. كولمها قوي اللون. حقيقتها مدببة الطرف. ظهرها اغبر اللون. قدامها شفافة. يعلو الى الشفة يعلو في حثارة تجلج اسود || مرمتها اوراق الاشجار الحرجية والزراعية باستثناء المستوريات || راسها كريمة.

١٦٤٩٧ - صَمِيَّة ٥ Somida
تعريف عام يطلق على كل جسم مادي مركزه ضمن الخلية يتأثر بعامل الجين السببي.

١٦٤٩٨ - صَمِيل Scarleux (F). Sarius (E).

تمت تعريفي يطلق، في علم النبات، على كل ما هو رقيق، وجفيف وشبه شفاف أو مضي.

١٦٤٩٩ - صَمِيلَة * Amphisilus (S).
Amphisile (F). Amphileus (E).

سمكة بحرية بيوض من شالكات الزعانف وفصيلة الزواجا في محيطها يمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي لغادها || جسمها مستطيل الشكل، قليل العرض، بطول نحو ١٦ سم. ثوبها الى الخضار البحري تملوه مائة قفصية. رأسها صغير الحجم، مستطيل الخط الاسفي الشكل. زعنفتها الظهرية ذيلية الزنكاز، مستطيلة المنحني الطرفي. الحاد من منابتها انها تنفخ خطمها، الابوي الطرف، ككل الحوام الحاممة فوق سطح الماء لتقع فيه فتفترسها || لديها متوسط الصنف مأكول.

١٦٥٠٠ - صَمِيلَة * Thyris (S).
Thyris (F). Thyris (E).

حشرة من فصيلة الصمليات وربة حشرقيات الاجنحة. اطاحتها تشمل بعض مناطق البلاد الممتدة الحارة. تألف الموات التي تكثر فيها المملوات || جسمها صغير القد، شبه اسطواني الشكل، بسطها نحو ١٦ مم. رأسها مكور. عينها صغيرتان. زباناها مشطيان. خطمها معتدل القد. ملامسها مستطيلة. اجنحتها مدببة ومجعدة. بطونها متكافئة السقف النقي. ظنايبها الحلقية رباعية المناسخ || سرقتها كثيفة، لائحة، تعيش على وزن النصال وقد تحول النصال الى لغافات شبيهة بالابوا.

١٦٥٠١ - صَمِيَّات * Thyrididae (S).
Thyrididae (F). Thyrididae (E).

فصيلة حشرات من ربة سرشقيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٩٠٠ منتشرة باكثريتها في المناطق الاستوائية من الماين القديم والجديد || اجسامها صغيرة صلبة، شبه اسطوانية الشكل. بسطها تراوح من ١٥

البلدة، مستطيلة الراش الزركفة. ثوبها بني اللون تملوه رقة سمراء. تقسم قنات النسل وتحت مكنها على التناوب فينفذ من رقات حاجية دقيقة لا تلبث ان تكبر فيفسر لونها ويبلغ طولها نحو ٣ سم. وهي تعيش كامل حياتها البرية على شمع التناوب تنفخ عليه.

١٦٤٨٨ - صَمَلُ الْيَاسَمِ * أبو الهول المجعد Sphinx ligustri (S). Sphinx du croble (F).

فراشة كبيرة القد طولها نحو ٤ سم. ثوبها الى الوردى يترسها تجمع اسود ويقلع خط حطلي يملو سلك اسود. حقيقتها حطلي اللون تملوها جانبة سمراء يحرقها حثار اسود. رواشها مزعزعة ومجعدة || رقتها كبيرة القد غليظة، ثوبها الى الصفرة الخضراء يترسها تجلج ابيض ونقط حر || تظهر في ايار ويثقي حتى اواخر حزيران. تركب اوراق الياسم والليلك والازدرخت.

١٦٤٨٩ - صَمَلُ الْيَتْرَع، صَمَلُ الْقَرِيْبِيْن، أَبُو الهول المَحْطَط Caferio euphorbiae, Dellephila euphorbiae (S).
Sphinx de l'euphorbe (F).

فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣٥ سم. ثوبها الى الوردية السمراء. رواشها بجلة التخطيط والفتح والخنايف البيض والخضر || رقتها سواد اللون، يضاء النشة النقيقة، صفراء النقط الارجية، حواء الخط البني القاطب، صفراء الخط البلي الجاني، سواد المذهب. تظهر في تموز ويثقي حتى ايلول، تركب اوراق اليترع.

١٦٤٩٠ - صَمَلُ خَيْرٍ Sphinx empressé (F).

فراشة من حشرقيات الاجنحة لدى ابو الهول السبول، اطلبها.

١٦٤٩١ - صَمَلَاخ هو "الاف"، اطلبها.

١٦٤٩٢ - صَمِيلَة ٥ Amphideasma (S).
Amphideasma (F). Amphideasma (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات التناوب وفصيلة المختريات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في سطر بحار المال. اصداها شبه مستديرة الشكل، قليلة الابداب، ثنائية المصارع، وشدة اثنائية الاستان الصغيرة. تعيش لاصقة بصخور المجاح المغمورة بالماء. ليتها قليل للمادة والكثافة.

١٦٤٩٣ - صَمِيَّات، هَوَكِيَّات Sphingidae (S).
Sphingidae (F). Sphingidae, Sphinx moths, Hawk moths (E). Schwärmer (D).

فصيلة حشرات من حشرقيات الاجنحة المخططات الزيات. اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠ مملها من القراشات الدويبة للمرح. اشهر اجناسها الصمل.

١٦٤٩٤ - صَمِيل * Myocetidium nobile (S).
Myocetidae remarquable (F).

نبات حشبي معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الحمصيات. ساقه متصبة زباه تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه خضراء كثيرة شبه قليلة الشكل تطلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. نصلها بجلة الخضار الزاهر. ازهاره متفردية التجميع المتكاثف. ازهاره صغيرة الحجم، زقاء اللون، عادمة العرف || تنويره ديمبي.



صَمَلُ النسل الكبير



صَمَلُ الْيَاسَم



صَمِيلَة



صَمِيلَة



صَمِيلَة

١٦٥٠٧ - صَيَّاء التَّبَع * ، تَسَنَّة التَّبَع ، مِلْدِيو التَّبَع ، عَفْوَلَةُ زَقَّاق

Peronospora tabacina (S). Mildiou du tabac (F). Blue-mold (E).



صَيَّاء

وصم فطر يكسب مريع الانتشار يركب التبغ يفتضي عليه وقد يصيب جميع التبرقع البرية والزيينية والنباتية || سببه فطر مجهرى من الصناعات بونه كروي الشكل، قطره راوح بين ٢٧ و ٤٦ م. يتنقل الرياح على ابعاد شاسعة فيكثر حيث يستطع التطفل وسيت تلامحه البيئة || مظهره الخارجى على التبغ يقع خلية لينة لا نظائرية التشتيت تملأ بشره الساق وصمغة النسل الصغرى فتغير مراح لها من الاعصر الى الاخير فالوردي فالصنابي فالبنفسجى . وهو يسلط التسع والحلايا ويسبب ذبوا ويلها || نشأته يزدهج الى البيئة الرطبة المتفارقة المراتين القصوى والدينا . وهو اذا اساب التبرق الى المشائل الارباع وأبات الشتلات . وإذا اساب الشتلات الممرسة في الحقل شوه اوراقها واذهلها وحال دون النمو الطبيعي وقد يفتضي عليه فئا اذا استحك كامل الاوراق .



صنَّاء الاسيانغ

- ١ - بتغير مركز المشائل التي ظهر فيها الصنَّاء او تظهر تربة الاكواد ان حراريا لو كبرها .
- ٢ - يتغير زهر التبغ يسلط سفلات النحاس المركز ١٠ ٪ قبل استعمالها بمدة وبينة .
- ٣ - باحتجاب البذر الكثيف وذلك باستعمال غرام واحد من البذر لكل متر مربع من الاكواد المثل .
- ٤ - باحتجاب الزراعة في الاماكن الرطبة او التظلية .
- ٥ - بتخفيف كثافة الزراعة اي عدد الشتلات بالمتر المربع .
- ٦ - باستعمال الفوطير الوقائية التي تمنع انتشار الرمم او تحول دين انتشارها . نفس منها بالاكوار المائى والزيئاب والبوليرام على اختلاف اشكاله والامثال كوك .
- ٧ - بتلف شتلات الاكواد المصابة عند تفشي الرمم .
- ٨ - بتلف جميع الشتلات ان سلبه او مصابة فور الانتباه من قطاف الاوراق .



صنَّاء البصل



صنَّاء الشوْتَدَر

١٦٥٠٩ - صَيَّاء الشَّوْتَدَر * ، مِلْدِيو الشَّوْتَدَر

Peronospora schachtii (S). Mildiou de la betterave (F). Downy mildew of beet (E). Falscher Mehltau der Rübe (D).

وصم يصيب مشر الشوْتَدَر واوراته الفتية فيمنعها عن متابعتها بها او يحول دونه فتبدو الاوراق المصابة صغيرة لينة ، مشوكة الشكل ، بنفسجية اللون ، سريسة السلب . سببه فطر مجهرى من الصنَّاء مظهره الخارجى يقع لا قياسية

الى ٢٠ م. رؤوسها شبه مكورة . حوزتها صغيرة . قرونها الاستمالة غيبطة . ملاصقة مستطيلة . اعطائها كبيرة . بطونها متراكبة السطح الفقيق . مرزاتها مستطيلة . اجنتها مشرقة الخضر ، عادمة التهديب . اثوابها منزوعة || اساريدها كثيفة ، غاضلة ، تعيش ضمن لفافات من الورق بوقية الشكل || اشهر اجنتها الصيلة .

١٦٥٠٢ - صُمَيْتَاء *

Adenostoma (F).

جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة الورديات . انواعها المهرقة قليلة العدد . مؤلفا فرعاه . اوراقها ضيقة التجميع ، شديدة الصغر ، صفوية الشكل . ازهارها متدوية . ازهارها مستطيلة التكرور ، خاسية الثلاث و خافتة العرف المستحب ، يبيضه اللون او صفراء .

١٦٥٠٣ - صَيَّاء

جنس فطور مجهرية من عارة الورديات وفصيلة الصنَّاتيات . انزله صندبة تتميز بجذعها البوقية المثلثية المستطيلة الانفعال . اطرافها شفعية ، ثنائية ، لا متشعبة . متجيبها عديد المرشاش المتشعبة . تكاثرها غيبي بوي . اشهر انواعها واضرها ما يلي .

١٦٥٠٤ - صَيَّاء الاسيانغ * ، مِلْدِيو الاسيانغ

Peronospora spinacea, P. effusa (S). Mildiou de l'apinard (F).

وصم فطري يصيب اوراق الاسيانغ فيقطها وقد يهيب تسبها || سببه فطر مجهرى من الصنَّاء مظهره الخارجى يقع لا قياسية الشكل ، منها المستدرة والبسفية . قطرها ١٠ و ٢٠ م. تركب النسل في وقته او بعدا مرهه فتبدو على الصفة العليا تيجيق مرتفع عادم اللون يتايله على الصفة السفلى تجيوق على البشرة ، احمل اللون ، بنفسجي المراح || يكافح باستعمال احد الفوطير القتالة اخضاها مركبات البوليرام || دون اصيح طرق الوقاية اجتناب الكثافة . والرطوبة .

١٦٥٠٥ - صَيَّاء البزلاء ، صَيَّاء الجلبان

Peronospora viciae (S). (S). Mildiou des pois (F). Downy mildew of peas (E). Falscher mehltau der erbsen (D).

وصم فطري يصيب اوراق البزلاء الفتية انضما الجلبان والبزلاء والبيقية والبقول والحصى || سببه فطر مجهرى من الصنَّاء . مظهره الخارجى يقع خلية حلاوة اللون ثم على السمة تحلب الاوراق وتيبب يلها . يكافح باستعمال مركبات البوليرام والزيئاب .

١٦٥٠٦ - صَيَّاء البصل *

Peronospora scheldeni, P. destructor (S). Mildiou de l'oignon (F). Blight of onions (E). Falscher mehltau der Zwiebel (D).

وصم فطري يصيب البصل في اوراقه الفتية وفي شرايحه الزهرية فيقطها || مظهره الخارجى يقع بنفسجية لشكل لا قياسية الحجم ، صفراء اللون ، خلية الخضر البنفسجي المراح ، تركب الاوراق تسبب ذبوا الباكور وتركب الشرايخ فتضربها زغبها من ايصال التسع الى الزمار فتضلم || يكافح باستعمال المركبات التحمالية المتفجرة او مركبات البوليرام والزيئاب .

١٦٥١٨ - صِنْبَاجَة ، مَاصُوث ، مَعْمُود *Elephas primigenius* (S), *Mammouth* (F), *Mammoth* (E).

نوع من القيلة البالدة التي عاصرت الإنسان في أجياله الماضية المائدة إلى ما قبل التاريخ. وجلبوا بعض جثثها وإلقت على قراعرها محفوظة من حيث الزن في مخالب سيرية وفيها من بلاد الشرق.

١٦٥١٩ - صِنْبَاج *Séplon* (F).

الصنّاج صدفه داخلية موجودة عنه بعض الرخويات كالخيار. وهو جسم بيض الشكل المستطيل، عذب المصحة العليا، أبيض اللون، يتكون من مواد عضوية عازية يكرهون الكلس. وهو شديد الخفة أي قليل الوزن النسبي، لأنه كثير الفجوات التي يجمع فيها الأوزت والحامض الكربوني.

١٦٥٢٠ - صِنْبَار *Platan d'Orient* (F).

هو الدلب الشرقي، الملبه.

١٦٥٢١ - صِنْبَارَة

هي الشمس، تستعمل لصنع السلك.

١٦٥٢٢ - صِنْبَاعَات زُرَاعِيَّة

Industries agricoles (F), *Agricultural industry* (E). الصناعات التي تصانع المواد الأولية الزراعية بوسائل ميكانيكية كصناعة السكر والكحول والقطر والزيت.

١٦٥٢٣ - صِنْبَاعَة ، كَبَش ، رَقَبَة *Fascine* (F), *Faggot* (E).

أغصان وأصنع ربا شبه توضع في وجه الماء لتحويل قس منه إلى مجرى آخر.

١٦٥٢٤ - صِنْبَاعَة التَحْمِير *Zymotechnie* (F), *Zymotechnics* (E).

١٦٥٢٥ - صِنْبَاعَة التَحْمُر *Vinification*

علم صنع الخمر وسفطها وتجويدها.

١٦٥٢٦ - صِنْبَاعَة السِيَال *Vannerie* (F), *Basket-making* (E).

تشمل كل ما يصنع بقصبان المصفاة والخيزران والاسل وغيرها من سلال ومنافذ الخ.

١٦٥٢٧ - صِنْبَاكَة *Totalité* (F), *Totality* (E).

١٦٥٢٨ - صِنْبَار مَبْدُول *

Crioccephalus rusticus (S), *Crioccephale rustica* (F), *Crioccephalus rusticus* (E).

حشرة خاشبة من فصيلة القرنيبات ورقية صفراء الالجنة. أعطانها معظم مناطق الصنوبر || أنثا أكبر قدًا من ذكرها فتطول من ١٨ إلى ٢٥ مم. أما ذكرها فتطول من ١٢ إلى ١٧ مم. ثوبها إلى أسمره الخفيفة الحمراء الملوّج. سرسها دجوي يتغير من الغروب إلى الشرق || تظهر في أوائل حزيران ويشتري حتى أواسط تموز. تنجح مكثها في شقوق لحاء الأشجار القائمة والمقطوعة فينتفخ || يرقاها دقيقة صغيرة تتطور وتكبر بسرعة وتدمر اللحاء والشكير إلى أن يمل زنب الاكمال حيث تتحول إلى حوريات ونها إلى حشرات جلجلة تهمج السرايب في

الشكل لونها إلى العظلة ثم ينحرف ويستقر على السرة. يكافح باستعمال القواطير المركزة على النحاس.

١٦٥١٠ - صِنَاء الصَلِيبِيَّات *

Peronospora brassicae, *P. parasitica* (S), *Mildew des crucifères* (F), *Downy mildew of crucifers* (E), *Falscher Mehltau der Kreuzblütler* (D).

وصم فطري يصيب سوق فروع وأوراق وزناد نباتات النجيلية الصليبية أخصها اللثف والكربط والمفلون. سببه فطر مجهري من الصناء. مظهره الخارجي يقع خلية غبراء اللون ثم تنحرف إلى السرة تشبه الفروع والأوراق والأزهار || يكافح بكثرة من الصناء باستعمال مركبات النحاس.

١٦٥١١ - صِنَاء القَنْب

Peronospora cannabina (S).

وصم يصيب أوراق القنب سببه فطر مجهري من الصناء. مظهره الخارجي يقع خلية صفراء اللون ثم تنحرف لتصلب نسيج الأوراق وتصب يباسها.

١٦٥١٢ - صِنَاء السَلَف

Peronospora trifoliorum (S), *Mildew des trèfles et luzernes* (F), *Downy mildew of alfalfa and clover* (E), *Falscher Mehltau der Luzerne* (D).

وصم يصيب أوراق اللؤلؤ واللثة والوطس. سببه فطر مجهري من الصناء. مظهره الخارجي يقع خلية لا تباينة الشكل والترتيب لونها إلى العظلة ويلبها موج بنفسجي تركب لصل الأوراق وتصب يباسها || يتحسن حتى البتات المناسبة عند ظهور المرض وأن تصمد الخش لسبب جوي فلا مانع من استعمال القواطير النجمية شرط الانتعاش من الخش قبل مرور ١٥ يومًا على المكافحة.

١٦٥١٣ - صِنَاء الزُود * ، مَبْدُول الزُود

Peronospora sparsa (S), *Mildew du rosier* (F).

وصم فطري يصري الورد في أعضائه المورلية أخصها الأوراق لونها وقد يشوبها دونه أن يقضي عليها بكاملها. سببه فطر مجهري من الصناء. مظهره الخارجي يقع صغيرة القند وروانية الشكل، وجووية اللون، بنسجية الملوّج، تركب حنار الأوراق وأصنافها وطاء الأناد الفنية ومالين الأزهار تنفجرها وتصلبها || يكافح باستعمال القواطير النجمية أو غيرها من القواطير المركبة الحديثة.

١٦٥١٤ - صِنْبَاكِيَّات

Peronosporaceae (F), *Peronosporaceae* (E).

فصيلة الفطور العنائية من مرتبة الثسنيات ورقية البشيات || تشمل ثلاث عمارات: الحصبيات والنباتات والروسيات، أما أجناسها والأصناف فمديدة منها الثسنة والحصيف والصناء والمصيل واللثة والنباغ.

١٦٥١٥ - صِنْبَاب * *Cardamina* (S), *Cardamine* (F).

جنس نباتات عشبية رية من فصيلة الصليبيات، أنواعه نحو ٦٥ منها الحولية والهلولة والسرة. أزهارها مركبة متعاقبة حريفة للذائق. أزهارها بيضاء أو وردية.

١٦٥١٦ - صِنْبَاب الماء *Cardamine des prés* (F).

هو حرف الخقل، الملبه.

١٦٥١٧ - صِنْبَاب يَتْرِي هو حرف السطوح، الملبه.



صناء الصليبيات



صناء الورد



صناب



صناب ملول

١٦٥٢٥ - صَنْجِيَّةٌ * أَفْئُونٌ ، ذَاتُ الْأَجْرَاسِ

ذَاتُ الصَّلَاحِلِ ، كِرُونَال

Crotalus (S). Crotale, Serpent à sonnettes (F). Rattlesnake (E).



صنّيط

جنس حيات خيئة من فصيلة الصنّيطيات لها في أذنانها ما يشبه الحراشف تحدث من ما تصدرك أو تلتس التلي. صوّناً كصوت الصنّج || يكثر ويوجد في البلاد الأمريكية ، يقفون عليها في الأماكن المروية بترية الحنازير لأن الحنازير يقتل عنها ويقتلها ولا تستطيع اليه سبيلاً لأن سمها لا تسري في جلده .

١٦٥٣٦ - صَنْطَابٌ ، صَنْخِر

Chameau gros et gras (F). الجمل الصّخيم اللّين :

١٦٥٣٧ - صَنْخَحَةٌ طَرْشُشِيَا * Transchella (S).

جنس ظفور مجهرية قريبة الشبه من الصّديفة . تتميز بفيها البيضي اللّذي الشكل الفيق الانتشاب والفيلق اللّثة . مساهم السّلمية عديدة استوائية الأرتكاز . ذبيمتها كثيرة التعلات الرّزية التجميع . دعامتها مؤلفة من خليتين لا متجانستين السّفل أسطوانية الشكل والعليا كروية . أعينها منفصلة || أنواه الاقتصادية قليلة أشهرها صنّخة الخوخ .

١٦٥٣٨ - صَنْخَحَةُ الْخَوْخ * Transchella pruni-spinosa, Puccinia pruni-spinosae, Accidium punctatum (S). Rouille du prunier (F).

فطر مجهري يتطفل على معظم اللوزيات انصعب الخوخ والمشمش والدرائق واللوز فيحطب الارواق ويضعف الأشجار ويؤذيها || مظهره الخارجي يثور صغيرة جوية اللون لا يّاسة التجميع تركب التصل حل صفحتة أسفل بين السروق والصلب تفجر أيشرة به أن تعطب اللّسج . يتكاثر ألا بجميع وحرر جميع الارواق به مغولها . نأيا ينسج الأشجار التي كان ظهر حل أرواقها الرّسم واحد القوالب القمالة الشديدة الانحماض والالتصاق تؤا بهد الأبرار .

١٦٥٣٩ - صَنْدَرَةٌ * Luciopeca sandra (S).

Sandra (F).

سكة نهريّة من القترغيات شالكت الزعانف . أطناها قسيمة الأبراء تشتمل معظم أشر البلاد المعتدلة الحاروة للشمرة نحو البلاده || طولها بأرواح من ٨٠ إلى ١٠٠ سم . ثوبها إلى الفصاء الرّقي يسلها من جانبها توشح أسمر يّداد أسمرأرأ مع اقترابه من شج الظهر || لحمها جيد الصنّف مرغوب فيه .



صنّخة الخوخ

١٦٥٤٠ - صَنْدَلٌ

مجوعة من خيوط اللّيج الجاف بأرواح عدد مشاككتها ما بين ٣ و ٥ ج . صندل .

١٦٥٤١ - صَنْدَلٌ هو أرزية السنور ، الحلبا .

١٦٥٤٢ - صَنْدَلٌ Santalum (S).

Santal (F). Santal, Sandalwood (E).

جنس نباتات مسرة برية وزراعية صناعية من فصيلة الصندليات . أنولها ثمانية منهاها الشرق الأقصى جميعها جنبات وأشجار صغيرة القد ، أرواقها معتقة متعاقبة . أزهارها عتقويّة التجميع ، أبطي وثانجي الأرتكاز . أزهارها غشوية . ثمارها ثوبية . بذورها سود . تُرَدع لأخشابها الصّقره اللّين و القاخرة الصنّف . أخشابها



صندل

طلب الحرية ولكوم وتفيد سربها الأيل مع حلول شهر حزيران || أضرارها شديدة الرّيح لأنها تنسب الأشجار القاطمة وقد تسبب يباسها .

١٦٥٢٩ - صَنْبِاطٌ Ceanobita (S).

Cénobita (F). Ceanobita (E).

جنس دوبيات بحرية من القترغيات عشاريات الأبريل طويلات الذليل وفصيلة الباغوريات . أنواه المرفوعة قليلة العدد منتشرة قرب شواطئ البلاد الاستوائية والمنسرة نحوها || أجسامها مستطيلة الشكل ، صدرها قصير المنك . تتميز باختبارها في الإصداق المجهرية ولا تخفي سوى بطونها عند الانتقال || أشهر أنوعها الصنّاط الأخضر (Cl. rugosa) الذي يكثر ويوجد قرب شطوط المحيط الهندي والبحر الأحمر .

١٦٥٣٠ - صَنْبُوبٌ Pila (S). Pello (F).

Pila (E).

جنس حشرات من فصيلة الصنّوبيات ورثبة ذوات الجناسين . أنواه المعروفة عديدة أعطانها منظر أقطار العالم || أجسامها متوسطة الحجم تطول من ٨ إلى ١٠ م . رؤوسها شبه مكورة ، مستقلة . حيوتها صغيرة ، فارقة عند الشقن . قرونها الاستشارية صغيرة ، تحيلة . ملابسها صغيرة . أعطانها متوسطة الحجم . كواسلها مستطيلة ، ثنائية التحديق ، مبدؤها الحلب . بطونها اهليلجية . وراثتها كبيرة . قواهاها نشيطة . أنوؤها عديدة ، جميعها وحيدة اللون || الجملانة واضحة تألف المروج والثغابات . البرقة نهمة تلّجّح الجلود والسوق فتؤدي للثبات الذي تركبه .

١٦٥٣١ - صَنْبُوبِيَّاتٌ Piliidae (S). Piliidés (F).

Piliidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناسين . أجسامها وأنواعها للمعرفة عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم . تألف المروج والثغابات ، ترطب في الملقح أرضية || أجسامها هيأة طول فارقة عند الشقن . قرونها الاستشارية خيطية متفارة الطول . ملابسها صغيرة أو فاسرة . كواسلها مستطيلة . بطونها اهليلجية . وراثتها كبيرة . قواهاها نشيطة . أنوؤها باهتة || الحشرة الجملانة تموش على طلع الأزهار ورحيقها . البرقة تعيش في جذور النباتات المختلفة ونها الجزر والقت والملقوف || أشهر أجناسها الصنّبوب .

١٦٥٣٢ - صَنْبُورٌ

النخلة دقت من أسفلها وانجدر كرها وقل حالي . والنخلة تخرج من أصل النخلة الأخرى من غير أن تفسر .

١٦٥٣٣ - صَنْبُورٌ ، صَنْكِيَّةٌ Robinet (F).

Cock, Tap (E).

جهاز يسمح للسواك المحضرة ، من ماء وغيره ، بالمرور أو بالمخرج عند الطلب .

١٦٥٣٤ - صَنْجِيَّاتٌ ، أَفْئُونِيَّاتٌ Crocailidae (S).

Crotalidae (F). Crotallidae, Rattlesnakes (E).

فصيلة حيات سامة من أنوبيات الأعاديد . أجسامها وأنواعها عديدة جميعها خبيثة سامة تتميز برؤوسها اللّطيفة واحداثها الدقيقة ويوجد بقرة واضحة جلّية بين الانف والعين .

Caranx sanson (F). - صَنْدَلٌ ١٦٥٥٠
سكة بحرية تدعى شم صنود، اعطها .

Maltage (F). - صَنْعُ الْمَلْتِ، مَلْتَاَج ١٦٥٥١
Maltng (E).
علية تحويل الشيز وغيره من الحبوب الى ملت اي حبوب
ناشئة (نايئة) .

Qualité (F). Quality (E). - صَنْف ١٦٥٥٢
خاصة الشيء، أَمِيْرَة .

Hampe de la plume (F). - صَنْمَكَة ١٦٥٥٣
Staff of the feather (E).
قصة الريش استندت او غلظت .

Critère, Critérium (F). - صَنْهَج ١٦٥٥٤
Critérion (E).
هو طابع الحقيقة الحاسم الذي يمكن من التقدير والفصل.
ج. صناعج .

Pinus (S). Pin (F). Pine-tree (E). - صَنْوِير ١٦٥٥٥
جنس اشجار حرجية وصناعية من فصيلة الصنوبريات .
انواعها عديدة . سوفها متصبة . ثمرها صلبة . اغصانها
متفرجة . غراصمها ضيقة الاكواز . اوراقها ابيدة عديدة
مختلفة التجميع . ثمارها اكرارز ريمية الشكل او مردنية .
جميعها من الاشجار الخفيفة الشائعة الاستعمال ويستخرج
من بعضها مادة راتنجية لها استعمالها الصناعي المشهور .
أعرف واشيع انواعها المزروعة ما يتبع .

Pin blanc (F). - صَنْوِيرٌ أَيْبَسٌ ١٦٥٥٦
هو صنوبر ويموت ، اعطيه .

Pinus resinosa (S). - صَنْوِيرٌ أَحْمَر ١٦٥٥٧
Pin rouge (F). Red-pine (E).
شجرة صبروتية مهدا أمريكة البالية . خشبها أحمر اللون
غزير المادة الراتنجية . تملو من ٢٠ الى ٣٠ م . اغصانها
فاشحة . غراصمها جزوية حادة الحسل . نباتها خفيفة
قصيرة حراة اللون . اعدابها شفعية ، ثنائية التجميع . نصلها
خيشي الشكل بطول من ١٢ الى ١٦ سم . ويرمض نحو
١ م . وهو مسنن الحافة حائض الغضار . اكرارزها طرفية ،
صنيرة ، طولها نحو ٥ سم . وقطر قاعدتها ٣ سم . جرهاتها
صاحبة الشوژ لوها الى الجفرة الزرقاء المزاج . || يمش
ويجود في جميع المناطق المعتدلة والأترية الصيغة النور .

Pinus armandi (S). - صَنْوِيرٌ أَرْمَنْدِي ١٦٥٥٨
Pin Armand (F). Armand-pine (E).
شجرة صبروتية تريزية سرية السنو مهدا الشرق الاقصى
تكثر في الصين واليابان تملو من ١٥ الى ٣٠ م . اغصانها
افقية الاكواز . غراصمها ونباتها حادة المادة الشفعية
الزرجة . راعمها يفضية ، صنيرة ، ذلقة ومديبة . اعدابها
وربية . خالصة التجميع . نصلها جامد الصفة المنسلطة .
انسلطه مرقى الشكل يمس في حدود الزرام الاول . اكرارزها
غرويطية طرفا براوح بين ١٥ و ٢٠ سم . ويرمضها
الى ٨ م . لوها الى الخضرة النحاسية اللامعة . جرهاتها
مثلثة الزوايا . منسلطة القتره الدائرة الحار || يمش
في جميع اقاليم الصنوبر دين ان يتأثر كثيرا بنوع التربة .

ناعمة الرقعة ، شديدة الصلابة ، عطرية العرف لا تقربها
حشرة ولا يفسد الزن .

Santalum album (S). - صَنْدَلٌ أَيْبَسٌ ١٦٥٤٣
Santal blanc (F). White sandalwood (E). Weisser
sandelbaum (D). Sandalo bianco (I).
نوع من الصندل الترياني المشهور باخشابه الصناعية
الفاخرة وببطرة الطبي اثنائها الاستعمال || يرغب في
المواقع الحارة ذات الأترية الخسبة . يتكاثر بالبزور
ويبدل في سنوته دون الجوده الى المائل لانه لا يقوى
على القتل || ثمرته تملو من ٦ الى ٨ امار . خشبها
غزير المادة العطرية يحوى نحو ٥ ٪ .

١٦٥٤٤ - صَنْدَلٌ مَرْجَانِي *
Adenanthera (S). Adénanthere, Bois de corail,
Crêpe de paon (F). Red sandalwood tree, Coral
pea tree (E). Korallenbaum, Phänakamm (D).
Pavoncia, Sami di corallo (I).
شجرة حرجية طيبة صناعية وزيينة من فصيلة القرنيات
التريانية . مهدا البلاد الاسترانية . تملو نحو ١٢ م .
ساقها سرسة ، اوراقها متعاقبة مركبة ريشية . ازهارها
متلب التجميع ، مدني الشكل ، ابطى الاكواز . ازهارها
مختوية صغيرة الحجم ، حرشية الكأس والبرعمات ، ضية
الامدية الوردية . ثمارها قرون ليلية ضيقة مستطيلة محببة .
يزورها يفضية الشكل شديدة الصلابة تستعمل في صناعة
الصبغات . اغصانها مرجانية اللون صناعية . جلودها
طيبة مرقية .

Ptérocarpe santal (F). - صَنْدَلَان ١٦٥٤٥
هو التوز الصندل ، اعطيه .

Santalacées (S). - صَنْدَلِيَّات ١٦٥٤٦
Santalacées (F). Santalacées (E).
فصيلة ثنائية من ذوات الفلقين عديدة القمالات . اجناسها
واظنها عديدة تتجمع الى ثلاثة اسياط . لياتها احشاب
وبنيات وبخيرات مسطها يمش طويلاً برغم الحلية وعمل
وظيفة الخضيبية .

١٦٥٤٧ - صَنْدَقُ الْإِدْمَاعِ
Caisse de prévoyance (F). Foresight chest (E).
مشاة خاصة في بعض المصارف والشركات تنظم لاجل
تحسين حالة المستحقين والمال باقطاع نسبة مئوية من
اجورهم وادخارها لم يضاف اليها مشا من رب الحسل
او احباب الشفكة . واشهر ثرونها ان لا تكتف الى
احصائها الا عند مفاداة الشول .

١٦٥٤٨ - صَنْدَقُ الْتَوْفِيرِ .
Caisse d'épargne (F). Savings-bank (E).
نظام تقيمه بعض الحكومات والمصارف قواصة التشجيع
على التوفير وحمل الناس على الاقتصاد . فكل من يرغب
في الادخار يطلب دفراً يحرمه باسمه فيود يقتضاه مبلغاً
لا يقل من كمية محددة من شاد ذلك . ويحسب له ربح
على ودائمه . وله ان يسحب ما يرغب في محبه على ان لا
يتجاوز مبلغاً معيناً في يوم واحد .

١٦٥٤٩ - صَنْدَقُ الْوَزْمِ هَتْكَ
Caisse de manipulation (F). Manipulation chest (E).
صندوق ميكال الجوانب لا قتر له تزوم فيه باطات التبع
عند تقنيتهما سفوقاً متتابعة مراكبة الى ان تبلغ الارتفاع
المطلوب .



صندل ايبس



صندل مرجاني

Pin de Bunge (F). - صنوبر بُنْج

هو السنوبر الصيني ، أطلبه .

١٦٥٦٥ - صنوبر جُرْدِي

Pinus montana (S). Pin à crochet, P. mugo, P. de montagne (F). Swiss mountain pine (E). Krummkiefer, Mugokiefer (D). Pino mugo, P. alpino (I). شجرة سريرية تملو من ١٠ إلى ٢٥ م. أغصانها مخفية. قنبا مخروطية الشكل، أحداها شفافة ثنائية التجميع. تصلها إلى الأغصان المايك. أكرانها مستطيلة حادة التناسق. جرهاتها جزئية اللون ، بارزة القتره المنقطة السن || يعيش في جميع الأثرية الجبلية وبين الصخور ، يتصلل الجرد المستمر ولا عشاء .



صنوبر اسود

Pinus halepensis (S). - صنوبر حَلَسِي

Pin d'Alep, P. de Jérusalem (F). Aleppo pine tree, Jerusalem pine (E). Aleppokiefer, Aleppokiefer (D). Pino d'Aleppo, P. di Gerusalemme (I). شجرة سريرية تملو من ١٥ إلى ٢٥ م. أغصانها مخفية. خراصها سطحة اللون. نباتها دقيقة. براعمها يفسية الشكل زاهر الأغصان يطول نحو ٨ سم. ويغرس من ١ إلى ٢ م. أكرانها مدينية طويلا نحو ١٢ سم. وقطر قاعدتها ٤ سم. جرهاتها شاربة القتره المنبسطة لونها إلى البجوة السهام اللولج || يالفت الأثرية الجبسية ويجود فيها تمامًا .



صنوبر بحري

Pinus excelsa (S). - صنوبر حَمَلَايَا

Pin pleureur de l'Himalaya (F). شجرة جادة صناعية وزينة سرية السنو تملو من ٣٠ إلى ٥٠ م. أغصانها أفقية فاشرة. نباتها غليظة الاطراف المتدلية. براعمها يفسية ، مقطوعة ، حادة الزائنج والمادة الصمغية. أحداها وثرية ، خاسية التجميع. تصلها جامد الشمية القليطية للشعرار. أكرانها مخروطية طويلا يراوح من ١٥ إلى ٢٥ سم. ويغرسها من ٤ إلى ٧ م. لونها إلى السمرة الخفيفة السهام اللولج. جرهاتها لامية القتره المستديرة البارزة || يرغب في الأقاليم والمواقع الرطبة .



صنوبر برّي

Pinus cembra (S). - صنوبر كَمْبَرُو

Pin cembra, Ahvier, Arolla, Auvier (F). شجرة سريرية تملو من ٨ إلى ٢٥ م. ساقها متعنية متناوبة الاوصاج. أغصانها خضرة. خراصها ونباتها غليظة، كثيفة الزغب المتسطل. براعمها يفسية الشكل مدبسة الاطراف. أحداها وثرية ، خاسية التجميع. تصلها جامد القصصه يطول نحو ٧ م. لونها إلى الحمرة الزرقة. أكرانها مخروطية ، مقطوعة للقواعد طويلا نحو ١٥ سم. وقطر قاعدتها ٦ سم. جرهاتها نازلة القتره القديمة القدية ، لونها إلى السمرة البنفسجية .



صنوبر جردِي

١٦٥٦٦ - صنوبر صِينِي، صنوبر بُنْج

Pinus bungeana (S). Pin de Bunge (F). شجرة كبيرة اللد منها الصين. ساقها متعنية تملو من ٢٥ إلى ٣٥ م. قنبا اجاسية الشكل. قشورها سلفة مستطيلة الصفائح. أغصانها أفقية الجلبوس. أحداها وثرية ، ثلاثية التجميع. تصلها جامد اللسيح. وأبعت الأغصان يطول نحو ٩ سم. أكرانها صديرة اللد ، يفسية الشكل ، تطول نحو ٦ سم. جرهاتها بارزة القتره القديمة لونها إلى الحطلي الاسمر اللولج || يزود لاحتياجه الجيدة الصنف لكنه يمتد من الانواع الجاسية التي لا تجود الا في مواقع خاصة ضمن اقل من ميين .



صنوبر حلبي

١٦٥٦٦ - صنوبر أسود*، صنوبر لَرَسِيو

Pinus laricio (S). Pin noir, P. laricio, P. de Corse, P. d'Austria (F). Corsican pine, Austrian pine, Larch pine (E). Schwarzkiefer, Korssischeichte (D). Pino laricio, P. di Corsica (I). شجرة خضرة دائمة. ساقها تملو من ٣٥ إلى ٥٥ م. قنبا هزينة الشكل. أغصانها مخفية فاشرة. خراصها ونباتها غليظة الجبس حشوة اللون. براعمها يفسية مدبسة الاطراف. سراسفها كثيفة متراكبة ذرية. أحداها شفافة. ثنائية التجميع. تصلها جامد الصفصه. مسن الحلقه ، بحري اللون. أكرانها مخروطية تطول نحو ٧ سم. وقطر نحو ٣. جرهاتها بارزة نازلة ، قنبا متصالية التحديد لونها إلى الحطلي الاسمر يطول موالج اصفر || يرغب في المواقع الرطبة ومن الانجبار السرية اللنو .

Pinus taeda (S). - صنوبر البَحْرُو

Pin à l'ancens (F). شجرة سريرية خضرة تملو من ٣٠ إلى ٥٥ م. أغصانها مخفية فاشرة. خراصها ونباتها كثيفة التجميع حشوة اللون. براعمها مخروطية ، جزوية الحراشف المخزفية. أحداها وثرية ، ثلاثية التجميع. تصلها جامد الصفصه بحري اللون يطول نحو ٢٥ سم. ويغرس ٢ م. أكرانها مخروطية الشكل تطول نحو ١٥ سم. وقطر نحو ٤ سم. لونها إلى السمرة السوداء البارزة ، جرهاتها مدينية القتره النازلة القليطية الشديدة || يمتد من الانجبار السرية اللنو التي تجود في جميع المواقع والأثرية المتوسطة للرطوبة. خشبه زفير المادة الزائنجية البخورية العرف .

١٦٥٦٦ - صنوبر الكُتْبَان

هو السنوبر البحري ، أطلبه .

١٦٥٦٢ - صنوبر بحري*، صنوبر الكُتْبَان

Pinus pinaster (S). Pin maritime, P. de Bordeaux, Pinastro (F). Swamp pine, Sea-side pine, Clustar-pine, Pinaster (E). Starnkiefer, Seckiefer, Bordeaux-kiefer (D). Pino maritimo, P. pinastro, P. di Bardo, Pinastro (I). شجرة سريرية كبيرة خضرة. ساقها تملو من ٣٥ إلى ٤٥ م. قشورها صلفة مستطيلة التصليح لونها إلى الحمرة البنفسجية. أغصانها غليظة متوسطة الانفرج. خراصها جزوية اللون. براعمها مخروطية الشكل كثيفة الحراشف المتراكبة. أحداها شفافة ، ثنائية التجميع. تصلها جامد اللسيح ، داكن الأغصان يطول نحو ٣٥ سم. أكرانها مدينية الشكل متدلية تطول نحو ٢٥ سم. لونها إلى البجوة المايكة للامسة. جرهاتها بارزة ، قبة الشكل عددة القتره || يعيش في جميع الأثرية . اقلية المناطق الساحلية اصنها الاماكن الرطبة حيث لا يصلح غيره .

١٦٥٦٣ - صنوبر بَرْي*، بَرُو

Pinus sylvestris (S). Pin sylvestre, Pinasso, Pin de Norvège, P. d'Ecosse (F). Scotch pine, Birk apple (E). Nordische Kiefer (D). Pino sylvestre, P. solvatico, P. comune (I).

شجرة سريرية تملو من ٢٥ إلى ٤٥ م. أغصانها قليلة الانفرج. خراصها شفافة متعاقبة. نباتها مخروطية الشكل سراسفها مدبسة. أحداها شفافة ثنائية التجميع ، تصلها إلى الأغصان الازرق. أكرانها مدينية طويلا نحو ٨ سم. وقطر قاعدتها ٣ سم. جرهاتها فاشرة الحطار. يزوها دقيقة مجنسة || ترغب في الأثرية الرملية .

الحراشف والأشمل. اهدابها وريّة، ثلاثيّة أو خماسيّة التجميع، نصلها جامد الصفحة الخيطيّة، نونها إلى الزرقاء البهريّة. اكرانها غرملية، طولها نحو ٨ سم. وعرضها ٥ سم. لونها إلى الصفرة المائلة للذمّة. بذورها لوزيّة الشكل مأكولة البياض. البويجا يبغي الشكل يطول نحو ١٠ سم. ويعرض من ٧ إلى ٨ سم. وهو مستحب الطعم غريب المادّة البنيّة.

١٦٥٧٦ - صَوْبَر قُصِير *
Pinus pinea (S).
Pin pignon, P. pinier, P. parasol, P. bon, P. d'Italie (F). Italian stone pine (E). Steinkiefer, Italienischekiefer (D). Pino pinea, P. da pinocchi, P. gentile, Pignolo (I).

شجرة سرّويّة تكثر زراعتيها في لبنان وفي مختلف تهايم وهضاب المتوسط من فلسطين إلى إيطاليا والأندلس. ساقها جالسة منتصبّة تملو من ٢٥ إلى ٣٥ م. قشورها مقلمة، صفراء، حمراسة الطبقات. اغصانها خليطة فائضة. قنّتها مظليّة الشكل. غراعيها حنطية اللون، صفراء المواج. نباتها مستقيمة. راعمها اسطوانية، سارفعها جالسة الكروبي ناشزة. اهدابها شعيّة، ثنائيّة التجميع، نصلها جامد الصفحة، عاين الحصار، يطول من ١٢ إلى ٢٥ سم. ويعرض نحو ٢ سم. اكرانها بيضيّة الشكل مقلمة القاعدية، طولها يراوح من ٨ إلى ١٢ سم. وعرض قطرها من ٦ إلى ٨ سم. جرهاتها شاذّة ناشزة، لونها إلى الجفوة الصنّاية السعفاء المواج || يعيش ويجمود في جميع الأترية إلا أنه يطير النور. بذور ثماره مأكولة وتستخدم في الطعام والحلويات.

١٦٥٧٧ - صَوْبَر متفحّي
Pinus palustris (S).
Pin palustris (F). Pitch-pin (E).

شجرة كبيرة اللد تملو من ٣٥ إلى ٤٥ م. ساقها جالسة منتصبّة كالشعنة. اغصانها ضنّية أفتيّة الارتكاز، غراعيها وبناتقها كثيرة العدد متراكبة. راعمها بيضيّة الشكل، قنّية الحراشف القلبيّة. اهدابها وريّة، ثلاثيّة التجميع، نصلها جامد الصفحة يطول من ٢٥ إلى ٤٥ سم. ويعرض نحو ٢ سم. اكرانها غرملية تطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. ويعرض من ٥ إلى ٨ سم. جرهاتها حنطية اللون يطولها مواج آخر || يرغب في الموالع الرطبة العميقة النور. أحشاياه لينة، جيدة الصنّف، شاملة الاستعمال المنزلي والصنّاعي.

١٦٥٧٨ - صَوْبَر مَتَّى
Pinus lambertiana (S).
Pin à sucre (F).

شجرة سرّويّة جبابرة بطيئة النمو تملو من ٥٥ إلى ١٠٠ م. مهادها البلاد الاسريكيّة. تحب في الأقاليم الرطبة والباردة. العميقة النور. غصنها ثقيل الوزن، أصفر اللون. احر الفصل. اغصانها ضنّية فائضة. راعمها خلدريّة الشكل، متراكبة الحراشف الجفوية اللون. اهدابها وريّة، خماسيّة التجميع، نصلها شديد الانعصار، جامد الصفحة الملتفة الزوايا، يطول نحو ١٥ سم. ويعرض ٢ سم. اكرانها غرملية كبيرة اللد طولها يراوح من ٣٥ إلى ٥٥ سم. وعرضها من ٨ إلى ١٢ سم || وهو يتنبّز بما تفرزه بناتقه وراعه من مادة سكرية تخبّه المنبت.

١٦٥٧٩ - صَوْبَر وَيَمُوت * صَوْبَر أبيض
Pinus strobus (S). Pin weymouth, P. blanc, P. du Lord (F). White pine, Weymouth pine (E). Weymouthskiefer, Gemeine Weimutskiefer (D). Pino di weymouth, Pino bianco (I).

شجرة كبيرة الحجم تملو من ٣٥ إلى ٥٥ م. اغصانها

١٦٥٧٠ - صَوْبَر كَثِيف الزَّهَر، صَوْبَر ياباني
Pinus densiflora (S). Pin densiflora (F).
شجرة سرّويّة مهادها اليابان تملو من ٣٥ إلى ٤٥ م. شكلها شكل الصنوبر الحلي. اغصانها متفرّبة. غراعيها حنطية اللون. بناتقها خليطة. راعمها خلدريّة ضنّية الحراشف. اهدابها شعيّة، ثنائيّة التجميع، نصلها إلى انضار الأزرق يطول من ٨ إلى ١٢ سم. ويعرض نحو ١ سم. انضارها كثيفة متراكبة. اكرانها ريمية صغيرة اللد، جرهاتها منتصبّة متوسطة النشور لونها إلى الحمرية الطمدا المواج || يعيش في جميع الأترية والموالع المعتدلة وهو في الأقاليم الرطبة أسرع نمواً وأقل مادة وانتجية.

١٦٥٧١ - صَوْبَر كَثِيف
Pinus brutia (S).
Pin de Calabre (F). Calabrian cluster pine (E). Kalebriischekiefer (D). Pino calabrese (I).

شجرة سرّويّة تملو من ٢٥ إلى ٣٥ م. اغصانها متفرّبة. غراعيها طمدا اللون. بناتقها خليطة. راعمها خلدريّة. اهدابها شعيّة، ثنائيّة التجميع، نصلها غصلي الشكل، باعت الحصار، يطول من ١٤ إلى ٢٥ سم. ويعرض من ٢ إلى ٣ سم. اكرانها ريمية، طولها نحو ٨ سم. وقطر قاعدتها ٥ سم. جرهاتها عددة الثرة القليلة النشور. لونها إلى السرة الصنّاية السعفاء المواج || يعيش في جميع الأترية والموالع المعتدلة.

١٦٥٧٢ - صَوْبَر كنّاريّة
Pinus canariensis (S).
Pin des Canaries (F).

شجرة كبيرة اللد تملو من ٣٥ إلى ٤٥ م. ساقها فراء. فرصها ضنّية صغيرة اللد. غراعيها غمليّة. بناتقها وراعه منتصبّة الحراشف المائلة الأطراف. اهدابها وريّة، ثلاثيّة التجميع، نصلها يطول من ٢٥ إلى ٣٥ سم. ويعرض نحو ١ سم. اكرانها غرملية مستطيلة، لونها إلى الجفوة اللامدة، متوسط طولها نحو ١٨ سم. وعرضها ٥ سم. جرهاتها عميقة الفتحة البارزة المهددة || يعتبر من الانواع البرّيقية المعتدلة القسور.

١٦٥٧٣ - صَوْبَر كُوْرِيّة
Pinus koraiensis (S).
Pin de Corée (F).

شجرة دائمة تملو من ٣٥ إلى ٤٥ م. اغصانها ضنّية كبيرة. غراعيها وبناتقها خليطة ضنّية اللون. راعمها خلدريّة، قنّية الحراشف. اهدابها وريّة، خماسيّة التجميع، نصلها مقنن الصفحة، سنن الحافة، يطول نحو ١٢ سم. اكرانها غرملية خليطة، طولها يراوح بين ١٢ و ١٥ سم. وعرضها من ٥ إلى ٧ سم. جرهاتها مظنة الزوايا، ناشزة الفتحة، لونها إلى السرة الصفراء || يعتبر من الانماذج السرّويّة البرّيقية اللريمة النوراني تجرد في جميع الأقاليم والموالع المعتدلة الرطوبية.

١٦٥٧٤ - صَوْبَر لَرِيصِيُو
Pin Laricio (F).
هو الصنوبر الاسود، اعطيه.

١٦٥٧٥ - صَوْبَر لَوْرِي
Pinus edulis (S).
Pin à amandes (F).

شجرة سرّويّة زراعية متوسطة الحجم مهادها بلاد المكسيك وجولها. تملو من ٣ إلى ٦ أمتار. قنّتها هرمية الشكل. اغصانها متوسطة الانعراج. غراعيها وبناتقها خليطة الأطراف. راعمها خلدريّة، حنطية اللون، غصبره



صنوبر مشر



صنوبر ويوت

١٦٥٩٣ - صَوَادِي
الصودي : التخلط الطوال وقد تكون بمعنى التي لا تشرب .

١٦٥٩٤ - صَوَاوَر
Troupeau de gros bétail (F). Drove of cattle (E).
هو قطعان البقر والجواميس .

١٦٥٩٥ - صَوَاوَر
هو الصنفور الذي يجب اذا دعي .

١٦٥٩٦ - صَوَانٌ ، ظِرٌّ
Silica, Silica (F).
Silica (E).
هو السيليوس .

١٦٥٩٧ - صَوَانَاة
هي السيلكا ، الحلبا .

١٦٥٩٨ - صَوَانِي
Granitique (F). Granitic (E).
ما كان تركيبه من الصوان .

١٦٥٩٩ - صَوَاي ، زَاوِي ، زَاوِي
Mareca (E).
Marica, Marique, Canard siffleur (F). Widgeon (E).
جنس طير من البطيات اقله ثلاثة واحد اسوي واثان
امريكيان . جميعها كبيرة الجثة ، حادة الزنبرك ، تتميز
بمنقارها المفلطحة التي لا يعادل طرفها طول الراس . مناقشها
صغيرة متبادلة ، اجنحتها متوسطة اقله زائفة ، تقضم
الاشعاب كالوزن ويتجنب غمر الحلق والامساك كما يفعل
البط || اما انواعها الثلاثة فهي :

M. americana (S).
صَوَاي امريكية

Mareque americaine (F).

M. penelope (S).
صَوَاي الشرق

Mareque pénélope (F).

M. sibiriazix (S).
صَوَاي سيبالان

Mareque de Magellan (F).
نحس منها بالتحلية الصواي الشرق .

١٦٦٠٠ - صَوَاي الشرق *
Mareca penelope (S).
Marque pénélope, Vinçon (F). Widgeon (E).

طائر من الصواي ربع الجثة طوله نحو ٥٥ سم . قروسة
مناكب الالوان ، جميل الزوايق والتركبة . فيه الابيض
والاصفر والاخضر والصنابي والرمادي والاسود والاسود .
هناك صنفين . متقارب الى قزعة الحمار . ساقه وباعدتان .
وعو من القواطع يحرب الشرق والغرب ، يألف البسرات
ويجاري الاخر . قوة الاشعاب وسطى اللبويات المائية .
يشن عصفه في العشب حل ضفة الماء . انهاء تبقي وتجنن
من ٨ الى ١٠ بيضات . يألف السنين اذا اضل صغيراً
لكنه يتطلب الكثير من الماء وما يتبع الماء من التفرجات
والخضرات || سره متفاوت القدر يحد من ٢٥ الى ٨٠
واكثر .

١٦٦٠١ - صَوْب
Point de direction (F).
Point of the direction (E).
نقطة الاتجاه .

١٦٦٠٢ - صَوْب
الصوب : تزول المطر . صاب المطر صوباً وانصاب :
انصب وهطل وأهمل .

١٦٦٠٣ - صَوْبَة
Tas de graines (F).
Heap of seeds (E).
الكومة من الحبوب على اختلافها .

١٦٦٠٤ - صَوْنَت
Voix (F). Voce (E).
الصوت هو حركة اهتزازية تحدث من اضطراب الاجسام
المادية كالغواء فيمثل اقترابها الى الاذن || ويطلق الصوت
على الاحساس السمي نفسه || ولكي يكون الصوت

خسنة فاشرة . نخرها وبناقلها غليظة ، قلبية الزنب .
راعها يضيء الشكل مدنية الاطراف . حوافها تينية
اللون يضاء اخضر الكيف الزنب . اهدابها ودية ، خلية
التصنج ، فصلها ثلاثي الزوايا ، جامد الصفة ، يجري
اللون . اكرادها مدنية الشكل طول نحو ٢٠ سم . وتعرض
اجنحتها منخفضة الحافة ، منبسطة الفترة المتساوية
الصفة . لها الى السرة الخفية || يرغب في الاثربة
الريالية والمواقع المعتدلة الرملية وهو فيها سريع النمو .

١٦٥٨٠ - صَوْنَر يَابَانِي
Pin densiflora (F).
هو الصنوبر الكيف الزهر ، اطلبه .

١٦٥٨١ - صَوْنَرِيَّة ، صَوْنَرِيَّة ، كَرَز
Cône, Pomme de pin (F). Pine-cone, Fir-cone, Fir-nut (E).

شكل من اشكال الباز . وهي ايضا ثمرة الصنوبر والارز
والتنوب وغيرها من اشجار فصيلة الصنوبريات . تحليتها
العلمية : محور وصفت عليه قنابات ليفية جامدة تنمى
جهرات تحمل كل منها غشاء وبرتيتين مجتمعتين .

١٦٥٨٢ - صَوْنَرِيَّات ، صَوْنَرِيَّات
Coniferae (S). Coniferae (F).
فصيلة نباتية من باديات الزهر هريانة اليزور تشل
ثلاثة اسباط : التنويات والسرويات والطقوسيات .
اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها اشجار راتنجية صناعية
شائعة الاستعمال .

١٦٥٨٣ - صِهَاء
Sources d'eau (F). Springs (E).
الصهاء : منابع الماء .

١٦٥٨٤ - صِهَارَة
Magma (F). Magma (E).
الصهارة وتسمى منيا كل مادة يوشه فيه مائعة كالزجاج
المصهور او كالمنصهر الذي يغلف به البركان عند ثورانه .

١٦٥٨٥ - صِهَارَة
Mottle (F). Marrow, Mechella (E).
هي الشحاح الشرقي وهي المكاء .

١٦٥٨٦ - صِهَاء
Vin blanc (F).
Colourless wine (E).
الخمر البيضاء .

١٦٥٨٧ - صِهْبَة
Enologie (F). Enology (E).
علم صناعة الخمر يشمل كل ما يتعلق بصنعها وتحليتها
وسقظها الخ .

١٦٥٨٨ - صِهْرِيح
Citerne (F). Cistern (E).
وعاء يحكم البد كثير الاستيعاب يستعمل لنقل السوائل .

١٦٥٨٩ - صِهْجَل
Hennissement (F). Neighing (E).
صوت الخيل حاة .

١٦٥٩٠ - صَوُّ
هي الجباري الصغيرة ، اطلها .

١٦٥٩١ - صَوْرِيَّة
Rationalisme (F).
Rationalism (E).

الصوادية مذهب فلسفي لاهوتي يعتبر العقل محور السلطة
وبرسمها ارسيد فينفي الرحي والتسلسل الى العرف التقليدي .

١٦٥٩٢ - صَوْرَاج
Pollen
غبار الى الصفرة مكون من جذرات الطلع ينشأ في المبر
اي في الجزء الاعلى من السداة وذلك في باديات الزهر .



صواي الشرق

صوت الظلم	المرار	مسموحاً يجب ان لا تقل ذبذباته في الثانية عن ٣٠ احترازة
صوت الضج	المشعر	ولا تزيد عن ٣٠٠٠ اما سرعته في الهواء فمسلماً ٣٣٠
صوت المفق	التمعقة	مترًا بالثانية وهي تتأثر بشده وبالموسط الذي ينتقل فيه.
صوت التقلب	التدثله	اما سرعته في الماء فتبلغ ١٤٣٥ مترًا ولصوت اسماء
صوت الذئب	الأمراء	كثيرة عند الحيوان والطيور ، ذلك لان الاصوات تختلف
صوت الثور عند الذعر	التمسكة	مع اختلاف مصادرها وقد وضعنا في الجدول التالي ،
صوت البيلبل	القتل	الذي نودوه ايجدياً ، كل ما تيسر من هذه الاسماء :
صوت الحية من لها	الفحيح	صوت الممزي
صوت الجندب	الفصيص	صوت البيط
صوت الخنزير	القيح	صوت قطبية
صوت الفحل من الابل	القيبية	صوت ثقب الخيل عند حفرها
صوت الفحل من الابل	القرقرة	صوت المكاء
صوت القبع الاتي	القشاح	صوت المصفور
صوت القطا	القططة	صوت الذئب
صوت العقاب	التمعقة	صوت القفان
صوت البير	التلخ	صوت البقرة
صوت الدب	القفحاق	صوت الحام
صوت الدجاج	التمعقة	صوت الحيطان
صوت الدجاجة	القرقاء	صوت الدواب عند طلبها الملق
صوت الابل	الكث	صوت الحرة في نعامها
صوت الجباري والسرکه	الكثكنة	صوت الخيل من بطونها
صوت الابل	الكش	صوت الخيل عند طلبها الملق
صوت الحية من جلدها	الكشيش	صوت البقر
صوت الفأرة	الكعيس	صوت الفأنة المرضع
صوت الغراب المجهود	الكيد	صوت ذوات الخلف
صوت القلق	القلقة	صوت البيط والاوز
صوت الحر	المواء	صوت الغراب
صوت الكلب	التيح	صوت الفحل من الابل
صوت التيس	التيب	صوت البؤ
صوت الظبي	الزيب	صوت القرد
صوت الغراب (بالين)	النبيب	صوت المصفور
صوت الغراب (بالخير)	التنبيق	صوت النمامة
صوت الدجاجة	التمعقة	صوت الاسد
صوت الضفدع	التنبيق	صوت القمري
صوت الاسود	التهبت	صوت البغل
صوت الحير	التهيق	صوت البغل
صوت الفيل واليوم	التشم	صوت الكيش والتيس
صوت المهدد	المهددة	صوت الحمار
صوت الابل	المندبر	صوت العصف
صوت الحام	المندبل	صوت البزاة
صوت الضأن	المرهرة	صوت الجراد
صوت الكلب عند الاستنكار	المرير	صوت النمرود
صوت الورشان	المرت	صوت الديك
صوت صفار الصماقير	الروصيح	صياح الطائر
صوت الذئب وابن آوى	الروصعة	صوت الخيل
صوت العصف	الرق	صوت الفيل
صوت الخيل من بطونها	الوطيب	صوت الديك خاصة والطيور عامة
صوت الابل	اليعار	صوت الثعلب

١٦٦٥ - صوجان ٥

Helminthosporium, Ophiobolus (S). Helminthosporiose (F).

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشويات . يتميز باصان ضخمة ، متسمة ، ظاهرة الملق ويبرغ وقيري الخلية ، غطلي الشكل ، متوازي الترتيب. نجمه تكات مستطيلة || انواعه المعروفة اربعة تحديدها ما يلي.

صوت نفس الخيل عند حفرها
صوت القرد
صوت الكلب عند الجرح
صوت الاوز
صوت القوق
صوت التيس عند الملاج

الضج
الضحك
الصفاء
الضغاب
الضلع
الغلاب



صوجان ائيع



صوجان الارز



صوجان الحب



صوجان الزروع



صوجه



صوجان

أقلبها افصح من اقليم القاصوليا لانها ائيع منها حل ائيع
الحرق والرر || تبلر عادة في ايار يسطل و او ه كيلو
لدم الواحد الذي يراور مدل ائيعه ائيعه ٢٠٠
٣٠٠ كيلو من الحب ويصو ٣٠٠٠ كيلو من كلكاه
الاخضر || اما المواد الغذائية التي تتركب منها الصوصه
فهي ، بالنسبة الى الخلطة والقمح ، ما يلي :

النوع	مواد ازرقية	مواد دعينة	مواد هيدروكربونية
صوجه	١٧,٥٠ %	١٧,٥٠ %	٩,٥٠ %
حقة	١٢,٥٠ %	٥,٥٠ %	٦١,٥٠ %
لم يقر	٢٢,٥٠ %	٢,٥٠ %	-

ومن الاطباء من ينصح باستعمال دقيقها هوصاً من
الخلطة وذلك لمن كان مصاباً بداء السكري || ويستخرج
من صوجان مادة دعينة غذائية شائعة الاستعمال ، اما كسبها
فيليد الحليب ويزيد فيه نسبة البقيد || اما علفها فتاجع
في جميع المواني (راجع جدول المواد الغذائية).

١٦٦١١ - **صَوْح** (F). Dried (E).
صوج و صوج البقل ، ثم يسه ، يقال صوصه الربع .
أليسته ، وتصورح من الجرد ، ييس .

١٦٦١٢ - **صَوْعَم** (F). Barroale (S). Barroale (S).
الواحدة صوصة || جلس الحجار وشجيرات برية وزراعية
لزيوتية من فصيلة القرعيات . انواعها المعروفة عديدة منها
المنطق الحارة والاسنولية من القلائد الاسيوية والافريقية ||
صوجها فرها . ائيعها متعاقبة . اورانها متعاقبة ، منعقة ،
سنانية اتصال الجالدة . ازمارها عشوية ، فسية التجميع ،
محورية الارتكاز . ثمارها كروية ، مكلفة بائان
التوزيع || اورانها فصصة المالح ، طيبة ، تستعمل في
معالجة اللباج والتباب غاطية القم .

١٦٦١٣ - **صَوْدَا** (F). Soda, Kall (E).
الصودا كايوا مركب من الصوديوم والاكسجين اما
تجارياً فهي مركب من كربينات الصوديوم المتعادل .

١٦٦١٤ - **صَوْدِيُوم** (F). Sodium
فلز ابيض نقي المالح ، شديد القوة ، اسادي التكاثر .
وزنه (ص-ب) ٢٣ ، وزنه الذوي ٢٣ ، ثقله الذوي ٩٦٠٠ .
يتصهر في ٩٦ بسخ || وهو سريع الصدا في الهواء
الطلق ولا يوبد منفرداً في الطبيعة بل متعادلاً بمناس
اخرى يذلل معها تختلف المركبات ، اهمها : كلوريد
الصوديوم او ملح الطعام ، ونيترات الصوديوم او ملح
البارود ، وكربينات الصوديوم او البترون ، وبيكربونات
الصوديوم ، وكربينات الصوديوم او سلفات الصودا .

١٦٦١٥ - **صَوْر** (F). Palm-grove (E).
الصور هو الخيس من النخل في اي تربة كان .

١٦٦١٦ - **صَوْرِي** (F). Feigned (E).
نعت تعري يطلق على كل حقه ليس له وبيد قانوني حل
الفرغ من مظاهره وشكله كالحب الصوري مثلاً .

١٦٦١٧ - **صَوْص** ، **قُوب** ، **كَنْكُوت** (F). Poussin (F). Chick (E).
صغير البجاج من يوم تفقه من البيضة الى حين تزويجه .

١٦٦١٨ - **صَوْلَاة** هي الاشراس ، اخلية .

١٦٦٠٦ - **صُوجَانْ أَيْع** *

Ophiobolus herpotrichus (S). Pictin (F).
نطر مجهري يصيب بعض التنبليات انحصا الخلطة .
مظهره الخارجى يقع بحر تركب الساق من عتقا وسامدا
فخصها بعد ان تثل فيها الحركة النسبية || اغرارها
تختلف باختلاف نشاطها وما يرفقه من عوامل مشجبة او
قائمة . وان رده الرياح في الارض قبل ادخال الحب نفس
ونوى .

١٦٦٠٧ - **صُوجَانْ الْأَوْز** *

Helminthosporium oryzae, *Ophiobolus myribeanus* (S).
Helminthosporiose du riz, *Burnson* (F). *Stripe disease of barley* (E).
نطر مجهري يركب الارز فيسطيه || مظهره الخارجى
يقع صفة فسية الين تمتد وتتفرع ويتم كامل فصل
الثران قسب استمرار واصفراره وذوبله . يعد يايه
عصيات الحب يقشها بكتات سود تملب اللب وتجلده .
يكافح بطهير البذار وباحتجاب الموانع الملوثة .

١٦٦٠٨ - **صُوجَانْ الْحَب** *

Helminthosporium sativum, *H. sorokinianum*,
Ophiobolus sativus (S). *Helminthosporiose des grains* (F). *Spot blotch of barley* (E).
نطر مجهري يصيب الخلطة والشرير والشلم وبعض
التنبليات البرية ومنها التيل || مظهره الخارجى يقع
لاقياسية الحميم تركب فصل العصف . اما الفطر فيران
حية البذار من يوم انتائها وتكون جلوريا حتى
اسبالها وتحميها حيث يسلب الحب ليدور مرطاً وعقداً .
اغرارها محدودة لانه لا ينتشر الا بطروف خاصة من
الحرارة والرطوبة .

١٦٦٠٩ - **صُوجَانْ الزُّرُوع** *

Ophiobolus graminis, *O. cariceti*, *Sphaeria cariceti*,
Rhaphidophora graminis (S). *Pictin des céréales* (F).
Take-all of wheat (E). *Schwarzbeinigkeit* (D).
نطر مجهري يصيب الزروع انحصا الخلطة ليؤذيها وقد
يمتدح من ادخال الحب || مظهره الخارجى يقع حطية
هاقية تركب سلاحيات العنصب من البلمان والخارج قنشل
التبادل التنسي وتسبب اصفرار العصف وذوبله قلمه الجلور
والسوق || اغرارها جسيمة لانه يحول دون ادخال الحب
فتبدو السلاحيات يضاء اللون فارغة .

١٦٦١٠ - **صُوجَة ، صَوْتَة** *

Glycine hispida, *G. soja*, *Soja hispida* (S). *Soja*, *Soja*,
Haricot soja (F). *Soja bean*, *Soys bean* (E). *Soja*, *Soy*,
Jasidbohne (D). *Soja*, *Sola*, *Fava soja* (I).
نبات عشبي زراعي صناعي وكلائي من فصيلة القرعيات
الغرافية . مهد الشرق الاقصى وقد تمت زراعتهم مسطر
اصطاع العالم نظراً لوائده الاقتصادية ولارتفاع نسبة ما
يصويه حبه من المواد الازوتية والدعينة || اسمها الصيني
« قيو » والياباني « دندو » وهي حبة حولة فرها تملر
نحو ١٥٠ سم . فريها حطية متعاقبة . اورانها مركبة
طويلة الزناد ، ثلاثية الوريقات السنانية اللدقة . ازمارها
عشوية التجميع ، محورية الارتكاز . ازمارها يتفشي
اللون او صفراء . ثمارها قرن صغيرة التسد ، قليلة
التجميع ، حلية القشور ، تغلف من حبتين الى خمس حبات .
اصرارها المشهورة نحو ١٦ تخلف البازا حبا وما تحويه
من مواد دعينة وصلحياتها للاطعم والثرية لذلك فهي
تجود في جميع الارربة المصببة والتوصلة الحصب والاندماج .

١٦٦٢٦ - صَوَفَان حَلَكِي *، حَافَرِيَّة حَلَكِيَّة

Ungulina annosa, Fomes annosus, Polyporus annosus, Trametes radiciperda (S). Polypore annelé, Maladie du rond des pins (F).

فطر من السيات ركب التنوب والعنبر والايصه والعمر والابل والبتلا والصربه || يصيب الجذور يقضي على جرادتها ويهينا ويصيب السخ يقضي على الماء والشكير دين ان يترس الخشب لان الراتنج يحول دين انتشاره ، يعلو الى الجردة والشكير اطارات حلقة متتامة ذاتجانية اللون تنحرف الى السرة عندما يبدأ حيث المشج بعمله الاجتلاي في الاجزاء والمواد الخفيفة || اما القطر فلا يعلو سطح التربة وهو صغير القند حافري الشكل ، قطر قاعدته براوح بين ٣ و ١٠ سم. ثوبه الى الصلبة الحنطية. لياه غير اللون ، لني التركيب او غليي || يورناغه يقيسه قياسها ٤x٦ ميكرون .

١٦٦٢٧ - صَوَفَان كاذب *، فِلِينْس مِلْهَاب *،

Phellinus igniarius (S). إسكَا
Faux-amadouvier, Apoplexie, Esca (F).

فطر من السيات موطنه البلاد المعتدلة الحارة والباردة . ركب حلة ألياف حرجية انحصاها الاسفندان ، البتلا ، الجزء ، الخور ، الدوار ، الشرم ، الصفصاف ، الفاسول ، الصبراء ، القرونس ، الخش ... وركب من النباتات الزراعية التفاح والكرز والكزبة || مشبهه اغبر اللون يدخل من الجروح اليابسة فيطب في الاتجار الحرجية طبقاتها الخشبية حتى القلب ويطب الفكر في الجزء والستديان . وقد يدوم حصة سنوات لانه يطوي السنو والانتشار . ويكون الخشب الموصوم شديد السرة او زاهي الصفرة عدم الحيوية سريع الانتعاش || وهو في الكزبة رسم ونمى القالبه لانه يقضي على الحفلة بسرعة بعد ان يعطب الحماء والياب الساق والجهاز الوعائي الذي يؤذن نقل النسغ وتبادلده || يكافح بقتلها باسبور بعض المظهرات والمثالة الموكزة على مادة التروبيخ || اما القطر فتتوسط القند ، قبي الشكل ، قطر قاعدته براوح بين ١٠ و ٣٠ سم. لحدائده قليلة صميكة ، محدودة صهبا اللون او قزينة ، زيا السطح خيرا العمل || لياه محتلي اللون جامد الملقح الناعم . وهو من الفطور التي تمر من ٥٠ الى ٩٥ سنة .

١٦٦٢٨ - صَوَفِيَّات *، Coniopterygidae (S).

Coniopterygidae (F). Caniopterygidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة شرافات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الباردة والمعتدلة الحارة ، تألف النباتات . حشرات الاجلولة تعيش على تنس الاججار . يرقاتها مفرقة تعيش خاصة على الارق والخشيات || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٥ سم. بطسها تراوح من ٥ الى ١٠ سم. قشارها مغلول بمادة سطلية الكالتيق . وهي مجهزة بنقد خاصة صميكة في جميع احاء الجسم ، قمرز مادة شمعية واقية . قرقنها الاستشعارية مهدية عند الاجلولة والبرقة . عيونها صغيرة . اجنسها انتساوية التقد بين الزوج الانامي والخلفي || يرقاتها صمغية ، مردنية الشكل ، صلبة التأثير ، مقترعة || اشهر اجناسها الصوق والسدال .

١٦٦٢٩ - صَوَفَلَّة مِي الثنونا ، اطلة .

١٦٦٣٠ - صَوَف *، صَوَفَة

Semblable (F). Similar (E).

Phylum (F). Phylum (E).

كل صوفية تسلية ، صوفية او نباتية ، تشتغل على انواع متحدة من يشها البعض تدعى صوفة .

١٦٦٣٢ - صَوَف *، Laine (F). Wool (E).

الصوف بالعرف العام مجموعة من الشعر تؤلف الحاف الذي ينطلي اجسام بعض الحيوانات المخرية كالنم والماعز والابل الخ || اما شرة الصوف تتكون من ثلاثة اجزاء : البصلة وما فيها من مادة نشوية وبلونة ثم الطبقة الصوفية البقية التي تقرر اللانعة والمرونة ويلها الطبقة الحرفية القرنية السطحية التي تحد خاصية التلبه .

١٦٦٣٣ - صَوَفَان *، حَافَرِيَّة

Ungulina fomentaria, Polyporus fomentarius (S). Amadouvier (F).

فطر من السيات ركب الزان والبتلا والقزب والخور والخرج والستديان . وقد شوه صدقة على الثوب والتفاح . وهو من اكبر فطور السيات واغلفها . شكله شكل حافر احصان . خطوط قطر قاعدته نحو ٢٠ سم. وقد يبلغ في طرف خاصة ٤٥ و ٥٥ سم. بينا براوح ارتفاع قيمته بين ١٠ و ٢٠ سم. || ثوبه في اول صده ليد اللون نبي الونج ثم ينحرف الى الخفي وينتهي باغوري . لياه غليي ندي، لونه الى الصبهة الحنطية . بويافته متسيلة مقبولة الاطراف قياسها ١٤x٥ ميكرون || يترى الجفوح ويدخل الى قلوبها من جروحها اليابسة . بعد ان يعطب الشكير والخشب الذي يلفقه والطور والمرس الى مكبات صامتا كماكة الطبقة الخشبية المنحارة || مشبهه اغبر اللون يكتنف المكبات ويسبب انحلال موادها الخشبية .

١٦٦٣٤ - صَوَفَان أَشْتَح *، فِلِينْس *

Phellinus pomaceus, Polyporus fulvus (S). Phellinus (F).

فطر من السيات ركب التفاحيات والوزيات في سرقها واحصاها . يدخل من جروح التشقيب التي لعل ملازها المشكير ويزق حتى القلب فيسبب انحلال المواد الخفيفة والخشبية || وهو حافري الشكل صغير القند حجيحه من ٣ الى ٦ سم. مطحه خلي الملسس قرني اللون . لياه صلب المقطع . ثوبه التركيب ، اسمر اللون || يكافح بانتراخ الفطر وبصطير الجرح وغلالة بالمستيك بعد تنظيحه من المشج والخشب المنطوب .

١٦٦٣٥ - صَوَفَان السنديان *، فِلِينْس السنديان *

Phellinus dryadens (S).

فطر من السيات ركبده جلوج السنديان وقد يصيب الكسنا || مظهره الخارجي قيمة مستوية ، خشدة ، فارشة الحافة ، قطر قاعدتها براوح من ١٠ الى ٢٠ سم. غلافها الخارجي الملوي رقيق لبشرة الرضوخ ، لونه الى البياض الاغبر . يرش بقش المقطع الخشبية اللون || لياه حنطلي عايق ، جامد المقطع الغليي . بويافته شفاة او تينية اللون ، مردنية الشكل ، طولها نحو ٩ ميكرون وقطر قاعدتها ٣ ميكرون || وهو من الفطور الرمية اللنو يظهر في اواخر تموز . مشبهه بسبب الفن الخيطي بعد ان يجوب الاوصية ويطها .



صوفان



صوفان اشتح



صوفان حلفي



صوفان كاذب

خلية الصفحة . ازهارها طرفي ، فردي التجميع ، تحوي
نسة من الاوراق المستعرضة .



صوبل الشام

١٦٦٣٧ - صَوَمَرَةُ * Achariae (S). Acharie (F).

الصورة ج صوبر . نبات لبني عارض مدبر من فصيلة
الصوبريات يكثر في التايان وصل سفان بجاري الماء .
يزرع القرين . يتبين بكثرة فروعه الشقية السميكة ،
بقلة اوراقه المموجة ، يمد بحال ازهاره وبغرابه ثماره
وزهوره المجردة المستحقة الشكل .

١٦٦٣٨ - صَوَمَرَةُ الْبَقُول * Misale oleracea,

Marneata oleracea, Polis oleracea (S).

Misale potagère, Noctuelle potagère (F).

Bright-line brown-eye (E).

حشرة مؤذية من الفسقيات حشرقيات الاجنحة . موطنها
يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اوروبية . فرائشها جارية
قوتها مشتر الازهار . سرقها تموش على اوراق الصليبيات
البرية والازهار . وصل البقول . جسمها متوسط الطول
نحو ١٥ م . يسطح نحو ٢٨ م . رأسها مثقل الجرم
جوي الون . صنها كيرتان ، زباناها غطيان .



صولة

جوشها الى الجوزة . يمتد الى الخليل الاسمر يملو غط
لحي من النقطة السود . ورشها الامامان الى الجوزة
الاسفر ، ويطولها تسين طرفي تبي الون . ورشها
الخلطاني الى الكلبة . اهدابها الى القطعة تنقية . لها
جبلان في الحول . تظهر فرائه الجبل الاول في حوزان
وتظهر فرائه الجبل الثاني في ايلول . تسرح في الليل .
تقاتل بمد ظهورها بنحو خمسة ايام وتفتح المكن لسطحاً
على الصفحات السفلى من نصال النبات اكامل في السرعة
تطول نحو ٣ م . جسمها نالس القشار . ثوبها الى
الخضار الالاس يملو غط لحي قاطب جوي الون يحده
من البين واليسار غطان اخضران واربع نقط سود في كل
سكة . ويطولها غطان جانبيان اسفران . رأسها الى
الجوزة . مدنها الى الشبهة السمر المواج . وراجها سود .
طوب الاكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في التربة .



صوبلية

١٦٦٣٩ - صَوَمَرَةُ الْقَرْفَل * Misale compta (S).

Misale parée, Noctuelle

des dianthées (F). Misale compta (E).

حشرة من الفسقيات حشرقيات الاجنحة . موطنها بعض
اقليم حوض البحر الابيض المتوسط . فرائشها نائمة قوتها
رقيق الازهار . سرقها نائمة قوتها حشرقيات القرنفليات
وتتقب الكماير وتلتهم الزور قبل التجميع . جسمها
متوسط الطول نحو ١٤ م . يسطح نحو ٣١ م . رأسها
خادوي . لشكل اسهب الون . صنها كيرتان . زباناها
غطيان . جوشها وربتها الى الصخرة السوداء المواج . ورشها
والامامان الى الصخرة السوداء يملو قاطب جميع اسمر
وتقيص وزركشة سفلية وتقيص اسود . ورشها
الخلطاني الى الصخرة السوداء السوية الون . اهدابها الى
القطعة الفضية . لها جبل واحد في الحول . تظهر الفرائه
في اباد وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تقاتل بمد
ظهورها بنحو ستة اسابيع وتفتح المكن لسطحاً على الصفحات
السفلى من نصال الاوراق . السرعة تطول نحو ٣ م .
جسمها اسطواني الشكل . مشقة القشار . ثوبها الى
القطعة الخضراء يسم في الظهور وينير في الجانبين . رأسها
جوي الون . مدنها الى الركبة . وراجها سود . طوب



صورة



صورة قرنفل



صورة قرنفل

Sperme des équidés (F).

Sperm of the equidae (E).

هو افراز اللبد التناسلية الذكرية عند اللواب من خيل
وجير .

١٦٦٤٠ - صَوَمَرَةُ * Corynespora

جنس فلور مجهرية من الريذانيات وفصيلة الطيمات .
جره الكيفية سمر الون ، اسطوانية الشكل ، غليظة
للفاصل العنقية ، فردية او نسية التجميع . كتالده
سمسية الترتيب ، تحوي الغواصل الشفافة . انواعه قليلة
المد ، اعرفها صوبل الشام .

١٦٦٤١ - صَوَمَرَةُ الشَّام * Corynespora melonis (S).

فلور مجهرية يتطفل على اوراق الشام والقرع والخيار
والكوس . مظهر الخارجي يقع لاقياسه الشكل والحجم ،
لونها الى السمر العطلاء ، اطرافها حالي عاب الون ، تركب
نصل الاوراق فتسبب ذوبها ويابسها . يكاتب عند
ظهوره باستعمال المركبات النسيجية المركزة ١ %

١٦٦٤٢ - صَوَلَةُ * Aschynomene

Aeschynomene (S). Aeschynomene, Sola, Nelitte (F).

Sola, Bastard sensitive plant, Pith-hat plant (E).

Schamplanze, Sinnpflanze (D). Pianta modesta

bastarda (I).

جنس نباتات عشبية وجنية من فصيلة القرنفليات الفراسية .
انواعه المعروفة سبعة مهنها البلاد الحارة تكثر في الصين
والهند . اوراقها مركبة وريشة . ازهارها مختلفة الالوان
الزاهية تتميز بكثرة اسديتها التي يبلغ عددها عشرة . وهو
نوعان .

Aes. paludosa (S).

Aeschynomène de Chine (F).

ساقها مستطيلة ، ليفية ، لينة ، تستعمل في صناعة الورق
الفاخر المعروف بورق الرز .

Aes. cannabica (S).

Aeschynomène de l'Inde (F).

جنية ليفية مستطيلة الساق اللينة . اربانها فزيلة مينة
تستعمل في عدة صناعات منزلية وغيرها .

Argent pur (F).

Pura silver (E).

١٦٦٤٣ - صَوَلَج * Calviforme (F).

Calviforme (E). صَوَلَجِي * Calviforme (F).

شكل من الزبان يشبه السويجان .

١٦٦٤٥ - صَوَلَجَانِيَّات الْقَرْفَل * Rhopaloceres

Rhopalocera (E).

مرقبة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة . فصائلها
عديدة تتميز بقرونها الاستثنائية الصوانية الشكل .
خادراتها حارية لا يسطعها في نياتها ، شبه . مكها برميل
الشكل ، فردي الوض ، لا نظامي الترتيب .

١٦٦٤٦ - صَوَلَجِيَّة * Leucadendron

argenteum (S). Leucadendron argenteum, Arbre d'argent (F).

شجيرة ثريينة سبروتية من فصيلة النسيات . ساقها
متنصبة فراه . اوراقها تطول من ١٠ الى ١٦ م . وتعرض
من ١٢ الى ١٦ م . نصلها جامد النسيج ، خلي البشرة
الفضية الون . ازهارها اثيوبية ، ضيقة ، رباعية للتشريح ،

للماشية الممرسة بها بركة موطئها النياض والادغال البرية
وسبها زراعة تزيينية . اشهرها الصوبر .

١٦٦٤٣ - صوصكة Solenanthus (S). Solénanche (F).
الصوصكة ح صوبل. نبات عشبي حولي من فصيلة الجسيميات.
انواعه قليلة موطئها جبال الشرق الاوسط . سوقها زهاب
الحماء، عذمة الفروع، تملو من ٧٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها
معتقة ، لاهليبية ، ذلقة الزام الاخضر . نصلها خفي البشرة
اغبر اللون . ازهارها عتقوي التجميع ، ابلي الارتكاز .
انهارها انبوية الشكل تبدو خراء القرن ثم تتحول الى
الاريجاني الازرق . ازهارها يستمر من نيسان الى
سبيران .

١٦٦٤٤ - صوصيات Protoblattoptères (F).
Protoblattoptera (E).
رنية حشرات متفرقة من طبقة الوردانيات . احتيرها
تعود الى الحقيقتين الكروية والبرمية من الاباج الاول .
الاسم العلمي يبرز الى انها من اسلاف الوردانيات .
تزينها الرشي واحد اما مقدم جوشها فلا يسلط الرأس
وكانت تعيش على الاشجار خلافاً لنبات وردان الدالة .

١٦٦٤٥ - صوصية هي الصوصة ، اطبا .

١٦٦٤٦ - صوصكة Ergot (F). Spur (E).
غلب الديك في ساقه .

١٦٦٤٧ - صوصاء ، صوصاء ، صوصاء Coulard (F). صوصاء
هو كل نبات معرض قصاصاً اي لسقوط الزهر او
لانتعاش الثمر بعد المقد .

١٦٦٤٨ - صوصاد السمك Cérýle (F).
هو الغراف ، اطبا .

١٦٦٤٩ - صوصادة الوري Hippodamia (S).
Hippodamia (F).
جنس حشرات مفيدة من فصيلة الاعماسيق ورنية ممدعات
الاجنحة .
١٦٦٥٠ - صوصار القطيع من البقر .

١٦٦٥١ - صوصاغة Formulation (F).
الصوصاغة وضع الصوصة وقوصيها . Formulation (E).

١٦٦٥٢ - صوصانة Entretien (F). Keeping (E).
هي جعل الاعمال المتروكة المتروكة الصفا على الشيء سليماً من
التشواب .

١٦٦٥٣ - صوصخو Roc (F). Rock (E).
الصخرة الصلبة الثابتة في مكانها .

١٦٦٥٤ - صوصيد ، صوصيد ، صوصيد ، صوصيد Chasse (F). Hunting (E).
هو اقتناص الطير والحوان . ويملك الصائد قصصه
بالاستيلاء .

١٦٦٥٥ - صوصيد Gibier (F). Game (E).
الصيد هو كل ما صيد من حيوان ينتج بوقاه أو جناحه .

الاكمال يسمر نحو ثلاثة اسابيع وينتفيش ضمن جلباب
من الطين تلتصقه السرة بعد ان تنمن في التربة على عمق
٤ او ٥ سم .

١٦٦٥٦ - صوصورة الهندباء *
Misella dysodes (S). Misélie dysode, Noctuelle
des chicorées (F). Misella dysodes (E).
حشرة مستجبة الرائحة من فصيلة النسيقيات ورنية حشرافيات
الاجنحة . موطئها يشمل معظم اقاليم حوض البحر الابيض
المتوسط . فراشتها وائمة منثر الازهار . سرقها تمش
على اوراق وايزار المركبات واخصها الهندباء . جسمها
متوسط اللد بطول نحو ١٤ سم . بسطها نحو ٣١ سم . رأسها
غوريطي الشكل . عينها كيرتان . زباناها خيطيان .
سرقها معتدل الحجم والفلو . جوشها وبعثها الى الرتبة
السراء المراج . ووشها الاسمان الى الرتبة الخنطية
المراج يطولها يتيج امر تتخله نقط سود . ووشها
الحلقيان الى الرتبة الخنطية الزامرة تسر قرب الاطراف .
لها جيل واحد في الحول . تظهر فراشة في ايار ويقي حتى
تموز . تسرح في الليل . تماثل هذه ظهورها بنمو ستة
اسابيع وتنتج للكن لعلها على الصفحات السفلى من نصال
الارزاق . السرة تطول نحو ٣٥ سم . جسمها اسطواني
الشكل ، مشعبد القشار . ثوبها الى السطلة السراء يطولها
خط لبي قاطب اسود اللون ، ابيض الخنار من اليمين
واليسار . جانبها متعقن بالاسود والاصفر . رأسها اخر .
مدبها الى الرتبة . وواجبها الى السرة . طور الاكمال
الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتفيش في التربة ضمن
جلباب من الطين .

١٦٦٤١ - صوصورة وحالة *

Misella peregrina (S). Misélie palarino (F).
Misella peregrina (E).
حشرة من النسيقيات حشرافيات الاجنحة . موطئها مجامح
وتنام حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها وائمة قويما
منثر الازهار تتميز بخامة الارتحال من بقعة الى بقعة .
سرقها تعيش على اوراق السرق والحرض والقطن والاشنان
والرث . جسمها متوسط اللد بطول نحو ٣٥ سم . رأسها
معتدل الحجم ، اوبه اللون . عينها كيرتان . زباناها
عيطيان . جوشها وبعثها الى الرتبة الخنطية المراج .
روشاها الاسمان الى الرتبة الخنطية تطولها رشة وزرقة
تراج من النشقة الى الصبغة والشفية . ووشها الحلقيان
الى الرتبة البنياء المراج تطولها جده متفرقة تسبق الخنار
الحاربي . لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول
في ايار وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب . تسرح في الليل .
تماثل هذه ظهورها بنمو عشرة ايام وتنتج للكن لعلها
على الصفحات السفلى من نصال اوراق النبات المائل .
السرة تطول نحو ٣١ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ،
مالي القشار ، عادم الحلب والنقط السود . ثوبها الى
الخصار الزيتي تملو ثلاثة خطوط قاطبة جووية . رأسها
الى الحيرة المراجانية . مدبها ورواجبها الى السرة السواء .
طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتفيش في التربة
ضمن جلباب من الطين .

١٦٦٤٢ - صوصيات Achariaceae (S).
Achariacées (F). Achariaceae (E).

نصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . انواعها
كثيرة معظمها افريقي المنبت . جميعها من النباتات الحليقة



صورة الهندباء



صورة رنالة

١٦٦٥٦ - صَيْدُ السَّمَك (Pêche (F), Fishing (E)). هو البحث عن السمك وأخذة بمختلف الوسائل . وتكون ملكية السمك للمصاد لصياد بحق الاستيلاء .



صيداء

١٦٦٦٦ - صَيْدُ اللَّحْم * (Sarcophaga carnaria (S), Mouche à daniars, M. de la viande (F)).

ذبابة من الصيدين طولها يراوح ما بين ٧ و ٢٠ م. ثوبها أغرض اللون يعلوه خطوط متصالية تشكل مربعات تشبه رقعة الشطرنج . يكثر وجودها من أيار إلى تشرين الثاني . تسرح في كل مكان . مكها يتغذى من جرابها القشري فضسه يرقات صغيرة دقيقة على اللحم والجيف والافتقار .



صيدان أبيض الرأس

Tamia

١٦٦٦٧ - صَيْدُ كَتَاي

هو التسمية ، أطلقها . أما صيدناي فن وضع القروى إلى الكتور لين المملوق .

١٦٦٦٨ - صَيْدُ كَيْتَات ، لَقَاعِيَّات (Calliphoridae (S), Calliphoridae (F)).

فصيلة حشرات ذبابية من رتبة ذوات الجناحين . أجناسها وإنزادها نحو ٥٥٠ معظمها صغير القند وبعضها متوسط وكثير . أنوثها مختلفة يئلب فيها الرصاصي . أرجلها زباء . ذكورها كائناتها لا ذارق بينها سوى عدة البك للزوجة الظاهرة في مؤخر الحلقة الطويلة عند الذكر . قوتها مشر الأضرار وإفرازاتها ، والعلماء ، وأكثر الموائد الضوية والإبراز || يرقاتها حواكة وأجعة ومنها خاضعة ونائلة وبعضها لاصق يركب الحيوان فيؤذي .



صيدان أزرق

Cynétique (F).

١٦٦٦٩ - صَيْدِي

ما له صلاية بفن الصيد .

Hunting art (E).



صيدان الجراد

١٦٦٧٠ - صَيْر

اسم شاملي يطلق على البلم المملوق ويل بعض صداد السمك كالشعير والمفت والرشال الخ .



صيدان اللحم

Bercall (F), Fold (E).

١٦٦٧١ - صَيْرَة

الصورة والمجارية . سيطرة البقر وأقم والخر .

Inoceramus (S).

١٦٦٧٢ - صَيْرَم * (Inoceramus (E).

جنس حيوانات من الرعويات صغريات ضفديات الخيليش هادسات الخاضب وفضيلة الاطريات . أنواعه للمرفة مدينة . جميعها من مصحبرات الاراضي الطليانية || أصدانها تشبه غروبية الشكل بالغة التعبد الطولي .



صيدان اللحم

١٦٦٧٣ - صِيص

هو السامة ، أطلقها .

١٦٦٧٤ - صِيصَاء

حب البليخ والمخلل والقيام وما أشبه الذي ليس في جوف لب .



صيم

١٦٦٧٥ - صَيْحُور لَقْن * (Seisura iniqueta (S).

Seisura iniquet (F)).

طائر من الجواثم منيات المتناير يتبع إلى فصيلة اللذابيات . يألف النايات وصفات مجاري الماء . لحيته الحياتي جامعي . جناحاته قليلة العدد . قوته للذباب والحمام والديدان || جسمه صغير القند يطول نحو ١٦ م . مقار غجري الشكل ، مشر الجرم . سباله كثيف قصير . جناحاه ذلتان . ذنبه مستطيل الشكل ، مقطوع الطرف . ثوبه البعدي إلى الخضار الالسي الاسفح المروج . زوره وصدره ويطع إلى



صيصور لقن

١٦٦٥٦ - صَيْدُ السَّمَك (Pêche (F), Fishing (E)). هو البحث عن السمك وأخذة بمختلف الوسائل . وتكون ملكية السمك للمصاد لصياد بحق الاستيلاء .

١٦٦٥٧ - صَيْدِيَّك * (Callionymus (S).

Callionyme, Chiqueux, Dragonet (F)). جنس اسماك بحرية من شاككات الزنائف . أنوثها مدينة بها واحد يقم في البس الايض المتوسط . وهو صغير القند ، مستطيل الشكل ، كبير الرأس ، مزخرف الثوب ، متباين الزنائف الخفيفة والمديجة بمختلف الالوان .

١٦٦٥٨ - صَيْدِيَّك

هي الارض الحمراء التربة الخفيفة الحجارة المستوية السطح

١٦٦٥٩ - صَيْدِيَّح (Hibou (mâle) (F).

Owl (male) (E).

ذكر البومة .

١٦٦٦٠ - صَيْدِيَّكَة (Pharmacopée (F).

Pharmacopoeia (E)).

بحث تركيب الادوية وطرق استخدامها للمعالجة .

١٦٦٦١ - صَيْدِيَّان ، زَيْتِيَّار (Sarcophaga (S).

Sarcophaga (F)).

جنس ذباب يمرض ولد لسباع من فصيلة الصيدينات . أنواعه عديدة جميعها وأجعة ونائلة يكثر وجودها في الصيف . أشهر أنواعها وأجعة الاربعة التالية .

١٦٦٦٢ - صَيْدِيَّان أَيْضِيَّار (Chrysomya albiceps (S).

Mouche à tête blanche (F)).

ذبابة من الصيدين طولها يراوح من ٥ إلى ٧ م . لونها إلى الزرق . رأسها أبيض . ذبانها سوداوان . ريقها غبراء اللون ، زباء الجسم تيش على الجيف .

١٦٦٦٣ - صَيْدِيَّان أَغْشِيَّان (Polinia rudis (S).

Polinie rude (F)).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين فضيلة الصيدينات . جسمها متوسط القند يطول من ٨ إلى ١٠ م . هليها متكافئ عشن . طيراتها منيف الحركة سريعة . رأسها كبير الجرم . خطمها ذرب . ذبانها صغيران . هليها كبيرتان . صدرها اريد اللون ، حشلي . المروج . يعلتها إلى الزرق . أسود الزركشة . ورشها كيرتان ، شفانان ، يلمرها شفح حشلي . قوتها إلى السرة || يكثر وجودها من نوسان إلى تشرين الثاني . ترب في المواقف المروضة لاشعة الشمس || قوتها مشر الأضرار والإفرازات النباتية وقد تقتص المائل الريفية في طلب القوت || يرقاتها وأجعة وتكطف مل الخراطين فتقتفي هليها .

١٦٦٦٤ - صَيْدِيَّان أَزْرَق * (Calliphora erythrocephala (S).

Mouche bleue (F)).

ذبابة من الصيدين طولها يراوح ما بين ٨ و ١٢ م . ثوبها إلى الزرقه اللامعة . يكثر وجودها من نيسان إلى تشرين الاول . مسرجها كل مكان شمسي . لا تدخل المساكن الا لتتبع مكها على اللحم والجبن والخضار والبقول الذنابلة . يرقها دقيقة غبراء اللون ، سمره الرأس ، مبيضة الحلب .

١٦٦٦٥ - صَيْدِيَّان الجِرَاد * (Stomorhina lunata (S).

Mouche des sauterelles (F)).

ذبابة من الصيدين طولها يراوح ما بين ٧ و ١٢ م . ثوبها مخمض ومغط بالأسود والاخير . يكثر وجودها من سزيان



صبي



صبي



صبي



صبي الخيل

١٦٦٨٢ - صبيكم *
Rostellaria (S).
Rostellaire (F). **Rostellaria (E).**
 جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل
 وفصيلة الدلاحيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة
 في بعض مناطق المحيط الهندي والبحر الاحمر والبحر
 الابيض المتوسط || اصداؤها مردنية الشكل ، متباينة
 القد ، طول من ٤ الى ١٢ سم . جميعها محزنة حتى
 الاضباب . فمها مستطيلة ، دقيقة : الاطراف المزايبة ،
 مقرنة الجواض || اجسامها محزنة ، مستطيلة الرؤوس
 المنتهية باضطام مفلوقة . لوانها ثنائية ، مفلوقة ، مديونة .
 ارجلها مشطورة الى فلتين ، الخلفية مجهزة بسقاط قرني
 المادة ظلي الشكل .

١٦٦٨٣ - صبيكم *
Déstrition (F).
Destruction, Wearing away (E).
 المسكة الانقراض بالاحتكاك او المك .

١٦٦٨٤ - صبيكم *
Détritique (F).
Détrital (E).
 نمت تعريفي يطلق على جمع التكوين الرسوبية المتأثرة .
 من تفتت الصخور ميكانيكياً .

١٦٦٨٥ - صبيكم *
Sclerostomum (S).
Sclérostome (F). **Sclerostoma (E).**
 جنس دود من السلديات ، انواعها عديدة جميعها طفيلية .
 بعضها يتطفل على اللواجن اغصان الخيل .

١٦٦٨٦ - صبيكم الخيل *
Sclerostomum equinum (S). **Sclérostome du cheval,**
Strongle armé (F).
 نوع من الصيلم يعيش طفيلياً في مساريق وارباب الخيل
 فيضيمها بما يشبه من مض مضغ .

١٦٦٨٧ - صبيكم *
 الصبي : شدة الحر . يوم صبي وصبي : شديد الحر .

١٦٦٨٨ - صبيكم *
Deserticola (F).
Deserticole (E).
 نمت تعريفي يطلق على كل حيوان او نبات يألف
 الصحراء .

١٦٦٨٩ - صبيكم *
Lisse (F). **Smooth (E).**
 الصبيج هو الاملس المعاء من النبات .

١٦٦٩٠ - صبيكم *
 صبيكم الخيل هي فصيلة الخيليات ، اطباها .

البياض الناصع || يذئن حظه في الانجار الرقبة . الاث
 تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات .

١٦٦٧٦ - صبيكم *
Formule (F). **Formula (E).**
 تعبير مجازي او وقي يدل على كيات المواد التي يتألف
 منها تركيب معين ما مع نسبة عناصره وعدد وسائطه
 الغذائية .

١٦٦٧٧ - صبيكم *
Été (F). **Summer (E).**
 احد فصول السنة الاربعة مدته ثلاثة اشهر تبدأ في نصف
 الكرة الشمالي في ٢١ حزيران وتنتهي في ٢٠ ايلول . وهو
 يتميز بشدة حرارته وبطول نهاره وذلك لانه يبدأ عندما
 تكون الشمس في الست عمودية على مدار السرطان .

١٦٦٧٨ - صبيكم *
Poussière suspendue dans l'air (F).
 الصبي والصبيكة : الغبار الجائل في الهواء .

١٦٦٧٩ - صبيكم *
Loxia (S).
Loxia, Bec-croisé (F). **Crossbill (E).**
 جنس صافير من فصيلة الترشوريات . انواعها سبعة جميعها
 من صافير المناطق المعتدلة . طولها يراوح بين ١٤ و ٢٠
 سم . انوارها عديدة الالوان فيها الجوزي والاصفر
 والاسمر والاسود والرمادي والابيض والمنش . مناقيرها
 غليظة ، قوية ، متصالية . اذنانها فارة || يألف
 الاحراج اغصان صافير الصنوبر والتوب والسرو . قوته
 سحب الصنوبر ويختلج البزور البرية والزراعية وبعض
 الحشرات والحلرم || يذئن في الانجار الكثيفة . اناته
 تحضن وسعها || بيضات على مرتين في السنة يبدأ ذكرها
 قوتين الغذاء وفرد .

١٦٦٨٠ - صبيكم *
Codex
 المحبسة الرقمية التي تيمث في الادوية وركبتها وطرق
 تحقيقها .

١٦٦٨١ - صبيكم *
Smerinthus (S). **Smerintha (F).**
 جنس حشرات من فصيلة الميريات انواعها اربعة او خمسة
 جميعها دجوية تسرح في الليل . اجسامها متصلة القد
 طولها يراوح بين ٣ و ٤ سم . انوارها الى القنبرة الخفيفة .
 حجبها متجبة بالاسود . وراشها كبيرة ، مزرقة
 وبيضاء . قرونها الاستشعارية قلابية الشكل || رقاتها
 مرطاة الجسم يكثر فيها اللون الاخضر القاتم . وهي غاصلة
 تلتهم اوراق بعض الاشجار اغصان السنديان والتريزيت .

ض



ضابطان احمر الشرط



ضارية

مرة من ٤ الى ٦ يبيضات تربطها بمنابذة الذكر نحو ١٧ يوماً :

١٦٦٩٣ - ضارية الصغرى
Entropie (F).
Entropy (E).
طريقة تسمح بتحديد انحطاط جهة القوة الحرارية .

١٦٦٩٤ - ضارية بيطرية
Police sanitaire vétérinaire (F).
جام القوانين والانظمة المرجعية الاجراء الهادفة الى مقاومة انتشار الامراض السارية والمعدية في المواجن .

١٦٦٩٥ - ضاجعة
Embouchure, Delta (F).
هي دلتا النهر وشوهره او صبه .

١٦٦٩٦ - ضار
Carnassier (F). Felis animal (E).
الحيلان المفترس . م ضارية . ج ضوار .

١٦٦٩٧ - ضارب
Erratique (F). Erratic (E).
تمت تعريفه يطلق على كل طائر ليس بأبده او قاطع بل يحوم البلاد من منطقة الى اخرى في طلب الرزق . ج ضوارب .

١٦٦٩٨ - ضاروب
Multipliant (F). Multiplying (E).
ج ضاروب .

١٦٦٩٩ - ضاروية *
Procrustes (S). Procruste (F).
جنس خنافس مفيدة من فصيلة البرمطانيات ورتبة مفدمات الاجنحة . انواعها عديدة جميعها كبيرة الجثة طولها يراوح بين ٣٠ و ٤٠ م . انثواها الى السواد النحبي . تشرح في الليل وتفترس الكثير من الحشرات والحوام الضارة .

١٦٧٠٠ - ضباس
جنس النبات : باشر بالفوس والفوس اول الهيج .

١٦٦٩١ - ضابطان *
Agelalus (S).
Troupiale (F). Bobolink (E).

جنس طير من فصيلة الكاروبسيات . انواعه المعروفة اربعة . جميعها من قواطع القارة الامريكية تحيي فصل الشتاء والبرد في الاقاليم الحارة من امريكا الوسطى والجنوبية وفصل الصيف في امريكا الشمالية . نطاشها الحياتي جماعي . اسرارها وافر البند || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٤ الى ٢٦ سم . مناقبها مخروطية ، مستطقة الاطراف . اجنحتها مستطيلة . اذنانها مستديرة الاطراف . ارسافها معتدلة الارتفاع . اثنواها سوداء اللون او كستنية . اكشافها اثنواها لواحض اجنحتها صفراء اللون او حمراء . اثنواها اصفر قدأ من ذكورها وابجت اثنواها منأ || تألف الاجام والمستنقعات ويجاري الماء . قوتها الحشرات والحبوب والبلودور . تقسم حقول الحنطة والارز والنقم .. فتزحف بها اشد الاندى || اعرف انواعه واشهرها ضابطان احمر الشرط .

١٦٦٩٢ - ضابطان احمر الشرط *
Agelalus phoeniceus (S).
Troupiale à épaulettes rouges (F).

طائر من الضابطان القواطع يحوم امريكا الوسطى والشمالية في طلب الحصيد واللقح . يألف الاجام ويجاري الماء والمستنقعات . سريره وافر البند || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٥ سم . ثوب الذكر الى السواد الاحمر الاسفع . لواحض منكبيه الى الحمرة الازرقوانية . حلقة حنك كستنية اللون . منقاده وساقاه الى السواد الازرق المزاج . الانثى اصغر قدأ من الذكر . تطول نحو ٢٢ سم . ثوبها الى الكحية تملوها في صدرها وبطنها رقعة سوداء || اخلافه مرسمة ، فرقة ، آتسة . قوته الحشرات والحبوب || يدشن عشه في الاشجار الشارطة على الماء . عشه قدسي الشكل رفيع الجانب . الاثنى تحضن مرتين في الحرك وتضع في كل

١٦٧١٣ - ضَبَاب (F), Oxypetalum (S).

جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الصقلابيات. أنواعه قليلة، سوطها مستقيمة، أوراقها متعاقبة، حمتة، أحليجية النصل، قلبية القاطعة، أزهارها مستطيلة التبرجات القارئة. الوحدة ضبابية || أشهر أنواعه الأترينية ما يلي.

١٦٧١٤ - ضَبَابِ أَرْزِي

Oxypetalum coruleum (F), *Oxypétale bleue* (F). نوع من الضباب وهي عشية حولية تطلع من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ساقها ليفية فراء، أوراقها زباه النصل حل صفحتيه، أزهارها تبو زرقاء اللون ثم يتفسخ || أزهارها يستمر من سزيان إلى أيلول.

١٦٧١٥ - ضَبَابِ كَثِيرِ الزَّهَر

Oxypetalum solanoides, *Tweedia floribunda* (S), *Oxypétale faux-solanum* (F). نوع من الضباب وهي جنية معمرة تطلع نحو ١٨٠ سم. ساقها غشوية فراء، أوراقها زباه النصل حل صفحتيه، أزهارها زرقاء اللون يملأها بتيجج وردي || أزهارها يستمر من سزيان إلى أيلول.

١٦٧١٦ - ضَبَابِ

الضباب مجموعة كواكب كثيرة العدد أسفل من بنات نعل.

١٦٧١٧ - ضَبَابِ كَهْ

Nivenia (S), *Nlvenie* (F), *Nlvenie* (F). جنس نباتات جنية تربينية من فصيلة السوسنيات. مهدها بعض مناطق أفريقية الجنوبية. جلودها دزينة، سوطها مستطيلة، حمتصية، قليلة الفروع ترتفع نحو ٦٠ سم. أوراقها سانية مشعة النصل. أزهارها علتي التجميع. أزهارها إلى الزرة السباحية. ثنائيات بينة اللون || أنواعه المعروفة اثنا عشر للآثار، بينها سوى شكل الأزهار ومعدد الأزهار ولونها || تنموه يستمر من الربيع إلى الخريف.

١٦٧١٨ - ضَبَابِ

Spadice (F), *Spadix* (E). الطلعة قبل أن تفتل عن القريض.

١٦٧١٩ - ضَبَابِ عَ لَقِيمِ

Cri du hibou (F), *Cry of the owl* (E). صوت البوم.

١٦٧٢٠ - ضَبَابِ

Cendre brune (F), *Brown ashes* (E). هو الرماد الاسمر اللون.

١٦٧٢١ - ضَبَابِ

هو هجرة جوز بوا.

١٦٧٢٢ - ضَبَابِ

Dendromecon (S), *Dendromecone* (F), *Dendromecon* (E). جنية معمرة من فصيلة الخشخاشيات، ساقها فراء تطلع نحو ٢٥٠ سم. أوراقها أحليجية النصل، بحرية الخضر، ثلاثية التبرج، تطلع من ١٢ إلى ١٥ سم. أزهارها صفراء اللون، تطلعها يراوح من ٣ إلى ٧ سم. || تزده قترين. تنموها يستمر من أواخر آذار إلى أواخر سزيان.

١٦٧٢٣ - ضَبَابِ

Galacantha (S), *Galacantha* (F), *Galacantha* (E). جنس حيوانات بحرية من القشريات مشاريات الأرجل طوال الليل وفصيلة السباعيات. أنواعه المعروفة خمسة منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ||

١٦٧٠١ - ضَبَابِن

الضابن من الخيل الذي لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالغرب.

١٦٧٠٢ - ضَبَابِ

Zityphus lotus, *Rhamnus lotus* (S), *Jubulier sauvage*, *J. des lotophages*, *Lotus des lotophagi* (F), *Lotus tree*, *L. Julube*, *Wild Julube* (E), *Lotobaum* (D), *Giugliolo salvatico*, *Logo dei lotofagi* (I). شجرة حرجية شائكة من فصيلة التوتيات، كانوا يقسموها في الزمان الثمار ويمزون إلى ثمارها عدة فضائل نفسانية وصحية. ثمارها صلبة القد، عتائية الشكل والرائحة، لذينة العلم. نقيجها يغيد الصبر ويقويه.

١٦٧٠٣ - ضَبَابِ

Connectif (F), *Connective* (E). نمت تمرني يطلق على بعض السنج الحيوانية المتصلة النضمة.

١٦٧٠٤ - ضَبَابِ

Ovis aries (S), *Mouton*, *Ovin* (F), *Sheep*, *Ovis* (E). جنس حيوانات داجية بحجرة من فصيلة الفصيات ثرى للعتابة والصبر والخلب. الواحد ضابن الذكر وثلاثه لاثن. والذكر الفحل يعي كيشا والاثن نمجة وشاة. أنواعه معروفة كثيرة العدد لا مجال للذكرما وتخليتها في هذه الموصلة.

١٦٧٠٥ - ضَبَابِ أَلْيَانِ

Ovis aries staeopyga (S), *Mouton à queue grasse* (F). ضابن ذو آلية وهو من السلالات المعروفة في الشرق الأوسط وأواسط آسيا.

١٦٧٠٦ - ضَبَابِيَاتِ

Ovinés (F), *Ovines* (E). الضبابيات أو الضبابية احد تسمي فصيلة الفصيات.

١٦٧٠٧ - ضَبَابِ

Imperméable à l'air (F). هو ما كان لا يتنفذ الهواء، واسع شيف.

١٦٧٠٨ - ضَبَابِ

Uromastix, *Uromastix*. حيوان من الزحافات يشبه الورل. موطنه البلاد الحارة يكثر في الجزيرة. يطلع نحو ٤٠ سم. وهو فيج الحية والشكل، صغير الرأس، قصير العنق، مستطيل الذنب، الأرض المفرقة للعد، لونه إلى الصخرة وهي فيرة مشربة سودا. واذا من أصفر صدره. يتغذى يقه في الرمل فيقتنص يده وضعه بارهين يربا || قوته الجنادب والذباب والمشب. والرب يحرصون حل صيده واكله. كنيته أبو حل. اثناء كشي فيه وجمعه ضباب وأضب وضبان.

١٦٧٠٩ - ضَبَابِ

Brouillard, *Brume* (F), *Fog*, *Haze* (E). غبار ماء كالتي سريع الانتشار يتكاثف قرب سطح الأرض فيقشها ويصحب البرودة. أسبابه عديدة أرجحها: مرور رياح دافئة رطبة فوق سطح بارد أو اختلاط رياح حارة رطبة بينها أبرد منها.

١٦٧١٠ - ضَبَابِيَاتِ

هي السقايات، المطبا.

١٦٧١١ - ضَبَابِ

Griffe de lion (F), *Claw of lion* (E). الضباب والضبط والضبط والمضاب: برأى الامد.

١٦٧١٢ - ضَبَابِ

Glapisement du denard (F), *Yelping of the fox* (E). هو حواء الضلب.



ضال



ضان



ضان الأنان



ضب



ضباك



ضبر



ضباب

كثرة الازوت وقلة الفسفور . ثانيا كثرة الرطوبة الجوية والحاررة . ثالثا الغل . الخ.

١٦٧٤٧ - ضُبُوبَة * Patersonia (S).

Patersonia (F). Patersonia (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السوسيات . مهدا استراليا . سوطها جلدية قصيرة . اوراقها خفيفة النصال الجملة . شواذها ملسة . ازهارها سبيل التجميع . ثلاث بصلات بقلبات كبيرة زرقاء اللون تتألف من انبوب دقيق وثلاث بصلات خاوية كبيرة الحجم فارفة وتكون بصلات داخلية دقيقة صغيرة منتصبة || تزوج الزئوين ضمن البيوت وفي الحدائق . تروى في الاتربة المعتدلة الانماذج الوفيرة الخصب || انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها التالية :

١٦٧٤٨ - ضُبُوبَة نَاعِمَة * Patersonia sericea (S). Patersonia soyeuse (F).

نوع من الضبوبة . شواذها يرتفع نحو ٣٠ سم . اوراقها مزخية الخلفات تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . وتعرض نحو ٥ م . ازهارها الى الزرقة البنفسجية المواج . قناباتها الزهرية مستطيلة الزغب الناعم || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٦٧٤٩ - ضُبُوبَة هَزِيلَة * Patersonia fragilis (S). Patersonia fragile (F).

نوع من الضبوبة . شواذها يرتفع من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وتعرض نحو ٥ م . ازهارها الى الزرقة الجميلة . قناباتها الزهرية مرطاة . بتلاتها الخارجية املجية الشكل تطول نحو ١٠ م . بتلاتها الداخلية تطول نحو ٣ م . || تنويرها يستمر من ايار الى آب .

١٦٧٥٠ - ضُبُوبَة * Malaptera (S).

Malaptera (F). Malaptera (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل وعضلة الكنثيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اصداؤها صندرة القد وشعبة محزنة . فواضها معتدلة الانفراج وباعية الفلق الاستوائية التي تبدو كاربيل الارض شككا وحطابا .

١٦٧٥١ - ضِعْج Insolation, Luminosité (F).

Sun-stroke, Luminosity (E).

الضج غيرة الشمس على الارض وهو تقيض الظل .

١٦٧٥٢ - ضِعْجَة Rhagonycha (F).

حشرة من الدّراحيات تنسى رفيق ، اظليا .

١٦٧٥٣ - ضِعْل Cri du singe (F).

Cry of the ape (E).

صوت القرد .

١٦٧٥٤ - ضِعْل Etage (F).

Low-water mark, Lowest water level (E).

هو البروض . المستوى الأدنى لياه بحر او نبع . وهو المياه الخفيفة اللسق مها كان مصدرا .

اسود . ظهراتها الى العلة الرمادية . ووشها عشائي ، قسطنتي اللون عند الانتشار . بطنها ويدها الى السمرة || تألف الحراج والمواقع التي يكثر فيها السنديان .

١٦٧٣٨ - ضُبُوب

الاشي الضيقة الاحليل ، الصصة الرضع من البقر والتمن والمنازع .

١٦٧٣٩ - ضُبُوبَة كَرْيَفِيَّة * Laccoclia cretica (S).

Laccoclia de Crète (F).

نبات عشبي يري معمر من فصيلة النجميات . منته جزيرة اكرت وجبال لبنان من ارتفاع ١٠٠٠ الى ١٨٠٠ متر عن سطح البحر || ساقه منتصبة فراءة ، اوراقه مركبة ، وديشة ، السفلى مستطيلة اما العليا قصيرة . ازهاره حيواني التجميع ، تاجي . الانتكاز . ازهاره صغرية ثنية اللون . محارة بضيعة الشكل ، حسكية القشار ، ثنائية الفلق || تنويره ديمبي .

١٦٧٤٠ - ضُبُوبَة * Unicites (S).

Unicites (F). Unicites (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات ضفديات الارجل وعضلة الكنثيات || انواعها المعروفة عديدة جميعها من متحجرات الطبقة الارضية الاولى .

١٦٧٤١ - ضِعْج * Brachycaulus (S).

Brachycaule, Brachycole (F).

جنس حشرات من فصيلة الضمبيات ، انواعها المعروفة اربعة جميعها صغيرة القد بنية اللون الخلع والموش بالاسمر والاغبر . ريقاتها خفيفة اللون ، مرارة المواج || تركيب مع ريقاتها معظم التبيليات البنية اخضرها التجليل والتجوير ولأدرا خصص صسارة الارواك وتلويها .

١٦٧٤٢ - ضِعْج مُحَرَّمَة * Brachycaulus triangularis (S).

Brachycaule triangular (F).

حشرة خاملة من فصيلة الضمبيات . جسمها صغير القد بطول نحو ٨ م . رأسها متعرج الفف ، محرم ، بني اللون . غطها معتدل الحجم . عيناها صغيرتان . زباناها دقيقتان . اسفان . كسلها بني اللون ، اسود الطوق . حشمتها صغيرة سوداء . ظهراتها لاسف . اربعة اللون . بطنها الى السمرة السوداء . قنواها سود الانفعاذ والازراع ، بنية القنابيب || تألف البراري حيث تكثر نباتات فصيلة المركبات اخضرها الضهفاء .

١٦٧٤٣ - ضِعْجَاج Ivoire (F). Ivory (E).

هو المايع ، اظله .

١٦٧٤٤ - ضِعْجَاج الضباج : ضِعْجَاج

ضباج : ضمع يؤكل . وكل شجرة يسم بها الطير وقيل الضباج .

١٦٧٤٥ - ضِعْجَاج

نبات كالفضفايس الا انه اغلظ مربع القنابيب يصغر ماؤه في الين الرائب فيطيب || (السان) .

١٦٧٤٦ - ضِعْجَاجَاج : ضِعْل Verse (F).

Beat down (E).

حارس يصيب الزروع فيستلي على الارض . اسبابه عديدة اهمها عدم ازان العناصر الغذائية في التربة اخضرها



ضِبُوب



ضِعْج



ضِعْجَة هَزِيلَة

Contributions (F).

Tax or rate (E).

في الاموال التي يجب على كل مكلف دفعها ساهبة
ليسام في النفقات العامة . وقد تكون ضمنية ومقاررة .

١٦٧٦٩ - فُرساب غير مُباشرة

Contributions indirectes (F). Indirect taxes or
excise (E).

في الضرائب غير المقررة التي تدفع بمناسبة على معين .

١٦٧٧٠ - فُرساب مُباشرة، فُرساب مُقررة،

Contributions directes (F). وَرُفعة

Direct or assessed taxes (E).

في المائدات الثابتة أي الضرائب المتصلة بصفة الاستقرار .

Multiplication

١٦٧٧١ - فُرسب

ضرب عدد في غيره .

Variété (F). Variety (E).

١٦٧٧٢ - فُرسب

الضرب ج ضرب هي افراد حيوانية او نباتية من نوع
واسع تتميز بصفات خاصة فيزيولوجية وشكلية مثلًا

ضرب التلخاخ الساركن .

١٦٧٧٣ - فُرسب هو المرء ، اطلبه .

١٦٧٧٤ - فُرسمة دم ، سكتة ، حَبْطَة

Apoplexie, Coup de sang (F). Apoplexy (E).

اسم شامل يطلق على مختلف الاعراض التي تسبب علم
الادراك الفجائي . وضربة الدم قد تكون اما زحف او وضع

او انسكاب دموي في النسجة المخ او غيره .

١٦٧٧٥ - فُرسمة شمس في القرن ، اطلبه .

Mamelle (F). Breast (E).

١٦٧٧٦ - فُرسمة

الفسرة هي اصل الثدي وهي ايضاً الفرسح كله .

Domage (F). Damage (E).

١٦٧٧٧ - فُرسو

هو الاذى المادي والادبي الذي يقع على النفس او على
المال .

١٦٧٧٨ - فُرس ، فُرسج

Molatre, Mâchelière (F). Molar, Grinder (E).

اسم اقسام الانسان الثلاثة وهي القواطع والانياب والافراس
وتعرف الافراس بالانواط لانها تنبت الطعام قبل ارساله
الى المعدة ، اما مدحها فيختلف مع فصيلة الحيوان ويختلف
وهي في اول عهدنا تنحى لينة ثم تزول لتحل محلها الثانية
التي تتميز بسطورها المحدودة العدد .

١٦٧٧٩ - فُرس العجوز هو المسك ، اطلبه .

Nycteribia (S).

١٦٧٨٠ - فُرسمة

Nycteribia (F). Nycteribia (E).

جنس حشرات راشنة من فصيلة الفرسبيات ورتبة ذوات
الجناحين . انواعها المعروفة ١٦ منتشرة في مناطق البلاد
الاستوائية والحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ،
مبطلة تقطع نحو ٣ م . وروسها صغيرة ، مزوانية الشكل ،
قليلة النشور . حيويا شديدة الصغر اعطاهما ثالثة ،
ماسة . وهي عديمة الجناح وقرزان . وقوامها نشيط .
اجسامها وقوامها مجهز ببصم الحب ، لثتين الطول ||
تتغذى على البطوليط والخنافس .

١٦٧٥٥ - فُرسحهم

Lapturus (S). Lepture (F).

جنس نباتات عشبية برية ، معروية ، حولية او مسرة
من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في
جميع المناطق الحارة من المائلين القديم والجديد || جميعها
شجيرة ، صغيرة ، متكاثرة المصنف تربتها المائية فيجود
درما وتسن عليها .

Orthogoriscus (S).

١٦٧٥٦ - فُرسحهم

Orthogoriscus, Môle, Molide (F). Sun-fish (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الضفسيات . اصطلحوا مياه
بحار المناطق الحارة . انواعها المعروفة ثلاثة جميعها غريبة
الشكل تبدو كأنها مقطوعة المؤخر . اجسامها غليظة
مقلطة تقطع من ٧٠ الى ٢٠٠ سم . زمانها القهرية
والبلدية مسطحة لتلاصق الثرجية القصيرة المقوسة .
انزاليا الى الصهبة للصلابة . بطونها فضية ، زانقها سم .
لونها ما كوكلة عادية وبهم من اعتبرها دون المادي .

Molidæ,

١٦٧٥٧ - فُرسحيات

Orthogoriscidae (S). Molidæ, Orthogoriscidae (F).

Molidæ, Orthogoriscidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من حريانات الانسان ورتبة ملحويات
الفك . اجسامها ثلاثة . اصطلحوا مياه بحار المناطق الحارة .
جميعها غليظة الشكل ، خضرة ، مبطلة ، مقطوعة المؤخر .
اشهر اجسامها الضخمة .

Photoperiodisme (F).

١٦٧٥٨ - فُرسحهم

Photoperiodism (E).

تأثير الضوء والاحتمار في شراخ النبات وعلى انفعال النبات
من اصطلاح التبار او الليل .

Macrocephale (F).

١٦٧٥٩ - فُرسهم الرأس

Macrocephalous (E).

ذو رأس اكبر واخر من المعتاد . رأس .

Crassilobé (F).

١٦٧٦٠ - فُرسهم الفككة

نمت وصفي يطلق على كل نبات مستقيم الفلكة .

١٦٧٦١ - فُرسرا هو الدلب القيقبي ، اطلبه .

Lutte (F).

١٦٧٦٢ - فُرسراب

زمن التبار او اقتناصه عند الضأن والماعز .

Monte (F). Serving (E).

١٦٧٦٣ - فُرسراب ، سفاد

نزو الذكور على الانثى في الحيوانات العواجن .

١٦٧٦٤ - فُرسراب هو الفُرسب ، اطلبه .

Brindille (F). Sprig, Twig (E).

١٦٧٦٥ - فُرسرام

هو دقيق الحطب وقيل ما ضعف ولان من الحطب الذي
يسرع اشتعال النار فيه وقيل ما لا جمر له وما له جمر
فهو جزل .

Pyrométrie (F). Pyrometry (E).

١٦٧٦٦ - فُرسرامه

قياس درجات الحرارة الشديدة الارتفاع .

١٦٧٦٧ - فُرسراوة هي البطم ، اطلبه .



ضمة

Mamelle, Pis (F).
Breast, Udder, Dug (E).

١٦٧٨٨ - ضُرُومِيَّات

هو مدرّ اللبن عند البقرة والشاة والماعز .

١٦٧٨٩ - ضُرُومِيَّات

هي النظيفة الضرع من البقر والشاة والماعز وغيرها .

Mammaire (F). Mammary (E). ضُرُومِيَّات

نعت ترميزي يطلق على كل ما له صلة بالضرع .

١٦٧٩١ - ضُرُومِيَّات، لَدِيَّات، لَبَنَات

Mammifères (F). Mammifères (E).

أحد صفوف الحيوان الخمسة . تتميز بالثداء إناتها المرصعة ، يوضع الأعداء أسفاه وبجهازها التنفسي الذي لا يتخلو من الكثرة . لذلك فهي تحتل مركز الصدارة بين الحيوانات الفقرية || رتبها ١٤ تنتمي إلى شصتين المششيات واللامششيات .

١٦٧٩٢ - ضُرُومِيَّات * صَبَّار الضُرُوم

Mamillaria (S). Mamillaire (F). Mamillary (E).

جنس نباتات لحية ممرمة من فصيلة الصباريات . أنواعها المعروفة زهاء ١٥٠ منبتها البلاد الأمريكية . معظمها زرع يزرع لفراية أشكاله وحسن أزهارها وروائحها وجمالها .

١٦٧٩٣ - ضُرُومِيَّات

هو أذنين الماء ، أطليه .

١٦٧٩٤ - ضُرُومِيَّات

Codium (S). Codie (F). Codium (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات الخضراء . أنواعها المعروفة قليلة العدد . أعطائها بجوار البلاد المعتدلة الحارة || يجيها أسفنجية التركيب ، غاطية ، حاملة الأوراق .

١٦٧٩٥ - ضُرُومِيَّات

هو حجر يشبه الأتارب في عطسه وورقه وله ثمر أبيض مدور مفلطح ككتين الحائط الصغار يفسر (السان) .

١٦٧٩٦ - ضُرُومِيَّات

Gourde (F). هو القرح الطويل ، أطليه .

١٦٧٩٧ - ضُرُومِيَّات

الضرم هي الخزاني البحرية ، نبات طبي طيب الرائحة أزهاره مشدرة يجربها النمل .

١٦٧٩٨ - ضُرُومِيَّات

هو قرع الطاب .

١٦٧٩٩ - ضُرُومِيَّات

Acidanthra (S). Acidanthra (F). Acidanthra (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة السونيات . منبتها بعض المناطق الأفريقية ، سوقها دقيقة ترتفع من ٢٠ إلى ٣٠ سم . أوراقها صفحية النصال معتدلة الطول و بحرية الخضار . أزهارها عقودية التجميع . أزهارها مستطيلة الأتارب ، سداسية البتلات الملونة || أنواعها المعروفة ثلاثة ، أشهرها التالية :

١٦٨٠٠ - ضُرُومِيَّات أَصْفَرُ

Acidanthra lutes (S). Acidanthra jaune (F).

نوع من الضرموم ، ساقه دقيقة ترتفع نحو ٣٠ سم . أوراقها صفحية النصال البحرية الخضار . أزهاره كبيرة القد ،

١٦٧٨١ - ضُرُومِيَّات

Nycteribildes (S). Nycteribildes (F). Nycteribildes (E).

فصيلة حشرات راشنة من رتبة ذوات الجناحين . أجسامها وأنواعها المعروفة نحو ٩٥ منتشرة في معظم مناطق العالم . أجسامها الاستوائية والحارة || أجسامها صغيرة معتدلة البسيط ، طولها من ٢ إلى ٤ سم . رؤوسها مزوانية الشكل ، شبه مدسرة . عينها شديدة الصغر . قوائمها نشيطة . جميعها عاصمة الأجنحة والقران || جميع أنواعها وراثة تمشي على الأرض والطير والمفانيس || أشهر أجناسها الفرسية .

١٦٧٨٢ - ضُرُومِيَّات

Geissorrhiza (S). Geissorrhiza (F). Geissorrhiza (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة السونيات . مهدا بعض مناطق أفريقية الجنوبية . أوراقها صفحية النصال السفلية الشكل أو الخطيعة . أزهارها سبل التجميع يرتكز على شراخ صغير . أزهارها قبة الشكل ، متساوية البتلات الملونة || أنواعها المعروفة عديدة معظمها برقي وبعضها زراعي ترميزي ، أشهرها التالية :

١٦٧٨٣ - ضُرُومِيَّات بِحْصِيَّة الْوَرَق

Geissorrhiza ovata (S). Geissorrhiza à feuilles ovales (F).

نوع من الضرموم الزرني . أوراقها بيضية الشكل قليلة العدد الذي لا يتجاوز ٤ فصاعدا عابقة الخضار المنتفخ بالأسود . شراخها يرتفع نحو ١٥ سم . وينتهي بسنبلة ودلة عديدة الأزهار . أزهارها بيضاء اللون ، صغيرة القد ، قطرها نحو ٢٠ م . || تنويرها يستمر من نيسان إلى أيار .

١٦٧٨٤ - ضُرُومِيَّات كَسْويَّة

Geissorrhiza secunda (S). Geissorrhiza monotrope (F).

نوع من الضرموم الزرني . أوراقها غليظة . شراخها يرتفع نحو ٣٠ سم . وينتهي بمجموعة الأزهار السبيلية الترتيب . أزهارها بنفسجية اللون ، متوسطة الحجم ، قطرها يراوح من ٢٥ إلى ٣٠ م . || تنويرها يستمر طوال شهر أيار .

١٦٧٨٥ - ضُرُومِيَّات مَعْدُوْلِيَّة

Geissorrhiza humilis (S). Geissorrhiza modesta (F).

نوع من الضرموم الزرني . أوراقها غليظة . شراخها يرتفع نحو ٣٠ سم . وينتهي ببعض الأزهار النشائية ، للتوسعة الحجم ، قطرها نحو ٣ سم . نوبها إلى الصفار الكريمي المشيز بالأحمر || تنويرها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٦٧٨٦ - ضُرُومِيَّات نَشِيْطِيَّة

Geissorrhiza grandis (S). Geissorrhiza robusta (F).

نوع من الضرموم الزرني . أوراقها سيقية الشكل مستطيلة شراخها تثنى صلب مود يرتفع من ٢٥ إلى ٣٥ سم . أزهارها إلى الصفار الباهت التي الملوأ يملو تشيز وسطى آخر || تنويرها يستمر طوال شهر أيار .

١٦٧٨٧ - ضُرُومِيَّات

ه دابة بين الكلب والذئب أو بين الكلب والسنور (م).



ضُرُومِيَّات



ضُرُومِيَّات

سداسية البتلات التي تطول نحو ٣ سم. لونها الى الصفار الكبريتي، يملو تمسج برتقالي ناري المزاج || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٦٨٠١ - صُغُرُو هو البطم الشرقي ، اطلبه .

١٦٨٠٢ - صُغُرُو Limier (F). Bloodhound (E).
الانثى ضرورة ج. سراء . والضرور كلب كبير الجفة شديد المراس يستخدم في صيد الرسوش .

١٦٨٠٣ - صُغُرُوغ الفروع : الصنير من كل شيء

١٦٨٠٤ - صُغُرِي Polygme (F). Polygamist (E).
صفة كل حيوان ذكر يعيش مع عدة اناث . وصفة كل نبات يجعل ازهاراً خثوية وذكرية واثوية على جذع واحد .

١٦٨٠٥ - صُغُرِيكة Impôt (F). Imposé, Tax (E).
الضريبة هي حصة اشتراك الفرد في نفقات الدولة العامة . لذلك فهي كل أسلوب تتبني به الحكايف العامة لحل الملكتلين . والضرائب عديدة تنحصر منها :

ضريبة استدلالية Impôt indiciaire
ضريبة الارباح الاستثنائية Impôt sur les bénéfices exceptionnels
ضريبة البلدية Impôt municipal
ضريبة التراكات Impôt de succession
ضريبة التمتع Patente
ضريبة الدخل Impôt sur les salaires
ضريبة الدخل العام ، ضريبة الربح Impôt général sur le revenu
ضريبة الطرق ، بدل الطريق Prestation
ضريبة القيم المتغيرة Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers
ضريبة التصاب Impôt de quotité
ضريبة تصاعدية Impôt progressif
ضريبة تنازلية ، ضريبة انحدارية Impôt dégressif
ضريبة توزيعية Impôt de répartition
ضريبة جزائية Impôt forfaitaire
ضريبة شخصية ، بدل Impôt personnel
ضريبة عقارية ، خراج Impôt foncier
ضريبة حثية Impôt réel
ضريبة غير مباشرة Impôt indirect
ضريبة مباشرة ، مفردة Impôt direct
ضريبة نسبية Impôt proportionnel
ضريبة نفعية Impôt cédulaire

١٦٨٠٦ - صُغُرِيك Gomme (F).
رسم يصيب الأشجار المنيرة وفيها يعرف بالتصمغ ، اطلبه .

١٦٨٠٥ - صُغُالكة Endogamie (F). Inbreeding (E).
التصالب بين اقارب من اصل واحد أو بين انسال قديم واحد .

١٦٨١١ - صُغُة Echinops (S).
Echinops, Echinopsis (F). Echinops (E).
جنس نباتات ثنائية شائكة مسمرة من فصيلة الصباريات انواحه عديدة بعضها اسطوانية ، مضلعة ، لحية ، فزوة الشثانة . سدائرها شائكة تركز على ثيج الاضلع . ازهارها كبيرة اللد ، جميلة الشكل والالوان تقوم على شرايين مضطربة تكسوها الحراشف المرسوة المتراكبة . تزور في المراكز لانها تفتش البرد .

١٦٨١٧ - صُغُف Multiple
الحاصل من عدد مضروب في ذاته .

١٦٨١٨ - صُغُل Consanguinité (F).
Consanguinity (E).
هو في اللوجان اسطفاة الاقارب فاسفادوا ذلك لاصح النسل او تحميمه او تثبيت بعض الصفات الخاصة .

١٦٨١٩ - صُغُباب Cri du lapin (F).
Cry of the rabbit (E). صوت الارنب اذا اخلت .



صُغُة

١٦٨٣١ - **صَفَط دَمَوِي** (F). Tension artérielle (F).
Blood pressure (E).
الضغط الدموي أو التوتر الشرياني هو قوة ضغط الدم على جدران الشرايين بفعل حركة القلب .

١٦٨٣٢ - **صَفِيب** (F). Glaplement du lapin (F).
Yelping of the rabbit (E).
صوت الأرنب .

١٦٨٣٣ - **صَفِيفَة** (F). Luxuriance (F). Luxuriant (E).
هي الروضة الخضرة الزبانية وقيل الصفيغة من بقل وعشب .

١٦٨٣٤ - **صَفِيفَة** (F). Cristatella (S). Cristatelle (F).
جنس حيوانات طحلبية من مظاهر الشرج تعيش في المياه العذبة . أمثالها متحركة .

١٦٨٣٥ - **صَفْ** (F).
هي نارية الخططة فراشة صغيرة القند سمراء اللون إذا لمست شري الأرجل من لسمها يذيق حراشيفا . ج غفلة .

١٦٨٣٦ - **صَفَاج** (F). Discoglossus (F). Discoglossus (E).
جنس صفادع من فصيلة الصفاجيات . أنواعه المعروفة خمسة . أعطائها تمتد من الحند الصينية إلى الشرق الأوسط وبعض البحر المتوسط . أجسامها صغيرة الحجم . طول من ٥ إلى ٨ سم . رؤوسها متوسطة القند . جبينها كبيرة نافرة . السنبا مستديرة الشكل . قليلة الحركة . أصابع قوائمها الخلفية قصيرة الخطاط الذي لا يتجاوز الزنم الأمامي . جلوسها عادمة الثالثة والثمعل . شديدة القوة . أنوثها إلى السمرة الخشبية يملؤها تقيج امر حاد وضغط أصفر أحمر تمتد من الرأس إلى العجز . وتصلان إمبران عايقان يمتدان من العينين إلى طرف الخلف . يطونها سوية الألوان الباهتة يغلب فيها الخشن الاغبر . تعيش في المناطق الجارية الماء . تسرح في الليل . قوتها الحشرات والديدان . الإناث تقرأ دحبلها في الماء ضمن ثلثين كل شلة تحوي من ٢٠ إلى ٣٠ دحيلة تنقف بعد التسمرة بنحو ثلاثة أسابيع .

١٦٨٣٧ - **صَفَاج مَلُون** (F). Discoglossus pictus (S). Discoglossus pictus (E).

نوع من الصفادع ينتمي إلى فصيلة الصفاجيات التي تحمل اسمه . جسمه صغير القند يطول نحو ٦ سم . عند الذكر ونحو ٨ سم . عند الأنثى . رأسه متوسط الحجم . عيناه زرقان جاسطتان . حنكه واسع الشفق . مسن الفك العلوي . قاتمته الاماميتين وربعيته الاصابع الطويلة . قاتمته الخلفيتين خاسيتا الاصابع الخفية بخطاب قصير . جلده قليل القلفة . شديد البهتان . ثوبه إلى السمرة الخشبية يملؤها تقيج امر وضغط أصفر أحمر تمتد من مقدم الرأس إلى طرف العجز . وبتان كستيتان يمتدان من العينين إلى طرف الخلف . يطنه إلى الخشن الاغبر . يألف النامق والندران . يسرح في الليل . قوته الحشرات والديدان والأباب والحوام . يباه الشوي يستمر نحو أربعة اشهر . يعتبر من الصفادع النافعة .

١٦٨٣٨ - **صَفَاجِيَات** (F). Discoglossidae (F). Discoglossidae (E).

فصيلة حيوانات درداء قازية من لة البقيات ومربطة

١٦٨٣٩ - **صَفَام** (F). Eurycaros (S). Eurycéros (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من الجوامئ سفيات المنقار ونسيلة الزرزوريات . موطنه جزيرة مدفسكر . جسمه معتدل القند شبه السمرة . ثوبه إلى السواد اللامع . وذائره وأباهره إلى السمرة الطلوانية . مقادته أزرق اللون شبه غرومي الشكل . كبير ونظيل وفلت مقدم الرأس كالكامنة . جناحاه ذوبا الاطراف . ذنبه مستدير الرمال . قوته الجوب والثار واختراف .

١٦٨٤٠ - **صَفِيس** (F).
هو المليون المروى . طلبة .

١٦٨٤١ - **صَفِيس** (F). Renardeau (F). Fox-cub (E).
هو ولد الثملة أي أنثى الثلب .

١٦٨٤٢ - **صِفْث** (F). Poignée d'herbes (F). Wisp of herbs (E).
الضفت : قبضة من حشيش غطلة الربب بإليابس . وكل ما ملا الكف من النبات فهو صفت . وضفت النبات : جلده استغاثا .

١٦٨٤٣ - **صِفْثَة** (F). Roscam (S). Roscée (F). Rosces (E).
نبات عشبي ينحلي الأروية من فصيلة الزنجبليات . مهدها بعض مناطق الهند والافان . ساقها موقية ترتفع نحو ٥٠ سم . أوراقها لائحة متضاربة سنانية النصل بحرية الخضار انزعاجها سبيل التسجج . انزعاجها صغيرة القند زرقاء اللون . تزود للزبون في الحدائق التي لا تحصى شدة القند .

١٦٨٤٤ - **صِفْثَة** (F). Poule (F). Hen (E).
هي الدجاجة . ج . صفاد .

١٦٨٤٥ - **صِفْث** (F). Poussée (F). Thrust (E).
هو الدفع الاقني على جدار ما من جراء ككل التراب او الماء .

١٦٨٤٦ - **صِفْث** (F). Presson (F). Pressura (E).

١٦٨٤٧ - **صِفْث البَحَار** (F). Tension de la vapeur (F). Vapour pressure (E).
هو قوة امتداد البخار .

١٦٨٤٨ - **صِفْث جَوِي** (F). Pression atmosphérique (F). Atmospheric pressure (E).
الضغط الجوي هو مقدار وزن الهواء في أي نقطة كانت معينة فوق سطح الأرض . وهو يقدر عنه سطح البحر بما يعادل ضغط هود من الزئبق ارتفاعه نحو ٧٦ سم . لذلك فالارتفاع من سطح البحر ينقص كمية الضغط كما هو الحال في الجبال حيث تقل كثافة الهواء التي تقدر الضغط . ويتأثر الضغط أيضاً بامتالي الحرارة والرطوبة إذ كلما ارتفعت درجة الحرارة تمدد الهواء ونفث وزنه وكما زاد بخار الماء ينفث وزنه كذلك . وهذا الضغط الجوي يقاس بواسطة جهاز خاص يدعى المرواز (البارومتر) .

١٦٨٤٩ - **صِفْث حَكُوِي** (F). Pression osmotique (F). Osmotic pressure (E).
اثبت العلم حل أن محتويات الحويرات النباتية يد أن تأخذ كمائة مية من المحلول الملحي الفذائي تنفك من النشاء الذي يحيط بها وتنقلس . فهذه البادرة الطبيعية الحوية تمنح الضغط الحلولي أو الانسلا .



صَفَام



صَفْثَة



صَفَاج مَلُون

١٦٨٤٦ - **صَفَدُغٌ أَحْمَرٌ** * **عُدْمُولٌ أَحْمَرٌ**
Rana esculenta (S), Grenouille verte (F).
Green frog (E).



صَفَدُغٌ

نوع من الضفادع ينتمي الى فصيلة البسموليات . اصغاه تشمل سطح البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى الى الاذن وادوية الجنوبية والوسطى والغربية وافريقية الشمالية . جسمه صغير الحجم . الذكر اصغر قدراً من الانثى بطول ٥ هـ الى ٦ سم . بينما تطول الانثى من ٧ الى ٨ سم . رأسه متوسط الحجم . خطمه مستعرض الشدق . فكه السفلي عديم الأسنان . عيناه كبيرتان جاحظتان . اصابع قاتمجة الاماميتين طليقة . اما اصابع الخلفيتين فليقية محطاب لا يتجاوز الزام الثاني . جلده مائل البشرة النشالية . ثوبه الى الخضار المائل تلوو ماجة حطلة ورشفة سمراء لاقيامية الشكل تكتنف الظهر والاعلان والقوائم من جوانبها الخاريجية . بطنه الى البياض الاخضر . وهذا النوع من الضفادع ينام ، بغض الشيء ، البنية التي يعيش فيها . يتميز الذكر بفلقين في مؤخر الرأس من البين واليسار ينتفخان عند التلقيح ، ثم بالعلاب المحبسة التي تملأ اطراف اصابعه الامامية في زمن التكاثر . يعيش معظم حياته ، نحو ١٠ سنوات ، في القنود والناقع يتركها في الليل تنمنا يسرح في طلب الرزق ويمد اليها عند الغمر . قوته الحشرات والديدان . الانثى تسرا في احوال الربيع من ٥٠٠٠ الى ١٠٠٠٠ بيضة طغر الواحدة نحو ١ سم . في شلة هلامية المادة تقذف بها في المياه الفحلة فتفترس وتشتقر في مكانها حتى التفك الذي تفرح مدته من اسبوع الى ثلاثة اسابيع . اما الطور البلعومي فيستمر من ٧٠ الى ٩٠ يوماً .



صَفَدُغٌ أَحْمَرٌ

١٦٨٤٧ - **صَفَدُغٌ أَشْعَرُ** * **عُدْمُولٌ أَشْعَرُ**
Trichobatrachus robustus (S), Grenouille poilue (F), Hairy frog (E).



صَفَدُغٌ أَشْعَرُ

نوع من الضفادع ينتمي الى فصيلة البسموليات . مهد بلاد الكامرون من احوال افريقية الاستوائية . جسمه صغير القد اعليحيلى الشكل يتميز بكونه قد الذكر الذي يطول من ١٢ الى ١٤ سم . ويصغر منه الانثى التي تطول من ٨ الى ٩ سم . ويتميز الذكر ايضاً بشعوره القنوية التي تكتنف الاطبلين وداعل الفخذين . رأسه مستعرض القنادة ، مقطوع الحلق ، كبير الشفق . عيناه صغيرتان ، مستديرتان ، جاحظتان . فكه السفلي عديم الأسنان . اصابعه طليقة في القاتمجة الاماميتين ومقيدة في الخلفيتين محطاب لا يتجاوز لزام الاول . اطراف اصابعه الامامية والخلفية مجهزة بطياح محبسية تحكته من تسلق السطح المائلة . ثوبه الى الخضار الاسمر تلوو ماجة سغاه قائمة ورضان اسودان يمتدان من مقدم الحلق الى مؤخر الرأس . ويبدو سمراء قائمة تغلفب الصلصة اعليا من قد الرأس الى البجز . ثم رشفة دقيقة سوداء يربطج مستدير اسود يملو مؤخر الظهر والقوائم الاربع . الانثى تشمل بذلات الثوب ولكنها عادمة الشعور القنوية والظباب القنوية وهي تعيش وحدها في البراري والسهول القريبة من مجاري الماء بينما يعيش الذكر في مياه الجبال القليلة الحرارة ولا يفترس عن الانثى ويقترب منها الا في زمن السفاد .



صَفَدُغٌ أَخَرٌ

١٦٨٤٨ - **صَفَدُغٌ أَخَرٌ** * **عُدْمُولٌ أَخَرٌ**
Rana temporaria (S), Grenouille rousse (F).
Red Frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي الى فصيلة البسموليات . اصغاه

السوفيات ورتبة البتراوات ابي عديت الذئب . اجلسها وانواعها متوسطة العدد . اجسامها شبيهة باجسام الضفادع لكنها تتميز بالثبات المستديرة القليلة الحركة . ثم يوجد اضلاع قصيرة ترتكز على الفقار الامامية المتقدمة . واصغراً يتبدد التواتر النطية الجانبية القائمة على قعره البجز . اعرف اجناسها واشهرها الضفادع والأكيت والتفاد .

١٦٨٤٩ - **صَفَدُغٌ مُذْبِئٌ**
Urodela (F).
Urodela (E).

رتبة من الضفادع تسمى بالسرقيات ، اطلها .

١٦٨٤٠ - **صَفَدُغٌ**
Bosse de vache (F).
Cow-dung (E).

هو خشي البقر .

١٦٨٤١ - **صَفَدُغٌ**
Amnicle (F).
الصفادى من الحويون والنبات الذي يعيش على صفاد الانهر والبييرات .

١٦٨٤٢ - **صَفَدُغٌ** *
Omoita colon (S).
Omoita colon (F), Omoita colon (E).

حشرة نائمة دائمة من فصيلة التزيحات ورتبة سفدات الاجسمة . تألف الموائل الرطبة التي تكثر فيها الفطور . غنافسها تعيش على الفطور وصل المواد النباتية والفسوية المتحللة . يرقاتها تهرب الفطور وتعيش عليها دون سواها . جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٥ سم . ثوبها الى السمرة المازوية اللامع . رأسها صغير الحجم . عيناه صغيرتان ، زباناها صولجانيان ، نحيلان . ظهرها قليل الاحديداب ، مستدير المؤخر اللامع ، غداها غفيفة التميز ، كيثفا النمل . لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملدة في اواسط الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار . تسادد بعد ظهورها بسنة اسابيع . تمتع المن في تكاثر الفطور . البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٧ سم . جسمها مستطيل للمقدم والرأس ، مستطيل المؤخر ، سداسي . القرن اسمر اللامع ، حاكك السمرة في الرأس والمفاصل . طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في آخر نفس تحضر البرقة في الفطر العائل .

١٦٨٤٣ - **صَفَدُغٌ**
الضفادع هو الضفد المرم .

١٦٨٤٤ - **صَفَدُغٌ**
الضفادع مائة غفروية صلبة في حوف الحافرن من القفوس . وقد تكون النسر . اطلب نسر .

١٦٨٤٥ - **صَفَدُغٌ** ، **صَفَدُغٌ** ، **صَفَدُغٌ**
Rana (S), Grenouille (F), Frog (E).

جنس حيوانات برآه قاذية من فصيلة البسموليات وصف الضفادع . انواعه المعروفة ١١٧ موطنها العالم . تتميز باجسامها الريمية وبامتدالة قوائمها الخلفية التي تساعدها على السط والسياسة . تعيش في المياه الرافكة ، يغشاها يعضي السجيل والثر يغتف من بلاصت صغيرة تقم في الماء حتى بروز واكبال قوائمها . قوته الحشرات والحوام والاسماك القنوية . ومن اماته البسمول والنفاد والتفاد . والذكر يكى باي هيرة اما الانثى فتعطي سفدنة وهاجة وكنيتها ام هيرة . اشهر انواعه واعماها ما لي .

١٦٨٥٣ - ضفدع جبّار * ، عُدْمُول جبّار

Rana goliath (S). Grenouille géante (F).
Goliath frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة السمليات. هذه بلاد الكامرون من أعمال إفريقية الاستوائية. اكتشف في أوائل القرن الحالي ويعتبر أكبر أنواع الضفادع المعروفة وأغلبها وإبطها. الذكر بطول من ٣٢ إلى ٣٧ سم. والآن بطول من ٤٥ إلى ٥٢ سم. يعيش قرب المنابع ويجاري الماء ولكنه لا يرتاد الماء إلا في زمن التزاوج. وتقيه قرب الشبه بصيغ الثور. قوته الحشرات والجوارح والمضاه والورغ والفئران وكل ما دب ويمكن منه.

١٦٨٥٤ - ضفدع تشيط * ، عُدْمُول تشيط

Rana agilis (S). Grenouille agile (F).
Agile frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة السمليات. أعطاه تيمت من الشرق الأدنى إلى أروبة الجنوبية الشرقية وللشمال. جسمه صغير القد. الذكر بطول من ٦ إلى ٧ سم. والآن بطول من ٨ إلى ٩ سم. ثورته قرب الشبه بصيغ الثور الضفدع الاخر إلا أنه يتميز باستطاعة القامحين الخلفيين ما يجعل مجال قفزه نحو مترين. وهو مستعرض الشكل. عام الانسان في الفك السفلي. عينا بصيرتان مستطيلتان. أصابه طليقة في القامحين الامامين وبقية في الخلفيين بحظاظ متوسط الامتداد لا يتجاوز نصف الاصابع. جلده مالمس البشرة. قليل التلون الدقيقة المتباعدة المبيضة. ثوربه يمان البيئة التي يعيش فيها وهو يركز على الشقة المحتلطة بتملحها رقة سمراء في الظهر والقرنم وبذاتان كستينتان تمتدان من مقدم الحلق إلى مستوى الكتف. بطنه ورشاه إلى البياض الاصفر. يعيش معظم حياته في القيل ويبيت في النهار ولا يقترب من الماء إلا في زمن السفا والتسرة وعندها يركبه برد الشاه على حجر المسما الاضي الى الماء. قوته الحشرات والديدان. ذكره عامدة البيلة القصيرة. الآن تسرا ابتداء من اواخر نيسان من ٨٠٠ الى ١٠٠٠ ديلة في جبل هلامي المادة تطرحه في المياه الضحلة فيفوس ويستقر في مكانه حتى التفت الذي يتم عادة قرب اواخر تموز.

١٦٨٥٥ - ضفدع عيات * ، Amphibia (S).

Amphibiens, Batraciens (F). Batrachia (E).

صف حيوانات من الفقاريات الحديثة النفس. سائله واجناسه واتواعه كثيرة الدمج بعضها ثلاث رتب : حدييات الذنب وحدييات الارجل والسروريات.

١٦٨٥٦ - ضفدع و * ، Odontophorus (S).

Odontophore, Capucine (F).

جنس طير من فصيلة الطيوريات. انواعه المعروفة نحو ١٧ أصلها من المناطق الاستوائية الاسيوية والامريكية. ملجها الحياتي جامعي. جماعاتها قليلة العدد. تألف البراري والاراجح الغلة. قوتها الحشرات المختلفة الفصائل والانواع وبعض الاعشاب والبرور البرية. اجسامها ربة تقول من ٣٠ الى ٣٦ سم. رؤوسها صغيرة متوسعة بقنازع قصيرة هريفة الشكل تمتد من قواع المناقيد إلى الاقداف. تتقاعها صيرة غالية الشكل. مسنة الاكالة السفلي. عيونها صغيرة. حناجرها عادم الريش مخضب بالاحمر او الاصفر او الاسمر. سواقلها مستديرة. لاسفة. اذناها

تتمل معظم البلاد الاسيوية والشرق الاوسط واروبة. جسمه صغير القد. الذكر بطول من ٦ إلى ٧ سم. والآن بطول من ٨ إلى ١٠ سم. رأسه متوسط القد. خطمه مستعرض الشكل. فكه السفلي عادم الانسان. عينا كيرتان جاحظتان. أصابه طليقة في القامحين الامامين وبقية في الخلفيين بحظاظ متوسط الامتداد. جلده مالمس البشرة عادم التلون. ثوربه الى الشقة المحتلطة الجراج يمتد في الاطلين ويبرز في البطن وتعلو رقة سمراء متفرقة في القوام ريدة كستنية منه مؤخر كل عين. بهذا الضفدع الذي يمان الى حد ما البيئة التي يعيش فيها يشقر ويسمر ويتلون. بعض التي. بالوان يحيط. يعيش معظم حياته التي بطول نحو ١٢ سنة قرب المنابع ويجاري الماء والندران. يسرح في القيل ويحجب في النهار أما في الماء او بين الحجارة وتحتها وفي كل مكان يؤمن له الاستار والسكنية. قوته الحشرات والجوارح والمضاه والورغ والديدان. الآن تسرا في أوائل الربيع من ٢٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ ديلة. قطر الرودة نحو ٢ سم. ثلة من الحبال خشالية المادة تعوم على سطح الماء. التفت يحصل بمد التمرة باسبوسين ولما يتجاوز ثلاثة اسابيع. والطور البلوطي ينتمي في اواسط الصيف.

١٦٨٤٩ - ضفدع الجبل، ضفدع السم * ، ضفدع

Craapud (F). Toad (E).

هو السليم، اطابه.

١٦٨٥٠ - ضفدع الحكل * ، عُدْمُول الحكل

Rana arvalis (S). Grenouille oxyrhina (F).
Arvelis frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة السمليات. أعطاه تيمت من الشرق الاوسط إلى أروبة الوسط. جسمه صغير القد. الذكر بطول من ٥ إلى ٦ سم. والآن بطول من ٧ إلى ٨ سم. ثورته شوزن الضفدع الاخضر وهو مستعرض الشكل. عادم الانسان في الفك السفلي. عينا كيرتان جاحظتان. أصابه طليقة في القامحين الامامين وبقية في الخلفيين بحظاظ متوسط الامتداد. جلده مالمس البشرة قليل التلون البنية التي يعيش فيها وهو يركز على الشقة المحتلطة بتملحها رقة سمراء في الظهر والقرنم وبذاتان كستينتان تمتدان من مقدم الحلق إلى مستوى الكتف. بطنه ورشاه إلى البياض الاصفر. يعيش معظم حياته في القيل ويبيت في النهار ولا يقترب من الماء إلا في زمن السفا والتسرة وعندها يركبه برد الشاه على حجر المسما الاضي الى الماء. قوته الحشرات والديدان. ذكره عامدة البيلة القصيرة. الآن تسرا ابتداء من اواخر نيسان من ٨٠٠ الى ١٠٠٠ ديلة في جبل هلامي المادة تطرحه في المياه الضحلة فيفوس ويستقر في مكانها حتى التفت الذي لا يتجاوز مدته ثلاثة اسابيع.

١٦٨٥١ - ضفدع كان

الصفدع الثاني نجم ثير من كوكبة قيطس مركزه على الشعة الجنوبية من الذنب.

١٦٨٥٢ - ضفدع لوزي * ، Rana mugiens (S).

Grenouille tauress (F).

نوع من الضفادع موطنه امريكة الشمالية. كبير الجثة طول نحو ٥٠ سم. ثورته يشبه صبيح البقر.



ضفدع الحفل



ضفدع جبار



ضفدع تشيط



ضفدع

١٦٨٦٦ - **ضَفِيلَة** * Cyrella (S). Cypello (F).

Cyrella (E).

جنس نباتات عشبية حشوية من فصيلة السبوتيات . مهمها بعض مناطق أمريكا الجنوبية . سيقانها مجراعية موقرة . أوراقها صغيرة ، متناوبة النصل . أزهارها متباينة التخصيب . تزهر القرنين ضمن البيوت وفي الحدائق . تروى في الأترية الخفيفة التي يكثر فيها عنصر الرمل || أنواعها المعروفة قليلة العدد ، أشهرها التالية :

١٦٨٦٧ - **ضَفِيلَة وَصَائِيَة الْوَيْن** * Cyrella plumbea (S).

Cypelle couleur de plomb (F).

نوع من الضفيلة . منبتها البرازيل . ساقها عقدية ، كثيرة الأوراق الصغيرة ، ترتفع من ٦٥ إلى ١٠٠ سم . زهرها كبيرة الحجم ، وسيدة ، ألوانها الازرق الزرقاء الرصاصية المارح يملؤها بقية مستديرة وريدة اللون || تنمو باستمرار نحو ثلاثة أسابيع ويكثر في شهر آب .

١٦٨٦٨ - **ضَفِيلَة هَرْبِرْت** * Cyrella Herbart (S). Cypella de Herbert (F).

نوع من الضفيلة . منبتها غزويلا . ساقها موقرة ، عادية العقد ، ترتفع من ٣٠ إلى ٥٥ سم . أوراقها صغيرة مجرية اللون . أزهارها عديدة صفراء اللون مملعة بالازرق والبنفسجي || تنمو باستمرار من آب إلى المثلث .

١٦٨٦٩ - **ضَفِيلَة** * Côté (F). Side (E).

كل غصن من الخيطوط التي تؤلف سطوح الشكل .

١٦٨٧٠ - **ضَفِيلَة** * Nervure médiane, Côte (F). Median nerve, Rib, Costa (E).

هي في الورقة عرقها الرئيسي الذي يصل بالوسط والأي تشعب منه سائر العروق . وهي التي تغل النسخ إلى نسج النصل فتورده بأغصن وتصنعه كلسا .

١٦٨٧١ - **ضَفِيلَة الْبَكْرَة** * هو الحبلاب ، اطبه .١٦٨٧٢ - **ضَفِيلَة الْمَثَلَّث** * Côté du triangle (F).

Triangle side (E).

١٦٨٧٣ - **ضَفِيلَة الْمُضَعَف** * Côté du polygone (F).

Polygon side (E).

١٦٨٧٤ - **ضَفِيلَة** * سكة صغيرة غضراء صغيرة الغنم (السان) .١٦٨٧٥ - **ضَفِيلَة** * Costal١٦٨٧٦ - **ضَمَّ - إِحْطَاق** * Annexion (F).

Annexion (E).

هو اتباع شيء بأخر .

١٦٨٧٧ - **ضَمَّ الْأَرَاكِيزِيَّة** * Remembrement (F).

Reconstitution (E).

هو توحيد القطع في الأرض المحرقة أو ضم الأراضي الزراعية إلى بعضها بعض حتى يتسع الملك وييسر استئجاره .

١٦٨٧٨ - **ضَمَّ النَّعْمَةُ إِلَى الْمَلِكَةِ** * Consolidation de l'usufruit (F). Funding of usufruct (E).

هو إحدى وسائل زوال الانقطاع بأحد حق الملكية وسنم النعمة في مالك واحد .



ضفوع



ضفون عاتق الزغب



ضفون ملتصق الأرض

جذع غزويته الشكل . ثمراتها واسابيحها شديدة النشط . الأوراق تختلف مع الأنواع ، تكثر فيها الشقمة السمراء المرقشة بالأسود في الرداء والجناح . اعناقها مقلقة بقلادة بيضاء اللون سود الحمار || تدفن أعناقها في الخواص تقيها في التربة بين الأدغال المستعصية أو بين غليل الخليلج الرفيع الكثيف . أنثائها تبيض وتحنن من ١٤ إلى ٢٠ بيضة . يستمر نحو ثلاثة أسابيع تقوم به الإناث دون الذكور التي تكون لها الحياة والغذاء .

١٦٨٥٧ - **ضَفِير** * Maçonnerie en pierres sèches sans liant (F).

الضفر البناء بجماعة بغير طين ولا كلس .

١٦٨٥٨ - **ضَفِيع** * Excrément de l'éléphant (F).

الضفيع : نجو القيل . Elephant excrement (E).

١٦٨٥٩ - **ضَفِين** * Parasitisme (F). Parasitism (E).

الضفن هو الروضة ، أطليا .

١٦٨٦٠ - **ضَفُون** * Nycthomos (S).

Nycthome (F).

جنس غفائش من عائلة الخيريات . موطنه المناطق الاستوائية الآسيوية والأفريقية والأمريكية . أنثاه عديدة ، أجسامها صفراء الفقد . رؤوسها مملعة قبيصة . آذانها شبه مستديرة . فرائسها حشرية . ضفهاها بنفسه . يعيش جماعات كثيرة العدد . يسرح كامل الليل . قوته الخشرات على اختلاف أنواعها . يألف التجار الحربية الدائمة .

١٦٨٦١ - **ضَفُون** * Paxillus (S). Paxilla (F).

جنس فطور من فصيلة الفصيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد أصلها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش على النبال والمواد النباتية الملتصقة والأرويات النضرة . تتميز بكون نكاتها وبقرس سيقانها وباللوناء الماهقة || أعرف أنواعها وأشهرها الضفون المايق الزغب والضفون المنلف الاطراف .

١٦٨٦٢ - **ضَفُون عَاتِق الزَّغَب** * Paxillus strotomentosus (S).

Paxille à tomentum foncé (F).

نوع من الضفون . يعيش على أرويات التجار البعرة اغصها الشديان . ساقه ضخمة ، قصيرة ، كستية اللون . نكهته كبيرة ، عذوبة ، مزغبة السطوح ، قطرها نحو ١٢ سم . ألوانها إلى الصبغة السمراء يعلوها موج كستية || لحية مأكولة لذيدة العلم .

١٦٨٦٣ - **ضَفُون مُلْتَصِق الْأَطْرَاف** * Paxillus involutus (S). Paxille enroulé (F).

نوع من الضفون . يعيش على المواد النباتية الملتصقة . ساقه مستعدة الانتفاخ والنفط . نكهته كبيرة ، مقمرة ، ملطفة الاطراف ، قطرها نحو ١٥ سم . ألوانها إلى الصبغة الشبه يعلوها موج نحاسي امع || لحية مأكولة ، لذيدة العلم .

١٦٨٦٤ - **ضَفِيرَة** * Plexus

جموعة عصبات حشوية .

١٦٨٦٥ - **ضَفِيرَة الْأَسَد** * Aldhara

ضفيرة الأسد نجم نير من كوكبة الأسد الاصفر .

اسمر العروق . يظنها اسمر الصفحة العليا ، اسود السفلى . قوائمها الى الشقعة اسفرا || مسرها البراري والنايات حيث تكثر الاصاب النجيلية . قوتها صفت النجيليات .

١٦٨٨٨ - مُبِيرَة مَرَقِيْشَة

Miridius punctulatus (S). Miris punctus (F).
حشرة خاضعة من فصيلة المصبيجات . جسمها صغير القد . يطول نحو ٥ م . رأسها صغير ، عيونها ، حنطلي اللون . خطمها مستدل الطول . حناها صغيرتان ، ناضرتان . زباناها حنطلي اللون . كوسلها حنطلي مرقوش بالاسمر . حنجبتها صغيرة . حنجبتها ظهرها مستطيلتان ، حنطلتان ، تعلوها رقعة سمراء ويقيج اسود واصفر . ظهرها لائح . يعلها الى السرة السوداء حنطرا اصفر بني . قوائمها سمراء || تألف البراري والمراعي العذلة مرتمها الاصاب البرية .

Garantie (F).
Guaranty, Warranty (E).
الضمان هو حاية شخص من ضرر يدهه او توفيقه من ضرر وقع عليه . لذلك فصيغه عديده تخص منها بالذکر :
ضمان اليوبوب
ضمان الفعل الشخصي
ضمان الفعل
ضمان ملك
Garantie des vices (F).
Garantie du fait personnel (F).
Garantie de fait (F).
Garantie d'éviction (F).

١٦٨٨٠ - مُبِيرَة زُرَاقِي هُو التَّابِيْن الزُّرَاقِي ، الملبه .

١٦٨٨١ - مُبِيرَة ، بِقَافَة

Bouquet, Gerbe de fleurs (F). Bouquet, Bunch of the flowers (E).

١٦٨٨٢ - مُبِيرَة الجُنْبُل *

Capsus vandilicus (S). Capsus du houbton (F).
حشرة من المصبيجات ثوبيا الى الصفرة الباحة . طولها نحو ٦ م . ورعها ٢ || تركب اوراق الجنبل تنصص صارتها وتؤذيها .

١٦٨٨٣ - مُبِيرَة الحَرَو *

Phytoecoris populi (S). Phytoecoris du pauplier (F).
حشرة خاضعة من فصيلة المصبيجات . جسمها صغير القد . يطول نحو ٧ م . لونها الى البياض الاخير يملوه يقيج اسمر يشمل جميع الاضداد بما فيها الزباني والقرنات || رأسها صغير . خطمها مستدل الطول . حناها كيرتان ناضرتان . زباناها مستطيلتان . كوسلها قمي الفكل ، مقطوم الطرف . حنجبتها حرمة . حنجبتها ظهرها مستطيلتان ، قوائمها مبعثرة الملب || تركب اوراق الحسور والصلعاف واليزون .

١٦٨٨٤ - مُبِيرَة السَّيْسَارُون *

Capsus pestinaceae (S). Capsus du pansis (F).
حشرة من المصبيجات ثوبيا الى الزرقعة يملوها موج اخضر . طولها نحو ٤ م || تركب مع رقاتها اوراق واخضر السيسارون والجزر .

١٦٨٨٥ - مُبِيرَة العَرْن *

Capsus carvinus (S).
Capsus du sainfoin (E).
حشرة من المصبيجات طولها نحو ٤ م . ثوبيا الى الصفرة الزراعية . اجنلها خضر . زباناها الى الايروالية || تركب الرن حل اختلاف انواعه فتؤذي الارواق وتذبلها .

١٦٨٨٦ - مُبِيرَة المَلْفُون *

Capsus bipunctatus (S). Capsus du chou (F).
حشرة من المصبيجات ثوبيا فسقي اللون . طولها نحو ٨ م . ورعها نحو ٢ || رقاتها دقيقة الجسم خضره الون تنفث وتتشمل مل الملفون وتعمل فعل الحشرة الكاملة بالمتصاص صارة الورق .

١٦٨٨٧ - مُبِيرَة سَوْدَاة *

Capsus star (S).
Capsus noir (F).

حشرة خاضعة من فصيلة المصبيجات . جسمها صغير القد . يطول نحو ٦ م . رأسها مستعرض القفف ، اسود اللون . خطمها مستدل الجرم . حناها صغيرتان ، ناضرتان . زباناها شديدة السرة . كوسلها اسود . حنجبتها صغيرة حرمة . سواد . حنجبتها ظهرها مستطيلتان . ظهرها اغير اللون ،



صَمِيْجَة الجُنْبُل



صَمِيْجَة السَّيْسَارُون



صَمِيْجَة العَرْن



صَمِيْجَة المَلْفُون

١٦٨٨٩ - مُبِيرَات

Capidae, Miridae (S). Capidae, Miridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنسة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . بعضها سار . جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل . ثوبيا مختلفة الالوان يلب فيها الاصفر ثم الاخضر والبي . قوتها الاستشارية رباعية الفواصل . استنكاها ثلاثية الاجزاء . ارساغها ثنائية القفل . تمتص مكبا داخل الانسجة النباتية وتركب عدة نباتات تمتص نساها .

١٦٨٩٠ - مُبِيرَة ، كَشْمِيْجَة

Pansement (F).
Dressing (E).
حاية الجرح والبلاج والضماد تسهيلا لانماله .

١٦٨٩١ - مُبِيرَات

Tetracentron (S).
Tétracentre (F). Tetracentron (E).
شجرة حرجية وزراعية تربيتية من فصيلة المفلوئيات . ساقها منتصبه فناء ، طول نحو ٣٠ م . اوراقها هائلة بيضية ، طول نحو ١٢ م . وتعرض نحو ٧ م . تصافا الى الخضار الزاهي . عروقها حراء اللون . عدها من ٥ اذواك الى ٧ . اذوارها صغيرة القد ، صفراء اللون ، رباعية الفصل ، ثلاثية البليات ، رباعية الاسدية .

١٦٨٩٢ - مُبِيرَة

Boques (F). Grove, Arbour (E).
هي الآلة الصغيرة الخاصة ج . نسوز .

١٦٨٩٣ - مُبِيرَة

Implicia

١٦٨٩٤ - مُبِيرَة ، هَوَال

Atrophis (F).
Atrophy, Atrophis (E).

١٦٨٩٥ - مُبِيرَات الخَمِيْشَة

Protobranches (F). Protobranch (E).
رتبة من الرغويات صفحيات الخياشيم تتميز بنحاشيها الخيطية البسيطة المنتصبة ، غير المتوتية ، لتصلها يعضها او تجمعها الى يعضها نزع من الملب البقيق القصير .

١٦٨٩٦ - مُبِيرَة

Turgenia (S).
Turgenia (E).
جنس نباتات عشية سولية برية من فصيلة الخياشيم . انواعها المرفوعة قليلة العدد منها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط اخضرها سورية ولبنان وفلسطين || صيغها مختلفة . غشة ، زياء ، قليلة الفروع والاشعاب .

من وزن البلوغ والتجوير || يكافح ويستعمل أحد الغرابير
القذالة المركزة على النملس توباً به الإضرار أو عند ظهور
عوارض القطر .

١٦٩٠٢ - شعير

Sternotherus (S). *Sternothera* (F).

جنس ملاحف مائية من فصيلة الخفاشيات . أنواعه
المعروفة ثلاثة . أصلاتها بعض مناطق افريقية الشرقية
والخليج حتى الهند ، تألف الأثر والبحيرات والمناقع ||
أجسامها متوسطة للحد طول من ٤٥ الى ٩٠ سم . ذنبها
ثلاثة الاسديداب ، شبه بيضة الثورن . ثوباً الى السرة
التيابية الماجات ، فيها الجروي والأخضر اللامس والبي
والصنابي . زعانها متوسطة ملحوة بمد الذبال . رؤوسها
مكرسة . احتاقها متوسطة الطول والغلظة . أذناها قصيرة .
قوائمها شديدة النشاط ، خاصة الخالب في الزويين .

Debur mauritica (F).

١٦٩٠٣ - شعير

الشعير والأصهار هو اول الفصيح المعروف بالادراك .

Cyon (S).

١٦٩٠٤ - شعير

Dohle (F). *Dohles* (E).

جنس كلاب متوحشة مقترنة موطنها سيرير ويعمل مناطق
آسية الوسطى وباليزية . له ثوبان شعير الشمال وشعير
الجنوب . يألف النباتات والبراري الجبلية . لحمه الحياتي
جامع . جماعته تعد من حدة الى عشرة أزواج . لا يتعم
فرسته متفرداً معها كانت الحال . انفس طرائقه الطياء
والشواذن || شكله الخارجي منقسم التقاطع فيه بالكبد
الاحل اما راحته العاطفة رافحة أين أدو . رين ميزان
جنسه ان عدد اطياف الاناث هو ١٢ او ١٤ في حين ان
لكلية ١٠ اطياف فقط .

Cyon javanicus (S). *شعير الجنبوب* (S).

Dohle meridional, Buansu (F).

نوع من الشعير . موطنه يمتد من جبال حلايا الى جزر
الزايج وبجبال بورليو . يألف الحشاب والجبال . جماعته
تعد من ٤ الى ٥ أزواج يقودها ذكر سن . يقتض جميع
الحوانات الضعيفة والأوز والبط ... يصرح في الليل ولي
التيار || جسمه ابيض الشكل يطول نحو ٩٥ سم . ذنبه
٢٠ سم . ارتفاعه ٥٥ سم . ثوبه الى الشقة السمر يزيداد
اسمراراً في الصيف ويحف في الشتاء || وهو سهل المراس
يألف حياة الاسر ويدين بكون عائد اذا أخذ صيداً لكنه
لا يطيع الا من يمني به ويعلم له الطعام || قيل لنا
مضى أن بعض الكلاب الاعلية تتحدث منه . ثم تحقق
فينا بعد ان النظرية خاطئة لان المادة السنية عند الكلب
تتقل ٤٢ سنّاً في حين انها لا تتقل سوى ٤٠ سنّاً
عند الفول .

١٦٩٠٦ - شعير الشمال ، قيون الجبل

Cyon alpinus (S).

Dohle septentrional, Cuon de montagne (F).

نوع من الشعير . موطنه يمتد من سيرير الى التركستان
والتيب . يألف المناطق الجبلية الكثيرة النباتات والارواح .
جماعته تعد من ٥ الى ٧ أزواج يقودها ذكر سن . يقتض
الطياف والارواح والمراغور والقلوع ... لا يجد منقسم
ابيض يطول نحو ١٠٢ سم . ذنبه ٤٤ سم . ارتفاعه ٥٢ سم .
ثوبه السميني الى الشقة كسر في الرأس واظهر وتبيض

اوراقها معتقة ، حاضنة ، متعاقبة ، مركبة ، وتربة
التصنيع . ورياقها متعاقبة النصال المشاوية التفريض .
انزعابها صغرة ، صيرانية التصنيع ، بيضاء اللون أو
ابرجوانية . ثمارها جب حقيق ، مسطبل ، إيربي الشوك
المثابئين الطول || تنوونها ريبني || اعرف. الثوبها واثورها
القصيرة المريرة الورق (*T. latifolia*) .

١٦٩٠٧ - شعيرك

Benincasa cerifera (S).

Bénincase (F).

نبات زراعي حولي مداد وحيد الجنس والنوع من فصيلة
القرعيات . مهده الثمر الاقصى . زراعته واسعة الانتشار
يستعمل كالكوس في الطبخ وكالبطن في المربيات ||
ساقه مدادة طول نحو ٢٠٠ سم . حوائطه متشعبة . اوراقه
معتقة . كلية النصل المتصبع المزئير ، خضابة الغصص
او سابعيتها . ازهاره فردية ، محورية ، كبيرة القند ،
خضابة البلات ، صفراء اللون . ثماره مستطيلة شبه
اسطوانية الشكل ، طول من ٢٥ الى ٤٠ سم . وظفر
يرواح من ١٠ الى ١٥ سم . لونها الى الخضار الباهت
يملو توشع اسمر . قشور الثار في اول مهدها كثيفة الزغب
الحسي الاطراف ثم يتقلص الزغب لينشأ مادة شبيهة
تكتسل مع الادراك . لياها جامد المكسر ، ابيض اللون ،
خافت العرف المسكي ، من المذاق .

١٦٩٠٨ - شعيرجبل

Dangila (S).

Dangile (F) *Dangila* (E).

سمكة نهرية من مفترسات اللحانة وفصيلة الشربليات .
موطنها جميع انهر الهند والبلاد المجاورة || جسمها ابيض
الشكل ، عذب الظهر ، يطول نحو ٣٠ سم . ثوباً الى
الخضار الاخضر يمتد في الظهر وينتهي في البطن . رأسها
معتدل الجرم ، ريمعي الشكل . غطها ثنائي الطبقات
الذقية . شقلها قليل الانفرج . زعنفتها الظهرية كبيرة
القند ، حلالية التقعر . زعنفتها الذيلية نازلة || لحمها
متوسط الصلابة ، مأكول .

١٦٩٠٩ - شعيب

Dissymétrie (F). *Dissymetry* (E).

الشعيب عدم التناظر في التركيب الاعصامي او الجسموري .

١٦٩٠٠ - شعيبية

Cuminiella (S).

جنس فلور مجهرية قريبة الشبه من السديلة . تتميز بيغها
البروني المردئي الشكل ، العقيق الانتشاب واللبظ اللفة .
ذئبيتها عديدة الضلعات الرزوية التصنيع . صلابتها موزقة
من حليتين لا متجانستين النصل اسطوانية الشكل وأصلها
كروية . اغنيبتها متصلة السام اثنتاثة || انواعها
الاقتصادية قليلة اعرفها شعيب الماهونه .

١٦٩٠١ - شعيبية الماهونه ، شعيبية قرمزية

Cuminiella sanguinea, *Uropyxis sanguinea*, *Puccinia mirabilissima*, *Uromyces sanguines* (S). *Rouille du mahonia* (F).


فطر مجهرى يتطفل على اوراق وثمار الماهونه فيؤذيها
ويصلها || مظهره الخارجي بثور عسبية ميمرة لافلية
التصنيع تركب الاوراق والثمار الفتية . تبو طلاء اللون
نفسية الاخلافة فتصبع النصل وترفعه ثم تنصرف الى الجوزة
الصغيرة حيث تنجر من بورها الفزري اللون || وهو
على الثار وأنها بثور صغيرة مستديرة رافحة ميمرة أو
متراسة تبو طلاء اللون ثم تحيل الى السرة مع اقترابها



شعير



شعير



شعيرة الماهونه



شعير



شعير

الفصويات. مهددا البلاد الحارة. اجسامها دودية مستطيلة، سحقاتها حرقفية التركيب، غيقة، متناوبة من الرأس الى طرف الذنب. وروصها وردية. عيونها دقيقة مغلقة. قوتها الحشرات. تعيش بين الحجارة وتحبها وفي انفاق تسربها كالحيات.

١٦٩١٧ - ضوكتيات
Caecillidae (S).
Caecillidae, Cécillidae (F).
فصيلة حيوانات عادية الارجل من صف الفصدييات اجسامها وانواعها عديدة مهددا البلاد الاستوائية والحارة. قوتها الحشرات والحوام والمواد العضوية المنحلة.

١٦٩١٨ - ضورج
Sinus
هو التوجيه للمقر في فصل النبات ج. اضوحي.

١٦٩١٩ - ضوحي
ضورج اللبن : مزجه ببناء وضحه كذلك.

١٦٩٢٠ - ضوكة
Enkanythus (S).
Enkanythus (F).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « الزهرة الفسحة ». جنس اشجار ونباتات حرجية وتزيينية من فصيلة الخنجنيات. منبتها يمتد من الشرق الاوسط الى اليابان. سوقها ترتفع من متر الى عشرة امتار. اوراقها متناوبة، مسننة القواعد والاطراف. ازهارها حلقي التجميع، طرفي الزنكاز. ازهارها ملونة، عشائية الاسدية، مغرقة المتكاثرة || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية :

١٦٩٢١ - ضوكة جرسييه
Enkanythus campanulatus (S).
Enkanythus en cloche (F).
نوع من الضوكة. مهددا الشرق الاقصى. ساقها فروع تملو نحو عشرة امتار. اوراقها تطلو نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٤ سم. نصالها مهدبة، ذرية الانسان الحادة. ازهارها كبيرة متدلية جرسية الشكل صفراء اللون تملوها شمسة وردية || تنويرها يستمر طوال شهر ايار.

١٦٩٢٢ - ضوكة هندية
Enkanythus deflexus (S). Enkanythus des Indes (F).
نوع من الضوكة. مهددا جبال الهند، اغصانها حلايا. ساقها معتدلة الخصاصة تملو من ٣ الى ٧ امتار. اوراقها واقناعها متراكبة. اوراقها لحياسية الشكل منها السنانية والاطليحية، تطلو من ٥ الى ٨ سم. وتعرض من ٣ الى ٤ سم. نصالها قصيرة الانسان اختارية. ازهارها حراء نحو مشيرة بالوردي || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

١٦٩٢٣ - ضوكة يابانية
Enkanythus japonicus (S). Enkanythus du Japon (F).
نوع من الضوكة. ساقها فروع متراكبة الانقاد والاغصان تملو من متر الى مترين. اوراقها اطليحية تطلو نحو ٤ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصالها مسننة الحمار. ازهارها يستيق الاوراق. ازهارها بيضاء اللون، جلجلية التويجات الخاسية الخدبات || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار.

١٦٩٢٤ - ضور
Rut des bovidés (F).
Rut de la bovidés (E).
هو استمرام البقر وسبها واء الثيران.

في الايطلين والبلن. ثوبه الشوي الى البياض الاصفر || نباحه يخلف من نباح الكلب وعواء الذئب وضياح الصلب || يسرح في الليل وفي النهار. قويلته الربوبية لا تتجاوز خمس ساعات.

١٦٩٠٧ - ضوكة
Abajous (F). Cheek-pouch (E).
الضوكة جراب في البطن الخلد تتميز به بعض الحيوانات اغصانها القرد تستعمله لطبع الطعام من حبوب ونورها. وما ضوكة يعني ويسرى. ج. اضواء.

١٦٩٠٨ - ضوكل
الضوكل : البقرة والشاة والمز واثانة التي قل لبنها. وهي البئر الغليظة الماء.

١٦٩٠٩ - ضوكة
Chardon (F). Thistle (E).
الضوكة لشوك على اختلاف انواعه. والضوكة كل اتي لا تحبس.

١٦٩١٠ - ضوكة
Lumières (F). Light (E).
الضوء هو المؤثر الطبيعي الذي يسبب الابصار. مصادر مختلفة منها طبيعية كالشمس ومنها صناعية كالمصابيح الكهربائية ونورها.

١٦٩١١ - ضوكة
هنة تخرج من سياه النانة والبقرة والشاة قبل خروج الولد.

١٦٩١٢ - ضوكة شرسية
Staurotypus triplicatus (S).
Staurotype agressive (F).
نوع من الضوكة. سلسطية من فصيلة الحماقيات. موطنها يشمل معظم مناطق امريكا الوسطى. تألف المنطق والغدران والارواض ويجاري الماء || اغصانها شرسية قوية، تهاجم كل من يقترب منها || جسمها متوسط القدر، ذيلها يضيء للثورن، قليل الاسدياد، ويطول نحو ٤ سم. زرعها منبسطة المسطحة صلبة الشكل. رأسها معتدل الحجم، شارف الفك الاحل. سنكها ثنائي الزوائد القرنية. صفها غليظ قصير ونبتها قصير. قوائمها معتدلة القد، نشيطة || قوتها الضفادع والاسماك والمطاط والتمارين.

١٦٩١٣ - ضوكة
Haliotinelles (S).
Haliotinelles (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديلات الارجل غليظيات الخياشيم وعضلة الكتيقيات. انواعها المعروفة قليلة العدد، اصلاتها البحر الاحمر والخليج. تعيش لاصقة بالصخور المنصورة القرية من السطوط || اصنافها صغيرة، داخلية، رقيقة تلمس الظهور. اجسامها اطليحية الشكل، منسقة المقدم للمعب. اريدنيسا قفصانية. غليظها يمينية الارتكاز، نظلية الترتيب الصفي. افواهها غليظة معتدلة الطول. لولاسها انبوبية مقلوبة السطوح الخارجية.

١٦٩١٤ - ضوكة
Erratiques (F).
هي الطيور التي تطلب الرزق.

١٦٩١٥ - ضوكة
١٦٩١٦ - ضوكة
Caecilia (S). Cécilie (F).
جنس حيوانات صماء، دجوية، دودية الشكل من فصيلة



ضوكة



ضوكة

١٦٩٢٥ - **صُورُفُورُ** هو الشراق ، اطلبه .

١٦٩٢٢ - **صُون** Callette (F). Rennet (E).
هو الخلقة ، اطلبها .

١٦٩٢٦ - **صُورُفُورُ** Coraciidae (S).
Coraciidae (F). Coraciidae (E).
نصيلة طير من الجوارم تدعى أيضاً شراقيات ، اطلبها .

١٦٩٢٣ - **صِيَاء** Rayonnement diurne,
Radiation diurne (F). Diurnal radianca, Diurnal
radiation (E).
هو الإشعاع القسوي النهاري .

١٦٩٢٧ - **صُورُوع** * Speotzo cunicularia (S).
Hiboux des carrieres (F).
من اسماء صرور الوجبار
H. des cavernes (F).
صرور الكهوف
H. des lapins (F).
صرور الارانب
H. des prairies (F).
صرور المراعي
H. des marais (F).
صرور المناقع

١٦٩٢٤ - **صِيَاك** * Thalamiflora (F).
Thalamifloral (E).
نمت تدعى يطلق عل النباتات المزروعة الخلاف الزهري
من نباتات الخلقة .

١٦٩٢٥ - **صِيْب** ، **صِيْب** قال النديمي عن ابن سيدة « الصيب شي من دواب البحر
على هيئة الكلب وصلفته . »

طائر من البويات ورمارة التفاديات يحوي البلاد في طلب
الرزق ولا يقم في مكان أكثر من شهرين . يبيض جماعات
كبيرة ، سره بعد من ٢٥ الى ١٠٠ طائر || وهو من
الطيور النافعة الواجب حمايتها . يألف المروج والمراعي
والبراري والناقص يفتن قوته في النهار . يصيد الحمر والقار
والذباب والظفاد والحيات والسقارب || يثن حشه في
صدوع الصخور والكهوف والجوار وفي اسفل وروقة
الاشجار اليابسة . اثناء تضع اربع بيضات تحضنها ثلاثة
اسباع .

١٦٩٢٦ - **صِيْح** Miel (F). Honey (E).
النصيح هو السمل فصل عن شهد .

١٦٩٢٧ - **صِيْرَاك** ، **أَبُو صَعْمُون** Caranx sanson
سمكة كبيرة مأكولة تكثر في البحر الاحمر والوسط .
وهي نوع من السمك تطول نحو ٦٠ سم . ثوبها ك الورد
القنفذية زهر ويشقر عند البطن ويقع مع اقترابه من ثبح
القطر .

١٦٩٢٨ - **صُورُوعَة** ، **سَبْدُ صُورُوع**
Engoulevant à collier (F). Fern-owl (E).
طائر من السبد الرواس طوله نحو ٢٧ سم . وهو ابدأ
الريش الاخير المشوم بخطوط سود وحر . رأسه مفلطح الشكل .

١٦٩٢٨ - **صِيْرَان** Poulche (F). Filly (E).
فرس لم يقبل الاناث ولم ينز قط (السان) .

متقار صغير للند واسع الشدين يحمل صولها يقص الريش
التيقن المنيش الركب . حقه مطوق بقلادتين عاجيتين .
سقطاه مستطيلان ذلقان . ساقاه مسرولتان . ذنبه متوسط
الطول || وهو من قواطع صرور البحر المتوسط . اثناء
تدش في افصوص تدبره وسط الادغال تحضن فيه اربع
بيضات من ١٦ الى ١٨ يوماً .

١٦٩٢٩ - **صِيْرَان** ، **صِيْرَان** Hétérogame (F).
Heterogamous (E).
نمت تدعى يطلق عل النباتات الزراعية التي تحمل اثماراً
ذكورة وبأنثوية في ثمر واحد .

١٦٩٢٩ - **صُورُوك** Sallie (F). Cover (E).
نرو ذكر الحيوان عل الانثى . ضاك الجواد الحبر ؛
نرا عليها .

١٦٩٣٠ - **صُورُور** ، **صُورُورَان** Hétérogamie (F).
Heterogamy (E).
الضيرة جسمورياً حيرانياً هي تعاقب تولد بكري مع
تولد كربي صحيح || وهي عدافاً حالة تباين الغامات
الوراثية من حيث الابداء المركزية او التكونن || وهي
شوزياً حالة وجود اثمار مختلفة الشق في ثمر واحد .

١٦٩٣٠ - **صُورُور** ، **صُورُورَان** Moschosma (S).
Moschosma (F).
جلس نباتات حولية وبسرة من نصيلة الشفويات اناؤه
قليلة البدن جميعها من الرباسين . سوقها دقيقة مرعبة الزوايا
تطول من ٦٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها معتقة ، متعاقبة ،
بيضية الشكل تصلها سبك للنسج ، منشاري الحافة ،
خلى البشرة عل صفحية . ازهارها سبلي التجميع . أزهارها
صغيرة للند ، خفية ، متعاقبة ، لونها يراوح بين الياض
والاخضر الباهت || ازهارها يستمر من كانون الاول
الحرف المطري .

١٦٩٣١ - **صِيْب** * Icticyon venaticus (S).
Icticyon (F). Icticyon (E).
حيوان لاح مفترس وحيد الجنس والنوع من نصيلة
الكلبيات . موطنه بعض اصقاع امريكية الجنوبية اخصها
البرازيل . يألف اطراف الغابات والاراضي المشجرة الاشجار
قوته كل ما استطاع قتصه واقتراه من حيوان وطيور .
ملجته الخياطي جماعي ، جماعته تمه من ٥ الى ١٢ زوجاً ||
جسه مختل قليل الارتفاع يطول نحو ٩٥ سم . بما فيه
الذنب الذي يبلغ ٣٢ سم . رأسه مستضخم الشكل مريض
الحية والخلم . اذناه صغيرتان . فوهه الى الشفة اليسرى
يمتن في الراس والظهر ويثبت في البطن . وبه قصير ليد .
الانثى اصغر قدماً من الذكر واهت ثوباً منه . عدد اطيافها
١٢ . يحملها يشتر نحو تسعة ااسباع تضع في تمامه من
٦ الى ٨ جراء طامسة لا يقصر التولد قبل مضي سبعة ايام .

١٦٩٣١ - **صُورُورَة** Lioplox (S).
Lioplox (F). Lioplox (E).
جنس حيوانات مائية سرلودة من الرغويات مديات
الاربع ونصفية البليونيوات . انواعه المعروفة قليلة البدن
اصطفاًها بعض مناطق الناطق المتدلة الحارة وشها امريكية
التيالية || اصنافها اطيافية ، بطيئة ، متباينة الاحجام ،
ريقة النشام فلكسي ، ملونة وزخرفية .

١٦٩٣٢ - **صِيْلَان** Parasita
هو اللئيلي ، اطلبه . ومن اسماءه بالني دون الاختصاص
لشع .



صُرُوع



صُرُوعَة



صِيْب

١٦٩٤٨ - صَيْكَلَة سَاطِطَة *

Masdevallia ignea (S), *Masdevallia flamboyante* (F).
نوع من الصيكة . ساقها تملو نحو ١٥ سم . أوراقها
حرشفية . زهرتها حمراء ساطعة يملوها موج قرمزي يتخلله
البنفسجي . فصلتها العليا مستطيلة منقطة عل الزهرة ||
تنويرها ويومي .

١٦٩٤٩ - صَيْكَلَة قِرْمِزِيَّة *

Masdevallia coccinea (S), *Masdevallia écarlate* (F).
نوع من الصيكة . ساقها تملو نحو ٢٥ سم . أوراقها
بيضية الشكل تطول نحو ٥ سم . زهرتها بنفسجية يملوها
مواج قرمزي أسفم || تنويرها يستمر عدة أسابيع ، من
أواخر آذار الى أوائل حزيران .

١٦٩٥٠ - صَيْكَلَة نَيْبُوتِيَّة *

Népotisme (F), *Nepotism* (E).
الضليعة تتجاوز مفاير للانظمة او الشرع يقوم به من
يده السلطة في سبيل مصلحة قريبه او صديقه .

١٦٩٥١ - صَيْكَلَة رُكَّان *

هو نعن الماء ، اطلبه .

Matou (F), *Tom-cat* (E).

١٦٩٥٢ - صَيْوَن

هو القط الذكر ج . ضيارن .

Parasitologie (F).

Parasitology (E).

Encastelure (F).

Contraction of the hoof (E).

عارض يصيب وبل الغرس سببه خيق الدابة في الحافر .

Paraphimosis

سوء تركيب طبيعي في القنب يمنع بروز الحشفة الى
الخارج وهو شائع عند الكلاب نادر عند الجياد .

Janus (S), * *جَانُوس* *

Janus (F), *Janus* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل
وفصيلة الخرشوبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها
بحار البلاد المتعددة الحرارة || اجسامها حراطة مستطيلة
مغطاة بلواس متكاثفة ورقية الاطراف || اعرف انواعه
واشهرها الصيكل القنبراني (*Janus cristatus*) الذي
يكثر وجوده في المناطق الشمالية من البحر الابيض المتوسط .

Masdevallia (S), * *صَيْكَلَة* *

Masdevallie (F), *Masdevallis* (E).

جنس نباتات اُمية من فصيلة السحلبيات . بقلورها
لحمية قليلة الانشعاب . ساقها فيه اسطوانية الشكل .
اوراقها حرشفية . ازهارها وسيدة ، كبيرة ، ملونة ||
انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها التالية :



صَيْكَل



صَيْكَلَة سَاطِطَة



ط



طاية



طارسة

منتشرة في معظم بحار البلاد الممتدة الحارة || أصدانها شبه يضيئة اللون ، كثيرة الفالج المصراعي القاطب ، مألوفة الصفة المزخرفة بالألوان الزاهية ، عادة الخليفة || اجسامها اعليجية ، فلق ارجلها تلحف الاصداف . رؤوسها قليلة الرؤوس ، عادة الرأس .

١٦٩٥٨ - طاحون ، طاحونة ، مطحنة Moulin (F). Mill (E). الرمح تحق الحب قصيره دقيقاً ، والطاحون يضي أيضاً البيت المد الطحن . ج طراحين .

١٦٩٥٩ - طاعير ، طاعير ، طاعير Nimbostratus (S). ضرب من الغيوم وهو محاب مراكب له اكهب اللون او اسمر يحجب الشمس .

١٦٩٦٠ - طادة الطادة ضرب من السك (السان) .

١٦٩٦١ - طارسة Pissette, Pipette اداة بخيرية تستعمل في لقاء السوائل المقتنة .

١٦٩٦٢ - طاروق الطاروق نجم يقال له كوكب الصبح .

١٦٩٦٣ - طاروي ، طاروي ، طاروي Adventif (F). Advencious (E). نعت تمرني يطلق على بعض اعضاء النبات كالبرام وغيره التي تظهر عرضاً في مواضع من النبات لم تألفها قبل .

١٦٩٦٤ - طاروي Accident راسع اصابة .

١٦٩٥٣ - طابع ، صفة Caractère (F). Character (E).

١٦٩٥٤ - طابق Etage (F). Stor, Floor (E).

١٦٩٥٥ - طابورة Tapura (S). Tapura (F). Tapura (E).

جنس نباتات برية جينية معمرة من فصيلة الجوزيات . أنواعها المعروفة نحو ١٢ أصلها المناطق الحارة الاسيوية || جنباتها فرعاء تعلو من مترين الى اربعة أمتار . أوراقها معقفة ، متعاقبة . نصالها سنانية متجمعة . ازهارها عتودي النجيم . ازهارها صغيرة متباعدة اللون اكثر فيها الاصفر الاخضر المواج ، قوامها متحدة البتلات ، اكاسها جزلة . ثمارها نصف مغلفة السوتق . عجاتها آحية .

١٦٩٥٦ - طابيات Bullidae (S). Bullidae (F). Bullidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الارجل خلفيات الخياشيم السقفية . اجسامها وانواعها عديدة ، بعضها من متحجرات الطبقة الثالثة والبعض الآخر منتشر في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة (الحارة || اصدانها تراوح بين الاستدارة والاستطالة وقد يظلم فيها الصفر والرقعة يعني كثيراً ما تكون مغلفة بالرداء او بالرجل . خياشيمها مجموعة في تجاويف خاصة مركزها عند مؤخر الظهر يظلمها الرداء . رؤوسها قليلة الرؤوس عادة الرأس || اعرف اجناسها وانهرها الطابية والجمية والحسية والخيزوب والكوارية .

١٦٩٥٧ - طابية Bullae (S). Bullée (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الارجل ونصيلة الطابيات . أنواعها المعاصرة المعروفة متوسطة المدد ،

١٦٩٧٢ - طاعون الدُّبُّوت *.

Tubercinia gladioli, Urocystis gladioli (S). Charbon du glaïeul (F).

فطر مجهري يركب الدُّبُّوت في أوراقه || مظهره الخارجي جيوب قدية تصيب النصل في نسيجه، لوفاً إلى الخضار المأكلين ثم تنفجر إلى الجزء فيسبب البشرة التي تنفجر من غبار فضي لدق من الحباب || اغراضه لا تستويب المكافئة لانها زبدية وقليلة الاذى .

١٦٩٧٣ - طاعون الدُّوِّصِيَّات *

Tubercinia primulae, Ginnaniella primulae (S). Charbon des primevères (F).

فطر مجهري واسع الانتشار قليل الاضرار يصيب الدُّوِّصِيَّات فيؤذي بعض ازهارها || مظهره الخارجي غبار كالدقيق ابيض اللون يكتنف قباب الزهر ثم يفصل بينا يتكون في قمر الكأس جراب من البوغ حشو حباب اسيد لا ينضج الزمرة ولكنه يصب البذور || لا يستمر المكافئة لانه محمول الاذى .

١٦٩٧٤ - طاعون الشُّقَار *

Tubercinia anemones, Urocystis anemones (S). Charbon des anémones (F).

فطر مجهري يصيب الشُّقَار في أوراقه وازهاره || مظهره الخارجي يقع حشوية لاقامية مجترعة رافعة يحيطها اطار احمر اللون، تسبب تجمع الاوراق ثم انفجار بشرة النصل . وهو حل احتاق الاوراق وأمن الازهار وكوسها يقع قرصية حاطة || يكافئ باقتلاص وسرق النباتات المصابة ويتطهر القرية بالكبريت والكلس الحراق بنسبة ٢ كبريت الى ١ كلس .

١٦٩٧٥ - طاعون الشَّيْطَم *

Tubercinia occulta, Urocystis occulta (S). Charbon des feuilles du seigle (F). Rye smut (E). Stengelbrand des roggen (D).

فطر مجهري يصيب الشَّيْطَم في عصفه فيؤذي وقد يمتد من الاسبال || مظهره الخارجي خطوط منتظمة التبريع لوفاً الى الزرة عرضها من ١ الى ٢ م. تبدو داخل النصل وقتد من الغمد الى اوائل الزام الثالث من المصفه . وعند اكبال دوره الحياقي يتضخم في الخطوط فيفجر بشرة النسيج وينتظر كتيار الفم الاسود || يكافئ ارباباً باستعمال البورة الزراعية التي تحل دون تكرار الزرع في الموقع الواحد حل سلتين متواليتين . ثانياً بتعطيل البذار مدة ٢٠ دقيقة في محلول الفورول التجاري المركز ٢٥ ٪

١٦٩٧٦ - طاعون التَّجِيل *

Tubercinia agropyri, Urocystis agropyri (S). Charbon des feuilles de chiendent (F).

فطر مجهري يصيب التَّجِيل في ورقه فيسيجه ويلويه . مظهره الخارجي خطوط منتظمة في نصل الاوراق تبدو سمراء اللون ثم تنفجر من غبار اسود || اغراضه جسيمة لانه يصبب الاوراق ويسبب يسها وتلف الفساري التي كان التجيل خضرها || يكافئ بالقلاص النباتات المصابة وبحرق او لحاق سوائها ثم تعجيد زرعها .

١٦٩٧٧ - طاعون الخنزير

Pestis suum (S). *Pestis porcina*, P. du porc (F).

وباء سريع الانتشار شديد الوبق يستلزم الطيابة البيطرية .

Géophage (F).

Geophagous (E).

١٦٩٦٥ - طاعون *

هو التارب ، المله .

Thalassicolle (F).

١٦٩٦٦ - طاعون *

نمت تعريبي ، يلقح على كل حيوان او نبات يعيش بيدا من الشلوط البحرية وقد لا يعيش عند الاقتراب منها .

Tubercinia (S).

١٦٩٦٧ - طاعون *

جنس فلور مجهري من فصيلة التفرافات ، يوشه نوري الارتكاز لاقياي الحنج يعمل في وسط محوره بويغات غصية مشبة الجسم الخليلج ويحصل في اطرافه بويغات حاقرة شافئة الجسم النحيل || طيلمه كيفية التجميع تعيش على نسيج الاوراق وقد تركب جنور بعض النجيليات وازهار الربيعيات || انواعه عديدة اشبهها ما يتبع .

١٦٩٦٨ - طاعون البَصَل *

Tubercinia cepulae, Urocystis cepulae (S). Charbon des feuilles d'oignon (F). Onion smut (E). Zwiebelbrand (D).

فطر مجهري يصيب اوراق البصل والكرات فيؤذيها وقد يصب بذيلها || مظهره الخارجي خطوط فضية اللون تملأ الاوراق باستطالها وتركب الاسفاط وتلب الثانية القرصية فتؤذيها منذ نشأتها || يكافئ بتطهير التربة الموبوءة بواسطة الكبريت والكلس بمعدل ١٢ كيلوكبريت نام و ٦٠ كيلوكلس حراق لثمة الواحد اي لافتمتر مربع .

١٦٩٦٩ - طاعون البَنَسَج *

Tubercinia violae, Urocystis violae (S). Charbon des violettes (F).

فطر مجهري يصيب البنسج في أوراقه فيؤذيها ويجهتها . مظهره الخارجي يقع مستوية تركب النصل على صفته النصل تصطبب النسيج وتغضب بشرة الصفحة العليا بلونها الاحمر البنسجي الذي ينحرف تدريجياً الى الاسفل الرصاصي . ويركب اعناق الاوراق فيقرحها ويجهتها . يكافئ باستجاب الكثافة وبالاتحاد من المواقع المأثرة الرطوبة .

١٦٩٧٠ - طاعون الحنطة *

Tubercinia tritici, Urocystis tritici (S). Charbon des feuilles du blé (F). Wheat smut (E).

فطر مجهري يصيب الحنطة في عصفها واغدادها وسوقها وستابلها || مظهره الخارجي خطوط متوازية مع حروق النصل تملأ الصفحة العليا تسبب تغير البشرة واتساع التفراف الى عدة اقسام . واذا ركب كامل نصف الزرع منع النمو والاسبال . يكافئ : اولاً : بزرع القسروب الموصقة بمنحيتها . ثانياً : باستعمال البورة الزراعية الثلاثية او الرباعية . ثالثاً : بحرق الحظافة في ارضها وهو على مفيد . رابعاً : بتطهير البذار قبل الزرع .

١٦٩٧١ - طاعون الحَنَدُون *

Tubercinia ranunculi, Urocystis ranunculi (S). Charbon des renoncules (F).

فطر مجهري كثير الشيع يصيب الحَنَدُون في اوراقه فيؤذيها || مظهره الخارجي دماثل لاقامية الشكل والحجم تصيب النصل ويرثه تسبب جيوباً رافعة لا تلبث أن تنفجر من غبار نضي داكن السواد || يكافئ باقتلاص وسرق النباتات المصابة ويتطهر التربة بالكبريت والكلس الحراق بنسبة ٢ كبريت الى ١ كلس .




طاعون البصل



طاعون البنسج



طاعون الحنطة



طاعون الدُّبُّوت



طاعون التجيل



طائون

Force cryptique (F). **طائون خفية** ١٦٩٨٩

هي القوة الخفية الممتدة التي تشمل تصميم الطبيعة الذي يشمل بدوره الحياة والمثل والقمل.

Energie potentielle, **طائون كامنة** ١٦٩٩٠

Potentiel (F). Potential energy, Potential (E).
ترتبط الطاقة المخدرة أو المخدرة الكامنة.

Energétique (F). **طائي** ١٦٩٩١

Energetic (E). ما هو شرط بالملكة.

١٦٩٩٢ - **طائون** *، **طعيم** *

Budorcas taxicolor (S).
Takang, Takin (F). Takang (E).

حيوان لبون عاشب يجتر من ذات الأعلاف. موطنه يمتد من الهمال إلى التبت على حدود التلج الدائم. ملجأ الحيواني جماعي. قطبانه صغيرة متفرقة لا يجتمع إلا عند الربيع من مقاطعة إلى أخرى فيبلغ عدد الإبل، إذ ذاك، نحو ٥٠٠ نقر. جسمه ديمية، مستطيل الشكل، فيه من الثور والكبش والطبي. يطول نحو ٢١٥ سم. ويملو نحو ١١٥ سم. ويزن عند بلوغه الكمال الجسموي من ٣٠٠ إلى ٣٥٠ كيلو. قرن الذكر يطول نحو ٥٠ سم. وقرن الانثى نحو ٤٠ سم. رأسه مستطيل الجرم، عذبة نصبة الأنف. عيناه صغيرتان لوزيتان أذناه صغيرتان مستعرضتان. قرناه غليظتان يتجهان الجهة. عنقه معتدل القد، كثيف الوبر المتصلب. صدره عريض النقص حاد القبة. كفه مقوس الطرف المنحدر. قوائمها خفيفة، شديدة النشاط. ثوبه إلى الشهية الزرقاء المزيج يندر ويشتر في صفحي المتى وينصرف إلى القشرة في البطن. فرج الانثى ثنائي الخلف. قوته الأعصاب الخفراء والغشائش اليابسة.



طائون

Table de pointage (F). **طائون** ١٦٩٩٣

جدول قياسي يحدد فيه قيمة الجزء من الشيء بالنسبة إلى كماله.

Tan **طائون** ١٦٩٩٤

الطائون هو المادة المعالجة في مسحوق لحاء الفص ولبه من أنواع السندبان والكسنة الخ. يستعمل في تخضير الجلود.

Indigesta (F). Undigested (E). **طائون** ١٦٩٩٥

ما تملأ الهضامه على المعدة.

le Paon (F). Pavo (E). **طائوس** ١٦٩٩٦

الطائوس كوكبة نجوم جنوبية للمذبح، مركزها بين المربع الفلكي والثلاث والنسب. عدد نجومها تسعة مراتها أرواح من الخامسة إلى الثامنة.

Pavo (S). **طائوس**، **طائوس** ١٦٩٩٧

Paon (F). Peacock (E).

جنس طير من فصيلة الفترجيات. مشهور بجماه وريشه والزخو يتناسه وألوانه. كنيته أبو الحسن وأبو الريش. أنواره قليلة. جميعها كبيرة البنية مستطيلة ريش القروادم والزخبي، قصيرة ريش الانثى. رؤوسها صغيرة عند تنويع. متناظرة غليظة. أرسافها طويلة. غالبا صغيرة. أنوارها متراكبة الألوان الهية يملؤها تزيين جميل وعمشة



طائون

١٦٩٩٨ - **طائون الخيل**، **مرض الخيل الأفرغي**،

Pestis equorum (S). **تجمعة**

Peste equine, P. du cheval (F).
وباء شديد الخطر سريع الانتشار يصيب الخيل وصار الدواب فيسيها أن لم تعالج وقائيا.

١٦٩٩٩ - **طائون الطير**، **طائون الدجاج**،

Pestis avium (S). Peste aviaire (F). **شرطه**

وباء خبيث سريع الانتشار يقتل بالطيور الباجية انحصا الدجاج. يعالج وقائيا.

١٦٩٨٠ - **طائون الكلاب**، **جائحة الكلاب**،

بو ستورز

Febri catarrhalis x nervosa (F). Morbus carre (F).
canum (S). Maladie de Carré, Morbus carre (F).
وباء خبيث يصيب الكلاب فيسيها أن لم يعالج وقائيا.

١٦٩٨١ - **طائون بكتري**، **أبو هكلاان**، **أبو**

دميتية، **هت**

Peste bovine (F). Cattle-plague, Rinderpest (E).
Pestis bovina (S).

وباء شديد الألف سريع الانتشار يصيب البقر والغنم والماعز والجاموس فيسيها أن لم تعالج وقائيا.

١٦٩٨٢ - **طائون** *

Imperméable à l'eau (F).
Waterproof (E).

نمت تمريني يطلق كل مادة لا ينفذها الماء.

١٦٩٨٣ - **طائون** *

Mutant (F).
فرد أو جزء من فرد ظهرت فيه طفرة أي شذو.

١٦٩٨٤ - **طائون** *

Petromys petaurista (S).
Petromys petaurista, Taguan, Oril (F).

نوع من البطارييس وهو حيوان قاصم من السجائيات موطن الهند وسريلاندي. طوله نحو ٥٠ سم. وذنبه ٥٥ سم. جسمه مستطيل الشكل. جوارحه قصيرة، اطرافه صغيرة مدببة. ثوبه إلى الصبغة البسراء تزين مع اقترابها من الظهر ورأس والصدر. ينه إلى الثبيرة المروحة بالأبيض. رائحته الجناسية المجلدية كاسية. يائث الأرحاج الكثيفة ويفترق من الاماكن الأضلة. قوته البأر والقشور والحشرات والديدان.

١٦٩٨٥ - **طائون** *

Boopis (S). Boopide (F).
الاسم العلمي معناه «حين الثور» والاسم العربي الماعا إلى شكل جميع الأرواق والأزهار. جنس نباتات مسمرة بيرة وفترجينة من فصيلة الكلسيديات. منبتها الطوسي بعض مناطق أمريكا الجنوبية المتصلة الحرارة. أنوارها المعروفة شرة، أما غروبها الزبدية لكثيرة البند. سورها مخشوشة، قليلة الفروع التي تنتهي بطاقات من الأوراق والأزهار. تنويرها يستمر من أواخر الربيع إلى أوائل الخريف.

١٦٩٨٦ - **طائون**

Energie (F). Energy (E).
صفة كل جسم يستطع القيام بعمل.

١٦٩٨٧ - **طائون الحركة**

Energie cinétique (F).
Kinetic energy (E).

١٦٩٨٨ - **طائون حركية**

Dynamisme (F).
Dynamism (E).

Paradisea minor (S). طائر الفردوس الصغير
Paradisier petit émeraude (F).
Paradisea apoda (S). طائر الفردوس الكبير
Paradisier apode, Paradisier grand émeraude (F).

1٧٠٠٧ - طائر القيثارة *
Oiseau-lyre (F). طائر من الجوامع لاقطات النمل يدعى مانور ، اطلبه .

1٧٠٠٨ - طائر القيثارة الأبيض *
Oiseau-lyre superbe (F). طائر من الجوامع لاقطات النمل وفصيلة المانوريات يدعى مانور ميلول أو اتيق ، اطلبه .

1٧٠٠٩ - طائر المقالب *
Oiseau des tropiques (F). طائر من كنفات اقدم وفصيلة الفيتريات يدعى فيتون ، اطلبه .

1٧٠١٠ - طائفك *
Sous-classe (F), Sub-class (E). الطائفة في تصنيف الاحياء تأتي بعد الصف وقبل الشعبة .

1٧٠١١ - طب أنجيل *
Hippiatrie (F). Hippiatry, Veterinary art (E). علم يبحث في امراض الخيل وهداؤها .

1٧٠١٢ - طب بيطري *
Médecine vétérinaire (F). Veterinary medicine (E). هو طب الحيوان أو طب الحيوانات الداجنة .

1٧٠١٣ - طيباب ، ديسك *
Disque (F). Discus, Disk (E). شكل قرصي الهيئة مسطح الصفيحة اورد عليها أو مقعرا .

1٧٠١٤ - طباج *
Lagria (S). Lagrie (F). جنس حشرات غاشلة من غديات الاجنحة وفصيلة الطاجيات . انواعه الممرقة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تقول من ٧ الى ٨ م . رؤوسها شبه مخروطية . متناكها ضلعية . عينيها كبيرة نافذة . قرنها الاستشعارية خيطية . كواسلها ضيقة مستطيلة . بطونها الحليجية مفطسة . اعاندها عذبة ، لاسعة ، خلية القشار ، مهدية الاطراف . قوائمها مستطيلة || تألف المراتع الفلحة . قوتها الاوراق والازهار . يرقاتها دامة تعيش على المواد النباتية المنحلة في الجفافة وتحت القشور والحاء .

1٧٠١٥ - طاجيات *
Lagride (F). Lagridae (E). فصيلة حشرات من غديات الاجنحة مختلفات الاجزاء اجناسها وانواعها الممرقة عديدة منتشرة في جميع المناطق الحارة . جميعها خالصة قوتها المواد النباتية . يرقاتها تعيش في الجفافة وتحت القشور || اجسامها صغيرة تقول من ٤ الى ١٢ م . رؤوسها مخروطية . كواسلها ضيقة مستطيلة . اعاندها جالسة القاعدة . مستديرة الاطراف اللاسعة . قوائمها مستطيلة . قوتها الاستشعارية مركبة من ١١ فصلة . ارسافها مختلفة الاجزاء || اشهر اجناسها واعما انتشاراً الطاج .

غلاية . ذنابها ريشة اللد ، مروجية النثر || موطنه الهند وجوارها وسرنديب . يألف الغابات والغياب والمروج الدفلة . يعيش اسراباً صغيرة بأروح عددها بين ٦ و ٢٠ . قوته الثار والجرب والاشحاب والتواني والحشرات والوزغ والافاعي || جمده الاشجار المنجسة الاضغان . اناته تقسم نحو ١٠ فصلات تحسباً وسجها في انحوس تدته في آخرة بين الاغفال والاشحاب || اشهر انواعه ما يتبع .

1٦٩٩٨ - طاووس أسود *
Pavo nigripennis (S). Black peacock (E). طائر من الطاووس موطنه الشرق الاقصى . يتميز بصدود ريشه وباستدارة فلول ذنابها وبالنشأة الغضبية المواج التي تملو ريش صدره .

1٦٩٩٩ - طاووس التبت *
Paoon du Thibet هو قشكيس طائر من التبتيات ، اطلبه .

1٧٠٠٠ - طاووس سنبل *
Pavo muticus (S). Paoon spicifère (F). طائر من الطاووس . موطنه الهند . كبير الجفة والاعمال . رأسه وقتره يصطف الى الاخضر الباقي الازرق المواج . صدره الى الاخضر الازرق اللهب المواج . بطنه شديد الخضار الازرق . ظهره اسف لاسع يتخلله الاخضر والاصهب . قولده الى الصهب . اباهره الى السواد الازرق المواج . كلاله الى الخضار الباقي . ذيله اكبر من ذيل الطاووس المادي وازلي لونا وابي رونقا .

1٧٠٠١ - طاووس عادي *
Pavo cristatus (S). Paoon vulgaire, P. commun (F). Common peacock (E). طائر من الطاووس رأسه وقتره وصدوره وبطنه الى الزرق الباقية ، الجسية ، الخضراء المواج . قة رأسه سوداء . عسره موشع بالايض . ريش ظهره اخضر اسف لاسع ، اسيد الحافة . قولده الى الصهب الباقية . اباهره الى السواد الازرق المواج . ذيله اخضر اسف تملو فلول سود يحرقها الاخضر الزاهي .

1٧٠٠٢ - طاووس *
Paonne (F). Peahen (E). انثى الطاووس .

1٧٠٠٣ - طائر البوق *
Thalassidrome (F). طائر من كنفات اقدم مشهور باسم قدوم ، اطلبه .

1٧٠٠٤ - طائر الزوايع *
Oiseau de pluie (F). طائر من فصيلة الفيتريات يعرف باسم قراق ، اطلبه .

1٧٠٠٦ - طائر الفردوس *
Paradisea (S). Paradisier (F). Bird of paradise (E). جنس طير من فصيلة الفردوسيات ورتبة الجوامع للشريبات المنائير . انواعه قليلة مهدية جزر المحيط الهادي . تتميز بزهاء انوارها المارقة الجبال . اجسامها متوسطة القد . طولها بأروح بين ٣٠ و ٤٥ سم . رؤوسها معتدلة . منقارها مستطيلة ، محدبة ، ذرية . مناقشها قاعدية الارتكاز منشأة بالزغب . اجنتها متوسطة القد ، ذلقة . اذنابها قصيرة . ارباش افنتها الجانبية مقوسة الشكل متناهية في اللد والانسمة . اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

Paradisea rubra (S). Paradisier rouge (F). طائر الفردوس الاحمر



طاووس سنبل



طاووس عادي



طاير الفردوس



طاج



مطاب

١٧٠٢٥ - **مَطْرَحِي** Gutta-Percha
مادة حليبية تستخرج من بعض اشجار الفصيلة اللبونية.
تتمثل كاداة حارة في غثفل الصناعات لانها لا تنقل
الكهرمان ولا تنوب بالخرافيس اما تنوب بالكلوروفر
ولغور الكربون والبريزن.

١٧٠٢٦ - **مَطْرُود** هو الابراج ، اطله .

١٧٠٢٧ - **مَطْرُود** Pain de sucre (F). Sugar-loaf (E).
هو السكر الابيض المبلور المقروب ويصنع البلورز
والبلورزل.

١٧٠٢٨ - **مَطْرُوسَة مُسْتَحَبَّة** *

Tetragnatha furtiva (S). Tetragnatha agréable (F).
دودية من العناكب الباعية القانصة من ثنائيات الروايا
مساكنات المشاتل وفضيلة الشياحات . موطنها سطح اقطار
البلاد المعتدلة الحارة من شمال القديم || جسمها شبه
مربعي الشكل يطول عند العنكب نحو ١٨ م. وعند العنكة
نحو ٣٠ م. صدرها بلنسي الشكل اسمر اللون . صياحها
مركبتان زحيتان . شيفها قديتان ذريان . فكها
محنتان . جرائزها مستطيلة ، نشطة ، مسنة الاطراف .
نوبا الى الصخرة الجميلة يملؤها فتاويق قائمة || قوتها
الحشرات اغصنها الذباب والحمام .



مطر

١٧٠٢٩ - **مَطْرِيَّات** Cyprinidae (S).
Cyprinidae (F). Cyprinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات سفيفيات الخياشيم
والايرل . اجناسها وانواعها المرققة كثيرة العدد .
متشابهاتها تظهر في الطبقة الباطنية . انواعها الخياشيم
منتشرة في معظم بحار العالم || اصداؤها سمكة الاصفاذ
متباينة الاشكال والاحجام . تتميز بمخياشيم الانسلاسية
الذئ ، يتغايا الطليقة ، القصيرة واربعتها المستطيلة
الغدة الصفحات السفلى || اعرف انواعها واشهرها
الطرية والوطيب واليوت .



مطروسة مستحبة

١٧٠٣٠ - **مَطْرِيَّة** Cyprina (S).
Cyprina (F). Cyprina (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات سفيفيات الخياشيم
والايرل من فصيلة الطيريات . انواعها المعروفة عديدة
اوطنها مصبات انهر المناطق الشمالية || اصداؤها شبه
غرونية الشكل خاسية الاطراف و سباعيتها ، سمكة
الصفتة المشقة ، مالة المختار . خيرا القرن غالبا ||
تميش بين الرمال والحصى . لحومها كاذة الصفت .



مطرية

١٧٠٣١ - **مَطْرِي**
هو القلح ، الجبل ذو النسانين ، اطله .

١٧٠٣٢ - **مَطْرِيُون** هو الدمان السوري ، اطله .

١٧٠٣٣ - **مَطْبَاب** Megacephalon (S).
Mégacéphale (F).

جنس طير من فصيلة الشبانيات . انواعه قليلة تتميز
بامتداد اجسامها . رؤوسها صلغ تعلوها خوذ قرنية
الكريز . اذنانها كبيرة القد . ظاهرها ابيض الى السرة
المايقة يملؤها موج زيتوني . ياطن الزوايا ويطرها واذنانها
الى السرة الوردية . اجنسها مستديرة الشكل ، متوتعة
الحجم . اذنانها صغيرة فرقة . ارساها قوية لونها الى
السلاد || تألفت الاجراس القرية من التواطي . تميش



مطباب

١٧٠١٦ - **مَطْبَارَة ، تَيْسَة شَتَوِيَّة** Rigue d'or (F).
ثمرة الطبار وهي متوتعة الصنف كبيرة التذ غلا الكف .
والطبار ضرب من التين الشتوي يعيش في البلاد المعتدلة
الحارة .

١٧٠١٧ - **مَطْبَاشِير** Craie (F). Chalk (E).

حجارة جيرية ناعمة البياض ، قليلة الصلابة ، حذبة
الأثر ، مسكونة من ذرات الجير تخاطلها بقايا عارية صلبة
سوطا مرور الزين بالضغط والترتيب || اما اصابع
الطباشير التي تستخدم في الكتابة على اللوح السدي فهي
مزيج مركب من الجير مع كربونات الكلسيوم او
كبريتات الكلسيوم .

١٧٠١٨ - **مَطْبَاشِيرِي** Crétacé (F).
Cretaceous, Chalky (E).

نمت تعريفه يطلق على الحقبة الثالثة من الابراج الاوسط
اي الثاني . ويطلق العصر الطباشيري والاراضي الطباشيرية ||
تتميز هذه الحقبة بتطور انصداع القشرة الارضية
وبانقسامها الى بعض القارات . ويتجلى استيلاط المناطق
المناعية ، وبكثرة انتشار الرغويات وسبا مسكنات الايرل
ومزويجات المساريم ، وبانتشار الزحافات الكبيرة
والجارية وتطور الثدييات الصغيرة لقد اقترية شبه
بالثدييات الحالية .

١٧٠١٩ - **مَطْبَاق ، مَطْيُون ، رَاسَن دَبِي**

Inula viscosa (S). Aunée visqueuse, Inule visqueuse,
Conyze visqueux (F). Rock fleas-bane (E). Alpenflöh-
kraut (D). Enula viscosa (I).
نوع من الزاين وهو نبات عشبي بري مسمر من فصيلة
المركبات الازرقية الزهر . ماله فروع ، زيا الحناء ، تلور
من ٣٠ الى ٨٠ م. اولاده صغيرة القد ، اعليجية ،
ذرية . نصلها ابرش البشرة الزرقية من فصيلة . وقد
جاء عنه في السان : والطباق شجر منابه جبال مكة كثير
المنافع .

١٧٠٢٠ - **مَطْبَاق البراغيث** هو البرنوف ، اطله .

١٧٠٢١ - **مَطْبَب** Disque solaire (F).
Solar discus (E).

شعاع الشمس وهي الطرائق التي ترى فيها عند طلوعها .

١٧٠٢٢ - **مَطْبَبَة**
كل قطعة من الارض مستطيلة الشكل ، عتيقة العرض
كثير لباها ار قل تدعى طبه .

١٧٠٢٣ - **مَطْبَر ، عُنْدُرْمَة** Ganoderma

فطر من الصيات يركب الجلعق اليابسة في السديان
والخود والاكاسيا والزان والينق فيسب انفلاتها الطوي
ثم منها وانواعها البقي || مشبه ابيض اللون كثيف
الحيف . فطر طين الشكل ، مشج السطح ، جل
الاطار ، نام ابرشة الزيا الحلية اللس ، لونه اسهب
اغير ، يمتد عند منتصف خط الاطار . اما الاطار
فايضا والصفتة السفلى بنية || لباه قرني اللون - يلد
المقط ، تدعى التركيب . سماحه من ١ الى ٣ م . يورثاته
قوية الشكل طولها نحو ٨ ميكرون وقطر ناعتها ٨ ميكرون .

١٧٠٢٤ - **مَطْبَر** Pilastre (F). Pilaster (E).

١٧٠٤٥ - طَبِيْنُ ، طَبِيْنُ
Tétine, Tétin (F).
Teat, Nipple (E).

حلمات الفرج التي من تحت وتلف وحافر واسع وأكثر ما يكون الطبي السباح . ج . املاء .

١٧٠٤٦ - طَبِيْنُ الكَلْبَةِ
هو الخلاف الصغير الورق ، املية .

١٧٠٤٧ - طَبِيْبُ بَطْنِيْنِي
Vétérinaire, Médecin vétérinaire (F). Veterinary, Veterinary surgeon (E).
هو الطبيب المختص بمعالجة الحيوان .

١٧٠٤٨ - طَبِيْحَا
هي الجوسا ، املية .

١٧٠٤٩ - طَبِيْرَة *
Gasteropelecus (S).
Gastéropélaque (F).

جنس اسماك بحرية بحرية من مفتوحات المثانة وعضلة السلبيات ، انواعها المعروفة قليلة العدد مملولة عند مصبات الانهر || اجسامها صغيرة ، مبططة ، طرية الشكل ، تفلون من ٥ الى ٦ سم . رؤوسها واضعائها متوسطة الحجم ، اشدها شبه حويدي الانفراج . زعانفها الظهرية خلفية الاربعين صغيرة ، الصدرية جناحية الشكل . الحوضية شديدة الصغر . الشرجية مستطيلة والبليلة فائقة . جميعها تتميز بطونها النصف دائرية الشكل . انواعها الى الخمس الفعلي المواج .

١٧٠٥٠ - طَبِيْع
هو لب الطلعة .

١٧٠٥١ - طَبِيْعَة
Nature

١٧٠٥٢ - طَبِيْعِي ، مَادِّي
Physique, Matériel (F). Physikal, Material, Natural (E).

١٧٠٥٣ - طَبِيْق *
Coronula (F).
جنس حيوانات بحرية من القشريات اصغافها طبقية الشكل ، مسطحة الاضلاع ، صغيرة القد تعيش على غنفل ابناس الحيتان .

١٧٠٥٤ - طَبِيْقِي
Hymenocallis (S).
Hyménocallide (F), Hymenocallis (E).

جنس نباتات عشبية دوفية من فصيلة الترسيات . موطنها بعض اقالم امريكا الجنوبية . اوراتها اهلجية الشكل . ازهارها عطرية العرف ، صيوانية التجميع قواعد خيطوط اسديتها مستعرضة مندغة قديمة الشكل || تزور للزريق ضمن البيوت وفي الحدائق . ترفب في الازربة القليلة الاندماج المنسوبة التركيب المنصري الزاوية المواد النذائية || انواعها قليلة العدد ، اشهرها الثلاثة التالية .

١٧٠٥٥ - طَبِيْقِي أَهْيَف *
Hymenocallis speciosa (S).
Hyménocallide élégante (F).

نوع من الطيب . عشبة دوفية صبروتية ، شراغها ثنائي الصلوع الزاوية ، يرتفع من ٤٠ الى ٥٠ سم . اوراتها اهلجية مسطحة ، نصلها جبل الخضر الزاهي . ازهارها صيوانية التجميع . ازهارها يبيض اللون ، كبيرة القد ، تظل نحو ١٠ سم . تاجها اي قدتها سداسي الفلق المندغة المخلد الخضار || تنورما خريفي .

ذكرًا وانثى كالحام . اسراها لعد من ٧ الى ١٥ زوجاً . قوتها الجربوب على اختلافها . انثاها تبيض في افرس كبير القد قطر يراوح بين ١٢٠ و ١٥٠ سم . وعقد من ٢٠ الى ٦٠ سم . تحفر مع ذكورها ورفيقاتها من السرب الواسد في دمال الشاطئ على حدود مرسى المد . يبي لا تحسن يعضها بل تنسه في الاقموس وتغليه بطيلة من الرمل سماكتها نحو ٢ سم . يفتقد بعد اسبوعين . وهي تبيض في مومها من ٨ الى ١٠ يضايت قصصها بالتتابع حيث يتنفي بين الوحدة وانثى تلبها من ١٢ الى ١٤ يوما . والبيضة كبيرة القد مستطيلة الشكل تبدو عند وضعها قريديلة اللون ثم تنمرق الى الصفرة وتستقر على البياض . الفرغ يتفك كاسياً نشيطاً مستنفا عن حضنة انه التي يجهلها ولا تعرفه .

١٧٠٣٤ - طَبَائِعُ
Argile grasse (F).
Clay, Greasy, Rich (E).

١٧٠٣٥ - طَبِيْق
Vertèbre animale (F).
Animal vertebra (E).
فقار الظهر عند الحيوان .

١٧٠٣٦ - طَبِيْق * ، كَتَب ، أَبُو طَبِيْق ، أَبُو طَرَض
Holacanthus (S). Holacanth (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات . انواعها المعروفة نحو ٤٠ موطياً بجار البلاد الحارة . جميعها صغيرة القد مقلطة مستدرة طولها يراوح بين ١٥ و ٢٠ سم . ألوانها زاهية الألوان الجميلة المبهجة بالاصفر والبرتقالي والوردي .

١٧٠٣٧ - طَبِيْعَة
Strate, Stratum, Couches (F).
Stratum (E).

١٧٠٣٨ - طَبِيْعَة
Superordre (F). Superorder (E).
باب في تصنيف الاسباء يأتي بعد الشية وقبل الرتبة .

١٧٠٣٩ - طَبِيْعَة مَوَلَدَة
هي القلب اي الكيسوم ، املية .

١٧٠٤٠ - طَبِيْعَة
Tympan (F).
هي الصمغ ، راجع اذن .

١٧٠٤١ - طَبِيْعَة الأذن
Tambour de l'oreille (F).
Ear drum (E).
راجع اذن .

١٧٠٤٢ - طَبِيْقِي
Tympanique (F). Tympanic (E).
تمت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بطيلة الاذن .

١٧٠٤٣ - طَبِيْن ، طَبِيْن
Pâture de charogne (F).
Food of carrion (E).

الجيفة توضع فيصااد حلياً والنور والسباح .

١٧٠٤٤ - طَبِيْر * ، قَمَلُ المَانَةِ
Phthirus pubis (S). Morpion, Pou du pubis (F). Crab-louse (E).

نوع من القرضيات صدر الجسم مستعرض الشكل طولها يراوح بين طليمز وازيمة خطوط وطيمز وبيمة خطوط . ارجله دقيقة ، ارساغه تنتمي بمقابل خادشة حادة . يعيش بين الشعر الخشن كشر المانة والابط والحاجب .



طَبِيْق



طَبِيْع



طَبِيْعَة



طَبِيْق

١٧٠٥٦ - طليح كبير الناج

Hymenocallis calathina (S).

Hymenocallide à grande couronne (F).

نوع من الطليح، عشبة دوفسية سرويتية. شراخها ثنائي الصلوص المزواني يملو من ٤٥ إلى ٨٠ سم. أوراقها قديمة الشكل، مستطيلة الطرف لذلك، طول من ٤٥ إلى ٦٠ سم. وتعرض من ٤ إلى ٥ سم. ازهارها صيواني التجميع. ازهارها بيضاء اللون، كبيرة القذ طول من ١٥ إلى ٢٠ سم. تاجها اي قدسها سداسي الشكل للندغة الباحة الخضار لا تنويرها يستمر من سوزبان الى حمور.

١٧٠٥٧ - طليح متواج

Hymenocallis undulata (S).

Hymenocallide ondulée (F).

نوع من الطليح، عشبة دوفسية سرويتية. شراخها عديم التضلع يرتفع نحو ٦٠ سم. أوراقها سنانية الشكل، رقيقة التصل المجزج، طول نحو ٣٠ سم. وتعرض نحو ١٢ سم. ازهارها صيواني التجميع. ازهارها عاجية اللون، كبيرة القذ، طول من ١٥ إلى ١٨ سم. تاجها سداسي الشكل للندغة، زينة اللون لا تنويرها ديمي او غريفي.

١٧٠٥٨ - طين

Cryptocère (F).

Cryptocerous (E).

نمت تمريفي يطلق على كل حشرة غنية الزباني.

١٧٠٥٩ - طشرة البطاطا

Lygaeus notani (S).

حشرة من الطاريات صغيرة القذ طولها نحو ٦ مم. ثوبها الى الخضرة. اطرافها صفراء اللون تتميز بكسولها الفيلظ الصفح ورأسها الكبير للمعرض لتركب اوراق البطاطا فتزجها.

١٧٠٦٠ - طشرة الزرع

Blissus leucopterus (S).

حشرة من الطاريات صغيرة القذ طولها نحو ٥ مم. ثوبها الى البصرة المايقة. جنداتها مستطيلان مزركان وشششان. ارجلها صفراء. ريقها ثوب صفراء اللون عند التلق ثم تنصرف الى الحرة وزداد ازهارها بعد كل انسلخ الى ان يستقر على الجوزة لتركب الحطة والشعير والشيلم والشوفا والذعن والذرة والارز.

١٧٠٦١ - طشرة السنديان

Lygaeus aquestris (S). Lygée aquestra (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الطاريات ورتبة مختلفات الاجنحة جسمها مبسط الجرم يملو نحو ١٢ مم. رأسها احمر اللون، اسود اطلس الممثل الطول. عنابها صفيرتان، ناشترتان. زياتها مستطيلان اسودان. كسولها احمر اللون، اسود القسم الذي يتنام الرأس، بلنها وسدبا الى الحشرة. سبنتها مزوانية اسوداء. طولها احر الجنداء، اسود الطرف والتبيج ويملو من طرفه الاسود تجليج ابيض وتفتيح. قشرتها شفاف. قوائمها الى البصرة لمرتها السنديان.

١٧٠٦٢ - طشرة القطن

Oxycarenus hyalinipennis (S).

حشرة من الطاريات صغيرة القذ طولها نحو ٥ مم. ثوبها الى البصرة السوداء. جنداتها بلن الفضة اللامعة لتركب براهم. القطن الزرية وتقع بها اشد الاذى.

١٧٠٦٣ - طشرة الكرمة

Pyrrhocoris apterus (S). Punaise tête de mort, Diabie (F).

حشرة من الطاريات صغيرة القذ طولها نحو ٦ مم. ثوبها ابيض اللون. اجنتها قصيرة. جنداتها جملدة لتركب برام الكرمة فتزجها.

١٧٠٦٤ - طشورج

Fourmis (F). Anta (E).

هو النسل واحدة طرية.

١٧٠٦٥ - طشريات و ليغيات

Lygaeidae (S). Lygaeids (F). Lygaeidae, Chinch bugs (E). Lang wazzen (D).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة. اجنتها وانواعها كثيرة المدد جميعها خاضعة او خائفة، صغيرة القذ او متوسطة. تتميز بجملها من خدد فروز السوائل الكرمية الرائحة. عيونها جانبية. قرونها الاستشارية مستطيلة، مقوسة، لثائية المفصل. ارجلها لثائية العغل. جنداتها خالية البروق القاطبة الطولية.

١٧٠٦٦ - طشيرة

حشرة تسور نحو القامة مشوكة من اسفلها الى اعلاها شوكها غالب لورونها وورقها صغار ولها ثورة بيضاء يحرمها النسل. ج طي (السان).

١٧٠٦٧ - طشاحرة

Etudes des nusges (F).

هي الايلان درس تكون السبب وتجر كاتبا.

١٧٠٦٨ - طشاح، طشاح، طشاح

Cirrus
خرب من النجوم وهو شهاب مرتفع وقصير ترى البها من خلاله.

١٧٠٦٩ - طشاح مرقطة

Tropideres sapicola (S). Tropidère moucheté (F). Tropideres sapicola (E).

حشرة خاضعة غاشية دامت من فصيلة القاطريات ورتبة مفصلات الاجنحة. تألف ارجح السنديان. غناضها تمش على الاوراق. يرقاتها تمش على الجفوع والاضبان اليابسة فتسودها بالبطول والبرص. جسمها صغير القذ يملو من ٤ الى ٥ مم. ثوبها الى السواد القمعي الاصعب المواج يملو ترقيط اطلس وبعض التزاويق الكمتية. رأسها مستد الجرم، عظمها متكي بزنق الطرف. عيناها صغيرتان. زياتها صفيرتان. طولها مستدير المثير للاسف. غنداما شديدا الصلابة، كسيتها الحبل. ارجلها لثائية العغل لها جيل واحد الى الحول. تظهر الحشرة الجملدة في اوائل ايار وتعيش حتى اواخر حمور. تسرح في التبار. تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع تمتع المكان في شرق الاغصان اليابسة او تحت قشورها البقية عند بلوغها الكمال الجسموي طول نحو ٨ مم. جسمها مستطيل الرأس والمنقذ، سداسي الارجح الصغيرة. ثوبها الى التني الاصفر المواج. رأسها اسود. فكها طليح ذويان. لطور الاكامل الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتقي في السرداب الريقي ضمن غشاء مزيل.

١٧٠٧٠ - طشاح

Rate (F). Spléon (E).
عضو بطني في الجسم يربط بين تجويف البطن تحت الحجاب الحاجز. وظيفته الدفاع من احمه ضد الميكروبات لذلك فهو يمتزج الكثير من كريات الدم احمر يستعملها عند الحاجة اليها. ج عمل اوطلة وطحالات.



طشة البطاطا



طشة الزرع



طشة القطن



طشة الكرمة



طشاح مرقطة

* ١٧٠٨٠ - طَحْرُوب السَّنْدِيَان *
Pleurotus dryinus (S). Pleurote du chêne (F).

نوع من الطحروب . يعيش على جذوع السنديان وأغصانه . مجموعته شبيهة العدد الذي يتألف من وسدتين أو أربع وحدات . ساقه شديدة القصر . نكتة مفروطة ، متحدة الحجم ، مكثفة الأطراف ، مزققة السطح ، لونها إلى الطحلة الصفراء المواج يملؤها تنبتش اسمر . اطراسها إلى الصفرة السمره المواج || لحيتة كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

* ١٧٠٨١ - طَحْرُوب صَحَارِي *
Pleurotus ostreatus (S). Pleurote en huître (F).

نوع من الطحروب يعيش على جلوع الصنوبريات . مجموعته تمد من ٦ إلى ١٢ وحدة . ساقه قصيرة شبيهة اللون . نكتة محارية الشكل لونها إلى الكهية السمره ، اطراسها إلى الأبيض المابق || لحيتة مأكولة ، لذينة الطعم .

١٧٠٨٢ - طَحْرُور ، طَحْرُورَة *
Nuage (F). Cloud (E).

الطحروب والطرورة : السحاب . والطحارير قطع السحاب المتفرقة .

١٧٠٨٣ - طَحَالِب *
Muscolae (F). Muscolous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على النباتات الطحلية .

١٧٠٨٤ - طَحْلَب ، طَحْلَب ، طَحْلَب *
Mousse (F). Moss (E).

اسم شامل يطلق على مختلف النباتات الطحلية دون تمييز رتبة أو فصيلة أو جنس . والطحلب من النباتات المادمة الاضرار والجذور الحقيقية تلتصق الغذاء بمراش خيطية تنبت في التربة وعلى الشجر والصخور .

١٧٠٨٥ - طَحْلَب السَّكَّك *
Mousse (F).

مرض سار يفنك بأحماك المياه المذبة . مظهره الخارجي نواص خلى التجميع ، قلبي اللون يملأ اجسام السكك . سيبه نظر مجهرى يلقى سبرولونية (Saprologia) يعيش في المياه الملوثة القذرة .

١٧٠٨٦ - طَحْلَب المتناقع *
Sphagne (F).

هو الصلطب ، اطحلب .

١٧٠٨٧ - طَحْلَبِيَّات *
Bryophytes, Muscinées (F). Bryophytes, Muscins (E).

قسم من المملكة النباتية يتميز بخلو نباتاته من الجذور والأزهار . اجنسه وأنواعه كثيرة العدد تجمعها ثنائي فصائل تنتمي الى أربع رتب وصفين .

١٧٠٨٨ - طَحْصَاء *
Mouture (F). Grinding (E).

جمل البر وسائر الحبوب دقيقاً .

١٧٠٩٠ - طَحِيرَب *
Olivella (S). Olivella (F). Olivella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديبات الارجل وفضيلة الطحيريات . انواعه الماصرة المروقة نحو ٣٠

١٧٠٧١ - طَحَالِب *
Mousses (F). Moss (E).

صنف من قسم الطحليات انواعه واجناسه عديدة تجمعها أربع فصائل تنتمي الى مرتبتين : السبخيات والصفانات . اما فصائلها فهي : الروكيات والصفانيات والثرنيثيات والصرغيات .

١٧٠٧٢ - طَحَالِي *
Splénique (F). Splenic (E).

نمت تعريفي يطلق على ما له علاقة بالطحال .

١٧٠٧٣ - طَحَان *
Meunier (F). Mûlier (E).

هو من تامل مهنة الطحن من صانع الطحين وباتمه .

١٧٠٧٤ - طَحَالَة *
Meunerie (F). Miller's trade (E)

حرفة الطحان وهي صناعة تحويل الحبوب دقيقاً .

١٧٠٧٥ - طَحْرَاب *
Olivancillaria (S). Olivancillaire (F). Olivancillaria (E).

جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات مديبات الارجل وفضيلة الطحروبات . انواعه الماصرة المروقة عديدة موطنها بدار امريكية الجنوبية || اصداها شبيهة باصداف الطحرب الا انها ازالق منها وبجوانسها مقوسة الشكل . صفحاتها ناعمة ، جميلة الالوان والزخرفة .

١٧٠٧٦ - طَحْرُوب *
Olive, Dactylus (S). Olive (F).

الواحدة طحربة . جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديبات الارجل وفضيلة الطحريات . انواعه المروقة نحو ٦٠ جميعها مفترسة . موطنها بدار البلاد الحارة . تعيش على التطوير الرطبة الموصورة || اصداها مائلة شبه زيتونية الشكل . متوسطة الحجم ، جميلة الالوان والزخرفة . بعض انواعها يفرز مادة صابغية لونها وقرصها كالاريجون || اثير انواعه واكثرها قذا واميها ارجوانيا الطحرب الرقي (Dactylus utriculus) لونه الى الشفحة المزخرفة بالكهية . موطنه المحيط الهندي .

١٧٠٧٧ - طَحْرِيَّات *
Olividae (S).١٧٠٧٧ - طَحْرِيَّات *
Olividae, Dactylidae (F). Olividae (E).

فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات مديبات الارجل . اجناسها وانواعها الماصرة المروقة عديدة موطنها بدار البلاد الحارة || اصداها شبه اطحلية و زيتونية الشوزن ، متفاوتة الاحجام ، جميلة الالوان . مستطيلة كفتحات القفصة الناعمة . ارجلها كبيرة ، ثنائية الفلق || اعرف اجناسها واشهرها الطحرب والطحيرب والطحراب والروطب والماجة .

١٧٠٧٨ - طَحْرَة *
Tégument (F). Tegument (E).

الغشاء الناعم الذي يلفل الفتوة والبررة وما اشبه .

١٧٠٧٩ - طَحْرُوب *
Pleurotus (S). Pleurote (F).

جنس تطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريقنيات . انواعه المروقة قليلة العدد اصلاها غابات وسراج جبال المناطق المعتدلة الحارة . تعيش على جلوع الاشجار واغصانها دون ان تؤذيها . تتميز بسوقها القصيرة وبنكاتها القسية الشكل || اعرف انواعها واشهرها الطحروب الخاوي وطحروب السنديان .



طحرب



طحرب السنديان



طحرب مجاري



طحرب

المروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مجار العالم || مستتراتها تبدو كمنافذ ملونة قطنية ألخفاف تتوهج في اللاه توجهها ملابسها المديدة وما ينشأ لها من الياث راشية مستطيلة عجيبة الاطراف .

١٧١٠٤ - طرّازيات ٥
Phosphoridæ (S).
Phosphoridæ (F). Phosphoridæ (E).

فصيلة من الفصائل المشييات البحرية . اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم مجار العالم || اشهر اجناسها الطرارة .



طخروف

Type ١٧١٠٥ - طرّاز

١٧١٠٦ - طرّاز بُرْتُسْطَالِي ٥
Rupicola crocea (S).
Rupicola orangé (F).

طائر من فصيلة الطرّازيات . موطنه بعض المناطق الجبلية من اليونان ولبنان . يألف المواقف الصخرية والاراضي الوعرة باستثناء فصل الشتاء حيث يهاجر الى الغابات . سره يند بعض المئات || جسمه مكرم الشكل يطول نحو ٣٠ سم . عند الذكر نحو ٢٧ سم . عند الانثى . ثوب الذكر الى الصفار البرتقالي . حناجره خضراء الى الازرق . لواحش قوامه وابعاره الى الجزرة . وقال ذنبه جزئية اللون صفراء الاطراف . حنقه حينه برقالية اللون . منقاره وساقه الى الصفار الحلي . ثوب الانثى الى الصفار النائي يطولو مائة حراء الى الانثى والذنب || طيرانه خفيف الحركة سريعها طويل النطو . قوته لثار المختلفة واليدور || يشبه وكه في مخالب الصخور . حمل طريقة السنور . بالعين المزوج بالالياف النباتية . الانثى تحضن ثلاث مرات في الحول . حضنتها تتألف من فيضتين . لترغم يمشي نحو اسبوعين تقوم به الانثى بينا الذكر يؤن لها الغذاء .



طرارة

١٧١٠٧ - طرّازيات ٥
Rupicolidae (S).
Rupicolidae (F). Rupicolidae (E).

فصيلة طير من الجوارم شيات النائير . اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد . موطنها بعض مناطق امريكا الوسطى اعصها اليونان . تألف البور والمواقف الصخرية التي لا تبعد كثيرا عن شلالات اللاه || اجسامها حلة مكرمة مستطيلة الاجنحة قصيرة الاذنان والارياح . صغيرة المناقيد . كبيرة الفنازع التي تبعد من المناش الى الانثى . انثواها تختلف مع النوع والوقت || نظامها الحياتي جماعي . اسرارها تد بعض المئات . قوتها لثار واليدور || اعراف انواعها واشهرها الطرّاز البرتقالي .



طرّاز برتقالي

١٧١٠٨ - طرّاة البج ٥
Terapha hyociani (S).
Punatæ des Jusquiamæ (F).

حشرة غاشلة من فصيلة الكورسيات ورتبة مختلفات الاجنحة . جسمها ميجر الحلب . متدل التبطيط . يطول نحو ١٠ سم . رأسها مستطيل . حرم عظمها متدل الطول . عينها صغيرتان . ناشزتان . زباناها مستطيلان || ثوبها الى الحمرة الصفراء المواجه يطولها تيج اسدي في الكول والحيفة وسنجي الطهران . طهرها اريد اللون . قشراتها شفافة . يطها الى الحمرة يطولها تيج اسدي . قوامها متكاثفة الحلب || تركب العديد من النباتات واعصها الباذنجانيات ومنها البج .

موطنها مجار البلاد الحارة || اصداها ماسة لامة زيتونة الشوزة . صغيرة الحجم . حيلة الالوان الزاوية || منه انواع تنفخ فوق سطح اللاه وذلك بواسطة ارجلها المغلفة المسكن لنفخها .

١٧٠٩١ - طحين ٥
Farine (F). Flour (E).
هو الدقيق . مسروق نام يحصل من طمن حبوب القمح والذرة الصفراء ويبرعا من الحبوب .

١٧٠٩٢ - طخاف ٥
Cirrus (S).
ويدهى الطخاف . صحاب مرتفع رقيق .

١٧٠٩٣ - طخروف ٥
Nimbostratus (S).
هو الطاخرف غروب من الليوم . اطلبه .

١٧٠٩٤ - طخروف ٥
Languria (S).
Langurie (F). Langurie (E).

جنس حشرات من غدييات الاجنحة دبوسيات القرن ونصفية الطرطليات . انواعها المروفة نحو ٧٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها صغيرة . ضيقة الشكل . تطول من ٨ الى ١٥ سم . رؤوسها عرجمة . عيوبها ناشزة . قوتها الاستعمارية غيطة . دبوسية الاطراف . كواسلها شبه مكورة . بطونها مسطوية . اغدادها ضيقة . لاحقة . قوامها دقيقة . انثواها ثنائية اللون . يكثر فيها الاحمر والبرتقالي . اغدادها زرقاء او خضراء او كستنية او صفراء مدهة الموج || معظم انواعها يعيش على الفلور والبعض الآخر تحت قشور النباتات الذابل . ورقاتها دامت .

١٧٠٩٥ - طخفء ٥
الانان السوداء الاثف .

١٧٠٩٦ - طخممة ٥
Troupeau de chèvres (F).
Flock of goats (E).
قطيع المز .

١٧٠٩٧ - طخميل ٥
Coq (F). Cock (E).
هو الدبيل المزر .

١٧٠٩٨ - طيجم ٥
Takang (F).
حيوان لبون عايب مجرّ يدهى طاكأن . اطلبه .

١٧٠٩٩ - طرّ ٥
Duvet (F). Down (E).
الطر : ما طلع من البور بعد الفسول . وطر النبات : رطل او كس .

١٧١٠٠ - طرّاخور ٥
هو الاسقمري . نوع من السك . اطلبه .

١٧١٠١ - طرّاخور شائع ٥
Maquereau commun (F).
سمكة بحرية تدعى اسقمري معروف . اطلها .

١٧١٠٢ - طرّاخور كليّاس ٥
Maquereau collas (F).
سمكة بحرية تدعى اسقمري كليّاس . اطلها .

١٧١٠٣ - طرّاة ٥
Phosphora (S).
Phosphore (F). Phosphora (E).
جنس عفاء من المشييات الطراريات . انواعها

١٧١١٨ - طُرُوث * Balanophorus (S).

Balanophore (F). جنس نباتات لحية فطرية الشكل معمرة من فصيلة الطروثيات. أنواعه المشهورة ثلاثة تصقل على جنوب مختلف الأنهار. سوقها وفروعها صغيرة القذ غليظة الجسم. أوراقها شريفة متراكبة. أزهارها صفراء أو بيضاء أو حمراء. عصارة أغاليجه شبيهة بالتركيب شائعة الاستعمال.

١٧١١٩ - طُرُوث * ، مَصْرُور ، رُبُّ الأرض ، إِبْر الحقيق ، إِبْر الذئب

Cynomorium coccineum (S). Cynomoir, Cynomorion écarlate, Champignon de Malte (F). Maltese mushroom, Scarlet synomorium (E). Maltaser Pilz, Schwammvon Malta (D). Fungo di Malta (I).

نبات طفيل يسيد الجنس والنوع من سبط المصرورات وفصيلة الطروثيات. منته حوض البحر المتوسط. أغاليجه مأكولة قابضة وهو لا يتغذى من بعض الحواش الطيبة الصحية المقوية للثافة، كما يستعمل لقطع الزحف.

١٧١٢٠ - طُرُوث أحمر * ، هَالُوك شَرَقِي

Phelipaea coccinea (S). Phélpée écarlate, Clendestine du Levant (F). Red showy broom rape (E). Clendestino di Levante (I). نبات طفيل من فصيلة الجففيديات يكثُر في بعض مناطق الشرق الأدنى. أغاليجه نفسجي اللون، أزهاره أرجوانية، حمر الحبل. وهو شديد الريق والضرر، يؤدي النباتات التي يركبها.

١٧١٢١ - طُرُوث حلو

هو الأكاريفون المري، أطليه.

١٧١٢٢ - طُرُوث مصري * ، هَالُوك رَجِي

Phelipaea aegyptiaca (S). Phélpée d'Egypte (F). Sweet scented broom rape (E). Nalkensommerwurz (D). Succiamale piccolo (I). نبات طفيل من فصيلة الجففيديات يركب أكثر الزروع السيفية ويقع بها أشد الأذى.

١٧١٢٣ - طُرُوثِيَات Balanophoraceae (S).

Balanophoracées (F). Balanophoraceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الغلغتين. أجناسها وأزهارها عديدة تتميز بطلاقة سواها الحسية. أوراقها شريفة متراكبة. أزهارها وبيضة أو ثنائية المسكن، صغيرة القذ، هامة الأركان، قرصية التجميع، لينة، متتامة.

١٧١٢٤ - طُرُوح Soustraction (F), Subtraction (E).

Régime de banane (F). Bunch, Stems (E). هو القرط يتألف من عدة أشامط متتامة ترتكز على شخاخ لبني التركيب، متين الحيك، غزير العصارة اللبنيّة.

١٧١٢٦ - طُرُوح في المُزَايِدَة

Mise aux enchères (F). Bidding (E). هو طرح حال متقول أو ثابت للبيع بطريق المزاد العلني ليشتره من يعرض أجل ثمن فيه.

١٧١٢٧ - طُرُوحَم Eau altérée (F).

Corrupt water (E). هو الماء الأجن.

١٧١٢٨ - طُرُوح ، طُرُوحَة Pulsard (F). Cesspool (E).

شبه حوض كبير عند خرج القناة يجمع فيه الماء.

١٧١٠٩ - طَرَائِقُ الإِسْفَاد

Méthodes de reproduction (F). Methods of reproduction (E).

طرائق الإفساد في الحيوانات النواجن تأتي بالنسبة إلى البداية المتوخاة على حدة الشكال: الإفساد والتجبن والانتفال والتخليط والانتخاب. وأجسامها في مواضعها.

١٧١١٠ - طُرُوب Tourbe (F). Peat (E).

هو التراب، أطليه.

١٧١١١ - طُرُوبَاء Tourbière (F).

Peat-bog, Peat-moss (E). هي التراب، أطليه.

١٧١١٢ - طُرُوب مَطْرُوقِي * ، دُرُكَة القَصَب

المطروقة

Cynchramus schoenicus, Embertia schoenicus (S). Cynchrame schoenicole, Bruant des roseaux (F). Dalmatian Reed Bunting (E).

طائر من اللرب وفصيلة الشروديات. موطنه أروبة الجنوبية ويقع في الشتاء نحو قبرص ولبنان وفلسطين وسيناء ومصر. يعتبر في الضواري التي تقيم في لبنان من شهر إلى أربعة أشهر. جسمه ريع القامة يطول نحو ١٥ سم. وتبلغ مسطته نحو ١٨ سم. ثوبه إلى الطحلة البنية يعلوها توضيح كسني. رأسه وذنبه إلى السمرة. ويمتد من قاعدتي الشنق عظام أبيضان فاصلان بين الحسرين والزرور ثم يتصلان بقلادة يضاء تطوق الرأس. وعلو الرداء والظهر والبصر عسلوط كسنية يتخللها الأسود. ذنبه مستدل القذ، غارق الطرف. صفوه ويطن إلى القبرة البيضاء. أبطاء وموئاج بالني. حلقه عينه كسنية. منقاره سبوروي اللون. الأذن أصفر قدام الذكر وشربا قريب الشبه بوجه. يأنف المنطق والأجام وضفاف جاذري الماء. يدخن منه على الأرض بين الأعشاب المكتنفة. الأذن تحضن مرة واحدة في العام. حشيتها ترواح ٤ إلى ٦ بيضات ترجعها بتناوبة للذكر من ١٣ إلى ١٤ يوما. يعتبر من المصافير النافعة القليلة الأذى.

١٧١١٣ - طُرُوبَاء Equus aslaticus (S).

Tarpan (F).

ضرب من الخيل موطنه فيافي آسيا الثلاثية. علماء الحيوان لا تتعرف بالظربان كنوع مستقل بل تقول أنه ضرب من الخيل توشش بعد أن كان داجبا. جسمه أصغر من جسم القرب العربي. ثوبه كسني اللون يمتد في الشتاء ويزهر في الربيع والصيف. يتميز بالصلاب والشاط. وبغلظة الرأس وباستطالة العنق الأضلع القصير العرق، ويصدر الحافر وبزواة شعر الذنب الذي يمتد حتى أخاخر الظهر.

١٧١١٤ - طُرُوبُوش القُرُوب هو لبلاب الحقول، أطليه.

١٧١١٥ - طُرُوكَة الطرة هي التلة الواحدة.

١٧١١٦ - طُرُوكَة Bord (F). Edge, Margin (E).

طرة كل شيء. حرفة. وطرة الورقة حرفة أو حثارة. ج طرد وطرار وطرات وأطرار.

١٧١١٧ - طُرُوكَة Huppe (F). Crest, Tufted (E).

شكل من أشكال الغنزة.



طربال مطروق



طربان



طُرُوث



طُرُوث



طُرُوث أحمر



طُرُوث مصري



طرخون



طردوس



طرب



طرسوج اسمر



طرسوج دلي



طرسوج صغري

الغابات . ملجته الحياتي زويي . مسرعه دجوي . قوته الخشرات والذباب والكار وريحق الاذهار يرتفعه بلسانه اللصيق المالح || جسمه صغير القدر بطول نحو ١٨ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٠ سم . رأسه مخروطي الشكل ، دقيق القمم . عيناه صغيرتان . اذناه مستديرتان . قوامه قصيرة . اياهه تقابل اسنابه . ويره كيت وقصير . ثوبه الى الشهية ويلعوا موالج انشقع في الرأس والظهر وموالج اصفر في الصدر والبطن ، ويلعوا ايضا خط شبيبي اسود قاطب يمتد من القفص الى قاعدة الذنب . حصره الى الشقعة الصنابية || الاذن تتحل بنفس الثوب ولما جرباب في اسفل البطن تقم في الرصيع حتى الطعام .

١٧١٣٩ - طُرْسُجُون * ، سُلْطَان ابراهيم

Mullus (S). Mulla, Rouget (F). Mullet (E). جنس اسماك بحرية من فصيلة الطرسوجيات انواعه ثلاثة مولها شواطي الخيطوط والاظلي . جميعها صغيرة القدر طولها يراوح بين ١٠ و ٣٥ سم . اجسامها املحلية الشكل خياف . اناجها زامية الالوان التراكبية المتداخلة بين الرادي والوردي والبرتقالي والاخر والبني والاسمر . رؤوسها صغيرة . عظامها قصيرة . طبائها ثنائية مستطيلة . زعانفها الشرجية فارة || انواعه الثلاثة مأكولة ومستحبة انما متفارة الصف .

١٧١٤٠ - طُرْسُجُون اَسْمَر * ، قُرْقُورَة

Mullus fuscus (S). Mulla brun (F). Dark mullet (E). نوع من الطرسوج قوته الشجوع والنبوت البحرية الربلية والصغرية . يكثر في البحر الخيطوط . طوله عند اكمال بلوغه يقارب ٣٥ سم . ملمسه املحليتي الشكل . ثوبه متراكب الالوان الزامية يندخل فيها الغني والوردي والاخر الصنابي المالح . ظهره اسود لونا من جنينه . رأسه صغير القدر . عظمه متوسط البروز . عظامها خيطوطان . عيناه حقيقتان . زعانفها الظهرية والصغرية معتدلة الحجم ، لينة . فلوله صغيرة ودقيقة || يكثر من اجساد الاسماك المأكولة ومنهم من ماله ان لم يغسله حل الطرسوج الصغري .

١٧١٤١ - طُرْسُجُون رَمْلِي * ، سُلْطَان ابراهيم

Mullus barbatus (S). Mulla rouget, Rouget-barbet, Petit Barbarin (F). Red mullet (E). نوع من الطرسوج قوته النبوت الربلية البحرية . طوله يراوح من ١٠ الى ٣٥ سم . ملمسه جالس الظهر . ثوبه متراكب الالوان الزامية يندخل فيها الغني والوردي والادرجاني . رأسه صغير القدر . عظمه قليل البروز وقصير . عيناه دقيقتان مستطيلتان . زعانفها الظهرية والصغرية معتدلة القدر لينة . زعنفة الشرجية فارة . فلوله مستطيلة رقيقة || يكثر من اجساد الاسماك المأكولة الا انه ياتي بعد الطرسوج الصغري . وهو مبدل حل الشواطي اللبنانية السوري .

١٧١٤٢ - طُرْسُجُون صَحْرِي * ، سُلْطَان ابراهيم

Mullus surmuletus (S). Mulla surmulet, Surmulet, Barbarin (F). Surmullet (E). نوع من الطرسوج قوته النبوت الصغرية للالوية . طوله يراوح بين ١٥ و ٢٥ سم . ملمسه مدني الشكل . ثوبه متراكب الالوان الزامية يغلب فيها الرادي والوردي

١٧١٢٩ - طُرْسُجُون هو الخندب البري ، املبه .

١٧١٣٠ - طُرْسُجُون * Saurel (F).

سمكة بحرية تسمى شم طرخودي ، املها .

١٧١٣١ - طُرْسُجُون *

Artemisia dracunculus (S). Estragon, Armoise petit dragon, Dragons, Fargon, Tragon, Serpentine (F). Estragon, Tarragon (E). Estragon, Traganbelfuss (D). Dragonce, Dragoncello, Targons (I). بقلة زراعية مسرة من فصيلة المركبات الانبوية الزهر . ساقه تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . اوراقه مستطيلة خيفة النصل . انجاده منلية التجميع ، ووكسية الشكل ، محورية الارتكاز || وهو من التوابل الشائعة الاستعمال . اوراقه وتوابعها مأكولة . جميع اجزائه حطرية . ينض الشهية ويثبه للمدة || يتكاثر بالبذر والفسخ . يحد في جميع الاربة الزراعية لكنه يفسد الرطوبة والفسخ .

١٧١٣٢ - طُرْدُ * طُرْدُ Essaim (F). Swarm (E).

هو فرق النحل . ج طرد .

١٧١٣٣ - طُرْدُكَا * هو السيوان السوري . املبه .

١٧١٣٤ - طُرْدُوس * Onychoteuthis (S).

Onychoteuthis (F). جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرغويات وأسيات الارجل لفصيلة الطردوسيات . انواعه المعروفة حديثة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه اسطوانية الشكل ، مستطيلة ، تنتهي بزنايف مزوالية كبيرة القدر . رؤوسها معتدلة الحجم . حيوتها كبيرة صاخفة . جرابها معلقة ، ثمانية منها محمية متساوية الطول واثنان لقيقتان مستطيلتان تشبهان برسي ستانية الشكل مجزأة بكتلاب حادة || اشهر انواعه الطردوس القوي (On. robusta) الذي يكثر وجوده في بعض مناطق المحيط الهادي والذي يطول من ١٥ الى ١٢ متراً .

١٧١٣٥ - طُرْدُوسِيَّات * Onychoteuthidae (S).

Onychoteuthidae (F). Onychoteuthidae (E). لفصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرغويات وأسيات الارجل ، مزدنبات الخياشيم ، حشريات الجرامز . اجناسها وانواعها المعروفة حديثة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمتعددة الحارة والباردة || احرف اجناسه واشهرها الطردوس والوراس والتاسم والفوس .

١٧١٣٦ - طُرْسُ Fouillet (F). Leaf (E).

جزء ودي الشكل من صفحة بعض القنطور . ج اطراس وطروس . والاطراس فهو كائنا اطراف اوراق مرصفة متناسبة مستطيلة .

١٧١٣٧ - طُرْسُك * Exuviable (F). Exuviable (E).

نمت ترغيفي يظن كل كل طائر يتسحر او حيوان يتجدد قشاره او جلده .

١٧١٣٨ - طُرْسَب * Tarsipes rostratus (S).

Tarsipede rostré (F). حيوان حاشر ثامر وحيد الجنس والنوع من فصيلة القنطريجات . موطنه بعض مناطق استراليا الشمالية . يأنف

الزئيفة . الاناث تبويض من ٤ الى ٥ بيضات والذكور تتأوب الاناث في الحضانة .

١٧١٥٠ - طُرُوبِيَّات * (S). Pteroptochidae
١٧١٥١ - طُرُوبِيَّات (F). Pteroptochidae (E).

فصيلة طير من الجوارم منيات المناقير . اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد . اصطلها بعض مناطق الشرق الاقصى وامريكا الجنوبية . تألفت البراري والمراعي قربها الحشرات والحوام والوزوز البرية || اجسامها صغيرة . ألوانها باهية الخصب الزاهر . اعراف اجناسها واشهرها الطرام والريازم .

١٧١٥١ - طُرُوب

هو الضرع الصغير الطويل المسترعي . ويقال لطويلة الضرع من الحيوان طربية .

١٧١٥٢ - طُرُوبَانِيَّة

الطربانية من الممر الطويلة شطري الضرع .

١٧١٥٣ - طُرُوبِيَّات (F). Vanneau huppé

طائر يدهي ابيض طيط متوج ، اطلبه .

١٧١٥٤ - طُرُوب (F). Petite centauree

هو القنطريون الصغير او مرارة الحنث .

١٧١٥٥ - طُرُوبَة (F). Tartrage

هي معالجة الخمر بمخاض الطرطريك مدأ لموز في نسبة حوضها .

١٧١٥٦ - طُرُوب * (S). Clinus argentatus
١٧١٥٦ - طُرُوب (F). Clinus, Crested blenny (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الجليديات شاككات الزمانف . اصطلها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || جسمها شبه اعليلي " الشكل ، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ثوبها الى الخضار البحري " الفضي " المراج يطو تجذع متفرع اسمر يمتد من الزعنفة الظهرية الى البطن . رأسها صغير انطز الذلق يطو في وسط الجبهة رتعة صغيرة تحمله غشروية المادة . زعنفتها الظهرية وبيدة مستطيلة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٧١٥٧ - طُرُوبُور هو البرازية ، اطلها .

١٧١٥٨ - طُرُوبُور البَاشَا

هو الكويجين الكبير ، اطله .

١٧١٥٩ - طُرُوبُور (F). Topinambour

هو صباد الشمس السنولي ، اطلبه .

١٧١٦٠ - طُرُوبُور مُحَرَّر * ، كَبُرُوبِيلُس

١٧١٦٠ - طُرُوبُور * (S). Coprophilus striatus

١٧١٦٠ - طُرُوبُور (F). Coprophilus striatus (E).

حشرة نائلة من فصيلة الدنيات وربة منقذات الاجنعة . تألفت المزروع التي تكثر فيها الماشية لاجأ تميش حل الزبل والورث || جسمها صغير القند يطول من ٦ الى ٧ سم . ثوبها الى السمرة الكستانية المابتاع . رأسها صغير الحجم ينتهي بفكين كبيرين . حيائها بارزتان . زباناها غيبطان حقيقان . ظهرها يلمع نحو ثلث البطن . غمداها قليلتا الصلابة ، متباينة التميز . بطنها مستطيل المخزير ينتهي

والاجواني الصنابي المواج . رأسه صغير القند . غطمه ذلق بارز . جذباه مستطيلتان . حيائها ارجوانيتان . زعانفه الظهرية والصغرى كبيرة القند لينة . زعنفته الشريفة فارقة مستطيلة || يتبر من اقفر الاسماك واجيدها صغاف . وهو مبدول حل الشواطي القنابية السودية .

١٧١٦٣ - طُرُوبُورِيَّات (S). Mullidae

١٧١٦٣ - طُرُوبُورِيَّات (F). Mullidae, Goatfishes (E).

فصيلة اسماك من الطبطيات الشاككات الزمانف . اجناسها وانواعها عديدة جميعها مأكولة مستحبة الطعم . اجسامها رفيقة متوسطة القند او صغيرة . ألوانها زاهية الالوان الجميلة . اشهر اجناسها الطرطوج .

١٧١٦٤ - طُرُوب * (F). Exuvie

الطرطم ما يتخل عنه الجسم الحيواني عنه التصير او الانسلاخ او الاكمال .

١٧١٦٥ - طُرُوبَة * (F). Exuvibilité

١٧١٦٥ - طُرُوبَة (E). Exuvibility

الطرطة خاصة التصير او الانسلاخ او ابدال القشار التي تنتج بها الطير والحشرات وبعض الحيوانات .

١٧١٦٦ - طُرُوبُور (S). Aptenodytes

١٧١٦٦ - طُرُوبُور (F). Mancho

جنس طيور بحرية من دمديات الريش وكليات القند . تتميز باجسامها الغليظة المستطيلة . طولها يراوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم . اجنتها بجذاف الشكل ، حشوية الريش . اصقلها وبناقها مستطيلة ، ورؤوسها صغيرة . اذنانها جداد كاسية || قربها الاسماك والقشريات . تفتن اوكارها في تخاليف الصبور فوق الماء . اناثها تبيض وتحضن بيضة واحدة نحو اربعة اسابيع .

١٧١٦٧ - طُرُوبُورِيَّات * (S). Aptenodytidae

١٧١٦٧ - طُرُوبُورِيَّات (F). Aptenodytidae (E).

فصيلة طيور بحرية من دمديات الريش وكليات القند . اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد . موطنها بحار القطب الجنوبي || اجسامها شبه غشوية الشكل . رؤوسها صغيرة . مناقبها جالسة . معتدلة الطول . غمدة الاناك اعلما الباترة السطام الحاد . اصقلها مستطيلة : اجنتها بجذاف الشكل ، حشوية الريش . اذنانها جداد كاسية . ارساغها متوسطة الحجم واربعة الاصابع ، كاملة الخطاب || اشهر اجناسها الطرطم والظلفان .

١٧١٦٨ - طُرُوبُور (F). Agrodrome champêtre

طائر من فصيلة الفعريات يدعى جشة الحقل . اطله .

١٧١٦٩ - طُرُوب * (S). Pteroptochos

١٧١٦٩ - طُرُوب * (F). Pteroptochos (E).

جنس طير من فصيلة الطربانيات . انواعه المروفة قليلة العدد . موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية . تألفت المروج والنباتات وشخاف مجاري الماء . قربها الحوام والحشرات والديدان والوزوز البرية || اجسامها صغيرة تطول من ١٤ الى ١٦ سم . اجنتها قصيرة . اذنانها مستطيلة . سميرية الاطراف . ألوانها تراوح من الشقعة الى السمرة والصغرة والشبهة . صدورها وبطنها من البياض الى النبرة الموحدة بالاسود || تفتن اعاشتها في الاجار



طرطم



طرطم



طرطم



طرطم حُرر

١٧١٦٦ - طَرْفُونِيَّات * Trogonidae (S).
Trogonidae (F). Trogonidae (E).
فصيلة طير من المتسلقات. اجنحتها وانواعها عديدة
اعطانها البلاد الاستوائية. تتميز باستحالة اذنانها وبجمال
الوانها والوانها الزاهية. أشهر اجناسها الطرغون

١٧١٦٧ - طَرْف

الطرف أو الطرفان منزل من منازل القمر الشامية. وما
نجان من برج الاسد يتقسمان الجهة. سيما بذلك لاجتارها
كمنى الاسد || رقيب الطرف يعنى سد بلع.



طرفة

١٧١٦٨ - طَرْف Thororoughbred (F).
نعت تعريفى يطلق على كل حيوان سريع النسيب الاصيل
اي كريم الطرفين طرف الاب وطرف الام.

١٧١٦٩ - طَرْف Partie (F). Part (E).
هو من اشترك في عقد قانونى مع غيره.

١٧١٧٠ - طَرْفَا المَعَادِلَة

Membres de l'équation (F). Members (sides) of
equation (E).

١٧١٧١ - طَرْفَاء هي الأقل، اقله.

١٧١٧٢ - طَرْفَاء المَنّ هي أقل المَنّ، اقله.

١٧١٧٣ - طَرْفَايَات

وتسمى اللثايات. فصيلة نباتية من ذوات الثلقين عديدة
القصاصات. راسع اللثايات.

١٧١٧٤ - طَرْفَة

الطرفة نجم ثير من كوكبة برج السرطان مركزة على قائمة
السرطان المؤخرة.

١٧١٧٥ - طَرْقِي Couver (F).
طرق القفل الاثنى. قما عليها (السلاح).

١٧١٧٦ - طَرْقِي Ecrouir (F). To hard-hammer (E).
طرق المددن. مدده.

١٧١٧٧ - طَرْقَة Rangee de dattiers (F).
Rangee of date-trees (E).
صف التتخل بها طال وايضا زرع.

١٧١٧٨ - طَرْقِين * Trygon (S).
Patusague (F). Whip-tailed sting ray (E).

جنس اسماك مذبذبة بحرية من فصيلة الطرقيات. انواعها
المروفة قليلة المد اعطانها بحار البلاد الحارة يكثر وجودها
قرب الاعوار حيث تلتصق بالارال والاصمال بانتظار ما
تفترسه || اجسامها مبطة فيه مستديرة الشكل تطلون من
١٨٠ الى ٢٠٠ سم. بما في الاذناب المستطيلة كالسياط
تحسبها مناسخ حادة شديدة الصلابة جرحوها مؤذية
سامة وقد تكون ميتة. اذنانها تطلون من ٨٥ الى ١٠٠ سم.
الوانها تختلف مع الانواع. اعرفت انواعها المبدل والبنفسجى



طرفين

١٧١٧٩ - طَرْفُون يَنْفَسِجِي *

Trygon violacea (S). Patusague violacea (F).
نوع من الطرغون. يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط.
طوله بما فيه الذنب نحو ١٩٠ سم. ثوبه الملوي الى

بشرج عريض. ارساغها خماسية القفل || حاجيل واحد في
الحبل. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتمتدح حتى
اواسط آب. تسرح في النهار وتبيت في الليل داخل انفاق
مستطيلة تحتفروا في التربة || البرقة عند بلوغها الاذراك
التام تطلون من ١٠ الى ١٢ م. ثوبها الى السرة الكستنية.
حلقاها الصدرية مستطيلة الجرم. رأسها ممتد القد اسود
اللون. شكلها قضيئات. رواجها وسرجها الى السرة
السوداء || طرر الاكمال الذي يستمر نحو ستة اشابيع
ينتهي في التربة ضمن جراب من الطين والمواد العضوية.

١٧١٦١ - طَرْفَب * Cephalopterus (S).
Céphaloptère (F). Cephalopterus (E).

جنس طير من الجوارم سنيات المناقير وفصيلة القطنجيات.
انواعه المعروفة قليلة المد اعطانها بعض مناطق امريكا
الاستوائية. تألف النباتات. قوتها اثار البرية. ملجئها
الحياثي جماعي. انوعها قليلة المد من ٤ الى ١٠ ازواج ||
اجسامها متوسطة القد شبيهة بالزرداب. رؤوسها متجربة
كبيرة الطور. اعانها مقفلة باغباب مستمرة الرض.
مناقعها ضليعة عجمية || أشهر انواعه الطرغب المزين
Ceph. ornatus (S). الذي يكثر وجوده على ضفاف
نهر الامازون. ثوبه الى السواد الاسفع الازرق المالح.

١٧١٦٢ - طَرْفَعَة * Columbella (S).
Colombelle (F). Columbelle (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديئات الارجل
وفصيلة الطرغليات. انواعه المعروفة نحو ٣٠٠ مظهرها
يمتدح على شواطئ بحار المناطق الاستوائية || اصداؤها
مستطيلة شبه بيضية. غنية بمحازنة قصيرة القلوب، مبيجة
ومجتمعة بالالوان الزاهية. رؤوسها صغيرة مبطة، ثنائية
القراس المصونة مخروطية الشكل. انواعها ملحقة
بالرؤوس، مستطيلة الانضمام الانبوبية. ارجلها مستطيلة.
ضيفة مجهرية باسقاط قرنية المادة.

١٧١٦٣ - طَرْفَعْلُودُس * و طَرْفَعْلُودُس * Trochilus (S). Colibri, Ouesau-mouche (F). Humming-bird (E).

طرغولوس وطرغيس من الجاسط. صفور صغير القد
طوله نحو ١٠ سم. ثوبه متداخل الالوان الزاهية الجميلة
فيه الرمادي والاخضر والاصفر والاسمر وفي جناحيه وريشة
ذهبية. ذنبه متوازي النقط البيض النقيقة. متقاربه رقيق
مستطيل. قوته اللذاب والمروم ورسق الانزمار || يمش
عشه في الانجار الفتاة فوق مجاري الماء || اثناء تحضن
من مرتين الى ثلاث مرات في السنة. حضنتها لا تصنى
اربع بيضات.

١٧١٦٤ - طَرْفَعْلِيَّات * Columbellidae (S).
Columbellidae (F). Columbellidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديئات الارجل
مشطيات الحياث. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة
منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والاستوائية || اصداؤها
صفيرة القد متباينة الاشكال منها البيضية والمخروطية
والوشية، جميعها متشابهة الصفة المزخرفة بالالوان
الزاهية || أشهر اجناسها الطرفة.

١٧١٦٥ - طَرْفُون * Trogon
جنس طير من الطرغويات للمتسلقات. انواعه عديدة
جميعها من الحشرات الثمارات تألف غابات واحراج البلاد
الحارة الاستوائية.

السديان . ساقه رقيقة ، منتصبة ، معتدلة الجرم ، غيراه
القرن . نكته قارئة ، مستديرة ، قطرها نحو ١٠ سم .
لونها الى الصبغة للسراة السفاه الموج . اطرافها الى
الصبغة الوردية للمواج لا لحمته جيدة الصنف ، مرضوب
فيها .

١٧١٨٩ - طُرْقُوس Mouton engraisé (F).
Fatten sheep (E). هو اغروف السمين .

١٧١٩٠ - طُرْمُشُ المَرْجُح * Longitarsus pratensis (S).
Longitarsus des prés (F). Longitarsus pratensis (E).

حشرة من فصيلة النصاريات . موطنها بمصر اقالم حوض
البحر الابيض المتوسط والناطاق الداخلية المتاخة . تألف
المرج والمزج وضاف مجاري الماء . خنافسها تعيش على
اوراق النباتات التابعة لفصلي الفريزيويات والحمصيات
ولا تمتص من السروق والخلوص . يرقاتها تعيش في التربة على
جلود النبات المائل || جسمها صغير القد ، شبه بيضي
الشكل ، يطول من ٢ الى ٣ سم . قوتها الى الجوزة يطولها
مواج اشجع . رأسها مستعرض الجرم ، اسفلي الخطم .
زبانها غيلتان مقوسان || لها جيلان في الحول . تخرج
الحشرة الجبلانة من مكنتها في اواخر نيسان . تصادف بعد
ظهورها ياسوسين وتباشر منع المن بعد الكرم يوسين و
تفتن في التربة وترز المنزق قرب استاخ ويصور النبات
المائل || البقرة منه تغتها تسجده نحو جلدور النبات فتفتب
الامدة وتلج الى الداخل ، قوتها المصاراة والعليا النباتية .
وتبقى حتى اكمال طورها اليرقي اي نحو ٣٠ يوما ثم
تتسب الى التربة وتدخل في طور الاكمال . والبقرة منه
يلونها الادراك تطول نحو ٥ سم . جسمها حنطي القرن ،
اسطواني الشكل ، رأسها اسود || اما خنافس الجيل الثاني
فيأتها الشوي يستمر حتى يمين زمن النشاط ويكون ذلك
في اواخر نيسان .

١٧١٩١ - طُرْمُوق Vespertilion (F).
هو الخفاش ، اعليه .

١٧١٩٢ - طُرْمُيد * ، طُورُغُوس * Torymus (S). Toryme (F). Torymus (E).

جنس حشرات من فصيلة الطورميدات . انواعها المعروفة
نحو ٢٥ اصنافها الاقالم الحارة والمعتدلة الحارة || جميعها
ناقة تتطفل على الحشرات الفسارة اخصها الابرار ||
اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٤ سم . رؤوسها مخروطية
الشكل . كوالها منقطة . بطونها فضية . مزارثها دقيقة ،
مستعيلة . اولؤها بخلفة الالوان ، لماعة .

١٧١٩٣ - طُرْمُيد يَات * Torymidae (S).
Torymidae (F). Torymidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المضمورة .
انواعها عديدة . اصنافها الاقالم الحارة والمعتدلة الحارة .
جميعها ناقة تتطفل على الحشرات الفسارة || حشراتا صغيرة
القد وتوسطه تطول من ٢ الى ٧ سم . اجسامها نحيلة ملونة .
رؤوسها مستعرضة . زباناها صولانية . قوالها طويلة .
مزارثها لاقحية الجرم منها القصيرة ومنها الحارقة الطول ||
اشهر انواعها الطريد والذبور والجلبورية .

١٧١٩٤ - طُرْقَالِيَّة Tornelle (F).
هي الشرس نبات من القلقاليات ، اعليه .

البفسجي السابق تملوه حاجات تراوح من الارزق الى
الاسود . ثوبه السفل الى الخطي الاسمر . منتشه اللبيل
كبير لقد طوله نحو ١٨ سم . || لحمه متوسط الصنف ،
ماكول .

١٧١٨٠ - طُرْقُون مَبْدُول * Trygon pastinaca (S). Pastenague commune (F).

نوع من الطرّون يكثر وجوده في المحيط الاطلسي . طوله
بما فيه الذنب نحو ٢٠٠ سم . ثوبه العلوي الى الشقة
السراة القاتمة . ثوبه السفل الى الخطي الاسمر . منتشه
اللبيل كبير القد ، حاد الطرف ، طوله نحو ٢٠ سم . ||
لحمه متوسط الصنف ، ماكول .

١٧١٨١ - طُرْقُونِيَّات * Trygonidae (S).
Trygonidae (F). Trygonidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من السفغيات الاطلاق . اجناسها
والنواها المعروفة قليلة العدد جميعها مقترنة ولودة . مرتها
الاخوار واغوار الشطوط || اعرف اجناسها واشهرها الطرّون .

١٧١٨٢ - طُرْم * ، طُرْمُ Rayon de miel (F).
Honey comb (E). العرم والعرم هو الشهد من العسل .

١٧١٨٣ - طُرْم * ، طُرْمُ Rayon (F). Ray (E).
هو شعاع الجلود والجلدوع .

١٧١٨٤ - طُرْم مَكَاكِي Rayon médullaire (F).
Medullary ray (E).

صفائح مرشمية شامخة الشكل تنطلق من محور الساق
او الجذر الى المكاء والخشب والكثير .

١٧١٨٥ - طُرْمَاز * تمت تعريفه بيلق على الفرس الكرم الرائع .

١٧١٨٦ - طُرْمُح * Ommatostrephus (S).
Ommatostrephes (F).

الواحدة طرمحة . جنس حيوانات بحرية مقترنة من الرخويات
وفصيلة الطرمحات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم
بحار العالم || اجسامها كبيرة القد وشية الشكل تنتهي
بزمانف رمية . رؤوسها مستطيلة . حيوتها كبيرة ،
جاسطة . رمية النقرة . ثمانية من جرمها محبة متساوية
الطول ولثتان مستطيلتان تنتهيان برسى ستانية الشكل ||
تتميز بقدة البأس والنشاط والقفز فوق سطح الماء حتى
ان يفسها يقع على سطوح المراكب || اشهر انواعها
طرمحة كولداني (Omm. Coldeneti) التي يكثر وجودها
في البحر الابيض المتوسط .

١٧١٨٧ - طُرْمُحِيَّات * Ommatostrephidae (S).
Ommatostrephidae (F). Ommatostrephidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية مقترنة من الرخويات رأسيات
الاذيل . مزدوجات الخياشيم . عشاريات الجرامز .
اجناسها المعروفة قليلة العدد اما انواعها فكثيرة جميعها
يمية لا تقرب للشطوط . ملجتها الحياتي جماعي . اسرايا
تعد بعض اللات || اعرف اجناسها واشهرها الطرمح .

١٧١٨٨ - طُرْمُوش * Pluteus cervinus (S).
Plutée couleur de cerf (F).

طرمماكول من فصيلة الطارقيزيات . يكثر وجوده في
النباتات الجبلية . يعيش على رويات الاشجار المبررة اخصها



طرقون مبدول



طرمع



طرموش



طرموش للمروج



طرميد



طريش الصفاين

Trigla nilvus (S). **طريخ شهب** ١٧٢٠٦
Trigla nilva (F).
نوع من الطريخ يطول من ٥٥ إلى ٦٥ سم. ثوبه إلى
الشبة القنصية يملأ سواج وودي يتخلله شيء من الأصفر
والأخضر .

١٧٢٠٧ - **طريخ رماندي**
Trigla gurnardus (S). Trigle gurnard, Grondin
gris (F). Gournard, Gurnard (E).
نوع من الطريخ يربط في جميع البحار أما يكثر في المتوسط
وطى الفلاني - الألبانية - الأوربية والافريقية || يطول
نحو ٦٥ سم. ثوبه إلى الزبداء القنصية يمتلئ مع اقترابه
من شبح الظهور ويبيض عند البطن .

١٧٢٠٨ - **طريخ صبور**
Trigla aspera (S).
Trigle rude, Cavalion (F).
نوع من الطريخ الصغير القند يطول نحو ١٢ سم. ثوبه
إلى الصفرة المرجانية الزاهية بإحدى أحرار من اقترابه من
الظهور وينصرف نحو البياض الألبان من البطن . يربط
في جميع البحار .

١٧٢٠٩ - **طريخ كبير**
Trigla corax (S).
Trigle perlon, Perlon, Perlan (F).
نوع من الطريخ يطول نحو ١٠٥ سم. ثوبه إلى الزبداء
القنصية السراء اللامعة . يمتلئ عند الظهور ويبيض عند
البطن . يكثر وجوده في المحيط الهادي .

١٧٢١٠ - **طريخ مرجاني**
Trigla cucullus (S).
Trigle morrude, Grondin barbarin, Orgue (F).
نوع من الطريخ يكثر في المتوسط يطول من ٢٠ إلى ٢٧
سم. ظهوه إلى الحمرة المرجانية . جانباه ويملأ إلى البياض
الأصفر اللؤلؤ .

١٧٢١١ - **طريخ منمش**
Trigla lineata (S).
Trigle Imbrigo, Surmulet sans barbe, Camard (F).
نوع من الطريخ يبدل في جميع البحار يطول من ٢٥ إلى
٣٥ سم. ثوبه إلى الحمرة الجوزية للامعة تعلوها نمشة
سوداء .

١٧٢١٢ - **طريخيات**
Triglidæ (S).
Triglidés (F). Triglidés (E).
فصيلة أسماك بحرية من رتبة الشبديات الشبكاتيات الزياتن.
اجناسها وأنواعها عديدة أعرفها وأشهرها الطريخ والجلاخ .

١٧٢١٣ - **طريد**
Rameau de moins d'un an (F).
الطريد هو العريون قبل أن يبلغ الحول .

١٧٢١٤ - **طريغلا**
جنس أسماك بحرية تدعى الطريخ .

١٧٢١٥ - **طريق**
Courtis mâle (F).
Curlew male (E).
هو الكروان الذكر .

١٧٢١٦ - **طريق**
Voie (F). Way (E).
طريق ج طرق . كلمة شاملة تشمل في عدة صيغ اشياء :
طرق المدن
طرق المواصلات

طرق قاتنة
Voie de droit (F).
طرق وأساليب
Voies et moyens (F).
طريق للتنفيذ
Voie d'exécution (F).
طريق تنظيمية
Voie classée

١٧١٩٥ - **طريغلية ليد يلدك**
Tornelle délicate
هي الشمس اللذيذ للأكل في الآبار ، اطلبه .

١٧١٩٦ - **طريغكة**
هي البلباط ، اطلبه .

١٧١٩٧ - **طريغشليا**
Tranzschella
جنس فطور مجهرية يعرف بالصنعة ، اطلبه .

١٧١٩٨ - **طريغشيل**
هو عباد الشمس السوي ، اطلبه .

١٧١٩٩ - **طريغشيل الصفاين**
Chrozophora tinctoria (S). Chrozophora tinctoria.
Tournesol des teinturiers, Croton des teinturiers,
Mauveille (F). Tournesole, Dyer's litmus paper (E).
Tournesolpflanze, Färber-Kroton (D). Tournesole,
Girasole (I).
نبات عشبي زراعي صناعي من فصيلة القريوليات ، اطلبه
معرض البحر المتوسط ، يربط في الأتربة الجيدة التركيب
المحتلة الانساج . زراعته تتطلب بعض النابت الخاصة
كالنور وللتنشيط بعد التتبع || يستخرج من سوه
عند الانزعاج ويعد لعلها وحقها صمارة صباغية شائعة
الاستعمال الصناعي .

١٧٢٠٠ - **طريغكة**
Torula, Torulées (F).

جنس فطور مجهرية من الفطريات وفصيلة الفطريات .
مشبهه مؤثر التركيب . جربه الكنديية سببية الانساج .
انواعه عديدة تعيش على ماء الانسان اليابسة والاراق
المتآخرة على الخشبي والمواد البضوية البائرة إلى الانحلال .

١٧٢٠١ - **طريغكة**
Torreya
شجرة حربية من القسوسيات تعرف بالطارق ، اطلبه .

١٧٢٠٢ - **طريغكة**
Lithodomus (S).
Lithodome (F). Lithodomus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات فصيلة الفطريات
وفصيلة الميديات . انواعه المحاصرة المرفوعة نحو ١٢
منتشرة في سطر بحار البلاد الحارة والمحتلة الحرارة ||
اصداها شبه اسطوانية الشكل متراكبة السفوحات للمحورة
بغشاء آدمي . اجسامها مسفورة مشعة || تعيش في اول
مهدلة لاصقة بالصخور المرفوعة ثم تتحرك من قيعا
اليقني فتشرب احلب الصخور وتعيش في الانفاق التي
تخلدها .

١٧٢٠٣ - **طريغ**
هو السرح ، اطلبه .

١٧٢٠٤ - **طريغ**
Trigla (S). Trigle, Grondin (F). Gurnard (E).
جنس أسماك بحرية من فصيلة الطريغيات . انواعه نحو ١٥
منتشرة في جميع بحار العالم . رؤوسها كبيرة مسفحة ،
هريفة للشكل . اجسامها مختلفة الاجسام تطول من ١٢
إلى ١٠٠ سم . زعانفها كبيرة شائعة لاقليمية . اطلبها
متراكبة الألوان الزاهية . طويها مأكولة ، مستعمية ،
جيدة الصنف || أشهر انواعها ما يلي .

١٧٢٠٥ - **طريغ آخر**
Trigla pini (S).
Trigle pin, Rouget rouge, Trigle hirondelle (F).
نوع من الطريخ ، يبدل في جميع البحار ، يطول من ٢٥
إلى ٣٠ سم. ظهوه احر اللون . جانباه إلى الوردي الزاهي .
يطول أعبر اللون .



طريغ

الجذور المتحرة تنقص عليها وتتركز بين الجرادة والاليف الخشبية حيث تتابع نشاطها الجوي وعملها التخريبي الذي يؤدي النبات لانه يعطب الوعية ويمنع التبادل النسفي || يكافح بتفادح النباتات الموصولة ويظهر التربة بالكلس الحراق أو بفسفور الكربون.

1٧٢٢٦ - **طَرَز** Tazard (F).
مكة بحرية قلعى اسفري طراز ، اطلها .

1٧٢٢٧ - **طَرَز ، فَرَكْدَا** Vérauda (F).
Veranda (E).

1٧٢٢٨ - **طَسَق ، طَسَك ، تَكْس** Taxe, Contribution (F). Tax, Impost (E).

الطسق : ما يوضع من الوظيفة على الجربان من الخراج المقرر على الارض . وكسب عمر الى صان ارفع الجزية من رؤوسها ونسب الطسق من ارضها . وقيل شبه الخراج له مقدار معلوم (السان) .

1٧٢٢٩ - **طَسَل** هو للماء الجارى على وجه الارض وهو التراب الدقيق الناعم وهو ضوء السراب .

1٧٢٣٠ - **طَسَم** Géotropisme (F).
Geotropism (E).
اثر الجاذبية الارضية في انتهاء النمو النباتي . وهو يندعي ايجابياً اذا كان متجهاً نحو مركز الجاذبية الارضية وسلباً اذا اجهت اتجاهها ماعاك .

1٧٢٣١ - **طَسَمَان** Desman (F).
جنس حيوانات حاشية من فصيلة الطويديات . يالاف صفاف الانهار والبيمرات . قوته الحشرات المائية والاسماك الصغيرة . له نجان طسان المسك ولسان الجبل .

1٧٢٣٢ - **طَسَمَانُ الْمَسْك** Myogale moschata (S). Desman musqué (F).
Muskrat (E).
نوع من الطسان موطنه فسج الارباه يمتد من بحر ارال الى بحر قزوين والى خضاف هر الذير . وهو يشبه الزبابة لكنه يجمع السنجاب الكبير . اسم اليون . فاسر الفراء . مستطيل الطول والذنب . يحمل عند قاعدة ذنبه غدة مسكية لمادة القوية المرف || قوته الحشرات المائية والاسماك الصغيرة . يعيش في نفق يحلده على مستوى الماء .

1٧٢٣٣ - **طَسَنَاج** Spheniscus (S).
Spheniscus (F). Spheniscus (E).
جنس طير من طيمات الريش و كفيات القدم و فصيلة الطسناجيات . انواعه المرفقة قليلة المدد موطنها القطب الجنوبي ارجسانها طول من ٦٥ الى ٨٠ سم . رؤوسها صغيرة . اعناقها قصيرة . مناقبها جالسة . مبطلة . عندها اذناك العليا الشارفة المبرودة الخواي . اجتمعتها بجاذبية الشكل ، حشرقة الريش . اذناها جنداج كاسية || تدثن في اناحيص متتلة السق . اناثها تبيض وتخصن بيضة واحدة نحو اربعة اسابيع || قوتها الاسماك والقشريات .

1٧٢٣٤ - **طَسَنَاجِيَات** Spheniscidae (S).
Spheniscidae (F). Spheniscidae (E).
فصيلة طيور بحرية من طيمات الريش ، كفيات القدم .

طريق خاص
طريق عام
طريقة السنف

1٧٢١٧ - **طَرِيقُ الْجَزْ ، طَرِيقُ السَّحَب** Chemin de halage (F). Towing-path (E).
هي الطريق المعدة حذاء النهر او القناة الصالحة للاحلا والى يجوز استعمالها لجر المراكب او سمحها .

1٧٢١٨ - **طَرِيقُ رِيفِيَّة** Chemin rural (F).
Rural road (E).
كل طريق في الريف تربط التساكر والقرى ببعضها بعض .

1٧٢١٩ - **طَرِيقُ زَوَاعِيَّة** Chemin agricole (F).
Agricultural road (E).
كل طريق يمر بين الاراضي الزراعية او تربطها ببعضها بعض .

1٧٢٢٠ - **طَرِيقَة ، مَتَهَج** Méthode (F).
Method (E).
هي الاسلوب المقروض اتباعه في تيج معين . كقولك طريقة الاشتار والاستغلال او العمل .

1٧٢٢١ - **طَرِيقَةُ الْخَدَف** Méthode de réduction (F). Method by reduction (E).

1٧٢٢٢ - **طَرِيقَةُ سِخِيَّة** Méthode sexagésimale (F). Sexagesimal method (E).

1٧٢٢٣ - **طَرِيقَةُ عَشْرِيَّة** Système décimal (F).
Decimal system (E).

1٧٢٢٤ - **طَرِيقَةُ مِترِيَّة** Système métrique (F).
Metric system (E).
هي طريقة لقياسات المترية .

1٧٢٢٥ - **طَرِيم** Armillaria mellea, Armillariella mellea, Agaricus melleus, Rhizomorpha inaequalis, R. subcorticalis, R. fragilis (S). Armillaire de miel, Pourridié-agric (F). Root-rot honey agaric (E). Hallimasch (D).
نظير من الفاريتويات موطنه فسج الارباه و مركب الجنود ليؤتيا . يصيب من الاثمار الحرجية السديان والزارع والقمح والبرغل والحوو والاكسبا والسورير والتوب والارويس . ويصيب من الاثمار المشرة الكركية والحوو والمشمش والدراق والكرز والتفاح والاجاص والجوز والحشيشات على اختلافها ثم للوز والقرن والين والشاي والكاكاو والكتينا والمطاط . ويصيب ايضاً بعض النباتات الزراعية والزرينية كالطماط والتفاح والجزر والاضاليا والبرجس والوزام || مظهره الخارجي في دوره الفطري الصحيح : ظر طويل الساق النعيلة الاسطوانية ، اسوسته قلنسوة الشكل ، دقيقة الحافة المنكسرة الى الداخل ، قشرها نحو ٥ سم . قوتها اصفر صلي يعلو مروج زيني . لبايه جابه المنطق ، ابيض اللون مر المزاق . وهو من الفطور المأكولة . مردودته تهب مع الال || يظهر في الخريف ويوم حتى اوائل الشتاء . مركب المواد العضوية والخشبية المنحلة على الجنوع والاشخاب المطروسة ارضاً || وهو في دوره المشيجي يتنبت بمرق مفطنة خفية الاطراف قشرها نحو ١٢ م . لونها الى البسرة ، تغلق من خيوط كثيفة مستطيلة تسرح في التربة المسطحة الى ان تلتفي



طريم



طسان المسك



طسناج

1٧٢٤٣ - طَعْمَةٌ Agraine, Aregne (F).

نثر الحب في مواضع معينة لتجسس عليه الطير فصاد.

1٧٢٤٤ - طَعْنٌ ، وَجُوعٌ ، إِنْجِيَاءٌ Recours (F).

Recours (F).

هي الانتباه الى السلطة المصولة على الفاء حكم أو تمديله

أو تفسيره أو إعادة بحثه.

1٧٢٤٥ - طَعْنُ الشُّهْرُدِ Reproche de témoins (F).

Objection of witness (E).

وسيلة يتلوه بها أحد المتخاصمين ليلجسده شهادة شخص

مبين .

1٧٢٤٦ - طَعَامٌ اِرْذَالُ الطَّيْرِ وَالسَّيَّاحِ .

1٧٢٤٧ - طَعْرٌ

الطَّيْرُ طَائِرٌ . ج طَرَانٌ (السَّانِ) .

1٧٢٤٨ - طَعْمُوسٌ Gorilla (F).

هو النورل ، اطلبا .

1٧٢٤٩ - طَعْمُوسٌ مُعْتَمِيَةٌ * ، سَمْبَلُورَةٌ

مُحْتَمِسَةٌ

Cymbalophora pudica (S). Cymbalophora pudica (F). Cymbalophora pudica (E).

حشرة من فصيلة الحريدات وريقة حرشيات الاجنحة .

موطنها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط .

لرأسها جارية قوتها رحيق الازهار . مرتبتها غاشية قوتها

صفت التنجيبات || جسمها متوسط لقدم بطول نحو ١٧ م .

بسطها نحو ٤٤ م . رأسها غلوري الشكل ، عيناها

كبرتان ياقوتيتان . زباناها مشطيان . مؤنثها مستطيل

جيشها حطلي اللون . يملأ الى الخلفي الاخر المراج ||

روشناها الاسمان الى البياض التي يملو بضيغ ويجمع

كسني . روشناها الخلفيان الى البياض الوريدي المراج

يملو تقيج كسني || لها جبل واحد في الحول . تظهر

لقراشة في حزيران ويثي حتى آب . تسرح في الليل .

تماثل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتتمتع الممكن على

الصفحات السفلى من لصال الارواق || السرعة تطول نحو

٣٠ م . جسمها انوبيو الشكل ، اريد اللون ، اسر المراج

تطلو مجموعات متفرقة من الحلب الاسود الانتساب ،

الخلفي الاطراف . رأسها اسود . معها ودأجها الى

البرادي || طسود الاكمال يتسرح نحو اربعة اسابيع

ويتقضي ضمن صلبة تحببها السرعة في شقوق الحاء أو

تحت القشور .

1٧٢٥٠ - طَفٌّ ، طِفْلَافٌ ، طَفَّاحَةٌ

Excédent de mesure (F).

1٧٢٥١ - طَفٌّ

الطَفٌّ هو سفح الجبل وساحل البحر ج طفون .

1٧٢٥٢ - طَفَّا Emerger (F). To emerge (E).

برز على سطح الماء .

1٧٢٥٣ - طَفْكُرٌ * ، طَفِّي الوَعْرُ

Oreotragus salator (S). Oreotragus sauteur (F).

Klppbok, Klppspringer (E).

حيوان لين يجتر من الطاء وحيد الجنس والزوج . موطنه

يمتد من الحيفة الى كنيه وارغندا وروديزه . يأنف

اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة العدد ، اطلاتها القلبي
الجنوبي || ملجتها الحلياني جماعي تمشي معظم حياتها في
الماء ولا تألف الجزر الا في زمن التساقط والترسيم ||
قوتها الاسماك والقشريات || اشهر اجناسها الطغناج .

1٧٢٥٥ - طَبِيخَةُ الشَّكَّان * ، نَارِيَّةٌ شَهِيَاءٌ

Cryptoblabes gidiella (S).

Pyrale grise, Cryptoblabes polyphage (F).

Cryptoblabes gidiella (E).

حشرة صغيرة من فصيلة التارويات حرشيات الاجنحة .

موطنها بعض المناطق الشرقية من حوض البحر الابيض

المتوسط . تألف يساتين الليمون وسنات الدراق والموز التي

يكثر فيها الشكَّان ، فراشتها عجيبة تمشي على غزونها

الاسمانى . مرتبها ناعمة تمشي على بشرة ثمار البرتقال وصل

اوراك الدراق والكرية والمكثان || جسمها صغير خفيف

بطول نحو ٤ م . بسطها تراوح من ١١ الى ١٣ م . رأسها

معتدل الجرم ، قصير الخطم . عيناها كبرتان ، ناضرتان .

زباناها خيطيان . ملساها دقيقان . مؤنثها جعدة .

جيشها وبعثا الى الشبهة || روشنها الى الشبهة يملوها

مواج ثبتي وسار اسر || لها جيلان في الحول . تظهر

قراشة الجيل الاول في ايار وقراشة الجيل الثاني في آب .

تسرح في الليل وتبيت في النهار || السرعة ، عنه بلونها

الادراك الشام ، تطول نحو ١٠ م . جسمها شبه اسطواني

الشكل ، مستطيل القدم والمخسر . ثوبا الى السرعة الجلوية

المراج يملوها عطان جالبيان ، قاطبان ، شديدا السرعة .

رأسها اسود . معها ودأجها الى الخلفي الاسر || طرد

الاكمال في الجيل الاول يتسرح نحو ١٥ يوما ويتسرح

في الجيل الثاني نحو ٢٨ اسبوعا ويتقضي ضمن صلبة

تلتجها السرعة بين شقوق الحاء أو تحت القشور .

1٧٢٣٦ - طَعَامُ الْأَرْبَبِ Phagnale (F).

هو الطي ، اطلبه .

1٧٢٣٧ - طَعْمُورٌ * Tolposporium (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفاروجيات . ينمو

البوية لاقامية الشكل والحلم . طياله حشيدة لامتجانسة

تغلغل عنه بلونها من غيرات جابية لونها الى السرعة

القائمة .

1٧٢٣٨ - طَعْمٌ Golt (F). Taste (E).

هو ما يؤذيه الترق من تصنيف لكل ما يدخل الفم .

1٧٢٣٩ - طَعْمٌ Appét (F). Bate (E).

كل ما يوضع من طعام لاجتناب الصيد من طير أو سمك

أو سموش .

1٧٢٤٠ - طَعْمٌ ، طَعْمُورٌ ، طَعْمٌ ، طَعْمٌ ، طَعْمٌ

Greffon (F). Graft (E).

هو جزء النبات المطلوب تكثيره واصلد للانضمام بالملمد .

1٧٢٤١ - طَعْمُ الْمَرْدُوعِ ، نَطْلٌ

Golt de terroir (F). Native tang (of wine), Raciness

(of style) (E).

علم خاص ، يعود الى التربة والموقع ، يكون في بعض

الحاصلات كالنبيذ والنبي وما اشبه .

1٧٢٤٢ - طَعْمَةٌ Production (F). Product (E).

هي ما نتج من محصول .



طَبِيخَةُ الشَّكَّان



طَفْمُوسَةٌ مُعْتَمِسَةٌ



طَفَار

Hydrargyris (F). **طَفَّيَة زَيْبِي**
Hydrargyris (E). تسم بالزئبق .

١٧٢٦٣ - **طَفَّيَة وَرْدِي**

هو الحامى مرض جلدي ، اطلبه .

١٧٢٦٤ - **طَفَّارُ التَّلَج** Electrophanes nivalls (S).
Electrophane des neiges (F).

طائر من الجوارح غرومليات المناقر وضفلة الاثني عشر ريش . موطنه يمتد من بلاد القطب الشمالي الى حوض البحر الابيض المتوسط ذلك لانه من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الرزق والمصيف والشتى . سلجته الحياتي جماعي . انواجه تدم بضعة الاف . قوته البرزور والحشرات || جسمه صغير النقد بطول من ١٧ الى ١٩ سم . ثوبه الشتوي يكثر فيه البياض وتقل فيه الشقعة والسمرة . ثوبه الصيفي يبقى حل البياض الصنابي الموج في الزور والصدر والبطن والاذنيك . اما الرأس والحشران والرداء والسفطان والذنب فال الشقعة المتباينة الماجات والمطوكة بالابيض . سقطا ذلقان . ذنبه فارق الطرف || يدخن حشاه بين الحماة وفي مخاليط الصخور . الاثني تسع من ه الى ٩ يبيضات تحضنها بمثابة الذكر نحو ١٢ يوما .

١٧٢٦٥ - **طَفَّرَة** Mutation
تبدل فيها يحصل في وثل وسدة وراثية . راجع انتباه وشرود .

١٧٢٦٦ - **طَفَّل** زين احمر الشمس قبيل الغروب .

١٧٢٦٧ - **طَفَّل** Argile (F).
هو الصلصال ، اطلبه .

١٧٢٦٨ - **طَفَّل** Tendre, soyeux (F).
Tender, Silky (E).
الطفل : الرغص الناعم من كل شيء . ج طفل ومقول .

١٧٢٦٩ - **طَفَّلِي** Cotylédon (F), Cotyledon (E).
هو الاشران نبات عشبي ، اطلبه .

١٧٢٧٠ - **طَفَّو ، طَفَّو** Emersion

١٧٢٧١ - **طَفَّوَة** Herbe tendre (F).
Tender herb (E).
الطفوة : النبات الرقيق .

١٧٢٧٢ - **طَفَّي** Paralique (F), Paralic (E).
تتم تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالطن اي ببال البحر .

١٧٢٧٣ - **طَفَّيَة** Echis (S), Echis
جنس سياث خبيثة من فصيلة الافاعي الانوبيات الاعايد . انواها حديثة جميعها من افاعي البلاد الحارة . طولها نحو ٧٠ سم . ثوبا الى الصبغة السوداء مملو رشة بياض وخطان اسودان اود ابيضان متعرجان . وبعضها حنلي الثوب الابيض ، مطروق البق || اشهر انواها الطففة الحرة وام الطفيتين ومقد الجرؤ والأردب .

الجناد الرقبة التي تملو من ٤٤٠٠ الى ٢٧٠٠ م . من سلج البحر . سلجته الحياتي جماعي . إجله يتألف من ثلاث الى اربع اناث ومن ثلاثة الى اربعة شوارب يقودها ذكر مانع . قوته اوراق السط والاعشاب المختلفة . يسرح في طلب اللقوت من الفجر الى الساعة التاسعة ومن العصر الى العشاء ولا يرتاد الماء الا ابد العشاء . سمه طفر وسداه || جسمه قريب الشبه من الشموه ومن الرم . طوله نحو ٨٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٨ سم . ارتفاعه نحو ٥٦ سم . وطول قرن الذكر نحو ١٠ سم . اما الانثى فحياء واسم مستعرض الجبهة صغير الخطم . اذناه متصتان . عيناه كبيرتان كسكتين . قرنا غرومليات جبالان . جماريه السمعية جليلة الرافض . جرمزه شديدة التشط . ثوبه يتغير مع فصل السنة الا ان القرن السائد هو الصبغة الموشة بالاسود . بطنه دائما ثني القرن احمر الموج || الاثني تسع يثوب الذكر وبني ثنائية الخلف . تسع شادنا واحدا ترصعه نحو ثلاثة اشهر .



طَفَّارَة

١٧٢٤١ - **طَفَّارَة** Zamenis (S), Zamenis
جنس سياث من الثعابين . انواها حديثة منتشرة في جميع البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها طولها دقائق تطفر بين المسنور وورق الرمال وفي الماء . اطولها تراوح من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . قوتها الاسماك والضفادع والوزغ والسماء . الخ .

١٧٢٥٥ - **طَفَّارَة** Podocnemis (S).
Podocnémié (F), Podocnemis (E).

جنس سلاحف مائية من فصيلة الخفاشيات . انواها المعروفة عشرة . اعطانها بعض مناطق امريكا الجنوبية وجزيرة مفسكر . تألف الاثر والبيمرات والفردان والناقص || اجسامها متباينة الحجم ، منها الصغيرة والوسى والكبيرة . الصغيرة تطول نحو ٣٠ سم . اما الكبيرة فتطول من ٧٥ الى ٩٠ سم . انواها الى الكلبة السوداء . ذبالها سمكية . قليلة الاحديداد . بيضه الشوزن . زعافها منبسطة ملحقة بغير الدبال . رؤوسها مكرسة . اعناقها متوصلة الطول والغلاظة . اخذائها قصيرة . قوائمها شديدة التشط . خمسة الخالب الامامية ، رباعية الخلفية .

١٧٢٥٦ - **طَفَّارَة** Parélie, Parhélie (F).
Parhelion, Mock sun (E).
الطغالة صورة الشمس متمسكة في سحابة .

١٧٢٥٧ - **طَفَّارَة** Immaturité (F).
Immaturity (E).
حالة الشيء غير الناضج . المذاق الحامز في منظم الجار دليل الطغالة .

١٧٢٥٨ - **طَفَّارَة** Cerne (F), Ring (E).
الدائرة الطاغرة في مقطع جذع الشجرة .

١٧٢٥٩ - **طَفَّي** Lave (F), Lava (E).
طفع ج . طلوح . هي حم المادن المصهورة اللبنة التي يندف بها البركان عند ثورانها .

١٧٢٦٠ - **طَفَّي** Débordement (F).
Overflowing (E).
سيلان الماء خارج مجراه .

١٧٢٦١ - **طَفَّي النَّوْ** هو البثار ، اطلبه .



طَفَّيَة

١٧٢٧١ - طَفْسُوس Taxus (S). W (F). Yew (E).

جنس اشجار حرجية من الطفسوسيات الصنوبريات . يقال لها تمر نحو ٣٠٠٠ سنة . انواعه وضروبه عديدة . اشجارها متفاوتة القدر تمل من ٥ الى ١٥ م . اغصانها وفروعها منتصبه تقبل التشذيب والتقليم . اوراقها متعابله ، ثنائية الصف ، شديدة الخضار المابقي ، لامة الصفرة العليا ، وهي جميلة للملدة تبيت الناس والجن والليل ويزكي البقر والماعز والضان . ثمارها عتية الشكل ، حمية الحجم ، حادة المزة ، قوية اللدغ والظرب ، لونها في المازرة المستبنة بالاسمر . شكرها ابيض اللون قابل البسكة .



طفة حرة

١٧٢٧٢ - طَفْسُوس عَادِي Taxus baccata (S). Il commun (F). Common yew.

Yew tree (E). Echte Eibe, Venbaum, Ebenbaum (D). Tasso, Libo, Livo, Albero della morte (I).
نوع من الطفسوس المبلدة غيرة تمل من ١٢ الى ١٥ م . ضروبه عديدة جميعها بطيئة النمو الا انها تخضع لختلط طرائق التشذيب الذي يجعل منها شئ الاشكال الممكن انسجاما مع الطرف والمكان .



طق احمر للمقاد

١٧٢٧٣ - طَفْسُوسِي Taxineés, Taxodinéés (F).

سبط من فصيلة الصنوبريات يشمل الطفسوس والطوق واللفش والسيليك .

١٧٢٧٤ - طَفْقُ Chettusia (S).

Chétusia, Chétusie (F).
جنس طير من طوال الباق وضيعة الزنزايات . انواعه نحو ١٥ جميعها من القواطع تجوب البلاد في طلب الرزق وللصيف والمشي وقد تكثر الاقلام في البلاد الحارة . اجسامها صغيرة القد ، رشيقة القوام ، اناها صغيرة . ظهورها وابجنبها الى البصرة . بطونها الى الياض || تألف المناقع ويجاري الماء والمروج النناء . قوتها الحوام والخشرات والقشريات . تكثر في المناقع بين الاعشاب . الانثى تحضن وسعدا نحو ٤ بيضات .



طفسوس عادي

١٧٢٧٥ - طَفْطُ Toxus (S). Tock (F). Tockus (E).

جنس طير من فصيلة الاركرويات . انواعه قليلة البند ، جميعها من الطيور الافريقية . اجسامها كبيرة القد . متابعها غليظة وحمية . مسنة الطفا ، تتميز بجلوها من التندوات القرنية || يألف الصيص والقنابات والاحراج . قوته الثار والمربور والبلور والخشرات والظاء والفئران || اعرف انواعه الملق بالاحمر المتقاد .

١٧٢٧٦ - طَفْطُ Toxus erythrorhynchus (S).

Tockus erythrorhynchus (S).
Tock à bec rouge (F).
نوع من الطن . اسنانه تمتد من الحيشة الى السنان . جسسه كبير القد بطول نحو ٨٥ سم . متقاد غليظ القاعدة مقوس الشكل ، مسن طفاظ المخطم الاصل ، احمر اللون . اسمر الملقط || يألف الفياض ومغاث الاثر . طيرانه يميده المدى متقطع الشوط كالنقار || قوته الثار والبلور والخشرات والورع والظاء والفئران || يذئ في تجاويف الجلود . تقع الاثني من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها نحو ١٥ يوماً محجور عليها بالطين والقش على غرار البوير والخنو .



طنطقة

١٧٢٧٧ - طَفْطُ Toxus erythrorhynchus (S).

Tockus erythrorhynchus (S).
Tock à bec rouge (F).
نوع من الطن . اسنانه تمتد من الحيشة الى السنان . جسسه كبير القد بطول نحو ٨٥ سم . متقاد غليظ القاعدة مقوس الشكل ، مسن طفاظ المخطم الاصل ، احمر اللون . اسمر الملقط || يألف الفياض ومغاث الاثر . طيرانه يميده المدى متقطع الشوط كالنقار || قوته الثار والبلور والخشرات والورع والظاء والفئران || يذئ في تجاويف الجلود . تقع الاثني من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها نحو ١٥ يوماً محجور عليها بالطين والقش على غرار البوير والخنو .

١٧٢٧٨ - طَفْطُ Toxus erythrorhynchus (S).

Tockus erythrorhynchus (S).
Tock à bec rouge (F).
نوع من الطن . اسنانه تمتد من الحيشة الى السنان . جسسه كبير القد بطول نحو ٨٥ سم . متقاد غليظ القاعدة مقوس الشكل ، مسن طفاظ المخطم الاصل ، احمر اللون . اسمر الملقط || يألف الفياض ومغاث الاثر . طيرانه يميده المدى متقطع الشوط كالنقار || قوته الثار والبلور والخشرات والورع والظاء والفئران || يذئ في تجاويف الجلود . تقع الاثني من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها نحو ١٥ يوماً محجور عليها بالطين والقش على غرار البوير والخنو .

١٧٢٧٩ - طَفْطُ Toxus erythrorhynchus (S).

Tockus erythrorhynchus (S).
Tock à bec rouge (F).
نوع من الطن . اسنانه تمتد من الحيشة الى السنان . جسسه كبير القد بطول نحو ٨٥ سم . متقاد غليظ القاعدة مقوس الشكل ، مسن طفاظ المخطم الاصل ، احمر اللون . اسمر الملقط || يألف الفياض ومغاث الاثر . طيرانه يميده المدى متقطع الشوط كالنقار || قوته الثار والبلور والخشرات والورع والظاء والفئران || يذئ في تجاويف الجلود . تقع الاثني من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها نحو ١٥ يوماً محجور عليها بالطين والقش على غرار البوير والخنو .

Ixodes reduvius, * طَلَح اللَوَاشِي ١٧٣٠٧
Hyalomma aegyptium (S). Tiquet du bétail, Réduve (F).

نوع من الطلح الاسمر، المبطط، البيضي الشكل، الصنبر القند. الذكر منه بطول نحو ٤ سم. والانثى تطول نحو ١٨ || يتطفل على جميع اللوامي اغصنها الابقار والاعنام والجمال.

Ixodidae (S). طَلَحِيَّات ١٧٣٠٨
Ixodidae (F). Ixodidae (E).

فصيلة حشرات من القتراديات قوتها الدم تجتمع حيث تستطيع اجسادها وانواعها عديدة، جميعها صنبرة القند. ذكرها اصفر جسمها من اناتها. تتميز باخطائها ثنائية الماسة النشارية التركيب التي تشيخ في اجسام الموال التي تركبها. لذلك يصعب زرع الطلح من عائله دون فصل جسمه حيث يبقى الرأس مع اجزاء الدم في جلد المائل.

١٧٣٠٩ - طَلَح
الطلح: ما بي في الحوض والتدير من ماء كثرت فيه النعاميس لا سبيل الى شربه.

١٧٣١٠ - طَلَحَام هو القتل في ذروة باسه ونشاطه.

١٧٣١١ - طَلَسَة Botrytis

جنس فطور مجهرية من الطليسات. واصله الواطحات. يتميز بمشجيه المزهور الاسطواني الشكل، القليل القطر، اخلاوي او السطحي الانتشاح. جبراه الكندي منتصب الجليس، عديد الفروع العمودية الاوتكاز. كنانته طرفية، حنقوية او ضمية التجميع، يضيء الشكل، نحلة الثلاث، وحيدة او ثنائية الخلية || انواعه كثيرة العدد اعرفها واشهرها ما يتبع.

١٧٣١٢ - طَلَسَة البَصَل Botrytis squamosa (S).

فطر مجهرية يركب اوراق البصل فيسبب يبأس اطرافها بعد اغتطاف لونها || يكافح باستعمال بيسلفيت الكلسيوم.

١٧٣١٣ - طَلَسَة التوليب Botrytis tulipae (S).

فطر مجهرية يركب اوراق التوليب فيؤذيها وقد يصيب السمرخ الزهري فيعطيه || مظهره المخارجي يقع صنبرة شبه مستديرة ومادية اللون تركيب التصلب قسبي جفاف نسبه المتحارة || وهو حل السمرخ الزهري لطخ صنبرة عديدة تشبه الازهار بعد ان تسي الى مجام || يكافح حته ظهوره باستعمال بيسلفيت الكلسيوم وبطبخير التربة بالكلورين.

١٧٣١٤ - طَلَسَة الثوم Botrytis alli (S).

فطر مجهرية يمتري الثوم والبصل في اثناء صفحتها. مظهره المخارجي وشاح كيندي له التجميع، خلي الحية، اغبر اللون، يركب اقراص الثوم والبصل فيفنها || يدارك باحتساب حفظ الثوم والبصل في الامكان الرطبة.

١٧٣١٥ - طَلَسَة الدَمِيكة Botrytis galanthina (S).

فطر مجهرية يركب الدميكة عند انشائها من التربة فيقتلعها ويؤاح اغبر اللون ندي الشكل يسيطر على الازراق فيقرسها بعد ان يؤتمها ببشوره السود الكثيفة.

Chênevis (F). طَلَام ، قُنْبُر ١٧٣١٣
هو التمر اي حب الشاهدانج.

Prodromes طَلَاك ١٧٣١٤
هي الاعراض التي تسبق المرض وتشير اليه.

١٧٣١٥ - طَلَاك هي التواكير، الملبا.

١٧٣١٦ - طَلَب ، عَرِيضَة ، اِنْعِياس Requête (F). Requête (E).

هو كل مطلب يقدمه صاحبه الى سلطة تملك حق النظر بفضيته واجراء اللازم.

١٧٣١٧ - طَلَب ، دَعْوَى Demande (F). Demande (E).

هو ما يرمسه البارز حل المحكمة رايياً بقراره ويقرر وجود حق له. ويأتي بمعنى الدعوى تيمناً.

١٧٣١٨ - طَلَب اِلْنْعَاء Recours en annulation (F). Petition for annulment (E).

هو طلب إلغاء حل اداري.

١٧٣١٩ - طَلَب اِعَادَة النَظَر في القَضِيَة Pourvoi en révision (F). Petition for rehearing (E).

هو طلب اعادة النظر في بعض القواعد القانونية لثبتي من مصها او في بعض الاحكام لانها.

١٧٣٢٠ - طَلَب قَبُول اِلْنْعِياس Recision (F). Recision (E).

دعوى غايها نقض الحكم دون الانفاذ الى موضوع الدعوى التي صدر عنها.

١٧٣٢١ - طَلَب مَا فَرَّقَ الْحَقَّ Plus petit, Ultra petit (F).

هو الحكم ينير مطالب الجسم كان يحكم القاضي بشيء لم يطلب منه او بشيء يزيد عما طلبه منه.

١٧٣٢٢ - طَلَب نَقْض الْحَكْم Pourvoi en cassation (F). Appeal for reversal of judgment (E).

هو الطلب بابطال حكم، صدر من محكمة الدرجة الابتدائية، طعن فيه.

١٧٣٢٣ - طَلَّة Arôme agréable (F).

الطلة: الذئبة من الروائح. يقال رائحة طلة وخر طلة.

١٧٣٢٤ - طَلَح Agresable aroma (E).

هو السط الصنفي، شجر من المضاء يرماعها الايل. الواسدة طلحة.

١٧٣٢٥ - طَلَح brodes (S). brode (F).

جس قراد من فصيلة الطليحات قوته الدم الذي يمتصه من الحيوان || انهر انواعه طللح اللوامي وطلح الكلاب.

١٧٣٢٦ - طَلَح الكَلَاب brodes ricinus (S). Tique des chiens, Pou des bois (F).

نوع من الطللح البطل الصغير القند. الذكر منه يطول نحو ٢ سم. والانثى تطول نحو ٩ سم || يتطفل على معظم الحيوانات الوحشية والداجنة اغصنها الكلاب والحيترات فيمتص دمها ويؤذيها.



طلح الكلاب



طلح اللوامي



طلة البصل



طلة التوليب



طلة الثوم

متة: البيوض، الملقة، البغاس، البغية، التفاتيريك، التنية.

١٧٣١٦ - ملقة الزئبق *

Botrytis elliptica (S).

فطر مجهرى يركب بعض انواع الزئبق فيسبب يفسد اوراقها بعد ان يوشم نصلها يقع حبة لاثلية الشكل والتجميع || يكافئ باستعمال بيليفيت الكليوم .

Botrytis fabae (S).

١٧٣١٧ -

ملقة الفول *

فطر مجهرى يركب اوراق الفول وفيه يسبب الاضرار والقرن || مظهره الخارجى نقط مبرشة مستديرة سمراء اللون تركب النصل على صفحتي ثم تتسع فيبلغ طولها من ١٠ الى ١٥ سم. بعد ان ينصرف لونها الى الرمادي الزاهي تملأه حالات متناوبة سمراء الملاج || وهو على القرن يقع متصل او متراكبة تطفل القشرة السنوية تصطبها وتبدلها || يكافئ عند ظهوره باستعمال احد الفوطاير الحديثة . ومن المستحسن انتاج الدورة الزراعية الثلاثية التي تقضي عليه غلغول التربة من الحمايل .

Botrytis infestans (S).

١٧٣١٨ -

ملقة القنب *

فطر مجهرى يركب سوق القنب عند شتمها وعلمها من الةربة فيلونها بمرسة || مظهره الخارجى لطنة سمراء عرضها نحو ١ سم. تلوق الساق تصطبها وتيبس يفساه مع اوراقها وازهارها || لا يستوجب المكافحة لانه عدم النباتات قليل الانتشار.

Botrytis trifolii (S).

١٧٣١٩ -

ملقة النفل *

فطر مجهرى يركب النفل في سقه واوراقه || مظهره الخارجى يقع صغيرة مبرشة مستديرة سمراء اللون تملأ السوق والاوراق فتدبب جفاف النبات .

Botrytis paeoniae (S).

١٧٣٢٠ -

ملقة الورع *

فطر مجهرى يسبب الورع وزئبق الوادي . مظهره الخارجى يقع لاثلية الشكل والحجم تركب الاوراق والسوق والزيمات . تبدو على النصل يقع صغيرة حمراء اللون ثم تتسع وتتحرف نحو السرة يقابلها على الصفحة السفلى يقع مرادية خلية ليدة || يكافئ باستعمال بيليفيت الكليوم المركز ١٪

Botrytis cinerea (S).

١٧٣٢١ -

ملقة رمادية *

فطر مجهرى عيب الانتشار يركب جميع المواد النباتية النضجة او السالطة الى الاغسل . كما يركب نباتات المصاري والمشاتل الكثيفة || مظهره الخارجى نولس خيل متكورى لاجل اللون .

Catananthe coerulea (S).

١٧٣٢٢ -

ملقة سمية *

هذه بته زرقاء *Catananthe coerulea* (S). *Catananthe*, *Cupidone* (E). *Rasselblume*, *Blau Rasselblume* (D). *Cupidone*, *Belvedere turchino*, *Madra d'amore* (I).

نبات عشبي بري مصر مبدل من فصيلة المركبات . كان يستعمل في كتابة طلاس الحب والبنفس . ساقه دقيقة رماء تلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. اوراقه ضيقة مستطيلة . منظرها قرصي الانتشار . طولها يراوح بين ٢٠ و ٣٠ سم. نصلها ثلاثى المروق ثنائى او رباعى التفصيص . خيل الصفحة السفلى . ازهاره روبيى، فردى التجميع . ازهاره الى الزرقاة || تنوره يستر من تموز الى ايلول .

Botrytides (S).

١٧٣٢٣ -

ملقة سمية *

Botrytides (F). *Botrytides* (E).

عامة تلود مجهرية من فصيلة الطليقيات . اجنحتها

Collia (S).

١٧٣٢٤ -

ملقة طليقي *

Collia (F). *Collia* (E).

طليقي هو الاسم الهندى . جنس سماك مجرية ونهرية من مغتصات الشاة وفصيلة الصابونيات . انواعها المعروفة سبعة اعطتها احوار اهر الهند || اجسامها مدوية الشكل ، معتدلة التيطوط ، طولها من ٢٠ الى ٣٠ سم. اشداها كبيرة ، وحية الانقراج . زعانفها الظهرية صغيرة ، الصدرية مستطيلة حسانية الشكل . الشرجية ضخمة ، مستطيلة ، تمتد حتى طرف الذيل . اذنها الى الزرقاة انغمراء الموج . بطونها الى الصغار الملعب || لحونها مأكولة ، جيدة الصنف .

Pollen

١٧٣٢٥ -

ملقة ، وكبج

هو الصلح ، امله .

Spadice (F). *Spadice* (E).

١٧٣٢٦ -

ملقة ، حبة

شكل من اشكال الازهار مركب من محور يحمل ازهاراً لاطة وسيدة الشق ، مثاله ازهار النخل .

Pollinique (F).

١٧٣٢٧ -

ملقة ، وكبي

Pollinic (E).

نمت تحريفي يطلق على كل ما هو مختص بالطلع كالجبوب والانايب الطلمية .

Talc

١٧٣٢٨ -

ملقة

Mica

١٧٣٢٩ -

ملقة ، ميكا

صوانة الالومين والبيتاس والحديد والمغنيزية . وهو احد الاجسام التي يتألف منها الفرائيت اي الاحبل .

Micaschie (F).

١٧٣٣٠ -

ملقة منقطة ، ميكا شيت

هو ما حوى الطلق والحجر للنفس اي الشيت .

Nuage peu épais (F).

١٧٣٣١ -

ملقة ، طنة

المله ما وق من السحاب .

Botryosporium

١٧٣٣٢ -

ملقة سمية

جنس تلود مجهرية من الماصريات وفصيلة الطليقيات . ازهاره قليلة العدد والاى . منظرها ربية تركب النباتات السقية الخريضة من التنبليات الى اشجار الحمزية .

Faon (F). *Fawn* (E).

١٧٣٣٣ -

ملقة

الط : ولد التليج ع املاء .

Tache, Souillure (F).

١٧٣٣٤ -

ملقة

Simear, Dirt (E).

١٧٣٣٥ -

ملقة ، طليق

هو الكنه اي الاعى خلفه .

Astisque (F).

١٧٣٣٦ -

ملقة ، متعرك

Astade (E).

ما كان بجالة الاثران المتداد للمستر

Nidifuge (F).

١٧٣٣٧ -

ملقة

نمت تحريفي يطلق على فراح الجبل التي تنف نشطة كاسية تصطب الاستغناء من ايوها .



ملقة الزئبق



ملقة الفول



ملقة الورع



ملقة



ملقة

١٧٣٤٨ - **طُومُور** * Tomocerus (S).

Tomocère (F). Tomocerus (E).
جنس حشرات قافزة دامت من فصيلة الطوموريات.
أنواعه المروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد
المتلة الحارة || أجسامها صغيرة محرشقة تعلو من ٤
إلى ٥ سم. ألوانها إلى الخفي المتباين الماجات. حراشفها
إلى السرة المابتة الغضبية المواج. بطونها لامتناهية التريجات
ميشرة الحلب التي يكثر في المخر || أشهر أنواعه
الطومور الجبل (Tomocerus vulgaris) الذي يتم
تحت الحجارة والاشخاب ولها الأجنار الباسية .

١٧٣٤٩ - **طُومُورِيَّات** * Tomoceridae (S).

Tomoceridae (F). Tomoceridae (E).
فصيلة حشرات قافزة دامت من رتبة النكهدليات . أجناسها
وأنواعها المروفة قليلة العدد منتشرة في بعض أقطار البلاد
المتلة الحارة || أجسامها صغيرة ، محرشقة ، تعلو من
٢ إلى ٦ سم. ألوانها ملونة ، يكثر فيها الخضاب السوي .
رؤوسها مستعصقة . أفاكها وثاقيرها ناشرة . عيونها زنجية .
قرونها الاستشعارية رباعية الفصص ، مستطيلة . بطونها
سداسية السكبي اللامتناهية المرض . أجنارها القفزية
نشطة وسليمة بمناسج حادة . مكائرها مستطيلة مدبنة
ومهدبة . قوائمها متتلة العلول تنتهي بأظافر حادة ||
أشهر أجناسها الطومور .

١٧٣٥٠ - **طِيلَم** Boue (F).

Loup (F). ١٧٣٥١ - **طِيلَال**
هو الذئب ، أظله .

١٧٣٥٢ - **طِيلَكَة ، طِيلَكَة** Eau bourbause (F).

Muddy water (E). ما يثي في المرض من الماء الكثر .

١٧٣٥٣ - **طِيلُول** Inerma (F). Thornless (E).

الطلول هو الماري . وهو من النبات ما كان سرساً أصلأ
لا زنب عليه .

١٧٣٥٤ - **طِيلَم** طم وتطم الطائر : وقع على فشن .

١٧٣٥٥ - **طِيلَم** الطين من الأرض : السهل المنخفض .

١٧٣٥٦ - **طِيلِي** Alluvion (F). Alluvium (E).

هو ما يحمله النهر من تراب وطين يتصلق باملاك المتاخين
على أن لا يبلغ قطعة من أرض يضيئها إلى ما بعدها في
سيله أو إلى ما يقابلها . ويعتبر الطلي ملكاً لمن لصق
بأرضه .

١٧٣٥٧ - **طِيلَمِير** * Cryptophyte (F).

Cryptophyte (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينمو تحت سطح التربة .
الكرم من النباتات الطيرة .

١٧٣٥٨ - **طِيلَكَة ، شِيكُو** Gymnocladus (S).

Gymnoclade, Chicot (F).
شجرة حرجية وحيدة الجنس والنوع من العندميات وفصيلة
القرنات || ساقها منتصب ، رفيعة ، عديمة الأنان .
أوراقها صغيرة النصال السنانة الشكل . أزهارها غمرية
كبيرة القند ، بيضاء اللون ، غصاه المواج ، خافتة الورد
الطري . ثمارها حنابل متساكنة تغلف بعض البزور
الأعية المادة .

١٧٣٣٨ - **طَلِيل**

الخصير للنسج من دود أو من سمف .

١٧٣٣٩ - **طَلِيلَس * ، دَلِيلَس** Tellinus (S).

Telline (F).
جنس غار من الرنويات الصفيحيات الخياشم . أنواعه
عديدة جميعها صيرانية الاصقاع تعيش غائرة في رمال
الشلواقي .



طليس

١٧٣٤٠ - **طَلِيلَسِيَّات** * Tellinidae (S).

Tellinidae (F). Tellinidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرنويات صفيحيات الخياشم .
أجناسها وأنواعها المروفة عديدة بعضها من متحجرات
الأراضي الطليانية والبعض الآخر معاصر . موطنها يشمل
معظم جوار العالم باستثناء المناطق القطبية || أصدافها
تتأرجح بين المستديرة والأحليلجية الرقيقة اللون ، جميعها
متصلة القند أو كبيرة . ألوانها جميلة الألوان الزاهية يكثر
فيها الأحمر ومشتقاته || أعرف أجناسها وأشهرها الطليس
والطليغان .

١٧٣٤١ - **طِيم** ما حل وجه الماء من غناه .

١٧٣٤٢ - **طِيَّاطِيم** Tomate (F).

أرجع بتقوة .

١٧٣٤٣ - **طِيَّخ** Rhus à feuilles d'épine (F).

الطبخ شجر يدعى به يحمي أذعه أحر القرن . ويصنع أيضاً
الدرب ، أظله .



طروق ميلول

١٧٣٤٤ - **طِيَّحِر** Ensilage

هو اللقن في الطمورة كلفن الللال والكلاء والساقط
لحفظها مدة من الزمن .

١٧٣٤٥ - **طِيَّحِر ، دَقْن** Enfouissement (F).

Burying (E).
وضع الشيء في التربة وطمرو كالبادو والاصمدة .

١٧٣٤٦ - **طِيَّحِرُون** * Pleocotus (S). Oreillard (F).

جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات . أنواعه عديدة تتميز
بشاذ كبير أذنانها المتدخعة فوق الجبهة . معظم أنواعه
يعيش في البلاد الباردة وبعضها يألف للمناطق المعتدلة .
أهوه الممرقق المبلول .

١٧٣٤٧ - **طِيَّحِرُون عَيْدُول** *

Pleocotus auritus (S). Oreillard commun (F).
نوع من الطمورة موطنه فسيح الأرياء يمتد من آسيا المتتلة
إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقية الشمالية || ثوبه إلى
الردة الحليقة السراء يقيق مع اقترابه من فيج الظهر .
طوله نحو ٨٥ م . يسلط ٢٥٠ م . ذنبه ٤ م . ولذته
٣ م || يألف في الشتاء جميع الموامع القليلة الرطوية
وتعبر للمرسة إلى الرياح الباردة كالبيوت المنفردة والحرية
والكهوف الجنوية المرض . ويألف في الصيف الأشجار
الحرجية النفض والأبراج المنفردة والفاوار الشمالية المرض .
يعيش جماعات قليلة العدد . يعيش على الأرض ويتسلق
الحيطان كما تقبل الثأرة وبرسها . قوة الحوام والذباب
والحشرات الصغيرة المختلفة . مسرعه يقوم من الفسق
حتى فصحة الليل وين الفجر الباكر حتى الشروق .



طسور



طنانة التربة



طنانة الحقائق



طنانة الحراج



طنانة القاع



طنانة حفرة



طننجية

Rejeton (F). طنب ١٧٣٦٩
Shoot, Sprout, Offshoot (E).
الطنب ج أطباب : عروق تنسب من أرومة الشجرة .
Tombereau (F). Tip-cart (E). طنبير ١٧٣٧٠
الطنبر كالمجلة حربة للقلل ذات دلايين .

Thunbergia (S). طنبرجية * ١٧٣٧١
Thunbergia (F). Black eyed susan (E). Thunbergia (D). Thunbergia (I).
جنس نباتات من فصيلة الاقيثيات معقودة التحريف مل اسم الطيب الرحالة السويدي « طنبرج » . انواعها ثمانية منها المشية الحولية ومنها اللقية المأودة المعصرة . اوراتها متعاقبة الارزكاز ، ثلينة او سهمية اتصل . ازهارها كبيرة القد ، زاعية الالوان || اشهر انواعها ما يتبع .

Thunbergiafragrans(S). Thunbergiaodoriférante(F). طنبرجية عطرية ١٧٣٧٢
جنس سرقية حارثة معمرة تملو نحو ١٥٠ سم . اوراتها سهمية صفنة الحافة . ازهارها عاجية اللون ، فواصة العرف السطري . قطرها نحو ٣ سم || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

Thunbergia slata (S). Thunbergia silén (F). طنبرجية متجمعة ١٧٣٧٣
جنس سرقية حارثة معمرة تملو نحو ١٥٠ سم . اوراتها سهمية الشكل شياخلة التستين الضعيف . ازهارها صفراء اللون او برتقالية يملوها في وسطها مزاج اسود تنسج بقعة يضاء || ازهارها يستمر من سوزران الى تشرين الاول .

Thunbergia chrysops (S). Thunbergia dorée (F). طنبرجية صفراء ١٧٣٧٤
سقية سرقية حولية زينة تملو نحو ١٥٠ سم . اوراتها قلية الشكل . كأس زهرها سميكة النسيج ، معقودة الطرف . ثنائياتها يلبسة مهدية ، توحيها بجري الخيش ، يتلاتها ذمية اللون ، ارجوانية المزاج يملوها طوق ازرق . ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

Xiphiidris (S). Xiphiidrie (F). طنبجور ١٧٣٧٥
جنس حشرات من فصيلة الخنثريات . اجسامها اسطوانية الشكل منتشرة في جميع البلاد المعتدلة . اجسامها سوية الالوان طولها يراوح بين ١٠ و ١٦ سم . ارجوانية سوية الالوان ينلب فيها الاسمر والحلي . قرونها الاستشرابية خيشية التركيب ، افقية الانتساب . رواشها ضاغطة كثيرة العروق . مرزات انثائها صغرة القد ذرية || قرونها غاشية تركيب جذوع الانحجار المرجية المائلة اعصابها للث والحور والدرادر .

Xiphiidridae (S). طنبجوريات ١٧٣٧٦
Xiphiidridae (F). Xiphiidridae (E).
فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة الاشرابات . اجسامها وانواعها مديدة تتميز باستدارة رؤوسها واستطالة اعناقها وقصر الجوار انثائها . قرونها غاشية تملو وتزدرب جذوع اللث واليترا والسفنيان والحور والدرادر .

Tanype culiciforme (S). Tanype culiciforme (F). طنبجور ١٧٣٧٧
حشرة من فصيلة المشويات . جسمها قريب الشبه من البعوضة ، يملو نحو ٥ سم . || قرونها الى القلعة الاسراء يملوها ، عند الذكر ، خطان اسودان في الصدر وسعة

Cheval de race (F). طيم ١٧٣٥٩
Botte de roseaux (F). طين ١٧٣٦٠
Bunch of reeds (E).
حزمة القصب . والقصب الواحدة طن .

١٧٣٦١ - طنان
هو الطرلوس ويضي الطائر الطنان والطائر كلاباني .

١٧٣٦٢ - طنانة
Sonométrie (F). Sonometry (E).
الطنانة علم يبحث في مقاييس الاصوات ومقارنتها .

Bombus (S). طنانة ١٧٣٦٣
Bourdon (F). Humble-bee (E).
جنس حشرات ناعمة من فصيلة النحل . انواعها نحو ٢٠٠ موطنها العالم . تتميز باجسامها النطقة الزباد . ارجوانها مديدة الالوان ازاجية المنفصلة ، منها الاصفر والاحمر والاسود والابيض والاصهب والصفاني || قرونها الطلم ورسوق الازهار . وهي من الحشرات الناقصة الفدية لانها تساهم على تأخير الزهر واخصابه || ام انواعها واشهرها ما يلي .

Bombus terrestris (S). * طنانة التربة ١٧٣٦٤
Bourdon terrestris (F).
طولها يراوح بين ٢٥ و ٣٠ سم . رأسها اسود يملو تزيح اسمر وسط اسفر . قرونها سوداء . جوشها والمنفصل الازر . من يبلها الى الصفرة . مفصلاها الثاني والثالث الى السواد اللامع . اما الرابع والخامس فالى البياض الاثير . قرونها سود . عرجها متوسط البدن تقيه في التربة او تحت الشيا . تسرح ابتداء من اواخر ايار .

١٧٣٦٥ - طنانة الحدائق
Bombus hortorum (S). Bourdon des jardins (F).
طولها نحو ٢٥ سم . رأسها اسود يملو تزيح اسمر . جوشها وقرونها والمنفصل الازر من يبلها الى الصفرة . مفصلاها الثاني والثالث الى السواد . اما الرابع والخامس فالى البياض . قرونها سود . عرجها كثير العدد . تسرح ابتداء من نيسان . تألف الحقائق والجنان القرية من الامكان الآهلة .

١٧٣٦٦ - طنانة الحراج
Bombus sylvarum (S). Bourdon des bois (F).
طولها نحو ٢٥ سم . جسمها كثيف الزغب الدقيق الطويل . قرونها الى الصفرة الشفراء . قرونها جوية اللون . عرجها كثير العدد . تسرح ابتداء من ايار . تألف الحراج والنايات الكثيفة الظلة .

١٧٣٦٧ - طنانة الكناك
Bombus lapidarius (S). Bourdon des carrières (F).
طولها نحو ١٦ سم . قرونها الى السواد اللامع . مفصلاها الثلاثة الطرفية الى الحمرة الصنائية . قرونها سمر يملوا زغب احمر . عرجها متوسط البدن تقيه بين الحجارة والصخور . تسرح ابتداء من ايار .

١٧٣٦٨ - طنانة عطرية
Bombus fragrans (S).
Bourdon parfumé (F).
طولها نحو ٢٥ سم . رأسها ويبلها الى الصفرة . جوشها زيتوني . قرونها سود يملوا زغب اشقر . عرجها قليل العدد تقيه في صمغ الانحجار . تسرح ابتداء من ايار .

خاسيا الفصّل. جوشها اصفر من بطنها. بطنها يبيض الشكل. مرزّتها مستقيمة. اجنتها حاملة اللون، مهدبة الاطراف. ثوبها الى البني الاشقر المواج || تربيتها منتشرة في اودية وامريكة.

١٧٢٨٨ - **طشوقشيات** (S). *Trichogrammidæ* (F). *Trichogrammidæ* (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المخصوصة. اجنحتها وانواعها المعروفة قليلة العدد. جميعها نافعة تغطّل على مكن الحشرات من غثفل الفصائل || حشرتها شديدة الصغر تطلو من ١ الى ٢ مم. اجسامها ريمية. جواشها اقصر من بطنها. قرونها الاستشعارية قصيرة، خماسية الفصّل او سباعيتها. ارساغها ثلاثية الفصّل. مرزّتها قصيرة، مستقيمة. اجنتها مهدبة الختار || اشهر انواعها الطنفوش الشارد.

١٧٢٨٩ - **طهاف** (S). *Stratus* هو السديم ضرب من السحاب المرتفع.

١٧٣٩٠ - **طهر، نقاء** (F). *Asepsis* (F). *Asepsis, Aseptic methods* (E). انعدام المواد الغثة او القاسدة التي تنقل الامراض.

١٧٣٩١ - **طهرورج** (S). *Ithaginis* (S). *Ithaginis* (E). *Ithaginis* (F).

جنس طير من الدجائيات وفضلة الطيوريات. انوعه المعروفة خمسة موطنها جبال الهند. ملجأها الحيالي حامي. قربها الاغشاب والحروب والجندابير والحشرات اغصها النمل || اجسامها متوسطة الطول من ٤ الى ٥ سم. انوثها الى الطحلة السراء المتفاوتة الماجات. رؤوسها صغيرة متوسية بقناير لاجناسية التسجيع والاستاطلة. حيوها ملوطة بالابيض. منائجها قصيرة ورشلية. اعناقها طويلة. اذنانها متوسطة الطول، مقبولة الاطراف || الانثى اصفر قدما من الذكر وافتح ثوبها منه. تدنث انقصوها في الارض. يبيض من ٧ الى ٩ بيضات تحضنها نحو ثلاثة اسابيع بينا الذكر يؤين لها الغذاء || تعتبر من الطرائد الفاخرة.

١٧٣٩٢ - **طهس** (F). *Endonastie* (F). الطهس الثفاف الزنبد على السوق تسهيل لجووز الوردية من الوردية.

١٧٣٩٣ - **طهش** (F). *Détartrator* (F). *To detartrator* (E). افسد العمل بسره تصره.

١٧٣٩٤ - **طهف** (F). *Frais* (F). *Fresh* (E). نمت وصفي يدل على طراوة الشيء كقولك زينة طهفة اي طازية.

١٧٣٩٥ - **طهف** (S). *Millium nigricans* (S). *Maïs de Guinée* (F). *African millet-grass* (E). *Echtes Flattergrass* (D). *Miglio nero* (I).

نبات عشبي زراعي حولي من التجليات. مهد البلاد الافريقية الحارة حيث تكثر زراعته نظرا لاستعماله الغذاء والمال. وهو قريب الشيء من الدخن. اوراقه كبيرة القد، صفية النصل، متقاربة الابعاد. شكله الزهري كبير الحجم. ثماره حبوب صغيرة مستديرة مغطاة بخرق الورد.

سطوط متفرقة في البطن. اما السطوط المتفرقة في ثوب الانثى صفراء اللون || رأسها مستعرض. زياتها وريشها عند الذكر، قلايدان عند الانثى. وريشها، عند الشقين، الى البياض الاغبر المرقوش بالخطي. قوامها الى الصفرة، منافسها سود || تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى تشرين الاول. تألف حشرات اللقح ويجاري الماء || يرقها مائية ثم قازية، وانجبة ودائمة.

١٧٣٧٨ - **طنج** هو المور، الحلبه.

١٧٣٧٩ - **طنرق سبدول** (F). *Tanrec commus* حيوان ليون حاشر يدعى مزال، الحلبه.

١٧٣٨٠ - **طنز** لغز غريب من السمك (الحيط).

١٧٣٨١ - **طنطور الجندي** هو التظيفة الحبيشة. الحلبه.

١٧٣٨٢ - **طنطين** (F). *Tanghin, Tanghen* مادة جمالية تستخرج من عصارة ساق الطنينة السامة او من لباب ثمارها.

١٧٣٨٣ - **طنثينة** (S). *Tanghinia* (S). *Tanghinie, Tanguin* (F). جنس الشجر برية وتربلية من فصيلة الغطيات انواعها المعروفة خمسة جميعها كبيرة القلة تملو من ٨ الى ١٥ م. اشبابها صلبة مستقيمة سطحية اللون. ثمارها ثنوية الشكل بنقية الحميم لونها يراوح من الاصفر الى الاحمر || اشهر انواعها الطنينة السامة.

١٧٣٨٤ - **طنثينة سامة**، **طنثينة مدسكرة** (F). *Tanghinia venenifera* (S). *Tanghinia de Madagascar* (F). نوع من الطنثينة يهي ثجرة جملة الخدام تملو نحو ١٥ امار. اوراقها سائبة الشكل، فصولها جاهد الصلابة حاقب الخضار اطول المواج || يستخرج من لباب ثمارها ومن صارة ساقها مادة جمالية شديدة القوم تشل القلب والجهاز العصبي || يقال ان باقر ملك مدسكرة امر عام ١٨٣٠ باسفار جميع بحرة الجزيرة ووقاها وكان مدعم نحو ٦٠٠٠٠ فحكم عليهم باجترار صارة الطنثينة السامة لتستريح البلاد من طفة الابلالة. وهكذا كان قاترا جميعهم بيوم واحد.

١٧٣٨٥ - **طنثف**، **طنثف** (F). *Auvent* (F). *Pent-roof, Porch-roof* (E).

الحيد من الجبل وما ثقتا منه. والقرز الحائط. وما اشرف خارجا عن البنايا. والقفقة تشرع فوق باب الدار.

١٧٣٨٦ - **طنثف** شجر احمر يشبه البسم (السان).

١٧٣٨٧ - **طنثوش شارد** (S).

Trichogramma evanescens (S). *Trichogramma errant* (F).

حشرة نافعة من فصيلة الطنفوشيات. موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تغطّل على مكن الحشرات ومنها القرمزيات (الكوكبيل) || جسمها صغير القه بطول نحو ١ مم. رأسها مستعرض الجرم. زياتها قصيران، متفرجان.



طنفوش شارد



طهرورج



طهف



طولاب مهذب

كيرة ، نائرة ، متباعدة عند الشقين . قربها الاستعمارية صغيرة ونحيلة . أسنمها لائقة أو ماسة . كسلها مستطيلة الشكل ، مبرشة الحلب . شياها كيرة . طولها شبه اسطوانية . قوائمها نحيفة . أطولها كيرة ، أشبه الاسود ثم الاسمر الحلي || يرقاها ونج أو نائلة أو عاحلة || أشهر اجناسها الطواسة والكردودة .

١٧٤٠٣ - طولوكرة * في الانثة السوداء ، أطولها .

١٧٤٠٤ - طولاعية التصرف (F). Disponibilité (F). Disposal (E). هي في القانون المدني صفة متصلة بالاموال يجعلها قابلة للتسليم .

١٧٤٠٥ - طولال الساق ، طوليلات الساق

Echassiers (F). Wading-birds (E). ربة من الطيور تتميز باستطالة سيقانها وأصابعها وسانقيها . اجناسها وانواعها عديدة تجتمع الى طرة فصائل : البيلونيات والقفليات والتطليات والباريات وجابيات الارض والفرقيات والكركيات والقفلقيات والسماميات والكتاتيات

١٧٤٠٦ - طولال القرون * هي قترنيت ، أطولها .



طول

١٧٤٠٧ - طولابحة * ، طولاي * . Tupia (S). Tupaia, Cladobate (F).

جنس حيوانات لبنة حاشرة من فصيلة الطوابيات . انواعه المعروفة مبة . اصلها تمتد من الحد الى الحد الصينية والانام ويوزر الاربعيل حتى صوته والفيليين . تألف الثابت والاحراج . تتسلق الاشجار بفعلة . قروح في الثمار وتبيت في الليل . قوسا الحشرات والورغ والفتران والجرذان ... || اجسامها تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . بما فيه الذناب التي تطول من ١٢ الى ٢٢ سم . رؤوسها مستطيلة الاعظام ، غروبية الشكل . سبالها كيرة . عيونها واذناتها صغيرة . اذنانها مستطيلة جلة . أطولها تختلف مع الانواع . انائها رباعية الاطباء .

اعرف انواعه واشهرها الاربية التالية :

طوابية اسمر حديدي * . Tupia ferruginea (S). Tupaia ferrugineux (F).

طوابية قانا - قانا * . Tupia tana (S). Tupaia tana, Tana (F).

طوابية جاوا * . Tupais javanica (S). Tupaia de java (F).

طوابية نيكوبار * . Tupais nicobarica (S). Tupaia de Nicobar (F).

١٧٤٠٨ - طولابيات * . Tupalidae (S).

Tupalidae, Tupalidae (F). Tupalidae (E).

فصيلة حيوانات لبنة حاشرة شقيقة . اجناسها وانواعها قليلة البدن . اصلها المناطق الحارة والاستوائية من الحد الى الانام ويوزر الاربعيل || جميع اجناسها صغيرة ، مستطيلة الاجسام والاذناب ، قريبة الكفة والتسباب . رؤوسها غروبية ، ذلقة الاعظام . آذانها صغيرة . قوائمها الخلفية اطول من الامامية || تألف الثابت والحراج . تتسلق الاشجار بفعلة . قوسا الحشرات والويدات والورغ والفتران || اعرف اجناسها واشهرها الطوابية .



طوابية

١٧٣٩٦ - طولاب مهذب *

Dolomedes fimbriatus (S). Dolomède frangé (F). Long-legged spider (E). Garteilachspinne (D). نوع من العناكب القانصة السابعة ثنائية الروايا سدسية المشانق ينتمي الى فصيلة الخنثريات . جسمه متوسط القدر يطول نحو ١٨ م . عند الذكر ونحو ٢٤ م . عند الانثى . صدراها اهليلجي الشكل ، اصعب اللون ، اقبر التوشع عينا زيمتان ، شيفساء ضليان ، عديدا المغاف ، فكاه مستطيلان . جرابه قوية ، نحيفة ، مبرشة الحلب . يله مستطيل الشكل البيضي ، حلي اللون ، اسمر الحلي ، يملوه تمسح ابيض واسود وخار مهذب اخير || يأنف المنافع والاهوار . قرة الحشرات المائية . يروح في الثمار . عكده كجارب ينسجها تحت الحجارة في مكان قصه || ملونه الجاني لا يختلف من ملين سائر العناكب .

١٧٣٩٧ - طولكة * . Fourrage débine (F). Straits fodder (E). الير من الكلاء .

١٧٣٩٨ - طوليج * . حشائش مرة كانت تأكلها اليهود في القصح . (اللسان) .

١٧٣٩٩ - طوليل * . Pimelopterus tahmal (S). Pimelode (F).

سمكة بحرية مأكولة من مفرسعات الثنائيات وفصيلة السلوريات . توجد في منط البلاد الحارة . تتميز بزيادة شكلها ، بقصر رأسها المقطوع ، بكثرة طبقات الكفة وباستطالة ينسج حشائشها الزنغية كما يبدو في الرسم . وهي عادمة الانسان ، خلية النظام الفكية .

١٧٤٠٠ - طوليلة * . Clausilia (S). Clausilie (F).

جنس حيوانات برية من الرخويات مديات الاربعيل وفصيلة الخلوريات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ٧٠٠ منشرة في جميع الاصقاع الحارة والمعتدلة الحرارة || اصلها صغيرة القدر وشبيهة الشكل المستطيل . اطولها تقارب من ٨ الى ٢ م . تعيش في المواق الرطبة وقرب المنافع ويجاري الماء . قربها المواد النباتية .

١٧٤٠١ - طولوحكة * . Scatophaga (S). Scatophage (F). Scatophaga (E).

جنس حشرات قانصة من فصيلة الطورابيات وربة ذوات الجنانين . انواعها المعروفة عديدة منشرة في منط انطار العالم || اجسامها عريضة تطول من ١٢ الى ١٤ م . رؤوسها كيرة . عيونها نائرة ، متباعدة عند الشقين . قرونها الاستعمارية شديدة القصر لتتهي بسيلة دقيقة . اعظامها ضليقة ، لائقة ، كسلها وطولها متكافئة الحلب . رواشها ملونة . قوائمها نحيفة ، مبرشة الحلب . اثارها عديدة و اجسامها الحلي || الحشرة الجملة قانصة . البرقة نائلة وواجبة .

١٧٤٠٢ - طولابيات * . Scatophagidae (S). Scatophagidae (F). Scatophagidae (E).

فصيلة حشرات من ربة ذوات الجنانين . اجناسها وانواعها المعروفة كيرة البدن ، منشرة في منط اصقاع العالم . جميعها من اللباب اللاتح الحام || اجسامها متفاوتة القدر تطول من ٤ الى ١٤ م . رؤوسها شبه مكورة . عيونها

Phase

١٧٤١٧ - طور - Brebis (F), Ewe (E).

هي النعجة . ج. طوبالات . ولا يقال لكبيش طوبال .

Disphase

١٧٤١٨ - طور انصصائي

١٧٤١٩ - طوبنة في الاقصر ، اطلية .

Geopelia (S). طوري * ، طوري ١٧٤١٩

Géopélie, Pigeon-épervier (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الحماميات . يتميز بصفه ريشة وشكله واستطالة اذنيه المتراخض الريش . ثوبه الى الصخرة المخططة والموشة بالاصود || موطنه الشرق يآلف القياي والحقل والمزرعة . اصابه صغرة براوح حدد انفرادها بين ١٢ و ٤٠ . قوته الجيوب واليور . يدن في الجنايات والادخال القليلة الارتفاع . انشاء تبيض بيفتين حل مرتين في السنة .

١٧٤٢٠ - طورانية * Torania gloriosa (S).

Toranie glorieuse (F).

دوية من الناكب الساعية الفاتحة ، ثنائية الرواية سداسية المخانق تنتمي الى فصيلة اللاميات . موطنها بعض المناطق الاستوائية من العالم القديم . تسرح في النهار . قوتها الحشرات الصغيرة || جسمها صغير القد بطول نحو ١٥ سم . عند الذكر ونحو ٢٠ سم . عند الانثى . صدرها مستدير الشكل ، سطلي اللون ، اسمر المواج . جناها زنجيتان ، فكها صغيران . جرازمها كبيرة ، كثيفة الحلب . بطها بيضي الشكل ، اسمر اللون منقط بالاحمر كالجرار || لسمها مؤذية تسبب بعض الحمى .

١٧٤٢١ - طورق * Corythax, Turacus (S).

Touraco (F), Turacus (E).

جنس طير من فصيلة المرازيات . اطلانه البلاد الافريقية الحارة . انواعه المروقة قليلة العدد . جميعها ابدية . اجسامها تطول من ٤٢ الى ٤٧ سم . اثنائها جيلة الانوار القاعة . متغيرها قصيرة ، عرطوية الشكل ، شارفة الحطاط العليا المنحنية الطفاف . ولوسها حوجة بقتارح عرطوية الشكل || اعرف انواعه واشهرها الطورق الازجواني .

١٧٤٢٢ - طورق أزجواني *

Corythax Buffoni, Turacus perra (S).

Touraco pourpre, T. bleu (F), Purple Turacus (E).

نوع من الطورق . اطلانه تشتمل منط مناطق افريقية الجنوبية . يآلف الاجراع والفايات والتنافس حيث تكثر الثار والجيوب البرية || جسمه بطول نحو ٤٧ سم . ثوبه الى الخضار الازجواني المواج . جناها مجمدة بالاخضر الانياس والازرق والاحمر والاسود . ذنبه الى الزرقه المايقة الخضراء المواج . فزعته خضراء القاعدة والزائم الاول ، ينفسجية الزام الثاني ، حمراء الثالث والاربع || يدن في تجاوياف الاجمار القديمة السعد . انشاء تقصع اربع بيشات تحضها بمثابة الذكر || قوته الثار البرية والجيوب . يعيش في القمص اما يرب في الموامع الظليلة . قوته في الاسر يرتكز على اثار البانة والرز المسقوع والتجزر المجلل بماء السكر .

١٧٤٢٣ - طوس * Pullulation (F).

Pullulation, Swarming (E). الطوس التكاثر السريع .

١٧٤٢٤ - طوس هو الجبان الحبيبي ، اطلية .

١٧٤٢٥ - طوبانة

هي النعجة . ج. طوبالات . ولا يقال لكبيش طوبال .

١٧٤٢٦ - طوبنة في الاقصر ، اطلية .

١٧٤٢٧ - طوبين Talpa (S), Taupe (F), Mole (E).

جنس حيوانات من آكلات الحشرات وفصيلة الطوبينيات انواعه المروقة ١٠ موطنها العالم القديم . اشهرها الطوبين البومل او القند الاروي . جميعها جاسة تعيش في انفاق ورداء تخلفها على اعماق مختلفة تراوح بين ٣٠ و ٧٠ سم . اجسامها مكنكة لسطوانية تطول من ١٢ الى ١٥ سم . رؤوسها رشيقة تنتهي بفتايل صغية . حيوتها عرطية صغرة . اذناها الخارجية طامسة . اذناها جلع تطول نحو ٢ سم . ايديها قصيرة مسترصة خنسية الاصابع المهيضة بالانطافر القوية المستطيلة الذرية . ارجلها صغرة القدة والاطافير || اثنائها تحمل مرة في العام وتضع من جبرين الى خمسة جراء || يكثر الطوبين من الحيوانات المؤذية لانه يقضم كل نبات يتري طريقه في التصرى من الحشرات ويحسح اربع مرات في النهار عند الصباح وعند الساعة السابعة وعند الظهر وعند الغروب || يكافح باستعمال الفخاخ وللصايد وللعلم السامة .

١٧٤٢٨ - طوبين أمريكي * Scalops parvus (S).

Scalope de Floride (F).

حيوان لبون حاشر جاس من فصيلة الطوبينيات . اطلانه بعض مناطق الولايات المتحدة اغصها فلورديه والتكساس || جسمه صغير القد كرم بطول نحو ٢٠ سم . رأسه كبير الجرم مستطيل القنم الذي يعلو كقنم الزبابة . عنابه عرطيتان . اذناه مساحتان ، طامستان . يلداه صغرتان شبيهتان بحيتا الاصابع المهيضة بالانطافر قوية . ذنبه شاذ القصر عادم الوبر . ثوبه الى الصخرة المايقة باستثناء لفة الرأس ومنقمة القوام فاتها الى الدرة الصفراء || يعيش تحت الارض في انفاق تخلفها على اعماق متفاوتة النور اقتصاما ٤٥ سم . قوته الديدان واساريع الحشرات ويرقاتها ورازن النمل والثلث ... || الانثى تحمل مرة في العام وتضع من جبرين الى ثلاثة جراء .

١٧٤٢٩ - طوبينيات Talpidae (S).

Talpidae (F), Talpidae (E).

فصيلة حيوانات صغيرة من رتبة الحشرات تشمل الطوبين واللسبان .

١٧٤٣٠ - طوتوت Tota (F), Grivet (E).

هو هجرس سبا ، اطلية .

١٧٤٣١ - طوق Plancton, Plankton (F).

Plancton (E).

كلية من المواد العنصرية المنصودة بالماء قواسمها مجسومات من الحيوانات الدنيا المائية والنباتات المهيضة من وحيدات الخلية . البتر اوسع من ماء البحر يحوي نحو ٥٠٠٠٠٠ كائن حي من هذه الحيوانات الدنيا والنباتات المهيضة . وحيث ان هذه الكائنات تتكاثر بسرعة لا مثيل لها ، تراوح من يوم الى يمين ، لذلك فالطوق يعني كامل كائنات الكلكتة من حية وميتة . ج. الطوايح .

١٧٤٣٢ - طوحجي * Planctique (F), Planktic (E).

نعت تعريفي يطلق على الكلكت العنصرية العامة في الماء او الثابتة فيه .



طوبين امريكي



طوراني



طرابنة



طورق لارجواني

١٧٤٣٨ - طوقش

أرض مستديرة سهلة بين أرضين غلاظ .



طوقان



طوقريون اصفر



طوقريون اكرتي



طوقريون جبلي



طوقريون شرقي



طوقريون كبير

Chitser (F).

To castrata, To geld (E).

انزع الخصيتين في ذكور الحيوان .

١٧٤٣٩ - طوقش

Anandre, Anandraire (F). العلاء كل زهرة عادمة الجهاز الذكري .

Chapon (F).

فرخ اللجاج الخفي . ج طوقش ومقاتلش . (E) Capon

Epervier commun (F).

هو الباشق المرووف ، اطليه .

١٧٤٣٩ - طوط

هو القطن او قطن البردي .

١٧٤٣٠ - طوطانيات

عارة من فصيلة دجاجيات الارض . اجناسها وانواعها عديدة جميعها من القواطع الصغيرة القند . انواها منقطة مرقطة ، وقشبا اهلجية الشكل . مناتها دقيقة نصفية التخذيد . ارساغها خيطة || تألف مجاري الماء وضطوب البحار والاشجار . قوتها اللبدان والشرات والرسوبات والشرابات || تدثر في الاشجار وبين الاعشاب وعلى التراب . الاث تبيض نحو : يبيضات تحضها سحبا من ١٧ الى ١٩ يوما || اشهر اجناسها البطوى والقرناز والقشع .

١٧٤٣١ - طوطي

هي البهاة (عن ابي حامد الغزالي) .

١٧٤٣٢ - طوطي

نعت تعريفي يطلق على كل نبات يتكاثر تلقائيا في تربة معينة واقليم محدد .

١٧٤٣٣ - طوطية

صفة ما هو تلقائي .

١٧٤٣٤ - طوطق

الطار من صديد يطوق بعض الاشياء لمنع تصدعها . ولطوق هو حابول النخل الذي يستعمل في الصدد البيا .

١٧٤٣٥ - طوقان

الطوقان كوكبة نجم جنوبية الموضع تشبه بشكلها طائر الطوقان || عدد نجومها ١٤ جميعها من المرتبة الخامسة وما دونها .

١٧٤٣٦ - طوقان

جنس طيور امريكية مسجنتة الشكل . موطنها البرازيل والفرنسا وبولارها . اجسامها كبيرة القند طولها يراوح بين ٥٠ و ٧٠ سم . انواها مختلفة يكثر فيها السواد اللامع . اعتناها وحاسرها يفس . اقناها حر الاناثيك . مناتها غليظة الشكل ، كبيرة الحجم ، ودية اللون ، سود البنية . تألف الغابات وتدثر في صمغ الاشجار . قوتها البار والحشرات والفروع .

١٧٤٣٧ - طوقانيات

قصة طير من الممتلكات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بكم مناتيقها اللينة الخشوية . اصطلحها البلاد الحارة والاسوائية . اهراف اجناسها واشهرها الطوقان .

١٧٤٣٩ - طوقريون ، طوقريون

Teucrium (S), Germandrée (F), Germander (E). جنس نباتات برية وزراعية ترينية من فصيلة الشفويات انواعه نحو ١٠٠ معظمها عشبي لني معمر شائع الاستعمال الطبي . منافعها عديدة يزبل السعال ويقيه الطحال . وهو مر البطم ، حامض ومقو ، يفر الصفراء ويقي الاغصاب ويقضي على اللبدان || اوراقها متعابلة مفرقة كثيرة التشرج . ازهارها ابطية غشلة الالوان || اشهر انواعه ما يلي .

١٧٤٤٠ - طوقريون اصغر ، عشبة الطحال

Teucrium flavum (S), Germandrée flavescens, Pouillot jaune (F), Yellow germander (E), Gelber Gamander (D), Camendrio giallo, Querciola maggiore (I).

عشبة برية معمرة تملو نحو ٤٠ سم . ساقها فروها . فروها منتصب زياها الحام . اوراقها كبيرة مفرقة وسنة النصل الحامل للبشرة حل صفحتي . خل اوراقها وزنب حساء فروها وساقها يفس اللون ، صفر المواج . ازهارها رؤسية التجميع ، حامية الازنكاز ، صفراء اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى آب || يقال انها تدثر اكثر حال الحلال .

١٧٤٤١ - طوقريون اكرتي ، بكلة العرف

Teucrium creticum (S), Germandrée crétoise, Pouillot de Crète (F), Cretan germander (E), Cretischer bergwandell, Ysop-Gamander (D), Camendrio di Creta, Querciola di Creta (I).

عشبة برية طيبة معمرة مهداة الشرق الاوسط . يقال انها من النباتات الناحضة الناحضة . تملو نحو ٨٠ سم . ساقها فروها منتصب ، اوراقها تطول نحو ٤ سم . وتعرض نحو ٦ م . ازهارها بنفسجية اللون ، فردية او ثلاثية التجميع . ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٧٤٤٢ - طوقريون جبلي

Teucrium montanum (S), Germandrée de montagne, Pouillot de montagne, Thym blanc (F).

عشبة معمرة تملو من ١٠ الى ٤٠ سم . ساقها فروها . فروها غشوية ، خيطة ، مستديرة الاضراس . اوراقها لائفة ، شيقة النصل ، خضراء الصفحة السفلى . ازهارها يضاء اللون ويلوحا مواج اصفر || ازهارها يستمر من ايار الى آب .

١٧٤٤٣ - طوقريون شرقي

Teucrium orientale (S), Germandrée d'Orient (F). عشبة برية وترينية معمرة تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ساقها فروها منتصب . اوراقها غليظة التفرش . نصلها يذات الخضراء ، خلي البشرة . ازهارها مفردية التجميع ، زرقاء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٧٤٤٤ - طوقريون كبير ، طوقريون ليبي

Teucrium fruticosum (S), Germandrée ligneuse (F). جنة ترينية تملو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . فروها نباتية متبادلة . اوراقها معقطة مسطلة . نصلها بارز المروق والشرانين ، ازغب الصفحة السفلى . ازهارها كبيرة القند ، زرقاء اللون ، ازهارها يستمر من شباط الى حزيران || وهي من النباتات الجامدة التي ترعب في بعض الاطربة للمدينة والمواقع الخامسة .

١٧٤٥١ - طَوَلَقِين نَكَات

Dendroplex picus (S).

Talapiot-pic (F). Talapiot-pic (E).

نوع من الطوباء. عاثر من فصيلة الطوليبيات. موطن معظم المناطق القريبة من أمريكا الجنوبية. يألف الغابات والرياض حيث تكثر الديدان والاساريع والحشرات || جسمه مثقل اللد طوله نحو ٢٢ سم. يتميز بمقناده الجالس كالحرية المستقلة الطوف. ثوبه الى الحلقة السوداء يملوا جميعه معترض اسود في الجناح والذنب وريشة سوداء في الصدر. صدره وبطنه ورزكاء الى الشقعة السوداء. حلقه عينه الى الزرقاء مقناده وساقاه الى السرة الباقية || يتسلق الاشجار من الصباح الى المساء وينكت القشور والحاء في طلب الديدان والاساريع || يذنب منه في تجاوبف الاشجار. الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات بتفضها بمادة الذكر نحو ١٥ يوما.

Dendrocolaptidae (S). طَوَلَقِينَات

Dendrocolaptidae (F). Dendrocolaptidae (E).

فصيلة طير من الجوارثم المتسلقات رقيقسات المناقير. اجناسها وانواعها المرفوعة نحو ٧٠ موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية. تألف الغابات والرياض والاشجار الجبلية. قوتها الحشرات واساريعها || اعرف اجناسها واشهرها الطوباء والقضاب.

Torreya (S) طَوَلَقِين ، طَوَلَقِين

Torreya, Torreya (F).

جنس اشجار حرجية من الطقوسيات. انواعها عديدة مدها الشرق والبلاد الامريكية. اشجارها متوسطة اللد دائمة الخضار. غراحيها متقايلة ابيدة. اوراقها حرة ثنائية الشعب. منفقة. احليلية، تألف الغابات والرياض والاشجار شائك القشرة. حاكب الخضار، تخطط الصفحة السفلى. اشهر انواعها ما يلي.

١٧٤٥٤ - طَوَلَقِين جَوَرِي السَّحَر

Torreya nucifera (S). Torreya à noix (F).

شجرة سروية حرجية وزيينية بطيئة النمو. مدها اليابان تملو من ٧ الى ٢٠ م. غراحيها تبدو خضراء اللون ثم تنحرف الى الجوزية. اوراقها شديدة الخضار اللامع اللامع. مسام تملوها عند فركها تحمر غراحيها اللامع الحبيبة الكريهة الرائحة || ثمارها جوزية اللد والشكل، لونها الى الأخضر المنشح بالابيض تقطيه بعض الحطوط الحمر.

١٧٤٥٥ - طَوَلَقِين زَرْبِي الْوَرَق

Torreya taxifolia (S). Torreya à feuilles d'if (F).

شجرة سروية جادسة مدها اشراج فلوريدا من اعمال امريكا الشمالية. تملو من ٧ الى ١٠ امار. غراحيها شديدة الخضار. اوراقها زرقية الشكل، ابرية المقعدة، فواكه الرائحة الكريهة.

Torreya grandis (S). طَوَلَقِين كَبِير

Torreya grand (F).

شجرة سروية حرجية وزيينية، بطيئة النمو مدها الصين. تملو من ٢٠ الى ٣٥ م. غراحيها فسقية اللون. اوراقها تطلو نحو ٤ م. تملوها لاص الصفحة العليا الشفافة اللون، باحت السفلى المتعددة الخضار، ثمارها بيضينة الشكل، صفراء اللون تطلو نحو ٣ م. وتعرض نحو ٢.

١٧٤٥٥ - طَوَلَقِين كَرْدِي * مَارُوم ، صَعْتَر

المرء مَرَسَاخُور

Teucrium marum (S). Germandrée ambrée, G. maritima, Marum, Thym aux chas, Herbe aux chas (F). Marum-germander, Cat thyma (E). Katzen-gamander, Katzenkraut (D). Camendrio maritimo, Maro (I).

بجلة برية طيبة مبرسة صغيرة اللد، ساقها فناء تملو نحو ٥٠ سم. اوراقها منفقة فضية الشكل تطلو نحو ١٠ سم. وتعرض من ٢ الى ٥. تملوها وسيد البرق خلى البشرة التبينة اللون. ازهارها ابيلة الازتكاز، فردية او ثنائية التجميع. لونها الى الزرقاء الباهتة || ازهاره يستمر من ايار الى آب.

١٧٤٦٦ - طَوَلَقِين خَزَنِي * حَمَامَدَارِيوس ، كَمَادَارِيوس

Teucrium Chamaedrys (S). Germandrée officinale, G. petit-chêne, Petit-chêne (F). Common germander, Ground oak, Wall germander (E). Echter Gamander (D). Camendrio officinale, Germandrie, Querciola (I).

حشبة طيبة مبرسة تملو من ١٠ الى ٣٠ سم. ساقها نحيلة مسطحة. اوراقها مفردة وسنة. تملوها خلى الصفحة السفلى. ازهارها فضية التجميع، حامية الازتكاز، حرة اللون || ازهارها يستمر من ايار الى الابليل. ثمارها الطيبة عديدة راجعها في مادة طَوَلَقِين.

١٧٤٦٧ - طَوَلَقِين السَّوَل * Thecla betulae (S).

فراشة من فصيلة الغنثيات طولها نحو ٣٨ م. ذكرها اسمر الجسم، اصهب الراوش المرفوعة والمبقجة بالاحمر والاصفر والحطلي. انثاها كستنية الجسم والراوش يملوها في روثينا الاماين بقية حراء صباية || يسرح من آب الى الابليل. رقت تتركب اوراق البتولا.

١٧٤٦٨ - طَوَلَقِين السَّيْدِيَّان * Thecla quercus (S).

فراشة من فصيلة الغنثيات طولها نحو ٣٤ م. ذكرها حطلي الجسم، لغير الصدر، بنفسجي الراوش المطلقة بالاسمر. انثاها حطلية الجسم فراء الراوش المسجبة بالاسمر والمنطقة بالاحمر والاصفر || يسرح من حزيران الى تموز. رقت تتركب اوراق السديان.

١٧٤٦٩ - طَوَلَقِين Longitude

قياس درجات طول الامكة. عماده قوس خط الاستواء القاتم بين هاجرة الموضع والهاجرة الاصلية.

١٧٤٧٠ - طَوَلَقِين * اَبُو سَاق Himantopus (S).

Echasse (F). Stik (E).

طائر من طول الساق القواطع. طوله نحو ٤٠ سم. متقار جالس، مستطيل، اسود. ساقاه خازن الطول جوارثا اللون. قفنه وظهوره يسقطه الى السواد اللامع يملو موج اخضر. عنقه وصدره وبطنه وذنبه الى البياض اللبي يختفجه موج وردى || يرزاد التامع والظلمة البحرية. قوته الحشرات والصفادوم والقشريات والرخويات والديدان || يقطن حته في المناطق بين الاحشاب يدبر افصوصه في الموائع التي تملوها المياه. انثاء تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وسدها نحو ١٧ يوما.



طَوَلَقِين كَرْدِي



طَوَلَقِين خَزَنِي



طَوَلَقِين السَّوَل



طَوَلَقِين السَّيْدِيَّان



طَوَلَقِين



طَوَلَقِين

وسيط الطوليات . انواعه المعروفة ٦٥ معظمها من نباتات المناطق الاستوائية . بعضها يقبل مأكول الارواق والآخر صناعي يستخرج منه صباغات صفر ، او طوي يدخل في عدة تركيبات وصقائير . اوراقه كبيرة لينة . ازهاره فردية التجميع ، محورية الزينة .

١٧٤٦٢ - طَوَلِيَّات (F).

سبط من الاقنشيات اجناله وازواحه عديدة جميعها من نباتات المناطق الاستوائية معظمها اشواب حولية وشجيرة صغيرة . لينة ، متدلة الارواق ، حيلة الازهار لقليلة العدد . لشهر اجناله الطويلة .

١٧٤٦٣ - طَوِي - هي الاثيرة ، اطليا . ج . اطواه .

١٧٤٦٤ - طَوِيلُ الْأَرْجُلُ (F).

Macropodus (E).
نمت تعريفي يطلق على الحيوانات المستطيلة الذيل .

١٧٤٦٥ - طَوِيلُ الْأَصَابِع (F).

Macroductyl, Macroductylous (E).
نمت تعريفي يطلق على الحيوانات المستطيلة الاصابع .

١٧٤٦٦ - طَوِيلُ الذَّقَبِ ، طَوِيلُ الْمِرْكَةِ (F).

Macrocerqua (F). Macrocerus (E).
نمت تعريفي توصف به كل دودية او حشرة مستطيلة الذنب او السرك .

١٧٤٦٧ - طَوِيلُ الذَّيْلِ (F).

Macroure (F).
نمت تعريفي يطلق على الحيوانات المستطيلة الذيل .

١٧٤٦٨ - طَوِيلُ الرَّأْسِ ، مُصَفَّحُ الرَّأْسِ (F).

Dolichocephala (F). Dolichocephalic (E).
من نموت تصنف في الشكل في الحيوانات الاطيلة .

١٧٤٦٩ - طَوِيلُ الرَّسْعِ (F).

Long in the pastern (E).
هو في الخيل صفة الرسغ الطويل الذي يقرب الحوشر من الخضيش . وقد يتبر من عيوب جياذ السبق .

١٧٤٧٠ - طَوِيلُ الزُّبَانِ (F).

Macrocre (F).
نمت تعريفي توصف به الحشرات المستطيلة الذيل .

١٧٤٧١ - طَوِيلَات الْأَرْجُلُ (F).

Macropodidae (F). Macropodidae (E).
فصيلة حيوانات من الجربيات . أشهر أنواعها القنقر .

١٧٤٧٢ - طَوِيلَات الرِّيشِ (F).

Longipennis (F).
مربية من كثرات القدم تشل بعض الطيور المائية الكبيرة الجثة ، المستطيلة الريش والقوية الطيران كزنج الماء ، والقطرس والخرشة .

١٧٤٧٣ - طَوِيلَات السَّاقِ (F).

Longirostre, Longirostral (F).
نمت تعريفي يطلق على الطيور المستطيلة المنقير .

١٧٤٧٥ - طَبَّار ، مَتَبَقَر (F).

Volat (F).
Volatile (E).

١٧٤٥٧ - طَوَلَقُ كَلْفُورِيَّة

Torreya californica, T. myrsinica (S). Torreya californica (F).

شجرة سبروتية سرجية وزيينية مهددا احرار كلفورنية من امال امريكا الشمالية . تملو من ١٠ الى ١٤ م . خراشيبها بحرية الخمار . اوراقها تطلو نحو ٧ م . وتعرض نحو ٣ م . نصلها جاند التسيج ، اسود القصبة الازرية الشائكة ، حاق الخمار حل صفحته العليا ، بحري الصفحة السفلى ، اعاد الراتحة اللانسجة || ثمارها اسطوانية تطلو نحو ٥ م . قطرها ٣ م . زنها الى الخمار الزاهي تملو شمسة حنطية تتخللها خطوط ارجوانية .

١٧٤٥٨ - طَوَلِيَّةُ التَّجِيلِيَّاتِ *

Tholera capitis (S).

Tholera capiteus (F). Tholera capitis (E).

حشرة متراكبة الحراشف والرشب من فصيلة النسيقات وريئة حرشيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها واسعة قوتها مخر الازهار . مرتها تبيض على النسيقات || جسمها متوسط اللد يطلو نحو ١٨ م . يستطها نحو ٤١ م . رأسها متدل الجرم وكتني اللون ، عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، مشطيان عند الانثى . جوشها كسني اللون . بطنها حنطي اللون ، كسني الحية || وريشها الاماميان الى الكتني الحنطي الملولج تملو زدا كشي مضبوط متفرعة غشايها يراوح من الجوزي الى الحنطي . وريشها الخلفيان الى الحنطي الاثخن يملو موج وريدي يمسر عند الاطراف || لها جيل واحد في الحية . تظهر القراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تقاتل بعد ظهورها بنحو ستة اصابع وتتمتع الممكن للتحا على الصفحات السفلى من نصال الارواق || السمرة تطلو نحو ٤٢ م . جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . ثوبا الى السمرة القامة يملو موج اسمر وعط ثيجي اسود وريشها جانبيين من كل جهة . رأسها جويي اللون . منها الى السمرة . وواجبا سود || طور الاكامل يمسر نحو ثلاثة اصابع وينتقي في القربة ضمن جلباب من اللون .

١٧٤٥٩ - طَوَمِيْس *

Thomomys (S).

Thomomys (F). Thomomys (E).

جنس حيوانات لينة قاضية جاسة من فصيلة الجروميسيات . انواعه المعروفة ٢٦ موطنها البلاد الامريكية . قوتها للزاد النباتية . تمسك كاللده تحت الارض في اتفاق مستطيلة ، متصبة تنتهي باجسام قسيمة لا يقل عنها من ١٥٠ م . اجسامها صغيرة ، مكروسة ، تطلو من ١٣ الى ١٧ م . واذنابها من ٥ الى ٦ م . رؤوسها مستطيلة ، شبه مخروطية الشكل ، منقوشة المقاصم . جوشها خرزية شديدة الصبر . اذانها لاقوية . جرمها قصير . اصابعها نثيفة الاظفار المقوسة الحادة . الزوايا تراوح من الركة الباحة الى المطة السمرام || انماها سداسية الاطباء ، تضع من مرتين الى ثلاث مرات في الحية . نتائجها من ٤ الى ٦ ادراس .

١٧٤٦٠ - طُون (F).

Tonne (F). Tun (E).

وحدة وزيية قدرها يماوي ١٠٠٠ كيلونرام .

١٧٤٦١ - طَوَلَقُ (F).

Dicliptera bivalvis (S).

Dicliptera, Herba dianthère (F). Balsam herb (E). Balsamkraut (D). Dicliptera (I).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة الاقنشيات



طَوَلَقُ التَّجِيلِيَّاتِ



طَوَمِيْس

الاثني مكها في فصال الاوراق فينتفخ من يرقات دقيقة حراء اللون تسرب النصال وتقيم فيها حتى الاكمال .

١٧٤٨٦ - **طيفار الشونان** * ، **ميسيل الشونان** *
Mayetiola avenae (S). Cécidomyie de l'avoine (F).
حشرة من الطيارات طوفا براوح من ٤ الى ٥ م . ثوبا الى الربعة وملعوا مواج جزوي . رقاتها تركب الشونان وتقل فيه قبل الطيار المبيد في القمح والشيلم .

١٧٤٨٧ - **طيفار الصنوبر** *
Cecidomyia pini (S). Cécidomyie du pin (F).

حشرة من فصيلة الطيارات . جسمها شديد الصغر يطول من ٢ الى ٣ م . رأسها مكور ، شديد السرة . عينها زيمتان . زباناها عيطيان ، مستطيلان ، صدها الى السرة المجزوة المواج . بطنها الى السرة الحمراء المواج . زيمتاها اللون القضي . وشناها قسطنطينا اللون . قواها مستطيلة ٥ تظهر الحشرة الجملانة من اواسط نيسان الى اواخر حزيران . تألف حراج الصنوبر . تمتع الاثني مكها في القشور قرب الندبات التي يميل منها الراتنج . البرقة يرتقالية اللون تميش على المواد الخشبية والراتنجية حتى الاكمال .

١٧٤٨٨ - **طيفار العوسج** *
Lasioptera rubi (S). Lasiptère des ronces, Cécidomyie des ronces (F).

حشرة من فصيلة الطيارات . جسمها شديد الصغر يطول من ٢ الى ٣ م . رأسها منقطع . عينها زيمتان . زباناها عيطيان . صدها اصفر تملو ثلاثة عطوط سرد ملتصحة القاعدة . بطنها يرمي الشكل اغبر ، تملو ستة عيطوط مغرزة . حرزها مستطيل . وشناها صيروان ابيضان . قواها مستطيلة ٥ تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى تشرين الثاني . تألف المواق التي يكثر فيها العوسج ٥ تمتع الاثني مكها على الساليج فينتفخ بها حشرة ايام من يرقات يبيض اللون تبقى بجمعة حتى الاكمال تفرغ القشور وتعلها .

١٧٤٨٩ - **طيفار القمح** *
Mayetiola tritici, Contarinia tritici (S). Cécidomyie du blé (F). Wheat midge (E). Weizengalmücke (D).
حشرة من الطيارات صغيرة طوفا من ٢ الى ٣ م . ثوبا الى الصفرة تمتع مكها حنة قاعدة صفا البر فينتفخ من يرقات تقضي عليه قبل تمام تكويته .

١٧٤٩٠ - **طيفار القنبيط** *
Contarinia nasturtii, C. torquens (S). Cécidomyie du chou-fleur (F). Swede midge (E). Kohlgalmücke (D).

حشرة من الطيارات صغيرة اللد طوفا لا يتجاوز ٢ م . ثوبا فضي اللون . وشناها خلية . تركب القنبيط في اول عهده فتضع مكها على ربحه القلق فينتفخ من يرقات تلطم ثم تمد الى الاوراق فتضك بها . ايجالها الحولية ثلاثة .

١٧٤٩١ - **طيفار الكرمة** *
Contarinia viticola (S). Cécidomyie de la vigne (F). Grape midge (E). Rebenblüten-galmücke (D).

حشرة من الطيارات صغيرة اللد طوفا نحو ٣ م . ثوبا امير اللون يطو مواج اغبر . تمتع مكها على حورات الكرمة (الحشرة هي اربعة بد الاكاع) فينتفخ من يرقات تقوض داخل الحورات وتقضي عليها .

١٧٤٩٦ - **طيامة** *
Petrogonia (F). Petrogony (E).
الطيامة نظرية بيولوجية قسوها ان كل جنس حيواني ير ، في تكويته الجنيني ، بمراحل نمازية متسلسلة الظواهر اثباتية تقدي في نهاية المطاف الى الشكل المنتظر .

١٧٤٩٧ - **طيب** *
Parfum (F). Parfume (E).
كل ذي رائحة صطرة قواسمة مستحبة من المهور والادهان . ج الجباب وطوب .

١٧٤٩٨ - **طيب العرب** هو الاذخر ، اعليه .

١٧٤٩٩ - **طيط** *
طائر من طوالب الساق يعرف بالي طيط ، اعليه .

١٧٤٨٠ - **طيسط متوج** *
Vanneau huppé (F).
رابع ابو طيط متوج .

١٧٤٨١ - **طيفار** *
Cecidomyia (S).
جنس حشرات شارة من فصيلة الطيارات انواعه عديدة جميعها صغيرة اللد تمتع مكها على البات فينتفخ من يرقات مؤذية تسبب الكثير من الاضرار ٥ اشهر انواعه وانشعا اذى ما ينتج .

١٧٤٨٢ - **طيفار الاجاص** *
Contarinia pyryvoza (S). Cécidomyie des poires (F). Pear midge (E). Birnengalmücke (D).

حشرة من الطيارات طوفا براوح بين ٢ و ٣ م . رأسها اسود . زباناها عيطية حطية تتألف من ٢٩ فاصلة . جوشها اسود يشوبه مواج فضي . ارجلها حنطية زياه . انشاء تمتع مكها في ثمرة الاجاص فينتفخ من يرقات تلم الثمرة أثناء نموها فتسود وتتلصص ٥ افراده قد تكون كثيرة في الانواع الباكورية . يكافح باستعمال احد الحواشير القمالة غير المرتكزة على النحاس .

١٧٤٨٣ - **طيفار البنفسج** *
Perrisia affinis (S). Cécidomyie des violettes (F).

حشرة من الطيارات صغيرة اللد ، حطية اللون ، زياه الجسم . تركب اوراق البنفسج فتضعها وتضع مكها على صفحاتها السفلى فينتفخ من يرقات دقيقة غراء اللون تلم النصل فتؤدي النبات وتضع الازهار بان قد تسبب قليا .

١٧٤٨٤ - **طيفار انقلب** *
Perrisia cenophila (S). Cécidomyie des feuilles de vigne (F).

حشرة من الطيارات صغيرة اللد سمراء اللون تركب خلب الكرمة فتضع مكها في اللروق فينتفخ من يرقات دقيقة ناعلة لونها الى الصفرة تميش تحت البشرة على حبيرات ونسج اللروق .

١٧٤٨٥ - **طيفار السينديان** *
Lestremia leucophaea (S).

Cécidomyie du chêne (F).
حشرة من فصيلة الطيارات . جسمها شديد الصغر ، يطول نحو ٢ م . ثوبا الى السرة الصفراء المواج . رأسها مكور . عينها زيمتان . زباناها مستطيلان . ملاسها رباحية الاجزاء . قواها مستطيلة . وشناها صيروان ، مغضبان ٥ تظهر الحشرة الجملانة من اواسط نيسان الى اواخر ايار . تألف حراج السينديان ٥ تمتع



طيفار الاجاص



طيفار البنفسج



طيفار الشونان



طيفار القمح



طيفار القنبيط



طيفار الكرمة

١٧٤٩٦ - طيشّار مُبيد * ٥ ذُبَابَة هيس

Myzotola destructor (S). Cécidomyie destructive, Mouche de Hesse (F). Hessian fly (E). Hessian fliege (D).

حشرة من الطيارات. طولها براوح بين ٢ و ٤ م. ثوبها الى الطلحة السمره. بطنها الى الحشرة. زباناها مركبة من ١٤ فاصلة || تركيب القنص والذليل والشمير: تظهر في نيسان ثم تختبئ مكبا في حلف الزرع فيقتل من ريقات دقيقة تلتصق بالنصل وتتجه نحو الكمية حيث تختص التسع وتسبب ذبول الحلف والسيلاب.

١٧٤٩٣ - طيشّار ورق الاجاص * ٥

Perrisia pyri (S). Cécidomyie des feuilles de poirier (F). حشرة من الطيارات صغيرة القند طولها نحو ٣ م. ثوبها الى السرة الخفيفة. تظهر في اوائل الربيع فتتركب اوراق الاجاص وتتبع مكبا في مسحاتها السفلى فيقتل من ريقات تتركب حته اطراف النصل حيث تعيش حسل الحبيرات النامية قسطيا وتتسبب ونشل عملها الفيزيولوجي الحيوي. لها جيلان في الحول الواحد.

١٧٤٩٤ - طيشّاريّات

Cecidomyiidae, Itonididae (S). Cécidomyiidae, Itonididae (F). Cécidomyiidae, Gall gnats (E). Gallmücken (D). فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجسامها وانواعها المعروفة زهاء ٣٠٠٠ صيغة القند. اجسامها مستطيلة رقيقة. ارجلها نحيلة وطويلة. قرونها الاستشرابية قدادية الشكل هليية، تطول في الذكور وتقتصر في الاناث. ريقاتها دقيقة و صغيرة، مدبة الاطراف. منسلها خاسل وبعضها طفيل او مفترس، تعيش حسل النجيليات والاشنيات والركبات وبعض الانجار والنباتات الفطرية. تختفي من النجس المجبرية وتسبب الذبول في غنفل الاجزاء التي تصيب كالبرام والازهار والثمار والاوراق والسوق والجذور.

١٧٤٩٥ - طيشّر ، طيشور ، طيشّر

Oiseaux (F). Birds (E). مفرد الطير طائر. والطيور صف حيوانات من الطقاريات. انواعها المعروفة زهاء ٢٥٠٠٠ تقسم الى ثلاث فئات او شصب: (١) الجوزييات (٢) القرواكس او العواوي (٣) عديجات اريش. اما رتبها وفضائلها حسب التصنيف الحديث، فهي موضوع الجدول التابع على الصفحة التالية.

١٧٤٩٦ - طيشّر ، تشّر طائر

Altair (F). Altair (E). الطير او النسر الطائر نجم لير من كوكبة العقاب. مركزه في رأس العقاب قبالة النسر الواقع من كوكبة القيثارة. يبعد عن الارض نحو ١٦ سنة ضوئية.

١٧٤٩٧ - طيشّر القراقيب

هو الشفراق واطله.

١٧٤٩٨ - طيشّر البكّل

هو الخفاش واطله.

١٧٤٩٩ - طيشّران

Vol (F). Flock (E). انتقال الطير وبعض الحشرات التي تدير في القضاء بواسطة اجتماعها.

١٧٥٠٠ - طيشّر * ٥

Myrpristia (S). جنس اسماك بحرية من فصيلة التنفيديات الشائكات ازواجه المعروفة قليلة العدد موطنها بحار المناطق الحارة انصها البحر الاحمر والمنتط. اجسامها صغيرة القند طولها براوح بين ١٥ و ٢٥ سم. اوقها جميلة الالوان الزاهية فيها الاحمر والازرق والوردي والاشهب والنفسي.

١٧٥٠١ - طيشريّات

Ornithologie (F). Ornithologie (E). الطيارات او علم الطير جزء من علم الموليد يبحث في الطيور.

١٧٥٠٢ - طيشس

Myriades (F). Myriad (E). الطيس العدد الحائل بكثرة.

١٧٥٠٣ - طيشسي

Thalassophile (F). Thalassophile (E). نعت ترميى يطلق على كل حشرة تعيش بمض ادوار حياتها في البحر او في الماء الاجاج.

١٧٥٠٤ - طيشسل

Pruine (F). Bloom (E). مادة عضوية لزجة مستنقة ناعمة تكثر الكبار تقضي بشرة الثمار والقطر وما اشبه.

١٧٥٠٥ - طيششركة * ٥

Tischeria (S). Tischeria (F). حشرة من فصيلة الطيشريات ورتبة حرشيات الاجنحة. اصلها من بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تألف الحراج التي يكثر فيها السديان || جسمها صغير، نحيل، شبه اسطواني الشكل. بطنتها نحو ١٠ م. رأسها مثل الجرم يكسو بعض السقف. عنانها صغيرتان، بارزتان. خطهما صغير. ملمسها قصيران، زباناها غطيان، مستطيلتان. اجنتها خفيفة، لاشسارية الاهداب. بطنها نحيل، كثيف الخمل. ثوبها الى السرة التنية المواج || سرقتها خاضعة تعيش على اوراق النباتات الحربية. انصها السديان والمخلول.

١٧٥٠٦ - طيششركة مُمكّسة * ٥

Tischeria complanata (S). حشرة من فصيلة الطيشريات ورتبة حرشيات الاجنحة. اصلها من بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تألف حراج السديان والزان والنفس والمخلول || جسمها صغير القند. بطنتها نحو ٨ م. رأسها مثل الجرم. عنانها صغيرتان، بارزتان. خطهما ولباسها قصيرة. زباناها غطيان. اجنتها خفيفة، مدبة الاطراف. بطنها مكثف الخمل. ثوبها الى الطلحة السمره المواج || سرقتها صغيرة، دقيقة، رقالة. تلتصق نصال الاوراق وتعيش بين البشريين.

١٧٥٠٧ - طيششريّات * ٥

Tischeriidae (S). Tischeriidae (F). Tischeriidae (E). فصيلة حشرات غرائسية من رتبة حرشيات الاجنحة. اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض القاليم البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة قنسية. رؤوسها معتدلة الجرم. ناعفاتها منتشرة بمضائف حشرية. قرونها الاستشرابية غطيلة.



طيّار سيّد



طيرة



طيشرة

الطير: شعيا-ورثيا وفصائلها (حسب التصنيف الحديث)

شعبة	ردية	فصلية
جَوْرِيَّات	دَوْرِيَّات الشكل	تَوْرِيَّات ، مَكْرُونَات ، مَرْشُونَات ، تَنْوَرِيَّات ، رُزْمِيَّات ، كَارُونِيَّات ، دَرَبَانِيَّات ، زَوْرِيَّات ، سَحَابِيَّات ، مَيْوَرِيَّات ، مَسْمُومِيَّات ، زَمَكْرُونِيَّات ، مَرْشُونِيَّات ، دُغْرِيَّات ، مَقُولَات ، لَبِيَّات ، كُفْنِيَّات ، عَصَافِير النُّوْل ، شَقْلِيَّات ، وَصِيَّات ، هَيْئَرِيَّات ، مَحْرُورِيَّات ، مَضْرَبَات ، دُخْلِيَّات ، بِلْدَانِيَّات ، خَلِيَّات ، كِبَاطِيَّات ، كَبِيَّيَّات ، عَرِيَّات ، كَسِيَّات ، عَرِيَّيَّات ، ذَوَلِيَّات ، صَحَافِيَّات ، رُحِيَّات ، فَرْشُونِيَّات ، عَرَلِيَّات ، كَلْبِيَّات ، غَرَابِيَّات ، زُرْزُورِيَّات ، عَرْمَلُونِيَّات ، دُكُورِيَّات ، كَبِيرِيَّات ، مَرِيَّات ، بَقَاطِيَّات ، فَكَاسِيَّات ، مَعَادِيَّات ، خَطَافِيَّات ، قُرِيَّات ، مَانُونِيَّات ، بِلِيَّات ، كَسِيَّيَّات ، عَنَاجِيَّات ، قَيْوُونِيَّات ، غُصُونِيَّات ، فَلَاسِيَّات ، بُوْرِيَّات ، رَمَازِيَّات ، كَسِيَّيَّات ، جَلِيَّات ، فِرَازِيَّات ، مَلِيَّات ، بَلُصُونِيَّات .
نَاقِيَّات الشكل	لُكْرِيَّات ، بَقَاطِيَّات ، خَطَافِيَّات ، مَلُونِيَّات ، خَبْرِيَّات ، نَقَارِيَّات .	
مُؤْمِنِيَّات الشكل	قَرَالِيَّات ، تَوْدِيَّات ، مَطْمُونِيَّات ، غَضَارِيَّات ، مُؤْمِنِيَّات ، فَيَزِيَّات ، لَبُونِيَّات ، هُدْنِيَّات ، شَدَالِيَّات ، أَرْكُونِيَّات .	
مُرْعُونِيَّات الشكل	مُرْعُونِيَّات	
سَمَائِيَّات الشكل	سَمَائِيَّات ، حَبِيَّات ، مَرْسِيَّات	
سَبِيَّات الشكل	سَبِيَّات ، عَرَلِيَّات ، بَكِيَّات ، بَذَرْمُونِيَّات ، حُوفَارِيَّات	
بُوْرِيَّات الشكل	بُوْرِيَّات ، بَمِيَّات	
قَيْوُونِيَّات الشكل	مَوَازِيَّات ، قَيْوُونِيَّات	
جَوْرِيَّات الشكل	جَوْرِيَّات	
بَيْنَازَات الشكل	بَيْنَازَات ، دَوْرَات	
حَمَائِيَّات الشكل	حَمَائِيَّات ، دَرَبَكُونِيَّات ، تَبِيَّيَّات ، غُصِيَّات	
زَقَالِيَّات الشكل	جَبِيَّات ، زَبِيَّات ، مَلَجِيَّات ، زَقَالِيَّات ، دُجَائِيَّات الأَرْض ، عَمَلِيَّات ، نَكَالِيَّات ، حُنُكُونِيَّات ، بَرْنِيَّيَّات ، مَسِيَّات ، بَتُونِيَّات ، مَسْمُومِيَّات ، كَرْكَرِيَّات ، تَوْرِيَّات ، مَحْمُومِيَّات ، بَطَرِيَّات .	
كَرْكَرِيَّات الشكل	هَلْدَانِيَّات ، نُكُونِيَّات ، كَرْكَرِيَّات ، رَمَلِيَّات ، بَحِيَّات ، بَلِيَّات ، مَرِيَّات ، عَشُونِيَّات ، كَوْرَلِيَّات ، كَرْمِيَّات ، حَارِيَّات .	
دُجَائِيَّات الشكل	مَلْهُونِيَّات ، نَدْرَجِيَّات ، مَرْغَرِيَّات ، حَبِيَّات ، شَقَالِيَّات ، عَرْنِيَّات ، مَرَانِيَّات .	
مَضْرَبَات الشكل	مَضْرَبَات ، بِلَاطِيَّات ، مُقْنِيَّات ، أَسْهُونِيَّات ، بَوَاف ، مَرْشُونِيَّات ، صَغَرِيَّات .	
وَرْنَات الشكل	بَلَاطِيَّات ، كَسِيَّيَّات	
نُصَائِيَّات الشكل	نُصَائِيَّات	
لَقْنِيَّات الشكل	لَقْنِيَّات ، مَلَاجِيَّات ، سَقَافِيَّات ، عَرْمَقِيَّات ، بَلَشَرِيَّات .	
بَحِيَّات الشكل	قَيْوُونِيَّات ، بَحِيَّات ، أَلْحِيَّات ، عَافِيَّات ، زَوْرِيَّات ، شَانِيَّات .	
قُرْعِيَّات الشكل	قُرْعِيَّات ، رَغَائِيَّات ، عَمَلِيَّات ، مَوَاجِيَّات .	
عَمَلِيَّات الشكل	عَمَلِيَّات	
عَمَائِيَّات الشكل	عَمَائِيَّات	
رَقْمُونِيَّات الشكل	رَقْمُونِيَّات	
زَوْرِيَّات الشكل	زَوْرِيَّات	
مَسْمُومِيَّات الشكل	مَسْمُومِيَّات	
رُزْمَانِيَّات الشكل	رُزْمَانِيَّات	
نَمَائِيَّات الشكل	نَمَائِيَّات	
عَدِيمَات الرِيش	مُطَنَاجِيَّات الشكل	مُطَنَاجِيَّات ، طَرُوسِيَّات



طيطن صغير



طيطن احر الساق



طيطن اخضر



طيطن البياض



طيطن البياض



* طيطن سلطاني

ونبه يبيض . اياهر وقوامه وكلاء سود الحمار . متقاره
اجر الانتشاب جزوي للملاط . سيقانه الى الاحمر
القرنيزي || سر به قليل البدن من ٦ الى ١٢ . يأنف
الناتق وضفاف المياه العذبة . يئن حشه بين اشباب
الناتق .

١٧٥١٤ - طيطن اخصر * تستاسك

Totanus ochropus, Tringa ochropus (S). Chevalier
cul-blanc (F). Green sandpiper (E).

طائر من الطيطوي موطنه حوض البحر المتوسط . يحوي
من حصفه الى مشتاه معتم بلاد الشرق وارويفه
الشالية والشرقية || يأنف الناتق وضفاف المياه العذبة .
يئن حشه بين الاشباب قرب الماء || ثوبه متركب
الالوان الزاهية انضر المواج . انفيكه ناصع الليان .
متقاره اسمر . سيقانه الى الخضار الزيتوني .

١٧٥١٥ - طيطن البياض *

Totanus stagnatilis, Tringa stagnatilis (S). Chevalier
stagnatilis, C. à pieds vorts (F). Marsh sandpiper (E).

طائر من الطيطوي طوله نحو ٢٤ سم . رأسه وعينه الى
الابيض الرمادي يملو تخطيط اسود مستطيل . طوره الى
الرمادي الاحمر تملو رقة سوداء . صدره وبطنه واخفكه
الى البياض الناصع تتخلله رقة براء . مبيسة . اياهر
وقوامه ميلة . متقاره اسود . سيقانه الى الخضار الزيتوني .
سره به من ٢٠ الى ٥٠ . يأنف الناتق وضفاف الانهر
والبحيرات . يسبح ويغوص . يئن حشه في الناتق فوق
التراب . انقصوه مستطيل للشكل قليل المنق .

١٧٥١٦ - طيطن البياض *

Totanus glareola, Tringa glareola (S). Chevalier
sylvain (F). Wood sandpiper (E).

طائر من الطيطوي طوله نحو ٢٢ سم . ثوبه متركب الالوان
مرقط || يبيض ازواجاً متفرقة يتجمع الى اسراب عند
الزوح . يأنف الناتق وضفاف الانهار والبحيرات .
يئن حشه في الخلق وفي الادغال .

١٧٥١٧ - طيطن سلطاني *

Totanus griseus (S). Chevalier gris, C. aboyeur (F).
Greyshank (E).

طائر من الطيطوي طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه متركب الالوان
الزاهية . طوره اسود الريش . ريشه جزوي الحمار منق
بالابيض . رأسه وعينه خططان بالابيض بطنه واخفكه
يضيوان . ذنبه موشج بالرمادي الاحمر . متقاره اسود .
سيقانه الى السمرة المخضره || سر به بعد من ١٢ الى
٢٠ . يأنف ضفاف الانهر والبحيرات . يئن حشه بين
اشباب الناتق فوق التراب .

١٧٥١٨ - طيطيات

Teuthididae (S). *Teuthididae* (F). *Teuthididae* (E).

فصيلة اسماء بحرية من كملات السقام . اجناسها وازواعها
المعروفة قليلة البدن جميعها من اسماء كبير البحر الاحمر ||
اجناسها اعطيلجية الشكل . حشكية . وحيدة الزعنة
النهرية . وذورها معتدلة الجسم . غطالها صغيرة
لاستطفة . اسنانها صغيرة حادة وحيدة الصف في الفكين .
اعرف اجناسها الطيط .

١٧٥١٩ - طيطن *

Gasterophilus (S). *Gasterophilus* (F). *Gasterophilus* (E).

جنس حشرات من فصيلة الطيطيات ودية ذوات الجناحين .

ملاصها نحيلة . مرافقها صغيرة . بطونها كثيفة الحمل
التصير . حشاتها مقفولة . روايتها سنانية الشكل .
بررامزها تامة . غطالها الخلفية وبامية للمناخس ||
اسارها لافحة . قربها غلايا الوؤ . عاداتها لطيفة
تتمحور داخل نفق السرة . اشهر اجناسها الطيطر .

١٧٥٠٨ - طيط * Tauthis (F). Teuthis (E).

جنس اسماء بحرية من فصيلة الطيطيات . انواعها المعروفة
قليلة البدن اعطالها البحر الاحمر || اجناسها اعطيلجية
الشكل . معتدلة القد . تتغفل على البشوريات والكرنبيات
ازواجها الى الحطلة تنبر وتزهر في النصف السفلي وتسر
في النصف العلوي وتنتشر الى الرصاصي المائق في الرأس
والظهر || لحومها متوسطة الصنف . مأكولة .

١٧٥٠٩ - طيطان * هو كرات البر . الحله .

١٧٥١٠ - طيطن صغير *

Pteromalus puparum (S). *Pteromala jouet* (F).

حشرة نافعة من فصيلة الطيطيات . موطنها بعض مناطق
البلاد المعتدلة الحارة . تتغفل على البشوريات والكرنبيات
والدوريات || جسمها صغير القد بطول نحو ١ سم .
وثلاثه خطوط . رأسها مستعرض الشكل . زبانتها غطبان
متفرجان . جوشنها شبه اسطواني . بطنها يضيء الشكل .
مقطوم القاعدة . مرزئها صغيرة مستقيمة . اجنتها ودية
تعلوها مشحة زرقاء خفيفة . ثوبها الى الخضار الاليس
الاسنغ المولج .

١٧٥١١ - طيطنات

Pteromalidae (S). *Pteromalidae* (F). *Pteromalidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة .
اجناسها وازواعها المعروفة نحو ٢٠٠٠ جميعها نافعة تتغفل
على الحشرات المؤذية من خلف الفصائل || حشراتنا
صغيرة القد طول من ١ الى ٣ سم . اجناسها ودية .
جرواشها اصغر من بطونها الخروطية المؤخر . قروبا
الاستشارية متباينة الاشكال . مرزئها صغيرة مستقيمة .
ازواجها مختلفة الالوان يكثر فيها الاخضر || اشهر انواعها
الطيطن الصغير والدبراق الهم والنارون القصير الزيان .

١٧٥١٢ - طيطوي

Totanus (S). *Totanus* (F). *Totanus* (E).

جنس طير من عائلة الطوطيات فصيلة دجاجيات
الارض . انواعه ١٥ جميعها من القوارض . ازواجها مرقة .
صدورها ووطونها يبيض . منانيرها مستطيلة . شاذة
الملاط . سيقانها دقيقة . اوصافها نحيلة || تألف الناتق
وعجاري الماء وضفاف الانهر والبحيرات . قربها الحشرات
بمجار اختلاف ازواجها والشرانيف والاسماك الصغيرة .
تدثر لوكارها في التراب وبين الاشباب وفي الانهار .
اناثها بيض نحو ١٠ يبيضات تحضها وسدحا نحو ٣
اسباع || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

١٧٥١٣ - طيطوي احر الساق *

Totanus calidris, Tringa totanus (S). Chevalier
gam-bette, C. à pieds rouges (F). Common redshank (E).

طائر من الطيطوي . طوله نحو ٢٨ سم . ثوبه الى السمرة
الرمادية الزرنيقية يملو غطالها اسود مستطيل . عتته وبطنه

1٧٥٢٨ - طَيْهَشِيَّة
Spectroscope (F).
Spectroscopy (E).
علم يبحث في طيف النور وهو ما يسمح ويمنح بمجموعة الناصر الكيماوية التي تركب منها الشمس.

1٧٥٢٩ - طَيْهَشَان
Chlamydo-spore
هو الثلاث الايسوي الشكل الذي يلفف ويحفظ وينبت ان القنطور ج. طيلاس.

1٧٥٣٠ - طَيْهَشَانِي
Palléal (F). Palléal (E).
نبت تعريفي يطلق على كل ما هو منسوب الى رداء الزخريعات وضدييات الديلج. كقولك التجوير الطيلساني والاحاساس الطيلساني.

1٧٥٣١ - طَيْهَش هو بشية الدين، اطلها.

1٧٥٣٢ - طَيْهَش
Argile (F). Clay, Argil (E).
الطين اي الصلصال هو سيليكات الالوميلوم المائي يوجد غالباً مخلوطاً باكسيد الحديد واكسيد المنغنيز وغيرها. وهو اذا كثر في التراب صيره منديجاً صلباً. انواعه عديدة تختلف باختلاف مركباته وبقدار كل منها. وهو حل الزان من الاحمر والاخضر والجلوي والاصفر.

1٧٥٣٣ - طَيْهَش، وَحْل، وَحْل
Boue (F).
Diré, Slime, Mud (E).
تراب نام لرج يفسره الماء وقد يسهل على رجة الارض.

1٧٥٣٤ - طَيْهَش غُرَوِي
Bol, Argile ocreuse (F).
Boule (E).
نوع من الصلصال الاحمر المردي الشان النام.

1٧٥٣٥ - طَيْهَش غُرَوِي
Argile colloïdale (F).
Colloidal clay (E).
نوع من الطين القزج النام السهل التشكيل.

1٧٥٣٦ - طَيْهَشِيَّيَا
Tinantis (S). Tinantia (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الوردانيات مقدودة التعريف على اسم العلامة الفرنسي طينان (١٨٠٣-١٨٥٢) انواعها المعروفة قليلة العدد، جميعها سبروتية، مهدا امريكة الوسطى. سورتها غرامه لبدة تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقها سانية تطول نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٣. نصلها جادة الصفة، خلي البشرة العليا، امط السفل. انزعارها عشوي التجميع، تاجي الازنكار. ازهارها زرقاء اللون او بنفسجية في تنويرها يستمر من تموز الى تشرين.

1٧٥٣٧ - طَيْهَش دَبَاغ
Prionus coriarius (S).
Prionus coriarius (F).
حشرة خالصة من فصيلة القرنييات ورتبة مفصليات الاجنحة. موطنها البلاد المعتدلة الحرارة. تالفت الاحراج. خناقها تعيش على غزو ثمار الحموي. يرقاتها تعيش على المواد النباتية المتحللة في جنود وبلوغ الاشجار اليابسة في جسمها كبير القد يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. ثوبها ثنائي اللون، رأسها وزباناها وكوسلها وبطنها وبرازها على السواد اللحمي. ظهرها الى السرة الكتينية. رأسها كبير الجرم. عيناها صغيرتان. زباناها كيرتان. مستطانان الى الوراء، مستطانان عند الذكر و تحيلان عند الانثى. ظهرها مقعوم المخزف اللامع. غذاءها شديدة الصلابة برداها كيرتان القد، حنطة اللون في جيلها لثاني الحول.

انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم اجسامها متوسطة القد تطول من ١٢ الى ١٦ م. ورونها كبيرة، مستعصية. عيونها كبيرة جاسطة، شباعة عند الشقين. قرنها الاستشعارية شديدة التعصر تنتهي بنسيلة دقيقة. اعطالها ولامسها صغيرة. كواسلها مكورة، كثيفة الخمل. بطونها يرمية متكاثفة الخمل. مرزاتها ذبذبة. وراشها كبيرة، مهيجة. قوائمها قشبية. طيراتها سريع الحركة، بعيد الطين في الجملانة تسرح في كل مكان وتصفب ذوات الخاف. البرقة تنتقل باللمس الى اغشية اثم الخاطبة ثم الى المدة حيث تستقر حتى زين الاكمال حيث تخرج مع الروث.

1٧٥٢٠ - طَيْهَشِيَّيَات
Gasterophilidae (S).
Gasterophilidae (F).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع العالم. تالفت الاماكن التي ترافدها الحفريات ان داجنة أو متوسطة اجسامها متوسطة القد، تطول من ١٠ الى ١٦ م. ورونها كبيرة، مستعصية. عيونها كبيرة، جاسطة، شباعة عند الشقين. قرنها الاستشعارية قصيرة. اعطالها ضامرة. ملابسها صغيرة. كواسلها مكورة، كثيفة الخمل التعصر. بطونها يرمية الشكل، متكاثفة الخمل. مرزاتها صلبة. وراشها قليلة التفضيب. قوائمها شبيهة. طيراتها سريعة الحركة شديدة الطين، بعيد الاثى تهريق لكن فردياً على ذوات الخاف. يرقاتها شبه اهلجية الشكل، مبططة، عشارية السكر. تعيش المرحلة الاولى من عمرها في اغشية اثم الخاطبة ثم تنتقل الى المدة تستقر حتى زين الاكمال حيث تخرج مع الروث في انهر اجناسها الطيلين.

1٧٥٢١ - طَيْهَش
Humidifier (F). To damp (E).
لين النني، بواسطة المطيع الذي يؤين الرطوبة اللازمة.

1٧٥٢٢ - طَيْهَش
Spectre (F).
Spectre, Spectrum (E).

1٧٥٢٣ - طَيْهَشِيَّيَات
Rale noire du spectre (F). Spectrum-line (E).

1٧٥٢٤ - طَيْهَش قَسِي، طَيْهَش النُّور
Spectre solaire (F). Solar spectre (E).
مجسمة الاشعة الملوئة الناتجة من تفكيك الضوء الشمسي.

1٧٥٢٥ - طَيْهَش صَوْتِي
Spectre du son (F).
Spectrum sound (E).

1٧٥٢٦ - طَيْهَش ضَوِي
Spectre de la lumière (F).
Spectrum light (E).

1٧٥٢٧ - طَيْهَشَوْر
Aegialitis (S). Aegialite (F).
طائر من طوائف الساق وفصيلة الزرقانيات. موطنه الشطوط البحرية وضفاف الانهر والبحيرات. قوته الحشرات والذعاص والديدان والحوام. يمشي جماعات قليلة العدد في جسمه صغير القد، يطول نحو ٢٠ سم. ثوبه الملوي جبل الطحلة الخضراء الملاج. ثوبه السفلي الى البيضاء الباهي. عنقه مطوق بالاسود. رأسه مبيج بالاسود والجلوي. جناحه ذلق الطرف يلحف الذنب. ذنبه غروي الشكل، صغير الجرم. ساقه تحيلة قيمة سموره اللون.



طير



طيش دباغ

تظهر الحشرة الجملانة في اواسط تموز وتعيش حتى اواسط آب . تسمى في الليل . تسافه بعد ظهورها بامسوح . تروى الحكن في شقوق الشب المطروح ارضاً || البرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٦٠ سم . جسمها غليظ الجرم شبه اسطواني الشكل . خطي اللون ، اسم الرأس عادم الملب والرواجب || طول الاكمام الذي يستمر من ٤٥ سم الى ٥٥ سم يتغذي في التربة فمن صلبة من المواد القليلة واللصوية المجعونة بالرياح .



طيهوج نيشاري

١٧٥٤٣ - طيهوج الفردوس

Oiseaux de paradis (F). Birds of paradise (E).
طيور من مختلف الاجناس والانواع تنتمي الى فصيلة الفردوسيات ورتبة الجواثم . وهي مشهورة بقرمز ارياشها الجميلة الالوان .

١٧٥٤٤ - طيهوج اهليكة ، طيهوج داجنة

Voltailles (F). Poultry, Fowls (E).
هي الطيور التي صار البادعا وتسميتها فاصبحت اليفة تعيش مع الانسان ولا تخشاه كالحمام والدجاج والبهشتيات وبعض القيط والاوز والغنفر .

١٧٥٤٥ - طيهوج لا تحسن بيضها

Oiseaux qui ne couvent pas (F).
الطيور التي لا تحسن بيضها كثيرة المدن تجمعها مشرة اجناس تنتمي الى اربع فصائل : الشبانيات ، الشبانيات الغريزيات والكاروبيات .

اما اجناسها فهي :

Indicateur (F).

الخرميت

Scythrops (F).

الشروب

Méapoda (F).

القبقان

Oxylopho-gal (F).

الصفص

Mégacéphale (F).

الطيطاب

Eudynamis (F).

المنهمس

Molothre (F).

الطاس

Cathérus (F).

النهق

Coucou (F).

الرواق

Leipoa (F).

التيحوج



طيهوج كبير

١٧٥٤٦ - طيهوج هو شجول الحبوب ، اطلبه .

Oiselier (F).

١٧٥٤٧ - طيهوجي

Bird-seller, Bird-fancier

هو بائع الطيور .

Germandrée (F).

١٧٥٤٨ - طيهوجي

هو الطوريون ، اطلبه .

Aunée visqueuse (F).

١٧٥٤٩ - طيهوج

هو الطيطاب . اطلبه .

تظهر الحشرة الجملانة في اواسط تموز وتعيش حتى اواسط آب . تسمى في الليل . تسافه بعد ظهورها بامسوح . تروى الحكن في شقوق الشب المطروح ارضاً || البرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٦٠ سم . جسمها غليظ الجرم شبه اسطواني الشكل . خطي اللون ، اسم الرأس عادم الملب والرواجب || طول الاكمام الذي يستمر من ٤٥ سم الى ٥٥ سم يتغذي في التربة فمن صلبة من المواد القليلة واللصوية المجعونة بالرياح .

١٧٥٤٨ - طيهوج ، غيريس

Tétras (F).
Grouse (E).
جنس طير من عماره الغريسيات وفضيلة الطيوريات له ثوبان الغيتاري والكثير || والطيروج يتميز بكبر الجثة وكثافة الريش . مناره غليظ الخطم الاعلى ، حاد الحلقه ، احفقت البرية . ثوبه متراكب الالوان المختلطة الباقية اللامعة . وهو يختلف بين الذكر والانثى || يأنف الاسراج الجبلية الكثيفة البهجة عن السران . قوته البرام والبار والحجوب والبيضان والحشرات || انشاء تنن في اقموس تدبره بين الخنق والخنق حيث تضع من ٨ الى ١٢ بيضة تحضنها وسعدا نحو ٣ اسابيع .

١٧٥٤٩ - طيهوج ليثاري ، غيريس الشرق ،

ديك التامول

Tetrao tetrix, Lyrurus tetrix (S). Tétras lyre, Petit coq de bruyère, Tétras à queue fourchue, Coq des bouleaux (F).

طائر من الطيور متوسط القد طول الذكر يراوح بين ٤٥ و ٦٥ سم . وطول الانثى ٤٥ الى ٤٥ . ثوبه متراكب الالوان يظلم فيه الازرق الاسفع الملاج والاسود الشديد اللمعة . افنيكه مستدير الريش الجانبي على شكل قيثارة . زيكاه يفضاه الريش وجزءه من مناكبه واباعره || موطنه فسح الارياض . يربط في المراتع القليلة الارتفاع . يكثر وجوده في الشرق .

١٧٥٤٠ - طيهوج كبير ، غيريس الجبل ،


ديك التامول

Tetrao urogallus (S). Tétras urogalle, Grand coq de bruyère, Grand tétras (F). Capercaille, Cock of the wood (E). Auerhuhn (D).

طائر من الطيور . كبير الجثة ، طول يراوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم . ثوبه متراكب الالوان الباقية للامعة . انفيكه اسود اللون مستدير الشكل يتألف من ١٨ ريشة . الانثى اصفر حجباً من الذكر ثوباً الى الصبغة الصفراء يملوه التحشم الاسمر من الرأس الى الاقنيك ومن الحلق الى الزنكي || موطنه شامخ الاطراف يمتد من الهند الى شمالي اوروبة . يأنف الاسراج الكثيفة اعضها اسراج الصنوبر .

١٧٥٤١ - طيهوجيات

Tetraonidae (S).
Tetraonidae (F). Tetraonidae (E).
فضيلة طير من رتبة الدجاجيات اطيائها مختلفة الاجسام



١٧٥٥٥ - ظبياء

الظبياء كراكب .

Acacia mellifera (F).

١٧٥٥٦ - ظبيّة

هي السبط العسل من الاشجار المثرية الزهر التي يكثر وجودها في بعض حشاب جزيرة العرب .

Ajuster (F). To adjust (E).

١٧٥٥٧ - ضبط

Antilope (F). Antelope (E).

١٧٥٥٨ - ظبي *

حيوان وحيد الجنس والنوع من ذوات الظلف المخبرات المحفوظات للقرن . وهو رشيق القوام اهيف القد ، يطول نحو ١٢٠ سم . ويصلو ٨٠ ، بنيأ ذنبه لا يتجاوز ١٦ سم . رأسه معتدل القد ، عظمه مستدير الطرف ، عيناه كبيرتان فرحان . اذناه جالستان محدثان ، جراسمه دقيقة وقوية . ثوبه يختلف باختلاف الشق والمصر ، الذكور البالغة اعين قويا من الاناث والذكور الفتية . قرون ذكورها منتصبة ، متتابة الخيد ، خماسية الدورة اللولبية تطول نحو ٥٠ سم . اما الاناث فجاء الرووس . ثنائية الاخلاف ، فردية الظل . ج طباء .

Cephalophe (F).

١٧٥٥٩ - ظبي اُرُوق

هو الحليم ، اطلبه .

Cervicapre (F).

١٧٥٦٠ - ظبي اسود

هو النفر ، اطلبه .

١٧٥٦١ - ظبي التبت * ، شيرُو

Pantholops Hodgson (S). Pantholops de Hodgson, Chiru, Antilope tibétaine (F).

شيرُو هو الاسم المشهور في بلاد التبت . حيوان لين عَيمَر من الظباء . موطنه نجاد التبت من ارتفاع ٤٠٠٠ الى

Ectoproctes (F).

Ectoprocta (E).

ظاهرات الشرج فئة من الحيوانات الطليعية تتميز بنشوز الشرج خارج لطاق القراس .

١٧٥٥٠ - ظاهرات الشرج

١٧٥٥١ - ظاهرات المتك

Ectognathes, Ectotrophes (F).

رتبة ششرات دابة من طائفة هدية الاذئاب . تتميز بالطلاق متكها . قرونها الاستشعارية عديدة الفواصل خيطية الشكل . اجسامها مستطيلة يكثر فيها الشكل المزدني . جميعها دالة هواكة وبها الناملة والقارصة التي تلمس الكتب والنياب . اجناسها وانواعها زهاء ٣٥٠ تجتمع الى فصيلتين : الشصبيات والظنبويات .

١٧٥٥٢ - ظاهرات زَوَّعِيَّة

Manifestations orageuses (F). Tempestuous manifestations (E).

هي العوامل الجوية التي تسبق او ترافق الزوايع والاعاصير كالرياح والنياب والسحب .

Phénomène (F).

١٧٥٥٣ - ظاهريّة ، مُتَشَع

Phenomenon (E).

هو كل تحول يحدث في حالة الجسم او في خصائصه . فان لم يكن مصحوبا بتغير في طبيعة مادته سمي ظاهرة حكمية (فيزيائية) . اما اذا اقترن بتغير في طبيعته فهو ظاهرة كياوية .

Phénoménisme (F).

Phenomenism (E).

١٧٥٥٤ - ظاهريّة

الظاهريّة وتدعى الحموليّة والمشيّة ، منهج فلسفي يقول بان المعرفة محصورة في الظواهر او في الحوادث الحسية . وهو بذلك يناقض الانتوليوية اي علم الكائنات ذلك لانه لا يبحث في الاسباب وكيّة الانتوليوية .



ظبي



ظبي التبت



طربان

Précaire (F).
Precarious (E).

١٧٥٧٣ - طَرْقِي ، وَلَقِيْ
قابل الإبطال والزال .

Cloportes (F).
Wood-louse, Slater, Sow-bug (E).

١٧٥٧٤ - طَرْصُوط
دويبة من القشريات مساويات الأرجل مشهورة باسم حمار قبان اطلية .

Oniscidae (S).
Oniscidae, Cloportes (F). Wood lice, Sow bugs (E).
Kellersslein, Landasseln (D).

١٧٥٧٥ - طَرْصُوطِيَّات *

فصيلة دويات من القشريات مساويات الأرجل . أجسامها وأرجعها المعروفة قليلة العدد . أصلها البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من المالمين القديم والجديد . أشهر أنواعها الطرموط المعروف بحمار قبان والدركيس .

Koelreuteria (S). Koelreutérie (E). * - طَرْوُ

جس نباتات شجرية من فصيلة البتديات . أنواعها عديدة معظمها سربي وبري . جميعها أشجار وخجيرات مرسة . أوراقها مركبة متعاقبة حاملة . أزهارها مستقلة القلمات ، وبائية الخبيلات ، صفراء اللون ، خشكية التجميع ، ثابجة الارتكاز . أشهر أنواعها ما يلي .

١٧٥٧٧ - طَرْوُ أُسُود هو البكف ، اطلية .

١٧٥٧٨ - طَرْوُ ثُنَائِي الرِّيش

Koelreuteria bipinnata (S). Koelreutérie bipennée (F).
نوع من الطرو ثمرته كبيرة القند تملو نحو ٢٠ م . أصنافها وأزهارها شاذية . أوراقها تملو نحو ٧٠ سم . وريقاتها ثنائية الريش . نصلها يعني الشكل ، مثلثي الحافة ، مائل البشرة . خشاكه الزهرية كبيرة القند قطرها براوح بين ٤٠ و ٥٠ سم . أزهاره يذو طول شهر تموز .

١٧٥٧٩ - طَرْوُ عَشْكَوِيَّي

Koelreuteria paniculata (S). Koelreutérie paniculée (F).
نوع من الطرو ثمرته سبروتية تملو نحو ١٢ م . أصنافها وأزهارها شاذية . أوراقها كبيرة القند ، وريقاتها عديدة وثرية التجميع ، نصلها يعني الشكل ، مسن الحافة ، خل الصفحة لشفل يملو نحو ٩ سم . وبمرس نحو ٥ . خشاكه الزهرية غائرة قطرها نحو ٤٠ سم . أزهاره منثرية يجرسها النمل . أزهاره يستمر من سززان الى تموز .

١٧٥٨٠ - طَرْوُ ثَعْلَكِيَّي

Koelreuteria apiculata (S). Koelreutérie apicula (F).
نوع من الطرو ثمرته سبروتية صغيرة القند تملو نحو ٦ أمتار . أزهارها وأزهارها زياء البلاء . أوراقها صفراء ، وريقاتها أحليبية الشكل ، ضيقة وقرصية ، نصلها خل البشرة عل صفحته . خشاكه الزهرية كثيفة التجميع قطرها نحو ٣٠ سم . أزهاره منثرية يجرسها النمل . أزهاره يستمر من سززان الى آب .

١٧٥٨١ - طَرْوِيَرَه

Helminthosporium (S).
جس طفوط مجهرية من الفريديات فضيلة الطمحات . جربه الكيحية ملونة منصبة حزية التجميع . كائناته طرية أو جانبية الارتكاز ، يضيقة أو مدطانية الشكل ، مرفورة ، شفعية الانقسام . أنواعها عديدة تستغل حل مختلف النباتات ، أعزها وأشهرها ما يتبع .

١٧٥٨٠ م . من صلح البسر . وألف السهل والأودية الرحية الخبجات . يسرح في الصباح ومن العصر الى الغنفة . غنسه الذي يأوي اليه في النهار صغيرة في الرمل تخفيه عن العين . ملجئه الخبجات فريدي ، الذكر لا يقترب من الإناث إلا في زمن الدواق والسفاد ثم يفرقان جسمه متوصلا لقد يطلو نحو ١٢٥ سم . ويرتفع نحو ٨٠ سم . ذنبه ١٨ سم ، قرنه ٦٠ سم . ثوبه الى الصبغة تسمر في الرأس والظهر ويبيض في البطن . حبة الذكر وعصره الى السرة العائفة . قرناه أبيضان ، شديدة السواد اللامع . الأناث جاء ثنائية الخلف تقص شاذتا واحدا في أوائل الصيف .

١٧٥٦٢ - طَبِيحُ الزَّوَر *
Orotrage sauteur (F).
حيوان ليون يجتر من الغطاء يدعى قطار ، اطلية .

١٧٥٦٣ - طَبِيحُ شَيْخَانَه *
Antilope tchikara (F).
حيوان من الغطاء يدعى شخانة ، اطلية .

١٧٥٦٤ - طَبِيحُ عَرَبِيَّي هو الآخر ، اطلية .

١٧٥٦٥ - طَبِيحَه
Biche (F). Hind (E).
أنثى النطس ج غياض وتلبات واطب . كنيها ام الخشت وام شادن رام اللالا .

١٧٥٦٦ - طَبِيحَه
Vagin des solipèdes (F).
Vagina of solipeds (E).

الحياه من كل ذي حافر (السان) ومنرج البردي والجرب والصير وربما كانت الصبوة لكيس اثنت مصفحة ميا .

١٧٥٦٧ - طَرْ ، طَرْوَه
Silax
أحجر الصواني الأحمد الإشراف ج . طران وأطرو .

١٧٥٦٨ - طَرْوُ هو أتراب اليابس من شدة البرد .

١٧٥٦٩ - طَرْب
Butte, Pierre saillante
ج طراب . ما تآ من الحجارة .

١٧٥٧٠ - طَرْبَان * ، طَرْبَان
Ichthyomys (S).
Ichomyx (F). Ichomyx (E).

حيوان من القوام صغير الجثة ، مجسع الرأس ، أسلم الاذنين ، صماء يويان ، أسيد المرأة ايض البطن ، قصير القوائم ، منن أراخه الكريجة . ج طرب .

١٧٥٧١ - طَرْبَان أَمْرِيكِي *
Mephitis (S).
Moufetta, Moufette (F). Shunk (E).

نوع من الطربان يعيش في أمريكا يتصل بأكثر صفات طربان الجزيرة ومنها التثانة التي يفر منها الإنسان والحيوان وثنائه هذه مسدده جرب يحيط بقاعته الذب يجمع فيه مادة سائلة قذرة مدنية التركيب يستعملها الطربان لقلأ عند الحوف والنفاح من النفس . وهو مجسع الرأس . طول الحلم . مستطيل الذنب الكش .

١٧٥٧٢ - طَرْفُورَه *
Petunculus (S).
Pétoucle (F). Petunculus (E).

جس حيوانات مجرية من الرضويات فضليات الحيات وفصيلة الفلكتيا . أنواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في سطر مجار المال . أصنافها شبه مستديرة الشكل ، متساوية المصاريع المخذلة والخفدة . اللبلة . تعيش بين الصخور وفي الرمال البعيدة الدور .



طرزة



طرو

طولها ٧ سم. وعرضها ٣ سم. بيضا تنحرف لونها الى الجوزية يطوقه حمار قاتم || يسبب ذبول الاوراق وقلة الانتاج. يكافح بتطهير البذار قبل ذره .

١٧٥٩٠ - ظُرَيْرُكِل * Zortila (S).
Zortila (F), Skunk (E), Banditais (D).

جنس حيوانات لبونة ضاربة من فصيلة السرمويات انواعه المروفة قليلة اصنافها البذار الافريقية يعي قربة الشبه من التزيب. اجسامها مستطيلة مستقيمة طولها براوح بين ٥٨ و ٦٢ سم. وروسها مخروطية القالب . فوائدها صغيرة، اذنانها جلطة مسانلة الشكل طولها نحو ٢ سم. انثائها الى الصهبة السمراء ظهورها ورووسها مخضلة بالابيض والاسود. قوتها الفار والجرذ والخبز والوزغ والحيات وحبج الحشرات .

١٧٥٩١ - ظُرَيْرُشِي * Zonotrichia albicollis (S).

Chingolo à gorge blanche (F).
طائر من فصيلة الشرشوريات . موطنه بعض مناطق امريكا الجنوبية . يأنف المزارع والاماكن الاكلة كاللدوري . نظامه احيائي حامي || جسمه صغير يطول نحو ١٨ سم. ثوبه العلوي الى الكهكة الخضراء الموحج مغطوا تسبيج اسود. رأسه مرقوش بالكسني والاسود زوره ابيض . عسراه وعنته وصدره الى الريدة . حذقة هيته كسنيته اللون . متقاده ووساه الى السمره . جناحه مستدل الحسم . ذنبه مستطيل الشكل . مفروض الطرف القليل الاستدارة || قوته البود البرية والثار المنية . تقريده مستحب الاالحان الطرفة || يثن عشه في الاغصان والاشجار القرية من سطح الارض . الانثى تبني من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بتأوية الذكر نحو ١٥ يوما .

١٧٥٩٢ - ظُمُنُونُ اُدْهَس * Erythrostrera parva (S).

Erythrostrera rousseti (F).
طائر من الفصايرب الجراثم سيات اللناقية وفصيلة المنيانيات. اصطناع تمتد من الهند الى اوروبا يحرب حضاها وبيهاها ذهابا وايابا كل عام . يأنف الاغصان والنايات . قوته الحشرات المنجية اخصها الذباب || جسمه صغير القد يطول نحو ١٢ سم. ثوبه يتقلع من العمر ويختلف بين الذكر والانثى . الذكر عند بلوغه الاوادك يكون جزوي الرأس والرداء والجناح والذنب . ازرق الحمره . احمر الزور اصفر الصدر . ابيض العين . ثوب الانثى الى الشبهة السمراء تقي في الرأس والرداء وتهيته وتغير في الصدر والعين . يثن عشه في الشجيرات المتصلة الارتفاع بين الاغصان والفروع . الانثى تحضن بتأوية الذكر من ٤ الى ٦ بيضات . التريثم يشمر نحو ١٣ يوما .

١٧٥٩٣ - ظُمُونُ Dromedary de somme (F).
Dromedary de burden (E).
البعير يستعمل ويعمل عليه . ج. ظمن .

١٧٥٩٤ - ظُفَّاف * Eudytes (S).
Gorfou (F), Gorfou (E).

جنس طير من دعيات الريش . كفيات القدم وفصيلة الطرسوسيات . انواعه المروفة قليلة المدد اعطاهما بحار القطب الجنوبي || اجسامها شبه مخروطية الشكل . حسمها حسم البيط المنيول . وروسها صغيرة متوجبة بكشاش ملونة . سناقيها صغيرة جزوية اللون . غفدة الاغصان العليا البائرة السطام .

١٧٥٩٢ - ظُرَيْرُ الثُّومِ * Helminthosporium alli (S).

فطر مجهرى يتطفل على فصوص الثوم فيصطبها || مظهره الخارجي يقع مستديرة او بيضية الشكل تركب فصوص الثوم في طرودا للثوري فتخرج للثوري لشحارة بهد ان تشكها بنشابة هابلية سوداء اللون تنحرفها الى السطح . يكافح بتطهير الفصوص ، قبل زرعها ، بسائل الفوروديل المخلول ٣ / ١ /

١٧٥٩٣ - ظُرَيْرُ الخِيَكِر * Helminthosporium cucumerinum (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق الخيار فيصطبها ويؤدي النبات || مظهره الخارجي يقع فسيحة صفراء اللون قطرها نحو ١٥ م. تركب التصل على صفحته العليا يتأهلها على السفل لطفة خلية رصاصية || يكافح بتطهير البذار قبل استعماله .

١٧٥٩٤ - ظُرَيْرُ الشَّاي * Helminthosporium theae (S).

فطر مجهرى رمي يمتري جنبات الشاي اليابسة فيركب لحاء الجلود والقضبان ويكثر عليها .

١٧٥٩٥ - ظُرَيْرُ القُطْن * Helminthosporium gossypii (S).

فطر مجهرى يتطفل على بعض انواع القطن في ظروف خاصة قوامها مستحسك الجفاف الجوي مغروبا بارتفاع الحرارة واستمرار الارتفاع مدة من اليت || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة وبيدية او قرنزية اللون تركب الاوراق والكتوس الزهرية || اضراره زهيدة لا تستوجب العناية .

١٧٥٩٦ - ظُرَيْرُ المَصَان * Helminthosporium sacchari (S).

Eye spot de la canna à sucre (F).
فطر مجهرى يتطفل على اوراق المصان . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة حمره اللون ، سوداء الحور ، صفراء الحمار تركب تصل الاوراق للفتية على حلو زلها الاخير . اضراره زهيدة لا تستوجب العناية .

١٧٥٩٧ - ظُرَيْرُ المَطَّاف * Helminthosporium heveae (S).

فطر مجهرى يتطفل على المطاط في طوره التشوي . ركب الاوراق فيرتشها يقع صغيرة حمره اللون تتحول تدريجيا الى بقع قديمة تشوه التصل دون ان تؤدي لنبات .

١٧٥٩٨ - ظُرَيْرُ المُرُز * Helminthosporium musarum, H. torulosum (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق وتار المرز || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة سوداء اللون تركب التصل بموازاة اعصابها ثم تنسع فيفسر لونها بهد ان تصعد بشرة البقعة الزرقية || وهو على الجار جناح يحمل غطاء الشرة يتوجهوا الى السوداء القشرة وصفها || يكافح باستعمال سائل بودري المركب ٣ / ٢ / ١٠٠ على ثلاث مرات . الاوى عند ظهور المرض على الاوراق والثانية عند ظهور الطرح والثالثة بعد الثانية باربعة اسابيع .

١٧٥٩٩ - ظُرَيْرُ لَدِي * Helminthosporium turcicum (S).

فطر مجهرى يتطفل على الذرة الصفراء وقد شدد في ظروف خاصة على المنفعة والشيطان والشعر والمسان والارز . مظهره الخارجي يقع قديمة الشكل تركب النصف في نعلها وعنده . تجود ضيقة حمره اللون ثم تستطيل وتنسع فينقل



ظُرَيْرُ المَصَان



ظُرَيْرُ لَدِي



ظُرَيْرُ



ظُرَيْرُ



ظُرَيْرُ اُدْهَس



ظُفَّاف

ألياشيس وفصيلة الكايات. اعطانه تحت من البحر الاحمر الى المحيط الهندي || صفته ميككة ، غليظة ، ثنائية المصارع الاستساوية ، مجهزة بفضلة تشبته . جسمه صلب الجرم ، عادم اللثام ، مستطيل الرجل || يعيش اصلاً بالصخور المنصورة .

١٧٦٠٧ - ظفيرة * هي التنع البري ، اطليه .

١٧٦٠٨ - ظفيرة * Thelyphonus (S).

Thélyphone (F).
حوية سامة من الرتيلات . مهددا البلاد الحارة والاستوائية . تتميز باستطالة الذنب والجرايز || فورها الى الطحلة يفر في الرأس ويسير في البطن وفي اللعاط . لسنتها سامة مؤذية || تسرح في الليل وتأوى الى جلود الاشجار النخرة في النهار ، قتها الحوام والحشرات .

١٧٦٠٩ - ظلّ Ombre (F). Darkness, Shade (E).

الظل هو تقيض للفتح وهو المنطقة المظلمة التي يكتونها الجسم الذي يمتنع سير اشعة النور .

١٧٦١٠ - ظلال

داه في قوائم الدابة لا ين سير ولا من تعب .

١٧٦١١ - ظلع Défaut (F). Default (E).

١٧٦١٢ - ظلع Chaleurs des chiens (F).
هو ملاحظة الكلاب . ويقال للكلبة المستعرة ظالمة . اما الكلب فظالم .

١٧٦١٣ - ظلف Ongle (F). Hoof (E).

ظفر كل حيوان يجتر كالبقرة والشاء والتمز ... وهو كالحافر للفرس وكالغلف للبعير .

١٧٦١٤ - ظليف Rocailleux (F).

Rocky, Pebbly, Flinty (E).
تمت تمريني يطل على كل موقع تكثر فيه الصخور الناشئة .

١٧٦١٥ - ظلف القرس

ظلف القرس نجم ثير من كوكبة الدجاجة .

١٧٦١٦ - ظلم Stevia, Piqueria (S). Stévie (F).

جس نباتات خشية معمرة برية وزيينية من سبيل الغشيات وفصيلة المركبات . الزواحه عديدة . اوراقه ثلاثية العروق . السفلة منها الوسطى متقابلية اما العليا فتتاقية . ازهاره رومبي . رؤوساته مركبة من ثلاث او خمس اذهار متساوية . اشهر انواعه الزينية ما يتبع .

١٧٦١٧ - ظلم أرجواني Stevia purpurea (S).

Stévie pourpre (F).
خشية معمرة زربية جادة تملو نحو ٧٠ سم . ساقها فراءه فارسة . اوراقها غنضة النصل ، خلية البشرة . ازهارها حلقة التجميع ، اريوانية اللون || ازهاره يستمر من آب الى ايلول .

١٧٦١٨ - ظلم عُرْصُفِيّ الزَّوْق

Stevia inaeifolia (S). Stévie à feuilles d'Iva (F).

خشية معمرة زربية جادة تملو نحو ٦٠ سم . ساقها

اعناقها مستطيلة . اجنتها جدافية ، حشفية الريش . اذنانها جداج كاسية . انوثاها علوية ، رؤوسها واعناقها وظهورها واجنتها سود . صغورها ويطونا بيض . كشائنها مذهبة اللون او رمادية او ليلكية || قوتها الاسماك والقرشيات وبعض الرخويات || ملجتها الحياتي جماعي . اسرباها وبالاحرى مستعمراتها تمتد من ٢٠ الى ٣٠ الف نفر .

١٧٥٩٥ - ظفر ، ظفّر Ongle, Sabot (F).

Nail, Hoof, Claw (E).
الظفر مادة قوية تنبت في اطراف الاصابع . ج اظفار واطناير .

١٧٥٩٦ - ظفر العقاب

ظفر العقاب ضرب من الثبات (محيط المحيط) .

١٧٥٩٧ - ظفر القبط Pied de chat

عشبة برية معروفة برجل القبط ، اطليها .

١٧٥٩٨ - ظفر النسر

ظفر النسر ضرب من الثبات (محيط المحيط) .

١٧٥٩٩ - ظفراء * هي التنع البري ، اطليه .

١٧٦٠٠ - ظفيرة

نبات حريف ينفع التروح الخبيثة والتأليل . (السان) .

١٧٦٠١ - ظفيرة العجوز Graine de cribule

هي ثمرة الحسك . اطلب حسك .

١٧٦٠٢ - ظفيرة الزلزال

ظفيرة الزلزال كواكب (محيط المحيط) .

١٧٦٠٣ - ظفوف * Tornatella (S).

Tornatella (F). Tornatella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربل وفصيلة البياغيت . انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مجار البلاد الحارة اخصها الهند والبحر الابيض المتوسط || اصدانها بيضية مستطيلة ، محزنة الاضباب ، مستطيلة التفرعة الاستساوية الرضابة . حيلة التقيح ، زاحية الالوان .

١٧٦٠٤ - ظفبات Myriangiaceae (S).

Myriangiaceae (F). Myriangiaceae (E).
عمارة تطور مجهرية من فصيلة البقيات . اجناسها وانواعها عديدة . اجربها الزقية كروية الشكل سطحية الارتكاز . انثاتها ريمية . ذكاتها احليلية . غلاتها غشائية المادة ، نصفية ، مستعرضة منها نوع واحد مؤذ يدهى اللصق .

١٧٦٠٥ - ظفبجور ، زأكدة Onglet (F). Mitro (E).

جزء الحاق الملحمة الذي يترك وتياً فوق العلم ، وهو أيضاً ما يترك من الصنن المثلث فوق آخر عين .

١٧٦٠٦ - ظفبر * Cleidothserus (S).

Cleidothère (F). Cleidothserus (E).

حيوان بحري ويده الجلس والنوع من الرخويات صفيليات



ظفوف



ظلم



ظفيرة

اصطابتها بعض مناطق البلاد الحارة والاستوائية من الماعلين القدم والجدي || أجسامها متوسطة القد تطول من ٣ الى ٤ سم. رؤوسها صغيرة. عينها باسطة. قرونها الاستشعارية صغيرة الأطراف. تأثير الذكور مستطيلة شليمة. كرومها كبيرة غنية. أخادعها لاسعة. أنثاها متباينة الألوان منها الأحمر الاصفر الموالج والاصفر والبنيجي والذهبي || تألف الحراج الجبلية ولا تقرب السنوبريات. تعيش في جلد الحراج النخرة. يرقاها غاشية مؤذية.

Collet de l'arbre (F).

Neck of the tree (E).

هو اصل الشجرة اري مركز انتشاب الجلود على الجلد.

١٧٦٢٩ - ظِّلْب

١٧٦٣٠ - ظِّلْبَارٌ عَشْكَارِي النُّقْطَ *

Zonabris decimpunctata (S). Zonabris à 10

points (F). Zonabris decimpunctata (E).

حشرة طيبة واثمة خاضعة واثمة من فصيلة الملويدات ورتبة مفدمات الاجنحة. موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط. غنائها تعيش على بتلات الاعراة وعلى التوايح. يرقاها تعيش في اول بعدها على المواد المضوية ثم على ما تستطيع اقتناسه من الحشرات الدنيا. الخفضاء التي تفرز عند لمسها مادة صفراء اللون كريمة الرائحة وحموي في شوارها وفي جهازها الدرسي مادة ناعقة تخرج بشرة الجلد وتثير الباء والايلاج || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٤ مم. ثوبا اسود الرأس والكرميل والين والبرامز. اصفر الظهران المنقط بالاسود. رأسها صغير الجسم. زباناها صولجانيان. عينها صغيرتان. ظهرها ممتلئ الاحدياد. مستطير الطرف للاسفل. غندامها خمسينا المنقط السود || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتعيش حتى اوخر تموز. تسرح في النهار. تسافد يده ظهورها بخلافة اسابيع وتتبع المكن تحت غطاء الاجزاء وتفسوها وتحت الجملانة || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢٠ مم. جسمها مبسط الشكل، سداسي الرؤوس، اغبر اللون. اسمر الموالج، عناي الرأس، ضليح انتاكثير || طول الاكمال الذي يستمر نحو ٤٥ يوما يتقضي في التربة.

Heteropatella (S).

١٧٦٣١ - ظِّلْبَة *

جنس تطور مجهرية من فصيلة الدلايمات. بكتيدات سطحية الاركانز. كرشية الشكل، جلدية الجلود الاسود، كروية الانقلاق. بوياتها قوسية الاحدياد، هليية الاطراف، مؤثورة الانقسام، شفاقة || انواعه المؤذية قليلة لغرضها ما يتبع.

١٧٦٣٢ - ظِّلْبَة القَرْفَل *

Heteropatella dianthi, H. valtellinensis (S).

نظر مجهرية يصيب اوراق القرنفل فيعطها ويمنها عن التيام برطوبتها || يبدو على الاوراق في اول عهده لطفاً مستطيلة محتلة اللون ثم غبراء تركب ساقه التصل الى كامل زامة الاعل || وهو في طوره الثاني نقط سمير تملو اللطخ تقسب انتسداد البشرة وانتزاع النسيج || يكافح بنفسه القتيل باسدة القواوير الخففة وذلك بعد انتفاع الاوراق الموسوية. ومن الضروري انتفاع الاوراق عند ظهور اللطخ.

١٧٦٣٣ - ظِّلْبَة السَّيَم *

Heteropatella antirrhini (S).

نظر مجهرية يصيب اوراق السيم فيعطها بعد ان يقرح

فرواه زياه. اوراقها عرسية الشكل، مستطيلة التصل، دقيقة الزام الاخير. انزعاما يفضاء اللون، خلية البيرة. انزعاما يستمر من تموز الى تشرين الاول.

Stevia eupatoria (S).

Stévia eupatoire (F).

حشة عمرة زيبية جادسة تملو نحو ٦٠ سم. ساقها فرواه مرطاه. اوراقها سنائية التصل. سفة الزام الاخير. انزعاما ودية اللون || انزعاما يستمر من تموز الى تشرين الاول.

Stevia serrata,

١٧٦٢٠ - ظِّلْمٌ مُسْتَنّ

Piqueria trinervia (S). Stévia denticulée (F).

حشة عمرة زيبية مبروية تملو نحو ٥٠ سم. ساقها وفروها خلية السماء. اوراقها متعاقبة، نصلا سنائي الشكل، ملس البيرة، مسن الحافة. انزعاما حر. انزعاما يستمر من تموز الى ايلول.

Solidages (F).

١٧٦٢١ - ظِّلْبَات

رتبة من المتكويكات ترطب في الظل وتخشى الشمس.

Umbraticole (F).

١٧٦٢٢ - ظِّلِيل

نمت تفرغي يملئ كل حشرة تعيش في الظل وعلى كل نبات ينمو في ظل غيره.

Pénombre (F).

Penumbra, Semi-darkness (E).

هو الظل الخفيف او شبه الظل الذي يحوق بالظل.

١٧٦٢٤ - ظِّلْمٌ، عَسَلَقٌ، عَسَلَقٌ

Austruche (mâle) (F). Ostrich (male) (E).

ذكر النامج اعظمه وظلائ. يقال عار الظلم حراراً اذا صوت.

١٧٦٢٥ - ظِّلْمٌ

شجرة على صورة الدلب. وهي ايضاً شجرة التين في نسة طينة. الراسدة ظلمة او ظلمة. ومنهم من قال شجرة الساق.

١٧٦٢٦ - ظِّلْمَحَة ذَهَبِيَّة الرُّقْ *

Castanopsis chrysophylla (S).

Castanopside à feuilles dorées (F).

شجرة حرجية وفريينة من فصيلة السوليات. ساقها غليظة صلبة تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم. هيكلها دائج الثخون. اوراقها تطول من ٨ الى ١٨ سم. وترتفع من ٤ الى ١٠ سم. نصلا جرداء لامة، صفحاها العليا الى اخضر الزيني صفحاها السفلى الى الصفار الذهبي. ثمارها قريبة الشبه بالكستنة لكنها بطيئة النمو لا تنضج الا بعد مرور سنين كاملين.

١٧٦٢٧ - ظِّلْمِيَان

شجر ينبت بنجد يشبه القرظ (السان) والقرظ هو السنط البري.

١٧٦٢٨ - ظِّلْبَابَة

Lamprima (S).

Lamprime (F). Lamprime (E).

جنس حشرات غاشية من عدييات الاجنحة صفيميات للثرون وفضلية المنظويات. انواعها المعروفة قليلة المدد



نَبَار عَشَارِي النَقْط



ظِّلْبَةُ الْقَرْفَل



ظِّلْبَةُ السَّيَم

تجمع المكان في لحاء سوق الأشجار تقيتف فيها ويحلبها ويسحبها || أشهر أنواعها وأهمها انتشاراً اللغة المنزلة .

١٧٦١١ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** *Emphytus cinctus* (S).
Emphyte cinct (F).

نوع من الفُطْرِيَّة ، ثوبها إلى السمرة السوداء يعلو تزوير أصفر || يرقاتها شديدة الأذى تعيش على سوق النبات تستلج اللحاء والشكير .



فُطْرِيَّة اسطواني

١٧٦٤٢ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** * *Pleurodelus* (S).
Pleurodèle (F). *Pleurodelus* (E).

ظهور هو الاسم للفربي القليل . جنس حيوانات مدنية قازية من السرفقيات وعضلة السمكيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد أعطتها بعض مناطق إفريقية الشمالية أخصها المغرب || أجسامها مستطيلة الشكل ، تطول من ٢٠ إلى ٢٢ سم . رؤوسها مقطوعة ، شبه مقطوعة الإخطام . أذنانها مستطيلة ، رقيقة ، مسنة الحمار العلوي . أنبوبها مزرقة وسنجة وبديعة || تألف المنافع كندوران والأولاد . قوتها البهتان واللباعيط والحوام التي تنفق على وجه الماء .



فُطْرِيَّة كذاب

١٧٦٤٣ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** هو الجانب التسمير من الفريش .

١٧٦٤٤ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** *Epithélium* (F). *Epithelium* (E).
كل نسج مكون من حبيبات أو خلايا صليبية التجميع تلتف أو تبطن الأجزاء الحية .

١٧٦٤٥ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** *Epithélial* (F). *Epithelial* (E).
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالظهارية .

١٧٦٤٦ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** *Dos* (F). *Back* (E).
هو الجانب العلوي المقابل للبطن عند الحيوان يمتد من الحمارك إلى الكفعل .

١٧٦٤٧ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** *Elytra* (F). *Elytron* (E).
الظهور هو النمد الخشبي القلبي التركيب الذي يلف جناح الحشرة من غديات الإجنسة . وهما ظهران وظهران وبه في المصغر من اجنسة الجراد ما حريفه ، وقاليلطيان يقال لها الظهران والرقيقان يقال لها القشران .



فُطْرِيَّة بحري

١٧٦٤٨ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** ظهر الامد يجير ثمر من كوكبة الامد الاصفر .

١٧٦٤٩ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** *Tortus* (F). *Tortoise* (E).
هي السلحفاة ، الطحبا .

١٧٦٥٠ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** *Dorsal*
نمت وصفي يطلق على كل ما له صلة بظهر الحيوان .

١٧٦٥١ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** *Ficoïdaceae* (S). *Ficoïdées*, *Mesembryanthemaceae* (F).
Ficoïdaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجسامها وأنواعها المعروفة زهاء ٨٠٠ معظمها بري وبضها جلي وزراعي وربي . أعرف اجسامها الفلورية .



ظهور

١٧٦٥٢ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** *Mesembryanthemum* (S). *Ficoïde* (F).
ج. ظهور . الاسم العلمي من الفلوري يمتد بجمعة زهرة مستصفت

لها أي زهرة الظهر . جنس نباتات عشبية ليفية لحمية

نصلها || مظهر الخارجي يمتد صخرة مستديرة قشرها نحو ٤ م . تركيب نصل الأوراق تنغصفي على النجج المنحارة التي تيسر وتنحت || يكتمل عند ظهوره باقتطاع الأوراق الموصونة وينفخ الشبل يابس القنواطير المتعالة .

١٧٦٣٤ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** *Tibia* (F). *Tibia* (E).
الفُطْرِيَّة عند الحشرات العضو المستقيم الكائني بين النقط والرسغ . ويديم الساق .

١٧٦٣٥ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** *Machilis* (S). *Machile* (F).
جنس حشرات دابة من فصيلة الفُطْرِيَّات . أنواعها مدنية جميعها خاشعة ودائمة تعيش على الليل ولحاء الأشجار للمقطوعة . اجسامها حشوية الجلد ، منزلية لشكل تطول من ٧ إلى ١٦ م . | أعراف أنواعها وانسجها ما يلي :

١٧٦٣٦ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** *Machilis cylindrica* (S). *Machile cylindrique* (F).
نوع من الفُطْرِيَّة طولها يراوح بين ٨ و ١٢ م . جسمه اسطواني الشكل ، ثوبه إلى الصبغة المائقة الحليقة المراج . يكثر في البيض والأندال وسباجيات الجناح . يعيش على المواد العضوية السائرة إلى الإختلال وصل لحاء النباتات اليابسة والمقطوعة .

١٧٦٣٧ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** *Machilis polypode* (S). *Machile polypode* (F).
نوع من الفُطْرِيَّة طولها يراوح بين ٩ و ١٢ م . ثوبه إلى الصبغة يعلوها مراح أشعث وبيض سمير جانبة . ملامحه وزبانه وقوائمها وأسراكه حمرة بالابيض || يكثر في الغابات والاحراج . يعيش على الليل وجميع المواد العضوية السائرة إلى الإختلال .

١٧٦٣٨ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** *Machilis maritimus*, *Petrobius maritimus* (S). *Machile maritime*, *Pétrobie maritime* (F).
نوع من الفُطْرِيَّة طولها يراوح بين ١٠ و ١٤ م . ثوبه إلى السمرة الصفراء المراج ، زبانه وقوائمها سوية اللون الحليقي المائقي . أسراكه حمرة بالابيض || يكثر قرب الشواطئ البحرية وفي الجرف وصل غصاف الأنهر .

١٧٦٣٩ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** *Machilidae* (S). *Machilidæ* (E).
فصيلة حشرات من رتبة طعرات المك . اجسامها وانواعها عديدة تتميز باجسامها المزدنية الشكل . أمتاعها وتكاثرها ولباسها الكبيرة كبرية اللد ، زئانها ثلاثية التركيب . جواشها عديدة . راجعها مستطيلة ، حلقاتها مستديرة . أطرافها الشرجية ثلاثية الزوائد الذيلية ، مستطيلة الاطوار الدقيقة الذرية || أشهر اجسامها الاقتصادية الفُطْرِيَّة .

١٧٦٤٠ - **فُطْرِيَّة مَرْكَبَة** *Emphytus* (S). *Emphyte* (F). *Emphytus* (E).
الواحدة طغفة . جنس حشرات مؤذية من فصيلة المنشاريات ورتبة غشائيات الاجنسة الاثريات . أنواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في الشرق الأوسط وأروبية وإفريقية الشمالية || اجسامها صغيرة مستطيلة تطول من ١٠ إلى ١٢ م . يسلطها قرواح من ١٨ إلى ٢٠ م . أنبوبها إلى المواد الخشنة المماثل وسها الحمضة والمزرة بالابيض والاصفر || انثائها اكبر قدماً من ذكورها وتكثر بمرزاتها المنشارية . اجيالها الحولية تراوح من اثنتي إلى ثلاثة ||

نحو ٢٥ م. سطحها أخضر اللون ، اغبر المواج ، زهرتها
حامية الازتكاز ، قرمزية اللون ، قطرها نحو ١٠ م.

١٧٦٦٠ - ظَهْرَةٌ تَلَسِيَّةٌ

Mes. testiculare, Argyroderma roseum (S). Ficoide
testiculare (F).

نبته تزيينية شاذلة مقررة . اوراقها قتل حلالية الشكل او
تلسية طولها نحو ٥ م. عرضها ٣٥ وسمكها ٢٥
م. سطحها يجرى اللون مبهر الزغب . ازهارها وردية اللون .
اريجوانية المواج . قطرها نحو ٢٥ م || ازهارها شوي .

١٧٦٦١ - ظَهْرَةٌ تَلَسِيَّةٌ

Mes. gaminum, Gibbacum gaminum (S). Ficoide
jumele (F).

نبته تزيينية شاذلة مقررة . اوراقها غرولبية الشكل ثنائية
التجميع تطلو نحو ١٥ م. ازهارها صغيرة القد ، قرمزية
اللون || ازهارها يستمر من آذار الى ايار .

١٧٦٦٢ - ظَهْرَةٌ ثَلَاثِيَّةُ الْقَصَصِ

Mes. bilobum, Derenbergia biloba (S). Ficoide bl-
lobée (F).

نبته تزيينية شاذلة مقررة تملو نحو ٤ م. تتركب من
قرص جلعي تملوه فلتان ملفطحتان متحمدا القاعدة
توصلها زهرة جملة ، كبيرة القد ، صفراء اللون . اما
القلعة فبشيرة اللون ، ثنائية التجميع الطري || ازهارها
يستمر طوال تشرين الاول والثاني .

١٧٦٦٣ - ظَهْرَةٌ حَصْبِيَّةٌ

Mes. calculus, Conophyllum calculus (S). Ficoide-
calicou (F).

نبته تزيينية شاذلة . جلدها فلتة حصبية الشكل سطحها
مالس البشرة ، أخضر اللون ، احر المواج . طولها نحو
٣ م. تملوها زهرة صفراء اللون قطرها نحو ١٢ م.
زهرتها تنوم من آب الى تشرين الاول .

١٧٦٦٤ - ظَهْرَةٌ عَدْرُوفِيَّةٌ

Mes. turbiniforme, Lithops turbiniformis (S). Fi-
colde en coupe (F).

نبته تزيينية شاذلة . جلدها فلتة تملو وترعرع نحو ٢٥ م.
سطحها مالس البشرة ، ابر اللون . حتماها اغنيش وبادي .
زهرتها حامية الازتكاز، صفراء اللون ، قصيرة الاذان ،
قطرها يراوح بين ٣٥ و ٤٠ م.

١٧٦٦٥ - ظَهْرَةٌ تَلَسِيَّةٌ

Mes. velutinum, Gibbaeum velutinum (S). Ficoide
veloutée (F).

نبته تزيينية شاذلة مقررة . اوراقها ناعشة ، مثلثة الشكل ،
خلية النصل ، طولها الاكبر نحو ٩ م. ازهارها مستطيلة
الاذن ، بيضاء اللون ، قطرها نحو ٥ م || ازهارها
يستمر من آذار الى نيسان .

١٧٦٦٦ - ظَهْرَةٌ خَيْمِيَّةٌ

Mes. umbellatum, Ruschia umbellata (S). Ficoide
en ombelle (F).

جملة تزيينية جادة تملو نحو ٩٥ م. اوراقها متقابلة ،
متصالبة ، اصصية الشكل ، ثنائية الزوايا ، تطلو نحو
١٦ م. تصلها أخضر زاه || ازهارها خيمية التجميع ،
بيضاء اللون ، صغيرة القد || ازهارها يستمر طوال
فصل الصيف .

برية وزراعية من فصيلة التهريرات . انواحه نحو ٣٠٠
م. سطحها من النباتات الافريقية المنبت . اوراقها غريبة
الاشكال المختلفة الحية والقدر . ازهارها كبيرة القد وردية
اللون او مرجانية واريجوانية وصفراء || اكثرا من النباتات
المعرة وبعضها يحول وسوي . اشهرها ما يتبع .

Anserina (S).

١٧٦٦٣ - ظَهْرَةٌ ٥

Anserina (F). Anserina (E).

جلس حيوانات بحرية من الرغويات مهدبات الازبل
وفصيلة اللاميات . انواعها الماهرة المعروفة قليلة العدد
اعطائها البحر الابيض المتوسط واغيط الاطلسي || اصداها
شبه وسمية الشكل مسترخية الجناح الايمن الثاني الزوائد
الرغوية الشكل || اجسامها حلزونية ، رؤوسها مستطيلة ،
مقطوعة ، ثنائية القراس المنوية . لاسها مستطيلة دقيقة .
اورطها بيضية القواعد يملوها اسقاط قرينة المادة .

١٧٦٦٤ - ظَهْرٌ

الظهي نبات شبه القبار او الكبر (محيط المحيط) .

Mesembrian-
themum coccineum (S). Ficoide écarlate (F).

جملة تزيينية فرعاء تملو نحو ٨٠ م. جلدها وفروصها
دقيقة . اوراقها صغيرة القد ، تصلها الى الخضار الازرق
اللامع . ازهارها ارجوانية اللون قطرها نحو ٤ م.
ازهارها يستمر طوال الصيف .

Mes. aloides,
Nananthus aloides (S). Ficoide-Aloés (F).

نبته تزيينية شاذلة مقررة . اوراقها قتل الوية الشكل ، فسية
التجميع ، حلبيية الصمغة ، غضراء اللون ، تطلو نحو
٥ م. ازهارها قصيرة الاذن ، صفراء اللون ، ارجوانية
المواج ، قطرها نحو ٢٥ م. || ازهارها يستمر من آب
الى ايلول .

Mes. tigrinum,
Foucaria tigrina (S). Ficoide-Tigre (F).

نبته تزيينية شاذلة مقررة . اوراقها قتل ضمية بيضية
الشكل ، مسنة اللقطة ، تصلها الى الخضار البشري
يملو تجلجع ثني يحوم اطراف احر . ازهارها متوسطة الاذن ،
كبيرة القد ، قطرها يراوح بين ٥ و ٧ م. لونها الى
الاحمر المرجانية || ازهارها يستمر من آب الى تشرين
الاول .

١٧٦٦٨ - ظَهْرَةٌ بِلُورِيَّةٌ ، حَصْبِيَّةُ الْبِلُورِ ،
حَصْبِيَّةُ الْبِلُورِ ، غَسَاوِلُ الْفَرْجِي

Mes. crystallinum, Cryophyllum crystallinum (S).
Ficoide glaciale, F. crystalline, Herbe à la glace.

Glaciale (F). Ice plant, Diamond ficoïdes (E). Eis-
kraut-Micageblume (D). Cristallode, Diacloia,
Erba crystallina (I).

عشبة برية وزراعية صناعية يستخرج من عصارة اوراقها
املاح قلوية تدخل في صناعة البلور || اوراقها كبيرة
القد ، ناعشة ، متحمبة للنصل الكثيف الحلييات البلورية .
ازهارها صفراء القد ، بيضاء اللون ، خيمية النبات .
ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٧٦٦٩ - ظَهْرَةٌ بَيْضِيَّةٌ

Mes. oviforme, Oophyllum oviforme (S). Ficoide
ovoïde (F).

نبته تزيينية شاذلة مقررة . جلدها فلتة بيضية الشكل تملو



نُظُورٌ بِلُورِيَّةٌ

اسطوانية ، مقطوعة ، عادمة الحلب . أزهارها صغيرة التذ
قصيرة الاذن ، ابطية الارتيكاز ، يفياد اللون || تستعمل
كالكاسولوك وفي مودة اليوك تفيد الممعة وصر الحفم .

١٧٦٧٤ - ظهيرة قارية

Mes. murinum, Stomatium murinum (S). Ficoide
souris (F).
نبته ترينينية شاذلة مقررة . اوراقها قتل غارية الشكل
سنة الخنار ، ربادية اللون || زهرتها مسكية العرف ،
مستلة التذ ، لونها الى الصفرة الباهتة || ازهارها صبي .

١٧٦٧٥ - ظهيرة قشدية

Mes. echinatum, Delosperma echinatum (S). Ficoide
hérisson (F).
بجلة ترينينية قنفذية الشكل تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها
اسطوانية تملو نحو ١٣ م . قواعدها مهدبة شائكة ،
تصلها طليعية البشرة ، زها الحليات || ازهارها فردية
التجميع ، يفياد اللون ، صنية التذ ، قصبة الاذن .
ازهارها يستمر طوال السنة .

١٧٦٧٦ - ظهيرة مثمرة

Mes. edule, Carpopotus edulis (S). Ficoide-figue
F. comestible, Figular des Hottentots (F). Hottentot
fig, Sour fig (E). Hottentottenfaige (D). Fico degli
tontottoti (I).
بجلة زراعية مأكلة الثمار ، تملو نحو ١٠٠ سم . ماتها
فراء . فروصها مبطة مستطيلة غائرة . اوراقها متعاقبة ،
متشاككة ، اصصية الشكل ، ثلاثية الزوايا . سنة
الخنار تملو من ٨ الى ١٢ سم . || ازهارها كبيرة التذ
قترها نحو ١٠ سم . لونها الى الصفار الباهت واملو مواج
وردي . ماتها شفعية التجميع عددها يراوح بين ١٠ و ١٢ .
ثمارها جوزية الشكل والذد مأكلة مسكرة العلم .

١٧٦٧٧ - ظهيرة مقطوعة

Mes. truncatellum, Conophytum truncatellum (S).
Ficoide tronquée (F).
نبته ترينينية شاذلة . سبلها قلة كروية الشكل مقطوعة
القاعدة قترها نحو ١٢ سم . سطحها اخضر اللون مزركش
بالجزوي . زهرتها صفراء ، قترها نحو ١٥ م . || ازهارها
يغوم من آب الى تشرين الاول .

١٧٦٧٨ - ظهيرة مشكادية

Mes. rostratum, Chiridopsis rostrata (S). Ficoide
à bec (F).
نبته ترينينية شاذلة مقررة ، اوراقها قتل مقررة صنية
التجميع ، لا تقليسية الحجم ، حليقة الخنار ، الحسري
مهدبة الخنار . زهرتها فردية ، مستطيلة الاذن ، كبيرة
التذ صفراء اللون ، قترها يراوح بين ٨ و ١٠ سم .
ازهارها ربيعي .

١٧٦٧٩ - ظهيرة تسيلكة

Mes. nobile, Pleiospilos nobile (S). Ficoide noble (F).
نبته ترينينية شاذلة مقررة . اوراقها قتل مسية التجميع
عززية الشكل . تصلها عابق الخنار الحسري ، اغبر
الخنار ، بطول نحو ٥ سم . زهرتها صنية ، كبيرة التذ ،
صفراء اللون ، قصيرة الاذن ، قترها نحو ٥ سم .
ازهارها عريخي .

١٧٦٨٠ - ظواهر

Météores (F). Meteors (E).
جبع الخواثد الطليعية الجوية المرتبط وتوها كالمسافة
والبحر وقوس قزح والمطر والتلج والبرد الخ .

١٧٦٦٧ - ظهيرة جذرية

Mes. noctiflorum, Aridaria noctiflora (S). Ficoide
nocturna (F).
بجلة ترينينية فراء تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . اوراقها
احليلبية الشكل تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . تصلها الى
الخنار البحري الاحمر المواج || ازهارها دجوية
الانلاج ، يفياد اللون ، فواصة العرف المطري . قترها
يراوح بين ٣٠ و ٤٥ م || ازهارها يستمر طوال
فصل الصيف .

١٧٦٦٨ - ظهيرة رؤسية

Mes. capitatum, Conicosia capitata (S). Ficoide à
rosette, F. à fleurs capitées (F).
بجلة ترينينية معمرة تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها اصصية
الشكل ثلاثية الزوايا تملو من ١٢ الى ١٨ سم . تصلها
الى الرتبة العلواة . ازهارها رؤسية ، قترها نحو ٥ سم .
لونها الى الصفرة الناعية || ازهارها يستمر من تموز
الى آب .

١٧٦٦٩ - ظهيرة زعفرانية

Mes. croceum, Hymenocyclus croceus (S). Ficoide
safranée (F).
بجلة ترينينية تملو نحو ٦٠ سم . ماتها فراء متشعبة ، اوراقها
متعاقبة ، اصصية الشكل ، ثلاثية الزوايا ، قصيرة التذ ،
باهتة الخنار ، سمراء الخنار || ازهارها فردية التجميع
قترها نحو ٣ م . لونها الى الصفرة الزعفرانية || ازهارها
يستمر طوال الخريف والشتاء .

١٧٦٧٠ - ظهيرة شاككة

Mes. spinosum, Ebaranzia spinosa (S). Ficoide
épineuse (F).
بجلة ترينينية فراء تملو نحو ٦٠ سم . جلها وفروصها
شاككة . اوراقها قتل صفيرة تملو نحو ٢ م . تصلها
بحري اللون تملو رقة سمراء || ازهارها صفيرة التذ ،
وردية اللون ، صفراء المواج || ازهارها ربيعي .

١٧٦٧١ - ظهيرة صلبة

Mes. validum, Cephalophyllum disaemile (S). Ficoide
robuste (F).
بجلة ترينينية جلها يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها
اسطوانية الشكل تملو من ٥ الى ٨ سم . لونها الى الخنار
الزاهي تملو ثفة فضية دقيقة || ازهارها وردية اللون ،
متوسطة الحجم ، دقيقة الاذن التي يراوح طولها بين ٥
و ٨ م . || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١٧٦٧٢ - ظهيرة عطرية

Mes. fragrans, Gloetphyllum fragrans (S). Ficoide
parfumée (F).
نبته ترينينية شاذلة مقررة . اوراقها قتل لا قليسية الحجم
ينطب فيها الشكل السنائي . طولا يراوح بين ٥ و ٧ سم .
عرضها من ٢ الى ٣ سم . ومها كيتها نحو ١٢ م . زهرتها وصيدة ،
قصيرة الاذن ، كبيرة التذ ، عطرية العرف ، قترها
يراوح من ٨ الى ١٢ م .

١٧٦٧٣ - ظهيرة عقديّة * ، ملّة ، غاسول

Mes. nodiflorum (S).
مصري
Ficoide à nœuds fleuris (F). Egyptian fig-marigold (E).
Agyptisches kalikraut (D). Erba dei nodiflori (I).
عشبة برية تملو من ٢٠ الى ٢٥ سم . منها البرال ،
مهدبا شواطئ البحر المتوسط ، فروصها غائرة . اوراقها



ظهيرة مقدية

بعض مناطق أفريقية الجنوبية . سيقها جلمورية مدادة أو مكشكة قوصية الشكل . أوراقها سيقية النصال و مزوجية التصنيف . أزهارها سداسية البتلات اللائسوية الحجم ، ثلاثية الاسدية ، عديدة الالوان . تزورع لقزوين في الحدائق والمراكن || أنواعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية :

١٧٦٨٩ - ظُوبَرَة نَسَائِيَّةُ الْوَن

Moraea bicolor (S). *Morée bicolore* (F).
نوع من الظُوبرة . جلمورها مداد . شراغها يرتفع من ٣٠ الى ٩٠ سم . أوراقها عديدة ، ضيقة النصال ، جميلة الخضار اللامع . أزهارها كبيرة القذ ، قطرها نحو ٥ سم . لونها اصفر وأسد || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٧٦٩٠ - ظُوبَرَة شِرْعَافِيَّة

Moraea spathacea (S). *Morée à spathe* (F).
نوع من الظُوبرة . جلمورها مداد . شراغها يرتفع من ٦٠ الى ١٠٠ سم . وقتها واحدة سيقية النصل الجسري الخضار . أزهارها صفراء اللون . عطرية العرف || تنويرها يستمر طوال شهر أيار .

١٧٦٩١ - ظُوبَرَة طَارُوسِيَّة

Moraea pavonia (S). *Morée pson* (F).
نوع من الظُوبرة . جلمورها قوصي الشكل . شراغها يرتفع من ٣٥ الى ٦٠ سم . وقتها واحدة سيقية النصل المزجج . أزهارها حراء اللون يملوها عند قواعدها يتبعج اسود مخضب بالازرق والاصفر || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

١٧٦٩٢ - ظُوبَرَة مَهْدَبِيَّة

Moraea fimbriata (S). *Morée frangée* (F).
نوع من الظُوبرة . جلمورها مداد . شراغها يملو من ٢٥ الى ٤٥ سم . أوراقها عديدة ضيقة النصال الجمادة المهدبة الخفاف . أزهارها مستدة الحجم . قطرها نحو ٥ سم . لونها الة اليلكي الزاهي || تنويرها يستمر طوال شهر أيار .

١٧٦٩٣ - ظُوبَرَة

دعامة تين الى جانب حلقط ليعم عليها .

١٧٦٩٤ - ظُوبَرَة

Gymnosporangium (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة السحليات تتميز باستغلالها التطوري وبانتقاء البتانات المتحارة التي تصبغ في كل طور . فين هي تتطفل على الورديات في طورها الاندي اذ بها تتطفل على حريانات اللور في طورها الدعامي . طورها الفشوي لا نظامي الادوار وقد يطول عدة اسابيع . مظهرها الخارجي يقع مستدرة ثم شماليه ودولية الشكل لاقياسة التصبغ غلامية للمادة المتخللة . شبيها الفطري يعيش ويتكاثر على خلايا النسيج النباتية || أنواعها المؤذية عديدة أشهرها اقتصادياً ما يلي .

١٧٦٩٥ - ظُوبَرَة الإِجاص

Gymnosporangium sabinae, *Rostelia cancellata* (S). *Rouille grillagée du poirier* (F). *Pear rust* (E). *Birnekrankheit* (D).

فطر مجهرى يصيب الإِجاص والمرض والقراق والأجل فيؤذي الارواق والانتاد والآبار || مظهره الخارجي على الارواق ، في طوره الاندي ، بقع مستدرة قطرها يراوح

١٧٦٨١ - ظُوب - هو صلح التيس عند الحياج .

١٧٦٨٢ - ظُوبَاء * *Alstromeria* (S). *Alstromère* (F). *Alstromeria* (E).

جنس نباتات عشبية مبروية من فصيلة الترجيبات . موهها بعض مناطق أمريكا الجنوبية . سيقها موقرة . لورائها مستطيلة النصال . أزهارها قمية الشكل ، متباعدة الالوان الزاهية || تزورع لقزوين في الحدائق وضمن البيوت . تروث في الاتربة المنسوبة للتركيب التصري الوفارة المواد الغذائية المشوية والمعدنية || أنواعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية :

١٧٦٨٣ - ظُوبَاء بِرُتَقَالِيَّة

Alstromeria aurantiaca (S). *Alstromère orangée* (F).
نوع من الظُوباء منبتها الشيلي والبيرو . شراغها منصب يرتفع من ٦٠ الى ١٢٠ سم . لورائها مستطيلة النصال لضيقة ، عابقة الخضار في الصفحات العليا ، بحريته في النصل ، تطول من ٧ الى ١٠ سم . وتعرض نحو ١٥ سم . أزهارها صيرالي التصبج . أزهارها يرتقالية اللون || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

١٧٦٨٤ - ظُوبَاء حَمْرَاء

Alstromeria hamantha (S). *Alstromère rouge sang* (F).
نوع من الظُوباء . منبتها يمتد من الشيلي الى البرازيل . شراغها منصب يرتفع من ٩٠ الى ٩٠ سم . لورائها مستطيلة ، ضيقة ، تطول من ٨ الى ١٢ سم . وتعرض من ١٢ الى ٢٠ سم . نصالها بحرية الخضار على الصفحتين العليا والسفل . أزهارها صيرالي التصبج . أزهارها الى الحجرة المابتة السلاء || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

١٧٦٨٥ - ظُوبَاء رَشِيْقِيَّة

Alstromeria pulchella (S). *Alstromère élégante* (F).
نوع من الظُوباء . منبتها بلاد المكسيك . شراغها منصب يرتفع من ٥٥ الى ٩٠ سم . لورائها مسوطية الشكل تطول من ٨ الى ٢٥ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ سم . أزهارها صيرالي التصبج . أزهارها وردية اللون يملوها يتبعج احمر يحاطله الاصفر || تنويرها سيجي .

١٧٦٨٦ - ظُوبَاء مَكُونِيَّة

Alstromeria versicolor (S). *Alstromère versicolore* (F).
نوع من الظُوباء . منبتها بلاد الشيلي . شراغها منصب يملو من ٢٥ الى ٥٠ سم . لورائها شبه نضطية الشكل مستطيلة القذ . أزهارها صيرالي التصبج . أزهارها صفراء اللون يملوها تشيزن اربوياني يتخلله الأبيض والبرتقالي . وهي قمية الشكل ، تطول نحو ٣ سم . || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

١٧٦٨٧ - ظُوبَرَى

للظُوبرى من البقر هي الضجة (التاج) .

١٧٦٨٨ - ظُوبَرَة *

Moraea (S). *Morée* (F). *Moraea* (E).
جنس نباتات عشبية مبررة من فصيلة السجنيات . موهها



ظُوبَاء



عِظْرَة الإِجاص



ظفرة التفاح



ظفرة الزعرور



ظفرة الورديات



ظليون

الجزوة تملأ شمع النصل وعرقه على صفحته السفلى وتبقى على حالها الى ان يكتمل دورها الايدي الذي يطول بضعة ايام ثم تسفل في طورها الدعامي فيبلغ طول دعامتها نحو ١٥ سم وهو على الانفاذ وانغم الثآليل بدور قرسية لونها الى السمره تطيب الحما والبشرة وتشوه الثآليل وتذللها . يكافئ كاسر طور النظرة .

١٧٦٩٩ - ظفرة الورديات *

Gymnosporangium juniperi-virginianae, *Rostelia pyrata* (S). Rouille des rosacées cultivées (F).

ظفر مجهرى واسع الانتشار خاصة في امريكا الشمالية حيث يتطفل على جميع نباتات الفصيلة الوردية || مظهره الخارجى على الفروع والانفاذ يقع قرسية مبرحة لا نظمية الترتيب تركيب الحما تحطبه وتسبب الذبول واليباس . وهو على الادراك يقع لا قياسية الشكل والحجم تركيب النصل على صفحته العليا بين الفروع والشمع . تبدو صفراء اللون ثم تتحول الى الحصى وتطرح بالنصل فتخده وتقره الى الانفاذ على ذاته الى ان يذبل ويمس . يكافئ مكافئة ظفرة الاجناس .

١٧٧٠٠ - ظليون بقية السمل في الخلية .

١٧٧٠١ - ظليون هو الملى الضيقة الورق ، اطليا .

١٧٧٠٢ - ظليكميات *

Gymnolémaez (F).

Gymnolémaez (E).

رتبة من الحيوانات الطليبية ظاهرات الشرج . فضائلها وانجاسها عديدة مظهرها مجرى وبضها يعيش في المياه العذبة || انواعها عادمة الدقة . لواسها دائرية الانتشاب مصينة الارتكاز .

١٧٧٠٣ - ظليون *

Curculigo (S).

Charançonne (F). *Curculigo* (E).

جنس نباتات عشبية معمرة درنية الجذور من فصيلة الترجسيات . مهدها بعض مناطق الشرق الاقصى اعصها جاليا . اوراقها كبيرة ، جلعية الانتشاب تمزق من ٣٠ الى ١٥٠ سم . وتعرض من ١٥ الى ١٨ سم . نصالحا جملة الخضار اللامع . ازهارها صوبالي لتجميع . ازهارها صفراء اللون او بيضاء او ثنائية الخصب || انواعها المعروفة ثلاثة لا فارق بينها سوى لون الزمار وحجم الادراك || تزود الثزين في الحداثق فقط .

بين ١٠ و ١٥ م . مبشرة ، لاقياسية التجميع ، حراة اللون ، يرتقالية الحافة تركيب النصل على صفحته العليا يقابلها على الصفحة السفلى يقع بنس الحجم لونها الى الصفار الداكن . وعند اكمال هذا الطور الذي يبلغ تمامه نظرف سبعة ايام او ثمانية ينتج الطور الدعامي الذي تبصر عنه التمايز التبدلية الشكل التي تملأ البقع الحمر يندوم نحو ثلاثة ايام ثم يذبل بعد ان يتحول لونه الى الجزوة فاسرة وبعد ان يقرح التسج المنحامة ويقضي عليها || يكافئ باستمال سائل بودو المركز ٠,١ ٪ . يضاف اليه كلس سراق بمعدل ٠,٠٤٨ ٪ او سائل بودو المركز ٠,١ ٪ . يضاف اليه ٠,٣ ٪ من سلفات الحديد .

١٧٦٩٦ - ظفرة الاكيدنيا *

Gymnosporangium confusum, *Rostelia mespili* (S). Rouille du néflier (F).

نظر مجهرى يتطفل على الاكيدنيا والسقيل فيحطب الارواك ويؤذي الثآليل || مظهره الخارجى ، على الارواك ، يقع مستدرة يرتقالية اللون سمر الخار تملأ النصل على صفحته العليا تصعبه وترفع البشرة فتضخ كحل دعامة اسطوانية طولا نحو ٥ م . تنفجر عند ادراكها الى عدة قدد || وهو على الثآليل يقع قرسية سلية لونها الى السمره العاقبة تشوه الثآليل ولطليا يسه ان تمرق سير تمحا . يكافئ باستمال السوائل السلفوكسية عند الازرار .

١٧٦٩٧ - ظفرة التفاح *


Gymnosporangium juniperinum, *G. tremelloides*, *Rostelia penicillata* (S). Rouille gillagée du pomier (F). Stem gall of mountain juniper (E). *Apfelrost* (D).

نظر مجهرى يصيب التفاح والاجناس والنبراء . مظهره الخارجى على الانفاذ والانفاذ يقع قرسية لا قياسية الشكل تملأ الحما ترفع البشرة وتفسرها ولطليا || وهو على الارواك يقع مستدرة لونها الى الجزوة تملأ النصل على صفحته السفلى تصعبه وترفع البشرة التي تبدو كالدعامة الاسطوانية طولا يراوح بين ٤ و ٦ م . ثم تنفجر الى عدة قدد حلزونية الشكل || يكافئ باستمال السوائل السلفوكسية قبل الازرار وعند اكماله .

١٧٦٩٨ - ظفرة الزعرور *

Gymnosporangium clavariaeforme, *Rostelia laceata* (S). Rouille de l'aubépine (F).

ظفر مجهرى يتطفل على الزعرور وقد يصيب الاجناس . مظهره الخارجى على الارواك ، يقع مستدرة لونها الى



Eburna (S).

١٧٧١٢ - عابجة *٥

Eburne (F). Eburna (E).

جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات مميزات الارجل وقصيلة الطحريات. انواعها المعروفة قليلة الممد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة || اصداؤها متماسكة مالمسة كالمعاج ، لماعة ، بيضاء اللون ، وردية الملوحة ، يملوها تبيحج جزوي أو عتالي وفي قريية الشبه من البرق ، بطينة القاعدة والوسط ، حلزونة القعب المذهب || شاملة الاستعمال الصناعي .

١٧٧١٣ - عاجيز عن الوقاء ، معدوم ، مغعير،

Insoluble (F). Insolvent (E).

مغلاقي

هو من عاجز عن وفاء ديونه .

Ada (S). Ade (F).

١٧٧١٤ - عاداك ٥

جنس نباتات عشبية إسمية معمرة من فصيلة السحليات. انواعها المعروفة قليلة جميعها برية ورتيية . اروساتها اسطوانية أو مخروطية، خشية، تطول نحو ١٠ سم. اوراقها من اثنين الى ثلاث وفي قرصية الانتشاب ضيقة النصل تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض نحو ١٠ م. ازهارها عنقودية التجميع، ارجوانية اللون، سدواء التجميع، تركيز على شراخ يملو من ٢٥ الى ٣٠ سم. ازهارها يستمر من شباط الى نيسان .

Aglypha (F).

١٧٧١٥ - عادم الأخدود

نعت تعريفي يطلق على كل حية غير سامة مالمسة الانسان العادة التخديده .

Adactyle (F).

١٧٧١٦ - عادم الأصابع

نعت تعريفي يطلق على بعض القشريات عدمات الملاقط .

Caducue (F).

١٧٧٠٤ - عايل ، نافيض

Deciduous (E).

المائل اسم سال يطلق على النبات الذي تسقط اوراقه كل سنة || والمائل هو تلك الاوراق المتناثرة الساقطة .

١٧٧٠٥ - عاتيق

الماتق : فرخ الطائر اذا طار واستقل وقيل الماتق فوق النافض وهو الذي يتحسر من ريشه الاول وينت له ريش جلدي اي قروي .

Atik

١٧٧٠٦ - عاتيق الثريا

عاتق الثريا نجم لير من كوكبة سيلاس .

Démarleuse (F).

١٧٧٠٧ - عاتقة ، قراذة

Beet thinner, Thinning machine, Gapper (E).

معمل ميكانيكي يقطع في سيرة ما زاد من النبات عن الممدل المرغوب فيه . وهو يستعمل في الزراعات الكبيرة .

Infertile (F).

١٧٧٠٨ - عاتكة

Infertile, Unfruitful (E).

الشجرة التي لا تأتير .

Antimite, Miticide (F).

١٧٧٠٩ - عاتلث ٥

Mite-Killer, Miticide (E).

كل مادة من شأنها ابعاد المث او القضاء عليه تدعى عاتلثاً .

Rigole (F).

١٧٧١٠ - عاتلور

Trench, Channel, Duct (E).

جرى الماء سحر له في التربة . ج عاتلور .

Ivoire (F).

١٧٧١١ - عاج ، ضجاج ، مسك

Ivory (E).

انياب القيلة او عظام اتيانها .



عاجة

17731 - عاكية ، قرص Prêt (F). Loin (E).
مقد يدفع به المرء الى غيره متقولا او حينا او شيئا ميمنا
بنحوه ليستصله زينا محمدا ثم يرد .

17732 - عاكية الاستعمال Prêt à usage (F).
Commodatus (E).
هي دفع شيء الى المستعمل ليستعمله ثم يرد به بينه بلا
مقابل .

17733 - عاكية الاستهلاك Prêt de consommation (F).
توايما ان المير ي نقل ملكية العين المارة الى المستعمل
ليستهلكها في منامه ويرد مثله في زمن معين .

17734 - عاكول Isolant (F).
غير ناقل للكهرباء . Isolating (E).

17735 - عاكول Isolateur (F). Insulator (E).
صفة للمادة او الاشياء التي تتصل بخلاصة عدم نقل الكهرباء .

17736 - عاكس Tris fort (F). Very strong (E).
نعت تعريفي يطلق على اشد التبرج سورة .

17737 - عاكس Tinnunculus (S).
Crécœlle (F). Kestrel (E).

جنس طير من عائلة الصقور وخصلة الصقريات . انواحه
٢٠ جميعها صغيرة القد ، جميلة الشكل والقدم ، مستقيمة
الاقلام . طولها يراوح بين ٢٢ و ٣٢ سم . فريها آخر
الريش . مواضعها ذائعة ، اذنابها طويلة . ارياسها دقيقة ،
هراطة ، صفراء اللون . مناسبرها قصيرة ، سوداء اللون ،
قوة البرة الحادة || يذئ في الاشجار الشائعة ، اناك
تضع وتضع من ٥ الى ٧ دفات || وهو من الجوارح
النافقة لانه يفتحي جل منظر القوائم الضارة || انهم
انواحه المسوق المعروف ومسوق الدورى والعويق .

17738 - عاكس الدورى * Tinnunculus alpestris (S). Crécœlle des moineaux (F). Windhover (E).

نوع من العاكس وهو طائر خفيف الجناح ، حاد المزاج ،
ثديد البطش . طوله نحو ٢٧ سم . ثوبه الى الحرة النابية
يبين عنه الظهر ويصغر عنه البطن . ريشه ابيض
الاصفر || يصيد الدورى والصقريات الصغيرة والقوائم
والسقاء والخشرات . وهو من الطيور القوائم التي يحوي
الشرق والغرب .

17739 - عاكس معروف * Tinnunculus alandicus (S). Crécœlle commune, Emouchet doré (E). Common windhover (E).

نوع من العاكس وهو اكبرها بين رايهاها شكلا وانماها
صيدا . قدره قدر الباقى . طوله نحو ٣٢ سم . ثوبه الى
الحرة النابية للنعبة المزاج . وهو ابيض الريش ، اسود
التوشح المستطيل || قوته القوائم والسقاء والنفط
والخشرات .

17740 - عاكيب ، عاكيب ، عاكيب Herbeux, Herbu (F). Grassy, Herbous, Overgrown With herbs (E).
ما كان كثير العشب .

17741 - عاشيات Herbivores (F).
Herbivorous (E).
الحيوانات التي تأكل الاعشاب .

17717 - عادم الرأس Acéphale (F).
Acephalous (E).
اسم يطلق على بعض الرخويات من صفيحيات الياض
تتميز بانعدام الرأس .

17718 - عادم العروق Enerve (F). Enervate (E).
نعت تعريفي يطلق على الاوراق الخالية من العروق .

17719 - عادم العنود Enode (E). Enod (E).
نعت تعريفي يطلق على الاعشاب الماددة العنود .

17720 - عادم الفك Agnathé (F).
Agnathous (E).
هو من الحيوان من كان عادم الفك او الفك الاسفل من
الشفق . ومن الحشرات من كانت عادمة الفك .

17721 - عادم المفاصل Inarticulé (F).
Inarticulate, jointless (E).
اطلاقا بلا مفصل .

17722 - عادم مفاصل Agnathes (F).
Agnatha (E).

قفة من الاسماك عادمة الفكوك وقرية الزعانف ، متجبرتها
تدعى صدفيات الجلود . هياكلها غضروفية لا عظمية .
غياضها جيبية الشكل || القرية الوحيدة الماصرة تدعى
حلفيات الاثلاف . اعرف اسمائها الملكى والميكسين .

17723 - عادية Hautain (F). Haughey (E).
هي التكمة التي تترش على النجسة . ج حواد .

17724 - عاكجة Grimpance (F).
Twining, Creeping (E).
كل لينة تتسلق غيرها .

17725 - عاكج Mécrophage (F).
Mecetophagous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على الفطور
م . عاكجة .

17726 - عاكجة ، معرشة ، معرشة Liane (F). Liana (E).
كل لينة صاتها طويلة قصفة لا تمكها من الانتصاب
بدون عائل تركر عليه .

17727 - عاكض هو السمحاق نوع من النورم ، اطلبه .

17728 - عاكضة Adventice (F). Adventitious (E).
كل نبتة تنكسر هراشا وتلتاقيا مع غيرها من النباتات
المزدهرة .

17729 - عاكضة Traverse (F). Joist (E).
كل خشبة جازنة تدعى عاكضة .

17730 - عاكية ، عاكجة Commodat (F).
Free loan (E).
مقد ياتزم به المير دفع شيء الى المستعمل ليستعمله زينا
محمدا ثم يرد او مثله بمقابل او بلا مقابل .



ماسوق الدورى



عاكس معروف

Tempête (F). Storm (E).

اختلال جوي حثيف القوة شديد الوقع بهيج العواصف الجوية ويثيرها .

Fistipare (F). Fissiparus (E).

عاشق - ١٧٧٥١

كل ما كان تسانله ضفوة اي بالانقسام الى شطرين . ويدعى أيضاً مَشْقُوق .

Serpent véneux (F).

عاشقة - ١٧٧٥٢

Venomous snake (E).

حية غيبية يموت الذي تلسه من ساعته .

Stérile (F).

عاقبر ، عقيم

Sterile, Barren (E).

ما كان لا يقبل الانجاب .

عاقبر قرصاً ، عود القرح - ١٧٧٥٤

Anacyclus pyrethrum (S). Anacyclus pyrethre, A. pourpre (F). Pellitory of spain, Alexander's foot (E). Alexanderfuss, Spelchawurz (D). Pilastro, Parietaria de Spagna (I).

نبات عشبي طبي حولي من فصيلة المركبات . ساقه تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقه كبيرة القند كثيرة التفريغ والتشريح . تفصلها خلى البشرة . وريجاتها الزهرية كثيرة العدد . مستطيلة الاذن ، صفيرة القند . ثماره زور مجتمعة الغلاف ، هدية المادة . جلوره واوراته واذا زارها فواحة العرق ، طعمها حريف لاذع . وانحما بهيج الانقب وقد تسبب العطاس . يستخرج منها مسحوق ناعم مادته الفعالة القروبي يستعمل في القضاء على الحشرات . يستعمل في عدة تركيب طبية انحصا معجونات الانسان .

عاقول ، حاج ، زنجبيل المعجم ، أشتغار - ١٧٧٥٥

Alhai mannifus, Al. maurorum (E). Alhage, A. des Maures, Sainfoin agul (F). Camel thorn, Hebrew manna plant (E). Alhagistrach, Mannastrach (D). Lupinella alhai, Manna di Peris (I).

نبات عشبي لبني مخشوب معمر من فصيلة القرنيات . ساقه شائكة فرما تملو نحو ١٠٠ سم . فروسه نحلة الشوك . اوراقه بسيطة كاملة مستطيلة || وهو من النباتات التي تفرز المن ويقال ان من بني اسرائيل كان من فرزه لانه كثير الوجود في صحراء سيناء .

عاقول الغزال هو الشكاعة ، الطلها . - ١٧٧٥٦

Réflecteur (F). Reflector (E).

عاكس - ١٧٧٥٧

جهاز يمسك النور او الحرارة .

Claviceps (S).

عاكوب - ١٧٧٥٨

جنس فطور مجهرية من النساخيات وفصيلة النساخيات . تسمى فطور عاكوب التي تحيط الزبينة وتنفس فيها تتشكل اطرافاً حولياً يحيط السويق || يولها عيطي الشكل متوازي الترتيب تحفنه تكات مستدرة || انواعها عديدة منها واحد يركب النبات ويؤذي هو عاكوب الشيلم .

عاكوب الشيلم - ١٧٧٥٩

Claviceps purpurea, Sclerotium clavus, Sphecella segetum (S). Ergot du seigle (F). Ergot (E). Mutterkorn (D).

فطر مجهرى يركب الشيلم وغيره من النباتات انحصا الكيشة والنف والثفل والدككيل والندوس والندس وذيل الثمار والزبير والشبير والشوفان والصفوية والمكرش والزعزع

١٧٧٤٢ - عاشق ومَشْقُوق اطلب غلدة كروية .

Triglochin (S).

عاشم - ١٧٧٤٣

Triglochin, Troscart, Joncage, Faux jonc (F). Arrow grass, Marsh arrow grass (E). Echter Dreisack (D). Triglochino, Gluncastrelle, Glunco falso (I).

جنس نباتات برية ، مروحية ، اسلية الشكل ، ممررة من فصيلة النساخيات . انواعها عديدة معظمها من نباتات الواقع الرطبة انحصا المنافع وريال الشطوط البحرية وغلاف الانهر واغوارها .

Triglochinaceae (S).

عاشميات - ١٧٧٤٤

Triglochinacées (F). Triglochinacées (E).

فصيلة نباتية من سحيدات الفلقة . اجناسها وانواعها عديدة . جميعها اسلية الشكل والاوراق . اذعارها كية ، مرتفعات المبيض . اشهر اجناسها العاشم .

Herbicide (F).

عاشوب - ١٧٧٤٥

Herbicide, Weed-Killer (E).

كل مادة فعالة تستعمل للقضاء على الاعشاب ج . عواشب .

١٧٧٤٦ - عاشق . - ١٧٧٤٦

Corynetes (S). Corynète (F). عاشق . جنس حشرات غشبية من فصيلة الزوجيات . انواعها المعروفة ١٤ معظمها من حشرات العالم القديم || جميعها صغيرة القند . اطرافها تراوح من ٤ الى ٨ سم . اطرافها متراكبة الاذن الزاهية || سرعها نهاري . قوتها رقيق الانزاع انحصا اذار الفصيلة الصبوانية || اشهر انواعها الماشق الارزق (Corynetes caeruleus) الذي يعيش في الحديق ويدخل المنازل حيث يفترس بعض الحشرات الضارة .

عاشق أزرق - ١٧٧٤٧

Corynetes caeruleus (S).

Corynète bleu (F). Corynetes caeruleus (E).

حشرة واشية خاشبة قاتسة من فصيلة الزوجيات ورتبة مفدمات الاجنسة . غنقاتها تميش على اذعار النباتات البرية والرتبية . يرقاتها خاشبة قاتسة تفترس الحشرات الدنيا || جسمها صغير القند بطول من ٤ الى ٨ سم . قوتها الى الزقعة . رأسها مستعرض الجرم . زباناها غيبليان ، مستطيلان . صيناهما صغيرتان بارزتان . ظهرها مستدير الطرف اللامع ، تحيل التحزيز التندقي القاطب . ارساغها خاشبة المعلى || لها جبل واحد في الخول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى اواخر قنوة . تسرح في التبار وتبيت في الليل || البرقة عنه اداكلها الكال الجسودي تطول من ٨ الى ١٠ سم . جسمها مردني الشكل ، مستطيل القندم والراس . مستطيل الطرف اللامع ، سداسي الارباع ، غليخ التاكثير . طول القرن ، اسر الموج ، مثير الحلب ، اسد الرأس || طول الاكامل الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في شقوق الحطب او تحت القشور والانقاض .

Réfractaire (F). Refractory (E).

عاصي - ١٧٧٤٨

كل مادة تقاوم التحويلات للمأثرة ولا تتصاع الى غططها الرئيسي . كالطين الذي يصنع الحرارة فلا تصهره .

Fouloir (F).

عاصيرة ، مِهْرَس - ١٧٧٤٩

Bester (E).

آلة تستعمل لسحق التال واستخراج عصارها انحصا العنب .



عاشم



عاشق أزرق



عاقبر قرصاً



عاكوب الشيلم

Pubis

١٧٧٧٥ - عائنة

١٧٧٧٦ - عائنة * اصل الاذن. ج. حوانة .

Anthropoide (F).

١٧٧٧٧ - عائس

العائس طائر يدعى الاديغ ، اطلبه .

Damoiselle de Numidie (F).

١٧٧٧٨ - عائس نميدك

طائر يدعى اديغ نميدة ، اطلبه .

Pubien (F). Pubic (E).

١٧٧٧٩ - عائسي

Infirmite (F). Infirmity (E).

١٧٧٨٠ - عائكة

كل اثر يبقى في البدن عقب اصابة او مرض . وعامة قد تكون وقتية اذا كانت وشيكة التوال او دائمة .

Taxes (F). Taxes (E).

١٧٧٨١ - عائكات

هي الرسوم المفروضة عل المغارات والبضائع . واحداها عائنة .

Rentabilite (F). Rentability (E).

١٧٧٨٢ - عائكة

راجع إيراد .

Delphinium (S). Dauphinelle (F).

١٧٧٨٣ - عائق

جنس نباتات حولية ومحولة ومعمرة من المربقيات ونباتة الشقيقيات . انزاعه المرفوعة نحو ٩٠ مظهرا بري وبعضها زراعي زخفي . اولها متناقصة ، متعنة ، مفضضة وبغرفة . انزاعها صنفوي او سنبل التجميع . انزاعها بحيلة الشكل ، مختلفة الالوان || اشهر انزاعه ما على .

١٧٧٨٤ - عائق الحدائق * وجمل البقرة ، مهنكاز

Delphinium ajacis (S). Dauphinelle des jardins (F). Rocket larkspur (E). Gazantrittersporn (D). Calceolipia dei giardini (Speronella (I).

نبات عشبي حولي زخفي يعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . ساقه فراء . اوراقه غليظة القترع . عتيقه الزهري كبير القند ، لبد الازهار . لون ازهاره يختلف باختلاف الصرم . يكثر فيه الازرق والايض والبشبي والوردي والاحمر || ازهاره يشتمل من حزيران الى تموز .

١٧٧٨٥ - عائق الحقل * كسنودة ملكية

Delphinium consolida (S). Dauphinelle consoude, D. des blés, Consoude royale (F). Field larkspur, King's consoud (E). Feldtrittersporn, Hornkümmel (D). Consolida regale, Calceolipia delle biade (I).

نبات عشبي حولي بري وزخفي يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . يحمله هربي الشكل . ساقه فراء . فروعه محمية بالبراقيد الزهرية القليلة الكثافة . ازهاره زرقاء اللون ، او بيضاء . اصراره الزراعية عديدة جنبها الكمية الزهر والصغيرة القند والمردنية المستطيلة . جميعها طيبة تشتمل كمدة ليل وطاردة للذود ودائمة الجروح الا انها جسمية المادة للتعامة مما يجعلها من النباتات السامة المؤذية || ازهاره يشتمل طوال فصل الصيف .

١٧٧٨٦ - عائق الشرقى

Delphinium orientale (S). Dauphinelle d'Orient (F).

نبات عشبي حولي بري وزخفي يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم .



عائق الحقل



عائق الحقل

والنزار والقطبان والتمح والتجير والتبيل والتبيل والمزمان والملتس ، الخ . || مظهره الخارجي زباد اسود ، شكله شكل الدائرة ، يدخل بويقة مع الجذرة عند تقطع الزهرة فيستقر في اللبش حيث يمش ويشر طفيلا فيجوز الحية وما فيها الى مادة سلبة سواء اللون تحوي مع بويقه بعض الجواهر السامة والمواد التي تلوته اعصابها الماكورين . يكلمه بتظليل البذر من الحب المكروب وقد يتم ذلك اما بالتلف واما بالتلف في الماء حيث يرتد الحب السليم ويظهر الحب المكروب . او باستعمال اسد الفواظير المطهرة .

١٧٧٩٠ - عائكويين * ، إرغويين ، دكبرين

Ergotina

مادة شبة قلوية توجد في الحبوب المربوة بفطر الماكروب .

Régne (F). Kingdom (E).

١٧٧٩١ - عائتم
النام او المملكة هو اول قسم في تصنيف الاسماء ، يقال عالم الحيوان وعالم النبات او مملكة الحيوان ومملكة النبات . راجع تصنيف .

An (F). Year (E).

١٧٧٩٢ - عام

العام حول يأتي على الفصول الاربع الشاء والربيع والصيف والخريف وعلى هذا فالعام اخص من السنة .

Gerbe (F). Sheaf, Bundle (E).

١٧٧٩٣ - عائكة

مجموعة من يربط الحصيد .

Facteur (F). Factor (E).

١٧٧٩٤ - عائيل

كل عنصر آزر من مجموع عناصر الوحدة .

Ouvrier, Salarie (F).

١٧٧٩٥ - عائيل

Workman, Salaried, Paid (E).

هو كل شخص مرتب بمقد العمل او عقد الاستئجار فيعمل بيده عملا صناعيا او زراعيا .

Facteur premier (F).

١٧٧٩٦ - عائيل اساسي

Prime factor (E).

Agent oxydant (F).

١٧٧٩٧ - عائيل التأكسد

Oxidizing agent (E).

Facteur expérimental, F. appliqué (F).

١٧٧٩٨ - عائيل تجربي

Applied factor (E).

Facteur biotique (F).

١٧٧٩٩ - عائيل حيوي

Biologic factor (E).

١٧٨٠٠ - عائيل وسيط ، عائيل مساعد ، وسيط

Agent catalytique, Catalyseur (F).

١٧٨٠١ - عائيل مشترك

Catalytic agent, Catalyst (E).

جسم يحدث التحليل باللامسة . اطلب مساح .

Facteur commun (F).

١٧٨٠٢ - عائيل مشترك

Common factor (E).

Amor (F).

١٧٨٠٣ - عائور

العمور كوكب سيار يدعى الزاهي ، اطلبه .

١٧٨٠٤ - عائنة

Anesse (F). She-ass (E).

هي الاتان ، اثنى الجار .

الفئة كوكبا يمش اسفل من السمود .

١٧٨٠٥ - عائنة

هي الاتان ، اثنى الجار .

١٧٧٩٣ - عائق كشمير

Delphinium cashmirianum (S). *Dauphinele du Cachemire* (F).

نبات عشبي معمر يصلو من ٣٠ إلى ٤٥ سم. ساقه قليلة الفروع المنتصبة. أوراقه مستطرفة خاسية التفصيص، نصلها خلي البشرة، سنن الحافة. أزهاره كبيرة القد، قناباتها غززية الشكل، حطيفة اللون. يتلاتها بنفسجية. عناقيده صغيرة وعلّة ۛ أزهاره يستمر من حزيران الى تشرين الأول.

١٧٧٩٤ - عائق ممسك

Delphinium brunonianum (S). *Dauphinele musquée* (F).

نبات عشبي ثريبي معمر يصلو نحو ٣٠ سم. ساقه قليلة الفروع المنتصبة. أوراقه ككوية الشكل، لثائية أو خاسية التفصيص. أزهاره كبيرة القد، زرقاء اللون، ارجوانية الحثار، سواد القرقعة، فواحة العرف المسكي المستحب ۛ أزهاره يستمر من حزيران الى تموز.

١٧٧٩٥ - عائق *Planta hôte* (F). *Host-plant* (E).
هو كل نبات يعيش عليه نبات طفيل.

١٧٧٩٦ - عيب *Lamper* (F). *To toss off* (E).
أخذ الماء حباً من غير مص وهو ما يفعله الطائر. والمعب هو طريقة شرب الطير.

١٧٧٩٧ - عيبه *Abatia* (S). *Abatia, Abatie* (F). *Abatia* (E).

جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة التفصيصات. أنواعها المعروفة قليلة المد اصحابها بعض المناطق الحارة من أمريكا الجنوبية ۛ سيقانها منتصبة فراءه. أوراقها متعاقبة. أزهارها مفردية طرفي. أزهارها جميلة يكثر فيها اللون الوردى ثم الاصفر ۛ بعض أنواعها تزيتي يزود في الحادق.

١٧٧٩٨ - عباد الشمس، عيين الشمس، دوار الشمس *Heliandus* (S). *Hélianthe, Soleil* (F).

جنس نباتات عشبية حولية أو معمرة من فصيلة المركبات الانبوية الزهر. أنواعها المعروفة نحو ٥٠ سيقانها أسطوانية جالسة. أوراقها منقطة أو لاطفة، كاملة، كبيرة القد. السفلية منها متعاقبة الاكثران اما الوسطى والعالية متعاقبة. أزهارها وديسي التجميع، كبير الأقراص المستديرة التي تمل مع اتجاه الشمس. أزهارها انبوية، صغيرة، ليدة، سراسمة، مستطيلة اللسان. يزودها وردية الشكل، فضلة الحروف، دهنية الباب ۛ الشهر انواعها الزراعية ما يتبع.

١٧٧٩٩ - عباد الشمس الأزغب

Heliandus mollis (S). *Hélianthe velu, Soleil velu* (F).
نبات زراعي معمر يصلو من ١٢٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقه غليظة، زباء، حادة الفروع. أوراقه لاطفة متعاقبة، بيضيه الشكل، نصلها كبير الضفحة المشعة، ثلاث المروق البارزة، الجدل اللون ۛ قرصه الزهري متوسط القد، قطره نحو ١٥ سم. لسانات أزهاره خلية البشرة لونها الى الصفار الكبير ۛ أزهاره يستمر من تموز الى تشرين الاول.

ساقه فراء. عيكله هربي الشكل. اوراقه قوية التفريخ. عناقيده الزهرية صغيرة القد. ازهاره بنفسجية اللون. ازهاره يستمر طوال فصل الصيف.

١٧٧٩٧ - عائق أنيق *Delphinium speciosum* (S). *Dauphinele élégante* (F).

نبات عشبي ثريبي معمر يصلو نحو ٩٠ سم. ساقه موقفة قليلة الفروع. أوراقه خاسية التفصيص، مسنة الحافة نصلها خلي البشرة. ازهاره الى الزرقاة انبالية الالسة. عناقيده الزهرية صغيرة القد وعلّة ۛ أزهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

١٧٧٩٨ - عائق جبتي، زيتب بوي، عيشة *Delphinium staphisagria* (S). *أفصل*

Dauphinele staphisagria, Staphisagria, Herbe aux poux (F). *Stavesacre, Lousawort* (E). *Scharfer rittersporn, Leuskraut* (D). *Calactrippa staphisagria, Srafusaria, Tusano* (I).

نبات عشبي بري طبي يصلو نحو ٧٠ سم. ساقه فراء. فروصها منتصبة. أوراقه مفصصة ومفرشة نصلها خلي البشرة سنن الحافة، مجري اللون. عناقيده الزهرية صغيرة القد، ليدة. أزهاره وردية اللون. يزود حامزة الطعم تستعمل كهيصة يسلطه وطاردة للبهان. لكتها غطرة نظراً لما تحويه من مواد بحالية مؤذية ۛ أزهاره يستمر طوال فصل الصيف.

١٧٧٩٩ - عائق ذليل *Delphinium zall* (S). *Dauphinele zall* (F).

نبات عشبي ثريبي معمر يصلو من ١٥٠ الى ١٥٠ سم. عيكله هربي الشكل. ساقه فراء. فروصه منبسطة تشب على ارتفاع ٢٠ او ٤٠ سم. أوراقه شبة للتفريخ القد. الشكل. أزهاره عناقيد كبيرة القد كبريتية اللون. ازهاره يستمر من تموز الى آب.

١٧٧٩٠ - عائق مستجولي *Delphinium azureum* (S). *Dauphinele azurée* (F).

نبات عشبي ثريبي معمر يصلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقه وفروصه وأوراقه وأزهاره خلية للساء والبشرة. أوراقه خاسية أو سباعية التفريخ. أزهاره سميتونية اللون. عناقيده الزهرية مستطيلة للشكل متتلة الكثافة ۛ أزهاره يستمر من حزيران الى تموز.

١٧٧٩١ - عائق كبير الزهر *Delphinium grandiflorum* (S). *Dauphinele à grande fleur, Pied d'alouette de Chine* (F). *Large flowered larkspur* (E). *Grossblüiger Rittersporn* (D). *Calactrippa a fiori grandi* (I).

نبات عشبي ثريبي معمر يصلو نحو ١٠٠ سم. ساقه فراء. فروصه متباعدة، عساجية المتناظرة الزهرية. اوراقه ندية التفريخ. أزهاره كبيرة القد يضاء اللون او زرقاء او حمراء ۛ أزهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

١٧٧٩٢ - عائق كزديلي *Delphinium cardinale* (S). *Dauphinele cardinale* (F).

نبات عشبي ثريبي معمر يصلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقه موقفة حادة الفروع ثلاثية أو رباعية المقاد. اوراقه خاسية التفصيص والتفريخ. سبله الزهرية مستطيلة وعلّة. أزهاره ارجوانية اللون صفر التوشم ۛ أزهاره يستمر من نيسان الى تموز.



عائق أنيق



عائق جبلي



عائق كبير الزهر

١٧٨٠٥ - عباد الشمس المزد *
Heliandus oryzae, H. salicifolius (S). Hélianthe

عباد الشمس الجبار

titian, Soleil de six pieds (F). نبات زراعي معمر يصلو نحو ثلاثة أمتار وقد يبلغ في ظروف خاصة ستة أمتار. ساقه مرطبة لسان. أوراقه كثيرة البد، متفانية الارتكاز || اقراصه الزهرية كثيرة البد، قطرها يراوح بين ٣ و ٧ سم. لسيات انزارة سوية الصغار القاتم || انزارة يستمر من ايلول الى تشرين الاول.

١٧٨٠٦ - عباد الشمس الخفائل
Heliandus fastuosus (S). Hélianthe fastueux, Soleil

عباد الشمس الشوي

fastueux (F). نبات زراعي معمر يصلو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. ساقه هدية الرغب. الجامد. اوراقه سنانية الشكل || جامدة الصفة، نصلها غشن اللمس، ثلاثي القرو، مسن الحافة، بحري الخصار، قرصه الزهري صاجي الشكل. قطره نحو ١٢ سم. لسيات انزارة صفراء اللون، ودية اختار || انزارة يستمر من آب الى ايلول.

١٧٨٠٧ - عباد الشمس النيلي
Heliandus angustifolius (S). Hélianthe à feuilles

عباد الشمس السقولي

étroites, Soleil à feuilles étroites (F). نبات زراعي معمر يصلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقه هدية الرغب. اوراقه متباينة الارتكاز. نصلها يطول من ٧ الى ١٨ سم. ويبرش من ٤ الى ٨ م. ويحوي ميك الصفحة الخشنة || اقراصه الزهرية قليلة البد. قطرها يراوح من ٥ الى ٨ سم. لسيات انزارة صفراء اللون، صفراء اللون || انزارة يستمر من آب الى تشرين الاول.

١٧٨٠٩ - عباد الشمس الكبير الورقي
Heliandus macrophyllus, Heliandus (S). Hélianthe

عباد الشمس القفي

macrophylla, Soleil à grandes feuilles (F). نبات زراعي معمر يصلو من ١٢٠ الى ٢٢٠ سم. جلوره صفريه اصبغة الشكل. ساقه ثنائية او ثلاثية القبان، جامدة القرو، قليلة الرغب. اوراقه متعاقبة، بيضية مستطيلة، نصلها كبر اللد مغبر الصفة، قرصه صاجي الشكل، قطره نحو ٨ سم. لسيات انزارة الى الصفار الباهت || انزارة يستمر من آب الى تشرين الاول.

١٧٨١٠ - عباد *
Tolypeustes (S). Apar, Tolypeuste (F).

عباد الشمس المارد

جنس حيوانات لبونة من فصيلة المرمعات. انواعه المعروفة ثلاثة اقطانها بعض ساطق اشربة الجودية. تألف الثبات والاحراج. ملجها الحياتي فردي. تسرح في الليل وتبيت في النهار داخل اجسام تحفرها في التربة قرب جلوح الانجار اجسامها صفيرة. رؤوسها غروبية. اقفاها مجهزة ياسان اسطوانية الشكل يراوح عددا من ٨ الى ٩ ازواج في كل فك. عيناها واذانها صفيرة. اذنانها قصيرة مشعلة. قوائمها قصيرة. اخطانها قوية. دروعها مؤلفة من جين رأسي وجين مشكي تقصص من الجين الحوضي ثلاثة اجزى غروبية متعاقبة متحركة تنقبض وتتمدد تحت الحاجة بما يجعل البكر يتحرك عندما يشاء || انثاها ثنائية الاطباء تقصع في كل رمص من جرو الى ثلاثة جراء || اما انواعه الثلاثة فهي التالية :



عباد الشمس كبير الورق

١٧٨٠٠ - عباد الشمس الجبار *
Heliandus giganteus (S). Hélianthe géant, Soleil

giant (F). نبات زراعي معمر يصلو نحو ٣٠٠ سم. جلوره صفريه جنزائية طويلة. ساقه خضة، مالة اللحاء، جامدة القرو. اوراقه كبيرة اللد، نصلها سائي الشكل، مسن الحافة، جامد الصفة المسكة || قرصه الزهري متوسط الحجم قطره نحو ٨ سم. لسيات انزارة عابطة الصفار || انزارة يستمر من آب الى تشرين الاول.

١٧٨٠١ - عباد الشمس السنوي *، طرغوف
Heliandus annuus (S). Hélianthe annuel, Tournesol,

Grand Soleil (F). Golden flower of Peru, Sun-flower (E). Echte Sonnenblume (D). Elianto del fioro grandi, Mirasole, Girasole, Tazza regia, Coppa di sole, Soleil (I). نبات زراعي حولي يصلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه جامدة متعقبة مغبرة اللحاء تحمل في اعلاها بعض القرو البهيفة. اوراقه كبيرة اللد قليلة الشكل || نصلها غشن اللمس، عابن الخصار البحري. قرصه الزهري القوي كبر اللد قطره يراوح بين ١٥ و ٥٠ سم. لسيات انزارة صفراء اللون ذهنية المواج || انزارة يستمر من آب الى ايلول || وهو من اثباتات الصناعات الثلاثة الزراعة والاستعمال. يزود دهنية وطلاقة.

١٧٨٠٢ - عباد الشمس السقولي *، طرغوف
كتنكر، القلقاس رومي

Heliandus tuberosus (S). Hélianthe tubéreuse, Topinambour (F). Candopotato, Jerusalem artichoke (E). Knollensonnenblume (D). Elianto tuberoso, Tartufo bianco, T. del canna, Carciofo di terra (I). نبات سقولي زراعي معمر. جلوره سنزائية الشكل واللدة، ساقه متعقبة تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقه كبيرة اللد، مستطيلة المت، نصلها جامد الصفة الخشنة، مسن الحافة، ثلاثي القرو الرئيسية. قرصه الزهري متوسط اللد قطره نحو ٦ سم. لسيات انزارة احليجية الشكل، زلمية الصفار || انزارة يستمر من ايلول الى تشرين. زراعته شائعة، صائله مأكولة، يرغب في الارربة المتوسطة الاندماج والرطوبة.

١٧٨٠٣ - عباد الشمس الفضي *
Heliandus argophyllus (S). Hélianthe argentée, Soleil

argenté, S. du Texas (F). نبات زراعي حولي يصلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه فرورها دقيقة، صباغة، زياء اللحاء، اوراقه كبيرة اللد، بيضية الشكل، ثلاثية القرو || نصلها انغب البشرة فضي المواج || اقراصه الزهرية كثيرة البد، صفيرة اللد، لسيات انزارة مستطيلة الشكل، جميلة الصفار الزاهي، متطيلة اختار || انزارة يستمر من آب الى ايلول.

١٧٨٠٤ - عباد الشمس القاسي
Heliandus rigidus, H. scaberrimus (S). Hélianthe

rigide, Soleil scabre (F). نبات زراعي معمر يصلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. ساقه جامدة متعقبة قاسية. اوراقه متعاقبة || كبيرة اللد، بيضية، لسنة. نصلها جامد الصفة المسكة الخشنة. اقراصه الزهرية قليلة البد، محتلفة اللد، صفراء يراوح بين ٦ و ١٠ سم. لسيات انزارة الى الصفرة الزاهية السوية. || انزارة يستمر من آب الى ايلول.

١٧٨٢١ - عَيْبُدٌ وَلِيَّاتٌ * Eupeimidas (S).

Eupeimidas (F). Eupeimidas (E).
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة .
اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها ناعمة تتعقل
على الحشرات الضارة من نصفيات الاجنحة والصدفيات
والحرشفيات || حشراتا صغيرة طول من ٢ الى ٤ سم .
اجسامها شبه اسطوانية . مرنّاتها سلبية ، مستقيمة . اثارها
عديدة الاثلاث يكثر فيها الاسود الفحمي . اجسامها شديدة
القصر او لا يوجد لها || اشهر انواعها عيدول جيري .

١٧٨٢٢ - عَيْبُدٌ يَمِي * Abdimia abdimi (S).
Sphénorhynchus (F).

طائر من طول الساق وفصيلة المقلقيات . اسلانه البلاد
الاfrقية يحب بجمراتها وانهارها كل عام || ثوبه اسود
اللون تملوه مابة ارجوانية في الرأس والظهر والصدر ومابة
خضراء في الجناح والذنب . عسراء وزوره وبلده وزيمكاه
بيض . راسه متوج الغفن بكشفة صغيرة من الريش الارجواني
الاسود اللامع || يأنف بجاري الماء . قوته الحشرات
والزحافات والقشريات وبعض الاشباب المائية .

١٧٨٢٣ - عَيْبُرَبٌ هو السَّاقُ الكاذب ، اطلبه .

١٧٨٢٤ - عَيْبُرُدٌ *
المشب العبرُد مشب عرد هو الرقيق الرديء الفار .١٧٨٢٥ - عَيْبُرُوسٌ * Epterus (S).
Eptera (F). Epterus (E).

جنس حشرات مؤذية من لمديات الجناح دوسيات القرون
وفصيلة المستبريات . انواعها المعروفة نحو ٥٠ اسلانه
معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش تحت
قشور وطاه الانجار في اثناء الانجاب لانفاسها المخطوط تغلبها
بالطول والعرض || اجسامها صغيرة معددة الظهر ، بيضيه
القشورن ، تطول من ٢ الى ٣ سم . اثارها لامعة يكثر فيها
الاسود والكسني والماني . احادها مبهمة التخديط الطولي .

١٧٨٢٦ - عَيْبُرِيَّ Jujubier des Iotophages (F).
هو الفصائل ينبت ويضع قرب شطوط الانهار .١٧٨٢٧ - عَيْبُرِيلٌ * Abrialia (S).
Abrialia (F). Abrialia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات واسيات الارجل .
انواعها المعروفة ثلاثة منها واحد يعيش في البحر الابيض
المتوسط والثاني في المحيط الاطلسي والثالث في المحيط الهندي .
جميعها تألف المجاذع والشرطوط . اجسامها شبه مخروطية
الشكل . ارجلها سائسة ، معتدلة الطول ، مجهزة بكلايات .
تكتنف القواعد ويصيفن من المخاطب الطافية الارتكاز .

١٧٨٢٨ - عَيْسُ Aunée conyze (F).
هو البرنوف ، اطلبه .١٧٨٢٩ - عَيْسُدٌ Obsidienne, Obsidiane (F).
Obsidian, Volcanic glass (E).

نوع من الفلنسية البوتاني . جسم حجري شديد الصلابة
مرجه الصخور النارية || يكثر ويوجد عند فوهات
البراكين القديمة والحديثة ، وفي بعض مناطق مصر وسفاريما
والمكسيك والبيرو .

١٧٨٢١ - عَيْبَارٌ بُوْلُونٌ * Tolypeustes tricinctus (S).

Apar de Buffon (F).
موطنه البرازيل واليونان وبوليفيا . جسمه يطول نحو
٤٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٧ سم . قوامه خاسية
الاصابع في الامامية والخلفية . دره عنبري اللون .

١٧٨٢٢ - عَيْبَارٌ مَعْرُوطِيَّ الذَنْبِ * Tolypeustes conurus (S).

Apar à queue conique, Mataco (F).
نوع من البطار موطنه بوليفيا وبعض مناطق الاربعين .
جسمه يطول نحو ٤٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو
٦ سم . قوامه الامامية ورباعية الاصابع . دره اسمر اللون .
اطمحل الموج .

١٧٨٢٣ - عَيْبَارٌ مُورِيَّ * Tolypeustes Muriel (S). Apar de Murie (F).

موطنه النبل وبعض مناطق الاربعين . جسمه يطول نحو
٤٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٥ سم . قوامه
الامامية رباعية الاصابع . دره اسمر اللون اصغر الموج .

١٧٨٢٤ - عَيْبَارَةٌ جَيْمِيَّةٌ Expression algébrique (F).

حلة حساية مردحا الجبر . Algebraical expression (E).

١٧٨٢٥ - عَيْبَاشَةُ دَاجِيَّةٌ * Ploaria domestica (S). Ploière domestique (F).

حشرة مبيضة ناعمة من فصيلة الردييات ورتبة خنثافات
الاجنحة . جسمها صغير القند يطول نحو ٩ سم . راسها
صغير ، بلوطي الشكل . خطها معتدل الطول . عيناها
صغرتان . زباناها دقيقتان مستطيلتان . كسلها وشي
الشكل . الزوج الامامي من قوائمها مجهز بقصص . للدور
يحمل متشابا سادا || ثوبا الى الحظي الاسمر يطول موج
تني في الرأس والكتل كسل || سرسها دجوي . قوتها الدم
تنص من البعوض اولاً ثم من كل حشرة تستطيع قصها .

١٧٨٢٦ - عَيْبَالٌ * Eglantier (F). Briar, Dog-rose (E).
هو التسرير ويورف بالورد الجليل ، ينظف ويضع حتى
تقطع منه السمي .١٧٨٢٧ - عَيْبَابٌ * القيب هو حب الكاكنج ومنب الثلب وشجرة الرآء عن
اللسان . ويجر من الاغلات عن ابي حنيفة .١٧٨٢٨ - عَيْبُدُ * القيد : نبات طيب الرائحة تكلف به الابل لانه ملينة
سنة (اللسان) .

١٧٨٢٩ - عَيْبُدُ الْأَكْرِي * هو السجور ، اطلبه .

١٧٨٣٠ - عَيْبُدُ وَلِيَّ جَيْمِيَّ * Eupelmus Geerl (S). Eupelms Geerl (F).

حشرة مباشرة ناعمة من فصيلة الميديليات . موطنها بعض
مناطق البلاد الحارة والمتنوعة نحو المعتدلة الحرارة . تتعقل
على الكثير من الحشرات اعصها المتوسيات ومنها متوسية
الذئ || جسمها عديم الجناح ، صغير القند يطول من ٢
الى ٣ سم . جوشها غدد الجناحين . يطنها معتدل الحجم .
مرزها جالس النصل الجامة ، معتدل الطول . ثوبا الى
السواد الفحمي اللامع .



عَبَّارٌ بُوْلُونٌ



عِيدُولُ جِيرِي



عِيدِي



عِدْرِيَس



عشوشة قبة

١٧٨٣٦ - **عشوشة** *Osmanthe* (F).
هي البقعة ، أطباء . أما البقعة في وضع الأبرص مصطنع
الشهائي .

١٧٨٣٧ - **عشوشة** *Griffe (bot.)* (F).
Root (E).

أول ما يثبت من أصول القصب ونحوه هو نفس رسم
قبل أن يظهر حل صلح البقرة . البقعة مبقرة .

١٧٨٣٨ - **عشوشة** *Zabrus tenebrioides*, *Z. gibbus* (S). *Zabro des cé-*
réales, *Z. boussu*, *Z. des moissons* (F). *Corn ground*
beetle (E). *Getreideauflücker* (D).

حشرة ضارة من البقوشيات . جسمها محبوس الشكل ،
طولها يراوح بين ١٤ و ١٦ م . ثوبها بني اللون ، اسود
المواج || تميش تحت الحجابة وبها ، تسرح في الخفول
تتركب الأزور وتقرض الحب قبل ادراكه || رقاتها
تقيم في التربة داخل اتفاق تحفرها قرب جلور الأزور ،
تخرج منها في الليل لتفشي حل الاقلاب النامية .



عشوشة

١٧٨٣٩ - **عشوشة** *Ibacus* (S).
Ibacus (F). *Ibacus* (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل
طوال الليل فضيلة الكركريات . انواعها المعروفة حديثة
منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || اجسامها مبطنة
كبيرة تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . تتميز بقوائمها
ويبدوها القصيرة المنسنة الطرف الاسامي || انوارها
متباينة الالوان يكثر فيها الاخضر وبسطة || جميعها
ماكولة متوسطة الصنف .



عشوشة

١٧٨٤٠ - **عشوشة** *Amara seneca* (S).
Amara bronze (F).

حشرة ضارة من البقوشيات . جسمها لوزي الشكل ،
محبوس السطح طولها نحو ٨ م . قوائمها انحراف اعطلي
يطول مواج اسف . زباناها حر الجسم ، سود الطرف .
قوائمها سود السيقان والانفعاذ ، حر الارياض || تركب
التجليات حل اختلاف اجناسها وانواعها . تميش حل
الزبور قبل ادراكها || رقاتها خافتة قليلة الاذى .



عشوشة اسف

١٧٨٤١ - **عشوشة** *Amara fulva* (S).
Amara rous (F).

حشرة ضارة من البقوشيات . جسمها محبوس الشكل ،
طولها يراوح من ٨ الى ١٠ م . ثوبها اسف اللون ،
اخضر المواج . تركب الزراوات الخفيفة حل اختلاف
انواعها . قوائمها الازهار والزبور تقضمها وتطعمها || رقاتها
خافتة تميش حل مختلف اوراق الثبات اغصها التجليات
والصلبيات والركيات .



عشوشة اسف

١٧٨٤٢ - **عشوشة** *Amara euryzona* (S). *Amara chkalni* (F).

حشرة ضارة من البقوشيات . جسمها يعني الشكل يطول
نحو ١٠ م . ثوبها كسني اللون اشقر المواج . زباناها
وقوائمها سود . تركب البقول والنباتات الخفيفة اغصها
الصلبيات || رقاتها خافتة قليلة الاذى تكتفي بقضم
الحراش الارواك .



عشوشة كسني

١٧٨٤٣ - **عشوشيات** *Pterostichidae* (S).
Pterostichidae (F). *Pterostichidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة عديدات الاجنحة . اجناسها
وانواعها كثيرة العدد . جميعها صغيرة اللد ، نخدة الاتحاد ،

١٧٨٤٠ - **عشوشة** *Agelena* (S).

Agelina (F). *Agelena* (E).
جنس حناكب من فصيلة العيشوشيات . انواعها المعروفة
كبيرة العدد ، منتشرة في معظم اصقاع البلاد الممتدة
الحارة || جميعها كبيرة اللد . تدبش في البراري بين
الاشعاب والادخال . قوتها الذباب والحوام وبعض الحشرات
الصغيرة || اشهر انواعها عشوشة التيه وعشوشة البقعة .

١٧٨٤١ - **عشوشة التيه** *Agelena labyrinthica* (S). *Agelena labyrinthica* (F). *Labyrinth-Spider* (E).

نوع من العيشوشة موطنها البلاد الممتدة الحارة . تألف
البراري والحراش . قوتها كل ما خلق يراها من حشرات ||
جسمها يطول نحو ١٢ م . عند المنكب ونحو ١٦ م .
عند المنكبة . صغارها اعطلي الشكل ، جلوري اللون
يميل وقص عند الرأس ويغير مع اقترابه من البطن .
صينها زغبان ، ثوبها صفران متقنسان ، فكاهها
ضليمان مقوسان . جرابها مستطيلة ، كثيفة الملب .
ملتها يعني الشكل ينفتح بزاويتين فحيتين وهو الى السمر
الحظية يطرحا تمشيح احمر وسرجه تينة || شعها قمي
الشكل ، كبير اللد ، قصير العنق الاجوف ، طليق
القاعدة المثبتة بعنق الحويط || بياها القشري يستمر
نحو حصة اشهر تقضيها في عكدة صليبية الشكل ، جامدة
الحلك تحفرها تحت الحجابة المرفقة من غير اللد .

١٧٨٤٢ - **عشوشة البقعة** *Agelena elegans* (S). *Agelena elegans* (F). *Elegant-Spider* (E).

نوع من العيشوشة . موطنها البلاد الممتدة الحارة . تألف
البراري . قوتها الحشرات الصغيرة اغصها الذباب والحوام
التي تعلق في شراكها بكثرة || جسمها صفر اللد يطول
نحو ٣ م . عند المنكب ونحو ٤ م . عند المنكبة . صغارها
قمي الشكل ، جلوري اللون . صينها زغبان ، ثوبها
صفران متقنسان ، فكاهها مقوسان . جرابها مستطيلة
كثيفة الملب . ملتها يعني الشكل ينفتح بست زوائد
نحيلة . وهو اسير اللون ، اخضر المواج يطول طوله اسود
يعمن حصة خطوط متعرجة اثل اسودا منه || شعها
قمي الشكل ، كبير الرصة السديرة ، طليق القاعدة
المثبتة بعنق الحويط ، حديد الشراك والحالة التي تملو
من جميع الجهات || حكدتها بلوية الشكل تحبكبها تحت
الحجابة او بينها في المراتع التي لا تخشى غير اللد .

١٧٨٤٣ - **عشوشيات** *Agelenidae* (S).
Agelenidae (F). *Agelenidae* (E).

فصيلة من الحناكب . اجناسها وانواعها كثيرة العدد .
اعطائها معظم اصقاع العالم || تتميز بفضلة الاجسام ،
بانتشار الجرامز ، بالاساع الشم وبكبر الشاشات البلى ||
اشهر اجناسها العيشوشة ، والفلس المعروف بتكبيوت
المازلز ، والنبسة .

١٧٨٤٤ - **عشوشة** *Andain* (F).
Swath, *Windrow* (E).

البقعة كية العشب التي يحصدوها الحاصد عند كل غطوة
اما اذا كانت من الزورود كالتقص والشعر فحدي غطوة .

١٧٨٤٥ - **عشوشة** *Antelope male* (F). *Antelope male* (E).

هو الذكر القمل من البلاء .

ينتهي زهرة وحيدة بيضاء اللون ، صفراء المواج ، فواحة العرف النطري || ازهاره يستمر من شباط الى نيسان .

١٧٨٥٢ - **عَبَّور شَيْق** *Leucolum pulchellum* (S).
Nivéole gracleuse (F).
 اوراته حصفية خفيفة النصل القستي اللون . ثمرانها الزهري يملو نحو ٣٠ سم . زهرته صغيرة القند ، بيضاء اللون ، صفراء الحمار ، خافتة العرف || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٧٨٥٣ - **عَبَّور شَوِّي** *Leucolum hialeale* (S).
Nivéole d'hiver (F).
 اوراته غيطية ، نحيلة ، زاحية الخضار . ثمرانها يملو من ١٠ الى ١٥ سم . ثمرانها ثنائي المصراع . ازهاره ثلاثية أو رباعية التجميع ، بيضاء اللون ، خضراء النبتة . ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

١٧٨٥٤ - **عَبَّور صَيِّي** *Leucolum aestivum* (S).
Nivéole d'été (F).
 اوراته حصفية الشكل جميلة الخضار الزاهي . ثمرانها يملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ينهي بضة من الازهار راجح عددها بين ٤ و ٨ وهي عاجية اللون خافتة العرف النطري . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

١٧٨٥٥ - **عَبَّور وَدِّي** *Leucolum roseum* (S).
Nivéole rose (F).
 نبتة نحيلة زهقة . اوراتها دقيقة ، مستطيلة ، خلية النصل ، بحرية اللون . ثمرانها يملو نحو ١٥ سم . ثمرانها ثنائي المصراع ، زهرها وردية اللون ، وحيدة ، تطول نحو ١٠ م || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين الثاني .

١٧٨٥٦ - **عَبَّوَل** *Dictateur* (F), *Dictator* (E).
 البهل الملقق النصرف . ج عباولة .

١٧٨٥٧ - **عَبَّوَلَة** *Dictature* (F).
Dictatorship (E).
 البهولة الماطلة المظلة النصرف .

١٧٨٥٨ - **عَبَّوَلَة** *Magnitude* (F), *Magnitude* (E).
 تمير اصطلاحي يستعمل في قياس الضوء الفلكي وتحديد لمعان النجوم والكواكب .

١٧٨٥٩ - **عَبْدِيَّة** *Esclavisme* (F).
Pro-slavery (E).

ملجن طبيعي عند بعض انواع النمل يرتكز على غزو قرى غيره من الانواع وعلى سلب ما فيها من بيتن لاستضافته واستعباده فيها بعد .

١٧٨٦٠ - **عَبَّور**
 المبور : الجملة من القلم وقيل اصفر وقيل بعد القلم ج حبار .

١٧٨٦١ - **عَبَّوَس** *Apus* (S).
Apus (F), *Apus* (E).

جنس دويبات مائية مفترسة من القشريات غشيبات الاطراف ونصيلة الميوسيات . انواعها المروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم . تعيش في اللقاع والاندان والاهوار || اجسامها صغيرة شبه بيضية الشكل ، مبطلة

لامسة الاطواب المختلفة الالوان . قرونها الاستشعارية زياة المفصل ، حلقة الاطراف . ارساغ قوائم ذكورها الامامية ثلاثية المقل تحمل صفان من الهياجم || رفاقها دقيقة صفرة ، غيرة اللون ، مبراه الرأس والمذنب . امرؤها واضرها اقتصاديا للبقوس .

١٧٨٤٤ - **عَبَل**
 حر الاثل المفصل ، اطليه . وهو يجري في حاله اوراوه الكثير من حناض التنيك لتلك يقف الاسهال كما يصنع الشعر ويبالغه اصفر قائم .

١٧٨٤٥ - **عَبَلَج** *Grivet* (F).
 حر جبرس سبا ، اطليه .

١٧٨٤٦ - **عَبَلِيد** *Aplidia* (S).
Aplidia (F), *Aplidia* (E).
 الواحدة عبليدة . جنس حشرات غاشضة من غديات الاجنحة ونصيلة الجمليات صفحيات القرون . انواعها المروفة ستة . اطالها حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه اعليجية الشكل ، صغيرة القند ، تطول من ١٦ الى ٢٠ سم . قرونها الاستشعارية صفحية . اناها ثنائية اللون . ذكورها وكواهلها وبطنها اقوى غضاباً من انثاهما . ظهورها لا يلحظ كامل البطن || قوتها اوراق النباتات القوية ولا تصد عن الزراعة والبقلي .

١٧٨٤٧ - **عَبَلِيْسَة** *Vitrina* (S).
Vitrina (F), *Vitrina* (E).
 جنس حيوانات برية من الرغويات مغديات الابل ونصيلة البزاليات . انواعها المروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم || تعيش في الملقق الرطبة تحت الطحالب والجلادة وتحت جرذ الحطب المغسورة بالثلج || اجسامها صغيرة ، حلزونية ، رقيقة ، شفافة ، ملونة . اجسامها مستطيلة ، رباعية القواس ، ملونة كالاصداف .

١٧٨٤٨ - **عَبِين** *Vitrina* (S).
 اطلب متصلب .

١٧٨٤٩ - **عَبَّور** *Leucolum*, *Leucojum* (S).
Nivéole (F).
 جنس نباتات بصلية من فصيلة الارجسيات . اوراتها قرمية الانتساب ، قليلة العدد ، مستطيلة النصل العصي الشكل . ازهارها بحرية متراكبة البتلات ، يجمعها وعملها شمراخ دقيق مسط || اشهر انواعها الزراعية التريينية ما يلي .

١٧٨٥٠ - **عَبَّور خَرَفِي** *Leucolum autumnale* (S). *Nivéole d'automne* (F).
 اوراته غيطية نحيلة زاحية الخضار . ثمرانها يملو من ١٥ الى ٢٠ سم . ثمرانها وسيد للمصراع . ازهاره صغيرة القند ، ثلاثية أو رباعية التجميع . بتلاتها وردية القاعدة والانتساب بيضاء الصفة || ازهاره يستمر طوال شهر تشرين الاول

١٧٨٥١ - **عَبَّور وَيَسِي** *Leucolum vernum* (S). *Nivéole printanière*, *Grelot blanc* (F). *Spring snow-flake* (E). *Frühlings-Knotenblume* (D). *Primestro*, *Campanello*, *Bulbulo bianco* (I).
 اوراته صفحية منبسطة تعرض نحو ١٦ م . نصلها جيل الخضار المائق . ثمرانها الزهري يملو من ٢٠ الى ٣٠ سم .



عبل



عبلية



عَبَّور ديمبي



عروس

Orgasme (F). عُورُفَان - عُورُفَان ١٧٨٧٥
Orgasm (E).
المُعْتَرُفُ وَالْمُعْتَرُفُ حالة الانماط التي التي تعقب التلجج .

١٧٨٧٦ - عُورُفَان
هو سباق مرته ، اطلبه . واحدته عوربه .

Genre spécifique (F). عُورُفَان ١٧٨٧٧
Specific genus (E).
النمرة في تصنيف الاحياء هي الجنس الذي يشل معظم الميزات العامة والخاصة الموصفة .

١٧٨٧٨ - عُورُفَان
هو الدليل ، اطلبه .

١٧٨٧٩ - عُورُفَان ، عُورُفَان
Gallus (S).
Cocks (F). Cocks (E).
جنس طير من فصيلة التدرجات . ربع الجثة - قصير الاجنحة مستديرا . انيكة يتألف من ١٤ الى ١٨ ريشة متعقبة الزوايا الاخير . رأسه متوج برف لحمي ويجعل حل جانبي شفه زهتين لحيتين . مخارقه قوي القرنية ، مقوس الفك الاعلى . ساقه عضة . ريشه اسطو او كاسي . غالبه خسة منها ثلاثة لامية واثنتان خلفيان ، ويودعها لا قياسي . دابره قوية سادة الخلف والاعلى . اشهرها العُورُفَان الداجن للمرفوف بالدياجج الاعلى .

١٧٨٨٠ - عُورُفَان بَنَكِيكَة
Gallus Bankiva.
G. ferrugineus (S). Coq de Bankiva (F).
طائر من العُورُفَان جميل الشكل ، طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه مزيج الالوان الزاهية فيه الاسفر والبنجي والاسمر والاحمر والابيض والاسفر والاسفر المثلج والاسود والاسمر والافيس . عرقه احمر اللون وريشاه كذلك . انشاه تدق في القرية وترجع الصنوج بالقش والريش . تبيض من ٢٠ الى ٢٢ بيضة تحضنها بسدعا ثلاثة اسابيع . قوته الاشباب والحروب والجار والخفسر والخشرات . موطنه الهند التالاية حتى ارتفاع ١٢٠٠ م . الهند وبورمه والهند الصينية والفلبين .

١٧٨٨١ - عُورُفَان جَاوَة
Gallus fuscatus (S).
Coq de Java, C. tacheé (F).
نوع من العُورُفَان . طوله نحو ٦٥ سم . جميل الشكل حديد الالوان المزركبة الزاهية المنمقة ، يكثر في صدره الاسود الاسفر المثلج . عرقه ازرق الانتشاب بنفسجي القمعة ، فكه الاعلى اسود اللون اما الاسفل فاصفر . موطنه جاو .

١٧٨٨٢ - عُورُفَان دَاغِن *
دَجَاج اَهْلِي
عُورُفَان ، عُورُفَان

Coq domestique, Poule domestique (F). Domestic cock, Domestic hen (E).
نوع من العُورُفَان يعرف بالدياجج الاعلى . موطنه العالم . يقال انه يتقدم من عُورُفَان بَنَكِيكَة . عرقه الصينيين قبل الميلاد بنحو ١٤٠٠ سنة . وعرقه البابليين به ذلك بنحو ٨٠٠ سنة ، لما اليونان فلم يذكره الا في عهد اريستوتان وذلك نحو ٤٠٠ سنة قبل الميلاد . عرقه يوربه وسلالاته عديدة لا تحصى ، يقال انها تفوق الالف . فوارقها كثيرة منها الثوب والشكل والحجم والعرق والقرعة وعدد البويض وصفت اللحم والطاقة الانماطية والناعمة الغذائية ، الخ .

تلصقها بجناات عمدة تلفظ الظهور وتلصق بالرأس . ارجلها صلبة شديدة الصغر ، كثيرة العدد . اذنائها خفيفة ثنائية الحركة .

١٧٨٨٢ - عُورُفَان ٥
Apusidae (S). Apusidae (F).
فصيلة دويبات مائية من القشريات غويشويات الاطراف . اجناسها والزواجا موصولة العدد ، منتشرة في معظم اقطار العالم . تعيش في المنافع والافواض حتى جفافها وتموت اليها عندما تبرد المياه . سرعا يحفظ بجويته في الارض الجافة اكثر من ثلاث سنوات . اجناسها صغيرة القدر تلصقها بجناات عديدة ملتصقة بالرأس . التوايح الى الرعدة الخضراء المولاج . جميعها مفترسة ، قوتها الحورينات والديدان التي تعيش في الماء . اشهر اجناسها الكيوس .

١٧٨٨٢ - عُورُفَان
Adenoma (S). Adenoma (F).
جلس نباتات عشبية برية من فصيلة الانتشيات . انواعها المرفوعة لطيفة العدد جميعها من ثورت افريقية الشرقية وسواحل الهند . تنبت في المواقع الرطبة . اوراقها متعاقبة ، صغيرة القدر ، اذنيتها التنصاع الاطليحية الشكل ، عطرة العرق الشبيه بالنعنع ، ازهارها ودية اللون ، عذقة العرق المتعصب . ازهارها سنبل التجميع .

١٧٨٨٤ - عُورُفَان ، عُورُفَان
هو الشيطان ، اطلبه .

١٧٨٨٥ - عُورُفَان اَبْنِيص
هو الشبح القمعي ، اطلبه .

١٧٨٨٦ - عُورُفَان مَبْدُول
هو الشويلا ، اطلبه .

١٧٨٨٧ - عُورُفَان
هي الند ، اطلبه .

١٧٨٨٨ - عُورُفَان ٥
Abyla (S). Abyla (F).
النسيلة حيوان بحري من الموفات ودية الماصات . يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط .

١٧٨٨٩ - عُورُفَان الزُرْق
هو النحية ، اطلبه .

١٧٨٩٠ - عُورُفَان
الباني والحار الباني واحد . راسع سمار الزرد .

١٧٨٩١ - عُورُفَان السَكِينَة
Agres, Apparaux (F). Rigging, Apparatus, Gear (E).
هي الادوات التي لا بد منها للسفارة وتعتبر جزءا من السفينة في حالة البيع والرحن والحجز والتأمين .

١٧٨٩٢ - عُورُفَان زَرْاعِي
Matériel agricole (F). Agricultural material (E).
هي الاجهزة الزراعية الثقيلة .

١٧٨٩٣ - عُورُفَان
الحاق من الخيل : التجانب ، مفردة حقيق . المتاق من الفيل : الحورج ، مفردة حقيق .

١٧٨٩٤ - عُورُفَان
Hyène mâle (F). Hyena male (E).
الذكر من الضباع .



عُورُفَان بَنَكِيكَة



عُورُفَان دَاغِن

١٧٨٨٠ - عُتْم * ، عُتْم - زَيْتُون بَرِي

Olea sylvestris, *O. oleaster* (S). *Oléastro*, *Olivier sauvage* (F). *Wild olive tree* (E). *Wilder Ölbaum* (D). *Olivo salvatico* (I).

هو الزيتون البري شجرته تملو من ٥ الى ١٠ امتار . فروعه وإنثائه شائكة . اوراقه معتقة ستائية . نصلها جامد النسيج ، مدبب العقصة ، يطول من ٥ الى ٨ سم . صفحته العليا بجمرة اللون والنفل خالية يطولها مواج فني || انحراف عقودي التجميع ، محوري الزنكاز . اثماره صغيرة اللد ، بيضاء اللون ، غشراء المواج || ثماره يبيضة الشكل ، صغيرة اللد ، قليلة اللب تدعى الزيتون .

١٧٨٩١ - عُتْرُد

المتد هو الجدي الذي استكرش وقيل هو الذي بلغ السفاد .

١٧٨٩٢ - عُتْوَمَة *Chamelle bonne laitière* (F). *She-Camel great deal of milk* (E).

الناقة الزيرة الدار .

١٧٨٩٣ - عُتْيِي * *Nova* (F). *Nova* (E).

التي كل نجم يشبه فياقه فجأة ثم يجبر . ج حثات .

١٧٨٩٤ - عُتَيْق *Cheval pur sang* (F). *Blood-horse* (E).

نمت تعري يطلق على كل فرس كريم منسوب السلالة .

١٧٨٩٥ - عُتْ *Mites*

كلمة شاملة تطلق على عدة حشرات من فصائل مختلفة يجمعها ما تلحقه من اذى بالحيوان والطير والفراء والالبسة الصوفية والكتيب ، الخ .

١٧٨٩٦ - عُكَّان * *Fumago vagans* (S). *Fumagine*, *Noir*, *Suie* (F). *Sooty mould* (E). *Russeau* (D).

وصم فطري يمد الى مختلف انواع العثان من فصيلة الرشحيات ورتبة الرشيات . يصيب نولم النبات فيركب الاقان والارواق الفتية ويمتلقها يوشع ليد من السنام ومنها عن القيام بولفها || اضراره قليلة لانه محدود الانتشار يمتري البرتقال والزيتون والكريمة وبعض النباتات الصناعية كالتيغ .

١٧٨٩٧ - عُكَّة *Dermestes*, *Atagenus* (S). *Dermeste* (F).

جنس حشرات مؤذية من فصيلة العثيات . انواعها كثيرة العدد، جميعها صغيرة اللد باعثة الالوان . تعيش على اضرار النباتات || رقاتها مؤذية تفسد الحبوب واللبس واللبس والشر والصفوف والريش والفراء واللحوم المقددة ، الخ . اضرارها واضرها ما يتبع .

١٧٨٩٨ - عُكَّة الحَبِوب *

Trogoderma granarium, *T. versicolor* (S). *Trogoderma des grains* (F). *Khapra beetle* (E). *Khaprakfer* (D).

حشرة من الحيات طولها نحو ٣ سم . ثوبها بني اللون ، رأسها وبوسنها ورطبها سود . زباناها الى الحمرة الاربوانية . رقتها حليلة الجسم ، دقيقة اللد ، بنية الثوب الجذع بالايض . تركيب الحبوب المخزونة فتلتهمها وتلفها .

١٧٨٨٣ - عُتْرَقَان سَرْتَدِب

Gallus stanleyi, *G. lineatus* (S). *Coq de Stanley*, *C. de Ceylan* (F).

نوع من العترقان ، ثوبه ثوب عترقان بنكهة الا انه اسفر العرق والورعيتين حاد الصوت للمسطلق القزرة . موطنه سرتدب .

١٧٨٨٤ - عُتْرَقَان هِنْدِي *Gallus sonnerati* (S). *Coq de Sonnerat*, *C. sauvage de l'Inde*, *Katukoli* (F).

نوع من العترقان ، موطنه الهند . طول نحو ٥٠ سم . ثوبه كثاوب، جسمه متراكب الالوان الكثيرة الزائجة غير انه يرتكز على الالوان الاربعة . عرقه احمر اللون وريشاه كذلك ، مغاره وريشاه الى الصفرة || جسمه مع سائر انواع جسمه الاجنار الاقضية الاخصان .



عتريس

١٧٨٨٥ - عُتْرَيْس * *Atherix* (S). *Athérice*, *Athérice* (F). *Atherix* (E).

جنس حشرات من فصيلة اللمبيليات ورتبة ذوات الجناحين انواعها المروفة عشرة اعطائها تمتد من الصين الى اوروبا || اجسامها متوسطة اللد ، تطول من ٨ الى ١٠ سم . وريشها كبيرة . عريها كبيرة ، فارقة عند الفتح . قرونها الاستشعارية صغيرة ونحيلة . اعطائها مستطيلة . ملابسها صغيرة . كراشها كبيرة . بطونها مستطيلة . ظنايب قوامها الوسطى والخلفية شائكة للنماتس الذرية . وريشها ملونة واثوابها ايضا || تألف الموائل الرطبة وفضاف مجاري الماء . جميعها قانصة . يرقاتها تعيش في الماء على المواد الصوفية المنحلة .



ثم

١٧٨٨٦ - عُتْرَيْس * *Campephagus* (S). *Campephage* (F). *Campephagus* (E).

جنس طير من فصيلة الترسيات . انواعها المروفة نحو ٥٠ جميعها من اوياء وضوارب العالم القديم . تألف الغابات والاحراج والحدائق || اجسامها صغيرة اللد، زجاجية الالوان المستديرة الاطراف . صغيرة النفاذ الذرية . اثوابها متباينة الالوان المتراكبة . وريشها مبلقة . صفورها ويطونها محتلة تملوها رقة مراء تنصر حتى الانقاذ || قوتها الحشرات الصغيرة والاساريع والديدان والذباب . تدفن في الاجنار لقتل المعتلة الارتفاع البعيدة عن السمك . تحسن نحو خس يبيضات تربتها الاثان بمنوبة الذكور نحو ١٥ يوما .



عثان

١٧٨٨٧ - عُتْرَيْسِيَّات * *Campephagidae* (S). *Campephagidae* (F). *Campephagidae* (E).

فصيلة طير من الجوام مشروبات المناقير . اجناسها واثوابها المروفة عديدة لا تقل عن تسعين . موطنها العالم القديم ، معظمها اسيري وبعضها اروي وافريقي . الانواع الاسيوية والادوية من الضوارب اما الافريقية قليلة || تألف الغابات والاحراج والحدائق . قوتها الحشرات واساريها والديدان والذباب || اجسامها الصغيرة والوسطى ، تتميز بمتانها الصغيرة الذرية وبانثانها قرتاجية الريش || أشهر اجناسها الترسى .

١٧٨٨٨ - عُتْك *Agamie* (F). *Agamy* (E).

هو اندام الازهار .

١٧٨٨٩ - عُتْكَة *Lever* (F). *Lever*, *Crow-bar* (E).

هي الرافعة اي الخنق . ج ح .



عتة الحبوب

١٧٨٩٩ - عثة السجاد * Anthrenus verbasci (S).

Anthrenus des tapis (F). Carpet beetle (E).

حشرة من العثيات يضيء الشكل طولها نحو ٣ م. ثوبها اسود اللون. عندلها مديتان يقع شرقية طلاء اللون. رقتها دقيقة صغيرة حلبيّة الجسم، ممرّاء اللون، سوداء الرأس والأرجل، يضيء اللدب. تلحس السجاد وتاتر الألفنة الصفيّة.

١٧٩٠٠ - عثة السقم * Dermestes lardarius (S).

Dermeste du hard (F). Larder beetle (E).

حشرة من العثيات طولها نحو ٩ م. ثوبها اسود اللون تملو شحمة خلية طلاء، تتركز في النصف الاول من العندين || رقتها غبراء اللون تلحس السقم والفراء وتاتر المواد الحيوانية.

١٧٩٠١ - عثة الفراء * Dermestes vulpinus (S).

Dermeste renard (F).

حشرة من العثيات طولها نحو ٨ م. ثوبها اسود اللون، اثير الخواصف الحلبيّة. يطنها الى السرة يملو خط قاطب احمر || رقتها ممرّاء اللون سوداء الرأس والفرج والأرجل. تركب الفراء والجبن وتختلف المواد الحيوانية والنباتية.

١٧٩٠٢ - عثة السرايين * Actagenus peltio (S).

Actagene des pelliciers (F).

حشرة من العثيات طولها نحو ٤ م. ثوبها شحليّ اللون. اصير المراج تحمل في كل من عنقها نقطة يضيء || رقتها شفراء اللون ممرّاء الرأس تحمل عند فرجها ضمة من الحلب الطويل. تركب وتقرض للفراء والبسط واليابب الصفيّة.

١٧٩٠٣ - عثة الكمن * Anthrenus plimipinellae (S).

Anchrène des pimpinelles (F).

حشرة من العثيات يضيء الشكل طولها نحو ٣ م. ثوبها الى السرة تحمل في وسط عنقها جنة متعرجة يضيء اللون. تركب يوجه صام جميع اجزاء نباتات فصيلة المركبات اعصها الكمون والانيسون.

١٧٩٠٤ - عثة المتاحف * Anthrenus museorum (S).

Anchrène des musées (F). حشرة من العثيات جسمها يضيء الشكل مبسط. طولها نحو ٣ م. ثوبها ابيض اللون. تعيش على اجزاء نباتات الفصيلة الجيمية || رقتها صغيرة، دقيقة، غبراء اللون، مجذعة بخلوط حلبيّة شحليّة، تقرض كل ما وصلت اليه من المواد الحيوانية المحفوظة كالشعيرات والعيير والحيوان.

١٧٩٠٥ - عثجول * Clavatus (S).

Clavatus (F). Clavatus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل وضعية للكريزيات. انواعه الممارسة المرفوعة نحو ٢٠ منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي وشواطئ افريقية الشمالية || اصداؤها وشية الشكل تملوها بعض المناخس الكبيرة الحادة. فوهاها شبه فرجة الشكل. مردل القوية مجهز بثلاث اسنان، السن الوسطى قصيرة اما الجانبيتان فكثيرتا القد مديتا الاطراف.

١٧٩٠٦ - عثّر * عثريّ Culture sèche (F).

Dry-farming (E).

المثّر والمثري والذي : ما سقته البهاء من الاجار والزرع. وسنه في حديث الاكاذب : ما كان يملّ أو شرياً فيه المشرّ.

١٧٩٠٧ - عثّر

هو الأطر من النباتات الزينية، اطله.

١٧٩٠٨ - عثرب

شجر نحو شجر الريان في القدر وورقه احمر مثل ورق الحماض رّق عليه بطون الماشية ازل شيء ثم عقد عليه الشمع بعد ذلك وله صاليج حمر وله حبة كعب الحماض. واصلته شرّة (من اي حنيفة).

١٧٩٠٩ - عثّق

هو البقس الدائم الحفرة، اطله. واصلته عثقة.

١٧٩١٠ - عثكول

Panicle (F). Panicle (E). عقنود من السيليات بسيطاً كان أو مركباً.

١٧٩١١ - عثكولي

Paniculé (F). Paniculiste (E). نمت تعريفي يوصف به الازهار الذي شكله شكل الشكل.

١٧٩١٢ - عثلب

Bouture (F). Slip, Cutting (E). هو كل تقصيب أو فند أو عقلة الخ. صار قطعاً وتخفيري.

١٧٩١٣ - عثلب

Bouturage (F). Propagation by slips, P. by cutting (E). عملية غرس العتالب بعد تأطعها.

١٧٩١٤ - عثلوپيات

Schizophytes (F). العثلوپيات فئة من النبات تتكاثر بالتجزئة أي يقطع جزء منها ويزرع في التربة. يقال نبات عثلوپي.

١٧٩١٥ - عثمان

فرخ الحباري وفرخ العنبان.

١٧٩١٦ - عثنج

المنجج : النسخم التثليل من الابل.

١٧٩١٧ - عثيات

Dermestidae (S). Dermestidae (F). Dermestidae (E). Speckkäfer (D).

فصيلة حشرات العث من رتبة عثديات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها صغيرة القند، زهاب الجسم، متراكبة الاوانح المختلفة الزركفة. قرونها الاستشعارية صرطنانية الشكل. ارساعها حلبيّة الشكل || تركب الازهار ولها الانجبار وتختلف المواد الحيوانية. رقاتها تعيش على المواد العضوية وبقياء الحيوان الجافة كالحلود والفراء والریش واللحوم المقددة، الخ.

١٧٩١٨ - عثيل

Densiflore (F). Densiflorous (E). نمت تعريفي يطلق على كل نبات متراكب الازهار البلية.

١٧٩١٩ - عيجارة

Ergot (F). Spur (E). دائرة الطائر آتي يضرب بها.

١٧٩٢٠ - عيجالة، عيجالة

Salaire (F). Salary, Hire (E). هي الاجرة التي يتقاضاها العامل لقاء، لفسل الذي قام به.

١٧٩٢١ - عجم

العجم الخفاش الغنم.



عثة السجاد



عثة السقم



عثة الفراء



عثة المتاحف



عثة المتاحف



عثر

اجناسها وأنواعها المروعة عديدة معظمها من نمول الحماط الاستوائية والحارة || جميعها حربية تألف الغابات والحدائق اجسامها كبيرة القد مجهزة بمخاض حادة تهريق السم او تقلقه من بد || يفسد انواعها دجوي والبعش الأخر يصرح في النهار || اشهر اجناسها المبروف والكبار .

١٧٩٣٦ - عَجَزْ
هي القناب الذهبية ، تأخذ السخلة فطير بها . ج عجزان .

١٧٩٣٧ - عَجَزْ
Déficit (F). Deficit (E).
هو مقدار النقص الحقن بعد اجراء كامل الحساب .

١٧٩٣٨ - عَجَزْ ، قَبْ
Sacrum
عظم في آخر سلسلة الظهر .

١٧٩٣٩ - عَجَزْ الاستغلال
Déficit d'exploitation (F). Working deficit (E).
هو ما نقص من الدخل بعد تقويم المستغل بالنسبة الى الكلفة .

١٧٩٤٠ - عَجَزْ الأسد
عجز الأسد اربعة كواكب صغار اسفل من المواء .

١٧٩٤١ - عَجَزْ حركليي
Sacro-iliac (F).
Sacro-iliac (E).

١٧٩٤٢ - عَجَزْ ذَيْلِي
Sacro-caudal

١٧٩٤٣ - عَجَزْ شَرْجِي
Sacro-rectal
ويسمى مستقيمي وهو غنص بالمعي المستقيم .

١٧٩٤٤ - عَجَزْ عَصْفِي
Sacro-coccygien (F).
Sacro-coccygeal (E).

١٧٩٤٥ - عَجَزْ فَرْجِي
Sacro-vertébral (F).
Sacro-vertebral (E).

١٧٩٤٦ - عَجَزْ لَقْطِي
Sacro-lombaire (F).
Sacro-lumbar (E).

١٧٩٤٧ - عَجِيف
Qui se prive de nourriture (F).
نمت تمريلي يطلق على كل فراشة او حشرة جلابة لا تفرد القوت . وهي ، غالباً ، تعيش من يوم الى اسبوع . م . عيفة .

١٧٩٤٨ - عَجْجَاء
Terre aride (F).
Barren ground (E).
المجفأ والارض المجفأ : التي لا خير فيها .

١٧٩٤٩ - عَجْجِيَّات
Entomophthoraceae (S).
Entomophthoracées (F). Entomophthoraceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة النطرييات ورتبة الليفيات .

١٧٩٥٠ - عَجَلْ
Veau (F). Calf, Veal (E).
ولد البقرة حتى السنة الثانية من عمره ثم يصبح جعداً .

١٧٩٥١ - عَجَلْ البَحْر
هو الفقمه حيوان مائي لبون ..

١٧٩٥٢ - عَجَلْ حَصِي
Bouillon (F).
Young bullock, Steer (E).
هو المجل سلت عصيتا .

١٧٩٢٢ - عَجَان
Périnée (F). Perineum (E).
المسافة الكائنة بين عضو التامثل والشرج .

١٧٩٢٣ - عَجَانِي
Périnée (F). Perineal (E).

١٧٩٢٤ - عَجَانِيَة
Tendon
المجاية . ج عجي وصجايات وصجايا : اوتار قوائم الخيل والاول .

١٧٩٢٥ - عَجَب
هو جلاب انيل ، اطلبه .

١٧٩٢٦ - عَجَب ، عَجَبْ
Racine de la queue (F).
Origin of the tail (E).

المسب : اصل الذنب وهو من كل دابة مسا انضم عليه الوركان من اصل الذنب المنفرد في مؤخر الميز . وهو المعصم والمسب . ج اعصاب وصجوب .

١٧٩٢٧ - عَجْدْ
Raisin sec (F). Raisins (E).
الجد هو التزبيب او حب التزبيب .

١٧٩٢٨ - عَجِرْ ، عَجِدْ
Loupeux (F).
Wenny, Knobby (E).
من الثبات ما كان ذا عجر او عقد .

١٧٩٢٩ - عَجْرَة
Éclat de souche, Souchet,
Souquet (F). Shiver, Splinter, Ragstone (E).
جزء من اربعة الشجرة ، يحل برمة أو يفسد البرام ، يقطع ويترس .

١٧٩٣٠ - عَجْرَة ، مَعَجْرَة
Défolié (F).
Defoliate (E).
غير صيرد ومجرد : حار من وده .

١٧٩٣١ - عَجْرَم ، أَشْكَل
Rhamnus petiolaris (S). Nerprun pétiole (F).
الأشدة صيرة وأشكلة ، شجيرة برية ، حرجية ، جبلية من فصيلة النبقيات . اصنامها بعض جبال الشرق الاقد ومنها جرد لبنان || ساقها فرعا كثيرة المقد الشائكة .

فروعها متعاقبة ، متفرعة ، شائكة . لوراقها متعاقبة ، متعاقبة ، متعاقبة الجامدة ، شديدة الحفار ، متعاقبة المروق . ازهارها ضيقة التجميع ، غشوية ، خاسية الاجزاء . ثمارها كروية لحية ، حامضة المذاق ، جزوية اللون عند الادراك || ازهارها يسمر من ايار الى حزيران .

١٧٩٣٢ - عَجْرَم
دوية سلبة تكون في الشجر (اللان) .

١٧٩٣٣ - عَجْرَمَة
شجرة شائكة كثيرة المقد . ج عجرم .

١٧٩٣٤ - عَجْرُون *
Camponotus (S).
Camponote (F).

جلس نمل كبير القد عديد الانواع ويكثر ويهود في اسراج البلاد الحارة . منه انواع تبي قراها بالطين وغيرها تردب الخشب وتقتضه .

١٧٩٣٥ - عَجْرُونِيَّات
Camponotidae (S).
Camponotidés (F). Camponotidae (E).

فصيلة حشرات من النمليات غشائيات الاجنحة المحمويات .



عجرون

١٧٩٦٢ - عَجُور * عَجْدُور

Cucumis chate (S). Concombre chaté, Abdellavi des Egyptiens (F). Chate of Egypt, Orange melon (E). Agyptische Melone, Orangen Melone (D). Ciatze, Cocomero d'Egitto (I).

نوع من الفناء المأكول الفبار تكثر زراعت في البلاد الحارة انحصار مصر والسودان . يجد في الاربة الدبالية المتروطة الانتماس وهو يرغب في الري لكنه يخشى الرطوبة المتحمكة



عجل

١٧٩٦٣ - عَجُور الرِّيقي

هو البياض الرزاعي ، اطلبه .

١٧٩٦٤ - عَجَبَج (F). Bauglement, Mouglements (F). Bellowing (E). صوت البقر من ذكر واثق .

١٧٩٦٥ - عَدَد * عَدَدَاك (F). Dénombrement (F). Enumeration (E). الحد والعدد هو الاسماء النوي للمشتلات مكان حين .



عجور

١٧٩٦٦ - عَدَدَاه * وَاكُر (F). Couraer (F). Runner (E). كل من كان سريع العدو او اشترك في سباق الركض .

١٧٩٦٧ - عَدَدَاه الشَّط (F). Octodrome (F). طائر من طوال الساق يدعى جَوَّكَل ، اطلبه .

١٧٩٦٨ - عَدَدَاك * رَمَل الناقع (F). Tangua, Tanque, Tangu (sable fin) (F). Slimy sand (E). رمل وامل والفر النفاير والنافسر المنفعية التطفلية . يستعمل في دمل الاربة العمادة الانتماس .



عجور

١٧٩٦٩ - عَدَدَاك (F). Effectif (F). Actual (E). هو مجموع الاجزاء والمال والمأمورين الذين يقعون الى شركة ما او مصنع او مؤسسة ، ابلغ .

١٧٩٧٠ - عَدَدَاك السرعة (F). Compteur de vitesse (F). Quickness meter (E). آلة تستعمل في معرفة سرعة الشيء .

١٧٩٧١ - عَدَدَاك * هِدْرَكَة (F). Hydra (S). Hydra (F). Hydra (E).

جنس حيوانات مائية من الشعيرات انزاحة كثرة العدد جميعها مفرقة تعيش لاصقة على النباتات البحرية . اجسامها مؤلفة من اثيوب عضوي دقيق طوله يراوح بين ٥٠ و ٥٠٠ سم ومن عجاس خيطية تحيلة شديدة اللؤلؤ وظفيتها القبض على الحيوانات الدنيا التي تمر في سحارها .



عدار

١٧٩٧٢ - عَدَدَاك * (F). Zoidiome (F). Zoidiome (F).

نعت تعريفية يطلق على كل نبات لا يتم تأبير ازهاره الا بواسطة الطير او الحشرات .

١٧٩٧٣ - عَدَاكَاك * هِدْرَاكَة (F). Hydralras (F). رتبة حيوانات مائية من المفويات .

١٧٩٧٤ - عَدَاكَاك * (F). Zoidiome (F). Zoidiome (F).

اسم يطلق على التأبير الذي يحصل بواسطة الطير والحشرات .

١٧٩٥٣ - عَجَلَة (F). Vèle (F). She-veal (E).

ابنة البقرة حتى السنة الثانية من عمرها وبهذا تصبح جليحة .

١٧٩٥٤ - عَجَلَة * طَبِير (F). Charrette, Tomberneau (F). Cart, Tip-cart (E).

حربة اللق ذات دولابين .

١٧٩٥٥ - عَجَلَس * (F). Haplostethus (S). Haplostethus (F).

سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة العجديات الشائكات الزعانف . موطنها المتوسط والاقليم . تتميز بعينها الكبيرتين المستديرتين وبزبارة الاكسال الثالثة التي تلو كامل رأسها . طولها نحو ٢٥ سم . ثوبها الى السمرة البغاء يملوها مراح بنفسجي . بطنها فضي اللون ، زعانفها وردية والزعجيرة منها كبيرة القد فارقة .

١٧٩٥٦ - عَجَلَس المتوسط (F). Haplostethus mediterraneus (S).

Haplostethus de la Méditerranée (F). Haplostethus mediterraneus (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة العجديات ورتبة شائكات الزعانف . اصطناعها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من املاك الثنائات . ملجئها الحياتي شرسني || جسمها شبه بيضي الشكل ، متحل التليط ، طولها من ٢٠ الى ٢٥ سم . ثوبها الى الفخار الزرق . يملوها مراح بنفسجي يبق في الظهر . بطنها فضي المراح . زعانفها متراكبة الاخر والوردي . رأسها كبير الجرم ، انفس الخط ، تملوها زعاير ناتئة . شعها رجب الانفراج . فكها السلي يتقدم العلوي . اسنانيا صغرية ، متراكبة ، حلقة السطح . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، نائشوان ، مطوختان بالزوايق النائسة . زعانفها الظهرية وحيدة ، مستطيلة الشكل . زعانفها القيلية كبيرة ، فارقة || عليها متوسط الصنف ، مأكول .

١٧٩٥٧ - عَجَمَكَة (F). Noyse (F). Stone (E). القسم الداخلي من الشجرة صلب وقسا وحوى البزرة .

١٧٩٥٨ - عَجَمَكَة * نخلة تثبت من فؤاة .

١٧٩٥٩ - عَجَمَكَاك * لَوْرِيَات (F). Arbrs à noyaux (F). Trees from stones (E).

هي الاشجار الجمية البزور كالدراق والحوخ والمشمش واللوز ، الخ .

١٧٩٦٠ - عَجَن * عَجَنَان (F). Pécrissage (F). Kneading (E).

عملية خلط الدقيق بالماء ودعكه ليصير عجيا .

١٧٩٦١ - عَجَنُوم * اَبُو جَكَم (F). Rhynchos (S). Bec-en-ciseaux (F). Scissor-bill, Skimmer (E).

جنس طيور راسه مائبة من صليحيات الناقير كفات الاقدام . انماه حبة جميعها بلقاء الثوب . تتميز بشكل منقريها التي تشبه جلي الحياط . وروبوها صغرية القد . امتاقها طويلة . اجنحتها مستطيلة ذلقة . اذنانها فارقة . موطنها البلاد الحارة . تائف الضبوط البحرية والبرية . ثوبها الحشرات والاسماك . مسرحها دجوي يتعد من الترويب الى الشرود || انثاها تثن في انماحيص تديرها على الرمل بين حصور الجرف والشرابي .

القدم || جسمها صلبية ، متوسط القد ، متكاثف الخمل .
يسقطها تراوح من ٤ الى ٦٠ م . الاذن اكبر قدماً من
الذكر واهت ثوباً منه . رأسها مخروطي . مينها صغيرتان ،
بارزتان . زباناها شطيان مزدوجان . عظمها قصير .
ملساها صغيران . اجنتها كبيرة ، ملونة وبسقة ||
سرقها خاشعة تمش على اوراق البتوليات .

Adrastra (S). * عذرسكة *
Adrastra (F).

جنبة معمرة برية وزراعية تربيتية من فصيلة الدلائيات .
منيتها جزر الزايع || ساقها متعصبة . فرومها نحيلة .
اوراقها متعاقبة ، سنانية التصال الجمادة المتوسطة القد .
ازهارها فردية التجميع ، طرفي الاثرناز . انهارها كبيرة ،
خامسة البتلات ، تبينة اللون يعلوها موانج ليلكي || تزوع
في الحدائق في المراتق الجنوبية لانها تحب صقيع الشتاء .

Endromididae (S). * عذرسيمات *
Endromididae (F). Endromididae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المرفقة قليلة المدد جميعها شحالية الاصلان .
مركزها القريبي يقرها من البغيات || اجسامها صلبة ،
فيه اسطوانية الشكل ، يغلغها خل مستطيل ، بسنها
تتراوح من ٥٠ الى ٦٠ م . انثاها اكبر قدماً من ذكرها .
رؤوسها مخروطية . عيونها مرطاة . اعطامها قصيرة . ملابسها
صغيرة . قرونها الاستعمارية شطية مزدوجة . اجنتها
كبيرة ، حادة التهذيب . الثوبان متراكبة الاوان الجسدية .
اسارمها شبه مرطاة ، تمش على الانجار . اكامل خادراتها
يم ضمن صلجة مستقلة || اشهر اجناسها العدريس .

Mules (F). Mule (E). * عَدَس *
العدس والعدس هو البقول وقد سمى بجزره . قال الشاعر :
أذا حلت بزني على عدس على الذي بين الحمار والعريس

١٧٩٨٨ - عَدَس * ، بِسَنْسُون *
Ervm lens, Lens esculenta (S). Lentille (F). Lentil (E). Echte Linse (D). Lenta, Lencichla (I).

نبات عشبي زراعي حولي من فصيلة القريبات القراشية .
ضروبه عديدة تختلف باختلاف مقدورها الانماي والانتاجي
وسرعة ادراكها والوان حيويها . الق . جميعها صغيرة
القد ، جنودها سطحية ، سقوها مضطمة لفرار تملو من
٢٠ الى ٤٠ م . اوراقها مركبة ، متعاقبة ؛ حشية
الاطراف . وريقاتها صغيرة القد يفضية الشكل متعاقبة .
انهارها محورية الاثرناز ، طويلة المالحق ، يبهام اللون ،
زرقاء التبريح . ثمارها قرون صغيرة مضطمة ، ماسلة البشرة ،
يوجد في داخل كل منها من الحبة الى الحبتين || وهو
من النباتات الزراعية الشائعة الاستعمال بمحدي في جميع الارضية
الحظيفة المعتدلة الاندماج التي لا تقتصر الى الكلس . موقعه
في السورة الزراعية يأتي في الاول ثم تليه الحبة او الشعير .
والعدس من النباتات المشهورة بفراة موادها الغذائية
الثامنة . فهو يحوي نحو ٨٢ وسلة غذائية يمكن تحميدها
كما يلي :

مواد هيدروكربونية ٥٨ %
مواد بروتينية ٢٢ %
مواد دهنية ٢ %

اما تين العدس فهو من انواع الكلاء الجيدة التي تتلفها
المواشي بشهوة .

Hydroides (F). * عذاريات ، هذريات *
طبقة حيوانات مائية من شعبة الهيرنات تشمل ثلاث رتب :
المدارات والمرجانيات والبلعليات .

Génétiqne (F). Genetic (E). * هَدَاكَة *
علم يبحث في التمثل وروايته واراسره عند الحيوان
والنبات .

١٧٩٧٧ - هَدَاكَة ، هَدَاكَة ، هَدَاكَة ، هَدَاكَة
Nombre entier, N. intégral (F). Integral number,
Whole number (E).

١٧٩٧٨ - هَدَاكَة ، هَدَاكَة ، هَدَاكَة ، هَدَاكَة
Quorum * نصاب *
هو العدد الاقل المفروض ليكون اجتماع اعضاء الجمعية
قانونياً .

١٧٩٧٩ - هَدَاكَة ، هَدَاكَة ، هَدَاكَة
Nombre fractionnaire (F). Fractional number (E).

١٧٩٨٠ - هَدَاكَة ، هَدَاكَة ، هَدَاكَة
Nombre composé (F). * هَدَاكَة ، هَدَاكَة *
Composite number (E).

١٧٩٨١ - هَدَاكَة ، هَدَاكَة ، هَدَاكَة
Numéral, Numérique (F). * هَدَاكَة ، هَدَاكَة *
Numeral, Numerical (E).

١٧٩٨٢ - هَدَاكَة ، هَدَاكَة ، هَدَاكَة
Striga (S). * هَدَاكَة ، هَدَاكَة ، هَدَاكَة *
Strige, Goutte de sang (F). Witch weed (E). Echte
Witchweeder (D). Striga (I).

جنس نباتات عشبية برية مرموعة من فصيلة الحنازريات
منها البلاد الحارة تكثر في المروج وفي البور على السواء .
يقال انها طيبة .

١٧٩٨٣ - هَدَاكَة ، هَدَاكَة ، هَدَاكَة
Adrastra limbatu (S). Adrastra bandé (F).
Adrastra limbatu (E).

حشرة خاشعة ناعمة من فصيلة السالويات ورتبة مفدمات
الاجنحة . موطنها بعض اقالم البلاد المعتدلة الحرارة من
الشرق الاذل واروبية . تألف المراتق الرطبة والمروج وضفاف
الماء والاحراج المغلة . خنافسها تمش على اوراق النبات .
يرقاتها تمش على المواد الضعيفة وعلى جذور النباتات
الضاربة نحو الاخلال || جسمها صغير دقيق بطول من
٤ الى ٦ م . ثوبها ثنائي اللون ، اسود الجسم ، كسني
الظهران المنصب بخار اسمر . رأسها صغير القد . زباناها
عظيخان . مينها صغيرتان . ارسافها خلسة الخقل ||
الاثن ايزر قدماً من الذكر واهت ثوباً منه واقرس زباناها
وانسهم بطناً || جيلها رباعي الخلود . تظهر الحشرة
الجملانة في اواخر شهر ايار وتبقى حتى اواخر محرم .
تسرح في النهار وتبيت في الليل || زين الدساق يستمر
طول شهر حزيران وترز المنكن في الجملة وحت الليل
ضمن انابيب سجيبة الشكل || البرقة عند ادراكها الكمال
الجمسوري تقطو نحو ١٢ م . ثوبها الى الصغار السابق
التناهي المراج || طول الاكامل يستمر من ٤٥ الى ٥٥
يوماً ويتغذى في التربة .

١٧٩٨٤ - هَدَاكَة ، هَدَاكَة ، هَدَاكَة
Endromis (S). * هَدَاكَة ، هَدَاكَة ، هَدَاكَة *
Endromis (F). Endromis (E).

حشرة من فصيلة المدريسات ورتبة حرشفيات الاجنحة .
اصلها تشمل كامل المنطقة الشمالية وما يتأخها من العالم



عدراس مصب



عدريس



عدرية



علس

١٨٠٠١ - عَدَمُ الرَّجُوعِ Irrevocabilité (F).

Irrevocability (E).

صفة تنبئ بها الحية بين الاحياء وقد لا تسمح بديها ونسوحها انه يحظر على الرباح ان يحفظ لنفسه مباشرة او مفادورة في عقد الحية بحق الابطال او التبطال .

١٨٠٠٢ - عَدَمُ النَّصْبِ Irrégularité (F).

Irregularity (E).

هو القسم الذي لا يصح للمرضع الا بدمه .

١٨٠٠٣ - عَدَمُ الْمُحْجُوزِيَّةِ عَدَمُ الْاِحْتِجَاج Inopposabilité (F). Inopposability (E).

هو ان يستحيل على الخصم ان يبيع شئ منه بحق له .

١٨٠٠٤ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ التَّحْوِيلِ Incasabilité (F). Untransferable (E).

صفة الاموال التي لا يمكن نقل ملكيتها الى الغير .

١٨٠٠٥ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ التَّصَرُّفِ Inaliénabilité (F). Inalienability (E).

صفة الاموال المينة التي لا يمكن نقلها او تكليفها بحقوق حية جديدة كالارتفاق وقرن ، القم .

١٨٠٠٦ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ التَّكَادُّمِ Imprescriptibilité (F). Imprescriptibility (E).

صفة تلازم حقاً او دعوى لا يستعملها مرور الزمن ككساحى الاحوال الشخصية والاملاك العامة .

١٨٠٠٧ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ الْحُزْمِ Insaisissabilité (F). Unsaisiability (E).

صفة عين ثابتة او منقولة لا يستطيع الدائن مالكتها ان يبيعها .

١٨٠٠٨ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ الْقِسْمِ Indivisibilité (F). Indivisibility (E).

هي حالة ما تنقسم قسمه مادياً او منوياً . كالاقطار وسق الارتفاق والالتزام بفتح ثمن حيوان حي معين .

١٨٠٠٩ - عُدْمُ الحُزْمِ Pernoptère mâle (F).

Pernopterus male (E).

الذكر من الرخيم .

١٨٠١٠ - عُدْمُ الحُزْمِ هو الضفدع ، اطليه .

١٨٠١١ - عُدْمُ الحُزْمِ اخضر Grenouille verte (F).

هو الضفدع الاخضر ، اطليه .

١٨٠١٢ - عُدْمُ الحُزْمِ اشعر Grenouille poilue (F).

هو الضفدع الاشعر ، اطليه .

١٨٠١٣ - عُدْمُ الحُزْمِ اقر Grenouille rousse (F).

هو الضفدع الاقر ، اطليه .

١٨٠١٤ - عُدْمُ الحُزْمِ الحقل Grenouille oxyrhine (F).

هو الضفدع الحقل ، اطليه .

١٨٠١٥ - عُدْمُ الحُزْمِ جبار Grenouille géante (F).

هو الضفدع الجبار ، اطليه .

١٨٠١٦ - عُدْمُ الحُزْمِ نشيط Grenouille agile (F).

هو الضفدع النشط ، اطليه .

١٧٩٨٩ - عَدَمُ الْمَاءِ

Lemna (S). Lentille d'eau, Lenticule, Canifée, Canéfile (F). Duck-weed, Water-lens, Water lentils (E). Kleine Wasserlinse (D). Lenticularia, Lente d'acqua, Erba antrina (I).

جنس نباتات حشبية مائية من وحدات الفلقة وطفلة عسليات الماء . تتميز بصغرهما ودقة سوقها واستدارة اوراقها العنسية الشكل والقد التي تغلق على سطح الماء . انزادها وحيدة المسكن ، ثلاثية التجميع يضمها عسليات واحد يتألف من زمرتين ذكريتين وزهرة انثوية واحدة .

١٧٩٩٠ - عَدَمُ مَرُ هو الاندوسارون ، اطليه .

١٧٩٩١ - عَدَمُ الْعَيْنِ Lentille de l'œil (F).

Eye lens (E).

١٧٩٩٢ - عَدَمُ سَيَّالِيَّةِ الْمَاءِ Lemnaceae (S).

Lemnaceae (F). Lemnaceae (E).

فصيلة حشبات الماء من وحدات الفلقة . اجناسها ١ وانواعها ٢١ جميعها من النباتات المائية والمنقية للملح في جمع اسفاج العالم .

١٧٩٩٣ - عِدْفُ Géniteur (femelle) (F).

Begetter (femelle) (E).

هو في النبات ما صار يتبع ميسم زهره بمكبر زهرة اخرى مصغرها الجسم المختص .

١٧٩٩٤ - عِدْفُ كَلَّة Incompressibilité (F).

Incompressibility (E).

عدم القابلية لقصط والانصرام والكبس .

١٧٩٩٥ - عُدْمُ لُوبِ ٥٠ Adolops (S). Adélops (F).

حشرة كفة من عذبات الاجنسة ديوسيات القرون . تألف الاثنية والكهوف والواقظ المظلمة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة الى جسمها ابيضاجي الشكل يطول من ٤ الى ٥ سم . قوتها الى السرة الثنية المراج . زباناها ديوسيات مستطيلة . قوتها تحمله مستطيلة الى قوتها المواد المنوية للخلعة تنلسها بزباناها لانها كفة عادمة البصر .

١٧٩٩٦ - عَدَمُ الْاِخْتِصَاصِ Incompétence (F).

Incompétence (E).

هو ان لا تكون لقاضي او لمحكمة او لاحدى السلطات العامة سلطة على ايجاز عمل قانوني .

١٧٩٩٧ - عَدَمُ الْاِنْقِصَاصِ Asystole (F).

١٧٩٩٨ - عَدَمُ الْاَهْلِيَّةِ Incapacité (F).

Incapacity (E).

هو ان يحرم المرء إما من مباشرة حق او من وجوب حق له . لذلك تقسم عدم الاهلية الى :

عدم اهلية الاداء Incapacité d'exercice

عدم اهلية الوجوب Incapacité de jouissance

١٧٩٩٩ - عَدَمُ التَّعَادُلِ عَدَمُ التَّعَادُلِ Asymétrie (F). Asymmetry (E).

شذوذ غير مأثور في التناظر او التبادل .

١٨٠٠٠ - عَدَمُ التَّغْفِيلِ Inexécution (F).

Non-fulfilment (E).

هو ان لا يقوم المرء بیکل ما التزم به او بضمه .



عص الماء



عدلوب

الفرنان والدلفان ولا تقع في المش الواحد أكثر من
يفيه .

١٨٠٢١ - عَدَن

Dérochement, Epiarrage, Epierrement (F). Scouring, Clearing land of stones (E).

رفع الحجارة أو إزالتها من أرض الحقل .

١٨٠٢٢ - عَدَنٌ وَ صَفِيرٌ Adenium venenatum (S). Adénie (F). Adénie (D). Adenia (I). جنبة برية ممررة من فصيلة العدديات ، أوراقها معتقة ، متعاقبة ، سنانية . نصلها جلدي الصفحة بحري اللون . أزهارها حشوكي تاجي . أزهارها غيراء اللون || منبتها البلاد الحارة ، تكثر في الجزيرة وهي من النباتات السامة .

١٨٠٢٣ - عَدَوٍ Galop (F). Gallop (E). ركض الدابة السريع .

١٨٠٢٤ - عَدَوْتُهُ

١٨٠٢٤ - عَدَوْتُهُ Idotea (S). Idotée (F). Idotea (E). جنس دوبيات بحرية من فصيلة العدديات . أعضائها بحار البلاد الحارة وأعضائها البحر الاحمر والمحيط الهندي . تعيش بين النباتات البحرية قرب المباح والشطوط || أعضائها تساعية السكم معتدلة التعليط ، طولها من ٣ الى ٦ سم . مناطقها الشرجية ملحونة بصفتان متدعة تبرز كالحنن المتسلل . قرونها الاستشعارية مسطحة ، مدبة الاطراف . أرجلها سباعية الازواج ، محببة المقاطع الدرية || أنثاها متراكبة الجذوي والاحمر والاصفر والازرق والبنفسجي .

١٨٠٢٥ - عَدَوْتِيَّات Idotidae (S). Idotidées (F). Idotidae (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات متساويات الأرجل اجناسها وأنواعها المعروفة نحو ٤٠ منتشرة في جميع بحار العالم باستثناء القطبية . تعيش بين النباتات البحرية القريبة من المباح والشطوط || اُعرف اجناسها وأشهرها العدوتيه .

١٨٠٢٦ - عَدَوِي

Infection, Contagion, Contamination انتقال الجراثيم أو الميكروبات المعدية الى جسم الحيوان السليم واصابته بالمرض الذي تحدثه تلك الجراثيم أو الميكروبات ، راجع إصابة .

١٨٠٢٧ - عَدِيد Multi, Poly (F). عَدِيد

١٨٠٢٨ - عَدِيدُ الْأَرْجُلِ Polypode (F). Polypod (E). عَدِيدُ الْأَرْجُلِ

١٨٠٢٩ - عَدِيدُ الْبُزُر Polysperme (F). Polysperm (E). صفة بعض القطور التي تتميز فيها الاعضاء الشرجية بوفرة البزور .

١٨٠٣٠ - عَدِيدُ الثُّغُور Polystomate (F). Polystomatous (E). عَدِيدُ الثُّغُور

١٨٠٣١ - عَدِيدَات الصِّحَاف Polyplacophores (F). Polyplacophora (E).

شعبة من الرخويات الراباطيات . أنواعها المعروفة نحو ٦٠٠ ينتمي إليها حل محصور الشاطئ * أشهر أنواعها الحديدة والكيتون .

Ranidae (S). عَدُوبِيَّات ١٨٠١٧

Ranidés (F). Ranidae (E). فصيلة حيوانات درداء قازبة من لة الحيديات ومرتبة السمويات ورتبة البراتوات أي عدييات اللبب || اجناسها وأنواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع اصقاع العالم القديم والجديد || اجناسها متفانية القند تتميز بمساواة سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز تلاقيها ، ويحيط بقرة القصير من الترسات المطوية الجانبية . فكوكها العليا مسنة . اصابع قوائمها الخلفية مفيدة محطاب لاجسامي الرسابة || أشهر اجناسها العدول أي عَدُوبِيَّات

١٨٠١٨ - عَدُوبِيَّات Adimonia (S). Adimonia (F). Adimonia (E).

جنس حشرات غاصلة من مفصليات الاجنحة وفصيلة الضفاريات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ اعضائها مناطق البلاد المعتدلة الحارة . تألفت الجراحي والحقل والنباتات المشية من الاوراق الى الزمار والجنوع والجملور || اجسامها متوسطة القند . انثاها اكبر جرمًا من ذكورها وافتح لوبًا واسفر ظهرًا اذ انه لا يلبس كابل البطن عند الاناث . اثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الاسود والاسمر القاتم والجذوي الباق || اُعرف انواعها وأشهرها الاثنان التاليان :

١٨٠١٨ - عَدُوبِيَّات سُرُورِي

Adimonia rustica (S). Adimonia rustique (F). ينتمي من الخنافس اللبزية لانه يلبس الاوراق التي تلبس سطح التربة . لوبه الى السرة للقامة ، اسفح المراج عند الذكر ، باهته عند الانثى .

١٨٠١٨ - عَدُوبِيَّات عَشِيد

Adimonia tenaceti (S). Adimonia obstinè (F). ينتمي من الخنافس اللبزية لانه يلبس كل ما استطاع اليه سبيلا من اجزاء النبات . ثوبه الى الجذوة يزعم عند الذكر ويهت عند الانثى .

١٨٠١٩ - عَدُوبِيَّات Eudynamis (S). Eudynamis (F). Eudynamis (E).

جنس طير من فصيلة القيقوبيات . انواعها المعروفة عشرة موطنها يمتد من إيران الى الهند والبرية والفلين || اجسامها رفيعة تعلو من ٣٥ الى ٤٠ سم . اجنحتها كبيرة ذلقة . أذناها مسطحة . مسطرة الاطراف . مناقبها ضلعية مسقوفة الخاطم العليا الشارفة ، جالسة السفل . سيقانها معتدلة الطول . حيوها مطوقة يختار ماسح امرط لا ريش فيه || قوتها الجراد والحشرات البرية والبرور || اُعرف انواعها وأشهرها العدنيس الشرقي .

١٨٠٢٠ - عَدُوبِيَّات شَرْقِيَّة ، قَوَال

Eudynamis orientalis (S). Eudynamis oriental (F). سمى قوالا لان صياحه يشبه القول . طائر من العدنيس . موطنه يمتد من الهند الى إيران || جسمه رشيق القوام يطول نحو ٤٥ سم . ثوب الذكر الى السواد الاغصير الالاسف . ثوب الانثى الى الخضار الالاسف للمرقوش بالابيض . سدة العين سوداء اللون عند الشقق || يألف الاجراع البيرة الاثمار . قوته الحشرات والجراد والثمار البرية والبلور || غذائه سفيف وتصيد بتهبط . شوطه قصير البقي || انثاه لا تمشي بل تقع البيض في اعشاش



عدون



عدنيس شرقي



عدوتيه

- Impennés (F). عُدْبِيَّات الرِّيش Lenticelle (F). Lentical (E). ١٨٠٣٢ - عُدْبِيَّة
- Impennates (E). ١٨٠٣٣ - عُدْبِيَّيِي Lenticulaire (F). Lenticular (E).
- ١٨٠٣٤ - عُدْبِيَّ الحَبَاة Abiose (F). Abiosis (E).
- ١٨٠٣٥ - عُدْبِيَّ اخْتِيَاشِيم Abranchiate
- ١٨٠٣٦ - عُدْبِيَّ الدَّم Ezsangue (F). Bloodies (E).
- ١٨٠٣٧ - عُدْبِيَّ الرُّؤْس Acéphale (F). Acéphalous (E).
- ١٨٠٣٨ - عُدْبِيَّ العُظْم ، فَتْ Insipide (F). Tasteless (E).
- ١٨٠٣٩ - عُدْبِيَّ الغُدْم Anélytre (F).
- نمت تعريفي يطلق على كل حشرة جلالة عديمة اللحم.
- ١٨٠٤٠ - عُدْبِيَّ الفِكْكَار ، لا فِكْكَاري Invertébré (F). Invertebrate (E).
- هي الحيوانات التي لا فقار لها . وللانفاقيات هي :
الارالي والافسنيجات والمخوقات والشوكيات والديدان
والرخويات والمفصليات .
- ١٨٠٤١ - عُدْبِيَّ الفِكْلَكَة ، لا فِكْلَكِي Acotyldéone (F). Acotyldoneous (E).
- نمت تعريفي يوصف به النبات الذي لا فكلته في نطيطه .
- ١٨٠٤٢ - عُدْبِيَّ الفُوهَة Apomastome, Apomatostome (F).
- ١٨٠٤٣ - عُدْبِيَّ المُعَالَة ، لا يَتَكِي Apétale (F). Apetalous (E).
- هو النبات الذي لا قامة في زهرته .
- ١٨٠٤٤ - عُدْبِيَّ اللِّسَان Aglosse
- ١٨٠٤٥ - عُدْبِيَّ الرُّؤْس Achromatique (F). Achromatic (E).
- ١٨٠٤٦ - عُدْبِيَّ النَّمِيَّة Aplacental
- ١٨٠٤٧ - عُدْبِيَّات الِاعَادِيد Aglyphodontes
- حيات خبيثة منها فصيلة التابان وفصيلة الاصليات .
- ١٨٠٤٨ - عُدْبِيَّات الأَرْجُل Apodes, Gymnophiones (F). Apodas, Footless (E).
- رَبِيَّة من المصغيات .
- ١٨٠٤٩ - عُدْبِيَّات الِأَصْدَاف Aplacophores (F). Aplacophora (E).
- شعبة من الرخويات الراباطيات الارالي . اجناسها وانواعها
المعروفة نحو ٢٥٠ .
- ١٨٠٥٠ - عُدْبِيَّات الجِنَاح Aphanipteroides
- طبقة حشرات من ثلثة الحديليات تشمل ربيّة واحدة
تدعى القُدَانِيَّات . فصائلها عديدة ، اشهرها البرغوثيات
اما احتناسها وانواعها لكثيرة العدد جميعها من الحشرات
الثاقبة الماصة الصغيرة القد .
- ١٨٠٥١ - عُدْبِيَّات اللَّذَتَب Anoures (F). Anourous (E).
- اطلب يتر .
- ١٨٠٥٢ - عُدْبِيَّات الرِّيش Impennés (F).
- نقة من البليز فصائلها قليلة العدد تتميز بأرياشها الخاصة
وبقصر اجنحتها الرضفية الشكل المسحالة الى التجديف
في الماء بدلاً من الطيران في الفضاء . اشهر الجوارها البليزريق
والطرشوح .
- ١٨٠٥٣ - عُدْبِيَّة النَطُوط Amétabole (F). Ametabola (E).
- ١٨٠٥٤ - عُدْبِيَّة الثَمَر Acarpe (F).
- نمت تعريفي يطلق على النباتات التي لا ثمر لها .
- ١٨٠٥٥ - عُدْبِيَّة الجِنَاح Aptère (F). Aptera (E).
- ١٨٠٥٦ - عُدْبِيَّة السَّاق Acaule (F).
- نمت تعريفي يطلق على النباتات التي ليس لها سوق ظاهرة
او التي سطحها جلدة . اما عائدة السوق بتأنا تخص الفطر .
والتي ساقها قصيرة جداً فهي النجمة .
- ١٨٠٥٧ - عُدْبِيَّين Cudrania (S). Cudranie (F).
- جنس الشجار برية وزراعية من فصيلة التوتيات . انواعه
قليلة العدد، مهددا الشرق . جميعها سرولية تملو من ٦
الى ١٢ م . سوقها فراءه فناء . اوراقها عابلة ، متعاقبة ،
بيضية او مفضضة التصل المالحس البشرة الشائك المغطاة .
ازهارها ثنائية المسكن ، ثمارها حراء اللون .
- ١٨٠٥٨ - عُدْبِيَّة Palourde (F). Clam (E).
- كل صفة مأكولة كالحمار والجمبري وغيرها تدعى عذبة .
- ١٨٠٥٩ - عُدْبَارِي ، عُدْبَارَة Adhara
- العذارى او البكرة خسة كراكب في آخر الحرة .
- ١٨٠٦٠ - عُدْبَام Cunonia (S). Cunonie, Cunone (F).
- الراسدة عامة . شجرة رحيمة الجنس والنوع من فصيلة
السفوسيات . ساقها مألبة منتصبة فراءه تملو من ٣ الى
١٢ م . اوراقها مركبة متعاقبة ، وريقاتها سنانية الشكل
وربية التجميع ، خاسية العدد او سباعية . تصلها جاهد
لفسضة ، منشاري الحافة . انفرها عتقوي للشكل ،
ابلي الانكازك . ازهارها خلسية البليات ، حشارة الامدية
لونها الى الازييض للويح بالاصفر .
- ١٨٠٦١ - عُدْبِيَّة Barbillon (F). Barbel (E).
- عذبة . ج عذبات . زوائد خيطية لمسة تكون في احد لكي
السكة او في كليها .
- ١٨٠٦٢ - عُدْبِيَّ Dulcaquicoile (F).
- نمت تعريفي يطلق على كل حيوان اوليات يعيش في المياه
العذبة .
- ١٨٠٦٣ - عُدْبُو هو السدنيان الارفر ، اطليه .
- ١٨٠٦٤ - عُدْبَارَة Nympe (F). Nympha (E).
- هي الحوراء ، اطليا .
- ١٨٠٦٥ - عُدْبُوط Cochylis
- فراشة من فصيلة القناتلات وربية حرشيات الاجنحة ،



ملطوط

Fritillaria lutea (S). عَرَكَر أَصْفَر ١٨٠٧٤ -

Fritillaria jaune (F).

نوع من المرار. اوراقه العليا متعاقبة ، ضيقة ، سنانية . شراخه يملو من ١٥ الى ٣٠ سم. زهره وحيدة كبيرة القد. لوها الى الصفار الكبير يميلو تقطيع مجسجي . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

Fritillaria persica (S). عَرَكَر الْعَجَم ١٨٠٧٥ -

Fritillaire de Perse (F).

نوع من المرار ديفست متراكبة غليظة متراكبة الاسقاط اللبدة . شراخه يملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه صغيرة ، سنانية ، متعاقبة ، بحرية النصل ، تركب الشراخ بكامله . ازهاره عنقودية التجميع ، صغيرة القد ، عريفة الرائحة ، لوها الى البنفسجي الازرق المزيج || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

١٨٠٧٦ - عَرَكَر الْغَاب ، ثُولِيْب المُرُوج

Fritillaria meleagris (S). *Fritillaire pintade*, *Pintade*, *Damier*, *Tulipe des prés*, *Œuf de vanneau* (F). *Chackered lily*, *Chackered tulip* (E). *Echte Schachblume* (D). *Fritzellaria meleagro*, *Melesgride* (I).

نوع من المرار البري اوراقه متعاقبة تطول من ٨ الى ١٥ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ سم. شراخه الزهري يملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. ازهاره تطول من ٣ الى ٥ سم. لوها الى الحمرة البنفسجية يملوها تقطيع ابيض . ضروره الترييبنة مدنية فارها لون الزهر || يستخرج من بصله ، بهد سلقه ، مادة نشوية تشبه البطاطا .

١٨٠٧٧ - عَرَكَر عَرِيْش الْوَرَق

Fritillaria latifolia (S). *Fritillaire à feuilles larges* (F). نوع من المرار اوراقه سنانية النصل مستعرضة . شراخه يملو من ٢٥ الى ٣٠ سم. زهرته كبيرة القد وحيدة . لوها الى الحمرة الحمرة المزهجة بالاصفر || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

١٨٠٧٨ - عَرَكَر قَيْصَرِيّ (F).

Fritillaire impériale (F). نوع من المرار يعرف باكليل الملك ، اطبخ .

١٨٠٧٩ - عَرَكَر مَدْهَب

Fritillaria aurea (S).

Fritillaire dorée (F).

نوع من المرار اوراقه العليا متعاقبة او ضخمة التجميع ، عيطية النصل . شراخه يملو من ١٥ الى ٢٠ سم. زهره تطول نحو ٣ سم. لوها الى الصفار الاصفر المذهب المزيج يملوه تقطيع سنلي || ازهاره يستمر طوال شهر نيسان .

١٨٠٨٠ - عَرَكَسَة *

Ophidium barbatum (S).

Ophidie barbu, *Donzelle* (F).

سكة بحرية يبروس من فصيلة الجيريات شائكات الزعنائف . اصطلها بعض اقوال البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || جسمها نملي الشكل ، معتدل التريط ، قريب الشبه بالثقب ، يطول نحو ٢ سم. ثوبها الى المرجاني القضي المزيج يملو في الظهر تمسح ازرع ويملو في الجانبين تحفة زرقاء حمراء . رأسها اسفلي الشكل ، ذات الحلق . زعنائفها الطهرية والذيلية والشربية متتابة تشكل زعنفة واحدة . زعنفتها الحوضية طامسة . فكها الاسفل يتأخر عن الاعل ويحمل اربع غلابات دقيقة مستطيلة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

طولها يراوح بين ١٤ و ١٦ م. ووشاها السليوان الى الفحلة الصفراء متمزجها جدد سود . ووشاها السليوان الى الفحلة النضبة || يرقاتها تلو مرءاء اللون ثم تتحول الى الزودي وتنتهي بالاحمر ولذا يصعبها للبدان الحمر . لها جيلان في السنة . يابها النشوي تقضيه كغادرة تحت لها بعض الانبهار اخصها الكرمية . تظهر القراشات في الربيع وتضع مكها حل البرام الزهرية والورقية فينتف من رقات تركب ، تلك البرام || وفي جيلها الثاني الذي يبتدئ حادة في تمور تحت الاثات مكها حل النار وبها الضب فينتف من رقات دقيقة لتصل النار من حيث نقتف لتصلها وتقيم حتى اتساعها الاخير ثم تتركها وتنتزع نحو اللسان سيث تحجب وتصل الى غادرات .

١٨٠٦٦ - عَرَكَر، ثُرُوزَة

Corymbe (F). *Corymb* (E). شكل من اشكال ازهاره يكثر في الفصيلة الوردية كازهار الاجامس والتشاح .

١٨٠٦٧ - عَرَكَكِيَّات

Corymbifères (F).

Corymbiferous (E). سبط من فصيلة المركبات الابوية الزهر . ومنت تمرني توصف به النباتات السقية الازهار .

١٨٠٦٨ - عَرَكَي

Culture non irriguée (F).

Dry-farming (E). كل نبات لا يسقى الا المطر . غلالة زنة . الحطلة الزنة هي الحطلة المروية .

١٨٠٦٩ - عَرَ النخل *

Graphiola phoenicis (S).

Graphiole des dattiers (F).

وصم فطري سبه فطر مجهري من فصيلة المريات ورتبة النعمايات || يصيب غصون النخل فتبدو كأنها جرياء لانه يورثها ينشأ صفة الشكل بنية اللون يملوها عند عورها الاصفر ، المنخفض الارتكاز ، غيط دقيق مركب يحمل غيرات الفطر || يقال لثقلته المصابة بهذا الرسم غلة مزار || يكاثف باستعمال بائل يورود المخلول من ٢ الى ٢,٥ ٪ .

١٨٠٧٠ - عَرَكَب

شجر يفتل من لحاء الحبال . الواحدة حراة . تأكله القردة (اللسان) .

١٨٠٧١ - عَرَكَدَة

Sauterelle femelle (F).

Female locust (E). الجرادة الانثى .

١٨٠٧٢ - عَرَكَر

Cri de l'autruche mâle (F).

Cry of the male ostrich (E). صوت الطي

١٨٠٧٣ - عَرَكَر * ، فَرِيْلِيْأَرِيَا ، حَشِيْشَة الْحَجَل

Fritillaria (S). *Fritillaire* (F). *Fritillaria* (E). *Schachblume* (D). *Fritzellaria* (I).

جلس نباتات دوصية برية ورتيبية من فصيلة الزنبقيات . ازهارها جرسية الشكل ، معتقة ، متدلية ، يحجمها شراخ تكلله قش من الاوراق للسنه المتراكبة . انواعه المعروفة نحو ٢٠٠ . مصارة بصلها جحالية المادة ، حارمة الطعم ، سهلة وقد تصعب مامدة عند الاكثار منها || اشهر انواعه ما يتبع .



مر النخل



حرا



عرابة

Agropyrum juncaum	نجير ، سينون	١٨٠٨١ - عَرَاقَة ٥
Herniaria maritima	نومان بحري	Thigmotaxie, Thigmotropisme (F). Thigmotaxy, Thigmotropism (E).
Kochia arenaria	هيشم الرمال	خاصة النباتات المتسلقة اذ تجعلها تلف بسوقها على سائنها او تكتل بجوارقها الخضرنة او المحجمة .

٢ - ثبوت الاثربة الرملية الداخلية

Spergularia campestris	أبو غلام حقلي	Placier (F). Town traveller (E).
Arabis arenosa	إبرس دمل	من عرض اللي، لتصرفه او يمه .
Agrostis alba	أدرا أبيض ، نجير أبيض	١٨٠٨٣ - عَرَاقَة ٥
Vicia lathyroides	بالقة جبلانية	Oniscia (S). Oniscia (F), Oniscia (E).
Scleranthus annuus	حشيشة القناويل الحولية	جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الاثرب
Scleranthus perennia	حشيشة القناويل الدمرة	وقصيلة الخوذيات . انواعه المعاصرة المعروفة سنة منتشرة
Rumex acetosella	حيفس النتم	في جمار البلاد الحارة اصداها شبه يبقية الشوزن ،
Airs caryophylla	عُرطالية قُرطيلية	لؤلؤية التخديد التاتش ، مستطيلة الانفلاق الطولي للقاطب ،
Airs praecox	عُرطالية مبكرة	قيمة الانقلاب المستندة الاطراف .



عَرَاقَة

Draba verna	دراية ربيعية	١٨٠٨٤ - عَرَاقَة الْاَثَرِيَّة
Vulpia Myurus	ذيل الجرب	Détermination des sols d'après la végétation spontanée
Ornithopus sativus	ريدان مرعوي	عَرَاقَة الْاَثَرِيَّة اسلوب والتي يفرد الى معرفة نوعية الاثربة
Spergula arvensis	سبرغولة حقلية	من ثبوتها الطوعية ذلك لان لكل تربة ثبوت تستقر فيها
Spergula vernalis	سبرغولة ربيعية	تلقائيا، وقد وضعنا في الجداول التالية اهم هذه الثبوت
Carex arenaria	سمادى الرمل	الدلالية واشهرها :
Saxifraga tridactylis	سفرس ثلاثي الاصابع	

Illecebrum verticillatum	شجير	١ - ثبوت الاثربة الرملية الساحلية
Arrhenatherum elatius	شيام رفيع	أثل ، طرفاء (عدة انواع)
Selene conica	ملوك عُرطولي الورق	Tamarix
Eragrostis minor	عُرغ صغير	Statice maritime
Eragrostis pilosa	عُرغ صفالي	أريل أحر
Eragrostis major	عُرغ كبير	Linaria arenaria
Armeria plantaginea	عيفقان لسوني	حباحب الرمال
Luzula	لزولة	Ammophila arenaria
Plantago arenaria	لسان الحمل الرمل	حشيشة الرمال
Plantago lagopus	لسان الحمل المقدي	Scirpus holoschoenus
Helianthemum guttatum	مداهن لؤلؤي	حلل الدردان
Herniaria glabra	نومان امرد	Lagurus ovatus
Herniaria hirsuta	نومان مزقير	ذيل الاونب
Agrostis spica venti	هزنوس	Polypogon maritimum
		ذيل الفار البحري
		Crepis bulbosa
		Honeckenya peploides
		Carex
		Elymus arenarius
		Eryngium maritimum
		Mesembryanthemum nodiflorum
		ظهيرة مقدية
		Phleum arenarium
		عصوية الرمال
		Ephedra distachya
		عند البسر
		Gallium arenarium
		Cakile maritima
		Polygonum maritimum
		Dianthus gallicus
		قرنفل الرمال
		Linum maritimum
		كتان بحري
		Calystegia soldanella
		لبلاب بحري
		Plantago coronopus
		لسان الحمل التتري
		Matthiola sinuata
		متيولا مقورة
		Malcolma
		سبلح (بعض الانواع)

٣ - ثبوت الاثربة السبخة وتدعى بحجوية او الف الملح

Artemisia maritima	أبست بحري	١٨٠٨٥ - عَرَاقَة الْاَثَرِيَّة
Salicornia	اشنان (جميع الانواع)	Ephedra distachya
Salsola kali	حرض	Gallium arenarium
Aster tripolium	خرام	Cakile maritima
Suaeda	دلو (جميع الانواع)	Polygonum maritimum
Inula crithmoides	راسن بحري	Dianthus gallicus
Atriplex halimus	سرق بحري	قرنفل الرمال
Senecio crassifolia	شرونة لحية الورق	كتان بحري
Glyceria maritima	عشبة الما البحرية	لبلاب بحري
		Calystegia soldanella
		Plantago coronopus
		لسان الحمل التتري
		Matthiola sinuata
		متيولا مقورة
		Malcolma
		سبلح (بعض الانواع)

Orchis maculata	صليب أبيض	Plantago maritima	لسان الحمل البحري
Carex	سمادي (بعض الأنواع)	Plantago crassifolia	لسان الحمل لحمي الورق
Quercus pedunculata	سندباد مزنة ، دور	٤ - ثبوت الأثرية الصوانية ، براح	
Genista germanica	شيرة جرمانية	Betula verrucosa	بتولا ثؤليلية
Salix caprea	صفصاف الماعز	Campanula persicaefolia	جريس دواقي الورقة
Potentilla tormentilla	عرق أنجبار	Jasione montana	جزيون أزرق
Fistula arundinacea	عكروش علجاني	Sedum Forsterianum	حيء العالم الظريف
Dianthus Armeria	قرنفل أديريه	Malva moschata	عجبانة مسكية ، عطر
Cirsium ferox	قصون شكس	Erica cinerea	خلنج ربادي
Erythraea pulchella	قطريون أتيق	Erica scoparia	خلنج مكمني
Cerasus padus	كرز عتقودي	Erica ciliaris	خلنج مهدب
Lobelia urens	لوبيلية محرقه	Hypericum pulchrum	داذي أتيق
Lotus uliginosus	لوطس	Digitalis purpurea	ديجيتال أريجواني
Molinia caerulea	مولينيه ، غوطالية زرقاء	Pteridium aquilinum	دشدار
Scutellaria minor	هرون صتير	Ornithopus perpusillus	ريبدان قزم
Ulex europaeus	وزال كبير	Antennaria dioica	رجل القط الشائع
Ulex nanus	وزال مشدون	Calluna vulgaris	صمسم

٦ - ثبوت الأثرية الكلسية

Laburnum anagyroides	ابنوس كاذب	Quercus sessiliflora	سندباد لاملي الزهر
Coronilla emerus	امروس الزمارين	Senecio sdonidifolius	شرونة زلفية الورق
Berberis vulgaris	بربريس ، حود الريح	Senecio viscosus	شرونة لزجة
Buxus sempervirens	بقس دائم الخضرة	Genista tinctoria	شيرة الصباغن
Asperula tinctoria	جوية الصباغن	Potentilla argentea	عشبة القوى القوية
Ophrys	حاجبية (جميع الأنواع)	Festuca heterophylla	عكروش هاتك
Lavandula latifolia	عزامي ذكورية	Veronica verna	فيرونيكا ربيعية
Lavandula officinalis	عزامي غزلية ، خيري البر	Veronica officinalis	فيرونيكا غزلية ، ليلاب الهويس
Lactuca perennis	عس الغالب	Dianthus deltoides	قرنفل دالي
Rhamnus alaternus	زفرين الجرد ، ثيق مترادف	Vaccinium Myrtillus	قام آسي
Hyssopus officinalis	زوقا	Gnaphalium sylvaticum	كوسقية حرجية
Thymus serpyllum	سمر البر ، زمر	Castanea saliva	كستنة بلنولة ، شاهبلوط
Thymus vulgaris	سمر شائع	Nardus stricta	ناردين المروج
Quercus lanuginosa	سندباد أزغب	Epilobium angustifolium	نذ سنبل
Ononis natrix	شبارق ، لتين اللقضاء	Sarothamnus scoparius	وزال الشبح

٥ - ثبوت الأثرية الطينية الرملية

Pulsatilla vulgaris	شقيق النعناع المبلول	Teucrium scorodonia	اسقودودين مائي ، قوم الحية
Eryngium campestre	شنداب حقلي	Juncus squarrosus	أسل خشن
Lonicera xylosteum	سرعية الجدي الدغلية	Betula pubescens	بتولا زغبية
Vincetoxicum officinale	صقلاب غزلي	Viola canina	بنفسج كلابي
Crucianella angustifolia	صلبانة شبيقة الورق	Peucedanum gallicum	بوسيدان غالي
Catananche caerulea	طلسمية ، هندباء زرقاء	Campanula patula	جريس عريش الورق
Teucrium montanum	طوقريون جبلي	Pedicularis sylvatica	حشيشة القمل الحرجية
Teucrium chamaedrys	طوقريون غزلي	Pedicularis palustris	حشيشة القمل المنقمية
Globularia	عينون مبلول	Scirpus compressus	حلل لب
Geranium sanguineum	غرنيق دموي	Aira caespitosa	غرطالية التنديس
Calamagrostis argentea	غرار قصي	Hypericum humifusum	داذي رطب
Rubia peregrina	قوة مرحلة	Scorzonera humilis	ديج حقير
Veronica teucrium	فيرونيكا أتيق		

<i>Pastinaca sativa</i>	ميسارون كبير	<i>Cornus mas</i>	قرنوس ذكر
<i>Lithospermum officinale</i>	شنجبار غزني	<i>Cirsium scaule</i>	قصبان قريش
<i>Saponaria officinalis</i>	صابونية غزنوية	<i>Brunella lyssofolia</i>	قلاع حسل ^١ الورق
<i>Potentilla reptans</i>	عشبة القوى المسطحة	<i>Brunella grandiflora</i>	قلاع كبير الزهر
<i>Potentilla anserina</i>	عشبة القوى الورقية	<i>Colutea arborescens</i>	قنصور شائع
<i>Euphorbia helioscopia</i>	فريبون النجم	<i>Centaurea scabiosa</i>	قطريون اجرب
<i>Euphorbia verrucosa</i>	فريبون مثالي	<i>Andropogon ischaemum</i>	كتيبة
<i>Melampyrum arvense</i>	قرطب الزرع	<i>Carlina vulgaris</i>	كرلين شائع ، زند الببد
<i>Erythraea centaurium</i>	مرارة الحنش	<i>Linocystis vulgaris</i>	لنسر مبدول
<i>Allium ursinum</i>	كرات الدب	<i>Cerasus mahaleb</i>	مخلب
<i>Ononis campestris</i>	لئين الحقل	<i>Sorbus aria crantz</i>	مخلص
<i>Ononis spinosa</i>	لئين شائك	<i>Helianthemum vulgare</i>	مداهن شائع
<i>Lychnis floe-cuculi</i>	لحنس ودي	<i>Melica ciliata</i>	مقشرية مهدبة
<i>Anthyllis vulneraria</i>	لوتيا ناقة ، حشيشة الجرح	<i>Satureia montana</i>	ندغ الجبل
<i>Lotus corniculatus</i>	لوطس قرني	<i>Hippocrepis comosa</i>	نمت الفم
<i>Fraxinus excelsior</i>	مركان شامخ	<i>Spartium junceum</i>	وزال الشرق
<i>Dipsacus fullonum</i>	مسط الراعي ، شوك الدراج	<i>Ligustrum vulgare</i>	ياسم مروث
<i>Rhamnus cathartica</i>	نبق سهول		
<i>Agrostis canina</i>	نجم كلسي		
<i>Epilobium hirsutum</i>	ند ^٢ صفائي		
<i>Mentha arvensis</i>	منع صمغري		
<i>Falcaria vulgaris</i>	ميردان شائع		

٧ - ثبوت الاثرية الطينية الكلسية

<i>Circaea lutetiana</i>	أبو سلام ، شرق
<i>Juncus glaucus</i>	أسل بحري اللون
<i>Aquilegia vulgaris</i>	اكيلاجيا عقابية
<i>Coronilla varia</i>	إمروس ارقش

A - ثبوت الاثرية المتبقية

<i>Achillea ptarmica</i>	أخيلية بقلة الطاس	<i>Sambucus ebulus</i>	بيلسان صغبر ، حنان صغبر
<i>Myosotis palustris</i>	أذنان الغار المنقي ^٣	<i>Sonchus oleraceus</i>	تقاف معروف
<i>Juncus</i>	أسل (بعض الانواع)	<i>Bromus asper</i>	قرغول كبير
<i>Viburnum opulus</i>	انفوس ثلجي	<i>Campanula trachelium</i>	جريس الست ، قفاز مريم
<i>Equisetum maximum</i>	اسوخ كبير	<i>Campanula glomerata</i>	جريس صمغي
<i>Equisetum palustre</i>	اسوخ منقي ^٤	<i>Lathyrus tuberosus</i>	جليان مدرن
<i>Sanguisorba officinalis</i>	بلان غزني	<i>Tussilago farfara</i>	حشيشة السعال
<i>Geum rivale</i>	جيوم نهري	<i>Bupleurum falcatum</i>	سليلاب منجلي ^٥
<i>Pedicularis palustris</i>	حشيشة القمل المتبقية	<i>Mercurialis perennis</i>	حليوب معمر
<i>Scirpus caespitosus</i>	حلال الحصر	<i>Androsaceum officinalis</i>	داذي غزني
<i>Populus tremula</i>	حور ريجراج	<i>Daphne laureola</i>	دفنة حود النار
<i>Scrophularia aquatica</i>	غنازيرية المانتع	<i>Aegopodium podagraria</i>	ربيل للمزى ، حشيشة المزى
<i>Scrophularia nodosa</i>	غنازيرية عقدا	<i>Fagus sylvatica</i>	زان معروف
<i>Pulicaria vulgaris</i>	وعرا شائع	<i>Orchis mascula</i>	مخلب ذكر
<i>Stachys palustris</i>	مسلق المانتع	<i>Orchis latifolia</i>	مخلب عريض الزرق
<i>Carex</i>	سمادي (بعض الانواع)	<i>Orchis incarnata</i>	مخلب قريزي
<i>Symphytum officinale</i>	سمفون غزني	<i>Stachys annua</i>	مسلق حولي
<i>Salix caprea</i>	صفصاف الماعز	<i>Stachys recta</i>	مسلق سنبل
<i>Cardamine pratensis</i>	صناب الماء	<i>Carex sylvatica</i>	سمادي حرجبي
<i>Comarum palustre</i>	عشبة القوى المتبقية	<i>Carex pendula</i>	سمادي مدلي
<i>Schaenus nigricans</i>	عين البقر	<i>Tragopogon pratensis</i>	مسلق المارج
<i>Eupatorium cannabinum</i>	فقت ابن سينا	<i>Colchicum autumnale</i>	سورتيان الخريف
<i>Lythrum salicaria</i>	فندل مبدول	<i>Iris fastidissima</i>	سوسن متن ، قوسر

بضيفة مقطوعة القاعدة تطول من ٣ الى ٤ سم. نصلها
خلى الصفحة السفلى || ازهار نوربها تمد من ٣ الى ٥
وي صيوانية التجميع بيضاء اللون || ازهارها يستمر
من نيسان الى ايار .

١٨٠٨٨ - عَرَاوَة دَاذِيَّة الْوَرَق *

Spiraea hypericifolia (S). Spirée à feuilles de millepertuis (F).

جنية عمرة تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها كاملة ،
مستطيلة ، مسنة الزام الاخير . نصلها انقب البشرة
ثلاثي اللوح او خلسيا || ازهار نوربها تمد من ٥ الى ٧
وي صيوانية التجميع ، بيضاء اللون || ازهارها يستمر
من ايار الى حزيران .

Spiraea douglasii (S). عَرَاوَة دُغْلَاس (F).
Spirée de Douglas (F).

جنية زينة تملو من ٨٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها سنانية
مستطيلة . نصلها بطول نحو ٨ سم. وهو خلى الصفحة
السفلى ، مشاري الحافة في زامه الاخير || ازهارها
عقدية التجميع ، وردية اللون القاني || ازهارها يستمر
طوال الصيف .

Spiraea pubescens (S). عَرَاوَة زَبَاء *

Spirée pubescente (F).

جنية تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. قروها ارجوانية .
اوراقها اهليجية مقطوعة القاعدة ، نصلها خلى الصفحة
السفلى ، مسن الزمان الاخير ين || ازهار نوربها متوسطة
العدد ، غمية التجميع ، لونها الى البياض الاصفر المواج .
ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٠٩١ - عَرَاوَة صَفْصَافِيَّة الْوَرَق

Spiraea salicifolia (S). Spirée à feuille de saule (F).

جنية تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها سنانية تطول
من ٤ الى ٨ سم. نصلها عابق الخضار مسن الحافة يستعمل
في غش الشاي || ازهارها وردية اللون ، عثكولية التجميع ،
هرمية الشكل ، عثكولها بطول من ١٠ الى ١٥ سم || ازهارها
يستمر من حزيران الى تموز .

Spiraea chinensis (S). عَرَاوَة صَبْغِيَّة *

Spirée chinoise (F).

جنية تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها مستديرة
مفصصة . نصلها خلى الصفحة السفلى المقطوع اللون .
ازهار نوربها خلية الاعضاء ، متوسطة العدد ، صيوانية
التجميع ، لونها الى البياض الاصفر المواج || ازهارها
يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٠٩٣ - عَرَاوَة عُسْكَوْلِيَّة *

Spiraea filipendula (S). Spirée filipendule, Filipendula (F). Common-dropwort, Italian may (E). Knollenmadesüss, Knolliges Madesüss (D). Spiraea filipendula, Erba peperina (F).

جنية برية طيبة تملو نحو ٦٠ سم. جفورها عسكولية
عقدية . اوراقها اهليجية ذرية . نصلها مشاري الحافة .
ازهارها صغيرة القند بيضاء اللون عثكولية التجميع . ازهارها
يستمر من حزيران الى تموز || عسقلها حاضرة الطعم ،
طيبة وردية اللون .

Spiraea cantoniensis (S). عَرَاوَة كَسْتُون *

Spirée de Canton (F).

جنية تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها ايضدة ، سنانية ،

Veronica beccabunga
Arundo phragmites
Hydrocotyle vulgaris
Cirsium palustre
Cladium mariscus
Alnus glutinosa
Valeriana officinalis
Mentha squatica

فبروليكاً قرّة العين
قصب ، يوس
قصّة الماء الشائنة
قصبان الناقع
كلاديين منقي
مفت غروي
قاردين غزقي
منع الماء

٩ - ثبوت الاثيرة الطرية وهي بمعظمها نباتات ناقصة

Arnica montana
Carus verticillatum
Andromeda polifolia
Viola palustris
Swerica perennis
Erica tetralix
Osmonda regalis
Carex
Salix repens
Sphagnum
Triglochin palustre
Oxycochos palustris
Gentiana pneumonanthe
Lobelia urens
Menyanthes trifoliata
Drosera rotundifolia
Drosera longifolia

ارنيكا جبليّة ، زهرة العناس الجبليّة
ارليلال حائلي
اندروديّه كثيرة الورق
بنفسج منقي
جص مسر
غشج رباعي
سرشن ملكي
سعادى (بعض الانواع)
سوس مدّاد
طحلب الناقع (جميع الانواع)
عاش منقي
قام صلب
كوشاد منقي
لوريبة حمرة
نقل الماء
نيسان مستدير الورق
نيسان مستطيل الورق

Spiraea (S). Spirée (F).

Spiraea (E).

جلس لياتات برية وزينة وطيبة من فصيلة الورديات .
انواع كثيرة القند جميعها جنات وينيات . اوراقها
متعاقبة ، عابلة ، مختلفة الاشكال والاحجام . ازهارها
مصدرة للقند ، لا قياسية الشكل والتجميع . اما الاخصابين
في علم النبات فيقسمون انواع العراوة الى ثلاث فئات :
- الفئة الاولى تشمل الانواع ذات الازهار الصيوانية
والمقنطرة غير المشب . - الفئة الثانية تشمل الانواع
ذات الازهار المنقني . - الفئة الثالثة تشمل الانواع ذات
الازهار العثكولية والمقنطرة المنقش || اشهر انواعه
الطبية والزيينة ما يتبع .

Spiraea cana (S). عَرَاوَة بَيْضَاء *

Spirée blanchâtre (F).

جنية تملو من ٢٠ الى ٩٠ سم. اوراقها اهليجية الشكل
تطول من ٢ الى ٤ سم. نصلها مسن الزام الاخير ،
خلى الصفحة السفلى البياض اللون || ازهار نوربها كثيرة
العدد ، غمية التجميع ، مصدرة القند ، بيضاء اللون ،
غبراء المواج || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٠٩٧ - عَرَاوَة حَوْغِيَّة الْوَرَق

Spiraea prunifolia (S). Spirée à feuilles de prunier (F).

جنية عمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها



عراوة داذية الورق



عراوة عسكولية

18102 - عرّنة الماء *Naladaceae* (S).
Naladaceae (F). *Naladaceae* (E).
 نصيلة نباتية من وصيات القلقة. اجناسها وازدها نعام
 ١٠٠ جيمها مائية. ازدها وسيدة اللثى || اشهر
 اجناسها وروس الماء.



عرّوة لية التيس

18103 - عرّنة التيل *Naladaceae* (F).
 هي التيلوز الايس، اطبله.

18104 - عرّنة *Cauteriser* (F) *To cauterize* (E).
 عرّنة الناية : يزها على اشجارها ثم كولها.

18105 - عرّنة و شاحكة *Voiture agricole* (F).
Farmer vehicle (E).
 حجلة كبيرة تستعمل في نقل الحاصل الزراعية وغيرها
 من سائر الاشياء.

18106 - عرّنة *Chien de chasse* (F). *Pointer* (E).
 هو التسم أي كلب الصيد.

18107 - عرّنة *هو الاربد* ، اطبله.

18108 - عرّنة *هو ساق الصباين* ، اطبله.

18109 - عرّنة *Urbec* (F).
 حشرة تدعى ريشيت الكربة ، اطبلها.



عرّوة ملكة المروج

18110 - عرّنة *Arrhes* (F).
Earnst, Deposit (E).
 هو مبلغ من النقد أو أي عين متقولة يدفعها أحد طرفي
 العقد إلى الآخر سائمة التعاقد.

18111 - عرّنة *المربيع*
 المربيع نوع من الكلاب الاسوية الفاصرة الأخضر.

18112 - عرّنة *هي المرة* ، اطبلها.

18113 - عرّنة *Myricaria* (S).
Myricaire, Petit tamarisk (F). *Small tamarisk* (E).
Rispelstrauch (D). *Piccolo tamarisco* (I).

جنس جنبات برية وريزية معمرة من فصيلة الالديات.
 سوتها فراء مستطلة القصبان المجزوة
 اللثى. خراصها دقيقة تنتهي بالانبات الزهرية || وهو

من النباتات السبروية التي تعيش في أي مكان كان حتى
 بين الصنوبر || اعرف انفسه ما يلي.



مريت

18114 - عرّنة جرمانيا *Myricaria germanica* (S).
Myricaire d'Allemagne (F).

جنبة برية وريزية تنمو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. خراصها
 دقيقة تسلك نحو ٣ سم. حنايقها الزهرية كبيرة وهلة.

ازدها صغيرة القد ، ودية اللون ، يضاء المراج .
 ازدهاها يستمر من ايار الى تموز .

18115 - عرّنة دؤري *Myricaria dahirica* (S).
Myricaire de Daourie (F).

جنبة برية وريزية تنمو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم.
 خراصها غليظة تسلك نحو ٦ سم. حنايقها الزهرية كبيرة

القد ، لينة . ازدها صغيرة ، ودية اللون ، مخزوية
 القنابات الخطيفة || ازدهاها يستمر من ايار الى تموز .

مسنة الزام الاخير || ازدها نوربًا قليلة العدد ، صيرانية
 التجميع ، متصلة القد ، مراكبة البلات المكبية ،
 لونها الى البياض المزعج بالاخضر || ازدهاها يستمر
 طوال شهر حزيران .

18095 - عرّوة لحية التيس * *Spiraea aruncus* (S). *Spirée de chavre, Barbe de*
bouc (F). *Goat's beard, Steeple weed* (E). *Wald-*
geissbart, Spierstande (D). *Spiraea spigata, Barba di*
capra (I).

جنبة برية طيبة تلوح نحو ٨٠ سم. اوراقها يضيء مقنونة
 القاعدية تطول نحو ٤ سم. نصلها خماسي المروق ، خلي
 الصفحة السفلى || ازدهاها يضاء اللون ، حشكوية التجميع
 شكل حشكوي يشبه لحة التيس || وهي من النباتات
 الطلية تدور البريل وتقيد اوجاج المفاسل والالتهابات .

18096 - عرّوة مجعدة *Spiraea bullata* (S).
Spirée à feuilles cloquées (F).

جنبة تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها يضيء
 الشكل لا قياسية التسنين . نصلها عجم الصفحة ، خلي
 البشرة ، متاوج اللون || ازدهاها ودية ، صغيرة القد ،
 لينة التجميع ، نوربًا عذقية الشكل || ازدهاها يستمر
 طوال فصل الصيف :

18097 - عرّوة مزينة *Spiraea bella* (S).
Spirée décorative (F).

جنبة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. رومها فارشة مقنونة.
 اوراقها سنائية الشكل ، نصلها عاين اخضر ثنائي
 التسنين || ازدهاها عذقية التجميع ، ودية اللون .
 ازدهاها يستمر من ايار الى حزيران .

18098 - عرّوة ملكة المروج * *Spiraea ulmaria* (S). *Spirée ulmaire, Ulmaire, Reines-*
des prés (F). *Meadow-sweet, Queen of meadows*
(E). Echtes Mädesüss, Weissenkönigin (D). *Ulmaria*
regina dei prati (I).

جنبة برية طيبة تملو من ٢٥ الى ١٠٠ سم. اوراقها
 مركبة . وراقها احليجية سنائية . نصلها بارز المروق
 والتسنين . ازدهاها يضاء اللون . غفرها المراج ، عذقية
 التجميع || وهي من النباتات التي تدخل في الطب التجاني.
 نقيها يفيد الاستمساك والالتهابات والحمايات والسعال .
 ويستخرج من قضبانها اللغنية عصارة لزجة صفراء اللون
 تحوي الكثير من الحامض المراوي (acide spiréique).

18099 - عرّوة ويلسن *Spiraea Wilsoni* (S).
Spirée de Wilson (F).

جنبة تملو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. فرومها زياء اللحاء .
 اوراقها مشرمة ، نصلها اغبر اللون ، خلي البشرة على
 صفحتها || ازدهاها نوربًا عذقية التجميع ، قطرها نحو
 ٥ سم. لونها الى البياض الاصفر المراج || ازدهاها
 يستمر من حزيران الى تموز .

18100 - عرّوة يابانية *Spiraea nipponica* (S).
Spirée nipponne (F).

جنبة تملو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها يضيء
 مقنونة القاعدية ، طرفها نحو ٢٠ سم عرضها ١٦ . نصلها
 خلي الصفحة السفلى اللثراء المراج || ازدهاها نوربًا كبيرة
 العدد ، غمية التجميع ، صغيرة القد ، مستطيلة البلات ،
 يضاء اللون || ازدهاها يستمر طوال شهر حزيران .

18101 - عرّونيات *Spirées* (F).
 سيط من فصيلة الورديات ، اشهر اجناسه المراءة .

١٨١٢٥ - عُرْجُون *Rafle (F). Grape-stalk (E).*
هو المتقد من العنب وغيره بعد انتزاع حبه .

١٨١٢٦ - عُرْجُون *١٨١٢٦ - عُرْجُون*
شرب من الكفاة قدر شرب وهو طيب ما دام غسقا ، وهو كالفطر يابس وهو مستدير .

١٨١٢٧ - عُرْجُون *Rameau (F). Bough (E).*
هو القند المحرق قبل أن يكون خشباً . ج . حراجين .

١٨١٢٨ - عُرْجُونِي *Ramale (F). Ramal (E).*
نمت تعريفه يطلق على كل ما ينشب في العرجون من ابن وزمات .

١٨١٢٩ - عُرْدَة *١٨١٢٩ - عُرْدَة*
عرد النبات ، طلع وانتصب واثبت .
١٨١٣٠ - عُرْدَة *١٨١٣٠ - عُرْدَة*
البرد ، الحار في طبع اللحم .

١٨١٣١ - عُرْدَاد *Eléphant de somme (F).*
الرداد : الغنل الدامل .
Elephant of burden (E).

١٨١٣٢ - عُرْدَمِيَّة *Phallium (F). Phallim (E).*
الردمية عبادة الرمدم عند الاقدمين كالسوريين والمصريين والكنعانيين والفيليبين والاشوريين وعرب الجاهلية واليونان طقوس وثنية قوامها إقامة الشعائر التبعية امام نصب يرمز الى الرمدم لانه بمقتدم محور الحياة في الكون .

١٨١٣٣ - عُرْدُوسُ الصُّوْبَرِ الْبَرِّي *١٨١٣٣ - عُرْدُوسُ الصُّوْبَرِ الْبَرِّي*

Aradus cinnamomeus (S).
Arade du pin sylvestre (F).
حشرة غاصلة من فصيلة العرديسيات ، جسمها صغير ، مسطحة ، بطول نحو ٤ م . عند الذكر ، ونحو ٦ م . عند الانثى || ثوبها الى الخفي الاخر يعطو مزاج برارح من الاشعة الى التبر . رأسها مزخرف بتقنات وانماط . غططها ينتمن في اعداد لا يحصى الى الحلقة الصدرية الاولى . عيناها جانبيتان . زباناها معتدلة الغلظة ، كوسلها مقطوع القاعدة والمقدم . حفيفها قليلة ، صغيرة . حنجرة الظهران مسنجة بالاخير . ظهراتها اسود العروق ، يلصق البطن دون الحمار . حمار بطها اسود التجديع . قوائمها صغيرة || تألف للمواقع التي يكثر فيها البرز . تعيش على الاهداب .

١٨١٣٤ - عُرْدُوسُ الْعَقَصِ *١٨١٣٤ - عُرْدُوسُ الْعَقَصِ*

Aradus corticales (S).
Arade plat (F).
حشرة دامة من فصيلة العرديسيات ، جسمها صغير مسطح ، بطول نحو ٦ م . رأسها مزخرف . عنقها معتدل الطول ، غططها ينتمن في اعداد يمتد حتى الحلقة الصدرية الثانية . عيناها صغيرتان . زباناها معتدلة الغلظة . حفيفها صغيرة . ظهراتها ادم الخشبة ، ولا يلصق كامل البطن || رأسها وزباناها الى الخفي الاسمر . كوسلها رصعته الى الخفي المبيح والغطط بالاسود . بطها احر التبيج ، اسمر التسنج المتفرع . الصفعة السفلى الى السرة القاعدة || تألف الغابات . تعيش تحت قشور الفصص والسليمان قوتها المواد النباتية المنحلة .

١٨١٣٥ - عُرْدُوسِيَّات *١٨١٣٥ - عُرْدُوسِيَّات*

Aradidae (F).
Aradidés (F).
فصيلة حشرات من رتبة تحتلقات الاجنحة وطبقة اصغيات

١٨١١٦ - عُرْكُون ، جَوْزُ مُرْتَانِي ، جَوْزُ مُجَنِّح *١٨١١٦ - عُرْكُون ، جَوْزُ مُرْتَانِي ، جَوْزُ مُجَنِّح*
Pterocarya (S). Pterocaryer (F).
جنس اشجار سرجية ويزينة من فصيلة الجوزيات مهدا البلاد الاسيوية ، انواعه قليلة جميعها اشجار فرعاء ، دفلة ، كبيرة الحجم وراية النخل . اوراقها صياغية عابرة مركبة ، وريقاتها من ١٥ الى ٢٥ مسنة الحافة تشبه لوراء المزان ولذا دعوا الجوز المراني . اما ثمارها فجوزية مجنحة وهذا ايضا ما جعل بعضهم يسميها الجوز المجنح . للثمرة صغيرة القد ، غلافها الجلدي لاصق بالقشرة الخشبية ، لبانها حنلي اللون يضيئ للشمك لا يؤكل .

١٨١١٧ - عُرْكُونُ صِيصِي *Pterocaryastenoptera (S).*
Pterocaryer de Chine (F).
شجرة من العركون تملو من ١٥ الى ٢٥ م . اوراقها طويلة المائلين ، وريقاتها لسنة تطول من ١٥ الى ١٢ سم . تصلها اذنب الصفحتين . ثمارها بحجم البندق ، اجنحتها ضيقة مستطيلة || مهدا الصين . اوراقها صياغية .

١٨١١٨ - عُرْكُونُ مُرْتَانِي الْوَرَقِ *١٨١١٨ - عُرْكُونُ مُرْتَانِي الْوَرَقِ*
Pterocarya fraxinifolia (S). Pterocaryer à feuilles de frêne (F).
شجرة من العركون تملو من ١٢ الى ٢٥ م . اوراقها مستطيلة المائلين ، وريقاتها نحو ٩ سم . تصلها عابق الصفحة العليا باحت السفلى . ثمارها بحجم البندق ، اجنحتها وافة العرض قليلة الطول || مهدا الصين والقوقاس . تستعمل للزينة ، اوراقها صياغية .

١٨١١٩ - عُرْكُونُ يَابَانِي *Pterocarya rhoifolia (S).*
Pterocaryer du Japon (F).
شجرة من العركون تملو من ٢٥ الى ٣٥ م . اوراقها جلدية النصل الاصفر اللون ، صفحته العليا مسلة البشرة اما السفلى خضراء . ثمارها بحجم الجوز الصغير . مهدا اليابان وقد انتشرت زراعتها الزينة نظراً لقربها شكلها ولانصرار اوراقها .

١٨١٢٠ - عُرَيْلُ * *Artabotrys intermedia (S).*
Artabotrys à parfum (F).
نبات سطري سرعي ممر من فصيلة القشديات . منه بعض المناطق الحارة من البلاد الاسيوية اخصها الهند وساباو . ويخرج كنبات صناعي لاستثمار صطره || يستخرج من اناضاره دهن سطري فاخر الصنف شائع الاستعمال في الهند وجاروا وسان الاطوار الاسيوية .

١٨١٢١ - عُرَيْمِيَّة *١٨١٢١ - عُرَيْمِيَّة*
Artemia (S).
Artémie (F).
دوية من القثريات البدنية عيشوييات الاطراف . تعيش في المناطق والندران الباردة حيث للملوسة لا تقل عن ملوسة البحر وقد تقفها || جسمها ادم الحام . عيناها مؤنذتان . زباناها مسطبلان عند الذكر . ارجلها الصدرية صغيرة للشكل .

١٨١٢٢ - عُرُج *Boiserie (F). Halting, Limpig (E).*
عطب يحل بترام الكواب فاذا كان مقطعا اعتبر من العيوب المبطلة لليع .

١٨١٢٣ - عُرْجَاء *١٨١٢٣ - عُرْجَاء*
الرجاء هي الفسج ، اطلبها .
١٨١٢٤ - عُرْجُء *Rameau tortueux (F).*
Tortuous bough (E).
هو القند البام الاستقامة الكثير التعاريج والمقد .



عُرِيل



عردیل اربد

Alarch

١٨١٤١ - عُرْشْ

الدرش بجموعه كواكب صغار تنضم اليها الاخر.

١٨١٤٢ - عُرْشْ التُّرْكَا

بجموعه كواكب بالقرب من الثريا.

١٨١٤٣ - عُرْشْ هُو ورد الهند، امله.

١٨١٤٤ - عُرْشْ مُتَقَلِّبْ *

Orsodacne variabilis (S).

Orsodacne variable (F). *Orsodacne variabilis* (E).

حشرة خاضعة وبقرة من فصيلة السالوليات وربة مفدمات الاجنحة، موطنها فسيح الارياح بين من الشرق الاصل الى اوروبا واسريكة الشهاية. تألف البراري والمناطق والحقول المزروعة، غناتها تعيش على اوراق النباتات من المذكورة وعلى اثمار الصبوانيات، يرقاتها تلم الاوراق وتعيش في داخلها || جسمها صغير اللطع هو ٨ م. ثوبا متقلب الالوان تقلب فيه الشقة الحنطة المولج مع اسوداد الرأس، رأسها مستد الجرم. عيناها كيرتان جاسطتان. زباناها خيطان خفجان. غلها مخروطي مزق الطرف. ظهورها مستدير المؤخر للامح. غدها مستتة الصلابة، متناحيتا التحزير الخفيف. ارساها رباعية العقول الظاهرة || ها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملنة في اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف، تسرح في النهار. تساد بعد ظهورها بنمو اربعة اسابيع. تنعم المكن على نصال الادراك || وجموعه عت ادراكها الكال الجسودي طولها هو ١٢ م. البرصه دقيق الجرم، شبه اسطواني الشكل، سداسي الرواجب التحيلة، اكهب اللون، اسمر الرأس || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما ينتهي في الجلالة فمن صلبة من المواد النباتية والثرابية المحببة بالريال.



عردیل



عردیل متقلب



عردیل جدي



عردیل شرقي



عردیل شتقوره

الجنح. اجناسها واوراها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجناسها صغيرة، مبطلة. رؤوسها مزرقرة. اعطاشها قصيرة، محبوبة. قريبا الاستشارية رباعية الفصل. قواها صغيرة. ارساها ثنائية العقول || جميعها خاضعة او دامة تعيش على اوراق النبات او على المواد النباتية المعتدلة.

١٨١٣٦ - عُرْدِيلْ اُورْدَه *

Adelocera murina (S).

Adelocera gris souris (F). *Adelocera murina* (E).

حشرة خاضعة وبقرة من فصيلة السالوليات وربة مفدمات الاجنحة، موطنها فسيح الارياح بين من الشرق الاصل الى اوروبا واسريكة الشهاية. تألف البراري والمناطق والحقول المزروعة، غناتها تعيش على اوراق النباتات من مختلف الفصائل ونها البقول التي تغلفها على غيرها. يرقاتها التي تعيش في التربة، نحو اربع سنوات لا كلال دورتها الحياتية، تغلف كجلود الزروع والبقول والنباتات التريزية والابجار المثمرة وتقترب اسرع بعض الحشرات وكزيرة ذرات الجنحين || جسمها متوسط القد، اهلجي الشكل، يعط من ١٢ الى ١٨ م. ثوبا الى السرة العاقبة يملها زغب احمر يميل الى الازرق. رأسها مستعرض الشكل. عيناها مخروطية. فكهاا غليمان زباناها خيطان. ظهرها صيرتان صاحتان. كيرتها قليل الاسدياد. ارساها خاسية العقول، حمية الخالب || الاثني اثن قلما من الذكر واكد ثوبا منه واقرص زبانا واضخم بطنها || جيلها رباعي الحول. تظهر الحشرة الجملنة في اواخر ايار وتبقى حتى اواخر تموز. تسرح في النهار وتبيت في الليل. تسى على الارض بقعة واذا وقعت على ظهرها تلتف لاستمادة وضعها الطبيعي.

١٨١٣٧ - عُرْشْ

Gastridium (S). *Gastridium* (F).

جنس نباتات عشبية برية مفعوة من فصيلة النجيليات انواعها المعروفة قليلة منها بعض اصناف حوض البحر الابيض المتوسط. تتميز انواعها بخصانته سيلانها المكشوفة الشكل || بعض انواعها ينبت طوعيا في الجرد القبانية.

١٨١٣٨ - عُرْشْ، عُرْشْ هُو ابن عرس، امله.

١٨١٣٩ - عُرْشْ

Ortixelus Melfreni (S).

Ortixelus de Melfren (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزرقايات. موطنه مناطق افريقية الاستوائية يجوها في طلب القوت، يألف غصاف بجاري الماء والبحيرات والمستنقعات. قرته الحشرات والديدان وبعض الاعشاب المائية. ملجته الحياقي جاسي || جسمه صغير القد، رشيق القوام، مغلف الرأس، صغير المنقاد للذهب الطرف. جناحاه كيرتان لاحفان. ذنبه مستدير الطرف. ثوبه الى الشقة الموحدة بالابيض. رأسه كستي اللون. عيناها مكشطان. عمراه الى الياض الناجي. مفادة ورساه الى الشرة الحنطة || يدن انحصره في التربة بين الاعشاب الرقية. الاثني تحضن رسدها من ٤ الى ٥ بيضات. ترغيبها يستمر نحو ١٥ يوما. الذكر يولن لها الغذاء.

١٨١٤٠ - عُرْشِيَات

هي فصيلة السوريات. املها.



عُرْصَت شِيَا



عُرْصَن



مَرُوس مُلْتَس



عُرْطِيل

قصدان ترتفع من ١٥ إلى ٣٠ سم. أوراقها القرصية مدبجة بالجزوي والاصفر الاسفنج المواج. ازهارها صفوتدية التجميع زرقاء اللون || ازهارها يستمر من نيسان الى تموز.

١٨١٤٩ - عُرْصَت شِيَا*
Ajuga chia (S). Bugle chia (F). Chia bugle (E). Chia Günsel (D). Ajuga chia, Bugula chia (I).

عشبة معمرة تملو من ١٥ إلى ٤٠ سم. أوراقها الجذعية السفلى مستطيلة. عقودها الزهري على حد طول الساق. ازهارها زرقاء اللون. ثنائياتها قصيرة ثنية || ازهارها يستمر من ايار الى آب.

١٨١٥٠ - عُرْصَت صَوْبَرِي* كَالْبَطُوس
Ajuga Chamaepitys (S). Bugle petit-pin, Chamé-pitys, Ivette (F). Ground pine, Yellow bugle (E). Gelber Günsel, Ackergamsander (D). Bugula ivatetica, Campesio (I).

عشبة حولية تملو نحو ٢٠ سم. أوراقها ثلاثية التشرع المدهي. ازهارها صفراء اللون سبيلية التجميع || ازهارها يستمر من نيسان الى تشرين الاول.

١٨١٥١ - عُرْصَت صَوْبَرِي*
Ajuga pyramidalis (S). Bugle pyramidal (F).

عشبة معمرة تملو نحو ٢٥ سم. ساقها مفصلة زباد اللحاء. أوراقها مستطيلة، نصلها متشعب الصفحة المابقة الحفار البحري. ازهارها صفوتدية التجميع المحري الشكل، لونها الى الزرقاء البشبية || ازهارها يستمر من نيسان الى آب.

١٨١٥٢ - عُرْصَم
Streptosolen (S). Streptosolène (F).

جنس نباتات جنية زينة معمرة من فصيلة الباذنجانيات. سوقها فراء تملو من ١٠٥ إلى ٢٥٠ سم. أوراقها ابيدة، كملية، بيضية الشكل، نصلها خلى البشرة حل صفحتيه. ازهارها برتقالية اللون، حطية التجميع، تاجية الارتكاز. ثمارها جوزية القند، بيضية الشكل، مقطوعة القرب، لينة السوف. يزورها حنسية صغيرة، وبقعة، حنطية اللون || ازهارها يستمر طوال الربيع.

١٨١٥٣ - عُرْصَن*
Siderodendron (F).

جنس اشجار حرجية من فصيلة الفوياد، انواها ثقيلة العدد منبها البلاد الحارة. سوقها فراء تملو من ١٢ الى ٢٥ م. أوراقها متقابلة اعليجية مستطيلة. ازهارها صفوتدية التجميع، تاجية الارتكاز، ثمارها عنبة. اشعابها ناعمة الرقة، ثقيلة الوزن، شديدة الصلابة، خضرة اللون، فاقرة الصنف، تستعمل في الصناعات الخشبية.

١٨١٥٤ - عُرْصِي
Lastude

المساة الكائنة بين مربع معين وضبط الاستواء.

١٨١٥٥ - عُرْصِي
Offer, Proposition (F). Offer, Proposal (E).

هو طلب ابرام عقد يتفق مع الشروط المفروضة.

١٨١٥٦ - عُرْصِي
Accidental, Fortuit (F). Incidental, Casual (E).

١٨١٥٧ - عُرْطَب هو القنطريون الكبير، اعطيه.

١٨١٥٨ - عُرْطَب
Artanthe (F).

نوع من التامول. جنية معمرة من فصيلة القنطريات اوراقها طيبة رائحة ونهم من يستعملها مضفاً. راسع تامول خفيف الورق.

١٨١٥٩ - عُرْطَبِيْنَا هو السكك، اعطيه.

١٨١٦٠ - عُرْطُوس مُلْتَس*
Athous obscurus, Athous haemorrhoidalis (S). Athous confus. Taupin confus (F). Athous obscurus (E).

حشرة مؤذية ناعمة مفترسة من فصيلة السميات وربة مفيدات الاجنحة. موطنها يحد من الشرق الاوسط الى معظم الامصاق الاوروبية. تألف المباليل والحقول المزدرة والادغال والاسراج. خنافسها تعيش على نباتات الزهور والورق القراص والحرفش. يرقاتها مؤذية تقضم كلوا النجيليات والبقول والبطاطا والشودند ويقتصر عملها تستطيع من الحشرات || جسمها متوسط القند يطول من ١١ الى ١٤ م. ثوبها ملتص الايلان، اسود الرأس والكسول، احمر البطن، كشي الفهران، اسمر الجرازم. راسها صغير الجرم. زباناها خيطيان، مستطيلان. عينها صغرتان بارزتان. ظهورها متشعب التميزز المندي القاطب. اوصافها خالصة السفل تتميز باستطالة العفلة الاولى وبقصر الزاوية || الانثى تدعى عرطوسية وهي امير قند من الذكر واكد ثوبا منه واقصر زبانا || حيلها رباعي الحول. تظهر الحشرة المجلجلة في ايار وتبقى حتى تموز. تسرح في النهار وبيتيت في الليل || البرقة طيبة النود تدرك الكال الجسوري بمرر ثلاث سنوات فيصبح طولها نحو ٢٧ م. ثوبها الى الصفرة الصنائية يملوها مواج امفر.

١٨١٦١ - عُرْطُون*
Orthonyx (S). Orthonyx (F). Orthonyx (E).

جنس طير من الجوارث رقيقات المناقير وفصيلة المانوريات. انواعه المعروفة اربعة موطنها استراليا وزيلندة الجديدة. تألف الاسراج والقنابات العاتية الانحجار. ملجئها الحيات زوجي. قوتها الحشرات والنسل والبار واليزور || اجسامها متوسطة القند، ريشة القوائم تطول من ٢٤ الى ٣٢ سم. رؤوسها مستدلة الجرم. مناقيرها رقيقة صغيرة. اجنحتها مستديرة. اذنانها مستطيلة، مقطوعة الاطراف. انواها متباينة اللون تكثر فيها التكهية الخنطية المخلجة والمزودة السراء. جميعها مرقوشة الرقاد والجناح والذنب || تدن الاشعاش في الادغال القليلة الارتفاع من سطح الارض. الاناث تحضن ريدعا من بيضة الى بيضتين في مرتين او ثلاث مرات في الحول. الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع. الذكور توفن الحاية والنذاء.

١٨١٦٢ - عُرْطِيل*
Erotylus (S). Erotylus (F).

جنس حشرات من غديات الاجنحة دبوسيات القرن وفصيلة المريطليات. انواعه المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الاستوائية || اجسامها شبه بيضية الشرنج و بحبة الصفحة العليا، تطول من ١٠ الى ١٥ م. انواها ملونة، زاهية الخصب وسها المؤذرة والمجذبة والمجذبة. تعيش على جميع انواع الفطور اعصها الحيفية التركيب.

مستطيلة، رملية، متدلية. اهدابها فلسية، ذرية متقابلة. ثمارها جزوية اللون، غنية الشكل، قطرها نحو ١٠ م. اغشائها صناعية شائعة الاستعمال.

١٨١٦٩ - عَرَبِيَّاتٌ رَافِع (F). *Genévrier de la Tauride*. هو القزاق، اطلبه.

١٨١٧٠ - عَرَبِيَّاتٌ صَبِيحَة (F). *Genévrier sabine*. هو الابل، اطلبه.

١٨١٧١ - عَرَبِيَّاتٌ سَوْرِي * و دَقْرَان
Juniperus drupacea (S). *Genévrier de Syrie*, *G. drupacea* (F). *Syrian Juniper* (E). *Syrischer Wacholder* (D). *Ginepro di Siria* (I).



عَرَبِيَّاتٌ سَوْرِي

شجرة وشية الشكل سبوتية مبدولة تملو من مترين الى ٢٠ م. غرايبها وبناتها قصيرة مزاكية. اهدابها تطول من ١٢ الى ٢٥ م. وتعرض من ٣ الى ٥. نصلها عمري الصفة قلبية، اخضر القفل. ثمارها نوية الشكل قطرها نحو ١٥ م. لوها الى الارجلاني اللابق المراج اللابح.

١٨١٧٢ - عَرَبِيَّاتٌ شَائِع *
Juniperus communis (S). *Genévrier commun* (F). *Common Juniper* (E). *Wacholder*, *Machandelbaum* (D). *Ginepro* (I).

جنية سبوتية ترطب في الاربة الكلسية تملو من ١٠٠ الى ٤٠٠ م. غرايبها فارقة. بناتها اسطوانية. اهدابها خيطية تملو من ٨ الى ١٥ م. ثمارها غنية الشكل ولقد تبدو متدلية ثم تزد مع الاذلاق وهي تستعمل في تطهير هذه مستحضرات منها الكحولية كاللين والبيت وسها الكنسر والاشوكروت.

١٨١٧٣ - عَرَبِيَّاتٌ عَال *
Juniperus procera (S). *Genévrier élevé*, *G. d'Afrique* (F). *Uganda Juniper* (E). *Afrikanischer Wacholder* (D). *Ginepro abissino* (I).

شجرة سبوتية منها الحيفة وقد عت زراعها خطوط حوض البحر المتوسط. ساقها منتصبة لزاما تملو من ٢٠ الى ٢٥ م. غرايبها متدلية. بناتها رباعية التضلع. اهدابها سفوية حامدة القسطن. ثمارها مستدرة صغرية قطرها نحو ٥ م. لوها الى الخليلي الاعمر. اغشائها صناعية جيفة الصنف.



عَرَبِيَّاتٌ شَائِع

١٨١٧٤ - عَرَبِيَّاتٌ فِيرَجِينَة
Juniperus virginiana (S). *Genévrier de Virginie*, *Cédrus de Virginie*, *C. rouge* (F). *Red Juniper* (E). *Virginischer Wacholder* (D).

شجرة سبوتية متدلة النمو، كبيرة القدر تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. اغشائها اقلية الانتساب. غرايبها رملية. بناتها رباعية التضلع. اهدابها غزوية الشكل لونها الى الخضار الاثوزق اقباق وفوح منها غنى اللبس عرف كره مسجن. ثمارها بيضيه الشكل تملو نحو ٧ م. وتعرض نحو ٥ لوها الى البقسجي المائم. اغشائها صناعية جيفة الصنف حراه اللون.

١٨١٧٥ - عَرَبِيَّاتٌ فِينِيْجِي
Juniperus phoenicea (S). *Genévrier de Phénicie*, *Morven*, *Lyrien*, *Sabine maritime* (F). *Phoenician Juniper*, *Arabian Juniper* (E). *Phönizischer Sadebaum*, *Rotfruchtiger Wacholder* (D). *Ginepro licio* (I).

شجرة سبوتية صغرية القدر تملو من ٤ الى ٨ امتار.

١٨١٦٣ - عَرَبِيَّاتٌ ٥
Erotylides (S).

Erotylides (F). *Erotylides* (E).
فصيلة حشرات من غديات الاجنحة دبوسيات القرون. اجناسها وازواها كثيرة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الاستوائية والحارة. اجسامها متباينة القدر والشكل، منها البيضية والاهليجية والاسطوانية، تطول من ٤ الى ١٦ م. اوتواها جميلة الغضاب الزهري الاسفع الموج، قرونها الاستشارية مؤلفة من ١١ فصلة، الفصل الثالث الاخير دوسية الشكل. ارباغها خامسة القفل. المغلة الرابعة شديدة الصغر لكاد لا تظهر. اشهر اجناسها العرطل والعشخوش.

١٨١٦٤ - عَرَبِيَّاتٌ فِينِيْجِي
Juniperus (S). *Genévrier*, *Genèvre* (F). *Juniper tree* (E). *Commoner Wacholder* (D). *Ginepro* (I).

جنس نباتات حرجية وتزيينية من السرويات. انواعها عديدة، منها الاجبار والشجيرات والجنابات، جميعها ابيدة. بناتها منتصبة لا غنية. اوتواها غنية غزوية الشكل او سرشفية. ازارها وسيدة المسكن. ثمارها عتيقة القدر والشكل، حلوة الطعم، عطرية العرف يستخرج منها بالتقطير بده التخمير قنديب مقوم ينشط الباه ويهد البول. اغشائها صلبة. عصارها صغرية بخورية سريفة الجفاف. اعرفها واشهرها ما يتبع.

١٨١٦٥ - عَرَبِيَّاتٌ الْبَحُور
Juniperus thurifera (S). *Genévrier à l'encens*, *G. porte-encens* (F). *Incense Juniper* (E). *Weihrauchwacholder* (D).

شجرة سبوتية صغرية القدر تملو نحو ٥ امتار. غرايبها منفردة الزوايا. بناتها اسطوانية. اهدابها فلسية ذرية متقابلة، لوها الى الخضار البشري الاسفع الموج، ثمارها غنية قطرها نحو ١٠ م. لوها الى الزرة الخيطية. يستخرج منها بالخز مادة صغرية عطرية تستعمل استعمال البخور.

١٨١٦٦ - عَرَبِيَّاتٌ الْشَّامَل *
Juniperus occidentalis (S). *Western Juniper*, *Sierra Juniper* (E).

شجرة سبوتية تعيش في جميع الاربة والمواقع تملو من ٣ الى ٢٠ م. غرايبها جامدة منتصبة. بناتها اسطوانية. اهدابها ثلاثية الصنف، فلسية، ذرية، يفوح منها غنى اللبس عرف اغاذ وانثني الرائحة. ثمارها زرقاء اللون، غنية الشكل قطرها نحو ٨ م.

١٨١٦٧ - عَرَبِيَّاتٌ الصَّيْن *
Juniperus chinensis (S). *Genévrier de Chine* (F). *Chinese Juniper* (E). *Chineseischer Wacholder* (D). *Ginepro cinese* (I).

شجرة سبوتية كبيرة القدر تملو من ١٥ الى ٢٥ م. اصرامها عديدة، اشهرها المغذية والقضية. جميعها تزيينية سريفة النمو. غرايبها جبالسة منفردة. بناتها اسطوانية منتصبة. اهدابها غزوية ثلاثية التجميع تطول من ٨ الى ١٢ م. نصلها اخضر اللون، ابيض المختار. ثمارها تنسجيه اللون، طليقة البشرة، بيضيه الشكل تطول نحو ١١ م. وتعرض نحو ٧.

١٨١٦٨ - عَرَبِيَّاتٌ خَرَج *
Juniperus flaccida (S). *Genévrier flasque*, *G. pleureur* (F). *Drooping Juniper* (E). *Trauerwacholder* (D). *Ginepro piangente* (I).

شجرة منتصبة القدر تملو من ٨ الى ١٥ امتار. غرايبها

ساقها فرعاء . أزهارها يفضاء اللون ، جميلة الشكل ، عتقودية التجميع ، تاجية الارتكاز ، منتصبه || أزهارها يستمر طوال فصل الصيف .



عرق الدم

١٨٢٠٢ - عرق الذهب المخزني *

Uragoga ippecacuanha, *Cephaelis Ipecacuanha*, *Psychotria Ipecacuanha* (S). *Psychotria Ipecacuanha*, *Ipecacuanha*, *Ipecá du Brasil* (F). *Ipecacuanha* (E). *Ipecacuanhiflansa* (D). *Ipecacuanha* (I).

نوع من عرق الذهب وهو عشبة ليفية صغيرة الغد تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . أصلها البلاد الحارة الرطبة . يستخلص من جذورها الغليظة والحديدية ، الحامضة ، مادة قلبية فاقية تحوي نحو ٢٪ من عنصر الاميتين (Emetine) الشائع الاستعمال الطبي .

١٨٢٠٣ - عرق السوس هو السوس ، اطبله .

١٨٢٠٤ - عرق السوس البري

هو الاسطرافالوس عرق السوس ، اطبله .

١٨٢٠٥ - عرق التجميل هو الدفن الاحمر ، اطبله .

١٨٢٠٦ - عرق النسا

Nerf sciatique (F). *Ichiatic nerve* (E).

١٨٢٠٧ - عرق انجبار *

Potentilla erecta, *P. tormentilla*, *Tormentilla officinalis* (S). *Potentilla tormentilla*, *Tormentilla officinalis* (F). *Blood-root*, *Tormentil*, *Septfoil* (E). *Blutwurzfingerkraut* (D). *Potentilla tormentilla* (I). نوع من عشبة القوي وهو نبات عشبي طلي مداد من فصيلة التيليكيات يكثر في الغابات والرمالي . جذاميره غليظة آتفة الانتشاب . ساقه فرعاء . أزهارها زنادية فردية تاجية ، صفراء اللون .

١٨٢٠٨ - عرق مدتي هي حداة المدينة ، اطبله .

١٨٢٠٩ - عرقاة ، عرقلة *Collet* (F). *Neck*, *Collar* (E). أروسة الشجرة التي تشعب منها المروق .

١٨٢١٠ - عرقلة *Filare* (F). *Filaria* (E). هي الحداة ، اطبله . اما المرقعة فهي شبة الدكتور حبيب صادر .

١٨٢١١ - عرقلة هو الحفص ، اطبله .

١٨٢١٢ - عرقص *

Sciophila (S). *Sciophila* (F). *Sciophila* (E). جنس حشرات من فصيلة القرمصيات وربة ذوات الجناحين . أنواعها المعروفة نحو ١٥ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة ، نجيلة ، تطلو من ٤ الى ٦ سم . رؤوسها صغيرة ، شبه موزانية الشكل . عيونها صغيرة ، متباعدة عند الشقين . قرونها الاستيعادية محيطية مركبة من ١١ فصلة . ملاحها وباعية العقول . مراشفتها شليمة . كواسلها بيضيه . بطونها مردنية . أنوثها لمرنة . رؤاشها قسطانية التنضيب . قوائمها الوسطى والخلقية مهدبة الطليانيب ، مجهزة بمناسخ ذوبة || تألف القنابات والمواقع الرطبة . اساريمها نجاية او عاردة تميش تحت لحاء الانجار او عل الفطرو .



عرق انجبار

١٨٢١٣ - عرقصون هو جلمه الحيفة ، اطبله .

١٨١٩٢ - عرق ، وتين ، وريد ، ودج

Veine (F). *Vein* (E). عضو رعائي من اعضاء الجهاز الدوري في الجسم .

١٨١٩٣ - عرق

Nervure (F). *Nervure*, *Nerve* (E). عضو رعائي ثانوي من اعضاء الجهاز الدوري الثاني مركزه الرئيسي في نصل الورقة ينشعب عن ضلعها .

١٨١٩٤ - عرق هو السلاة ، اطبله .

١٨١٩٥ - عرق أبيض

Veine blanche (F). *White veins* (E).

رسم ويمن الرواق الاقتصادية تسببه حشرات الترييس والفيزيو التي تركب اوراق التبغ تقطع الخشب وتمص عصارة الخلايا واللصع الناجع ولا تترك حل نسيج النصل بمحاذاة النصل والبروق والترايين موى اياها حلوية جامدة ميتورة لا مناعة عندها تحميها من عبث الامراض الفطرية ولا طاقه نشورية فيها تمكها من متابة نشاطها الحيوي || يكاتف هذا الورم بالفساد على الحشرة التي تسببه ذلك فور ظهورها على اوراق . راجع ترييس التبغ .

١٨١٩٦ - عرق أبيض

هو الجزر الأبيض ، اطبله .

١٨١٩٧ - عرق أكور هو عود الوج ، اطبله .

١٨١٩٨ - عرق الحلاوة

هو الصابونية الحزنية ، اطبله .

١٨١٩٩ - عرق الدم * ، دموية

Sanguinaria canadensis (S). *Sanguinaire du Canada* (F). *Blood-root*, *Red puccoon*, *Blood-wort* (E). *Kanadisches Blutkraut* (D). *Sanguinaria del Canada* (I). نبات شبيه جذموري معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الفشخانيات . جذاميره غليظة عقدية مادة غزيرة العصارة اللبكية الحمراء اللون ، اوراقه فردية تقشبي وسيدة عند كل عقدة يطولها شراخ . وهي معتقة ، كفية ، خاسية او سداسية القصوص المسنة الحامضة ، تصلها الى الحفار البحري يطلو موانج اجر . شاربته الزهرية تملو نحو ١٥ سم . وهي فردية الزهرة التي تألف من ٨ الى ١٢ بتلة يفضيه الشكل يفضاء اللون || أزهارها يستمر من نيسان الى ايار . وهو من النباتات الصناعية الطبية والتريينية وذلك لان صمارة اللبكية تستعمل في صباغ الالافقة ولان جميع اجزائه من الجذور الى الورقة والزهرة تستعمل طبيا كمور او مخدر .

١٨٢٠٠ - عرق الذهب *

Psychotria (S). *Psychotria*, *Psychotria* (F). *Psychotria* (E). *Brechkraut*, *Brechpflanz* (D). *Psicotria* (I). جنس نباتات برية من فصيلة القوييات أصلها البلاد الحارة . انواعها عديدة جميعها جنيات وجينيات منتصب السوق ، اوراقها متعاقبة منتعة كاملة . أزهارها عتقودية التجميع او تاجية الارتكاز . ثمارها عشبة جلدية يابة . له نواتج مشهوران واحد طبي وآخر ترييني .

١٨٢٠١ - عرق الذهب الأبيض الزهر

Psychotria leucocephala (S). *Psychotria leucocephala* (F).

نوع من عرق الذهب وهو جنية معمرة تملو نحو ١٥٠ سم .

فردية التجميع ، أبيلية الارتكاز || أعرف أنواعه وأشهرها المرقون الحزقي .

١٨٢٢٢ - عَرَقُونٌ مَحْزُونِي *

Euphrasia officinalis (S). *Euphrasia*, *Euphrasia*, *Cassinetunensis*, *Luminet* (F). *Euphrasia*, *Common eye bright* (E). *Echter Augengrost* (D). *Eufrasia*, *Spezza occhiali*, *Luminella* (I).

نوع من العرقون وهو نبات عشبي بري سولي شبه قنطريون لانه يركب بجذوره جذور النباتات الاخرى || اقلية حوض البحر المتوسط ، اوراقه صغيرة لثقة متعاقبة نصلها مشاربي الخافقة متمنقفة التسنين ، ازهاره وردية اللون . اوراقه وازهاره تنفع الرمد وجميع التهابات العين .

١٨٢٢٣ - عَرَقِيل
Jaune d'oeuf (F).
Yolk of an egg (E).
هو صفار البيض .

١٨٢٢٤ - عَرَم
Oufs de gangas (F).
Eggs of the Pin-tailed grouse (E).
الرم : بيض القطا .

١٨٢٢٥ - عَرَم ، قَارِص ، أَمِير يَاسِر

Carissa (S). *Carisse* (F). *Carandas plum* (E). *Carisse* (D). *Carissa* (I).
جنية معمرة برية طيبة من سبط العرميات وفضيلة التفاليت . اصلها الهند وبعض مناطق افريقية الشرقية والجنوبية . ساقها فراء . فروعها سرعية شائكة . اوراقها سنانية متعاقبة . ازهارها حشوكية التجميع ، محورية وتاجية الارتكاز ، بيضاء اللون || ازهارها وديعي يستمر من ايار الى تموز .

١٨٢٢٦ - عَرِمَاص ، عَرَمَص

طحلب كانه نسيج العنكبوت . والفلق الاخضر الذي يتفكك الماء .

١٨٢٢٧ - عَرَمَة *
Georgychus (S). *Géorgique* (F).
جنس حيوان من فصيلة اللطافات . انواعه ثمانية . اجسامها اسطوانية الشكل تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . انوارها الى السرة . وروصها مستديرة ، وقامها مقطوعة . صوبها خرزوية . اذنانها لا قوية ، قوائمها قصيرة ، اطرافها قوية ، اذنانها حصل شعر تملو جذاع || انانها تنصع من جبرون الى اريمة . تألف النيام والاراضي الرملية الشجرية . اجسامها متوسطة السمك . انفاقها طويلة متعرجة كثيرة القوة ، قوتها جلود ولاء وشكر النبات .

١٨٢٢٨ - عَرَمَة ، عَرَمَة
Meule (F). *Stack* (E).
الكس من الحصيد يرم ويحفظ ويأكل يدرس .

١٨٢٢٩ - عَرَمَص

Salpichroa (S).
Salpichroa, *Chef de coq* (F).
جنس نباتات جينية معمرة من فصيلة الباذنجانيات . انواعه عديدة جميعها سرعية . صوبها فراء تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . فروعها سرعية . اوراقها اطيالية مستديرة القاعدة ، صغيرة لثقة ؛ نصلها ناعم التسنج ، خلج اللبس جميل الخضار . ازهارها محورية الارتكاز ، جليبية الشكل ، بيضاء اللون . ثمارها جوزية الشكل والقد ، لية السوداء ، غراء اللون .

١٨٢٣٠ - عَرَمَص

الرمض : كل شجر لا يثمر ابداً .

١٨٢١٤ - عَرَقِيَّات *
Scrophillidae (S). *Scrophillidae* (F). *Scrophillidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المرمقة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متفاوتة القد ، تطول من ٤ الى ١٦ سم . وروصها صغيرة ، شبه مزوانية الشكل . صوبها صغيرة ، متباعدة عند التسنين . قوتها الانتشارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . رائحتها ولباسها معتدلة الطول . قوائمها الخلفية مستقيمة الانحناء || تألف الرياض والغابات والحراج . يرقصها تدوير على الاعشاب النخرة وتحت القشور || أشهر اجناسها العرقص والميكوبية والية .

١٨٢١٥ - عَرَقُطٌ مَحْزُون *
Oreocla cristata (S).
Oréocla huppé (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة المرمديات ورتبة الجروم سنات الخنازير . يأنف انفايات والاحراج . ملجته الخياشي جاني . جماعته قليلة العدد . قوته الحشرات والناث والبانة والازود || جسمه صغير القد ، يطول نحو ٢٢ سم . ثوبه جميل الالوان المتداخلة . راسه معتدل الجرم المنس الخضر الاصفر ، تملو ، عند الذكر ، قزعة شرعية الشكل حيلة الخضر اللهب . وناثه وجناحه وذنبه الى الخضر الالامس يملو مواج يراوح بين الشبه والثرقة . زوره الى اليافض الناجي . امل صدره الى الحمرة الجوزية . يبط الى الصفرة يملو مواج يراوح بين الشبه والخضرة || يطن عنه في الادغال المستعصية . الاثنى تحضن بمواجة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات .

١٨٢١٦ - عَرَقُوب
Jarret (F). *Hough*, *Hock* (E).
عضو من اعضاء القوائم في الثناب وهو ما ضم ملتقى الساق والوظائف من مؤخرها .

١٨٢١٧ - عَرَقُوب الرامي
Arkab
عرقوب الرامي كوكب نثر من برج الرامي . مركزه على الساق اليسرى وهو الاول من الصردين .

١٨٢١٨ - عَرَقُوب القنطرا
ساقها . وهو ما يباع له في القصر يقال يوم انصر من عرقوب القنطرا .

١٨٢١٩ - عَرَقُوكَة
الثرقة نجان متشعبان من كوكبة القوس الاعظم .

١٨٢٢٠ - عَرَقُوكَل
Duchesnea (S). *Duchesnée* (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الورديات . انواعه قليلة العدد جميعها قريبة الشبه من الشيلك . صوبها مدادة تطول من ٢٥ الى ٥٠ سم . اوراقها متعصية مستطيلة المائلين . نصلها مفصص الصلصة . ازهارها الى الصفرة اللحية . ثمارها حشوية التركيب ، شيلكية للقد والشكل ، حراء اللون ، مأكولة ، لكنها عادمة النكهة والرف .

١٨٢٢١ - عَرَقُون *
Euphrasia (S). *Euphrasia* (F).
جنس نباتات عشبية برية سولية ومعمرة من فصيلة الخنازيريات . انواعه نحو ٢٠ منظرها من اشباب المناطق الحارة . اوراقها صغيرة متعاقبة مسننة الخافقة . ازهارها



عرقط متحج



عرقون



عرقون غزني



عرمة

١٨٢٤٠ - عُرُوشُ *
Epi de maïs (F).
Maize head, Maize ear (E).
عور اسطواني الشكل غليظ القدر تركز حوله حل صفوف متتابعة حبوب اللقطة الصفراء .



عور

١٨٢٤١ - عُرُوشُ *
Clio (S). عُرُوشُ الحوت *
Clio (F). Clio (E).
جنس دوبيات بحرية من الرخويات بجنات الابريل وفصيلة المرئوسيات . انواعها المرفقة عشرة منتشرة في المحيط الاطلسي والمحيط الهندي والبحر الابيض المتوسط || ملجئها الحيائي جلجي . اسرطيسا تعد بضعة ملايين || اجسامها صغيرة عادية اللثاف الصلبي شبه وشية الشكل تطول من ٢ الى ٤ سم . افواهها مطوقة بزوائد غروطية نابضة . زعانفها زوجية تشعب في الفت . انواعها عديدة منها الازرق والبنفسجي والجزوي والاحمر || الجنسان تتنح اسرابها وتلتهمها بشراهة .



عور النثم

١٨٢٤٢ - عُرُوشِيَّات *
Clonidae (S). Clonidae, Clonidés (F). Clonidae (E).
فصيلة دوبيات بحرية من الرخويات بجنات الابريل هريانات . اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || تتميز باجسامها الصغيرة القشة وشية الشكل وبملامسها الهجعة الاطراف وبغلوا من اللثاف الصلبي || اشهر اجناسها المرئوسية .

١٨٢٤٣ - عُرُوشُوم *
Champlignon (F). عُرُوشُوم *
Mushroom, Fungus (E).
هو كل فطر تام الخلفة بين الباق والكعبة .



عورلوس

١٨٢٤٤ - عُرُوشُ *
Pérénne (F). Perennial (E).
صفة نباتات المعمر . وقد تستعمل بمعنى الممتدة الانخضار في النبات الذي لا ينحصر لاعمال الزرع الموقوت . ضدها بالمعنى الارل سولي . وبالمعنى الثاني حابل ونافض ونفيس .

١٨٢٤٥ - عُرُوشُ الماء *
Naiade, Nais (F). Naiad, Water-nymph (E).
جنس نباتات مائية من فصيلة عرائس الماء . انواعها المرفقة ١٠ جميعها من نباتات المياه العذبة . سوقها منشبة قصفة . اوراقها رقيقة شفافة . انماها لثائية المسكن . ابطية الارتكاز . فردية التجميع . الفكرية منها قوامها معادة والاثوية مبيض || وهي من نباتات القمرودية في المساك الاسطاسية لانها تدخل في غذاء بعض الاسماك انصها البيوط .



عورشة

١٨٢٤٦ - عُرُوشُ النيل *
هو لولس النيل ، اطلية .
١٨٢٤٧ - عُرُوشَةُ البَحَر *
هو السمل المنلخ ، اطلية .

١٨٢٤٨ - عُرُوشَةُ الْقَرَّاصِ *
Eurrhypare urtica (S). Eurrhypare de l'ortie, Teigne des orties (F). Eurrhypare urtica (E).
حشرة مزوقة من فصيلة الثاربات حرشفات الاجنسة . موطنها بعض اقالم البلاد المتدلة الحارة من الشرق الاوسط ولروية . فراشها واسعة قوتها رقيق الازهار . غاضلة تركب اوراق القراص والشعويات البرية والزراعية فتقتل الازراق وتقيم في داخلها || جسمها يطول من ١٠ الى ١٢ سم . بطنها قراوح من ٣٠ الى ٣٤ سم . راسها صغير الجرم . قصير الخلم . عينها زيتانية . صغيرتان .



عورشة القراص

١٨٢٣١ - عُرُوشُ *
Rafie (F). Grapes-stalk (E).
المرئوش والمنشوش هو المنقد انترع عنه .

١٨٢٣٢ - عُرُوشُوط *
Congre commun (F).
سمكة بحرية تدعى زرقونية مبلولة ، اطلية .

١٨٢٣٣ - عُرُوشِيَّات *
Carissées (F).
سبط من فصيلة اللثليات يشمل بعض الاجناس والانواع جميعها جنبا وجنبات فروعها شائكة ، اشهرها الهرم .

١٨٢٣٤ - عُرُون *
Forme cartilagineuse (F).
شكل من الزيدات وهو انتفاخ عظمي قاس يترى المنفعة الجائية من اطرة الحافر .

١٨٢٣٥ - عُرُون *
سَلَةُ زُرَاعِيَّة *
سُتُون *
Onobrychis sativa (S). Sainfoin cultivé, Esparcette, Bourgogne (F). Sainfoin, Holy clover, French grass (E). Echte Esparcette, Hannekammkraut (D). Sanfeno, Sedragola, Crocetta (I).
نبات عشبي علني معمر من فصيلة القترنيات اققرانية . جذوره وندية قوية تنمو في الارض من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . سوله مخنجة جفوة تطول من ٥٠ الى ٧٥ سم . اوراقه متعاقبة مركبة ، وريقاتها بيضية الشكل كثيرة العدد . انجاده منبيلة التجميع ، عوروية الارتكاز او تاجية ، مستطيلة الزناد ، ودية اللون ، مستحبة العرف ، مشرقة الرقيق يحرسها النحل ، ثماره زروق مغلطة خنطية اللون ، بارزة الزراكش ، عجنة الاطراف ، لا تحافظ طاقها الابائية اكثر من سنتين || وهو من النباتات التي تجود في جميع الاثرية ولا تخفى سوى الرملية الماددة الانساج .

علفه غزير اللادة ، جيد الصنف ، يحسن الدو ويؤيد فيه نسبة البنية .
١٨٢٣٦ - عُرُونُ الْفَت *
سَلَةُ عُرُونُ البليك ،
سِنُ الْعُجُوز *
Onobrychis cristagalli (S). Sainfoin crête de coq, Hérisson (F). Cock's head, Medick vetch (E). Hahnenkamm (D). Cresta di gallo (I).
نوع آخر من اللرن وهو من النباتات المغلية الحولية التي تنحش مرة واحدة . سنباله الزهرية صلبة القدر ، حريفية الشكل ، مستطيلة الزناد ، بزره خنطية اللون العباب ، كثيرة التماريع والزراكش البارزة || يجود في جميع الاثرية ولا يخفى الزراعة العذبة .

١٨٢٣٧ - عُرُونُاس *
عُرُونُاس *
طائر كالحامة لا اشهر به حتى يطير من تحت تشميك فيفزك . هو انتفاخ ، اطلية .

١٨٢٣٨ - عُرُونُاسِيَّات *
Cracidae (S). Cracidés (F). Cracidae (E).
فصيلة طير من رتبة الدجاجيات ، اجناسها خمسة طيورها متوسطة الحجم ، مستطيلة الشكل ، قوية المنقار الاسجن ، قزعية الرأس ، مستورة الاجنسة ، مستطيلة الذيل . اجناسها المشهورة ثلاثة المنقار والغزان واشكس .

١٨٢٣٩ - عُرُونُكَّة *
Télotisme (F). Yelotism (E).
المرئكة حالة الصلبة رمداء في العضو الفجج .

١٨٢٥٦ - **عُرُوسَاتُ البَيْضِ** *Gymnogyne* (F).
Gymnogynous (E).
 نعت ترميضي يطلق في علم النبات على كل زهرة عريانة للبعض.

١٨٢٥٧ - **عُورِيَانَات** *Pterotracheidae* (S).
Ptéotrachéides (F). *Pterotracheidae* (E).
 فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الأرجل . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها بيضاء ، اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || معظم انواعها عديم الصفد والتقليل منها يحمل أصدافاً تلتصق بالاشياء || اعرف اجناسها واشهرها المرمانة والشفارة والفردولة والنبله .

١٨٢٥٨ - **عُرُويَانَاتُ الأَسْكَان** *Gymnodontes*
 مرتبة اسماك من الطغليات تنتمي الى رتبة ملحوبات الفك . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة تجمعها فصيلتان الفصميات والفتقيات .

١٨٢٥٩ - **عُرُويَانَاتُ البُورُور** *Gymnospermes* (F).
Gymnospermes (E).
 احد قسمي باديات الزهر في النبات .

١٨٢٦٠ - **عُرُويَانَاتُ الخَيْشُوم** *Nudibranches* (F).
Nudibranchiotes (E).
 صف حيوانات من الرخويات المدلية .

١٨٢٦١ - **عُرُويَانَة** *Pterotrachea* (S).
Ptéotrachée, Firole (F).
 جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الأرجل وفصيلة المرمانات ، انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة ، يكثر وجودها في بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || اجسامها عريانة مستطيلة هلامية شفافة تنتهي بأذناب مغارة الطول دقيقة الاطراف . زعانفها صغيرة وثرية التجميع ، افواهها خشبية ، خياشيمها قريبة الانضمام تلاصق القلوب في مجموعة واحدة مركزة تحت البطن .

١٨٢٦٢ - **عُرُويَانَة كَيْسُ البُورُغ** *Gymnosporange*
 هي الفطور الطفيلية التي لا ينفذ اكياسها بوطها ششاء او لحاف .

١٨٢٦٣ - **عُورِيَزَة** *Imperata* (S). *Impérato* (F).
 جنس نباتات عشبية ، بيرة ، مرغوة ، من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد الحارة من العالم القديم || جميع انواعها عشبية . عصفها ضيق ، متوسط الطول ، سنابلها مركبة ، صغيرة .

١٨٢٦٤ - **عُرُوس** *Ctenolabrus* (S).
Céénolabre (F). *Ctenolabrus* (E).
 جنس اسماك بحرية من شالكات الزعانف وفصيلة الكيديات انواعها المعروفة قليلة ، جميعها صغيرة القد . اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة والباردة . ومنها نوعان مسرحها البحر الابيض المتوسط .

١٨٢٦٥ - **عُرُوسُ سَوَّسِي** *Ctenolabrus iris* (S).
Céénolabre iris (F). *Ctenolabrus iris* (E).
 سمكة من العريس اعطائها بعض مناطق البحر الابيض

زبانها خيطيان . ملمسها دقيقان . مرشفها مثل الجرم . جوشها ونبها الى التي الاسفح الموجح || رواشتها الى البيضاء النماحي يعلو تيجح وزركشة متاخلة الاربد والاصفر والاملح القفي || لها جبل واحد في الحول . تظهر الغرافة في اباد وتبقى حتى آب . قسرح في التبار || الانثى تصح للكن مهادياً على الصفحات العليا من مصال الارواق || الطور الاسويح يستمر نحو ٢٨ يوماً ولسرة مت بلونها الاذواك اتام طول من ١٢ الى ١٤ سم . جسمها اسطواني الشكل ، اغبر اللون ، اسمر الموجح ، طولها ثلاثة صفوف قاطبة من الحلب القصير رأسها جويي اللون . رواجاها البطنية مجهزة بكلايب صغيرة حادة الاطراف || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يقتضي شمن صلابة تحت الحلب تسجيها السرعة بين طيات الارواق المفتوحة .

١٨٢٦٩ - **عُرُوقُ الصَّبَاغِينَ** * ، **عُرُوقُ صَفَر** ، **بُكْلَة الخطاطيف** ، **مِيرَان**

Chelidonium majus (S). *Grande chélideine, Eclair, Herbe aux hirondelles* (F). *Celandine, Swallow-wort, Greater celandine* (E). *Gemeines Schellkraut, Schölkraut* (D). *Chelidonia majagra, Celandina, Erba nocta* (I).
 نبات عشبي بري معمر من فصيلة الخشخشيات . اوراقه مركبة مفردة بحرية اللون . ازهاره كبيرة القد ، طويلة الزناد ، لونها الى الصفار الزاهي || يكثر وجوده قرب البوت الريفية وفي السياجات . صصاره لينة كايوة صفراء اللون تقضي على التناول . يعين من اوراقه عند فركها رائحة لاذعة تاحض بالانف والمخ . ويستخرج منه صباغ اصفر مرغوب فيه .

١٨٢٥٠ - **عُرُويَات** *Graphiolaceae* (S).
Graphiolacées (F). *Graphiolaceae* (E).
 فصيلة الفطور الثرية من رتبة التعاليات . تتميز بعضها الوحيد الخلية ، اما بعضها فتتالي الجيلة شعبي الانقسام .
 ١٨٢٥١ - **عُرُويَات** *Inerne* (F). *Thornless* (E).
 نعت ترميضي تصف به الاعضاء النباتية العادة للشوك والزشب .

١٨٢٥٢ - **عُرُويَانُ الجِسْم** *Gymnosome* (F).
Gymnosomate (E).
 نعت ترميضي يطلق في علم الحيوان على كل جسم عديم الكساء .

١٨٢٥٣ - **عُرُويَانُ الجِلْد** *Gymnodermata*.
Gymnodermes (F). *Gymnodermous* (E).
 نعت ترميضي يطلق في علم الاحياء على كل حيوان مكشوف الجلد .

١٨٢٥٤ - **عُرُويَانُ اللَّيْلِ** *Gymnure* (F).
 نعت ترميضي يطلق في علم الحيوان على كل ذيل عديم الورب او الحلب او الحراشف .

١٨٢٥٥ - **عُرُويَانُ السَّاق** *Gymnocaula* (F).
Gymnocaulous (E).
 نعت ترميضي يطلق في علم النبات على كل ساق عديمة الارواق .



عُرُوقُ الصَّبَاغِينَ

1876١ - عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ *
Anarrichus lupus (S).

Anarrichus, An. loup (F).

سمكة بحرية يمرض من شائكات الزعانف وفصيلة الجحشريات
محبها المناطق الباردة والمحتلة الحارة من المحيط الاطلسي .
قليل تقرب من المحاذير . اسرابها متوسطة العدد ١١ جسمها
شبه اهليجي الشكل ، كبير القند ، بطول نحو ١٤٠ سم .
رأسها انطس . شفها وجب الانفراج . اسنانها كبيرة
جادة الاطراف . عيناها صغرتان مائتان . جلدها عادم
السفح مسطح . زعنفتها الظهرية مسطوية قاذية .
زعنفتها الذيلية صغيرة بحدية الطرف ١١ ثوبها الى الخصار
البحري القاتع يملو بتجمل معرض اسم تشد حمرة في
الرأس وأعلى الظهر ١١ لحمها جيد الصنف ويطبخها مرغوب
فيه .

1876٧ - عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ *
Antre du lion (F). Lion's den (E).

البرين والعريضة : مأوى الاسد .

1876٨ - عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ *
Euphonus (S).

Euphone (F). Euphonus (E).

جنس طير من فصيلة الشتريرات . انواعه المعروفة نحو
٢٤ جميعها من طيور امريكة الوسط والجنوبية . تألف
القابات والحراج . نظامها الحياتي جماعي . اسرابها متغايرة
العدد ١١ اجسامها صغيرة القند ، عيناها ، بطول من ١٢
الى ١٦ سم . مناقبها مخروطية صغيرة . اجنحتها معتدلة
الحجم . اذناها متوسطة القند ، مقطوعة الاطراف . اسرابها
معتدلة . اصابعها صغيرة . اوتارها جملة الالوان الساحلة
يكثر فيها الازرق والاصفر ١١ تتميز بكثرة تغريدها
المستحب الانعام . جميعها تميل على التلألؤ الليلية والياور .
اغلاظها رضية . منظر انواعها يألف القنفص ويحب التعزيب ١١
تكثر اعشاشها في الاشجار الغناء المعتدلة الارتفاع من سطح
الترية . اناتها تنفع من ٤ الى ٥ يفتاح تحضنها بتناوبة
الذكور نحو ١٤ يوما .

1876٩ - عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ *
Esacus (S). Esaque (F).

طائر من طوال الساق وفصيلة الرزترقيات . يتميز بجمته
وبسرعة عده . موطنه مناطق الهند والافان وايران . يألف
المتنوع والقيعان ويطاف الانهر وكثبان القرب . ملجئه
الحياتي جماعي . جماعته قليلة العدد . قوته الحشرات
والديدان والسماعيص ١١ جسمه بطول نحو ٢٨ سم . يتميز
بكبر مقناده المركب من جزين ، جزء فضوري يمتد من
القاعدة حتى ثلثي المتقاد وجزء قربي يكون الثلث الاخير .
جناحه ذلق الطرف يلسف الذنب . ذنبه مخروطي الشكل ،
قصير . ثوبه الملوي الى الزبداء السمر يملوها مواج اسود .
رأسه اشد حمرة من رده . عيناها مملوءتان بقط ابيض يمتد
كالجانب حتى القنف . زورده وانفكه الى الثيرة . عده
ويطه الى الشبهة . مقناده وساقاه الى الكهبة السمر .

187٨٠ - عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ *
Rectrices caudales (F).

Caudal tail-feathers (E).

المرلاان : الريشان اللتان في طرف ذنب النعاب .

187٨١ - عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ *
Ferne (F). Farm (E).

العزبة كلمة مصرية ترادف مزورة . والمزورة هي كل
ارض زراعية موصوفة المحذور يستقرها صاحبها او يؤجرها
بقد .

المتوسط اخصها المناطق الثالية ١١ جسمها صغير القند
بطول نحو ١٣ سم . ثوبها الى الحمر الزاهية . زعنفتها
سود ١١ لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

187٦٦ - عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ *
Ctenolabrus

rupestris (S). Ctenolabrus des rochers, Ronqué (F).
Ctenolabrus rupestris (E).

سمكة بحرية يمرض من الرئيس . اصطنابها معظم اقالم البحر
الايض المتوسط . سرجهها حشاش المحاذير والنفقات ١١
جسمها اهليجي الشكل . معتدل التبيط . بطول نحو
١٥ سم . ثوبها الى الصبهة الوردية يملوها مواج اخضر
وشررة غسوط حنطية قاذية . رأسها مخروطي الشكل ، مدبب
الخطم . فكها صغيران . شفها قليل الانفراج . عيناها
كبيرتان . زعنفتها الظهرية مسطوية الشكل ، لامتسارية
الارتفاع . زعنفتها الذيلية مقنونة الطرف ١١ لحمها متوسط
الصنف ، مأكول .

187٦٧ - عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ *
Platyphylle (F).

Platyphylous (E).

187٦٨ - عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ *
Platypétale (F).

Platypetaleous (E).

187٦٩ - عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ *
Plathelminches, Placodes.

Vers plats (F). Platyhelminches, Platyhelminches (E).

شعبة الديدان الراض . تشمل ثلاث رتب : الشريطيات
والملقحات والمهزئات .

187٧٠ - عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ *
Pétition (F).

Petition (E).

كتاب رفع الى السلطات العامة يعرض فيه رأيا او طلبا
او شكوى .

187٧١ - عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ *
Platygastra (F).

جنس حشرات مفيدة من عشائيات الاجنحة تعيش يرقاتها
على اساريع بعض الحشرات المضره تنسبها .

187٧٢ - عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ *
Testacelle (F). Snail-slug (E).

تدعى في لبنان و بزاز حريان و جنس دويبات من فصيلة
المريطيات . انواعها قليلة العدد ، اصطنابها حوض البحر
المتوسط . وهي من الدويبات النافعة المفترسة التي تلهم
الديدان على اختلاف انواعها .

187٧٣ - عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ *
Testacellidae (S).

Testacellidae (E).

فصيلة دويبات من الرخويات المديدات الارجل الزنوية
الشبيهة . اجناسها وانواعها عديدة . اشهرها العربية .

187٧٤ - عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ *
عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ * هو الساهر . اطله .

187٧٥ - عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ *
Platycurus (S). Platycurus (F).

جنس حشرات كبيرة القند من مفدمات الاجنحة . انواعها
عديدة . اصطنابها اجزاء البلاد المعتدلة الحارة . اجسامها
غلظقة ، قرونها الاستثنائية صفحية الشكل ، اوتارها
الى السواد الباتم الاسفح للمواج ١١ يرقاتها تركب اوراق
الاشجار الحرجية تقطنها .



عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ



مريلة



عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ



عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ



عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ



عَرِيضٌ صَخْرِيٌّ

يألف الثنايات ويقترّب من الاماكن الآلهة ولا يتمدى على الانسان. ملجته الحياثي زوجي || جسمه اهيف الذلوم رشيها ، يطول نحو ١٧٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٩٠ سم. رأسه صغير الجرم. اذناه صغيرتان ، مستديرتان ، عيناها صغيرتان. سباله كثيفة مستطيلة. فروته قصيرة الثوب. ثوبه الى الصحرة الحمراء المواج يسبق في الظهر ويذوق في الصدر والبطن. ويحصل غدة ادرية المركزة تفرز مادة كريمة الرائحة. الانثى انتج ثوباً من الذكر || يتسلق الاشجار غنفة ويعدو على الارض بسرعة. قوته الطير والمناظر وكل ما استطاع اليه من الحيوان.

١٨٢٩٨ - عسّاكة كبيرة *

Leucospis gigas (S). *Leucospis géant* (F). حشرة من العساكيات كبيرة القد. موطنها بعض انظار البلاد الحارة والمشمسة نحو المعتدلة || جسمها مستطيل الشكل ، متق الجوشن ، يطول نحو ١٥ سم. ثوبها الى السواد اللامع تملو غطوط عريضة صفراء كبريتية المواج رأسها شبه مخروطي الشكل ، زباناها خيطيان ، قوائمها مستطيلة. سنتها الطنايب. اجنتها غشائية ، غشقة ، قليلة العروق والاعصاب. اشترها مستطيلة ، منقطة تسفر عند الاستراحة في اشدود يقطب الظهر حتى الجوشن || تنطفل على الزناوير والزرافات فترز اشترها في جهول الحشاء مها كان صلباً ومتمتع المكان في البدا وعليا.

١٨٢٩٩ - عسّاكيات *

Leucospidae (S). *Leucospidae* (F). فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المضمورة. انواعها عديدة جميعها نائمة تنطفل على الحشرات الضارة من ذوات الجناحين || حشراتها متوسطة القد وكبيرة تطول من ٧ الى ١٥ سم. اجسامها غشقة ملونة. رؤوسها مخروطية. زباناها خيطية. قوائمها طويلة. سنتها الطنايب. مرزاتها مستطيلة ، حادة منقطة نحو الظهر عند الاستراحة || اشهر انواعها العسّاكة الكبيرة.

١٨٣٠٠ - عسّالة

هي غشقة النحل ، اطليها.

١٨٣٠١ - عسّاكة *

Morphogenèse (F). *Morphogenesis* (E). العسامة مجموعة النمليس التي تتحد وتتحكم شكل النج والاعضاء في كل جسم حي منذ ابتداء تطويرة.

١٨٣٠٢ - عسّب

هو الابرور العطر ، اطليها.

١٨٣٠٣ - عسّب

Sperme du chameau (F). *Sperm of the camel* (E). شلخ النحل من الابل.

١٨٣٠٤ - عسّب ، عسّب

هو في النبات اقرّ الذي يتحمل بجميع صفات الضرب المثالية المطولة.

١٨٣٠٥ - عسبار *

Proteles cristatus (S). *Protèle à crête, Loup fouisseur* (F). *Aard-wolf* (E).

حيوان من اللوامس وجبه الجنس والوجه يشبه الضبع المخدعة لكنه اصفر منها جثة واحمر ثوباً وأغشن صوفاً. اصطنه البلاد الافريقية ، يسرح في الليل ، قوته الجيف وكل ما استطاع اليه سيلاً من صابر الحيوان والطير.

١٨٢٩٧ - عزّة

Bichette (F). *Little hind, Young hind* (E). هي بنت الطليعة حتى افتراقها عن امها.

١٨٢٩٨ - عزّور ، عزّير

الزور واليزر : هو ثمن الكلا به الحصيد. تقول : حل اخذت عزّير هذا الحصيد اي حل اخذت ثمن مرادها.

١٨٢٩٥ - عزّور

Terra compacta (F). *Compact soil* (E). التبرز : الارض السليبة الرمية السيل.

١٨٢٩٦ - عزّف

هو الحمام الطوراني ، اطليها.

١٨٢٩٧ - عزّق

Sarclage (F). *Weeding* (E). سرت القشرة الطمعية من القرية بالمرق الآلي او اليدوي وذلك لتنظيف التربة باقتلاع الاعشاب الضارة ولتخريب انايب الاستحلاب نملاً لتبشر الماء.

١٨٢٩٨ - عزّك

Isolément (F). *Separately, isolation* (E). فصل الحيوان المريض عن السليم.

١٨٢٩٩ - عزّك من الرصاية

Destitution de la tutele (F). *Dismisal of the tutelage* (E). تجريد الوصي من مهمة الرصاية التي استندت اليه.

١٨٢٩٠ - عزّمة *

Energide (F). *Energid* (E). التربة محيط غليوي يشتمل على نواة وينملقة زكينة فتعمل بتوجيهها.

١٨٢٩١ - عزهيل

Pigeon mâle (F). *Pigeon male* (E). الذكر من الحمام.

١٨٢٩٢ - عزّو

Imputabilité (F). *Imputability* (E). هو القول بان فلاناً لعل فلة مينة مادياً وادبياً.

١٨٢٩٣ - عزّوق

الزوق : عمل الفتق القادم اللب وهو دياغ.

١٨٢٩٤ - عزّيرب

راجع نشة وجيرة.

١٨٢٩٥ - عزّيزّاه

هي الجشّة ، اطليها.

١٨٢٩٦ - عزّيم *

Azime (S). *Azime* (F). جنس نباتات برية وتزيتية مسمرة من فصيلة الثنايات. انزاعه المعروفة عديدة منها المناطق الاستوائية من البلاد الاسودية والافريقية || سوقها سريعة او ملتفة. اورثاقها متقابلة. نضالها اهلبيجة الشكل ، جميلة الخضار اللامس. انزاعها ابطي وهامس الاوتكساز ، عقودي التبيج. انزاعها صغيرة يضاء اللون او وردية ، عطرية العرف الخالط.

١٨٢٩٧ - عسّاس *

Cryptoprocta ferox (S). *Cryptoprocta féroce, Foussa* (F).

حيوان لاسم مفترس من فصيلة السنوريات. موطنه جزيرة مفسكر. يعتبر اكبر غزاري الجزيرة. مسرعه جدوي.



عزيم



عاس



عسّاكة كبيرة



عسبار

١٨٣١٢ - عَسْطُون * Phyllotachys (S).

Bambou (F), Bamboo (E).

جنس نباتات قصية بزية وزراعية من عائلة الخيزرانيات وصليبة التيجليات. أنزاهه عديدة ترقب في الأترية القليلة الانتساج ، الميعة النور ، المقوية ، الثبالية ، الرطبة . أشهرها ما يتبع .



صبر

١٨٣١٣ - عَسْطُون أسود

Phyllotachys nigra (S), Bambou noir (F), Black bamboo (E), Japanese Blattsähre (D), Bambie nero (I).

نوع من السطوس يطول من المترين إلى السبعة أمتار . سته بكاملها مع سلاسلها وصبرها إلى السواد اللامع . أوراقه تطول من ٥ إلى ١٢ سم . وتعرض من ١ إلى ٢ سم . نصلها مائل للصفحة العليا ، أزغب السفلى ، مهبب الحافة . يتبر من النباتات البروية القليلة المتطلبات . يفضل الأترية الخفيفة الرطبة .

١٨٣١٤ - عَسْطُون أصفر

Phyllotachys aurea (S), Bambou doré, B. jaune (F), Yellow bamboo (E), Gelbe Blattsähre (D), Bambie giallo (I).

نوع من السطوس يطول من ٤ إلى ٥ أمتار . سلاسله مقنطرة قصيرة ، صبره بارزة مقنطرة . انزاده حديثة ، دقيقة ، متشعبة . أوراقه تطول من ٧ إلى ١٤ سم . نصلها مسن الحافة ، مائل للصفحة العليا خلي السفلى ٥ وهو نبات سبروتي يعيش ويمجد في جميع الأترية .



صبرية مرققة

١٨٣١٥ - عَسْطُون بنفسجي

Phyllotachys violaceus (S), Bambou violacé (F).

نوع من السطوس يطول من الثلاثة إلى الست أمتار . سته بكاملها بنفسجية اللون . أوراقه تطول من ٥ إلى ١٨ سم . وتعرض من ٣ سم . نصلها مسن الحافة ٥ زراعتو تتطلب بعض العناية . يرغب في الأترية المعتدلة الانتساج والرطوبة . الزائرة المواد القشوية .

١٨٣١٦ - عَسْطُون يَهْشِي

Phyllotachys ruscifolia (S), Bambou petit-houx (F).

نوع من السطوس يطول من ٤٠ إلى ٩٠ سم . سلاسله تبو خضراء اللون ثم تصفر . أوراقه تطول من ٦ إلى ١٠ سم وتعرض من ٣ إلى ٥ سم . نصلها مستدير القاعدية ، ذاتي القممسة . وهو نبات سبروتي يمجد في جميع الأترية القليلة والمتوسطة الانتساج .

١٨٣١٧ - عَسْطُون زَبَرْجَكِي

Phyllotachys viridiglaucens (S), Bambou vert glaucescent (F).

نوع من السطوس ، يطول من ٦ إلى ٦ أمتار . سلاسله متوسطة الطول ، خضراء اللون . صبره بارز أسود . أوراقه تطول من ٨ إلى ١٢ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصلها أخضر الصفحة العليا خلي السفلى ٥ وهو نبات سبروتي ، زراعتو كثيرة الانتشار لكنه يخشى الجفاف .



عسطن

١٨٣١٨ - عَسْطُون كَسْتِيلُون

Phyllotachys castillon (S), Bambou de Castillon (F).

نوع من السطوس ، يطول من ٣ إلى ٥ أمتار . سلاسله متعاقبة الخضرة والصفرة . أوراقه تطول من ٨ إلى ١٤ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصلها منشري الحافة متوضع أصغر وودي ٥ يتبر من النباتات البروية التي تمجد في جميع الأترية الممكن ردها .

١٨٣٠٦ - عُشْبَر ، عُشْبُون Chien-loup (F).

Wolf-dog (F).

سلالة من الكلاب تميز ببطها وبقابليتها إلى اقتباس ما يطلب منها .

١٨٣٠٧ - عَسْبِق Pileostegia (S), Pileostégia (F).

جنس جنباوت كريدية معمرة من فصيلة السقرسيات ، أنزاهه قليلة البد ، سوقيها زرجونية تطول من ١٠٠ إلى ٢٥٠ سم . أوراقها كاملة أليفة ستانية النصل الجملة الصفعة وهي حاضرة مرة تداوي بها الجراحات . أنزاهها صيرلانية التسجيع ، يفضاه اللون . سلاسلها غيبية الشكل بارزة ٥ أنزاهه يستمر طوال الصيف .

١٨٣٠٨ - عَسْبَجَد هو الذهب ، أطله .

١٨٣٠٩ - عَسَد هو البهر ، أطله .

١٨٣١٠ - عَسْرَاب * Butalis grisola (S).

Butalis gris (F), Brown fly-catcher (E).

طائر من الفصاير من فصيلة المغنايات . موطنه جميع المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الأدنى وأروبة . يألف جميع الأماكن القريبة من الماء ٥ جسمه صغير القد يطول نحو ١٥ سم . ثوبه العلوي إلى الرتبة . جبهته ورأسه مرقشان بالأسود . ويعمل في جناحه بعض التسجيع الأبيض . ثوبه السفلي إلى الأبيض الأخر . منقعه وصدره وأبطاه مرققة بالأسود . منقده وحفة صبه إلى السواد الخاك . ساقاه وأصابعه إلى السمرة السوداء . ثوب الأني عادم التسجيع في الجناح ٥ طيرانه خفيف الحركة رشيقا . ويتنقل على الأرض بلباقة . قوته الحشرات من الذباب إلى الفراش والياسيب ولا ينف عن اللار الشبية اليانعة ٥ يدفن حبه بين الأعشاب . الاثني تضع في أوائل حزيران من ٤ إلى ٥ يعضات متعشبا متناوبة الذكر نحو ١٤ يوما .

١٨٣١١ - عَسْرُوبَة مَعْرَكَة *

Notodonta ziczac (S), Notodonta zigzag, Zigzag,

Bois veiné (F), Notodonta ziczac (E).

حشرة من فصيلة الشوسليات ورتبة حشرغيات الاجنحة . موطنها معظم الاصقاع المعتدلة الحارة من الشرق الأوسط والأردن . فراشها واطمه قويا رقيق الانسار . سرقتها تعيش على أوراق الخور والصفصاف ٥ جسمها معتدل القد يطول نحو ١٥ سم . بطليها نحو ١٢-١٤ مم . رأسها صغير الجرم ، بني اللون . عيناه صغيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، مشطيان بسيطان عند الانثى . جنينها إلى البني الخفي الموج بطليها إلى البني الأصفر المواج . وراثها الامانيان إلى الخفي المتفاوت السرة تملوه شمشحات بيضاء ونطوط وعروق سمراء اللون . وراثها الخفيا إلى الأبيض التي المواج . اهدابها حاجية ٥ لها جيلان في الحول . تظهر قراشة الجبل الأول في نيسان وتظهر قراشة الجبل الثاني في تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو اربعة أسابيع وتنتج للكن مبيدات على الصفحات السفلى من نصال الأوراق ٥ السرة تطول نحو ٢١ سم . جسمها مائل انتشار اكبه اللون أسود السمور . مستطيل الرأس ، مستضئ البطن حتى السكة السابعة ثم يضيق تدريجيا حتى الشرح الذي ينتهي برائتين صغيرتين ٥ طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي فمن صلبة تعبكية السرة تحت القشور أو في شقوق الحاء .

١٨٣٢٦ - عُشْطُود * *Asperococcus* (S).

Aspérocoque (F). *Asperococcus* (E).
جنس نباتات بحرية من الخفيات السمر. أنواعه الممرودة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد المعتدلة الحرارة || كلالها صغيرة وقصيرة. أوراقها قلبية، وحلابة التركيب. مراجعها أطوار حاشية تحت امتداد النصال || تعيش على الصخور المغمورة.

١٨٣٢٧ - عُشْطُوك، عُشْطُوك هو الدرة، الملبا.

Chapeau, Péridium (F). *عُشْطُوكَان*
Pileus, Peridium (E). عُشْطُوك الفطر: أعلاه ورأسه.

١٨٣٢٨ - عُشْطُوكُونَة * *Escallonia* (S).

Escallonie (F). *Escallonia* (E).
جنس شجيرات برية وزراعية تزيينية، من فصيلة السفريات. مهدا بلاد الشيلي. سوقها فناء ترتفع من متر إلى ثلاثة أمتار. أوراقها أبيضه ومنتعجة، مسنة الخفاف. أزهارها لاقحياس الشكل والتجميع. أزهارها ملونة || أنواعها الممرودة قليلة، أشهرها التالية.

١٨٣٢٩ - عُشْطُوكُونَة رَاتِنَجِيَّة * *Escallonia ilinita* (S).

Escallonie résineuse (F).
نوع من المسكولة، ساقها تملو من مترين إلى ثلاثة أمتار. أوراقها صغيرة تطول نحو ٤ سم. وتعرض نحو ٢ سم. نصالها جلدية، جرداء، مسنة الخفاف، لامعة الخفسار. صفحتها العلل ميمرة اللد الراتنجية. أزهارها بيضاء اللون، محورية الارتكاز، صغيرة القد، قطرها نحو ٨ مم. || تنويرها صيفي.

١٨٣٣٠ - عُشْطُوكُونَة عَفْرَة * *Escallonia pulverulenta* (S).

Escallonie pulvérulente (F).
نوع من المسكولة. ساقها تملو من متر إلى مترين. أوراقها أحليجية، مقلوبة. نصالها خلية البشرة، عفرة. أزهارها صغيرة القد، وريدية اللون أو بيضاء، تجمعا متناوذة طرفية الارتكاز متدلية || تنويرها يستمر طوال شهر تموز.

١٨٣٣١ - عُشْطُودَة دَرَامَة *، أَكْرُوبِيكَا دَرَامَة * *Acronycta leporina* (S).

Acronycta lièvre (F). *Acronycta leporina* (E).
حشرة من فصيلة القشقيات وريدية حشفيات الالاجسة. موطنها بعض اصقاع حوض البحر الأبيض المتوسط. قراشها واسعة قوتها رقيق الأضمار. سرقتها تعيش على أوراق الأشجار الوريفة || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٦ مم. بسطها نحو ٤٠ مم. رأسها كبير الجسم. عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان مستطيلان. جرشها سحري اللون. بطها إلى الزرقة تملوها خسة غسوط متعرجة متعرجة اللون || ورشها الاماميان إلى الزرقة الباهتة بملوها تنقيط اسود وروقة حلالية الشكل. ورشها الخلفيان إلى الأخضر الاصفر الملوخ || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب. ترحب في الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو أربعة أسابيع وتحتسب المكمل لطناء على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرقة تطول نحو ٣٠ مم. جسمها اسطواني الشكل، مائل

١٨٣٢٩ - عُشْطُوس مَأْكُول *Phyllostachys mitis* (S).

Bambou comestible (F).
نوع من العسوط، يملو من ٨ إلى ١٢ م. قطر ساقه يراوح من ٥ إلى ٧ سم. سلامياته مستطيلة صفراء اللون. أوراقه تطول من ٨ إلى ٩ سم. وتعرض نحو ٢ سم. نصالها اخضر الصفحة العليا، أزرق السفلى. اماليجه الفتية مأكولة تستعمل استبدال الخليون || يرغب في الأربة الدبالية للتوسلة الاندماج والرطوبة.

١٨٣٣٠ - عُشْطُوس مَعْلَع *Phyllostachys narmorea* (S).

Bambou marbré (F).
نوع من العسوط، يملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ م. سلامياته تنقيجية مشوكة بالرمادي. أوراقه تطول من ٧ إلى ١٢ سم. وتعرض من ١ إلى ٢ سم. نصلها حاكق الخفسار يملو تنقيج غير باهت || يرغب في الأربة الرملية أو القليلة الاندماج الفتية الرملية.

١٨٣٣١ - عُشْطُوس * *Isotoma* (S).

Isotoma (F). *Isotoma* (E).
جنس حشرات قافزة دامت من فصيلة العسوطيات. أنواعه الممرودة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ إلى ٤ مم. ألوانها سوية اللون منها الاسود والافضر والاطحل. رؤوسها نضجة، بطرها أحليجية الشكل، ميمرة الحلب. جهازها القفزي نشيط || أشهر أنواعه العسوط الاخضر (*Isotoma viridis*) الذي يكثر وجوده على الطحالب ونحشها.

١٨٣٣٢ - عُشْطُوسِيَّات * *Isotomidae* (S).

Isotomides (F). *Isotomides* (E).
فصيلة حشرات قافزة، دامت وقارضة من وربة الكهديات. اجناسها وأنواعها الممرودة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة تطول من ١ إلى ٤ مم. رؤوسها شبه بيضية الشوزن. افكها وتأثيرها لاطة. ميمرتها رقيقة. قرونها الاستشعارية قصيرة، رباعية الفصل. صورهها ثلاثية الحلقفات. تتميز بقصر مقدم الجوشن المدام الحلب. بطونها سداسية السكر مجهزة بجهاز قفزي نشيط. مكانها ثنائية أو ثلاثية الانسان. قواشها قصيرة تنتهي باظافر محجمة حادة || أشهر اجناسها العسوط.

١٨٣٣٣ - عُشْطَار * *Eschara* (S).

Eschère (F). *Eschara* (E).
جنس حيوانات طليعية من فصيلة المسقاريات. أنواعه الممرودة قليلة العدد منتشرة في أكثر مناطق البحر الأبيض المتوسط || مستعمراتها مغمورة قليلة القور، من ٣٠ إلى ٥٠ م. تحت سطح الماء. جميعها متشعبة منتفذة الحميزات ثنائيتة الطبقات.

١٨٣٣٤ - عُشْطَارِيَّات * *Escharidae* (S).

Escharidés (F). *Escharidae* (E).
فصيلة حيوانات طليعية بحرية اجناسها وأنواعها المماصرة قليلة العدد مملوها يعيش في بحار البلاد المعتدلة الحرارة || تتميز بقواشها الدائرية ويأكلها القديسة المغمورة.

١٨٣٣٥ - عُشْبِيَّة، عُشْبِيَّة *Grappetetta*.

Grappillon (F). *Small bunch of grape* (E).
عشيد صغير منفردا كان أو متصلا بملاق غيره. ج صاب.



عسوط



عشكولة راتنجية



عشودة درامة

انهارها عشودية التجميع . عصارها ساقها تشي من الجرب
وتستعمل في تنظيف الانسجة الصوية .

١٨٣٣٧ - عَسَلِيَّاتُ الْفَنَائِي

Leontice chrysogone (S). *Leontice chrysogone* (F).
نوع من الصلج الطبي البري والبرزي . ساقه تملو
١٥ سم . اوراقه وريشة الشكل ، وريقاتها احليجية ثلاثية
او خنسية التفصيص ، تصلفها بحري اللون . انهاره ال
الضمار النحبي يحلفها شراخ دقيق مسط || انهاره
يصل في ايار .



صفويدة هريلة

١٨٣٣٨ - عَسَلِيَّاتُ الْأَسَد * ، وَاحِدَةُ الْأَسَد ، خَمِيرَةُ الذَّكَرِ ، وَكُف

Leontice leontopetalum (S). *Leontice pied-de-lion*,
L. commun, *Léonore* (F). *Lion's-foot*, *Lion's-turnip*
(E). *Echte Löwenblatt*, *Löwentrapp* (D). *Leontice*
plâ de lions (I).
نوع من الصلج وهو نبات حشبي طوي يري يملو نحو
١٥ سم . اوراقه مركبة ثنائية التلث . وريقاتها بيضية
الشكل ، مقلوبة القاعدة ، مشروطة الطرف . انهاره
صفر اللون . انهاره يحصل في ايار .

١٨٣٣٩ - عَسَلِيَّاتُ الْفَنَائِي

Leontice altaica (S). *Leontice de l'Altaï* (F).
نوع من الصلج البري والبرزي . ساقه موزقة ، تملو
نحو ١٢ سم . اوراقه مركبة وريقاتها احسية الشكل
لا متساوية القد . انهاره كبريتية اللون كيفية التجميع .
انهاره يستمر طوال شهر نيسان .



صلج الاسد

١٨٣٤٠ - عَسَلِيَّاتُ * *Felis pardalis* (S). *Ocelot* (F). *Tiger-cat*, *Leopard-cat* (E).

حيوان لاح مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه شاسع
الاطراف يمتد من امريكا الشمالية الى المكسيك والبرازيل .
يألف الاجراع . ملبته الحياتي رزيمي || جسمه ابيض
القوام رشيقيها يطول من ١٢٥ الى ١٥٠ سم . بما فيه
الذنب الذي يطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . رأسه مستد الجرم .
اذناه صغيرتان ، مستديرتان . عيناه صليتان ، سادتان .
ثوبه الى الصبغة الحمراء المواج يملوها تنير اسود وريشة
سمره وتتشير حنطي . ذنبه عشاري الاطراف السود ||
مسرحه دجوي يستمر من الغروب الى فحة الليل ومن
الغبر الصبيح الى بزوغ الشمس . ينسلق الاجراع بجمفة
السنور ويمدو على الارض بسرعة الجبل . قوته الطير
والايل والقرود والخناثيس والجربان || حبل الاث يوم
نحو ٧٥ ويصا تقص في نهايته من جبروي الى ثلاثة سيرا
تبقى مع والديها نحو ستة اشهر .

الفتار . ثوبا الى الريدة الخضراء تملوها سمة خطوط
مزدوجة ، قاطبة ، جزوية . رأسها الى الجزوة القائمة .
مدها ورواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر
نحو ١٥ يوما يتقضي ضمن صلبة تحببها السرة بين حلاء
الاجبار .

١٨٣٣٩ - سُقُودَة هَرِيْلَة * ، اَكْرُونِيْكَنَّا هَرِيْلَة *

Acronycta strigosa (S). *Acronycta strigosa* (E).
شجرة من فصيلة النسيقيات وريشة حشوات الاجنحة .
مربها الاقالم المحتلة الحارة من الشرق الاسط والاذف
واردية . فرائسها جارسه قنبا رقيق الاطار . سرقها
تدش على اوراق الزعرور والغوخ || جسمها صغير القد ،
هزيل . يطول نحو ١٥ سم . يستلها نحو ٢٩ سم . رأسها
مستد الجرم ثني اللون . عينها كبرتان . زباناها
وجشها . وجشها ويطها الى ثني الاكلت المراج ||
رواشنها عت الشقين الى ثني الاكلت تملوها في الزوج
الاسامي بقعة قاعدة صفراء واخرى ستارية سمره وتخلج
وتنظف وززوة الى ثني الاشقر . وتملوها في الزوج
الخلفي نقطة قاعدة صفراء وبعض الزوزقة السمره .
اهدائها الى الصصرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر
الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل .
تعاظل يمه ظهورها بنحو ستة اسابيع وتفتح الممكن لعدا
على الصفحات السفل من تصال الاوراق || السرة تطول
نحو ٢٢ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالى الفتشار .
ثوبا الى اخفي الاسمر تملوه الحراق بنية . رأسها شديد
السرة اصفر المراج . مدها الى ثني . وراجهها الى السرة
القائمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٥ يوما
يتقضي ضمن صلبة متينة الحبلك تلسجها السرة بين حلاء
الاجبار او تحت القشور الصلفة .

١٨٣٣٤ - عَسَلِيَّاتُ * اَوِي
Miel (F). *Honey* (E).
مادة سكرية يصنعها النحل من رسيق ويشتر الاجراع
والاير والارواق ليصنها ويحفظها في تخاروب سلسة
خامسة ، يصنعها من الشمع وينطها بقشرة رقيقة شفافة
شبيهة المادة تمنع عنها الفساد || اجود العسل طعما ورائحة
ما كانت بجناه الصنوبر والخرام وسمما البان والوسج والليمون
والزير والخلعوق والنفل والسنط || اما متوسط تركيبه
الماضي فهو :

غلوكوز وفليزوز	٧٠ ٪
سكاروز	٥ ٪
ماء	٢٢ ٪
ميت وديسترين	٢ ٪
مواد صمغية ومعدنية	١ ٪

١٨٣٣٥ - عَسَلِيَّاتُ ، نَاجِم *Scion* (F). *Shoot* (E).

الصلج هو القضيبي النامي على العلم قبل بلوغه الحول .
وقد يكون برقا فيضي اذ ذلك تابعا . ج صالح || ويقال
صلجت الشجرة اذا اخبرجت عالجها .

١٨٣٣٦ - عَسَلِيَّاتُ *Leontice* (S). *Léontice*, *Patte de lion* (F). *Leontice*, *Lion's-foot* (E). *Löwenblatt*, *trapp* (D). *Leontice* (I).

جنس نباتات صغولية طية من فصيلة البرباريسيات .
انهاره ٦ ساقها معصرة ، سويقها حولية ، اوراقها مركبة .

١٨٣٤١ - عَسَلُوج *Brindille* (F). *Spig*, *Twig* (E).

قضيبي دقيق قصير املس طوله من ٥ الى ٢٠ سم . ينتهي
غالبا برعمة او ببرام عمرة || والصلوج في العرف الحربي
هو القضيبي الدقيق على الفصن او الفتد .

١٨٣٤٢ - عَسَلِيَّاتُ *Melanthaceae* (S). *Melanthaceae* (E).

فصيلة نباتية من مزدوجيات الفلقة مستقلة الفلقات .
اجنسها وانواعها قليلة العدد جميعها شجيرات وشجيرات
معصرة ابيدة الورق .



سنان

Combrées (F). - عَسِيَّات * ١٨٣٤٩

سبط من فصيلة الأهلبيجات، أشهر نباتاته العس.

Osmylidae (S). - عَسِيَّيَّات * ١٨٣٥٠

Osmylidés (F). Osmylidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة شافرات الأجنحة. أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم أقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || أجناسها متوسطة الحجم، تكثر فيها الاستطالة. | بسطها تراوح من ٣٢ إلى ٤٨ سم. رؤوسها شبه اسطوانية الشكل، عيونها كبيرة جاحضة. | قرونها الاستشعارية غشبية مستطيلة. | أجناسها مزعزعة ومبعدة بالأسمر وهي كبيرة، | لسانها - شبه متساوية بين الزوجين. | جلونها الاستطالة عند الراحة. | جلونها شبه اسطوانية الشكل. | أثوابها مزوقة بالأصفر والأسمر والوردي والأخضر || تألف غلاف مجاري المساء حيث تكثر الاصاب || أثنائها تمتص الحنك على نصال الأوراق. | يرقاتها مفترمة، | قاذبة تمشي في البر وفي الماء || أشهر أجناسها السليل.

Périthéc (F). Perithécium (E). - عَسِيَّ * ١٨٣٥١

هو خلاص الثمرة في الفطر وهو الثمرة الفطرية التي تحسن الاتقاق. ج. إصان.

١٨٣٥٢ - عَسِيَّ * هو الجريس الأصين، أطلقه.

Cire (F). Beeswax (E). - عَسِر * ١٨٣٥٣

هو الشمع النحل.

Lepidodactylus (S). - عَسَوْدَة * ١٨٣٥٤

Lépidodactyle (F).

جنس عظام من فصيلة السدييات. أنواعه ١٠، أجناسها صغيرة القد، طولها يراوح من ٦ إلى ٧ سم. | أثوابها بين الصفار والخضار تملؤها نمشة حمراء أو سوداء. ج. صايد.

Lepidae (S). - عَسَوْدِيَّات * ١٨٣٥٥

Lépides (F). Lepidae (E).

فصيلة حيوانات زسافة من رتبة الظفانيات. أجناسها وأنواعها عديدة جسيما صغيرة القد، رباعية الأبريل، خاسية الأصابع المبططة المحببة || أشهر أجناسها المسودة.

Issus (S). Issé (F). Issus (E). - عَسُوس * ١٨٣٥٦

جنس حشرات ناسفة من فصيلة السوسيات. أنواعها المعروفة متوسطة العدد أعطانها بعض مناطق البلاد الباردة ويعرف مناطق البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم || أجناسها صغيرة القد، مستطيلة الرؤوس، | ناشرة الجباه والعيون، | صغيرة القرون الاستشعارية النحيلة، | مستطيلة القوائم المسننة الشائكة. | أجناسها مستعرضة، | مشبكة، | لائحة، | شفافة. | أثوابها متباينة الألوان، | تكثر فيها السمرة على اختلاف مابناها التي تراوح من الشفافة إلى الحمرة الوردية والخضار الزيتي || قوتها النسخ تمتصه من الأوراق.

١٨٣٥٧ - عَسُوس السِنْدِيَّان

Issus coleoptratus (S). Issé des chânes (F).

شجرة ناسفة من فصيلة السوسيات. جسمها صغير القد، | يطول نحو ٧ م. || رأسها مستطعم، | خطها ذرب.

١٨٣٤٣ - عَسِيَّة * ، زَهْرَةُ الْعَسَل

Melanthus (S). Mélianth, Fleur de miel (F). Melanthus, Honey flower (E). Honigblume (D). Fior di miele, Melianta (I).

جنس ثجيرات ونباتات طبية وزيينية من فصيلة السلييات. | أنواعها قليلة العدد صغيرة القد. | أوراقها متعاقبة مركبة وثرية التجميع. | أزهارها غشوية لا لباسية الشكل، | خاسية | أفضل الانتفاضة، | ولباسية البتلات والاسدية. | لحدية | المياض. | تحارها جردا مفصلة رباعية القريقات، | وهي | فواحة العرف الطري، | غزيرة الرحيق السكري الاسمر اللون الذي يمتص من الخج حلاجات الأمراض الصفرية. | اعرف أنواعها وأشهرها ما يتبع.

١٨٣٤٤ - عَسِيَّة صَغِيرَة * Melanthus minor (S).

Mélianthé mineura (F).

جنية سبروتية صغيرة تملو نحو ١٥٠ سم. | ساقها جوفاء | أوراقها صغيرة القد. | أذنباتها سائبة. | وريقاتها تم ٧ أو ٩ وهي شيقة النصل للمشاري الحافة. | أزهارها عنقودية التجميع، | محورية الارتكاز، | متدلية. | قوتها إلى السمرة الخفيفة يملوها موج اسف || أزهارها يستمر من آب إلى ايلول.

١٨٣٤٥ - عَسِيَّة مُسَدَّدَة

Melanthus comosus (S). Mélianthé chevelu (F).

جنية صغيرة القد تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. | ساقها مسطحة. | أوراقها صغيرة مستعرضة مهدلة. | وريقاتها خطية دقيقة. | أزهارها عنقودية التجميع، | محورية الارتكاز، | متعسبة. | بتلاتها رتقالية اللون، | غصير القاعدة حر التبديع || أزهارها يستمر طوال فصل الحريف.

١٨٣٤٦ - عَسِيَّة مُسَطَّيَة

Melanthus pectinatus (S). Mélianthé pectiné (F).

جنية سبروتية تملو من ١٥٠ إلى ٣٠٠ سم. | ساقها جوفاء جالسة. | أوراقها متوسطة القد. | أذنباتها سائبة. | وريقاتها سائبة النصل، | خلية الصفصعة السفلى قد من ١٣ إلى ٢١. | أزهارها عنقودية التجميع، | تاجية الارتكاز، | أرجوانية اللون || أزهارها يستمر من أواسط آب إلى أواسط تشرين الأول.

١٨٣٤٧ - عَسِيَّة هَرَمِيَّة Melanthus major (S).

Mélianthé majeure, M. pyramidal, Pimpernelle d'Afrique (F).

جنية جاحدة تملو من ١٠٠ إلى ٢٥٠ سم. | ساقها جوفاء متعرجة. | أوراقها كبيرة. | أذنباتها متدعجة. | وريقاتها لائفة تم ١١ أو ١٣ أو ١٥ نصلها مجري اللون بالغ التسنين. | أزهارها عنقودية التجميع، | هرمية الشكل، | تاجية الارتكاز، | لونها إلى الحمرة الباقية || أزهارها يستمر طوال فصل الحريف.

١٨٣٤٨ - عَسَم * Combreum (S).

Combre, Chigomier (F). Vegetable-glus plant (E). Langfaden (D). Combreto, Combrato (I).

جنس نباتات حرجية من السمييات وفصيلة الأهلبيجات. | أنواعها نحو ٨٠ منها الأشجار والشجيرات والأجنيات. | أعطانها البلاد الاستوائية. | قفورها تحوي بعض السواد الصمغية الراتنجية القابضة. | بزورها دعنية يستخرج منها زيت مأكولة.



عسيلة



عس



عسودة

اللون ، غبراء الجدار . تركيب الارواق في دورها النهائي الذي يستيق الاورواق ضغط التسبل وتقل الصفات والانتاج دون ان تسي الى نمو النبات .

١٨٣٦٤ - عُشْبٌ - مُوَكِّنٌ - مُوَكِّنَةٌ

Nid (F), Nest (E).
المش موضع سحن يفسر الطائر يحسمه من دقاق الحطب وتختلف الحشائش والمواد فيدثه في الشجر . وان كان في جبل او عمارة فهو وكر وكن ، اما اذا كان في الارض فهو انحوص وادسي . ج عشاش وعاشش وشفش .



عصبة النبع

١٨٣٦٥ - عُشْبَاوِي الْأَقْسَامِ
Décatoine (F), Decatoine (E).
ما كان مقسوما الى عشرة اجزاء .

١٨٣٦٦ - عُشْبَاوِي الْأَوْجَةِ
Décabre (F), Decahedral, Decahedron (E).
من الحاد ما كان شاري الاربعة او التواحد .

١٨٣٦٧ - عُشْبَاوِي الْعِصَلِ
Décamère (F), Decamère (E).
ما كان مركبا من عشر فصل .

١٨٣٦٨ - عُشْبَاوِيَّات الْأَرْجُلِ
Decapoda (S), Décapodes (F), Decapoda (E).
اسم تعريفي يطلق على القشريات وعلى الرغويات الرأسيات الارابل الرباعيات الخيشوم .

١٨٣٦٩ - عُشْبَاوِيَّةُ الْمِدَقَاتِ
Décagyna (F), Decagyn (E).
من الازهار ما كان وزيمها مؤلف من عشر ملقات .

١٨٣٧٠ - عُشْبَانَةٌ ، زُوغُونِيَّةٌ
Zoogonie (F), Zoogony (E).
المشاة علم يبحث في تطور الحيوان .

١٨٣٧١ - عُشْبَانَةٌ : المشاة : اصل السفة .

١٨٣٧٢ - عُشْبٌ
Essarter (F), To clear, To grub (E).
اقتلع الاعشاب المضرة من التربة .

١٨٣٧٣ - عُشْبِيَّةٌ
Herbe (F), Herb, Grass, Wort (E).
المشقة ج . عشب واعشاب . كل نبات رغو مومي الساق والارواق القادرة .

١٨٣٧٤ - عُشْبِيَّةُ الْاَبْرَاقِ هي البقية ، اطلبها .

١٨٣٧٥ - عُشْبِيَّةُ الْاَبْرَاقِ هي البقية ، اطلبها .

١٨٣٧٦ - عُشْبِيَّةُ الْبَرَاثِيثِ
هي يزو تفلونه ، اطلبها .

١٨٣٧٧ - عُشْبِيَّةُ الْبِلُورِ
هي القنطرة البلورية ، اطلبها .

١٨٣٧٨ - عُشْبِيَّةُ الْبَوَاسِرِ
هي شيشة الطماط ، اطلبها .

١٨٣٧٩ - عُشْبِيَّةُ الْبَوَاسِرِ الْعَمْدَاءِ
هي الحنازيرية العمداء ، اطلبها .

١٨٣٨٠ - عُشْبَةُ الْبَيْكَارِ هي الفسفة ، اطلبها .



عصبة مزوانية

حينها كيرتات . زباناها قصيران ، نحيلون . كوسلها مزواني صغير . حصبها تماثل الكوسل شكلها وكذا . ظهرتها يرمي الشكل ، لاحت ، شارب . بطنها غروطي . قوامها مسنة القنايب الخلفية || ثوبها الى الخطي الاضخم يملوه تشنج كسني في الرأس والكوسل والحففة والثلوران والقوام . بطنها الى الخطي الاسمر || تألف حراج السديان والنفس . قوامها نسخ الاوراق .

١٨٣٥٨ - عَسَوِيَّاتٌ

Isidae (S), Isidés (F), Isidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم || اجسامها صغيرة ، لاقبسية الشكل ، معدلة التطييد . رؤوسها غليظة ، محرمة المقدم . اعظامها ذرية معدلة الطول . كوسلها صغيرة ، شبه هربية الشكل ، جالسة التواحد . اجنحتها مشبكة ، ملونة ، لاسفة . بطونها غروطية الشوزن او سنائية . قوامها قوية ، مستطيلة ، ضليمة القنايب الخلفية المسنة الخلفان الغاربية || انهر اجناسها الموس .

١٨٣٥٩ - عَسُوفٌ

Coré (F).
نمت تعريفي توصف به التبرغ الشديدة السودة .

١٨٣٦٠ - عَسُوبِيَّاتٌ
Eurytomidae (S), Eurytomidae (F), Eurytomidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المتصورة اجناسها وانواعها قليلة العدد منها الناضجة التي تتطفل على الحشرات الضارة ومنها الخاضعة للزوجة التي تتطفل على التيجليات || حشراتا صغيرة القند طول من ٢ الى ٤ مم . اجسامها مستطيلة ، بطونها ضامرة . مزاناتها قصيرة . زباناتها الاغبرة عحرانية الشكل || اشهر انواعها يصوم التيجليات .

١٨٣٦١ - عَسِيلٌ

Verge de l'éléphant (F), Verge of the elephant (E).
النسيل : قضيب الفيل ج . عسل .

١٨٣٦٢ - عَسِيمَةُ النَّبْعِ ، زَائِلَةُ النَّبْعِ

Pseudomonas tabaci (S), Feu sauvage, Feu rouge, Rouille brune (F), Wild fire, Wild fener (E).
وصم يكثيري فتاك سريع المدى يترى في النبع في الماشات وفي الحقل || المائل الازم بكثيري في قضيبية لمطوانية دقيقة ، طولها يراوح من ١٠ الى ٢٠٨٠ ميكرون ورضها من ١٠٠ الى ٧٥٠ ميكرون تحمل في احد ثلبيها ثلاث حديبات سولية يراوح طولها من ٢٠٠ الى ٧٠٠ ميكرون || مظهره الخارجي ، على نصال الاوراق ، يقع مستديرا لا قياسية الحجم تبلو صفراء اللون ثم تتحرف الى السرة وتنتهي باللباس || يكلفه وقتا يتغير تربة الماشات ويظهر البذار بحلول القرمول او بحلول نيزرات القنفة المركز ١ / ١٠٠ على ان لا تفوق مدة تقع البذار في الحقل ١٥ دقيقة .

١٨٣٦٣ - عَسِيمَةُ مَزَوَانِيَّةٌ

Pseudomonas angulata (S), Maladie des taches anguleuses, Feu noir (F), Angular leaf spot, Black fire (E).
وصم يكثيري شديد الوبق قليل الانتشار يركب النبع في الحقل بعد دخوله في البذر الثاني من شمامه || مظهره الخارجي يقع لا قياسية الحجم . مزوانية الشكل ، سوداء

للون، خلية اللحم. اوراقها خاسية أو سباعية الوريقات. نصلها اهليجي الشكل، سن الحافة، خلي البشرة على صفحتيه. ازهارها سباعية اللون، ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٨٣٩٥ - عُشْبَةُ الْقَوَى الصَّخْرِيَّةُ *

Potentilla pulcherrima (S). *Potentilla superba* (F). عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ساقها منتصبة. اوراقها خاسية أو سباعية الوريقات. نصلها ابيض الصفرة السفل، اغضر العليا. ازهارها الى الصغار الزاهي || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

١٨٣٩٦ - عُشْبَةُ الْقَوَى الصُّفْيَةِ *

Potentilla argyrophylla (S). *Potentilla argyrophylla* (F). عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها السفل ثلاثية التركيب، ووريقاتها خلية البشرة، فضية اللون، ناعمة للمس. ازهارها صفراء اللون، قطرها يراوح من ٢ الى ٤ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٨٣٩٧ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْكَبِيرَةِ الرَّوْمِيَّةُ *

Potentilla grandiflora (S). *Potentilla à grandes fleurs* (F). عشبة معمرة مبلولة تملو من ١٥ الى ٤٠ سم. اوراقها مركبة ثلاثية. ووريقاتها مسنة الزام الثالث والرابع. ازهارها غنية التجميع، زنادها يحمل من زهرتين الى خمس كبيرة اللند قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصفرة المابقة للامسة || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

١٨٣٩٨ - عُشْبَةُ الْقَوَى اللَّيْفِيَّةُ *

Potentilla fruticosa (S). *Potentilla frutescens* (F). عشبة ليفة معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها خلية اللحم. طحلاء اللون. اوراقها خاسية أو سباعية الوريقات الاهليلجية الشكل. نصلها خلي البشرة، ناعم للمس، ازهارها ذهنية اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٨٣٩٩ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْمُتَشَبِّهِةُ *

Potentilla ambigua (S). *Potentilla ambigua* (F). عشبة معمرة منتسبة الساق. اوراقها ثلاثية التركيب جامدة النصل. ووريقاتها الوسطى مستطيلة مسنة الزام الاخير. ازهارها فردية، طويلة الزناد، صفراء اللون. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

١٨٤٠٠ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْمُتَشَبِّهِةُ *

Potentilla erecta (S). *Potentilla dressée* (F). عشبة معمرة زبابة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ووريقاتها خاسية مستطيلة، نصلها جامد الصفرة مفرج البشرة السفل. ازهارها الى الصغار الكبريتي الزاهي || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٨٤٠١ - عُشْبَةُ الْقَوَى الرَّوْمِيَّةُ *

Potentilla anserina (S). *Potentilla anserina*, *Herbe aux oies* (F). عشبة طيبة معمرة مبلولة ترطب في المراتع الغليظة الرطبة. تطلو من ١٥ الى ٥٠ سم. ساقها منبسطة تشرش عند كل عقدة. اوراقها ثلاثية الصف المتقابل. ووريقاتها تعد من ١٥ الى ٢٥ نصلها خلي البشرة، فغي المزاج. ازهارها كبيرة اللند قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصغار الكبريتي الباهت || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٨٣٨١ - عُشْبَةُ الْجَبَلِيَّةِ

هي القهرية البلورية، اعلاها.

١٨٣٨٢ - عُشْبَةُ اَنْجَلِيْنُون

هي الخليون، اعلاها.

١٨٣٨٣ - عُشْبَةُ الدِّبَاغِيْن

هي الردل، اعلاها.

١٨٣٨٤ - عُشْبَةُ السَّعْج

نبات من التفة، اعلاها كرد.

١٨٣٨٥ - عُشْبَةُ الطَّحَلِك

هي الطوقرين الاصفر، اعلاها.

١٨٣٨٦ - عُشْبَةُ السَّلَكِي

هي الزغيلة، اعلاها.

١٨٣٨٧ - عُشْبَةُ الْفَقْرَاء

هي حشيشة الفقراء، اعلاها.

١٨٣٨٨ - عُشْبَةُ الْفَحْل

هي الماتن الجبل، اعلاها.

١٨٣٨٩ - عُشْبَةُ الْهَوَكَةِ

Herbe aux écus (F). عشبة يقال انها طيبة قدر البول، تدهى حشيشة القعر الحولية، اعلاها.

١٨٣٩٠ - عُشْبَةُ الْقَوَى ، بُونْتِيْلَا، بُونْتِيْلُون

Potentilla (S). *Potentilla* (F). *Potentilla* (E). جنس نباتات عشبية طيبة مدادة معمرة من القروايات. ازراعها عديدة. اوراقها مركبة، ازهارها منبسطة الزناد، مختلفة التجميع. مظهرها بري وزيتي وبضها طيب يستعمل في عدة مستحضرات وعلجات مقوية || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.

١٨٣٩١ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْاَبْيَكَةِ

Potentilla speciosa (S). *Potentilla élégante* (F). عشبة زغبية معمرة تملو من ١٠ الى ٣٥ سم. اوراقها ثلاثية التركيب. ووريقاتها مفرجة النصل المسن الحافة، الاغضر الصفرة العليا، الخلي السفل الغضبية الملوحة. ازهارها ثلاثية أو خاسية التجميع، متوسلة اللند، يضاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٨٣٩٢ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْبَيْضَاءِ *

Potentilla alba (S). *Potentilla blanche* (F). عشبة معمرة جبلية مبلولة. ساقها تحلة تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها السفل خاسية أو سباعية التركيب. ووريقاتها خلية النصل التام المسن الحافة. ازهارها ثورية التجميع، طويلة الزناد، بظلاها رتقالية التقادة والوسط، ساجية الاطراف || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار.

١٨٣٩٣ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْاَدْمَوِيَّةِ

Potentilla acroanguinea (S). *Potentilla rouge sang*, *P. sanguine* (F). عشبة معمرة زغبية لأعضاف تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ازهارها مكسبة دموية اللون كبيرة اللند قطرها نحو ٤ سم. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

١٨٣٩٤ - عُشْبَةُ الْقَوَى الصَّخْرِيَّةِ *

Potentilla rupestris (S). *Potentille des rochers* (F). عشبة معمرة مبلولة تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. توجد بين الصخور وعلى اطراف الاراضي للمحاسة. ساقها حراة



عشبة القوي البيضاء



عشبة القوي الصفراء



عشبة القوي الفانخرة



عشبة القوي الغضبية



عشبة القوي الوردية

١٨٤٠٢ - عُشْبَةُ الْمُسْك * ، أدوكسا

Adoxa moschatellina (S). Adoxa, Herbe au musc, Muscatella (F). Hollow-root, Muschatel, Musk-root (E). Echtes Bismkraut, Moschus-Kraut (D). Erba del muschio, Muscatella (I).

نبات عشبي طلي، جلومري وحيد الجلس والورع من فصيلة النويات ، أوراقها قرصية الانتشاب ، مركبة ، مستطيلة المالحق المنقبضة ، ثلاثية القصوص ، فصلها مقوس الصفة الحولية البثرة . أزهارها نورية التجميع مستطيلة الزناد ، خاسية البتلات الوردية اللون || جلومري وأوراقها وأزهارها فواحة الرائحة العطرية المسكية وهي طيبة جزيلة التفع مضادة لقتنشح .

١٨٤٠٣ - عُشْبَةُ الْمَن * ، Glyceria (S), Glycérie (F).

جنس نباتات عشبية من فصيلة البنيليات . أزهارها نحو ٣٠ سوقها منقبضة جيوه تنشي بعاكل سائلة . أوراقها صفيية الشكل كآكارق الخطط . منها أنواع حلقية مزروعة غنية بالمواد التسفوية ومنها أنواع منقبضة بألفها لمن السال الذي يقضي ستانها عند انتصاف النهار في أسر ايام الصيف فيترك عليها مادة لزجة سكرية السهم مأكولة .

١٨٤٠٤ - عُشْبَةُ الْحِنْد في السبجل الطبي ، اطليه .

١٨٤٠٥ - عُشْبَةُ بَرِّيَّة في الاراليه القارية ، اطلبا .

١٨٤٠٦ - عُشْبَةُ حَمْرَا في ابو غلام ، اطليه .

١٨٤٠٧ - عُشْبَةُ مَقْدَسَة في القيسون ، اطليه .

١٨٤٠٨ - عُشْبَةُ هِنْدِيَّة في الزيان ، اطليه .

١٨٤٠٩ - عُشْبِي ، حَشِيئِي Herbaceous (F).

تحت تعريتي يطلق على النباتات ذات السوق اللينة التي تكون صلابها دون صلابه النباتات اللغيفيه .

١٨٤١٠ - عُشَّة

المنه : الشجرة النقيضة التفتان المنطرة .

١٨٤١١ - عُشْقَار

Azarta (S). *Azarte*, *Astarté* (F). *Astarco* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرضويات صفيحيات الخياشيم وقصيلة المشاريات . أزهارها المروقة ٢٠ منها النائرة والماصرة . الماصرة منتشرة في جميع بحار البلاد الباردة || اصداها صئيرة ، يكثر فيها الشكل السيولي ، مصاريها متساوية الاطراف ، دقيقة التنسخت الحناري ، ويلوح تحزير طولي نحيل يستمر حتى الفتة . ثنائيا ثنائية ، طليقة ، مستطيلة ، الواها زاهرة ، يكثر فيها الاخر والوردي || تعيش عموية في الرومال المغمورة بالماء .

١٨٤١٢ - عُشْقَارِيَّات

Astartidae (S). *Astartidae* (F). *Astartidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرضويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وأزهارها قليلة العدد ، منها النائرة التي تمتد متصيراتها من الاراضي السيولوية الى الثالثة ومنها الماصرة المنتشرة في جميع بحار البلاد الباردة || امداها صئيرة الحجم ، صيرانية الشكل ، متساوية المصاريع ، دقيقة التنسخت الحناري || اعرف اجناسها وانهرها المشثار .

١٨٤١٣ - عُشْقَرَا

Dianella (S).

Dianella (F). *Dianella* (E).

جنس نباتات عشبية معمرة جادحة من فصيلة الزنبقيات . منها نباتية وبعض مناطق اسرالية . اوربها رادية . اوراقها متقابلة ، ثنائية الصف ، غيبية الشكل ، ابيدة ، خاتمة الاخضرار . ازهارها حنكولي التجميع . ازهارها متدلة الحجم ، سداسية البتلات النبطية النجبة الشكل ، البتنية المروق . سداسية الاسدية المنقبضة الاطراف || تزود للزوين . قريبا في الازرية المتصلة الانساج للوراة العناصر النذائية والصفوية || اشهر انواعها المعروفة الاربية التالية :

١٨٤١٤ - عُشْقَرَا تَسْمَانِيَّة *

Dianella caesantica (S). *Dianella de Tasmanie* (F).

نوع من العشيرة . منها جزيرة تسمانية . تملو من ١٢٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها تطول من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . وتعرض من ٢٠ الى ٣٠ سم . ازهارها حنكولي التجميع ، كبير الله ، كثير الفروع والصب . ازهارها الى الزرة الازرقية . ثمارها عتية ، زرقاء اللون ، متدلة || تنويرها صفي .

١٨٤١٥ - عُشْقَرَا زَرْقَاء *

Dianella caerulea (S).

Dianella bleue (F).

نوع من العشيرة . منها بعض مناطق اسرالية . تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . اوراقها كثيرة العدد . صفيية الشكل ، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . وتعرض من ١٢ الى ١٨ سم . ازهارها حنكولي التجميع قليل الانفراس . قصير الفروع . ازهارها الى الزرة المائجة الجسلة . ثمارها ديبية متدلة || تنويرها يستمر من آذار الى حزيران .

١٨٤١٦ - عُشْقَرَا صَفِيَّة الْوَرَق *

Dianella laevis (S). *Dianella à feuilles lisses* (F).

نوع من العشيرة . منها بعض مناطق اسرالية . تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها صفيية الشكل ، صقيلة النصل ، شديدة الخضار . تطول من ٣٠ الى ٤٥ سم . وتعرض من ١٢ الى ١٨ سم . ازهارها حنكولي التجميع ، هريبي الشكل . ازهارها الى الزرة السابجوية . ثمارها عتية ، ليلكية اللون ، متدلة || تنويرها ديبية .

١٨٤١٧ - عُشْقَرَا مُنْقَطَع الْوَرَق *

Dianella revoluta (S).

Dianella à feuilles enroulées (F).

نوع من العشيرة . منها اسرالية . تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم . اوراقها صفيية الشكل ، جامدة لتسج ، مائلة الخفاف ، ملقعة ، تطول من ٧٠ الى ٨٠ سم . وتعرض من ٦ الى ٨ سم . ازهارها حنكولي التجميع . ازهارها الى الزرة السايوية . ثمارها عتية زرقاء اللون || تنويرها يستمر من محوز الى آب .

Séquelle (F).

Gang, Crew, Set (E).

الشدة ما يحل بالانسان من علة سبها مرض اصابه او عتية جراحية اجريت له .

١٨٤١٩ - عُشْر

Dime (F). *Thie, Dime* (E).

هو جزء من شرة يقطع من انتاج الارض ويضع الى ولي الامر عريية من الارض .



عشبة المسك



عشبة المن



عشيرة تسمانية

الزهرية رجلة مستطيلة || ازهارها يستمر من آب ال
تشرين .

١٨٤٧٨ - عَشَقَة مَبْدُولَة * ، قَسْوَس مُسَلَكِي
Hedera helix (S). Lierre commun (F). Hedera, com-
mon Ivy (E). Gemeiner Eleu, Epheu (D). Edera,
Ellera, Verna, Verola, Vite nera (I).

جنية سروية ليفة متسلقة تطول من ٢ الى ٣٠ م .
اوراقها لا قياسية الشكل ينطب لها الايليجي . مالميق
ازهارها واحدا خلية البشرة طحلاء اللون . ثمارها نوية
تجمل ال السرة المابقة || ازهارها يستمر من ايلول ال
تشرين .

١٨٤٧٩ - عَشْرُوف
Arbre sec (F). Dry tree (E).
الشروخ هو الشجرة اليابسة .

١٨٤٣٠ - عَشْرُوفِيَّات ٥ .
Pyrénomycètes (F).
فصيلة فطور مجهرية تنتمي ال مرتبة الفطريات ورتبة
الزقيات تتميز بمق جانب من النكاسة او يفتانلق بوغ
واحد من الزرق وذلك بعد تمام ادراكه . اما اصنافها
بسيطة وقد تكون فردية او مركبة || اجناسها وانواعها
عديدة يجسمها ثلاث عائل وهي السخليات والسنانيات
والبيبيات .

١٨٤٣١ - عَشِير
Cri de l'hyène (F).
الشعر : صوت الضع .

١٨٤٣٧ - عَشِيق *
Agapornis (S).
Agapornis, Inseparable (F). Love-birds (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من زوائف البهجات . موطنه
يشمل جميع مناطق افريقية الوسطى وجزيرة مدغسكر ||
يألف القفص لكنه لا يعيش الا ذكرا وانثى . تربيته
منتشرة في جميع اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة لانه
يشي البرد || جسمه صغير القد ، ذلق الذنب والجناح
مفاده عريض وقصير . قوته جميل الالوان المتراكبة فوه
الاسمر والاخضر والاصفر || قوته الدخن والقنبر والمفوف
والخس والثار الناصبة || الانثى تلتصق منها في تجويف
جلع . حشيتها تفرز من ٣ الى ٤ بيضات ترخلها نحو
١٥ يوما .

١٨٤٣٣ - عَصَا الدَّهَب
هو قضيب الذهب ، اطله .

١٨٤٣٤ - عَصَا الراعي
Houlette (F). Crook (E).
صا رأسها اجوف كاللمقة يستعملها الراعي لقلع الحجارة .

١٨٤٣٥ - عَصَا الراعي
هي القرد نبات بري وتربي ، اطله .

١٨٤٣٦ - عَصَا الراعي الزَبَاء
هي الدار ، اطله .

١٨٤٣٧ - عَصَا هِرْمِس
هي الحلوب ، اطله .

١٨٤٣٨ - عَصَا يَفُوق
هو القيقوه السبلية ، اطله .

١٨٤٣٩ - عُصَاب ، مَسْوَاك الراعي ، شِسْطَرَج
Lepidium (S). Passerage (F). Ditcander (E). Senf-
kraut (D). Lepidio, Peparella (I).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الصليبيات .

١٨٤٧٠ - عَشْر
Calotropis (S).
Calotrope, Calotropis (F). French cotton, Mudar
plant (E). Wahre mudarplanze (D). Calotrope (I).
جنس نباتات برية طيبة من فصيلة الصقلابيات . انواعه
عديدة منها الاشجار والشجيرات والجنات . لحاء جلورها
مقوية ومروقة . اطرافها الجيزة وبض المناطق الاسيوية
والاثرافية الحارة || جاء عنه في القاموس : « العشر
شجر فيه حراق لم يفتح الناس في اجدو منه ويحش في
الحقاد ويخرج من زهره ريشه سكر وفيه مرارة » . وقال
ابو حنيفة : « العشر من المشاء وهو من كبار الشجر
وله صمغ حلو وهو عريض الورق صمغا في البها وله
سكر يخرج من شبيه ومواقع زهره » . وفي الصالح :
« وقرته نفاضة كنفاعة القناد الاسفر » || الواحدة
عشرة والجمع عشر وعشرات .

١٨٤٧١ - عَشْرُوق
يعرف بابي سلام ، اطله .

١٨٤٧٢ - عَشْرُوكَة
Préfoliation, Vernation (F).
Vernation (E).
هي الترتيب القموي اي انتظام الاوراق داخل البرقة
الورقية .

١٨٤٧٣ - عَشْرُوفِيَّات ٥
Circaceae (S).
Circacées (F). Circaceae (E).
فصيلة نباتية ، كانوا يعتبرونها في التصنيف السابق
كسب من فصيلة الاعدريات ، وفي من ذوات الفلقتين
عديدة الفصائل . اجناسها اربعة وانواعها نحو ٣٦ ||
نباتاتها عشبية ، منها الحولية والعمرة والسمرة ، اطرافها
بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة . اوراقها بسيطة ،
متقابلة او متعاقبة . ازهارها خضوية رباعية الخدر .
ازهارها سبيل التجميع ، تاجي الارتكاز .

١٨٤٧٤ - عَشْرُومِي
Décimal (F). Decimal (E).
نعت تعريفي يطلق على القليات والحسابات المرتكزة على
عشرة .

١٨٤٧٥ - عَشَقَة
Hedera (S). Lierre (F). Ivy (E).
جنس نباتات معمرة من فصيلة الاراليات . انواعها نحو
٦٠ جميعها ليفة خشبية عازلة الخشوية . معظمها بري
وبعضها ذراعي تربي . سوطها تتساق بواسطة اطرافها .
اوراقها متعاقبة معتقة جلدية الصل ايده . ازهارها عذوق
التجميع عذوق او ابلي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد
بيضاء اللون || اوراقها طيبة ويستخرج من سوطها عصارة
صافية مقوية وهيجية || اشهر انواعها التريزية ما لي .

١٨٤٧٦ - عَشَقَة كَلَشِيد
Hedera colchica (S).
Lierre de Colchide (F).
جنية جادسة ليفة متسلقة تطول من ٢٥ الى ٣٥ م . اوراقها
ثلاثية او خماسية التفصيص ، تفصلها بطول نحو ١٢ سم .
ويمرض نحو ١٠ مالميق ازهارها واحدا كثيفة الحراشف
الاصفر اللون || ازهارها يستمر من تموز ال ايلول .

١٨٤٧٧ - عَشَقَة كَنَارِيَّة
Hedera canariensis (S). Lierre des Canaries (F).
جنية سروية ليفة متسلقة تطول من ٣ الى ١٥ م .
اوراقها ثلاثية او خماسية التفصيص ، كبيرة القد ، قلبية
الشكل تعرض من ١٥ الى ٢٠ م مالميق ازهارها واحدا
مشرقية اللحاء ، نجمة الحراشف الطحلاء اللون . عناقيدها



عَشَقَة مَبْدُولَة



عَشِيق



عصاب غرض الورق

18447 - **عُصَابَة مَعْدِيَّة**
Suc gastrique (F).
Gastric juice (F).
سائل حامضي التركيب ، يحوي بعض الصفات والكولوريدات القلوية والمضخات ، يفرزه غشاء المعدة ، يصلح خاصة لغضم المواد الآسية .

18448 - **عُصَابَة مِعْرِيَّة**
Suc intestinal (F).
Intestinal juice (E).
سائل سائفي التركيب وتبلغت ثابتة على الصارة اللدنية في حضم الطعام واستخلاص مواده الغذائية .

18449 - **عُصَابَة نَوْرِيَّة**
Suc nucléaire (F).
Nuclear sap (E).
رأج سائل نووي .

18450 - **عُصَابَة**
Baies, Ecales (F). Shell, Pod (E).
هي مجمر الصفات والصفات التي تغسل عن الحلب عند الدراس .

18451 - **عُصَابَة**
Oaphya (S).
Osphy (F). Osphy (E).



عصاة متوجة

جنس حشرات من فصيلة الثورميتات رتبة غديات الاجنحة . انولها المعروفة تسة منتشرة في جبال البلاد المعتدلة الحرارة || اجناسها مستطلة الشكل ، معتدلة التسطيط ، تطول من ٦ الى ٩ سم . رؤوسها صغيرة ، مستطيلة الاضام . عينها بارزة ، تلتصقها متوسطة القند ، ملاصقا النكية كبيرة . قرونها الاستعارية غريبة ، سنية . كواسلها مقبة الشكل ، بطونها مستديرة الخوض . اعماحها لتحت البطن باستثناء الطرف المستدير . قوائمها نضيفة . تتميز بانفاد قوائمها الخلفية البالغة الضخامة . انولها ملونة || الحشرة الجبلانة واسعة وشاحنة . اما البرقة فشكارة او فاجحة .

18452 - **عُصَابِي**
Scarce pourpré (F).
سكة بحرية تدعى دقة البحر ، عظمها .



عصان

18453 - **عُصَان**
Céblepyris (S).
Céblépyris, Echenilleur (F). Céblepyris (E).
جنس طير من الجواثم وفضيلة المذبذبات . هذه بعض مناطق البلاد الافريقية . انواعه قليلة العدد . قوته الحشرات اعصها الاساريج والبرقات ولا يسف من الثار الناضجة من برية وزراعية || جسمه صغير ، ذنبه رتاجي الریش المستطيل ، الفارق الطرف . بعض ارياش افيئكه جاسدة التركيب مدنية الاطراف الشاذة || ثوبه متباين الالوان . رأسه احمر . عساره الى السرة الباقية . سباله أسود . ظهوره الى الربعة الخلفية الملاج . جناحه الى السواد الاسفم . صدره وبطنه ويؤخر ظهره وقاعدة ذنبه الى الربعة الخلفية المؤشمة بالاسود || يدخن عته في الاشجار الرقيقة . الانثى تحضن نحو اربع بيضات تربيتها ينسحر نحو ثلاثة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤن لها الغذاء .



عصان

18454 - **عُصَابَة**
Immunologie (F).
Immunology (E).

علم يبحث في مقاومة الجهاز العضوي الحي لتضديت الاوصام المختلفة .

18455 - **عُصَابِي**
Immunologique (F).
Immunologic (E).

نمت ترميمي . يلقى عل ما هو يخص بالصامة .

انولمه نحو ٧٠ اطنانها جمع البلاد المعتدلة الحرارة . جهورها وشية مدلة . سرتها دقيقة منتضبة . اوراتها معتمة و متناحية ، نصلها سبك الصفة ، سرح البشرة . ازهارها متكولي التجميع ، طرفي الاوتكان . ازهارها صغيرة القند يبيض اللون او صفراء . ثمارها غريدلية . اشهر انواعه العصاب العريض الورق .

18440 - **عُصَاب غَرَضُ الْوَرَقِ**

Lepidium latifolium (S). Grande passerage, Moutarde des anglais, Cresson à arges feuilles (F).
Pepperwort, Green mustard (E). Pfefferkresse (D).
Lepidio ibride, Erba mostarda (I).

نوع من العصاب وهو عشية برية طيبة مدمرة حيلولة في الاساكن الظليلة الشمية . ساقها تطو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . رواتها قلبية الشكل . ازهارها صفراء اللون . منافها الطيبة كثيرة وهي مضادة لداء الحفر ويقال انها تنفي من الكلب .

18441 - **عُصَابَة ، حَوْت**
Heterodon (S).
Hétéronon (F). Heterodon (E).

جنس سحيات بيوضة من فصيلة الحششيات عداوات الاغادي والصوم . انواعها المعروفة نحو عشرة . اطنانها بعض المناطق الحارة من الماكن القديم والجديد || جميعها صغير القند اطولها تراوح من ٤٥ الى ٥٥ سم . انولها مطوقة او مبلتة او مجذعة بالاسود والجوي والاحمر . رؤوسها شبه مغرطية الشكل و رقيقة الخاطم . اذنانها مستطلة الاطراف || قوتها الحشرات والبرديات والضفادع والظنساء والفتران والنسافير ويبيضها || اعرف انواعها واشهرها العصابة المتوجة .

18442 - **عُصَابَة مُتَوَجَّهَة ، حَوْت مُتَوَجَّه**
Heterodon diadema (S). Hétéronon diadema (F).

نوع من العصابة . موطنها بلاد الجزائر والمغرب . تألف للبراري والادغال . قوتها الحشرات والبرديات والظنساء والفتران || جسمها مطول نحو ٥٥ سم . رأسها شبه مغرطي الشكل . ربيع الخلم . عينها صغيرتان ، ماحتان . ثوبها الى الصبهة يعلوها تمصيب أسود يمتد من الرأس الى طرف الذنب . عصبه رأسها تمتد الى الجبهة فتنبو كالتاج . بطنا الى السرة الخلفية || تعتبر من الحيات المفيدة الاروائية .

18443 - **عُصَادَة ، قَرَابَة**
Consanguinité (F).
Consanguinity (E).

طريقة اصطفاة خاصة باصلاح النسل او بتثيت بعض الصفات الميزة قوتها تساهل الاقارب المنتجة دون مراعاة درجات النقب .

18444 - **عُصَابَة**
Jus (F). Juice (E).
ما عسر من الماء ومخلط الاعضاء النباتية .

18445 - **عُصَابَة التَبِغ**
Jus de tabac (F).
Juice of tobacco (E).

نقيع اوراق التبغ وهو غني بمادة النيكوتين القمصر القلوي الصالح في التبغ . يستعمل في مكافحة الحشرات اعصها الاراق .

18446 - **عُصَابَة خِلْيَوِيَّة**
Suc cellulaire (F).
Cell-sap (E).

Plante volubile (F). **عَصْبَة ، عَصْفَة** - ١٨٤٧٣

Volubile plant, Twining plant (E).

كل نبات عارض يلتف على غيره .

١٨٤٧٤ - **عَصْبَة السوس** هي الكشم ، اطبه .

١٨٤٧٥ - **عَصْبَة القتب**

هي الميطاريقون المعروف ، اطبه .

١٨٤٧٦ - **عَصَبِيَّات الجناح** Neuropters (S).

Névroptéroïdes, Névroptères (F). Neuroptera (E). Netzflügler (D).

طريقة حشرات من شعبة الحسدليات تشمل ثلاث رتب وهي سادات الاجنحة وشارفات الاجنحة وشبكيات الاجنحة . اما فصائلها وابناسها وانواعها فكبيرة العدد جميعها من الحشرات الثلاثة || تحليتها : حشرات تامة التطور بجنته ، اجنحتها غشائية مشابة ، رؤوسها وزناهما كبيرة القد . استطاعها قارضة . ارساغها خامية العقول . ملاسها الترحية جذعة . برقانها مفرطة قوية التأثير .

١٨٤٧٧ - **عَصْبِيَّة الأجنحة** Névroptère (F).

Neuropteral (E). هي كل حشرة تنتمي الى طبقة عصبيات الجناح .

Sperme animal (F). **عَصْد** - ١٨٤٧٨

Animal sperm (E).

المصد هو السليخ اي افراز الغدد التناسلية عند ذكور الحيوان .

١٨٤٧٩ - **عَصْر ، عَصْرَة ، عَصْرَار**

Expression, Pressurage (F). Expression, Pressing (E). هو كبس الشيء لاستنزاف مصارته .

Epoque, Période (F). **عَصْر** - ١٨٤٨٠

Epoch, Period (E). أنه من الزمن .

Période glaciaire (F). **عَصْر الجليد** - ١٨٤٨١

Ice age (E).

Foulage (F). Furling (E). **عَصْر العنب** - ١٨٤٨٢

هو سحق العنب واستخراج مصارته . ومنهم من قال هرس العنب .

Age paléolithique, **عَصْر حجري** - ١٨٤٨٣

A. de la pierre taillée (F). Palaeolithic age (E). هو الدور الثلاثي ، اطبه .

Coccyx - **عَصْفَص ، عَصْفُوس** - ١٨٤٨٤

طوف القتب وقد شاع اسناده الى طرف ألية النعم . ج عصافص .

Ecimage (F). **عَصْف ، قَرْف** - ١٨٤٨٥

Topping, Pollarding (E).

اقتطاع بعض قن النبات انصها القن الحامية . وعندما تكون الناية من المصنف اقتطاع الانزهار فهو الحصي .

Pampe (F). Blade (E). **عَصْفَة** - ١٨٤٨٦

ورقة الزرع وسننم النباتات التجلية . ج عصف .

Bouquet (F). Aroma (E). **عَصْفَة الخمر** - ١٨٤٨٧

ريح الخمر . يقال ان الخمر عصفة مستحبة .

Nerf (F). Nerve (E). **عَصَب** - ١٨٤٥٦

هو الوحدة التي يتكون منها الجهاز العصبي في الجسم الحيواني . وظيفته تنظم وتكثيف عمليات اجهزة الجسم والسيطرة عليها واغصانه الى مختلف اجسامه . ج أعصاب .

Nervure secondaire (F). **عَصَب** - ١٨٤٥٧

Secondary nerve (E).

هو في اوراق النباتات الرعاء النسبي الوصل ما بين الفرق والثرينات . اما ترتيب اوعية الورقة فهو غليظ وقرق وعصب وثرينات لا والعصب في رواشن بعض الحشرات يحتل المرتبة الثانية بعد العروق .

١٨٤٥٨ - **عَصَب**

النصب قيم احمر تراه في الاقن عند مغيب الشمس . يقال نصب الاقن اي احمر .

١٨٤٥٩ - **عَصَب** راجع اسطرافالوس نواوس .

Biscournage (F). Castration (E). **عَصَب** - ١٨٤٦٠

طريقة في الحصاد تقتل فيها حيال الحمى ولا تسلب تقصر وتتلأى .

Nerf ophtalmique (F). **عَصَب بَصَرِيّ** - ١٨٤٦١

Ophthalmic nerve (E). هو النصب المختص بالبرصر .

Nerf moteur (F). **عَصَب حَرَكِيّ** - ١٨٤٦٢

Motor nerve (E). كل نصب اختصاصه الحركة .

Nerf sensoriel (F). **عَصَب حَيّ** - ١٨٤٦٣

Sensory nerve (E). هو النصب الذي ينتمي الى جهاز الحس .

Nerf laryngé, **عَصَب حَنَجرِيّ** - ١٨٤٦٤

N. laryngien (F). Laryngeal nerve (E).

كل نصب غصص بالحنجرة .

Nerf pulmonaire (F). **عَصَب رِئَوِيّ** - ١٨٤٦٥

Pulmonary nerve (E). النصب المرتبط بالرئة .

Nerf acoustique (F). **عَصَب سَمْعِيّ** - ١٨٤٦٦

Acoustic nerve (E). النصب الخاص بجهاز السمع .

١٨٤٦٧ - **عَصَب سِنِّيّ ، عَصَب لُحْرُوِيّ**

Nerf alvéolaire (F). Alveolar nerve (E).

النصب الخاص بشغاريب الانسان .

Nerf olfactif (F). **عَصَب شَمِيّ** - ١٨٤٦٨

Olfactory nerve (E). النصب الخاص بلمحة الشم .

Nerf brachial (F). **عَصَب عَضْدِيّ** - ١٨٤٦٩

Brachial nerve (E). النصب الخاص بالعضد .

١٨٤٧٠ - **عَصَب قِحفليّ ، عَصَب شَحيّ**

Nerf crânien (F). Cranial nerve (E).

النصب الخاص بالجسمية .

Nerf abducteur (F). **عَصَب مُبْعِد** - ١٨٤٧١

Abducent nerve (E). كل نصب اختصاصه الإبعاد .

Nerf optique (F). **عَصَب بَصَرِيّ** - ١٨٤٧٢

Optic nerve (E). النصب المختص بالبين .

١٨٤٩٩ - عَصَلٌ Uriner (F). To urinate (E).
صعل الكلب والذئب والتعلب : بال .

١٨٥٠٠ - عَصَلٌ Rhododendron (S).
Rosage, Rhododendron (F). Rhododendro (E).
Rosebaum (D). Rododendro (I).

جنس نباتات معمرة برية وثرينية من فصيلة الوردية.
أنواعه المعروفة نحو ١٧٠ منها أزهار والشجيرات والجنابت.
أوراقها معتقة جلدية النصل . أزهارها خماسية البتلات
باردة الاسدية الشفوية التجميع الكثرية السد . واحدة
صصلة || أشهر أنواعه الثرينية ما يتبع .

١٨٥٠١ - عَصَلَةٌ أَفْغَانِيَّةٌ

Rhododendron collectianum (S). Rosage de l'Afghanistan (F).

جنية سرورية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها وفروعها
نشيطة قوية . أوراقها سائنة تطول من ٥ الى ٨ سم .
نصلها خلي الصفحة السفل المبطنة اللزج . نوربها خضيرة
الشكل حديدية الأزهار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٢
و ٣ سم . بتلاتها خلية البترة ، بيضاء اللون . أوراقها
صطرية الرائحة عند الفكك || أزهارها يستمر طوال شهر
أيار .

١٨٥٠٢ - عَصَلَةٌ الشَّرْقِيَّةُ ، عَصَلَةٌ شَيْخِيَّةٌ ، بِقَيْلٌ
Rhododendron ponticum (S). Rosage d'Orient (F).

جنية سرورية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . أوراقها
سائنة ، خفيفة ، ذرية ، تطول نحو ١٥ سم . نصلها أخضر
اللون المايق اصبع المواج . نوربها تضم من ٣ الى ٥
قطر الواحدة منها يراوح بين ٦ و ٨ سم . لونها الى
البنيضجي يعلوه تزيين اسمر || أزهارها يستمر من أيار
الى حزيران .

١٨٥٠٣ - عَصَلَةُ الْيَان

Rhododendron yunnanense (S). Rosage du Yunnan (F).

جنية سرورية متوسطة القند تطلو نحو ٢٠٠ سم . أوراقها
أحليجية الشكل خفيفة الزرام الاخضر الذلق المذهب ؛ نصلها
يطول من ٦ الى ١٠ سم . تطلو خلق من الملب الجاند .
نوربها تضم من ٥ الى ١٥ زهرة قطر الواحدة منها نحو
٥ سم . لونها الى البياض الساطع تملو مشعة وريدة ورقشة
حرارة || أزهارها يستمر من أيار الى حزيران .

١٨٥٠٤ - عَصَلَةٌ بَاهِرَةٌ

Rhododendron fulgens (S). Rosage éclatant (F).

شجيرة سرورية كبيرة القند تملو من ٣ الى ٦ أمتار . ساقها
قرعاء قتاة . أوراقها بيضية الشكل ؛ نصلها يطول نحو
١٢ سم . صفحته العليا أخضر اللون مائة اما السفلى
فحنطية غنية وفسية . نوربها تضم من ١٥ الى ٢٥ زهرة
أرجوانية اللون ، زاهية المواج ، صغيرة القند || أزهارها
يستمر طوال شهر أيار .

١٨٥٠٥ - عَصَلَةٌ بَحْرِيَّةٌ الْوَن

Rhododendron hypoglucum (S). Rosage glauque (F).

جنية سرورية جميلة الشكل تطلو نحو ٣٠٠ سم . ساقها
وفروعها خالية الزغب . أوراقها أحليجية تطول من ٥ الى
٧ سم . نصلها جامد أخضر الصفحة ، اسمر البترة ؛ بحري
الخصار . نوربها صيوانية الشكل تضم من ١٥ الى ١٦
زهرة متوسطة القند لونها الى البياض الباهي تملو نمشة
سمرارة || أزهارها يستمر طوال شهر أيار .

١٨٤٨٨ - عُصْفُورٌ هو نورم الصباغين ، اطليه .

١٨٤٨٩ - عُصْفُورٌ Oiseau (F). Bird (E).

قال حزة : سمى عصفورا لانه يصي وير . والعصفور اسم
شامل لجميع الطيور الصغيرة القند . الاثنى صفورة والجسج
عصائير . قال الشاعر :

« كعصفورة في كت طفل يسودها

سبحان الردى والطفل يلهم ويلهم »

١٨٤٩٠ - عُصْفُورُ الثَّيْنِ Bec-fige (F).

اسم شائع يطلق على بعض العصائير من أكالات الثين
كأب : قلقتو ويثير .

١٨٤٩١ - عُصْفُورُ الْجَنَّةِ هو الخفاط ، اطليه .

١٨٤٩٢ - عُصْفُورُ الشَّرْقِ Prunella (S).

Accenteur (F). Accentor (E).

جنس عصائير صغيرة القند من الجوارث . أنواعه قليلة العدد
أزواها الى الطحلة تدبر وتسر وزهر وتبين مع مختلف
الانواع . اصنافها منشقة بالابيض . اجنحتها مرشحة
بالاسمر . مناقرها دقيقة قوية . ارساها سيقية الجلد .
قوتها الحشرات والجوارث والبزور البرية || احرف انواعه
واشهرها ما يلي .

١٨٤٩٣ - عُصْفُورُ الشَّرْقِ الْجَنَّتِيَّةِ

Prunella collaris (S). Accenteur alpin, Pégot (F).

طائر آبد طوله نحو ١٨ سم . يتزين بتجديد جناحه وبياض
عنه وطرف ذنبه . يألف الجبال . قوته الحشرات والجوارث
والسناكب والديدان والآبار النووية الحرجية وبزور البتات
البرية اصحابها الشرط || يذفن في الارض وبين خثايف
العصفور . الاثنى يتناسع من ٥ الى ٦ بيضات على مرتين
في السنة تحضنها بتجارة الذكر من ١٣ الى ١٤ يوما .

١٨٤٩٤ - عُصْفُورُ الشَّرْقِ الصَّغِيرِ

Prunella modularis (S). Accenteur moucheté, Ac.

mouchet, Mouchet chanteur, Traine-bulsson (F).

Hedge-sparrow (E).

طائر آبد طوله نحو ١٥ سم . لونه عادم البياض تملو
مشعة صناعية وتزين اسمر . يألف الحدائق والادغال
والسباحات واحراج الصنوبر والتوب . قوته الحشرات
على اختلافها والبزور البرية والزراعية || يذفن في
الادغال والنجار الفناء . الاثنى تضع من ٥ الى ٦ بيضات
على مرتين في السنة المرة الاولى في أيار والثانية في تموز .
الحضن يدوم من ١٣ الى ١٤ يوما وقد يشترك فيه الذكر .

١٨٤٩٥ - عُصْفُورُ قَارِيٍّ Oiseau-souris (F).

طائر يدعى الخنثور ، اطليه .

١٨٤٩٦ - عُصْفُورُ مَائِيٍّ Oiseau-diamant (F).

طائر من فصيلة السرديات يدعى وثنى ، اطليه .

١٨٤٩٧ - عُصْفُورٌ Organe copulateur (F).

Copulatory organ (E).

لور ذكر كل حشرة مجتمعة واخصها الجراد .

١٨٤٩٨ - عَصَلٌ Scorpioide (F). Scorpoid (E).

نمت تعريفي يطلق على ما كان شكله شكل ذنب العقرب
بالانواء والتحمجين .



عصفور الشرقي الجبل



عصفور الشرقي الصغير



عصلة الشرق

من ٣ الى ٤ سم. صفحته العليا لمساء البشرة خضراء اللون . صفحته السفلى خالية ، ناعسة ، غبراء المواجه . نورتيًا خيمية الشكل عديدة الاعتدال الصغيرة ، قطر الواحدة منها نحو ١٢ سم. لونها الى الياض الناصع || أزهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٨٥١٣ - عَصَلَة صَفْرَاء

Rhododendron lutescens (S). *Rosage jaunâtre* (F). جنبة صبروتية اللد تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها وفروعها دقيقة أوراتها سنائية ذرية . نصلها يطول نحو ٦ سم. صفحته السفلى طلاء اللون ذهبي الحراشف المبرسة . نورتيًا تضم من ٢ الى ٤ أزهار ، قطر الواحدة منها نحو ٤ سم. لونها الى الصفار الزاهي || أزهارها يستمر من شباط الى آذار .

١٨٥١٤ - عَصَلَة صَوْبِيَّة الزَهَب

Rhododendron lanatum (S). *Rosage laineux* (F). شجرة صبروتية تملو من ٣ الى ٦ أمتار . ساقها وفروعها وأفانها كثيفة الزغب المستطيل الصوي الشكل . أوراتها احليجية مقطوعة . نصلها يطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وهو خلى البشرة على صفحته . نورتيًا تضم من ٦ الى ١٠ أزهار لونها الى الصفار الباهت تملو بمشة حراء . أزهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٨٥١٥ - عَصَلَة عِطْرِيَّة

Rhododendron fragrans (S). *Rosage parfumé* (F). جملة صبروتية تملو من ٢٠ سم. ساقها وفروعها دقيقة . أوراتها صغرة احليجية الشكل تطول نحو ٢٥ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا ، اسمر السفلى الغليسية الحراشف . نورتيًا طقية تضم من ١٢ الى ١٥ زهرة ، قطر الواحدة منها نحو ١٢ سم. رقتها مستحب الرائحة لونها الى الصفار الباهت || أزهارها يدوم طوال شهر نيسان .

١٨٥١٦ - عَصَلَة قَاصِرَة *

Rhododendron calophytum (S). *Rosage superbe* (F). شجرة صبروتية جملة الشكل المردني المقطوم . تملو من ٨ الى ١٥ م. هروقتها وأفانها مسرة . أوراتها سنائية تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. نصلها أزغب الصفحة السفلى ، زغبه ليد التجصيع ، اصفر اللون . نورتيًا تضم من ٥ الى ٧ أزهار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٥ و ٦ سم. لونها الى الحمرة القانية الزاهية || أزهارها يستمر طوال فصل الربيع .

١٨٥١٧ - عَصَلَة كَرْوَلِينِيَّة

Rhododendron carolinianum (S). *Rosage de la Caroline* (F). جنبة صبروتية متوسطة اللد تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. أوراتها غزويطة الشكل قصيرة المقصة المنقبة . نصلها يطول من ٥ الى ٧ سم. صفحته السفلى خالية البشرة طلاء اللون . نورتيًا تضم من ٢ الى ٤ أزهار ، قطر الواحدة منها نحو ٤ سم. لونها الى الوردى اللامع المواجه || أزهارها يستمر من أيار الى سبيران .

١٨٥١٨ - عَصَلَة كَلِفُورْنِيَّة

Rhododendron californicum (S). *Rosage de Californie* (F). جنبة صبروتية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. أوراتها سنائية ، تطول من ٨ الى ١٥ سم. نصلها اطحل الصفحة

١٨٥١٦ - عَصَلَة جَرَسِيَّة

Rhododendron campanulatum (S). *Rosage campanulé* (F). شجرة جامدة تملو من ٤ الى ٥ أمتار . أوراتها يضيئة الشكل صندرية الطويين . نصلها يطول من ٨ الى ١٥ سم. وهو اخضر الصفحة العليا اطحل السفل . نورتيًا كبيرة اللد ، كثيرة الأزهار الجرسية . قطر الواحدة منها يراوح بين ٢ و ٢ سم. لونها الى الالبيض يطلو موجه ليكي وستار اسمر || أزهارها يستمر من نيسان الى أيار .

١٨٥١٧ - عَصَلَة خَمَلِيَّة

Rhododendron villosum (S). *Rosage velu* (F). شجرة صبروتية صغرة اللد تملو من ٥ الى ٦ أمتار. ساقها وفروعها مالة اللحاء . افانها واهناق أوراتها حلوية . أوراتها يضيئة الشكل مقطوعة اللقاعة ، مدبة المقصة . نصلها خلى البشرة على صفحته طول يراوح بين ٥ و ٨ سم. نورتيًا تضم من ٣ الى ٥ أزهار كبيرة اللد لونها الى الحمرة البنفسجية || أزهارها يستمر طوال الربيع .

١٨٥١٨ - عَصَلَة ذَهَبِيَّة الزَهَر

Rhododendron aureum (S). *Rosage jaune d'or* (F). جملة صبروتية تملو نحو ٥٠ سم. ساقها وفروعها دقيقة ، مرطاه اللحاء . أوراتها سنائية الشكل تطول من ٦ الى ١٠ سم. نصلها فلسي الصفحة السفلى . نورتيًا تضم من ٢ الى ٤ أزهار ، قطر الواحدة منها نحو ٢ سم. لونها الى اخضر الذهبى الجليل || أزهارها رديني .

١٨٥١٩ - عَصَلَة رَافِعِيَّة

Rhododendron maximum (S). *Rosage élevé* (F). شجرة صبروتية جملة الشكل شاملة الاستعمال التريبي . تملو نحو خمسة أمتار . أوراتها خيقة ذرية تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. نصلها اخضر البشرة على صفحته . نورتيًا حلوية الشكل ، خلية الزناد والمالقي والاعن ، عديدة الاعتدال ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٤ و ٥ سم. لونها الى الوردى يطلو توبخ اصفر ومشة حراء ومشة خضراء . أزهارها يستمر من أيار الى سبيران .

١٨٥١٠ - عَصَلَة زَيْتُونِيَّة الْوَرَق

Rhododendron oleaeifolium (S). *Rosage à feuilles d'olivier* (F). جملة صبروتية متوسطة اللد تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. أوراتها زيتونية الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم. نصلها نقي اللون اسمر الحار . نورتيًا تضم بعض اوراقها الوردية ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٢٥ و ٣٠ سم. أزهارها يستمر من نيسان الى أيار .

١٨٥١١ - عَصَلَة سَمِيرْنُوف

Rhododendron Smirnowii (S). *Rosage de Smirnow* (F). جنبة جامدة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. أوراتها سنائية مدبة تطول من ٧ الى ١٢ سم. نصلها اصفر الغسل ، غائر العروق ، خلى الصفحة السفلى ، مائل العليا الزاهية الخضر . نورتيًا تضم من ٣ الى ٤ أزهار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٣ و ٨ سم. لونها الى الوردى يطلو موجه ليكي || أزهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٨٥١٢ - عَصَلَة صَغِيرَة الزَهَر

Rhododendron micranthum (S). *Rosage à petites fleurs* (F). جنبة صبروتية صغرة اللد تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها وفروعها غليظة . أوراتها سنائية الشكل ، نصلها يطلو



عَصَلَة قَاصِرَة

الشكل، ليد الارتكاز. تكثر في المروج وفي معظم الأراضي الرطبة من أقاليم البلاد المتحدة.

١٨٥٢٦ - عَصَبَة المَرْج



عصلة مرصنة

Phleum pratense (S). *Piéole des prés*, *Massetta*, *Timothy* (F). *Cat's tail*, *Herd's grass*, *Timothy grass* (E). *Timotheeschryas*, *Timotheegrass* (D). *Codolina*, *Fiao del prati*, *Erba di Timoteo* (I).

اشهر انواع العسوية واسمها علماً وأيضاً إنتاجاً جيد في المراعي بالاشتراك مع القمح ويختلف البتاتات القرنية. يرغب في الاقاليم المعتدلة والارربة الجبلية الرطبة المنخفضة الانساج. ثمه جيد الصنف تنضج الخيل والابقار والغنم.

١٨٥٢٧ - عَصَبَة، عَصَبَة، *Juteux* (F), *Juicy* (E). كثير العصير أو الرب.

١٨٥٢٨ - عَصَبَة، عَصَبَة، *Moët* (F), *Must* (E). سائل سكري يستخرج من بعض الثمار كالعنبر والفاص، الخ.



عصبة المروج

١٨٥٢٩ - عَصَبَة الحَصَص، *Verjus* (F), *Verjuice* (E). عصير من القنب في طوره الثفري الحامضي. يستعمل في تخميص الثمرات السكرية وفي صناعة الخردل، وقد يضاف الى الحمر لزيادة حوضتها فيما ودعت الحامية.

١٨٥٣٠ - عَصَبَة اللَّدْبِي، هو القالب الشائع، اطلية.

١٨٥٣١ - عَصَبَة الدَّن، *Cuvée* (F), *Tubful* (E). هو ما يستخرج البذن من عصير.

١٨٥٣٢ - عَصَبَة، *Ligularia* (S), *Ligulaire* (F). جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المريكيات. انواعها كثيرة البدد - منها معظم اصناف العالم. سيقانها فريدة منتصبة تنضج بالانزهار. اوراقها جلدية الانساج كبيرة القند. ازهارها وريسي التركيب سنبل او عقنود لتجميع. قنابات ثلثات وحيدة الصنف || يرغب في المراتع الرطبة والارربة المنسوبة التركيب الحامي || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.



عصبة الحجاب

١٨٥٣٣ - عَصَبَة الحجاب

Ligularia divorura (S), *Ligulaire des coteaux* (F). نوع من العصبين للممر. ساقه زياه مفردة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقه شبه مستديرة الشكل طولها نحو ٥٠ سم. وريثها ٤٥ سم. ازهارها حشركلي لتجميع. وريثها الزهرية كبيرة القند حشركلي الاقراص يرتقالية اللبسات، قناتها قطرها يراوح بين ٩ و ١٢ سم || تنوره يستمر من آب الى ايلول.

١٨٥٣٤ - عَصَبَة بَحْرِيَّة اللون

Ligularia glauca (S), *Ligulaire glauque* (F). نوع من العصبين للممر. ساقه سرعة تملو نحو ١٥٠ سم. اوراقه قلبية الشكل تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم. نصلها باحث الحفصار سميك الصفحة. ازهارها سنبل لتجميع وريثها الزهرية حشركلي اللون || تنوره يستمر طوال شهر تموز.



عصبة بحري اللون

١٨٥٣٥ - عَصَبَة سِيرِيَّة، *Ligularia sibirica* (S), *Ligulaire de Sibérie* (F). نوع من العصبين للممر. ساقه سرعة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه كبيرة القند تملو نحو ٤٠ سم.

السفل، اخضر العليا، ثخين النسيج. نوريتها تقسم من ٣ الى ٧ ازهار، قطر الواحدة منها يراوح من ٥ الى ٦ سم. نوريتها الى الابوياني المنش بالقرنزي || ازهارها يستمر طوال شهر ايار.

١٨٥٣٩ - عَصَلَة مُسْتَدِيرَة الوردِي

Rhododendron rotundifolium (S), *Rosage à feuilles rondes* (F). جنبة سبروتية تملو نحو ثلاثة امتار. اوراقها مستديرة الشكل قلبية القاعدة طول نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ١١ نصلها بحري الصفحة السفل، اخضر العليا. نوريتها تقسم من ١٢ الى ١٤ زهرة، قطر الواحدة منها نحو ٤ سم. نوريتها الى الوردي الزاهي || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٨٥٤٠ - عَصَلَة مُسَوَّكَة

Rhododendron hirsutum (S), *Rosage hérissé* (F). بجلة عسوية القند تملو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. ماتها وريثها سديقة. اوراقها بيضيه الشكل، مقنطية القاعدة، مدببة المقصبة الشالكة. نصلها خلي البشرة يملو من ١٥ الى ٣٠ سم. لونه الى اخضر الزاهي. نوريتها تقسم بعض الازهار الصغيرة القند الوردية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٨٥٤١ - عَصَلَة مُلْتَبِجَة

Rhododendron ambiguum (S), *Rosage ambigu* (F). جنبة سبروتية كبيرة القند تملو نحو ٣٠٠ سم. انثائها ضمية الانتساب. اوراقها اعليجية الشكل، نصلها يملو من ٥ الى ٧ سم. يشرته بجلة الحفصار اللامع قناتها ثمة غدية سمراء. نوريتها تقسم من ٥ الى ١٥ ازهار جرسية الشكل، كبيرة القند، قطر الواحدة منها نحو ٥ سم. نوريتها الى الحفصار الليموني || ازهارها يستمر طوال شهر نيسان.

١٨٥٤٢ - عَصَلَة مُسَوَّكَة

Rhododendron insigne (S), *Rosage remarquable* (F). شجيرة جادة عمودية الشكل تملو من مترين الى ستة امتار. اوراقها سنائية تملو من ٨ الى ١٢ سم. نصلها جميل الحفصار اللامع البشرة. نوريتها تقسم من ٨ الى ١٥ ازهار، قطر الواحدة منها يراوح بين ٤ و ٥ سم. نوريتها الى الياس الموحج بالوردية || ازهارها يستمر طوال فصل الربيع.

١٨٥٤٣ - عَصَلَة مُسَوَّكَة

Rhododendron ciliatum (S), *Rosage cillé* (F). بجلة كبيرة القند سبروتية تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها سنائية الشكل، حشركلي النصل، مدببة الزام الاخير، طولها نحو ٥ سم. صفحتها العليا ناعمة البشرة صفراء اللون. صفحتها السفلى غدية، مبرقعة، مهدبة، طحله اللون. نوريتها تقسم من زهرتين الى ست ازهار، قطر الواحدة منها يراوح بين ٤ و ٥ سم || ازهارها يستمر طوال شهر نيسان.

١٨٥٤٤ - عَصَبَة، *Vent violent* (F), *Strong gale* (E). العصف والصفيت والريح الشديدة.

١٨٥٤٥ - عَصَبَة، ذَيْلُ القَطَا

Phleum (S), *Piéole*, *Phéole* (F), *Cat's-tail grass* (E). جنس اعشاب مرعوية برية وزراعية من فصيلة النجيليات، انواعها المعروفة ١٠ بجها شلثة. سيقانها دقيقة منتصبة. عصفها سنائي مستطيل. ازهارها سنبل لتجميع، اسطواني

ذهبتا الحلقة المطوقة بالابيض . زعنفتها الظهريه مسطليه قاطبة . زعنفتها الشريبيه خط من المناخس اللويه . زعنفتها القبلية حلالية الطرف || لحها متوسط الصنف ، مأكول .

1٨٥٤٥ - عُصْبَادَة ، أَلْبَيْدَاد

Alidade
جهاز التخطيط يستعمل في المساحة وهو مركب من مسطرة لها مصويتان شاقوليتان موهبتان بالتوازي مع حافة طرفها .

1٨٥٤٦ - عُصَار
Loranthus schimperii (S).
نوع من الحاصل يزود القرنين . راجع حضال .

1٨٥٤٧ - عُصَاة
النضار: كل شجر يعظم وله شوك . وما صغر من شجر الشوك فهو العُص . وما ليس بمُصٍّ ولا عصاة من شجر الشوك . فالشكامي والحلاوي والحاذ والكب والساج .

الواحدة عصاة وضة .
1٨٥٤٨ - عُصَاة ٥
Organisme (F).
هي الجهاز النضوي الذي يميز الاجسام الحية من الجاهل .

1٨٥٤٩ - عُصَايِي ، مُعَقَّق ، مُعْصُون
Organisé (F), Organic (E).

1٨٥٥٠ - عُصْبُ : العُصْبُ : هو العليل عند طلوع قرنه .

1٨٥٥١ - عُصْبَة * ، عَصْبَة اليُكَاكِر

Silphium (S), Silphe, Plante au compas, Silphide, Silphie, Silphion (F), Compass plant, Bastard chrysanthemum, Polar plant (E), Geschlitzte Tassenpflanze (D), Silfo (I).
جنس نباتات جنية زينة معمرة من فصيلة المركبات . انواعه ١٢ ، أصلها المالح . سيقانها دعامه صابرة والزينة . اوراقها خضية التيج . ازهارها رؤسية كبيرة القند صفراء اللون . زهورها مفلطحة ومجمدة || أعرف انواعه واشهرها ما يلي .

1٨٥٥٢ - عُصْبَة ثَلَالِيَّة الْوَرَق
Silphium trifoliatum (S), Silphe à feuilles ternées (F).
جنية معمرة تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها اسطوانية مزينة بفرازة مادتها الرتيبية . اوراقها خضية التيج ، رمضاء اللحاء ، بحرية اللون . اوراقها خضية ثلاثية التركيب ، سنانية النصل ، تطلو نحو ١٦ سم || رؤسياتها الزهرية متوسطة المدد قطرها براوح بين ٤ و ٥ سم ، لونها الى الصفرة || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول .

1٨٥٥٣ - عُصْبَة رَاتِنْجِيَّة

Silphium terebinthaceum (S), Silphe térébinthacé (F).
جنية زينة معمرة تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها تتميز بفرازة مادتها الرتيبية . اوراقها خضية التيج ، بيضيه الشكل ، قلبية القاعدة ، جلدية النصل ، مسنة الحافة ، تطلو نحو ٣٠ سم . وتقرض ١٥ سم . || رؤسياتها الزهرية عديدة ، قطرها براوح بين ٥ و ٨ سم ، لونها الى الصفرة . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

1٨٥٥٤ - عُصْبَة مَحْرُوقَة

Silphium perfoliatum (S), Silphe perfolié (F).
جنية معمرة تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها رباعية التضلع . اوراقها متقابلة مندمجة الاذنات التي تبدو مقعرة كالكرتب توصطها الاثتان || رؤسياتها الزهرية عديدة ، قطرها براوح بين ٥ و ٨ سم . لونها الى الصفرة الشاحبة || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

1٨٥٤٤ - عُصْبَابَة لِيْفِيَّة *

Lepidopus argenteus (S).
Lépidope argenté, Argentin (F).
سمكة بحرية مفترسة بيضاء من فصيلة السيفيات شائعة الزمان . أصلها اقراط ونفاق البحر الابيض المتوسط || جسمها مستطيل الشكل ، مبط الجرم كمنصل السيف تطلو نحو ١٤٠ سم . لونها الى الزرقه بعلوها موج وودي ورشة فضية تتخللها نقط خضية . رأسها وظهورها امبق عَضَابًا من ابطيها وبطنها || رأسها شبه اسفيني الشكل مستطيل الخط . شفتها كبير . اسنانها كبيرة القند منها الثابتة والمتحركة والذرية والمتنعة || ميناها كيرتان

وتقرض نحو ٣٠ . رؤسياته الزهرية خضية اللون ، سلبية التركيب ، قطرها براوح بين ٤ و ٥ سم . لسينياتها ثنائية التخرج تبدو كأنها مزدوجة || تنوره يستمر من تموز الى آب .

1٨٥٣٦ - عُصْبَيْف كَبِير الْوَرَق

Ligularia macrophylla (S), Ligulaire à grandes feuilles (F).
نوع من العصيف الممر . ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه اعليجية الشكل تطلو من ٤٠ الى ٥٥ سم . نصلها الى الخضر الازرق المزج . ازهاره سبلي التيج ، رؤسياته الزهرية كبيرة القند ، مسطية الاقراص ، صفراء اللونات || تنوره يستمر من تموز الى آب .

1٨٥٣٧ - عُصْبَيْف يَابَانِي

Ligularia japonica (S), Ligulaire du Japon (F).
نوع من العصيف الممر . ساقه سرطه تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقه كبيرة القند سباجية او تساعية التفريش . نصلها حاب الخضر سبك الصفرة . ازهاره سنقودي التيج . رؤسياته الزهرية صفراء الاقراص ، حرة اللونات ، كبيرة القند ، قطرها نحو ٩ سم || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

1٨٥٣٨ - عُصْبَيْفَة

Glume (F), Husk, Chaff (E).
قناة تحيط بسنبيلة التيجيات وما عصيفتان لكل سنبيلة .

1٨٥٣٩ - عُصْبَيْفِيَّة

Sclerospora (S).
جنس فطور مجهرية من عارة السببات وفضية السببات . يتميز بقصر خيوطه البولية وقلة تشعبها وكبر بيشاتها واستدارة مرائفها || انواعه المعروفة قليلة انهورها عصيل التيجيات .

1٨٥٤١ - عُصْبِيل التَجِيلِيَّات *

Sclerospora graminicola, S. macrospora (S).
فطر مجهرية من العليل يتميز بلسواد بيشاته الكبيرة الحجم التي يبلغ قطرها نحو ٦٠ مي . || ركب شرائف الحقة والذرة وقد يتهداها الى الازرار . مظهره الخادبي سقم واصفرار ثم تبقي اتصال وقد يؤدي الى الجشنة والاعراض الازرار .

1٨٥٤٢ - عُصِيم

Faillies des arbres (F), Leaves (E).
العصم : هو ورق الشجر .

1٨٥٤٣ - عُصَا ، عَقِي

Lotir (F).
قسم الارض الى عدة حصون .

1٨٥٤٤ - عُصْبَابَة لِيْفِيَّة *

Lepidopus argenteus (S).
سمكة بحرية مفترسة بيضاء من فصيلة السيفيات شائعة الزمان . أصلها اقراط ونفاق البحر الابيض المتوسط || جسمها مستطيل الشكل ، مبط الجرم كمنصل السيف تطلو نحو ١٤٠ سم . لونها الى الزرقه بعلوها موج وودي ورشة فضية تتخللها نقط خضية . رأسها وظهورها امبق عَضَابًا من ابطيها وبطنها || رأسها شبه اسفيني الشكل مستطيل الخط . شفتها كبير . اسنانها كبيرة القند منها الثابتة والمتحركة والذرية والمتنعة || ميناها كيرتان

عصيل التيجيات

عصاة فطية

عصيم

عصبة

ونلسطين . يكثر قرب الحقول المزروعة والياريات . يلتصق قوته في النهار . جمره دهاليز قسيمة عديدة الانفاق يجزن فيها ما استطاع من حبوب .

Muscle

عَصْفَة ١٨٥٦٦

جمجمة نسج عضوية ليفية تتميز بنحاصيتها الانقباضية واللاانقباضية . تقسم عضلات الجسم الحيواني التي يعرف عنها بالجهاز العضلي الى ثلاثة اقسام : قسم العضلات الارادية او العضلات الخطة التي يسيطر عليها الجهاز العصبي فتنتفيش وتنقبض بفعل الارادة . وقسم العضلات غير الارادية او العضلات للماء اي غير الخطة وهي التي لا تأتمر بالارادة كعضلات الجهاز الهضمي والاورقية للسوية . قسم ضم عضلات القلب وهي من العضلات الخطة للارادية التي تتميز باستمرار الحركة طوال الحياة .



عضرلوط

Muscle extenseur (F). عَصْفَة بِاسِطَة ١٨٥٦٧
Extensor muscle (E).

Muscle abdominal (F). عَصْفَة بَطْنِيَّة ١٨٥٦٨
Abdominal muscle (E).

Muscle alaire (F). عَصْفَة جَنَاحِيَّة ١٨٥٦٩
Alary muscle (E).

١٨٥٧٠ عَصْفَة حَاجِيَّة ، عَصْفَة كَامِشَة
Muscle corrugateur, Sourcilier (F). Corrugator muscle (E).

Muscle iliaque (F). عَصْفَة حَرْكِيَّة ١٨٥٧١
Iliacus muscle (E).

Muscle malarie (F). عَصْفَة عَدِيَّة ١٨٥٧٢
Malarie muscle (E).

Muscle circulaire (F). عَصْفَة دَائِرِيَّة ١٨٥٧٣
Circular muscle (E).

Muscle releveur (F). عَصْفَة رَالِيَّة ١٨٥٧٤
Levator muscle (E).

Muscle anal (F). عَصْفَة شَرْجِيَّة ١٨٥٧٥
Anal muscle (E).

Muscle pectoral (F). عَصْفَة صَدْرِيَّة ١٨٥٧٦
Pectoral muscle (E).

Muscle temporal (F). عَصْفَة عُدْغِيَّة ١٨٥٧٧
Temporal muscle (E).

Sphincter عَصْفَة عَاصِرَة ١٨٥٧٨

١٨٥٧٩ عَصْفَة مَادَّة ، عَصْفَة مُبَدِّدَة
Muscle protractor (F). Protractor muscle (E).

١٨٥٨٠ عَصْفَة مُبْعِدَة ، عَصْفَة قَاصِحَة
Muscle abducteur (F). Abductor muscle (E).
عضلة مبعدة عضواً عن محور الجسم .

١٨٥٨١ عَصْفَة مَحْطَطَة
Muscle strié (F). Striped muscle (E).

هي كل عضلة في الجسم يسيطر عليها الجهاز العصبي فيسير انقباضها وانبساطها .

١٨٥٨٢ عَصْفَة مَكَارِيَّة ، عَصْفَة مَلَاغِم
Muscle orbiculaire (F). Orbicular muscle (E).

١٨٥٥٥ عَصْفَة مُشْرَمَة (S). Silphium laciniatum (S).
Silphe laciné (F).

جنية معمورة تملو من متر الى مترين ساقها حلوية غشقة . اورثاتها لافطة متعاقبة دائمة الاتجاه نحو الشمال . نصفاها مشرق الصلصة ، تشرمه يبلغ الضلع || ورياساتها الزهرية كبيرة القذ ، قلعها يراوح بين ٨ و ١٢ سم . لوها الى الصغار الكبيرتي قزاعي || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٨٥٥٦ عَصْفَة
Lot
هي الحصة او السهم او النصيب وهي القلعة من الشيء او الجزء منه : ج عضون .

١٨٥٥٧ عَصْفَة
Emondage (F). Pruning, Lopping (E).
تقليم الفروع والاضنان الكبيرة التي تنبت على اللوق .

١٨٥٥٨ عَصْفَة
Bras (F). Arm (E).
من اعضاء قوائم الدواب الاسامية . ج اعضاء واضد .

١٨٥٥٩ عَصْفَة زَنْدِيَّة ، عَصْفَة مِرْقِيَّة
Brachio-cubital, Huméro-cubital (F). Humero-cubital (E).

١٨٥٦٠ عَصْفَة كُعْبُرِيَّة ، عَصْفَة كُوْعِيَّة
Huméro-radial (F). Humero-radial (E).

١٨٥٦١ عَصْفَات الارْجُل
Brachiopoda (S). Brachiopoda (F).
شعبة من صف اشباه الديدان .

١٨٥٦٢ عَصْفَرِيْن
Guillemotte officinale
هو الخطي الخنزري زهره قاني الحمرة تسمى منه جملان الدواب اذا اكلته .

١٨٥٦٣ عَصْفَرْلُوط *
Calotes (S).

Calote, Lézard-arlequin (F).
جلس عظام من فصيلة الحردونيات . انواعه ٢٥ اصنافا البلاد الحارة الاسيوية . تتميز باستطالة اذنانها البنية وبقدورها على الاستطوال (الماتنة) || تألف الاذغال والنايات والحراج . قوتها الحشرات .

١٨٥٦٤ عَصْفَرْلُوط مِلْوَان *
Calotes versicolor (S). Calote versicolore, Lézard-arlequin versicolore (F). Versicolour calotes (E).

حيوان يمرض من عظامه وفصيلته الحردونيات شارفات الانسان ، مكشبات الالسة ، ورياسيات القترام ، خناشيات الاصابع || جسمه يطول من ٢٧ الى ٤٠ سم . ثوبه الى الريدة الخنطية تلوها رقعة سمراء . قوته جمدة بالاسمر . وهو كائن انواع جسمه يتميز بالشدة فياتن المحيط الذي يوجد فيه || يألف الاذغال والحراج المبردة الانجار . يعيش ذكراً واثني من اواسط الربيع حتى اواخر الخريف .

١٨٥٦٥ عَصْفَل *
Psammomys obesus (S). Psammomys obesus (F).

حيوان لين قافص من فصيلة القارريات . وسيد الجنس والنوع . شكله شكل الجرذون ، طوله نحو ١٩ سم . وذنبه ١٤ ، ثوبه الى الريدة الصهباء . موطنه رمال مصر وسيناء



عضرلوط ملوان



عصفل

البروية تستغرق ٢٤ ساعة و ٥٠ دقيقة . اما دورته الفلكية حول الشمس تستغرق نحو ٨٨ يوماً || يقال ان حجمه لا يفوق بل من حجم الارض وهو يرى دائماً مغشوراً بنور الشمس نظراً لقربه منها . ويقال انه لا يوجد حول سطحه غلاف جوي وان حرارته تبلغ نحو ٣٥٠ مع || اما المتجيمين فيدعونه منافقاً لكونه مع السد سداً ومع النسخ نحساً .

١٨٥٩٩ - عَطَّارِد هو الناردين الاقليطي ، اطبه .

١٨٦٠٠ - عَطَّاط *
Telophorus (S).
Télophore (F), Telophorus (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من الجوارثم مشروبات المناشير ولصيلة السرديات . اصابته تمتد من افريقية الجنوبية الى الاستوائية والشرقية . وهو من الضواري التي تجوب البلاد في طلب الرزق . ملجئه الحيائي زوجي الا في زمن القطاع . قوته الحشرات والديدان الصغيرة والبرور والثآليل جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٢ سم . منقاده معتدل الجرم . ضليح . جناحه متوسطا القد . ذنبه معتدل الطول ، مستدير الطرف . ثوبه الملوي الى الخضار الالاس ، اطراف اياهه واطراف رقاله الى الحرة الاربعونية . ثوبه السفلي ، من الزور الى الافنيك ، احمر اللون صناعي المويج . منقاده مجزوي . رساه واصابعه الى *السرة القائمة || يدخن عشه في الانجار الرقيقة . الاثني تحضن من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يشمر نحو ١٥ يوماً تقوم بها الانثى دون الذكر الذي يئن لها الغذاء والحماية .

١٨٦٠١ - عَطَّاسِي *
Faunistique (F), Faunistic (E).

كل ما له صلة بالعلم وبالحيوانات الداجنة في كورة معينة .

١٨٦٠٢ - عَطَّان ، عَقَص
Tanin (F), Tannin (E).

مادة سائلة قابضة توجد في انسجة بعض النباتات . حصرها العمال يدعى الطان . والعطان يعتبر من المقويات الطبية الصلبة وهو يستعمل في الدبابة .

١٨٦٠٣ - عَطَّاب هو الغطان ، اطبه .

١٨٦٠٤ - عَطَّيْل ، عَطَّيْلُ النلية الطويلة العنق .
Essence (F), Species, Attar (E).

سائل طيار طيب الرائحة يكون بحالة شيفات في خلايا النبات او في قوتلها وجيوبها الخاصة .

١٨٦٠٦ - عَطَّر هو البهون المر ، اطبه .

١٨٦٠٧ - عَطَّر القَدَّاح ، دهن القَدَّاح ، نِيرُولِي
Nérol (F), Neroli (E).

عطر يستحصل عليه من تقطير زهر التارنج الذي يدعى قداساً .

١٨٦٠٨ - عَطَّر جَعْدِي
هو الحيازة الجعدية ، اطلبا .
١٨٦٠٩ - عَطَّرَف
Vipère (F), Viper (E).

الاصى الكبيرة القد .

١٨٥٨٣ - عَصَلَة مَرْبِيَة ، عَصَلَة قَالِلَة

Muscle adducteur (F), Adductor muscle (E).
عصلة مربية مضوا الى محور الجسم .

١٨٥٨٤ - عَصَلَة مَقْلَمَة
Muscle constrictor (F), Constrictor muscle (E).

١٨٥٨٥ - عَصَلَة مَسَاء
Muscle lisse (F).
Skin muscle (E).

هي العضلة غير المخططة التي لا تؤثر فيها الإرادة او الجهاز العصبي .

١٨٥٨٦ - عَصَلَة هُدَيْيَة
Muscle ciliaire (F), Ciliary muscle (E).

١٨٥٨٧ - عَصَمَكُورِي
Micro-organisme (F).

هو كل كائن حي متناهي الصغر . ويدعى بفقور ، اطبه . اما كلمة ضمكري فن وضع المجمع العلمي في مصر . ج . عضمكريات .

١٨٥٨٨ - عَضُور
Organe (F), Organ (E).

جزء من كائن مركب ، وجيده لازم او ضروري . ج . اعضاء .

١٨٥٨٩ - عَضُور التَلَكِيح ، عَضُورِل
Organe copulateur, O. de copulation (F), Copulatory organ (E).

١٨٥٩٠ - عَضُور سُبَابِي ، عَضُور ودَاجِي
Organe carotide (F), Carotid organ (E).

١٨٥٩١ - عَضُور شَمِي
Organe olfactif (F), Olfactory organ (E).

١٨٥٩٢ - عَضُورَة
Fissiparité (F), Fissiparium (E).

العضوة والتضفية ، التناسل بالانقسام الى شطرين كما هي الحال عند الاولاي والكتيريات .

١٨٥٩٣ - عَضُورِي
Organique (F), Organic (E).

نمت تدريجي توصف به الاعضاء والاجسام والمواد العضوية من اي فئة كانت .

١٨٥٩٤ - عَضِيد
Effeuillage (F), Stripping off the leaves (E).

ما انتزع او اسقط من الورق .

١٨٥٩٥ - عَضِيد *
Palmette (F), Palm-shaped (E).

شكل من اشكال تقليم الانجار المشعة .

١٨٥٩٦ - عَطَا
Fente longitudinale (F), Longitudinal slit (E).

العد : الشق طولاً . انعطاط الخشب : انشقاقه طولاً .

١٨٥٩٧ - عَطَّار
Strombus lantiginosus (S).

نوع من الدلاع يكون منه انطار الطوب .

١٨٥٩٨ - عَطَّارِد
Mercure (F), Mercury (E).

كوكب سيار من الخس ينتمي الى مجموعة النظام الشمسي وهو اقربا من الشمس . سرعة دورته الانتقالية في الفضاء تبلغ نحو ١٩٩٥٠٠ كيلومتر بالساعة . دورته المحورية



عصيدة



عطاط

Tige volatile (F).
Volatile stem (E).

١٨٦١٥ - عَطَلَة

هي الباق التي تنشط وتلتف حل دماغها .

Vrille (F). عَطَلَة ، حَالِق ، لَوْشِيَّة .
Yendril (E).

ورقة تحولت الى حرق لبني التركيب اسطواني الشكل ،
مستطيل ، يمكن الثبات من التفتق والتفتق كما في الكرمه
ونيرعسا .

Aetophorus imperialis (S). * عَطْفُور *
Aétophore impérial (F).

حشرة دلمت من فصيلة السلكويات ورتبة مفدمات
الاجنحة . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة .
تألف المقاصب والمناقع التي يكثر فيها الاصل لانها تعيش
على المواد النباتية المنحلة تحت التقصيب والاسل المطروح
ارضا || جسمها مستطيل الشكل ، مغطى الجرم ، بطول
نحو ١٢ سم . زياتها غيلاني . كولها منزلي الشكل .
توحيها الى الصفرة الصنابية المواج بعلمها في ظهرهاها خمس
نقط سود . ظهرها لا يلحف كابل الجسم .

Hédérac (F). عَطْفِي ، تَبَلِي
Hedéraceus (E).

نمت ترميني توصف به السوق الباقية اللدادة او المستلفة
اللبلاية الشكل .

١٨٦١٩ - عَطَل

راجع أصد .

Otolithus (S). * عَطْلِي *
Otolithe (F). Otolithus (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات .
انواعها المعروفة نحو عشرة . اسطانيها بجار البلاد الحارة ||
جميعها كبيرة القد ، مستطيلة الفك الاسفل ، مقعرة
الزعانف الظهرية الشائكة ، عمودية القذلية || اوتوها الى
الجزوة يملوها ملح اغضر يدر عنه البطن ويسمر في
الظلم || لحومها جيدة الصنف مرغوب فيها .

Faune (F). Fauna (E). عَط *
العلم هي مجموعة حيوانات كورة او قطر او حقة
جبلوية .

Faune abyssale (F). * عَطْمُ لُجِيَّة *
Abyssal fauna (E).

مجموعة الحيوانات البحرية على اختلاف رتبها وصفاتها
واجناسها التي تعيش في المناطق البعيدة من البحر .

Faune aquatique (F). * عَطْمُ مَائِيَّة *
Aquatic fauna (E).

مجموعة الحيوانات المائية التي تعيش في منطقة بحرية خاصة
او معينة .

Faunique, Faunique, * عَطْمِي *
Faunesque (F). Faunic (E).

نمت ترميني يطلق على ما هو خاص بالعلم .

Milieu climatique naturel (F). * عَطْن *
Natural habitat (E).

هي البيئة المناخية الطبيعية الخاصة بالحيوان او النبات
ج اسطان .

١٨٦١٥ - عَطْرِف نَثَات * ، بَخَّاع ، بَرَّاق

Sepedon haemachata (S). Cobra cracheur,
Haemachata, Serpent cracheur (F).

حية سرلودة سامة من العطريفات امانيات الاخاديد مشهورة
بخلقت سمها مع العلم في وجه من تمخيره مهاجرا || جسمها
متوسط الشخانة بطول نحو ٦٥ سم . ثوبا الى الصفرة الخفيفة
المواج يملوها من عنفها الى طرف ذنها جميع مجوزي
معترض وضطوط دقيقة متكررة ومتضاربة سواد اللون .
راسها لوزي الشكل ، عنقها مستطيلة . عيناها مستديرتان
قرمزيتان . عدد اسنانيا ٥٠ منها ٢٤ الى الفك الاسفل
و٢٦ في الاعلى من اصلها عقاقطان امانيات دريتان
لا متحركتان || يرباتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر .
تبلغ كابل نموها بمر ١٢ سنة وتعيش نحو ٩٥ سنة ||
تعتبر من الثعابين الشديدة الاذى .

١٨٦١١ - عَطْرُوب *

Etroplus (S).
Etrople (F). Eetroplus (E).

جنس اسماك بحرية وبحرية من شائكات الزعانف وفصيلة
البهاريات . انواعها المعروفة قليلة العدد اسطانيها اغوارا نهر
الهند || اجسامها بيضية الشكل ، مبطلة ، متقسية ،
تطول من ٢٠ الى ٢٧ سم . رؤوسها شبه مخروطية الشكل ،
مقبعة الاعظام . عيونها صغيرة نازحة . زعانفها الظهرية
مستطيلة عشارية الاشعة والناحس الحادة تقابلها الترسية
المائلة شكلا وقدا ، الحوضية صغيرة مزوانية والبطنية
كذلك . الذيلية مستعصمة مقبوعة || اوتوها الى المنصار
البحري يملوها جميع معترض بنفسجي اللون . ونها انواع
مربوطة بالفضي واخرى فضية البيل || لحومها مأكولة
مرغوب فيها .

١٨٦١٢ - عَطْرُود *

Erythrura (S).
Erythrure (F).

جنس صفاير صغيرة القد من الجراثم خروطيات الناطير
وفصيلة الزرققيات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها جزر
الزايغ ، ملينها الجاني جامي اسرابها تمد اكثر من مئة
زوج || اجسامها صغيرة مكنكة قريبة الشبه بالدوري
الا انها قصيرة الذئاب المقنونة . اوتوها الى الكمية يملوها
مواج اصغر او اشجع . بطونها الى البقرة . ونها نوع ثلاثي
الالوان الزاهية يكثر وجوده في غابات تيمور .

١٨٦١٣ - عَطْرُور *

Chloranthe (F).

جنس نباتات جينية وعشبية معمرة من فصيلة البوروديات .
انواعها المعروفة عديدة اسطانيها بعض المناطق الاستوائية
والحارة من القارة الاسيوية || اوراق زاهية جميع الاوتوح
عطرية العرف المتحطب . ونهم من استعمل الاوراق
استعمال التمنع والشاي .

١٨٦١٤ - عَطْرُورِيَّات *

Chloranthaceae (S). Chloranthacées (F). Chloranthaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدات القممالات مرتفعات
المخيش . اجناسها وانواعها عديدة فيها الاشجار والشجيرات
والنباتات والاشواب . اسطانيها المناطق الاستوائية والحارة
من الهند الى جزر المحيط الهادي الى امريكا الجنوبية ||
اوراقها مسطحة متعاقبة . ازهارها سنبلية التسبيح . ثمارها
لنوية ، متدلية ، صغيرة التلطي للمحوت بطنية آمية
متسكة || اشهر اجناسها البورود والاسكرين .



عطرف نثات



عطروب



عطرد



عطفور



عطليب

مختلفة الاحجام والالوان ، تغلب فيها الاصطالة والاشكال المتسجمة والالوان الغضر النحاسية اللامعة || جميعها مفيدة صغيرة قوتها الحشرات والحوام .

١٨٩٣٦ - عَظَامِيَةُ الحِيطَان

Lézard des murailles (F).

هي بحلية الحيطان ، اطليبا .

Lézard vert (F).

١٨٩٣٧ - عَظَامِيَةُ خَفَضَرَاك

هي بحلية خضره ، اطليبا .

Lézard agile (F).

١٨٩٣٨ - عَظَامِيَةُ رَشِيكَة

هي بحلية رشيقه ، اطليبا .

Lézard vivipare (F).

١٨٩٣٩ - عَظَامِيَةُ وَلَوْذ

هي بحلية ولود ، اطليبا .

Azara microphilla (S).

١٨٩٤٠ - عَظَر

Azara à petites feuilles (F).

شجيرة برية وريزيين من فصيلة النسيان . مهدها بلاد الشيل ، ساقها غراء قتل من ٤ الى ٦ م . فروصها متعاقبة مزدوجة التصفيص . اوراقها ابيدة متعاقبة معتقة صغيرة القذ تقطرن من ٢٥ الى ٣٠ م . نصلها جامد الصفه ، رمعي الشكل . سنن الحافة . ازهارها عطرية العرف ، صغيرة القذ غضراء اللون ، محورية الايتكار . ثمارها غنية ، برتقالية اللون || تنورها يستمر من اواسط شباط الى اواخر اذار .

١٨٩٤١ - عَظَلَم

هو الوصه ، نبات عشبي من الصليبيات . وهو اسم عدة صباغات ذرق اخضها الوصه والنبات ...

١٨٩٤٢ - عَظَلَم هو غُطْر الصفاين ، اطليبا .

Os (F), Bone (E).

١٨٩٤٣ - عَظَم

نسيج ضام صلب يتكون منه الهيكل العظمي الحيواني وهو مركب من اربع طبقات : - ١) الطبقة الخارجية المرفوعة بالسماق وهو غشاء ليفي غالف - ٢) الطبقة القشرية الشديدة الصلابة - ٣) الطبقة الداخلية الهشة المرفوعة بالاسفنجية - ٤) الحافة وهي المادة الدبعية التي تحمل عظام الطبقة الاسفنجية ومن اسماها الرم والنقي . والعظام تستعمل في عدة صناعات اهمها صناعة الاسنة الفسفورية كما تدخل في غذاء الحيوان والطير .

Os spongieux (F).

١٨٩٤٤ - عَظَم اسفنجي

Spongy bone (E).

Fémur (F).

١٨٩٤٥ - عَظَم الفخذ

Femur, Thigh-bone (E).

اقوى عظام الجسم واسهلها ، يتألف من العظم الطويل يحده من طرفه الاهل الدور وتوابعه ومن طرفه الاسفل تنوء اللقمة او اللقنتين .

Bréchet (F). Breast-bone (E).

١٨٩٤٦ - عَظَم القَص

هو الجؤشور ، عظم صدر الطير .

Scapulum (F).

١٨٩٤٧ - عَظَم الكتف ، عَظَم لَوَحِي

Calcaneum (F).

١٨٩٤٨ - عَظَم الكَتَب ، عَظَب

Heel-bone (E).

Ethusa (S).

١٨٩٢٦ - عَظُوز *

Ethusa (F), Ethusa (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الابريل قصار القليل وفضيلة اللباليات . انواعه المرفوعة قليلة العدد ، اصغرها عمار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها بجبة لا تقرب الشطوط الا في زمن التسرة || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، متراكبة لتتواء المدية الاطراف . تتميز بالانجاس المفرط الموجود بين قوائمها ، زويجان كبيران مستطيلان ، وزويجان صغيران . ملاصقها قصيرة ، شديدة التثنت . حيرتها دبوية . اقربها الى الغضار الارزق تملو ماجة حراء . قوائمها الكبيرة وملاصقها ملقوة بالاصفر واللويدي .

Don (F).

١٨٩٢٧ - عَظِيَّة و تَحَلَّة

هي الهبة على اختلاف اشكالها .

Androcée (F). Andracium (E).

هو جهاز التفكير في النبات ، واسع جنس .

Filago (S).

١٨٩٢٩ - عَظِيم *

Filago, Filago, Herbe à coton (F). Horrowort, Cotton rose cud-weed, Cud-weed (E). Schimmelkraut (D). Filago, Filonaria, Campeschio, Erba da Cotone (I).

جنس نباتات عشبية برية من المركبات الشرويات . انواعه المرفوعة لا تجاوز البانها جميعها نباتات بحلية غراء . اوراقها عطرية . ازهارها رويضة كثيفة التجميع يطولها عنه الادراك زغب ابيض اللون يشبه لدف القطن . قالوا انها لا تخلف من المنافع الطبية لكنهم املوا ذكرها .

١٨٩٣٠ - عَظَاء

اسم تعريفي شامل يطلق على منظم الزخافات التي تنتمي الى رتبة العظائيات .

Sauriens, Lacertiliens (F).

١٨٩٣١ - عَظَائِيَّات

Saurians (E).

رتبة العظاء وهي حيوانات زحافة بيوضة عادمة الدم . مفترسة قوتها الحشرات والحوام . فصائلها ٢١ ، اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صماء الاذن ، جليزية الصدر ، ولبانية القوائم او ثنائيتها او عاصمتها . اجسامها مستطيلة ، جلونها حشوشية ، اجناسها متحركة || اشهر فصائلها الجروديات والحرباويات والحردويات والحشجويات والحنازيات والسقشرويات والسليليات والسوديات والبيشرويات والقافرات والقهرانيات والورليات والورزيات .

Carpe (F).

١٨٩٣٢ - عِظَام اليَعْم

Carpus, Wrist (E).

Hes (F), Iliia (E).

١٨٩٣٣ - عِظَام حَرَكِيَّة

١٨٩٣٤ - عَظَامِيَّة

العظاية كركية تقوم شمالية المخ مركزها بين كوكبي النخابة والاراء المسلسلة || نجيمها قليلة العدد بمشها ملون لونها من المرتبة الرابعة .

١٨٩٣٥ - عَظَامِيَّة * ، سَكَامِيَّة و سَحَلِيَّة

Lacerta (S), Lézard (F), Lizard (E).

العظاية والسكامة والمطاعة ج عطاء ومطاي ومطايات ، جنس حيوانات زحافة من فصيلة السقايات . انواعه عديدة



عظيم



عظاية

Saurographie, Saurologie (F). - عَقَنَتِيَّة * ١٨٦٦٦

Saurology (E).

المَعْدَنَة علم يبحث في العظائيات على اختلاف فواصلها وأجناسها .

Saurographique, ١٨٦٦٧ - عَقَنَتِيَّة * ١٨٦٦٧

Saurologique (F). Saurologic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالمَعْدَنَة .

١٨٦٦٨ - عَقَار

شجر يشتهر منه الزناد كالمرخ . قال أبو سنيّة : « أخبرني بعض الإعراب أن الغار شبيه بشجرة التبرء ونورها أيضا كنورها وهو شجر حوكر . ولذلك جاد الزناد . واحدة عقارة » .

١٨٦٦٩ - عَقَارَكَة

Poudreuse (F). Powdery (E). أداة خاصة تفر بواسطتها مختلف المساحيق الحشورية والفاطورية المستعملة في مكافحة الحشرات والقصور والاصنام .

Noix (F). Walnut (E). ١٨٦٧٠ - عَقَارَكَة

المفازة هي الجوزة للمأكولة . ج. مفاز .

Capsule de coton (F). - عَقَارَكَة ، بَبْتَم ١٨٦٧١

Nut of the cotton (E).

المفازة ولكنكب . ج. مفاز وكناكب ، هي جرة القطن المروقة صامياً بجوز القطن أو لوزة .

Traitement curatif (F). ١٨٦٧٢ - عَقَاسْ

Curative treatment (E).

العقاس ج. عقاسات هي العلاجات الشافية في الحيوان والنبات .

Fuligula (S). ١٨٦٧٣ - عَقَاسْ

Fuligule, Nyroca, Canard plongeur (F). Nyroca (E). جنس طيور مائية من عمارة العقاسيات وفضيلة البطيات . أنواعه عديدة جميعها من القواطع . أجسامها ربة قدتها قدر البطة الصغيرة . مناقبها مبطلة مريضة القاعدة . أنفها يلقاه اللون فيها الأبيض مع الرمادي مع الآخر والأزرق والبنفسجي والاسود . ذكورها أضر من أنثاها وأكبر حجماً منها . قوتها الأسماك الصغيرة والقشريات وكل ما هو صغير في الماء تقتنصه بالفتس . وهي تغفل المياه البحرية على البنية || تدثر في الأسر والقبب على ضفاف البحيرات . أنثاها تضع من ٨ إلى ١٠ بيضات تحضنها وحدها من ٢٢ إلى ٢٣ يوماً .

١٨٦٧٤ - عَقَاسْ أَيْضْ *

Fuligula marila, Nyroca marila (S). Fuligule à collier, F. milouina (F). Scamp (E).

نوع من العقاس طولها نحو ٥ سم . أخضر الرأس ، مقلق السطح ، اسود الجوزة والذنب ، أبيض البطن ، سحطي للنفاد ، أحر العين ، اسمر الرجل .

١٨٦٧٥ - عَقَاسْ أَيْضْ * ، عَقَاسْ كَبِير

Clangula glaucion, C. hyemalis (S). Fuligule du milouen, Garrot vulgaire (F). Several duck (E).

نوع من العقاس يطول نحو ٦٥ سم . رأسه وجزءه إلى الذقن . سائر جسمه إلى البياض الناصع . متقاده أسود . يألف مياه المناطق الباردة والمعتدلة .

١٨٦٤٩ - عظم المَعْدَنَة Ischion (F). Ischium (E).

١٨٦٥٠ - عظم المَيْكَمَة ، مَيْكَمَة Vomer

١٨٦٥١ - عظم جِدَارِي Os parietal (F).

Parietal bone (E).

١٨٦٥٢ - عظم حَقِي Os cotyloide (F).

Cotyloid bone (E).

١٨٦٥٣ - عظم حَلَزُونِي ، عظم مَقْبُول Os turbiné (F). Turbinal bone (E).

١٨٦٥٤ - عظم زَوْرَقِي Os scaphoide (F).

Scaphoid bone (E).

١٨٦٥٥ - عظم صُدْغِي Os temporal (F).

Temporal bone (E). هو الجزء المستطيل من عظم الفخذ .

١٨٦٥٦ - عظم طَوِيل ، مَشَاش Diaphyse (F).

Diaphysis (E).

١٨٦٥٧ - عظم فَرْأَبِي Os coracoid (F).

Coracoid bone (E).

١٨٦٥٨ - عظم غَشَائِي Os membraneux (F).

Membranous bone (E).

١٨٦٥٩ - عظم مَحْتَجَر Osteolithe (F).

Osteolith (E).

١٨٦٦٠ - عظم مُنْخَلِي Ethmoide (F).

Ethmoid (E).

النظم المنخلي أو النظم القربالي أو النظم المنفصلي هو ركيزة الأنف في الجمجمة .

١٨٦٦١ - عظم وَدَدِي Os sphénoïde (F).

Sphenoid bone (E).

١٨٦٦٢ - عَظْمِيَّة ، عَقَاسِي Osseux (F).

Bony, Osseous (E).

نعت تعريفي يوصف به ما هو كالنظم طبيعة أو تركيباً أو شكلاً .

١٨٦٦٣ - عَظْمِيَّات ، كَمَالَات العظام Téléostéens (F). Téléostei (E).

صنيف من الأسماك يسمى أكثرها . أجناسه وأنواعه عدة الاثني جميعها نباتات الفضائل ونفسها خمس رتب : هي : عصيليات الحياض ، شائكات الزمائف ، مفتوحات المثانة ، ملحويات الفك ، ولساوات .

١٨٦٦٤ - عَظْمِيَّات الرُّؤُوس Osteoglossidae (F). Osteoglossidæ (E).

فصيلة أسماك نهريّة من كمالات النظام تتميز برؤوسها المنحنية بمصانع عظمية المادة . أجناسها وأنواعها قليلة العدد منتشرة في بعض أنهر وبحيرات البلاد الآسيوية والأفريقية والأمريكية .

١٨٦٦٥ - عَظْمِيَّات Osteine, Ostéine (F).

Osselin, Ostein (E).

النشأ الحلامي الموربد في النظم .



عقاس ابلق



عقاس أبيض

١٨٦٨٥ - عَفَّاصُ Bouchon (F). Stopper (E).
صمام القارورة . عَفَّاصُ : سدُّها بالعفَّاص .

١٨٦٨٦ - عَفَّائِيَّاتُ ٥ Paleodictyoptères (F).
Paleodictyoptera (E).

طبقة حشرات من شعبة السرنجيات وطائفة المجنحات أصلاً .
أنواعها وأجناسها وفصلاتها عديدة تنضم إلى ثلاث رتب
السرطايات والزهريات والقروديات . جميعها من مخلوقات
الآفة العابرة . أحاديها تتناول من أواسط إلى أواخر
الربيع الأول . جميع حشراتنا كبيرة القصد وبعضها
مستفسخ .

١٨٦٨٧ - عَفَّالَةُ ٥ Epiphila (S).
Epiphile (F). Epiphila (E).

جنس حشرات فراشية من فصيلة البشوريات ورتبة
حشرشيات الاجنحة . أنواعها المعروفة متوسطة المدد أعطتها
بعض جبال أمريكا الجنوبية . فراشاتها وأشعة قوتها
ريق الأزهار البرية . أساريها خاضعة تعيش على أوراق
النبات . أجسامها معتدلة القصد تطول من ١٦ إلى ٢٠ سم .
سبطها تراوح من ٤٨ إلى ٦٠ سم . رؤوسها صغيرة و
ملونة . عيونها ناشزة ، كبيرة . قرونها الاستشعارية
صوليانية . مراشها دقيقة . جوارشها وبطنها مزينة أو
خالية . جميعها ملونة . وراشها غضبية متراكبة الألوان .
معظمها يجمع الزوج الأماني المنقط بالأبيض وبعضها
يجمع الأماني والخلفي . أعرف أنواعها وأكثرها انتشاراً
العفالة المستعينة (Epiphila dilecta) .

١٨٦٨٨ - عَفَّانُ الرَّصْع ٥ Loque, Pourriture du couvain (F). Rag, Breeding-
cells rot (E).

وصم جرثومي فتاك يصيب العفانة يدمر رصع النحل يقضي
عليه . يتكاثر بانتطاع أقسام الخنازيب المصابة وينتقل
النحل إلى قنبر أو غلية نظيفة ومطهرة .

١٨٦٨٩ - عَفَّة ٥
العفة «مكة جرداء يضاء صغيرة مطبوعها كالراز» .

١٨٦٩٠ - عَفَّجُ Duodenum
المعج : ما ينتقل الطعام إليه بعد المددة ، وهو السباع
كلها بمنزلة المسارين لذوات الخنف والتلف التي تؤدي
إليها الكرش ما دفعته . ج أفضاج وعطجة .

١٨٦٩١ - عَفَّكٌ ، لَعِيدُ ٥ Lagopède (F).
Lagopus (E).

جنس طير من عائلة الأرنبيات وفصيلة الطيوريات .
أنواعها ١٤ منظمها قطبي يألّف أسراج الجبال العالية .
ثوبها مختلف الألوان . رأسها كاسي الريش . أجنحتها
قصيرة شبه مستديرة . أفتيكها قصير مستدير يتألف من
١٤ ريشة . أرباسها كاسية من خالبها . ج عفدان .
أعرف أنواعها وأشهرها الثلاثة التالية .

١٨٦٩٢ - عَفَّكُ أَبْكَم ٥ Lagopus mutus (S).
Lagopède muet, L. des Alpes, L. ptarmigan (F).
Ptarmigan, Willow grouse (E).
طائر من العفدة ، طوله نحو ٣٨ سم . ثوبه عديد الألوان
دائم التغير ، يتبدل كل شهر ، تغلب فيه العفوية والخفوة
والبياض ، قوادمه وأفتيكه وباطن سقطه سود . مرحلة

١٨٦٩٦ - عَفَّكُ أَشْهَبُ ٥ Nyroca ferina (S).
Fuligule milouin (F). Pochard (E).

نوع من العفاس يطول نحو ٤٧ سم . رأسه وعقته إلى الشبهة
المائلة ، جريش وذنبه إلى البواد القصبي ، سائر أشهب
الجل . عيانه إلى الحرة . متقاده حنطي .

١٨٦٩٧ - عَفَّكُ مَتَوَجَّ ٥ Netta rufina (S). Fuligule roussâtre, Brante rous-
âtre, Siffleur huppé (F).

نوع من العفاس طوله نحو ٥٥ سم . رأسه أصعب اللون
مشوش الريش . عقته وجريش ويطه وذنبه إلى البنفسجي
اللامع . جناحاه إلى العنبرة ، مناكبه يفيض . عيانه
ورجله ومتقاده إلى الحرة .

١٨٦٩٨ - عَفَّكُ مَصْرِي ٥ Fuligula cristata, F. nyroca (S). Fuligule morillon,
Sarcelle d'Egypte (F). Tufted duck (E).

نوع من العفاس طوله نحو ٤٢ سم . رأسه أخضر اللون
أسفح المواج . جسمه برادي التوب . جريش إلى البنفسجي
اللامع . عيانه إلى الحرة . متقاده أطول ، رجله إلى السرة
الحنطية .

١٨٦٩٩ - عَفَّاسِيَّاتُ Fuligulines (F).
عارة طير العفاس من فصيلة البليات .

١٨٦٨٠ - عَفَّاشُ ٥ Oularia (S).
جلس فلور مجهرية من الطليسات وفصيلة البوطيات .
أنواعه عديدة معظمها طفيل لا مؤذي . جرابه الكتيبي
معداني الشكل ، ضمي التجميع . كنانده يفضية أو
أهليجية . مشبهه خلوي الانتساب يركب السرق والأوراق
يفرقح التسج واليشرة .

١٨٦٨١ - عَفَّاشُ الْخَفَافُ ٥ ، عَفَّاشُ أَوِيلِيكَا ٥ Oularia obliqua (S).

نظر مجهرية يصيب أوراق الخافض فيلونها .
الخارجية يقع مستديرة خفيفة قطرها من ٦ إلى ١٥ سم .
تركب نصل الأوراق على صفحتها العليا . تغير سمراء
اللون ، حراء الحالة ثم تنصرف إلى السمرة الكالحة التي
يضمها اليباس .

١٨٦٨٢ - عَفَّاشُ الْوُطْسُ ٥ ، عَفَّاشُ كَرَرِي ٥ Oularia sphaeroides (S).

نظر مجهرية يدمر وريقات الروطس فيسبها .
الخارجية يقع سم تركب النصل على صفحته العليا تقيب
يباس البشرة يقابلها على الصفحة السفلى ندف خل ،
أبيض اللون تفرزه اللسان المويضة .

١٨٦٨٣ - عَفَّاشُ الْبَيْمَيْنِ ٥ Oularia citri, O. Bristolii (S).

نظر مجهرية يصيب ثمار الليمون الخافض في قشورها
فيلونها .
مظهر الخارجية يقع برادية أو يضاء اللون
تركب تشرة الشرة قبل اكتمال نمو قشورها وتصلها .

١٨٦٨٤ - عَفَّاشُ التَّحْجِيلِ ٥ Oularia pulchella (S).
نظر مجهرية يركب أوراق التحجيل على اختلاف أنواعه .
مظهر الخارجية يقع صغيرة ، مستديرة ، مبيضة ، غبراء
اللون ، تملو النصل على صفحته العليا يقابلها على الصفحة
السفلى ندف خل أطول اللون .



عفاس أشهب



عفاس متوجج



عفاس مصري



عفاس الخفاف



عفاس الليمون



عفالة



عُذَّةٌ أَبَك



عُذَّةٌ أَبِيض



عُذَّةٌ



عُذَّةٌ



عُذَّةٌ

الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || اجسامها شبه بيضية اللون ، طولها من ٥ الى ٨ سم. رؤوسها معتدلة الجرم ، قليلة التشويز ، يلمعها غلب الكوبل. قرونها الاستشعارية خيطية مركبة من ١١ فصلة. عيونها صغيرة ، ناعسة. تشبهها خيلية. كولاسها مستقيمة ، معتدلة الايدياد. اغادها لافحة ، نخلة التخديد القاطب. قوائمها نشطة. انوارها متباينة الخلفاظ تكثر فيها الحفرة ثم الصمعة فالعرة || الحشرة الجملانة قاصدة ، سريعة الحركة ، تألف ضفاد مجاري الماء اللب ، خاصة الضفاد الرملية حيث تنسج بكرة. القيرة الناجمة وبهشها خاضل.

١٨٧٠٠ - عُذَّةٌ رُيَّاتٌ ° Omophronidae (S).

فصيلة حشرات من رتبة عذبات الاجنحة - اجسامها وانوارها المرفوعة عديدة منتشرة في معظم المنطقة الشمالية وفي افريقية والهند || اجسامها شبه بيضية اللون. رؤوسها صغيرة. قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة. مقدم جوبنها ينفخ سطفور اليريد. حانة البلورة مقوية. كولاسها شبه منحرفة الشكل. مستقيمة الناعضة. اغادها نخلة التخديد القاطب الذي يد ١٤ ار ١٥ اعطوداً. قوائمها نخلة ، معتدلة الطول || مكها شبه اسطواني الشكل ، تمتع افرايدي في التربة. يرتانها سداسية القوائم. قوائمها سداسية الشكل. حورديها مرطاة تنحدر في التربة داخل رواق انبوي الشكل || تعيش على ضفاد مجاري الماء. معظم اجناسها خاضل وبهشها مدفس والبرقة كذلك لكنها لا تسرح في النهار || اشهر اجناسها المُشْتَرُون.

١٨٧٠١ - عُذَّةٌ ° Pulverulent (F). Pulverulent (E).
تنت وتض يدل على الزغب الحمل الذي يثني بعض الاجزاء البائية والحويانية.

١٨٧٠٢ - عُذَّةٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).
جنس حوريات مجهرية بحرية. من الشمسيات. تشيز يملها من الهيكل الصواني الذي تقوم مقام حوصلة كروية نابضة تكتنفها المناسق القلرية.

١٨٧٠٣ - عُذَّةٌ ° هي السقيط ، اطليه.

١٨٧٠٤ - عُذَّةٌ ° هو سندان البرتقال ، اطليه.

١٨٧٠٥ - عُذَّةٌ ° هو الطنان ، اطليه.

١٨٧٠٦ - عُذَّةٌ ° Tannate

١٨٧٠٧ - عُذَّةٌ ° Cécidie, Galle, Bédégaur (F).

Bédégaur, Rose-gall (E).
بثرة مخلفة الاشكال تحصل في نسج النبات تسببها بعض الحشرات او القليقيات || اشهر انواعها واشكالها ما يتبع.

١٨٧٠٨ - عُذَّةٌ القمل Acarocécidie (F).

بثرة في نسج النبات يسببها القمل.

١٨٧٠٩ - عُذَّةٌ جَبَّيْنِيَّةٌ ، عُذَّةٌ بَكْتِيرِيَّةٌ ° Bactériocécidie (F).

بثرة تسببها الجراثيم والبكتيرياات التي تنطقل على النباتات احصاها التجليات وسبها الزروع.

الجبال العالية والقيس الريفية. قوته الاشعاب والجذور والبرام والارواق والثمار والحبوب حل اختلافا || ينش في الخلع. اثناء تبيض من ٨ الى ١٠ يبيض.

١٨٦٩٣ - عُذَّةٌ أَبِيضٌ ° Lagopus albus (S).

Lagopède blanc (F). White grouse (E).
طائر من العذ ، طوله نحو ٤٠ سم. ثوبه الى الابيض الناصع ، اياهه واذنيكه الى السمرة. اما ثوبه الصيفي الرسمي فالى الصبغة والصفرة والجودة ويطوى تزيح اسمر وواج اشع || موطنه المناطق الشمالية. قوته المواد النباتية على اختلافها وبعض الحشرات || اثناء تبيض من ١٢ الى ١٥ يبيض تحضنها بمثابة الذكر في عش تدته في بعض الجنبات الغناء دائماً باتجاه الجنوب.

١٨٦٩٤ - عُذَّةٌ إِكْوَسِيَّةٌ ° Lagopus scoticus (S).

Lagopède d'Ecosse (F). Red grouse (E).
طائر من العذ ، طوله نحو ٣٧ سم. ثوبه الشتوي والشمسي واحد. يكثر في الابيض ، قوامه وياهه واذنيكه الى السمرة الفسحة || موطنه شمالي انكلترا ، يألف المناطق والبيمرات ، قوته الاشعاب والارواق والبرام والثمار والجذور || ينش عشه في الخلع ، اثناء تبيض من ١٠ الى ١٢ يبيض.

١٨٦٩٥ - عُذَّةٌ دُوَّةٌ ° Anchomenus (S).

Anchomène (F). Anchomenus (E).
جنس حشرات دجوية المسرح مقترنة ناعسة من فصلات الاجنحة وفصيلة السلكرتات. انواعه المرفوعة عديدة منتشرة في معظم المناطق المعتدلة الحارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها صغيرة طولها من ١٢ الى ١٧ سم. انوارها بمظهرها عابقة الالوان السوية. يكثر لها الاسود والكشي || يرتانها مقترنة تقضي على الكثير من الحشرات الضارة.

١٨٦٩٦ - عُذَّةٌ ° Sanglier (mâle) (F).

Wild boar (male) (E).
هو ذكر الخنزير الوحشي. ج عفار واحفار.

١٨٦٩٧ - عُذَّةٌ ° Camail (F).

هو ديش حتى الديك وتعرف أيضاً بالبرال Hood (E).

١٨٦٩٨ - عُذَّةٌ القشور ° Aphrophora cortices (S).

Aphrophore des écorces (F).
حشرة من فصيلة السركويات ورتبة متجانسات الاجنحة. جسمها صغير القد ويكوي من ١٠ الى ١٤ مم. || ثوبها متراكب الاصفر والخطي والاسود والانيه. واسها حلالي الشكل ، اصفر اللون ، اسود الجبهة. عطنها ثلاثي الازهار اسود. عيناها كبرتان. زباناها قصيران. كولها مبع بالاسمر والاسود. حقيقتها صغيرة. ظهراتها كامل الحنسية ، لافح ، سطني اللون يملو تشيح اصفر وزغاريف بنية وسود. ووشها غشائيان. بنها الى الخنطي الاسمر. قوائمها مبلقة || مسرها سراج الصنوبر. تعيش بين القشور وتحتها. يرتانها غاضلة تعيش على اوراق الاشعاب.

١٨٦٩٩ - عُذَّةٌ ° Omophron (S).

Omophron (F). Omophron (E).
جنس حشرات ناعسة من فصيلة الغفونيات ورتبة عذبات الاجنحة. انواعه المرفوعة عديدة منتشرة في بعض المناطق

- Drogali** ١٨٧٢٢ - **عَفْصَة حَشْرِيَّة** (F). Entomocécidie (F).
بثرة تسببها الحشرات عند لمسها أوراق النبات .
راجع زرع العفر .
- Ovulariopsis (S).** ١٨٧٢٣ - **عَفْصَة** *
جنس فطور مجهرية ، وسيد النوع ، من الطليحات
وفصيلة الوطليحات || جرابه الكنيدي اسطواني الشكل
يحمل في طرفة كنيده واحدة بيضيه || تونه المروف
عفصية القطن .
- Ovulariopsis gossypii (S).** ١٨٧٢٤ - **عَفْصَة القُطْن** *
فطر مجهرى يركب أوراق القطن فيؤذيها || منظره
الخارجي يقع خلية ، قصيرة الزغب ، لا يقاسية الشكل
والجسم ، تملأ النصل قبلو كالإبريداء || أضراره
محدودة ، وثيقة الصلة بكثرة الرطوبة الجوية ، لا تستوجب
اللكانة .
- Amphicyllis (S).** ١٨٧٢٥ - **عَفِيل** *
Amphicyllis (F). Amphicyllia (E).
جنس حشرات من فصيلة اليبوديات ورتبة غمديات الاجنحة
انواعه المروفة قليلة العدد اعطائها معظم مناطق البلاد
المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، محدودة ، نصف
كروية الشكل ، قطن نحو ٢ م . رؤوسها مستعرضة ،
ميوئيا قليلة البروز . تأشيرها بذكوكها قياسية . ملاسها
الفكية قصيرة . قرونها الاستشعارية صليانية . كواسها
مستعرضة . انماحدها لاسفة . قوائها ذليقة ، مهدبة .
اثوابها لامة يكثر فيها الجلودى والامود البنفسجي المواج
والكتشي الاسفع || تعيش على الفطور وعلى الاخشاب
السائرة الى الانحلال .
- Ptomaline (F).** Ptomain (E). ١٨٧٢٦ - **عَفِين** *
عنصر قلوي التركيب ينجم من انحلال المواد العضوية .
ج حفيفات .
- Jauge (F).** Trench (E). ١٨٧٢٧ - **عَقِي** *
حفرة مستطيلة في الارض توضع فيها الفراس المغلقة من
المشتل ريثما تنرس في مستقرها .
- H'Aigle (F).** Aquila (E). ١٨٧٢٨ - **عَقَاب** *
العقاب كوكبية نجوم شمالية الموقع . مركزها بين كوكبة
حور وسية وكوكبة الدلن . عدد نجومها ١٥ اشهرها
« الطير » او « النسر الطائر » الذي يوجه النسر الواقع
من كوكبة النشائرة . ثم « الشاهين » و « ذنب العقاب »
و « انور الظليين » في ذنب العقاب .
- Aquila (S).** Aigle (F). Eagle (E). ١٨٧٢٩ - **عَقَاب** *
جنس طير من الكواس وفصيلة الصقريات يشمل اُنبل
الجوارح واعتادوا واشدها بأساً وابيسها مزاجاً واحدها بصرأ
واسرها طرائفاً || انزاعه عديدة بعضها مسررة ، قوية
الغالب الحادة ، قصيرة النسر ، محبة البهار اللرية .
تصيد فريستها ولا تقع على الجيف الا اذا ضحها الجوع .
تدثر اركانها في قم الجبال بين الصخور الناتئة او في
قنان الاشجار البسقة . انائها تقع من وقتين الى اربع
رئات تحضنها وسحها نحو ٦ اسابيع || قيل فيه : العقاب
سيد الطيور والنسر حريقها . كنيته ابو الاشيم وابو الحجاج
وابو حسان وابو الدهر وابو الحمى . واللاتي ام الخوا
وام الشمور وام طلبة وام لوح . من اسمائها : سهوم
لقرة وعقاف مدرب || أشهر انواعه ما يتبع :
- ١٨٧١٠ - **عَفْصَة حَشْرِيَّة** (F). Entomocécidie (F).
بثرة تسببها الحشرات عند لمسها أوراق النبات .
- ١٨٧١١ - **عَفْصَة سَلَكِيَّة** (F). Nématocécidie (F).
تفشم في تسج النبات سببه بعض الحشرات السلكية .
- ١٨٧١٢ - **عَفْصِيَّات** (F). Gallicoles (F).
هي الآبرات فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة .
- ١٨٧١٣ - **عَفْصِيَّة** * Cynips (S).
جنس حشرات من فصيلة الآبرات . راجع آبرة .
- ١٨٧١٤ - **عَفْط** * Ebrouement (F).
نثر الشاء بأنفها او سحاس المامز .
- ١٨٧١٥ - **عَفْن** * Chancre (F).
Moisture (F). Mustiness, Mouldiness (E).
فساد من قودة او غيرها يصيب المأكول والبار والمسالق
والجوب .
- ١٨٧١٦ - **عَفْن** * Chanci, Mold (F).
Mouldy, Musty (E).
ما هو مصاب بالفن .
- ١٨٧١٧ - **عَفْطُوس الصَوْنَر** (S). Aphanus pineti (S).
Aphanus des pins (F).
حشرة غاشغة من فصيلة الطرايث ورتبة غمديات الاجنحة .
جسمها مستطيل الشكل ، بسيط ، يطول نحو ٨ م .
رأسها شبه مخروطي الثورن ، أسود اللون . غشطها متدل
الطول ، أسود . عيناها صغيرتان . زباناها مستطيلتان .
كولها لمعب النصف الخلفي ، أسود النصف الامامي ،
يلغو في كل من جانبيه نقطة سوداء تتابع القاعدة .
حبشها مزوانية ، سوداء ، ويلغها خيطان ملحيان . بطها
أسود اللون ، ابيض الحار . قشراتها اغمبر . قوائها مسنة
الظنايب || مسرحها غابات الصنوبر . تتركب ازهار
ولوراق النباتات البرية .
- ١٨٧١٨ - **عَفْصِيَّات** (F). Mucorinées (F).
فصيلة فطور مجهرية من رتبة النظريات ورتبة البيضيات .
- ١٨٧١٩ - **عَفَر** (F). Anon (F). Ass's foal (E).
ولد الحمار والائى عفوة . ج عفاه .
- ١٨٧٢٠ - **عَفْطُوس** * Aphycus (S).
Aphycus (F). Aphycus (E).
جنس حشرات نافعة من فصيلة الشراقيات ورتبة غشائيات
الاجنحة المضمورة . انواعه المروفة قليلة العدد موطنها
بعض مناطق البلاد الحارة . جميعها تتطفل على الحشرات
المؤذية من ذوات الجناحين والحرفشيات || اجسامها صغيرة
القد تطول نحو ١ م . رؤوسها نصف دائرية الشكل .
قرونها الاستشعارية غبيطة . جواسها اسطوانية . بطونها
قصيرة ، غريبة الموضع ، مهدبة التراجبات . مرزاتها
قصيرة . اثوابا تزاوج من الوردي الى البني . اجنتحها
موتجة بالازرق القاتم .
- ١٨٧٢١ - **عَفْطُورَة** Pourriture (F).
Rot, Rottenness (E).
اسم شامل يطلق على عدة اوصام تصيب النبات بمختلف
انصائه سببها فطور مجهرية مختلفة .



مثيل

١٨٧٣٨ - عُقَاب مُسَيَّرَة ، عُقَاب الْبَادِيَة ، خُمْلَارِيَة

Aquila pennata, A. minuta, A. nipalensis (S). *Aigle botté, A. nain, A. des steppes* (F). *Steppe eagle, Booted eagle* (E).

طائر من العقاب الصغيرة لقد ، طوله نحو ٥٠ سم. وبسطه ١٢٠ وهو اسمر السطحين الظهر والجنب ، ابيض المنكبين والصدر والبطن || اصطناع البقلا الحارة والممتدة يحويها باستمرار وهو لا يفرق الاسراج الكثيفة والبادية لكنه لا يتعلم من ورود مجاري الماء || والعقاب المسيرة تألف الحياة المجاورة سربها يراوح بين ثلاثة ستة أزواج . تصيد القوامش والبرقش والزرزور والزاغ . انتاء تحضر مرة واحدة في السنة من رشتين الى ثلاث رفات.



عقاب ذهية

١٨٧٣٩ - عُقَاب مُؤَزَّرَة

هي السهوك ، طائر من العقاب ، اظلمه .

١٨٧٤٠ - عُقَابِيَة . *Biogenèse* (F). *Biogenesis* (E). نظرية بيولوجية تمارس النظرية القائمة بالتنازل الذاتي . عودها ان كل كائن حي يتولد من كائن حي آخر .

١٨٧٤١ - عُقَابَدَة . *Insolubilité* (F). *Insolubility* (E). صفة الاشياء التي لا تنحل .

١٨٧٤٢ - عُقَابَر هو اسمر ، اظلمه .

١٨٧٤٣ - عُقَابَر ، عَيْن ثَابِتَة

Immeuble, Bien-fonds (F). *Real, Real property, Estate* (E).

هي مال لا يمكن نقله من مكانه بحكم طبيعته او بتخصيصه والامكان الثابتة تصنف الى اربع فئات : || الاراض : || الاراض التي لا يمكن نقلها من مكانها بحكم طبيعتها كالارض والشجر والمنازل || الثانية : الاموال الثابتة بالتخصيص وهي طبيعتها ايمان منقولة الا ان صاحبها الحقها بين ثابتة فأكسها لقانون صينة الثبوت . الثالثة : الاموال الثابتة بالاضافة او بالتعلق وهي حقوق تنصب على من ثابتة غير حق للملكية || الرابعة : الاموال الثابتة بقرار المالك وهي حقوق منقولة يفيض عليها صاحبها صفة الثبوت مجازاً بقرار منه .

١٨٧٤٤ - عُقَابَر مُؤَزَّرِيَة . *Fonds dominant* (F). العقار المرتفع او المرفوع هو الذي ينفذ من الارتفاق .

١٨٧٤٥ - عُقَابَر مُؤَزَّرِيَة . *Fonds servant* (F). العقار المرتفع به او الخادم هو الذي عليه حق ارتفاق لعقار آخر .

١٨٧٤٦ - عُقَابَر

العقار : عشية ترتفع قدر نصف القمامة وقره كاليندق وهو مغطى البتة ولا يأكله شيء حتى انك ترى الكلب اذا لايه يموي ، ويسعى عقار ناعمة . وناعمة امرأة طينته ريمه ان يلعب الطبع بناتله فأكلته فقلها (اللسان) .

١٨٧٤٧ - عُقَابَرِي . *Foncier* (F). *Landed* (E). كل ما له صلة بالعقار كالمصرف العقاري والضريبة العقارية الخ .

١٨٧٣٠ - عُقَاب الْبَادِيَة

هي العقاب المسيرة ، اظلمه .

١٨٧٣١ - عُقَاب الْبَحْر

هي المورينا ، سمكة من الشفنيات ، اظلمه .

١٨٧٣٢ - عُقَاب الْبَحْر الْجَفَافَة

Mourine commune (F).

هي المورينة الميولة ، سمكة بحرية ، اظلمه .

١٨٧٣٣ - عُقَاب الْفَطَة

هي الفشة الثالثة ، اظلمه .

١٨٧٣٤ - عُقَاب ذَهَبِيَّة * ، عَجَزَة لَمَاعَة

Aquila fulva, A. chrysaetos (S). *Aigle doré, A. royal, A. fulva* (F). *Golden eagle* (E).

طائر من العقاب وهو اجملها قدراً واضلها جنة واندما بأساً وبطشاً . طوله نحو ١٠٠ سم. وبسطه مقطوع نحو ٣٠٠ سم. لونه الى الصبغة الخفية يملوها توشح اسمر . رأسه صفته ذهبيا الريش . اما باطن مقطوع فكتبي ابيض . زيمكاه كدراء اللون . ذنبه الى الصبغة السمره يملوها تجميع متمرس || تألف الجبال الشاهقة للمنية ، تمش وكها في صدور المسنور الناتئة او في امالي الاجنار الكبيرة الباسقة . انتاء تبيض مرة في السنة نحو ثلاث رفات تحضنها وسدحا نحو ستة اسابيع || وهي تصيد كل ما دب وطار واستطاعت اليه سيك . وقد تفضل الشواة والوطيل والحمرزة والحسل ثم الثعلب والكلب والزرزب والسنور . لكنها لا تمتع من البيل والارباب والسمور والتفند والفاق والزاغ والحسل الخ .

١٨٧٣٥ - عُقَاب رَمَحَاء هي الرخاء ، اظلمه .

١٨٧٣٦ - عُقَاب صَعْبَاء * ، عَجَز الْأَرَب

Aquila clanga, A. naxos (S). *Aigle criard* (F). *Spotted eagle, Rough-footed* (E).

نوع من العقاب كبير الجثة ، طوله نحو ٧٢ سم. وبسطه مقطوع تقرب ٣٠٠ سم. ثوبه الى السمره الموشة يملوها موشج اسفر زديدا لمة واسوداداً || اصطناعها امالي القديم وهي من الطيور الآتية التي لا تهجر حليها اذ اعتاد شتداد الحر في ايمان الصيف لتعود اليه عند قدوم الشتاء كما تألف مجاري الماء وترطب في الاماكن الرطبة || انتاء تحضر رفتين مرة واحدة في العام وحضنها يندوم ستة اسابيع . وهي من الطيور الناعمة اللوحيه ساهيتها لانها تقضي على جميع القوامش والزناجات بما فيها الاناعي .

١٨٧٣٧ - عُقَاب قَيْصَرِيَّة * ، عَجَلَة ، عَاطِيَة مَلِك الْعُقَابَان

Aquila imperialis, A. heliaca (S). *Aigle impérial* (F). *Imperial eagle* (E).

طائر من العقاب كبير الجثة ، طوله يراوح بين ٨٠ و ٩٠ سم. وبسطه مقطوع من ٢٤٠ الى ٢٦٠ سم. ثوبه اصدا الصبغة ، اسفر الموشج . ذنبه تتجاسر غريش يملوها توشح مريض لا يقاس الشكل والحجم || وهو من القوامش التي تجرب العالم . يألف الاسراج والسهول ولا يخش الااااا الاكله . يندش وكته في فنان الانجار الرقيقة او في صدور المسنور الناتئة . انتاء تحضر وسدحا مرة في للعام من رفتين الى ثلاث رفات || يصيد الارويل والياوور والثعلب وكبير الطير ويغني على جميع القوامش من اي نوع كانت.



عقاب سماء



عقاب قيصريّة

الشكل . اذناها مجدانية . اقلها مجبقة تكثر فيها الكلبة الصفراء يملونها بتقبح اغضر بنفسجي المواج .

18754 - **عَقَان** و **مَلَخ** (F). Dragon (F). Sucker (E). قضيبي ينمو من برعة عرضية ناشئة على اربعة او جلد بعض النباتات الملقحة .

18755 - **عَلِكِب** (F). Calcanéum (F). علكيب هو مؤخر القدم .

18756 - **عَقَب** (F). To vary or rotate (E). رتب الزراعات الخلفية على طريقة دورية تماثلية وفقاً للمحاج خاص يعرف بالدورة الزراعية .

18757 - **عَقْبَان** (F). Aigles, Aquilions (F). عارة طير من فصيلة الصقريات تشمل ثمانية اجناس وهي العقاب والهوك والنس والتفتة والدولف واليمتق واليشيطة والسرولف . جميعها كبيرة الجثة قوية المنسر الجالس الانتصاب الاسحين البهرة الشديدة الانعقاد الحادة الطرف .

18758 - **عَلِكِي** (F). Calcanéen (F). علكي

18759 - **عَقِي** (F). Biogène (F). تمت ترميزي يطلق على ما يحدث الحياة او ينشأ الخصائص الحيوية ويهضها .

18760 - **عَقَمَة** و **عَقِمَة** (F). Variété (F). Variety (E). هي الشرب ، اطليه .

18761 - **عَقْد** و **قَوْس** (F). Cintre (F). Arch, Curve (E). هو القوس الخشبي الذي يستعمل لبناء المقعد عليه وهو البناء حل شكل قوس .

18762 - **عَقِيد** (F). Trachelospermum (S). Trachelosperme (F).

جنبة عازشة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اورقانها متقابلة معتقة ابيدة . نصلها يهفي الشكل ذرب الزمام الاشهر بطول نحو ٧ سم . ويرس ٤ . وهي طيبة نائمة تلسم المراح بصرمة ويدون زفل ا زغارها يهض اللون ، حرفة الزائحة ، عذقة التجميع ، تاجية الاروكاز . ثمارها جراه اسطوانية الشكل تطول نحو ١٥ سم . يزورها مستيلة القزعة البورية ا زغارها يستمر من نيسان الى ايار .

18763 - **عَقْد** (F). Nouaison (F). راجع انتقاد - هو في النبات بدء تكوين البزرة بدء اتصال الواليع بالبيضية اي بدء انحصائها .

18764 - **عَقْد** و **عَمَل** و **قَصْرَف** (F). Acte (F). Deed (E).

هو الابانة التي تنشأ آثاراً قانونية وقد صار تدوينها في وثيقة كتابية تثبت مصتها .

18765 - **عَقْد** (F). Contrat (F). المقد والاتفاقه هو توافق الارادة بين اثنين او أكثر حل انشاء التزامات فيما بينهم .

18768 - **عَقَاصَةُ الْعَنْبِ**

هي اوديس الكربة ، اطلها .

18769 - **عَقَالَة** (F). Dent canine de la vipère (F). Canine tooth of the viper (E).

هي التيب المدية الطرف ، الانبوية او الخددة التي تستعملها الانبي لبع السم . ج عقاف .

18770 - **عَقَافَةُ الزَّرْدِ**

Argyroplote ochroleucana (S). Argyroplote du rosier, Tordeuse du rosier (F). Argyroplote ochroleucana (E).

حشرة من فصيلة العائلات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبية . فراشها صفة تمشي على غزونها الامحالي . سرقتها خاضعة تمشي على اوراق الورد بعد ان تنقلها ويضاح من التواس . جسمها صغير القد بطول من ٧ الى ٨ سم . بسطها ترانح من ٢٠ الى ٢٢ سم . رأسها معتدل الحجم ، صغير الخلم ، الشهب اللون ، سبوري المواج . عينها زهنيان ، صغريتان ، نازرتان . زيانها غيظيان . ملاسها الفككة والشقوية صغيرة . مرشها جعدة . جوشها ويطها الى الشبهة . روضها الاسمان الى الطلعة الزاهرة يملوها تجلج اشهب تكنته ماجة زرقاء . روضها الخلفيان الى الشبهة السبورية . اهداها صامية ا لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في اواخر نيسان وفراشة الجيل الثاني في اواسط تموز . تسرح في الليل وتبيت في النهار . والاني تلقي المكن ميحادي او لطفاً صغرة ورتبة المدد تنقلها مادة خروية تتهب على الصفحات العليا من نصال الاوراق ا للور اليربي يستمر في الجيل الاول نحو ثمانية اسابيع ويستمر في الجيل الثاني نحو ١٧ اسبوعاً وينتضي على الاوراق التي تنغنها السرفة وتعيش في داخلها حل الخضيب والمصاراة السرفة او الادراك تمام تطول نحو ٢٠ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستضف الوسط ، اغضر اللون ، اصفر المواج ، يملو في كل سكة من سكم البطن طوق من التمرل السود الخنسية بالهلب . رأسها ودقها الصغرية الى السرة السوداء ا طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ١٥ يوماً ، يستمر في الجيل الثاني نحو ٢٠ اسبوعاً وينتضي ضمن وثقة مفتولة كالبوق وشبكة جنيوط حربية الماددة .

18771 - **عَقَاق** و **عَقَق** (F). Gestation (F). Pregnancy (E).

المَعَقَّ والمَعَقُّ : الحمل عند الحيوان عامة وعند ذوات الحافز خاصة . والحمل من ذوات الحافر تدعى المَعَقَّق ج عَقَقَّ وعَقَقَّ .

18772 - **عَقَاقِير** (F). Drogues (F). Drugs (E). ما يتناول به من الادوية . وقال الجوهري : العقاقير اصل الادوية .

18773 - **عَقَام** (F). Platurus (S). Plature (F). Platurus (E).

جنس حيات خفية سامة من اساميات الاخاذيد وفصيلة الهيدرويات . انواعه المعروفة قليلة المدد اسطواناتها بحار البلاد الحارة اغصها البحر الاحمر والمحيط الهندي وبعض مناطق المحيط الهادي ا اجسامها مبطلة مستطيلة ، تطول من ١٢٠ الى ١٤٠ سم . رؤوسها صغيرة شبه مخروطية



عَقَافَةُ الزَّرْدِ



عَقَام

18779 - **عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ** Contrat à titre onéreux

هو ما أخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلًا لما أُعطي .

18780 - **عَقْدُ الرِّعْدِ ، مَشْرُوعُ الْعَقْدِ**

Avant-contrat (F). Advance contract (E).

هو الاتفاق الوقفي الذي ينفذ مع تحديد المسؤولية للمفائة
على تحقيق الاتفاق للقول .

18781 - **عَقْدُ الرِّكَالَةِ ، تَوْكِيلٌ ، وَكَالَةٌ**

Mandat (F). Mandate (E).

عقد يُعْمَلُ به المرء غيره أن يفعل باسمه شيئاً له . أما صيغ
الوكالة فمعددة منها العامة والخاصة والصريحة والصفيّة
والتفريعية والتبائية .

18782 - **عَقْدُ بَيْعٍ تَامِيْنٍ**

Contrat pignoratif (F). Pignorative contract (E).

عقد التراض على شكل البيع بالوفاء يبيع به المقرض
مقاراً إلى المقرض ولكنه يحتفظ بحقّه بجزء الفغار للبيع ويبيع
سواءً المقرض فوائد قرضه .

18783 - **عَقْدُ تَبَادُلِيٍّ ، عَقْدُ مَلْزَمٍ لِلطَّرْقَيْنِ**

Contrat synallagmatique (F). Indented deed (E).

هو الذي يلتزم فيه كل فريق من المتعاقدين نحو الفريق
الأخر كمقتد البيع فانه يتقابل فيه التزام البائع بتخل
ملكته المبيع وتسليمه . والزام الشاري بدفع الثمن وتسليم
المبيع .

18784 - **عَقْدُ تَبَوُّعٍ** Acte à titre gratuit (F).

عمل قضائي قوامه تملك حق أو مال بلا بدل يؤخذ أو
معارضة تشترط .

18785 - **عَقْدُ تَعِيْمٍ** Contrat accessoire (F).

Accessory contract (E).

هو ما كان تابياً لمقد أصلي قائم قبله كالكفالة والرهن .

18786 - **عَقْدُ تَحْفَظِيٍّ ، عَمَلٌ تَحْفَظِيٌّ**

Acte conservatoire (F). Conservative deed (E).

عمل يراد به إنقاذ مال من خطر ملح .

18787 - **عَقْدُ تَرَاضٍ** Acte consensual (F).

Consent deed (E).

هو العقد الذي يكفي لانفاذه الإيجاب والتقبل بين
المتعاقدين مهما كانت طريقة اجراءه .

18788 - **عَقْدُ تَوْكِيدٍ** Acte confirmatif (F).

Confirmative deed (E).

عقد قانوني يُزِيلُ به عاقده عيوباً كانت لصيقة بهتد
سابق .

18789 - **عَقْدُ جَمَاعٍ** Contrat collectif (F).

Collective contract (E).

هو الذي ترتب له أفراد جماعة معينة بمجرد رضاه متوحد .

18790 - **عَقْدٌ حِكْمِيٌّ** Quasi-contrat (F).

Implied contract (E).

المقد الحكمي أو شبه المقد تسمية تطلق على الالتزامات
التي يتكون مسبقاً أعمالاً إرادية مفضة قد ينتج منها تمهيدات
للغير كالتفاداة ودفع غير المستحق ، الخ .

18791 - **عَقْدٌ عَلَى التَّخْفِيفِ**

Acte à titre particulier (F).

هو تملك عين أو أصنام سماعاً أو بابها .

18792 - **عَقْدٌ احْتِيَالِيٌّ** Contrat aléatoire (F).

Aléatory contract (E).

ويدعى عقد المخاطرة أو عقد الفرو . عقد يشترط فيه
للمتأقدين أو أحدهم سخطاً من الربح أو أماناً من الخسارة
إذا وقع حادث غير مضمون الخلوث .

18793 - **عَقْدٌ إِدَارِيٌّ** Contrat administratif (F).

Administrative contract (E).

هو كل عقد تفتده الادارة في سبيل إنجاز أعمال عامة
أو خاصة مردحا المنفعة العامة أو الخاصة .

18794 - **عَقْدٌ أَوْسَمِيٌّ** Contrat solennel (F).

Solemn contract (E).

هو الذي لا يكفي لانفاذه اقتران القول بالإيجاب بل
لا يكون صحيحاً إذا لم تتبع في تكوينه مراسم خاصة
حددها القانون .

18795 - **عَقْدٌ اسْتِثْنَائِيٌّ** Fiducie

عقد يلتزم به مشتري العقار ظاهراً بأن يرده إلى البائع
سبباً يليه له بالالتزامات التي تطها على نفسه نحوه .

18796 - **عَقْدٌ إِسْتَادِيٌّ** Acte attributif (F).

Attributive deed (E).

هو عقد موضوعه نقل حق إلى شخص أو استأذه إليه .

18797 - **عَقْدٌ أَصْلِيٌّ** Contrat principal (F).

Principal contract (E).

هو ما كان مستقلاً عن عقد آخر كالبيع والإيجار .

18798 - **عَقْدُ الإِدْهَانِ** Contrat d'adhésion (F).

Adhesion contract (E).

هو عقد وضع شروطه الجبرية مقدماً أحد طرفيه ليشتمل
بها مع كل من يرغب في التماسل معه .

18799 - **عَقْدُ التَّبَوُّعِ** Contrat à titre gratuit (F).

Gratuitous contract (E).

عقد يولي به أحد الطرفين الطرف الآخر فائدة بلا عوض .

18800 - **عَقْدُ التَّرَاضِيِّ** Contrat consensual (F).

Consensual contract (E).

هو الذي يكفي لانفاذه اقتران القول بالإيجاب .

18801 - **عَقْدُ الْجَوْرُ** Vipère commune (F).

Common viper (E).

حيّة خبيثة سامة تسمى أفعى مبلولة . اطلبها .

18802 - **عَقْدُ الْخَطِّطَيْنِ**

عقد خططين كوكب ثمر من الرشاء . اطلب رشاء .

18803 - **عَقْدُ الْعَمَلِ** Contrat de travail (F).

Labour contract (E).

هو التماقد الذي يرصد امرؤ به نشاطه وسمافه على خدمة
امرئ آخر فيسبل تحت اشرافه مقابل جمل يلقى اجرة .

وهو في العرف التماقد المتماقد الذي يمدل بموجبه العامل
لدى رب العمل .

18804 - **عَقْدُ الْعَمَلِ الْمُشْتَرَكِ**

Contrat collectif de travail, Convention collective

de travail (F). Collective contract of labour (E).

هو تماقد جامع يرم بين رب العمل أو خطليه وبين عمال
أحدى النقابات . موضوعه تنظيم شروط العمل التي تحتر
على أسسها التمدد الفردية بين رب العمل وأعضاء هذه
النقابات .

١٨٨٠٦ - عَقْدَةٌ خِتَارِيَّةٌ، عَقْدَةٌ دَرَبِيَّةٌ

في السَّلْمَةِ ، اَطْلِبْ .

١٨٨٠٧ - عَقْدِيَّةٌ

بِكَيْتَرِيَّةٍ مُسْتَدِيرَةِ الشَّكْلِ تَعْرِفُ بِالسَّيْحَةِ ، اَطْلِبْ .

١٨٨٠٨ - عَقْرَبٌ ، قُصْبُلٌ

Scorpio (F). Scorpion (E).

المعرب للذكر والانثى حل السواء. ج. عقارب. وعند التخصيص يقال للذكر عقربان وللأنثى عقرباء وعقربة || والمعرب جنس دوبيات خبيثة سامة من فصيلة الشبديات ورتبة الميريبات. انواعه عديدة مختلفة الاحجام والالوان. طولها يراوح بين ٢ و ١٥ سم. جميعها دسوية تسرح وتسي في الليل وتختبئ في النهار. تحمل في طرف ذنبها ابرة منقطة، سادة الحمة، جوفاء. تتصل بها غدتان تفرزان مادة قلووية سامة. وهي تستعمل ابرتها للدفاع عن النفس أو لتخدير وقص فرسها من السطاء الضعيفة.

١٨٨٠٩ - عَقْرَبٌ أَسْوَدٌ ، عَقْرَبٌ أَصْفَرٌ

الدَّكْبُ

Euscorpilus flavicauda (S).

Scorpion noir, S. à queue jaune (F).

Black scorpion (E).

نوع من المعرب ينتمي الى فصيلة الشبديات. جسمه صغير القد ، اسود اللون ، اسير الذنب الخفي المارح. يطنه سكي التركيب مفلطح الشكل ينتهي بذبب معتدل الشخانة ، سداسي السكم ، يحمل في اوله ميطشان يملغان الشوار الجنسي ويحمل في طرفه شوكه منقطة سادة جوفاء يستعملها في بث سمه. عينا مركبتان صغيرتان البصر القصير المجال. مقبناه الفكاه كبيراً الجرم. ميطشاه دقيقا الانسان التي يبلغ عددها عشرة ازواج عند الذكر و١٢ زوجاً عند الانثى || الذكر اصغر قدماً من الانثى، يطول نحو ٣٥ سم. اما الانثى فتطول نحو ٤٥ سم || مسرعه دسوي. قوة الحشرات المختلفة الاجناس وسكنها وبقائها || الانثى تسافد بمر ثلاث سنوات وتعيش نحو خمس سنوات. اما الذكر فيعيش الى حين يكرم الانثى التي تقضي عليه || يعتبر من الدوبيات المؤذية الضارة.

١٨٨١٠ - عَقْرَبٌ أَصْفَرٌ ، شَبْدَعٌ أَصْفَرٌ

Buthus australis (S). Buthus jaune, Scorpion

jaune (F). Yellow scorpion (E).

نوع من المعرب ينتمي الى فصيلة الشبديات. موطنه البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من الدال القديم || جسمه كبير القد ، اصفر اللون الباهت. يطنه مفلطح ينتهي بذبب مبسط سداسي السكم. شوكته قوية منقطة جوفاء سادة الحمة. لدغته مؤلمة. سمه شديد الاذى || عينا مركبتان تبصران في جميع الاتجاهات. مقبناه الفكاه مستن الحافة للأنفلة. ميطشاه كبيراً الانسان التي تبلغ عند الذكر ٣٥ زوجاً. وعند الانثى ٢٢ زوجاً || الذكر اصغر قدماً من الانثى ، يطول نحو ٦٥ سم. وتطول الانثى نحو ٨٥ سم. مسرعه دسوي. قوته كل ما دس واستطاع اليه سبيل || الانثى وتلد شبيحة تعيش نحو ست سنوات وتسافد بمر سنتين. الذكر يعيش الى حين يكرم الانثى التي تقضي عليه || يعتبر من الدوبيات الشديدة الاذى والضرر.

١٨٨١١ - عَقْرَبٌ أَكْمَهٌ ، وَشَكٌ

Bélsar, Scorpion aveugle (F). Blind scorpion (E).

نوع من المعرب ينتمي الى فصيلة الشبديات. موطنه

١٨٧٩٢ - عَقْدٌ عَلَى الشُّمُولِ

Acte à titre universel (F).

هو تلك بعض اموال شخص أو كلها بلا تعيين ولا تخصيص.

١٨٧٩٣ - عَقْدٌ عَيْنِي

Contrat réel (F).

Real contract (E).

هو الذي لا يتمد إلا بتسليم المقدور عليه كالتوبة

والقرض ورهن الحياة.

١٨٧٩٤ - عَقْدٌ غَيْرُ مُسَمًّى

Contrat innommé (F). Unnamed contract (E).

هو الذي لم يخصص القانون باسم بل أخضع لشروط واستكانه لقواعد العامة المقررة لجميع العقود.

١٨٧٩٥ - عَقْدٌ فَوْرِي

Contrat instantané (F).

Instantaneous contract (E).

هو الذي يكون تنفيذه فوراً بدأ به متى شاء ذلك المتعاقدان.

١٨٧٩٦ - عَقْدٌ قَضَائِي

Contrat judiciaire (F).

Judiciary contract (E).

هو الذي ينفذه الخصوم امام القاضي خلال الدعوى لينفصوا به موضوعاً متنازعاً فيه.

١٨٧٩٧ - عَقْدٌ مُعْجَدَدٌ

Contrat commutatif (F).

Commutative contract (E).

هو الذي يحدد المتعاقدان فيه مدى التزام كل منهم فيعرف المصلحة ما اعطى والاخذ ما اعدى أو تفاضلا.

١٨٧٩٨ - عَقْدٌ مُزَوَّجُ الْاَطْرَافِ

Contrat bilatéral (F).

Bilateral contract (E).

هو ما عقدته عاقدان بالرضا والاتفاق.

١٨٧٩٩ - عَقْدٌ مُسَمًّى

Contrat nommé (F).

Named contract (E).

هو ما اخضعه القانون باسم معين كالبيع والمقايضة والشركة والوديعة والمارية.

١٨٨٠٠ - عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ

Acte à titre onéreux (F). هو الذي لا يمدد بفائدة حل المقيد له الا اذا قدم بدلاً عنها.

١٨٨٠١ - عَقْدٌ مُتَّعِدٌ

Contrat successif (F).

Successive contract (E).

هو الذي يستغرق تنفيذه مدة من الزمن كالاجارة وعقد السلم والبيع بالتقسيط الخ.

١٨٨٠٢ - عَقْدٌ مُتَّفَرِّدٌ

Contrat unilatéral (F).

Unilateral contract (E).

هو الذي لا ينشئ التزامات الا في جانب واحد. كالمارية فان على المستعير ان يردھا وليس على المار اي التزام.

١٨٨٠٣ - عَقْدٌ لِحَاجِزٍ

Contrat en mains (F).

Contract in hands (E).

من عقد البيع التي لا يترتب لها حل الشاري اي نفقة من تفقات التصحر ورسوم التسجيل ، بل تكون كلها حل البائع.

١٨٨٠٤ - عَقْدُكَاهُ

في خاتم سليمان ، اَطْلِبْ .

١٨٨٠٥ - عَقْدُكَاهُ

Loupe, Nœud (F).

Wen, Knob, Knot (E).

الحقنة والعميرة تنوع خشبي في سوق بعض الاشجار.



معرب أسود



معرب أصفر



معرب أكْمَه

جسمها مرعوية . سوتها مدادة . اوراقها متعاقبة كاملة .
ازهارها فردية ، عوروية ، مستطيلة الزناد ، صفراء اللون .
ثمارها متفحة عديدة وصحبة الطرف ، قريبة الشبه من ذنب
المقرب وين اسارع بعض الحشرات || اعرف انواعها
للبلولة هي :

S. muricatus (S). Scorpione petite (F).
S. varicellatus (S).
Scorpiure grosse (F).
S. sulcatus (S). Scorpione rayée (F).
S. subvillosus (S).
Scorpiure velue (F).

١٨٨٢٠ - عُقْرَبْل
Eléphant pleine (F).
She elephant with young (E).

١٨٨٢١ - عُقْس

Pterocéphale (S).
Pterocéphale (F).
شجرة ممررة زياد من فصيلة البتسليات . ثمارها فواخ .
الشكل . لصلها جامد القسح ، خلي البيرة ، لونه الى
الخضار الاصفر . ازهارها محورية كبيرة القند ، لونها
الى البنفسجي تملو شمسة ودية .

١٨٨٢٢ - عُقْمَة
Pointe de la feuille (F).
Point of the leaf (E).

١٨٨٢٣ - عُقْمِي

١٨٨٢٤ - عُقْمَق ، كُنْدُش
Pica (S). Pie (F).
Magpie (E). Elstern (D).

جنس طير من فصيلة الزربايات . انواعه عديدة ، اصلها
المال . اثارها يتباه . اذنانها طويلة . اسرارها عقيمة .
قوتها الحشرات والجربوب والبار ويؤسس الصائير . وين
طباعها اختلاط كل ما يهر نظرها . تألف الحقائق
والنايات القريبة من الممران . تاقن في الانجار الرقية .
انها تبيض من ٣ الى ٦ يضات تحضنها رسدا نحو ٣
اسباع || وقت اعطفا في سبب تسميتهم عقمقا فقال
المجسط لانه ينق فراشه كسائر الغربان وقيل اشتقاق
من صوته . قال الشاعر :

اذا يارك الله في طائر فلا يارك الله في المقق
طويل الذناب صير الجناح عى ما يجد غفلة يرق
يقلب عييه في رأسه كأنها تطرنا رقيق

١٨٨٢٥ - عُقْمَقُ أَزْرَقُ *

Pica cyanea, Cyanopica cyanus (S). Pie bleue (F).
Blue magpie (E).

نوع من المقق طوله يراوح بين ٣٥ و ٥٠ سم . لونه
ازرق اللون ابيض . رأسه الى السود اللامع . رسدا الى
السرة الخطية . تألف الحقائق والنايات والاسراج .

١٨٨٢٦ - عُقْمَقُ مَرَرَفُ *

Pica caudata (S).
Pie vulgaire, P. bavards (F). Common magpie (E).
نوع من المقق طوله نحو ٥٠ سم . لونه اسود اللون ابيض .
مقار ورسدا الى السرة القاعة . تألف الحقائق والنايات
القريبة من الممران . وهو مبدول في جميع بلاد الشرق
الاسط ويتبر من الطيور المؤدية الشدا .

١٨٨٢٧ - عُقْفُ

Orcha (S). Orxze (F).

الرسدة عفا وهي جنبة صغيرة القند من فصيلة السفايات .



عقرب حنطي



عقربة



مقق ازرق



مقق مروق

البلاد الحارة من العالم القديم . يألف المغاور والكهوف
والاحياء القديمة . مسرعه دجوي . قوته الحشرات ويكسها
والذباب والحرار تقوده اليها حاسة الشم ثم السمع || جسمه
صغير القند يطول عند الذكر نحو ٢٥ سم . ويطول عند
الانثى نحو ٣٠ سم . ثوبه الى السرة الخطية . يلمه مغلط
سكني التركيب ينتهي بذنب سداسي السك يميل في طرفه
شولة جوفاء حادة الحمة يستعملها في بث سمه لتخدير
فريسته من الزود من الحياء || عيناها مركبتان عادتتا البحر
لذلك يدعى العقرب الاكبر || الانثى تميش نحو خمس سنوات
اما الذكر فيعيش الى حين يكوم الانثى التي تقضي عليه .

١٨٨٢٢ - عُقْرَبُ الْبَحْرِ

هو الجلاج ، من الاسماك البحرية ، اعليه .

١٨٨٢٣ - عُقْرَبُ الْمَاءِ

هو سرطان البحر ، اعليه .

١٨٨٢٤ - عُقْرَبُ حَنْطِي * ، شَبَدَعُ حَنْطِي

Buthus occitanus (S). Buthus brun, Scorpion
brun (F). Brown scorpion (E).

نوع من المقرب ينتمي الى فصيلة الشديعات . موطنه جميع
المناطق الحارة من العالم القديم || جسمه متوسط القند ،
حنطي اللون ، مغلط البطن . ذنبه معتدل الطيلع ،
سداسي السك يميل في طرفه شولة جوفاء حادة الحمة .
عيناها مركبتان تبرزان في جميع الاتجاهات لكنها ضميقتا
البصر القصير المجال . ميطا الذكر مركبان من ١٨
زويجا من الانسان . اما ميطا الانثى فن ٢٠ زويجا ||
الذكر يطول نحو ٥٠ سم . والانثى من ٦٥ الى ٦٤ سم .
مسرعه دجوي قوته الحشرات وكل ما دب || الانثى
تميش نحو ست سنوات . اما الذكر فيعيش حتى التيام
بعمليته الكوم || يتبر من الذويبات الشديدة الانثى
والفرور .

١٨٨٢٥ - عُقْرَبَان

Scorpion (mâle) (F).
Scorpion (male) (E).

ذكر المقارب يعيش الى حين يكوم الانثى حيث تقضي
عليه .

١٨٨٢٦ - عُقْرَبِيَّات

Scorpionides
رتبة ذويات شبيهة من التكبويات . فضالها سبع
غخلفة الاشكال والاحجام والالوان . اشهرها فصيلة
الشديعات التي تحوي المقارب .

١٨٨٢٧ - عُقْرَبِيَّاتُ الْمَاءِ

Nepidae (S).
Népides (F). Nepidae, Water scorpions (E).
Wasserskorpione (D).

فصيلة من بق الماء التابعة الى رتبة نصفية الوجة .

١٨٨٢٨ - عُقْرَبِيَّاتُ كَأَذِيَّة

Pseudoscorpionides
رتبة من التكبويات . اجناسها وانواعها عديدة تجتمع
الى فصليتين . حشراتا عادية السم . صغيرة القند ، مبطلة
الاجسام . مستطيلة اللامس .

١٨٨٢٩ - عُقْرَبِيَّة * ، ذَنْبُ الْعُقْرَبِ

Scorpiurus (S). Scorpione, Ornithopce, Chenille,
Chenillette (F). Scorpion's tail, Cascapillar plant (E).
Raupenkraut, Raupenkies (D). Coda di scorpione (I).

جنس نباتات عشبية برية مدادة من فصيلة القرنيات
الفراشية . ازهارها عديدة مهدا حوض البحر المتوسط .

قوائمها نشطة . ثوبها الى البني الاسفع المروج || تألف العبابات التي يكثر فيها الزئان والمملول . قربها مراقبة تميش حيث تنقذ على المواد النباتية المنحلة .

١٨٨٣٣ - عَقْنِيدِيَّاتٌ (S).
Eucnemididae (F). Eucnemididae (E).

فصيلة حشرات من عُنْدِيَّات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجناسها صغيرة ، مستطيلة الشكل . معتدلة التطبيع ، تطول من ٤ الى ١٢ م. رؤوسها مستعرضة القفص . جوبها بارزة . تأثيرها ودياسها نظامية . قرونها الاستشارية متباينة الاشكال منها الخيطية والمشيطة والمسننة والمنشارية ، جميعها مؤلفة من ١١ فصلة . كواسلها لاقامية ، يكثر فيها التريب . امحادها لاسفة . قوائمها نشطة . ارساغها خاسية القفل . اظفارها ملونة || تألف العبابات . معظمها دجوي المسرح . جميعها عاصلة ودامية . يرقاتها مراقبة تميش حيث تنقذ على المواد النباتية المنحلة || اشهر اجناسها الميغشيدي .

١٨٨٣٤ - عَقُوبَةٌ (F). Penaty (E).
Paine (F).

هي الاختصاص من الحزم باسم المختص .

١٨٨٣٥ - عَقُوبَةٌ (F). Correa (S). Corré (F).
جلس نباتات برية ورتينين من فصيلة السذابيات . انواعها قليلة جميعها نجيرات صغيرة القند تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠ م. سوقها فروع زياه . اوراقها ابيدة متعقبة متعاقبة . نصلها اهلجلي الشكل . جامد النسيج ، خلي الصفحة السفلى . ازهارها بوقية ، وديعية البتلات المنصعة ، ثمانية الاسدية . اوراقها زاهية فيها الابيض والوردي والفستقي والاحمر || ازهارها يستمر من نيسان الى تموز .

١٨٨٣٦ - عَقُوقٌ (F). Pleine (F). Full (E).
العقوق هي الاثنى الحاصل من ذوات الحافر والظلف خاصة ج عَقُوقٌ وعَقُوقٌ .

١٨٨٣٧ - عَقِيَّانٌ (F). Or natif (F). Native gold (E).
هو الذهب الصرف الطبيعي .

١٨٨٣٨ - عَقِيَّبٌ (F).
هو المرة الرمضاء ، الحلبا .

١٨٨٣٩ - عَقِيدٌ (F). Insoluble
نمت تمريني يطلن على كل مادة لا تذيب وصل كل عمل حبابي وما اشبه لا ينحل .

١٨٨٤٠ - عَقِيدٌ (F). Plinth (F). Plinth (E).
سطح مربع في قاعدة حرد او في تاجه .

١٨٨٤١ - عَقِيدٌ هَيْدِي (F).
هو الكركم الصبغي ، اطلبه .

١٨٨٤٢ - عَقِيَّصٌ (F).
هو الميراء الزياه ، الحلبا .

١٨٨٤٣ - عَقِيَّاتِيَّاتٌ (S). Calotermitidae (S).
Calotermitidae (F). Calotermitidae (E).

فصيلة حشرات قارضة دجوية من رتبة العنقانيات . انواعها عديدة جميعها غليظة الرؤوس ، قوية المشافر ، عادمة الرياين . قوتها المواد العضوية والسيلولوزية . نياكها رداء

بائها فروع تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها لاطنة متعاقبة سنانية الشكل . نصلها يطول نحو ١٥ سم. وهو جامد الصلابة ، خلى البشرة . جنثي العرف . ازهارها متفوي التجميع ، محوري الاوتكار . ازهارها صغيرة القند ، صفراء اللون . اوراقها غزيرة للمادة الجمالية القمالة تقتل الشاة والبقرة ، تؤذي المزر ولا تضر بالابل .

١٨٨٤٨ - عَقِيَّاتِيَّاتٌ (F). Isoptera (F). Isoptera (S). Isoptera (E).

رتبة حشرات قارضة صغيرة الجسم ، مستطيلة الشكل ، غليظة الرأس ، قوية المشافر الحادة ، طويلة الاجنحة عند وجودها . نظامها الاجتماعي والاقتصادي نظام النمل . تبني نياكها تحت الارض وقوتها ودخل الاشخاب . اشهر فصائلها : الارضيات والعقانيات .

١٨٨٤٩ - عَقْلَةٌ ، قَسَلَةٌ ، قَسَمٌ ، عَقَبٌ (F). Bouteur (F). Slip (E).

قصب او جزء من قصب يفصل عن النبات ويفرس . والقفل تقع على اشكال مختلفة احصاها :

عَقْلَةٌ برعية او زيمية (F). Bouteur à cell (F). Slip for bud (E).

عَقْلَةٌ جذرية (F). Bouteur par racine (F). Slip by root (E).

عَقْلَةٌ جمودرية (F). Bouteur de rhizome (F). Slip of rhizome (E).

عَقْلَةٌ ديبية (F). Bouteur à talon (F). Slip at butt (E).

عَقْلَةٌ فندية (F). Bouteur par rameau (F). Slip by bough (E).

عَقْلَةٌ عُنْبِيَّةٌ (F). Bouteur à cressette (F). Slip for cutting (E).

عَقْلَةٌ ورقية (F). Bouteur par feuilles (F). Slip from leaves (E).

١٨٨٤٠ - عَقْمٌ ، عَقَبٌ (F). Stérilité (F). Sterility (E).
العدم والقسم : حال الاثنى التي لا تحمل .

١٨٨٤١ - عَقْنُفَصَةٌ (F). Volucella (S). Volucella (F).
جنس حشرات من فصيلة السرفيديات . انواعها عديدة . طوطا يراوح بين ١٢ و ١٨ م. تتميز بسرعة طيرانها وافرار ازوارها الخمدية واللديجة بالاسود والايض . يرقاتها قاسية الجلد ، كثيفة الحلب للتسثيل . معظمها يعيش على هي ووسع الزنايزب والرقاقط وما اشبه . اشهر انواعها :

عَقْنُفَصَةٌ زياه (F). V. bombylians (S).

عَقْنُفَصَةٌ شفاطة (F). Volucella bourdon (F).

عَقْنُفَصَةٌ شفافة (F). V. pellucens (S).

عَقْنُفَصَةٌ شفافة (F). Volucelle transparente (F).

عَقْنُفَصَةٌ منقطة (F). V. zonaria (S).

عَقْنُفَصَةٌ منقطة (F). Volucelle zonée (F).

١٨٨٤٢ - عَقِيدٌ (F). Eucnemis (S). Eucnemis (F). Eucnemis (E).

حشرة وبيدة الجنس والعنق من فصيلة العنقديات ورتبة غنديات الاجنحة . اعلطانها بعض مناطق اوروبية الشمالية والوسطى وبيال الشرق الاقصى || جسمها صغير القند ، مستطيل الشكل ، قريب الشبه بالنسائل . طولها نحو ٨ م. رأسها صغير . صيهاا بارزتان . تأثيرها ودياسها الفكية مستقلة الجسم . زباناها مشطيان . كواسلها شبه مربع الشكل . غمداهما لاحتقان يملوهما تحفيد تحيل قاطب .



منقصة زياه



منقصة شفافة



منقصة منقطة

١٨٨٥١ - عِكْبَابِيَّةٌ عَمَلِيَّةٌ

Tradescantia pilosa (S). *Ephémère velue* (F).
عشبة زُرْبَانِيَّةٌ معمرة تملو نحو ٥٠ سم. أزهارها شفافة
فراءة. أوراقها لائقة متعاقبة. تصلها صني الشكل،
خلي البشرة حل صفحته يطول نحو ٢٥ سم. ويعرض
نحو ٢ سم. أزهارها كثيرة العدد ليلكية اللون || أزهارها
يستر من سيزان إلى تشرين الثاني.



عَفِيفَان

١٨٨٥٢ - عِكْبَابِيَّةٌ فِرْجِيَّةٌ

Tradescantia virginiana (S). *Ephémère de Virginie* (F).
عشبة سرْبُونِيَّةٌ معمرة ساقها متعقبة فراءة تملو نحو ٦٠ سم.
أوراقها لائقة متعاقبة. تصلها شيق الصفحة مدبب
المقصة يطول نحو ٣٠ سم. ويعرض من ٢٥ إلى ٣٠ سم.
أزهارها جميلة الشكل تعرض نحو ٢ سم. ألوانها تختلف
باعتلاف الظروف فيها الأزرق والبنفسجي والأبيض
والوردي والآخر || أزهارها يستر من أيار إلى تشرين.

١٨٨٥٣ - عِكْبَابِيَّةٌ وَرْدِيَّةٌ

Tradescantia rosea (S). *Ephémère rose* (F).
عشبة سرْبُونِيَّةٌ معمرة تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها شفافة
النصل عذبة تطول نحو ١٨ سم. تعرض من ٢ إلى ٣ سم.
أزهارها وردية اللون مستطيلة الزناد || أزهارها يستر
من سيزان إلى تشرين الثاني.



عَفِيفَة

١٨٨٥٤ - عِكْبَارَةٌ
Génophère (F).
تختلف أشكال الانفعالات البيئية التي تهو على عكر
موصوف معين.

١٨٨٥٥ - عِكْكَس
Araignée (mâle) (F).
Spider (mâle) (E).
ذكر النكبوت.

١٨٨٥٦ - عِكْكَاس
Communtatrice,
Permutatrice (F). *Rotary converter, Rectifying*
commutator (E).
الكاس جهاز خاص يسمح بتحويل التيار الكهربائي
من متواصل إلى تناوبي والعكس بالعكس.

١٨٨٥٧ - عِكْكَاش، عِكْكَاشَة
Toile d'araignée (F). *Egagrop, Spider-work* (E).
الكاش والمكاش والمكاشة: بيت النكبوت.

١٨٨٥٨ - عِكْكَاشِي *
Orbitale, Orbitaire (F).

نمت ثمريني يطلق حل النكابت التي تتجج حكاها
كالشعاع. فواسه سهل الانكشاف، جبه المنة، شديد
لغة، يستعمل في تحديد لفاقيس المجهرية.

١٨٨٥٩ - عِكْكَاشِي *
Cosmopolite (F).
Cosmopolite, Cosmopolitan (E).

حفة المدينة الجامعة من كل طوائف البشر وصفة من
اسب جميع البلدان وأهلها ومن اعتبر العالم كوطه او
من كان العالم وطه كعفس الحيوان والمير والنبات.

١٨٨٦٠ - عِكْكَامَة *
هي المنة، الملهة.

١٨٨٦١ - عِكْكَير
Pollen récolté (F).
جذرات الويلع يجي بها التحل عمل ارساغها وسبقها
وانفادها فتجعلها في الشهد.



عِكْبَايَة

وانفاد دبحايز قنينا بالطين في التربة وعلها ووق الاخشاب
التي تفرحها || تميش في الظلام. نظمها الاجنابية
والاقتصادية قربية الشب من نظم النحل والتمل، فيها الملكة
البيض والذكر الكامل والجنود والمال الخنايث || أشهر
أنواعها:

عَفِيفَان *
Reticulitermes lucifugus (S).
Termite lucifuge (F).

عَفِيفَان اصغر العنق *
Caloterms flavicollis (S).
Termite à cou jaune (F).

عَفِيفَان أكبر *
Hodoterms ochraceus (S).
Termite ocre (F).

١٨٨٤٤ - عَفِيفَةٌ *
Gryphaea (S).
Gryphée (F). *Gryphoea* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم
وفصيلة المحاربات. أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في البحر
والابيض المتوسط وفي بعض مناطق الاطلسي || أصدانها
تصنف مستديرة الشكل، متعقبة القدم، لاشواوية
المصاريع، كبيرة اليسارية صغيرة اليمينية || أنواعها
الماكثة عديدة أشهرها العميقة المقرنة (*G. angulata*).

١٨٨٤٥ - عَفِيفِي، عَفِيفِيَّة
Agave
حجر كريم من مركبات المرو (الكوارتز) الخشنة بعض
الكاسيد الحديدي التي تصبها بالوانها التملية القائمة بين
الاصفر والآخر.

١٨٨٤٦ - عَفِيفِيَّةٌ يَمَّان
Onyx
نوع من العقيق الجيه الصفه يتميز بخطوطه المتوازية
الترتيب المشتركة المركز.

١٨٨٤٧ - عَفِيفِيَّات *
Commelinaceae, Commelinacées (F). *Commelin-*
naceae (E).

هي فصيلة الزولانيات من وسيدات الفلقة، اجناسها
وانواعها كثيرة العدد، اصلها البلاد الحارة والاستوائية.

١٨٨٤٨ - عَفِيفِيَّة *
Tradescantia (S). *Tradescantie, Ephémère* (F). *Com-*
mon spider-wort (E). *Tagblume, Dreimasterblume*

(D). *Efemero* (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الكيكليات. انواعها
عديدة معظمها بري وبضها زُرْبِي. أزهارها حامية ثلاثية
الفصل والبتلات، سداسية الاضلاع، خلية الاندام || أشهر
انواعها ما يلي.

١٨٨٤٩ - عَفِيفِيَّةٌ الرِوِي *
Tradescantia fluminensis (S). *Ephémère de Rio* (F).

عشبة سرْبُونِيَّةٌ زُرْبَانِيَّةٌ معمرة تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها
بيضية مستطيلة. تصلها عاقب الخضار حل صفحته العليا،
بنفسجي الصفحة السفلى. أزهارها كثيرة العدد، يضاء
اللون، عصارتها قابلة الخضب || أزهارها يستر طوال
السنه.

١٨٨٥٠ - عَفِيفِيَّةٌ يَتَفَهَّرُ الزَّهْر *
Tradescantia albiflora (S). *Ephémère à fleurs blan-*
ches (F).

عشبة زُرْبَانِيَّةٌ مركبنة معمرة. سوقها مسطحة تنثر عند
كل مقدة. أوراقها بيضية الشكل، قلبية القاطعة،
مدببة المقصة، تصلها جيل الخضار الزاوي. أزهارها
قليلة العدد يضاء اللون || أزهارها يستر من أيار إلى
تشرين الثاني.

١٨٨٦٧ - عَكْبَرُ مُقْتَصِد

Microtus oeconomus (S). Campagnol économe (F). نوع من الكبار ، موطنه البلاد التركية ، طول نحو 17 سم ، وذنبه ٥ ، جسمه اسطواني الشكل مقسمه مقطوم الطرف ، اذناه مستديرتان صغيرتان . ظهوره الى الصهبة السراة العابقة . ابطاءه الى الصهبة الصفراء بطة ابيض اغبر || يعيش جماعات كثيفة البدد وهو من الكبار القاطنة التي تجوب البلاد في طلب المصيف والمشي . جحره الشتوي وجحره الجوانب يخزن فيه ما لا يقل عن ١٠ كيلو من الحبوب والحبوب.

۱۸۸۶۸ - عَمَّ بَات

١٨٨٦٨ - عكبريات
Arvicolinés (F).
العكبريات أو قثان الزرع عارة حيوانات ليلية قاضية
من فصيلة الفأريات . اجناسها وانواعها عديدة موطنها
المان . جميعها صغيرة القد . اجسامها ريمية . رؤوسها
عُرْطِيَّة غليظة . مقاضها مغطوة . آذانها مستدرة بارزة .
آذانها صغيرة كاسية || اُعرف اجناسها العكبر والممين
والسفتة .

۱۸۸۶۹ - هکند

١٨٨٦٩ - هيكند
Balai de sorcière (F).
Witches broom (E).
خمة من الافنان الكثيفة التجميع تشبه المكفلة تسبها
بعض قلوب التفرقة - راجع تفرقة .

۱۸۸۷ء - عکدہ

Nid d'araignée (F). عَكَدِيَّة - ١٨٨٧.
Nest of spider (E).
المكدة عكاش ليد النواس ، جرابي الشكل ، ينسجه
العنكبوت حيث يقيم للاستراحة فيه .

١٨٨٧١ - عكدة

Base du cœur (F),	١٨٨٧١ - عَكْدَة
Base of the heart (E),	قاعدة القلب .

١٨٨٧٢ - عکړه

١٨٨٧٢ - عكرو Genotype (F), Genotype (E).
هو الذي يمثل نتيجة عمل الجين في التركيب الخلوي وهذا
ما يحمل التركيب العكري مثلاً لمجموعة الصفات الوراثية .

١٨٨٧٣ - عَكَرَ ، كَمَاءُ الْمَاءِ ، قَسَطَ طَلَّ الْمَاءِ

١٨٨٧٢ - عَكَرَ ، كَمَاءُ الْمَاءِ ، قَسَطَلَ الْمَاءُ
 Trapa (S). Macra, Châtaigne d'eau, Truffe d'eau,
 Tribula, Cornuelle, Echarbot (F). Water chestnut,
 Water caltrop (E). Echte Wassernuss (D). Tribolo
 aquatico, Castagna d'acqua (I).
 جنس نباتات عشبية وقصيلة • مائية • سارية من
 فصيلة الإصغريات. أزهارها الزهرية ثلاثية، وأوراقها
 كبيرة القند مسطيلة الزناد تفصلها عن الشكل منشاري
 الحافة. أزهارها فردية محيطة بصلبها اللين. ثمارها جوزية
 شائكة • مشابة الأشكال، كسنته اللباب المأكول.

Trapa bispinosa (S). عَكْرَ أَبُو شَوْكَتَيْن = ١٨٨٧٤

نوع من العكر الشرقى تكثر زراعته في الهند والهند الصينية. ثماره كنية الشكل ثنائية الفصل الجالسة المشوشة الحادة الشوكية. دقق لها يستعمل في تحضير بعض الحلويات.

Trapa bicornis (S). * عَكْرَ أَبُ قَرْتَن - ١٨٨٧٥

نوع من العكر الشربي تكثر زراعته في الصين حيث يستعمل في منظم المآكل الويتية . ثمرته تشبه رأس الكباش بقرنيه المنقفين حجمها حجم الكستناء . لبابها جيد الصنف وهذا ما يجعلها تحتل المركز الاول بين انواع العكر .

۱۸۸۶۲ = عکب

Microtus, Arvicola (S). عَکْبَر ۱۸۸۲
Campagnon (F). Vole, Field-mouse (E).
جنس حيوانات فاسية، من العکبريات وخصيلة
القارات. انواعه عديدة جميعها صغيرة اللد تتميز بخرارة
تحتها. انماها تضع من ثلاث الى اربع مرات في السنة
كل مرة من ۴ الى ۶ افراس تبصر وتكني بعد بعضها
يسبح وتروح في طلب قوتها يمرضت اسابيع ۱ قوتها
الحليب والجنور ومختلف المرات اخضعها لاه الا قوتها
في الشتاء بعد الانعام العامة انبات الشوى.

١٨٨٦٣ - عَكَتْ أَصْبَحَ •

١٨٨٣ - عكبر أصغر*

Microtus glareosus, *Arvicola glareosus* (S). Campaigne fauve, C. des grèves (F).

نوع من الكابار، طوله نحو ١١ سم. ونيته ٤ ثوبه إلى الصخرة يبقى مع اقترابه من ثقب الظهور وينحرف إلى اليسار عنه الصدر واليافق. || يالغ للزوج وأقرول يتلجج البعوض والأعداء ولحادن. قومه يسباحات كثيفة العدد تتبلغ على الألوف || قوته الحبوب والثار واليرلوط والكفتنة والخدود وفله الأجران في الجموع.

١٨٨٦٤ - مکتبہ الہیہ

١٩٨٦٤ - عَجَبِيَّةٌ
Microtus terrestris, *Arvicola terrestris* (S). *Campagnol terrestris* (F).
 نوع من الكابار ، موطن الشرق الأوسط ، طول نحو ١٨ سم ، وذنبه ٧ سم ، جسمه اسطواني كجسمه مقطوع الطرف . اذناه مستديرتان كجرتان . ثوبه الى السجبة البنية .
 يعيش قريب قليلا من الغلير ويبيض عند البطن .
 تألف الخجل والرمحي وصفات الاخر مجاري الماء .
 قوته المواد النباتية و من اختلافها من الحبوب الى الفار
 وائلون البتالة وكمار القصب .

١٨٨٦٥ - مكنة الحيا * دار القسط

١٨٨٥ - عَكْبَرُ الْحَكْلِ * قَارَةُ النَّيْظِ
Microtus arvalis, Arvicola arvalis (S). Campagnol
des champs (F).
نوع من الحماكير ، موطنه فسح الأراجام بينه من الشرق
الأوسط إلى المراتل أروبية ومن البلاد المصرية حتى أمالي
السودان . جسمه أسطواني الشكل ، طوله يبلغ ١١ سم
وزنه ٣ ، ثريه إلى الصبهة الصفراء ، بطنه إلى البياض
التيبي . مدب جبرانه أيضا . مقفصه مشتمل التدييب .
أذناه مستديرتان صغيرتان . يفتاح الحفرل والرماحي
والأراجام والحفاني وجباري الماء والينانف . يعيش على
النباتات البحرية وفي الجبال حتى ارتفاع ١٨٠٠ م .
يركز بصفة خاصة على البسبوع ويعيش البساتنة لكنه أخرق
التمسك بطنه . قوته جمع المواد النباتية مما كان مصدرها
ونوعها .

۱۸۸۶ - مکتبہ قیاسیہ *

١٨٨٦ - عَكِير قَازِب *
Microtus amphibius, *Arvicola amphibius* (S). *Campanag. amphibio*, *C. aquaticus* (F). *Water rat*, *Water vole* (E). *Wasserstrasse*, *Mollmaus* (D).
 نوع من العُكَّارِ، طوله ١٧ سم. وذنبه ٨ سم. جسمه الخشن، مقعصه ذلك الشكل. أذناه كيرتان. (ثوبه أ. الصبية السراء، يمشي مع ابتهاجه من بين الظهور ويتصرف على التبرية مع الصدف والياضين على الخوازي والمخروقات). يألف ضفاف البحيرات والواضات وبجاري الماء. يسبح ويقلب ويقلد الانجرار. قوته الحروب والمجور والحشرات والاصنام والصدرة.



الانسياب . تعيش في الماء ولا تغلق حل سطحه إلا عند الحاجة الى تجديد الهواء لا جسمها كبير فقد يطول من ٣٠ الى ٣٥ سم . ثوبها الى السرة القصية يطولها موج اخضر . كوسلها وظهورها مغطيان بخار اصفر . وأساها مستعرض الشكل ، قصير الخيط . فكاهها قووان ، حينها كيرتان زياتها حقيقان ، مستطيلان ، غلارها مستدير الطرف الاصح . جرابها صفراء اللون تتميز بكبر الزوج الخلفي المبط الساق والارياض المدة لتجديد . ارسافها خاسية النمل الا انش اكبر قدا من الذكر وابت ثوبا منه وابلغ تحديدا في عهدنا في لما جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواسط الخريف . قوتها كل ما تيسر لها من الحيوانات الدنيا التي تقتنصها في الماء الا انش تجمع المكن في البر حل صفحات الارواك التي تلتاس التراب . يتخفى لكن بعد متنه بنحو ثلاثة اسابيع عن يرقات مدوية الشكل ، عمراء اللون ، سود الرؤوس ، كيفية الخبط تسمى الله به التفت يبين وهي كالخشرات الجملانة تسبح وتطس وتقرس كل ما تيسر لها من الحشرات الدنيا والارياك .



عكر ابو قرون



عكر احمر



عكرش المروج

١٨٨٨٤ - **عُكْرُشِيَّات** **Dytiscidae (S).**
Dytiscidae (F). Dytiscidae, Predaceous diving beetles (E). Schwimmkäfer (D).

فصيلة حشرات قانصة ، مائية من رتبة غدييات الاجنسة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . معظمها من حشرات مياه المناطق الحارة . تألف المناطق والاهوار والبحيرات والأبر الماء الا عند الحاجة لتجديد الهواء لا اجسامها متفارة القند ، منها الصغيرة الدقيقة التي تطول نحو ٢ سم . ومنها الكبيرة المستضفة التي تطول نحو ٥٠ سم . جميعها يضيئة الشكل ، مضلة الاحدياد . تتميز جرابها الخلفية المبطلة الارياض للحدة السباحة . ارساخ الجرابز الامامية ، عند الكور ، مجهزة بصاحب تمكثها من التنفث بظهور الاناث عند الكور . وهي لا تخرج من الماء الا في زمن التنكسة او عند الانتقال الى مكان الى مكان تنقرس اذ ذاك في الليل في البرقة كالخشرة الجملانة تسبح وتطس وتقرس كل ما تيسر لها من الحيوانات الدنيا في اشهر اجناسها المنكزل والدنقوت والمندوس والرافس .

١٨٨٨٥ - **عُكْس** - **قُدْرِيَّح** و **تُرْقِيد** **Marcottage (F).** Layering (E).
احدى طرائق تكثير النبات تقوم بحمل اللصن ودنه في التربة دون فصله عن امه الا ان تبرز له جذور فيفصل ويفرس .

١٨٨٨٦ - **عُكْسُ التَنَوُّجَة** **Dénitrification (F).**
Dénitrification (E).
تحويل يحصل في بعض الارية الرطبة بتأثير جراثيم خاصة تحول النترات الى نيتريت فامونياك فازوت وهو بذلك يكون عكس التبرجة ومعه ضرر كبير لان النباتات اقرب تحييز واسهل امتصاصا من النيتريت .

١٨٨٨٧ - **عُكْسِين** **Invertin (F).** Invertin (E).
خيرة المكس تمكس السكرز فيصير غلوكوزا .

١٨٨٨٨ - **عِكْم** **Enveloppe (F).** Envelope (E).
العكم الغلاف . ج . اعمام ومكام .



عكرش مطوق

١٨٨٨٧ - **عُكْرُ أَبُو قُرُون** **Trapa natans (S).**
Macra commune (F).

نوع من العكر المبلول يعيش في جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة . ثماره ما كولة تستعمل مسلوقة أو مشوية بني حجم الكعكة تحمل أربعة قرون متخالفة ذببة سادة الشلكة .

١٨٨٨٧ - **عُكْرُش** **Festuca (S).** Fétaque (F).
Festuca (I). Festuca grass (E). Schwingel (D).
جنس نباتات عشبية مرصوية حولية أو مدمرة من فصيلة النجيليات . انواعه زهاء ١٠٠ معظمها اعشاب كلثية تنلفها الماشية من الخيل الى الماعز . وقد قيل فيه
« اعلقت سارك كعرا حتى يحيد ويكشا »

وهو من النباتات التي رغب في الاربية المتدعة المحافظة على ورطتها في اشهر انواعها المرصوة التي تزرع في المروج والمراعي الثلاثة التالية :

عكرش احمر **Festuca rubra (S).** Fétaque rouge (F).
عكرش المروج **Festuca pratensis (S).**
Fétaque des prés (F).
عكرش منتصب **Festuca elatior (S).**
Festuca élevée (F).

١٨٨٨٨ - **عُكْرُشَة** **Hase (F).** Doe-rabbit (E).
هي انثى الارب .

١٨٨٨٩ - **عُكْرُشِيَّات** **Festucaceae (S).**
Festucacées (F). Festucaceae (E).
سبط من النجيليات يشمل حدة اجناس وانواع ، اشهرها العكرش . معظمها نباتات عشبية برية وبعضها علفي في زرع في المراعي .

١٨٨٩٠ - **عُكْرَمَة** **Pigeonne (F).**
هي الحلمة ، أن الحام . اما الالك فهو المرطل والمخليل .

١٨٨٩١ - **عُكْرِيَّز** **Alchryson (S).**
Alchryse (F). Alchryson (E).
نبات عشبي مسر من فصيلة الخلدات . منته بعض انايب البحر الابيض المتوسط . ساقه فارقة خلية الماء ، تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه معتقة ، متعاقبة ، كلوية الشكل ، جميلة الخضار الزاهي . ازهاره متعدية التجميع . ازهاره صفراء اللون .

١٨٨٩٢ - **عُكْرِيَّسُ أَسْوَد** **Xyllocoris acer (S).**
Xyllocoris noir (F).

حشرة مفترسة من فصيلة القطرسيات . جسمها شديد الصغر يطول نحو ٣ مم . ثوبها الى السرة القطرانية ، يهت في البطن ويصق في الرأس والكتيل والحجفة والخنجين في رأسها محرم . عظمها متدل الجرم . حينها صغيرتان . كوسلها عموديب . حنجرتها حمرة . حنجرتها صفيتان . روشتها اغبران . قوائمها دقيقة ، عمراء اللون الا تألف حراج الصنوبر وتعيش بين القشور وتحثها . قوتها الحشرات والحوام .

١٨٨٩٣ - **عُكْرُشُ مَطْوِق** **Dytiscus marginalis (S).** Dytique marginé (F).
Dytiscus marginalis (E).

حشرة مائية قانصة من فصيلة المنكزليات ورتبة غدييات الاجنسة . تألف المناطق والندران ويجاري المياه البطنة

Sarcoptes (S). Sarcopte (F). **عُكْسَة** ١٨٨٩٨ -

Sarcoptes (E).
جنس حشرات جلدية من فصيلة الجربيات ورتبة القراديات
انزاعه عديدة جميعها صغيرة القد، ذرية، مؤذية عابطة
بعضها يحدث الجرب في الإنسان والحيوان || يكافح
بإستعمال مركبات الكبريت .

١٨٨٩٩ - **عُكْسَة أَمْلَس** * ، **جَرَب أَمْلَس**
Sarcoptes laevis (S). Sarcopte lisse (F).
نوع من الجرب يركب بصل أرياش الطير فيسبب سقوطها.

١٨٩٠٠ - **عُكْسَة قُمْلِي** * ، **جَرَب قُمْلِي** ، **جَرَب**
Sarcoptes scabiei (S). **نَشَاب**
Sarcopte de la gale, Acare de la gale, Gale sèche (F).
Iech-mite (E).

نوع من الجرب الشائع يتطفل على الخيل والابل والبقر
والنم والماعز فيؤذيها في جلودها ويسبب لها الحكاك
واللتوشير والحزاز .

١٨٩٠١ - **عُكْسَة مُتَقَلِّب** * ، **جَرَب مُتَقَلِّب**
Sarcoptes mutans (S). Sarcopte changeant (F).
نوع من الجرب يتطفل على ارساغ الطير اخضعها للاداجنة
فيؤذيها ويشوهها .

١٨٩٠٢ - **عُكْسَة**
Empaqueuse (F).
هي الصارة جهاز ميكانيكي يصير ويلبب الاشياء .

١٨٩٠٣ - **عُكْسَة** *
Bionomie (F). Bionomics (E).
علم البيئة الحاربية ويدل تأثيرها في الكائنات الحية .

١٨٩٠٤ - **علاج**
Traitement (F). Treatment (E).
هو الدواء المستعمل في مكافحة مرض معين او وصف مقدار .

١٨٩٠٥ - **علاجات شافية** * ، **أدوية**
Traitements curatifs (F). Curative treatments (E).
هي الادوية الناجمة المستعملة لشفاء من علة بدت او
لقضاء على حشرة ظهرت ، وأجمع فاس .

١٨٩٠٦ - **علاجات وأكسية**
Traitements préventifs (F). Preventive treatments (E).
هي الادوية التي يحسن استعمالها لقواتية من مرض يمتنى
وقوه او لاجتناب وسم مرتقب .

١٨٩٠٧ - **عُلاس** *
Chélat (F).
الملاس مركب عضوي يمكنه اختلاط مع المواد القوية
من تكوين ثالث عصري يقوم الانحطاط دون ان يعزل
سيد التشيل النهائي .

١٨٩٠٨ - **عُلاس** *
Olace

جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة البلاسيات .
انواعه المعروفة ٢٥ منها معظم المناطق الحارة والاستوائية
من العالم القديم واسرائيلية || اشهر انواعه عُلاس مرتدب
(Olace de Ceylan) اوراقه مأكولة وتطبخ كالمفلوف
وفيرة .

١٨٩٠٩ - **عُلاسيات** *
Olacaceae (S). Olacacées (F). Olacaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القنالات مرتفعات
المبيض . اجناسها المعروفة ٢٩ اما انواعها فنحو ١٧٠ ||

١٨٨٨٩ - **عُكْسَة أَيْفَة** *.

Mycetophila elegans (S). Mycetophilie élégant (F).
حشرة لامؤذية من فصيلة الكسسيات . جسمها صغير القدة
يطول من ٤ الى ٦ سم. رأسها صغير . عيناها بارزتان .
زباناها غليظان . ثوربا الى الصفرة الصنابية . ودوتاها
الى الصفار الباهت . قوائمها كبيرة . غنايبها مجهزة
بمناس حادة || مرتعها الغابات . الاثني اكبر قدأ من
الذكر ، تمتع مكثها في سوق الفطور وفي نكاحه فيفت
عن يرقات تعيش على الفطور حتى طور الكمال .

١٨٨٩٠ - **عُكْسِيَّات** *
Mycetophilidae (S). Mycetophilidés (F).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
المعروفة متوسطة العدد . معظمها من علم الاقائم المعتدلة
المتحركة نحو البادية . مرتعها الغابات حيث تكثر الفطور ||
اجناسها صغيرة . نحيلة . رؤوسها صغيرة متدنية . عيونها
زرقية . قرونها الاستشعارية غليظة ، تعد من ١١ الى ١٧
فصلة . اعطامها فياجة . قوائمها مستطيلة . غنايبها مجهزة
بمناس نشطة || يرقاتها شبه اسطوانية الشكل ، بيضاء
اللون ، جميعها خاملة او دامت . خادراتها طليقة لا تنمن
في التربة لكنها تلتفت ببناء دقيق .

١٨٨٩١ - **عُكْسَة** * هي سورجان الجبل ، اطبله .
١٨٨٩٢ - **عُكُوب** *
Gundelia tournefortii (S).
Gundèle, Gundélie, Accoub (F).
نبات عشبي بري شوكة معمر ويعد الجلس والنوع ،
من فصيلة المركبات . اعطان بلاد الشرق الاوسط يكثر
في المناطق البرية الجبلية . وهو بقلة نادرة لا تحمل من
بعض الفيتامينات والناصر المفيدة . فلها مأكولة تستعمل
مطبوخة .

١٨٨٩٣ - **عُكُوزَة**
Racine de la queue (F).
اصل ذنب القذابة حيث حري من الشعر من مفرد الذنب.

١٨٨٩٤ - **عُكُوس** *
Ixa (S). Ixa (F). Ixa (E).

جنس دويات بحرية من القشريات حشريات الاربل ،
قصار الذيل وفصيلة الققيويات . انواعه المعروفة قليلة
العدد اعطانها بحر البلاد الحارة || اجناسها صغيرة تطول
من ٢ الى ٣ سم. وتعرض من ٥ الى ٦ سم. تتميز
باعتادها الجانبية الاسطوانية الشكل الهزلية الاطراف
الدمية . ارجلها نحيلة مستطيلة . ملتقطها كبيرة دقيقة
الاطراف || انواعها الى السمة المتفاوتة الشدة والمجاهات
الحطية والزويية .

١٨٨٩٥ - **عُكُيس** *
Achronique, Acronyque (F).
Acronychal (E).

نمت تعريفية يطلق على كل نجم او كوكب هنسا يكون
مركزة في الفضاء مائكا الشمس فيظهر عند غروبها
وبقيع عند شروقها .

١٨٨٩٦ - **عُكُيس** * ، **دَرِينَة** * ، **وَكِيدَة**
Marcotte (F). Layer (E).

النصن الذي يمسك او يدورخ او يرقه .

١٨٨٩٧ - **عُكُيس الكرمَة** * ، **وَكِيدَة الكرمَة**
Provin (F). Layer of a vine (E).

سرع الكرمَة الذي صار تدورخه .



عُكْسَة أَيْفَة




عُكُوب



عُكُوس



عُلْ أَمْلَس



عُلْ قَلْ

١٨٩٢٠ - **عُكْتُ**

المرء والائل والحاج والبيت والمكوش جميعها من العُكْتُ .
ج علائت (اللسان) .



علائش

١٨٩٢١ - **عُجْ**

هو الجار الوحشي السمين القوي .
Onagre gros et gras (F).

١٨٩٢٢ - **عُجْجَان * ، عُجْج**

Arundinaria (S). Bambou (F). Bambou (E).

جنس نباتات قصية برية وزراعية من عائلة الخيزرانيات
وفصيلة النجيليات . انواعها عديدة ترطب في الاربة الرملية
الدبالية الرملية . اشهرها ما يلي .



علام

١٨٩٢٣ - **عُجْجَان مُسَاع**

Arundinaria nitida (S). Bambou luisant (F).

نوع من العُجْجَان يملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . سلاياته
الى الجلوة البنفسجية . صبره حديد الاثبان . اوراقه تطول
من ٦ الى ٨ سم . نصلها مائل للبرشة جبل الخضار القزافي
للأصع || يرطب في الاربة القليلة الاندماج الوفرة للمواد
المضوية .

١٨٩٢٤ - **عُجْجَان مُشْبِك**

Arundinaria tessellata (S). Bambou à réseau (F).

نوع من العُجْجَان يملو من ٨٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه
ذلفة اكرام الاخير تطول نحو ٤٥ سم . وترش نحو ١٠
نصلها جبل الخضار يحوته اطار اسفر ويجعل حل صفته
السفل خطين ازرقين متوازيين مع الصلغ || يرطب في
الاربة الرملية الدبالية الرملية .

١٨٩٢٥ - **عُجْجَان مُوَسَّج**

Arundinaria veitchii (S). Bambou panaché (F).

نوع من العُجْجَان يملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . سلاياته
اسطوانية . صبره عجلة مفندة . اوراقه معتقة تطول
من ١٢ الى ١٥ سم . وترش نحو ٣ . نصلها اخضر الصفحة
العلي اطلل السفل يحوته اطار اسفر || يرطب في الاربة
الخفيفة الغنية الرملية .



علب

١٨٩٢٦ - **عُجْجَان نُحْلِي**

Arundinaria palmata (S). Bambou-Palme (F).

نوع من العُجْجَان يملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . سلاياته
اسطوانية . صبره عجلة مفندة . اوراقه معتقة تطول
من ٢٥ الى ٣٥ سم . وترش من ١٠ الى ١٢ . نصلها اخضر
الصفحة البلي بجري السفل || يرطب في الاربة الرملية
الدبالية الرملية .

١٨٩٢٧ - **عُجْجَان وَصِي**

Arundinaria humilis (S). Bambou de fortune (F).

نوع من العُجْجَان يملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . سلاياته
اسطوانية خضراء اللون . صبره دبنة . افراده قليلة . اوراقه
مبشرة تطول من ١٠ الى ١٥ سم . نصلها مائل البرشة
جبل الخضار || يرطب في الاربة الرملية القليلة الاندماج
الغنية بالمواد المضوية .



علبان



علجوم

١٨٩٢٨ - **عُجْجُوم * ، ضِفْدَع الجبل ، ضِفْدَع**

السَّم
Bufo (S). Crapaud (F). Toad (E).

جنس حيوانات دوداء صغيرة القد قاذرة من فصيلة
السلجوييات ورقية عدييات الاذنان . انولاه نحو ٨٠
منتشرة في جميع العالم تتميز من الضفادع العادية بقصر

جميعها اشجار وبخيرات . اعطائها بعض اصقاع البلاد
الحارة والاستوائية من العالم القديم . سبطا رقيقة ، قرعاه .
اوراقها متناقية ، كاملة . انزاعها عقودية التجمع او
فردية || اشهر اجناسها العالاس .

١٨٩١٠ - **عُلاش ***

Sardinella surita (S). Alliche (F). Alliche (E).

سكة بحرية قريبة الشبه بالسردين من فصيلة الصابقيات .
اعطائها بحار البلاد الاستوائية والحارة وبعض مناطق البحر
الايض المتوسط . سرعها الافواظ والنفات والهايج .
سرها كثير العدد كالسردين || جسمها احليجي الشكل
يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . فمها مائل ورفيق . زعنفتها
الظهرية مقعرة الطرف واقرن من الرأس من زعنفة السردين .
زعنفتها الذيلية فارقة مستطيلة الجناح . نوبا الى الرينة
الزرقاء يملوها موج فضي يمتد عند الظهر . يطلها الى
البياض القضي المامية || لحمها ما كمل متوسط الصنف .

١٨٩١١ - **عُلاط**

Face latérale de l'encolure (F).

١٨٩١٢ - **عُلاط**

Fil (F).

الخط الدقيق . يقال اعطى الارة بلطاط اي يسطها .

١٨٩١٣ - **عُلاط**

Elyme des sables, Oyat (F).

هو اليموس الكتبان ، اطلبه .

١٨٩١٤ - **عُلاط ، عُكْتُ ، ذُتْب**

Pétiole (F). Petiole (E).

جزء دقيق من الورقة يعمل النصل فيندج اليه بالنسخ الباهل
ويقتل النسخ الكامل . وهو صلة الوصل بين الورقة والنفس
النباتي الذي يرتكز عليه .

١٨٩١٥ - **عُلاط**

Amande du harprun (F).

Buckthorn almond (E).

١٨٩١٦ - **عُلاط**

Accipiter n-oui (S).

Epervier majeur, Grand épervier (F). Greater sparrow-hawk (E).

طائر من البراشق ، طوله نحو ٤٥ سم . ويصطه ٨٥ سم .
جسمه رقيق القوام ، نوبه جبل التوش . صدره افر الرقة
الغبراء المظلمة بالاسود || خلفه خلق البراشق الا انه
اسر مزاجا رائد يعلو من سائر انواع جنسه . وهو من
الذواضع التي تجرب العالم القديم ولا تقيم في الشرق الاذ
اكثر من خمسين يوما في السنة .

١٨٩١٨ - **عُلاط**

Tragelaphus euryceros (S).

Tragelapha euryceros, Bongo (F). Tragelaph, Bongo (E).

نوع من الجليل وهو اكبرها قدًا وقرنا وانسبا قالا واسرها
انتشارا . ثوبه كيت اسفر يملو تجديده ابيض ورشة صفراء
كسائر انواع جنسه . الاكر اميق لونا من الاني || اعطانه
فصية الاربعاء تمتد من بحيرة تشاد الى كيريو والناوين .

Bufonidae (S).

١٨٩٣٢ - عُلُجُومِيَّاتٌ

Bufonidae (F), Bufonidae (E).

فصيلة حيوانات من لمة الرُفِيَّاتِ ومرتبة السُّفُونِيَّاتِ ورتبة البُفُونِيَّاتِ أي دعيمات الذئب || أجنتها المرفوعة ثمانية وأنواعها ١٣٠ منها القازبة والمائية والبرية الجلمة والشاجرة. أصليها خليج أصقاع البحر واستثناء جزيرة سنغافورة وبعض جزر المحيط الهادي || يجيها عادمة الإنسان . السَّنْبا إيليجية الشكل . فقارها الإمامية المتقدمة عادمة الضلوع . أما التتو الفصلي الذي يمتد من قاعدة العنق ويمتد إلى البطن . التمدد . أصابع قوائمها الإمامية طويلة . أما أصابع قوائمها الخلفية فقصيرة عظام لاقلامي المدى لانه يختلف مع الانجناس والأنواع || أعرف أجنتها وأشهرها الملجوم .

Ephedra (S), Ephédre (F).

١٨٩٣٤ - عُلْدٌ

جنس نباتات معمرة برية من فصيلة العلديات . أنزاعه المرفوعة ٢٠ . يجيها جنينات فراءه عتقده تلو من ١٠٠ إلى ٤٠٠ سم . فروصها متقابلة ثنائية أو ثلاثية الانتصاب . أوراقها صغيرة متقابلة تركب القعد . أزهارها وريسة المسكن . الذكورية منها فردية أو ثنائية التجميع . أسسا الانثوية سنبلية . ثمارها عنبية . مهدها شواطئ مجار البلاد الحارة والمتندلة . أعرفها وأعجمها البلد المزروع السابيل .

١٨٩٣٥ - عُلْدٌ مُؤَدَّجٌ السَّابِيلُ ، عُنْبُ البحر

Ephedra distachya (S), Ephédre distique, Raisin de mer (F), Sand cherry, Ses grape (E), Gewöhnliches Meertraubchen (D), Uva di mare (I).
نوع من العلد . موطنه شواطئ البحر المتوسط . جنته تملو نحو ٢٥٠ سم . سنايل أنزاعه الانثوية مزدوجة التجميع . ثماره عنبية . صغيرة القعد . حاضرة العظم . مأكولة ، لا تخلو من بعض النافع الطبية وتستخدم في عدة شرايات قنيدية مقوية .

١٨٩٣٦ - عُلْدُوسُ الرِّزَالِ ٥

Alydus calcaratus (S), Alyde des genêts (F).

سفرة غاضلة من فصيلة الكوروسيات ورتبة مختلفات الاجسمة . جسمها مبط ، مبرر الملب يطول نحو ١٢ سم . رأسها شبه بيضي اللون . أسود العين . غشيتها متدل الطويل . صينها صفراء ، نازرة . زباناها مستطيلان . كسولها متدلي اللون ، أسود الرباط بالراس . سنجتها صغيرة ، مزوانية ، شديدة السمرة . ظهرها الى الخلفي الاخير . بطها احر ، جويي الخثار المنقوش بالخطي الصفسة السفلى من بطها الى السواد . قشرها شفاف . قوائمها متكاثفة الملب || مسرعا البراري . تركب العلبه من النبات اخصها القرنيات الفرائية ومنها الرزال .

Gnetaceae (S).

١٨٩٣٧ - عُلْدِيَّاتٌ

Gnétiacées (F), Gnetaceae (E).

فصيلة نباتية من حريانات البزور . أجنتها ثلاثة : الملب والرجرج والموس .

Aliment (F), Food (E).

١٨٩٣٨ - عُلُسٌ

هو الفناء ، أطليه .

قوائمها . اجسامها تلو من ١٥ الى ٣٥ سم . تبلغ كامل نموها ونشائها بصر خمس سنوات . اذليها خططة ، ثولوية الجلد . تحمل بعض اللند القارزة . موائلها كربة الرائحة كارية تنفسها وترقيها دفعا عن النفس .

١٨٩٣٩ - عُلُجُومٌ أَخْضَرٌ *

Bufo viridis (S).

Crapaud vert (F), Green toad (E).

نوع من الملجوم القاذب . أصطانه جيع الاصقاع المتندلة الحارة من المال القديم || جسمه متوسط القد يطول نحو ١١ سم . عند الذكر ونحو ١٥ سم . عند الانثى . جلده كثير التمول الصغيرة تتخللها بعض اللند القارزة . سائلها كرية الرائحة كاري يقلده الملجوم دفعا عن النفس || رأسه قصير . عيناه كبيرتان . فم واسع الشق . فكاه عادمة الأسنان . أصابع قوائمها الامامية طويلة . أما الخلفية فقصيرة عظام الكتف ازام الاول || ثوبه الى السرة الزيتية المواج تملوها رقيقة حراء ورسجة خضراء يطولها الاسود || مسرعه دجوي . قوته الحشرات وما استطاع من الزحافات || الانثى تقرأ من ١٥٠٠ الى ١٢٠٠ دبله في حبال مستطيلة تلفها على النباتات المائية || يختبر من الحيوانات النافعة لانه يقضي على الكثير من الحشرات والجوارز والديدان .

Baudroie (F).

١٨٩٣٠ - عُلُجُومٌ الْبَحْرِ

هو الكركاج ، جنس اسماك بحرية . أطليه .

١٨٩٣١ - عُلُجُومٌ جَبَّارٌ *

Bufo marinus (S).

Ague, Bufo géant (F), Giant toad (E).

نوع من الملجوم . أصطانه امريكة الجنوبية والوسطى . جسمه كبير القد يطول نحو ٢٥ سم . عند الذكر ونحو ٣٥ سم . عند الانثى . جلده متحمل تملوه غد فارزة ، سائلها كرية الرائحة كاري . رأسه غليظ وقصير . عيناه كبيرتان . جاحظتان . خطه واسع الشق ، مقطوف الطوف يعلو من خطي المادة يمتد من طرف الخط الى مستوى العين . فكاه عادمة الأسنان . أصابع قائمته الخلفيتين مقبضة عظام الكتف ازام الاول || ثوبه الى السرة الخلفية يملوها مواج اغفر ورقيقة سوداء تتخللها الانثى || مسرعه دجوي . قوته الحشرات والزحافات . الانثى تقرأ من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ دبله في حبال مستطيلة تلفها على النباتات المائية || يختبر بقيقه الضاج الشبيه بمواء الكلب .

١٨٩٣٢ - عُلُجُومٌ مَبْدُولٌ *

Bufo bufo (S).

Crapaud commun (F), Common Toad (E).

نوع من الملجوم . أصطانه جيع اصقاع البلاد المتندلة الحارة من المال القديم || جسمه متوسط القد يطول نحو ١٥ سم . عند الذكر ونحو ١٤ سم . عند الانثى . جلده كثير التمول تتخللها بعض اللند القارزة ، سائلها كاري الرائحة || رأسه قصير . عيناه كبيرتان . جاحظتان . خطه واسع الشق . فكاه عادمة الأسنان . أصابعه الخلفية واقرة الخطاب . ثوبه الى الخضار الاسمر يطول مواج زيتي ورقيقة كستنبسة || مسرعه دجوي . قوته الحشرات والزحافات والديدان || الانثى تقرأ من ٤٠٠٠ الى ٧٠٠٠ دبله في حبال مستطيلة تلفها على النباتات المائية || يألف حياة الاسر ويضرب بحاسة التوجه . يختبر من الحيوانات النافعة .



علجوم اخضر



علجوم جبار



علجوم مبدول



علد مزودج السابيل



علدوس الرزال

الاستعمارية خطية طويلة . مرزاتها قصيرة مدببة . رقاتها عادة الاربيل البطنية ، مزدوجة التقويس الماكس الذي يشبه الكلاب .



علمة الاجاص

١٨٩٤٥ - **عُكْسَال** * (F). *Phalaropus* (S).
طائر وحيد الجنس والتون من حمارة اللباليات . طوله نحو ٢٢ سم . ظهره الى السمرة الصهباء يعلوها مزيج اسود . راسه وعصره الى السمره . زروه ابيض . عتقه وصدره الى الصهبه الرمادية . بطنه وبخرايه واخفيه ، يتغير . جناحه ضيق ذئق ، اسود الطاهر ، ابيض الباطن . ابطاهه وقوامه صغر الخمار . منقاره مستطيل احمر اللون . ارساغه قوية اصابعه مفصصة الخياط || الاثني اصغر قدماً من الذكر واقل طولاً . تدنن بين الاصابع قرب الماء . تبيض ٤ يعضات تقصصاً بمجاورة الذكر من ١٧ الى ١٩ يوماً .



علمة الزرع

١٨٩٤٦ - **عُكْسَالِيَات** (F). *Phalaropodini* (F).
حمارة طير من فصيلة دجاجيات الارض القاطع . اجناسها وانواعها قليلة . اجسامها صغيرة القند . مناقيرها مستطيلة . ارساغها قوية ، اصابعها مفصصة الخياط || ترتاد شطوط البحار وصفات الجحيرات . تقضي نصف اوقاتها حائمة على سطح الماء وتلتصق الآخر في الاجزاء وصل الحضيض . قوتها القشريات والرخويات والشرافيت والاسماك الصغيرة والحرايز وبض الاصابع || لها جنسان : الملعلات والمخالفات .



علوط جلع

١٨٩٤٧ - **عُكْسَل** * (S). *Melanocorypha* (S).
جنس طير من فصيلة القربيات . انواعه ٩ ، انطاشها البلاد الاسيوية والافريقية والاربية . جميعها قنبرية الرأس ، مستطيلة الجناح ، قصيرة الذنب ، دقيقة الرسع ، قوية المنقار . انواها الى الصهبه الخطية تعلوها ريشة سمره . تأتف الحقل المزدودة والمراعي والبقاع . تدنن في المراعي وبين الزروع . انثاها تحضن وضعها من ٤ الى ٥ يعضات || اعرف انواعها واشهرها :

ملعل الحيشة
M. alboterminata (S).
Calandra d'Abyssinie (F).
ملعل الهند
M. maxima (S). Calandra de l'Inde (F).
ملعل روسيا
M. tartarica (S). Calandra de Russie (F).
ملعل زنجي
M. negra (S). Calandra nègre (F).
ملعل معروف
M. calandra (S).
Calandra commune (F).



ملال

١٨٩٤٨ - **عُكْسَان** (S). *Tapiscia* (S).
جنس نباتات تريينية مسرة من فصيلة النسيات . انواعه قليلة جميعها شجرية تلغو من ٦ الى ٨ امتار . اولوقها عابله ، مركبة ، وريه . وريقاتها خاسية او سباعية اللند . تضلها يضيي الشكل ، فلي التماسه يطول من ٦ الى ١٣ سم . صفحته العليا خضراء اللون اما السفلى فاحمر . ازهاره متكونة الجميع ، عمومية الارتكاز ، صفراء اللون ، صغيرة القند ، قواسة العرف الطري .



ملعل

١٨٩٤٩ - **عُكْسَف** (F). *Affener* (F).

١٨٩٣٩ - **عُكْسَف** * (S). *Cephus* (S).
الواحدة علقة . جنس حشرات من فصيلة الملييات . انواعه عديدة . اجسامها نحيلة مستطيلة . وراشها شفافة ، كثيرة الروق . قرونها الاستعمارية خطية ، رقاتها دقيقة الجسم كلابية الشكل ، عادة الاربيل البطنية . اعرف انواعها واعمرها علقة الاجامس وعلقة الزرع .

١٨٩٤٠ - **عُكْسَفَةُ الْاِجَاصِ** * (S). *Janus compressus* (S). *Cèphe du poirier* (F).
حشرة من الملص ، طولها يراوح بين ٩ و ٨ سم . جسمها اسطواني الشكل . جوشها اسود اللون تعلوه مشعة صفراء . يعلها الى السمره البرتقالية . تظهر في الربيع وتعتك مكثها في لحاء الافنان لينفث من رقاتها تلمم الشكير والحشب فضليه وتسبب ذبول التواهي وموتها .

١٨٩٤١ - **عُكْسَفَةُ الزَّرْعِ** * (S). *Cephus pygmaeus* (S). *Cèphe pygmée*, *Cèphe du blé*, *C. des chaumes* (F). *Wheat stem sawfly* (E). *Getreidehalmwespe* (D).
حشرة من الملص ، طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم . جسمها نحيل البنية ، اسطواني الشكل . نوجها الى السمره ، يعلها يجلع بالاصفر . تمتع مكثها في قصب الزرع فيقتف من رقاتها لتدخل القصب وترعى لب الكمار فتضع اللبغ من النسابل التي تبيض . تتلوي || تكفلح بانتقام وحرق الجلمل لانها تبيت فيه ضمن رقائق صغيرة وشمية الشكل .

١٨٩٤٢ - **عُكْسَط** * (F). *Altitude* (F). *Altimeter* (E).
جهاز يمين رءاه بالمقع بالنسبة الى سطح البحر اي ارتفاع المكان من مرمى مياه البحر .

١٨٩٤٣ - **عُكْسَطُ مُجْدَع** * (S). *Chilochorus bipustulatus* (F).
حشرة خاتلة آفة نافة من فصيلة الصسقيات ودية مندعات الاجنحة . تأتف غابات الصنوبر واحراجه . غناضها وريقاتها تبيض على الارق افعي يركب الصنوبر || جسمها صغير القند يطول من ٤ الى ٥ سم . نوجها الى السواد البانق . مفداها ثلاثيات البقع المتناحية . واسها معتدل الجرم . صيها كيرتان . زياتها صقيان . فكها ضليخان . ظهورها مستدير الاطراف التلاصقة . مفداها شديدة الصلابة كيثفتا المل . ارساغها رباعية المل || اجسامها الحولية ثلاثة . تخرج الحشرة الجملانة من يائها الشتوي في نيسان . تسرح في الجدار وتبيض في الليل || البرقة سريعة النمو شبه اسطوانية الشكل تطول عند الإدراك اتمام نحو ٧ سم . نوجها الى السمره النحيلة يعلوها خلل اغبر || اما غناضها الجبل الثالث فانها تقضي فصل الشتاء مختفية تحت الحجارة ولا تخرج من مكثها الا عندما تدب الحرارة في اواسط شهر نيسان .

١٨٩٤٤ - **عُكْسِيَّات** * (F). *Cephidae* (S). *Céphidés* (F). *Cephidae*, *Stem sawflies* (E). *Halmwespen* (D).
فصيلة حشرات من رتبة عشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اجسامها نحيلة مستطيلة ، قرونها

تختلف باختلاف الحيوان وما هو مطلوب منه . لذلك فلا بد من معرفة مختلف نسب المواد الغذائية التي تتكون منها حتى الاختلاف الطيبية والمركزة || وقد وضعنا في الجدول التابع متوسط تركيب معظم الاعشاب والذئب والاعلاف مع ما يحويها من المواد المنهضة :

Aliment du bétail (F).

١٨٩٥٠ - علف

Aliment of cattle (F).

هو المادة او المواد الغذائية التي تقدم للحيوان في سبيل حفظ حيواته. وهو جسمه ونتاجه || يختلف العلف باختلاف نوعه وما يحوي من عناصر وبنود غذائية يمكن هضمها وتغليها في الجسم || ولا كانت الغاية من العلف

الذئب جزء من العلف المذكور يحوي ما قلده

ماهية العلف	عناصر عظام						عناصر منضمة			الحين الغذائي	مواد آسية	القيمة الغذائية الشفوية في
	مواد جافة	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات	سليولوز	مواد ازوتية	مواد دهنية	خلاصات	سليولوز			
١ - في الكلال	٢٥٠	٢٣٠	٠٨	١٣٠	٦٠	٢٠	٠٤	٩٠	٢٩	٠٨٧	١٥٠	١٣٠
اعشاب المراعي قرب الازهار	٢١٨	٢٥	١٠	١٠٠	٤٠	٣٤	٠٦	٨١	٢٨	٠٩٢	٢٣	١٣٠
اعشاب المراعي السوسنة	٢٠٠	٢٥	٠٨	١٠٧	٤٠	٣٥	٠٤	٧٣	٦٠	٠٩١	١٧	١١١
اعشاب المروج المادية	١٩٢	٣٥	٠٧	٨٥	٤٩	٤٩	٠٤	٦٣	٣٢	٠٨٧	١٣	٩٩
اعشاب المروج المروية	٣٠٠	٢١	٠٨	١٤٨	٩٢	٢٠	٠٤	١٠١	٤٤	٠٧٩	١٣	١٣٧
اعشاب المروج عند الازهار	١٦١	٢٣	٠٥	٨٠	٣٨	١٧	٠٤	٥٢	٢٣	٠٨٩	١٤	٨٥
شوفان عند الاسبال	٢٣٢	١٩	٠٦	١٠٤	٨٥	٤٩	٠٤	٦٥	٤٩	٠٧٥	١٢	١٠٠
شوفان أثناء الازهار	٤٩٤	١٢	٠٢	٢٠٤	١٨٦	٢٨	٠٨	١٢٦ <th>٣٣</th> <th>٠٥٨</th> <th>٢١</th> <th>١٤٧</th>	٣٣	٠٥٨	٢١	١٤٧
شوفان بالغ	٣١٥	٢٤	٠٨	١٤٣	١٠٠	٢١	٠٤	٩٨	٢٨	٠٧٦	١٧	١٣٧
دوسر	١٣٠	١٣	٠٢	٦٢	٤١	٠٧	٠٤	٢٢	٢٨	٠٨٦	٤	٤٥
دخن	٢٠٤	٢٣	٠٧	١٠٧	٤٥	١٥	٠٤	٧٦	٢٠	٠٨٩	٢٠	١٠٧
دكتيل مكعب قبل الازهار	٢٧٠	٢٥	٠٩	١٤٢	٧٣	١٥	٠٤	٩٥	٢٣	٠٨٣	١٠	١٢٩
دكتيل مكعب أثناء الازهار	١٧٢	١٤	٠٤	٨٩	٥٠ <th>٢٧</th> <th>٠٥</th> <th>٢٧</th> <th>٢٠</th> <th>٠٨٢</th> <th>٢٣</th> <th>٧٣</th>	٢٧	٠٥	٢٧	٢٠	٠٨٢	٢٣	٧٣
ذرة صفراء ككتلة امريكية	١٩٤	١٧	٠٥	١٠٤	٦٠ <th>٣٠</th> <th>٠٥</th> <th>٦٧</th> <th>٢٠</th> <th>٠٨٣</th> <th>١٦</th> <th>٩١</th>	٣٠	٠٥	٦٧	٢٠	٠٨٣	١٦	٩١
ذرة صفراء ككتلة اوروبية	٢٧٠	٢١	٠٦	١١٩	٩١	١٨	٠٣	٧٤	٢٤	٠٧٤	١٠	١٠٦
موها (دخن جبراني) عند الازهار	٢٤٨	٢٩	٠٧	١١٥	١٠١	١٨	٠٣	٧٤	٢٠	٠٨١	١٣	١٠٦
زوان مبرر أثناء الازهار	٣٥٠	٢٤	١٠	١٦٦	١٢١	٢١	٠٥	٧٧	٢٦	٠٨٥	١٤	١١٤
زوان ايطالي أثناء الازهار	٢٣٣	٢٠	٠٩	١٠٣	٧٥	٢١	٠٥	٧٥	٢٥	٠٨٠	١٤	١١٣
شيلم قبل الاسبال	١٩٥	٢١	٠٦	٩٦	٦٢	١٢	٠٢	٨٥	٢٣	٠٧٩	١٧	٨١
ذرة سكرية	٣٣١	٢١	١٠	١٧١	١٢١	١٦	٠٥	١١١ <th>٢٨</th> <th>٠٧٩</th> <th>١٠</th> <th>١٤٠</th>	٢٨	٠٧٩	١٠	١٤٠
عصوية المروج أثناء الازهار	١٩٠	٢٥	٠٥	٨٨	٦٥	١٨	٠٣	١٢٤	٢٨	٠٨٠	١٥	٧٦
شعير عند الاسبال	٢١٤	٢٢	٠٥	١٦٨	٩٢	١٥	٠٣	١٢١ <th>٢٤</th> <th>٠٧٩</th> <th>١٣</th> <th>١٦٠</th>	٢٤	٠٧٩	١٣	١٦٠
شعير عند الازهار	١٧٠	٢٣	٠٦	٧٢	٢١	٤	٠٤	٦٠	٢٠	٠٩٢	٢١	١٠٠
نفل المروج الطري	١٩٠	٢٣	٠٧	٨٠	٢٥	٢٥	٠٥	٦٣	٢٠	٠٨٠	١٧	١٠٢
نفل المروج قرب الازهار	٢١٠	٢٤	٠٧	٩٤	٢٧	٢٥	٠٤	٧٦	٢٦	٠٨٣	١٧	٩٧
نفل المروج أثناء الازهار	١٧٨	٢٧	٠٧	٦٣	٥٥	٢٤	٠٥	٢٩	٢٩	٠٨٢	١٣	٧٩
نفل احمر قرب الازهار	١٧٢	٢٨	٠٧	٦٢	٥٠	١٦	٠٤	٣٠	٢٠	٠٧٩	١٥	٧٦
نفل احمر أثناء الازهار	١٨٥	٢٨	٠٧	٧٠	٦٢	٢١	٠٥	٢٢	٢٢	٠٨١	١٥	٩٠
نفل قريزي أثناء الازهار	١٨٥	٤١	٠٨	٦٩	٤٣	٢٨	٠٥	٤٧	٢٦	٠٨٨	١٩	٨٨
نفل ابيض قرب الازهار	١٨٩	٠٦	٠٨	١٢	٤٣	٤١	٠٤	٧٧	٢٥	٠٨٧	٢٧	٨٧
نفضة طرية	٢٤٠	٤٥	٠٨	٦٦	٦٨	٣٢	٠٤	٦٣	٢٠	٠٧٩	١٧	٩١
نفضة قرب الازهار	٢٤٠	٢٩	٠٦	٩٣	٧٨	٢٧	٠٤	٧٧	٢٥	٠٧٤	١٥	٨٤
نفضة أثناء الازهار	١٩٠	٣٦	٠٨	٧٩	٦١	٢٦	٠٤	٢٥	٢٥	٠٨٥	١٩	٤٥
عربن قرب الازهار	٢٠٠	٣٥	٠٦	٧٨	٦٥	٢٣	٠٣	٤٨	٢٣	٠٧٦	١٦	٧٦
عربن أثناء الازهار	١٣٣	٢٦	٠٦	٥٦	٢٢	٢٠	٤	٣٦	٢٠	٠٨٨	١٥	٦٦

المدة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قدره

مادة الغذاء	عناصر غذائية										الحين الطعامي آسية النسبة منهضمة في مئة جزء	مواد آسية منهضمة في مئة جزء	القيمة الطعامية النسبة منهضمة في مئة جزء
	عناصر حوام					عناصر منهضمة							
	مواد جلالة	مواد أزوية	مواد حمضية	مواد غير أزوية	سليلوز	مواد جلالة	مواد أزوية	مواد حمضية	مواد غير أزوية	سليلوز			
دييدان مرموي	٣٤,٧	٧,٠	١,٥	١٣,٥	١٠,٤	٤,٥	٠,٧	٩,٤	٦,٢	٠,٧٦	٢,٢	١,٤٥	
جليان	٣,٥	١٠,٣	٢,٥	١,٠	٨,٩	٧,٦	١,٢	٦,٢	٤,٥	٠,٨٠	٠,٣	١,٤٨	
بائية	١٨,٧	٢,٤	٠,٨	٦,٠	٥,٥	٢,٥	٠,٤	٤,٥	٢,٥	٠,٨	٠,٧	١,٤٧	

٣ - في الثمن

١٨,٩	٢,٥	٠,٤٩	١٥,٦	١٩,٣	٠,٥	٣,٤	٣٣,٥	٣٨,٢	١,٥	٧,٥	٨,٥٧	ثُ المروج الكثيفة
٢٣,٧	٣,٢	٠,٥٨	١٥,٣	٢١,١	٠,٦	٤,٦	٢٩,٢	٣٩,٧	٢,٠	٩,٢	٨,٥٧	ثُ المروج المتوسطة
٣١,٠	٣,٨	٠,٦٧	١٥,٠	٢٥,٧	١,٠	٥,٤	٢٦,٣	٤١,٤	٢,٥	٩,٧	٨,٥٧	ثُ المروج الحسنة
٣٦,٢	٤,٠	٠,٧٤	١٣,٨	٢٧,٩	١,٣	٧,٤	٢١,٩	٤١,٦	٢,٨	١١,٧	٨,٥٠	ثُ المروج الجيدة
٤٠,٦	٦,٥	٠,٧٨	١٢,٧	٣٠,١	١,٥	٩,٢	١٩,٣	٤٠,٤	٣,٠	١٣,٥	٨,٥٠	ثُ المروج الفقيرة
٣٥,٧	٥,٥	٠,٧٣	١٤,٠	٢٦,٤	١,٦	٦,٩	٢٢,٥	٣٨,٤	٣,٤	١١,٥	٨,٥٢	ربيع المراعي غير المروية
٣٧,٧	٦,٠	٠,٧٧	١٢,٢	٢٧,٢	١,٢	٧,٤	١٦,٧	٤٠,٤	٤,٠	١٢,٤	٨,٥٠	ربيع المراعي المروية
٣٨,٥	٦,٤	٠,٧٤	١٥,١	٢٧,٠	١,٣	٨,٢	٢٢,٦	٣٩,٧	٣,٦	١٢,١	٨,٥٠	ثُ المناطق الجبلية
٣٤,٧	٣,٧	٠,٦٩	١٥,٨	٢٨,٣	١,٣	٥,١	٢٦,٧	٤٤,٢	٢,٤	٩,٣	٨,٩٠	ثُ المراعي البترائية
٢٣,٨	٥,٤	٠,٧٢	١٤,٥	٢٥,٤	١,٢	٧,٠	٢٢,٣	٤٠,٤	٢,٥	١١,٤	٨,٥٠	ربيع المراعي الترابية
٣٣,٧	٤,١	٠,٦٩	١٥,٣	٢٧,٦	١,٠	٥,٠	٢٦,٠	٤٣,٢	٢,١	٨,٧	٨,٥٠	ثُ الأجرار
٣٠,١	٣,٠	٠,٦٥	١٦,٤	٢٤,٦	١,٤	٤,٣	٢٨,٤	٤١,٧	٢,٧	٨,١	٨,٨٣	ثُ المراعي الماخلة
٢٠,٩	٢,٠	٠,٥٢	١٥,٠	٢١,٨	٠,٨	٢,٨	٢٣,٤	٣٧,٢	٢,٤	٧,٠	٨,٧٠	ثُ المراعي الخاضية
٣٥,٢	٤,٨	٠,٦٧	١٨,١	٢٦,٧	١,٧	٥,٦	٣,٠	٤٢,٤	٢,٤	٧,٥	٨,٨٥	ثُ الحظائر
٣٠,٣	٤,٨	٠,٦٤	١٧,٦	٢٣,٤	٠,٩	٦,١	٢٩,٤	٣٨,٥	٢,٢	١٠,٨	٨,٦٦	ثُ المواجا
٢٢,٥	٣,٣	٠,٦٠	١٥,٤	١٩,٩	٠,٨	٥,١	٣٠,٢	٣٦,١	٢,٧	١٠,٢	٨,٥٧	ثُ التران المسر
٢١,٠	٣,٥	٠,٥٥	١٥,٦	١٧,٥	٠,٨	٤,٦	٢٩,٤	٣٢,٦	٢,٧	١١,٢	٨,٥٧	ثُ العوسر
٣٥,٦	٤,٩	٠,٧٣	١٤,٩	٢٦,٦	١,٤	٧,١	٢٢,٩	٤٠,٤	٣,٢	١١,٢	٨,٥٧	ثُ التران الإيطالية
٢٦,٦	٦,٢	٠,٦٩	١٧,١	٢٧,٣	١,٥	٧,٣	٢٨,٥	٣٩,٠	٢,٥	١٠,٤	٨,٥٧	ثُ السليم
٢٩,١	٣,٢	٠,٦٤	١٥,١	٢٥,٥	١,٠	٤,٠	٢٨,٥	٤١,٤	٢,٤	٨,٥	٨,٥٧	ثُ الصوية
٢١,٠	٥,٥	٠,٦٠	١١,٣	٢٦,٠	١,٧	٨,٥	٢٤,٠	٣٧,١	٢,٩	١٠,٣	٨,٢٥	ثُ نفل المروج المتوسط
٢٦,٥	٨,١	٠,٦٣	١١,٣	٢١,١	١,١	١٢,١	٢٧,٠	٣١,١	٢,٤	١٦,٢	٨,٤٠	ثُ البرسيم قبل الإزهار
٢٢,٤	٩,٢	٠,٥٧	١٢,٢	١٨,١	١,٢	٩,٧	٢٩,٥	٢٩,٢	٢,٢	١٤,٢	٨,٢٥	ثُ البرسيم أثناء الإزهار
٣٢,٩	٧,٨	٠,٦١	١٠,٧	٢٥,٢	١,٠	١٠,٩	٢٤,٩	٣٤,٠	٢,٥	١٤,٤	٨,٢٤	ثُ العرن قبل الإزهار
٣١,١	٧,٥	٠,٦٦	١١,٨	٢٥,٣	١,٦	٩,٦	٢٨,٠	٣٢,٥	٢,٥	١٣,٢	٨,٢٥	ثُ العرن أثناء الإزهار
٣١,٠	٨,٦	٠,٦٩	١٠,٨	٢٣,٢	١,٦	١١,٨	٢٤,٥	٣٣,٢	٣,٤	١٥,٤	٨,٤٠	ثُ القصب
٢٢,٠	٥,١	٠,٧٢	١١,٢	٢٧,١	١,٥	٧,٤	٢٥,٥	٤١,٧	٣,٠	١٣,٥	٨,٧٥	ثُ القوس القرني
٢٧,٤	٥,٥	٠,٦٤	١٢,٣	٢٣,١	١,٠	٩,٣	٢٦,٢	٣٥,٥	٢,٤	١٢,٠	٨,٢٣	ثُ النفل القرني
٢٥,٨	٨,٣	٠,٦٠	١٢,٩	٢٠,٢	١,٢	١١,٧	٣٠,١	٢٨,٩	٢,٠	١٥,٢	٨,٢٣	ثُ النسفة
٢٩,٨	٤,٦	٠,٦٧	١٣,١	٢٣,٨	١,٣	٨,٢	٢٥,٧	٣٤,٥	٢,١	١٣,٦	٨,٤٠	ثُ النفل النثلي
٣١,٤	٩,٢	٠,٦٨	١٢,٨	٢٣,٩	٢,٠	١١,٤	٢٦,٢	٣٣,٢	٣,٠	١٤,٢	٨,٤٠	ثُ الر بيدان المرموي
٢١,٤	٤,٤	٠,٥٥	١٣,٦	١٨,١	١,٤	٨,٥	٣٠,٣	٢٧,٩	٢,٨	١٦,٧	٨,٤٣	ثُ الحنقوقة الأبيض
٣٣,١	٤,٩	٠,٧١	١١,٨	٢٥,٠	٢,١	٨,٥	٢٣,١	٣٥,٧	٣,٦	١٤,٩	٨,٤٠	ثُ النفل الأبيض
٣٣,٦	١٢,٠	٠,٧١	١٢,٨	١٨,٦	١,٧	١٦,٧	٢٣,٣	٣٢,٨	٢,٨	٢٢,٣	٨,٤٠	ثُ الجلبان قرب الإزهار
٢٧,٨	٦,٦	٠,٦٦	١٢,٦	٢٠,٥	١,٦	٩,٤	٢٥,٢	٣٤,٤	٢,٦	١٤,٣	٨,٢٣	ثُ الجلبان أثناء الإزهار
٣٠,٤	١٠,٨	٠,٦٩	١٢,٦	١٨,٥	١,٤	١٥,١	٢٣,٤	٢٨,٥	٢,٣	١٩,٨	٨,٢٣	ثُ البائية قرب الإزهار
٢٦,٩	٦,٦	٠,٦٥	١٢,٨	١٩,٧	١,٥	٩,٤	٢٥,٥	٣٢,٨	٢,٥	١٤,٢	٨,٢٣	ثُ البائية أثناء الإزهار
٣٣,٨	٨,٥	٠,٦٩	١٩,٤	١١,٦	١,١	١٣,٧	٢٦,٥	٢٤,٦	٢,٣	١٨,٥	٨,٤٠	ثُ الترس الاسفر أثناء الإزهار
٣٩,٢	١٣,٧	٠,٧٣	١٥,٥	٢٢,٨	١,٤	١٨,٩	٢٥,٤	٢٨,٩	٢,٢	٢٢,٥	٨,٤٠	ثُ الكرسة
٢٧,٠	٨,٥	٠,٦٦	١٢,٦	١٩,١	٠,٧	١١,٩	٢٤,٥	٢٨,٩	٢,٢	٢٧,٢	٨,٤٠	ثُ الصوية
٣٢,٠	٨,٠	٠,٦٩	١٢,٢	٢٥,٢	٠,٩	١٢,١	٢٥,٣	٣٤,٦	٢,٠	١٧,٣	٨,٢٥	ثُ القندران
٣٥,٨	٦,٣	٠,٧٤	١٣,٠	٢٧,٢	١,٢	٧,٧	٢١,٨	٤١,٨	٢,٣	١٢,١	٨,٥٥	ثُ السبرغولة

اللمة جزء من الغذاء المذكور بحري ما قلوه

مادة الغذاء	عناصر حوام										عناصر منقصة			الحين الطبيعي بالنسبة الى النشأ	مراد آسبة منقصة في مئة جزء	القيمة الغذائية منقصة في مئة جزء
	مراد جافة	مراد أزوية	مراد حمية	مراد غير أزوية	مليوز	مراد أزوية	مراد حمية	مراد غير أزوية	مليوز	خلاصات	خلاصات	مليوز				
ن الثمن	٨٦٠	١٠٥	٢١	٣٥٦	٣١٤	٦٠٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٣	١٠	٤٧	٢٧٧				
ن السليم	٨٦٥	١٠٧	٤١	٣٤٥	٣٤٥	١١٠	٢٠٥	٢٢٢	١١٣	٨٥	٧٠	٣٥٨				
ن الخردل	٨٥٠	١١١	٢٨	٢٧٢	٢٦٢	٦٠٣	٤١	٢٢٠	١٤٥	٤٠	٢٦٥	٢٧٧				
ن الزوال	٨٥٠	٩٠	٢٠	٢٨٧	٤١٨	٣٠٦	٢٠٩	١٧٣	١٦٧	٢٧	٢٢٧	١٤٠				
ن السنفون	٨٥٠	٢٠٧	٢٧	٣٥١	١١٥	١٢٠	١٨	٢٩٧	٢١	٩٥	٢٨٥	٣٧٥				
ورق المقراس	٨٨٦	١٨٣	٧٧	٣٨٠	١٠٦	١٢٨	٤٩	٣٠٠	٦٠	٩٣	٢٨٩	٤٨٠				
ورق سوق الجنبل	٨٩٤	١٢٥	٣٥	٣٨١	٢٤٥	٨٠	٢٥	٢٧١	٧٦	٦١	٢٦٩	٣١١				
شمن البطاطا	٩٠٠	٩٤	٢٤	٤٠٦	٢٦٠	٢٨	٢٦	٢٤٤	٩٦	٢١٣	٢١٨	٢٥٣				
ورق الاجمار المنيرة (في اواخر تموز)	٨٤٠	١٠٥	٣٠	٤٩٣	١٤٢	٦٠٢	٢٤	٢٢٥	٢٠٢	٢٧	٢٨٢	٣٧٧				
ورق الحور في تشرين الاول	٨٤٠	١٠٨	٨٧	٢٩٦	١٧٤	٦٠	٢٦	٢٦٢	٢٦	٢٧٣	٢٧٣	٢٦٧				
ورق الكرمية في الخريف	٨٥٠	١١٤	٧٥	٣٠٩	٨٠	٦٧	٤٥	٣٤٤	٢٠	٩٠	٢٩٠	٢٦٥				
ورق الاكاسيه في الخريف	٨٧٦	٩٨	١٧	٤١٠	٣١٥	٥٥	٢٦	١٩٣	٦٦	٤١	٢٤١	١٢٦				
شمن الطوبوف	٨٧٥	١٢٧	٢٢	٤٨١	١٤٢	٧٦	١١	٣٢٦	٤١	٨٢	٢٨٢	٣٧٣				
ورق البودار	٨٨٠	١٥٩	٢٩	٤٩٩	٨٠	١٦٠	١٧	٤٠٧	٤٩	٨٥	٢٩١	٥٠٠				

٤ - في القش

قش الخندروس	٨٥٧	٢٧	١٤	٣١٨	٤٤٠	٨٠	٤٠	٢٢٠	١١٨	٢٨	٢٦	٩٧		
قش الشمر القريبي	٨٥٧	٣٥	١٤	٣٩٩	٣٩٩	٩٠	٣٥	١٩٠	٢١٣	٤٦	٢٦	١٠٠		
قش الشمر الشتوي	٨٥٧	٢٢	١٤	٤٢٠	٣٢٥	٧٠	٤٠	٢٢٧	٢١٠	٣١	٥٥	١٠٧		
قش الشرفان	٨٥٧	٢٨	١٦	٢٨٧	٣٥٩	٢٣	٥٥	١٦٥	٢٠٩	٤٣	١٠	١٧٠		
قش الدخن	٨٥٠	٢٣	٢٣	٣٦٤	٣٦٤	١٦	٢٠	٢٠٠	١٩٤	٢٢	٥٢	٢٢٣		
قش القردة الصفراء	٨٥٠	٥٠	١٥	٣٩٢	٣٤٥	١٧	٥٥	١٧٢	٢٢٥	٣٣	٤٧	٢٠٥		
قش الارز	٨٦٨	٥٥	٢٢	٣٢٥	٣٢٥	٢٥	٢٥	١٠٧	٢٠١	٤٠	٢٢	١٣٠		
قش القليم	٨٥٧	٢١	٢٣	٣٢٢	٣٢٢	٦٠	٤٠	١٢٩	٢٢٠	٣٢	٢٠	١٠٦		
قش الخنطة	٨٥٧	٢٠	٢٢	٣٥٩	٣٥٩	٢٥	٤٠	١٣٣	٢٠٤	٢٢	—	١٠٩		
قش القفل المصري	٨١٦	٨١	١١	٣١٠	٣١٠	٤٠	٥٥	٢٠٥	١٥٥	٤٨	٢٢	٩٢		
قش الحصن	٨٦٤	٩٠	١٦	٣٣٧	٣٣٧	٣٥	٧٠	١٨٥	١٣٧	٤٤	٢٢	١٢٢		
قش الباتية	٨٦٧	٩٠	١٧	٢٩٨	٤٠٩	٤١	٨٠	١٤٤	١٦٤	٣٥	٢٢	١٢٧		
قش القيس	٨٤٠	١٣٩	١٧	٢٨١	٣٣٦	٦٨	٨٠	١٦٨	١٣٧	٤٦	٤٠	١٦٤		
قش القرس	٨٤٠	٦٥	٤١	٣٠٨	٤١٤	٢٥	٤٠	١٢١	٢١٠	٤٤	١٦	١٩٤		
قش النفل المرمي	٨٤٠	٩١	١٨	٢٢٤	٤٢٦	٢٠	٦٠	١١١	١٦٤	١٨	٣١	٨٥		
قش الكرمه	٨٤٠	٦٧	٢٢	٣٢١	٣٩٩	٢٨	٤٠	١٦٢	١٥٥	٣٣	٢١	١٢١		
قش الصوبه	٨٤٠	٢٢	٢٠	٢٨٣	٢١١	٣٧	٤٢	٢٥٣	٢٠٩	٥٢	٢٥	١٢٢		
قش الجلبان	٨٥٢	١٣١	١٧	٢٩٠	٣٧٠	٨٧	٨٠	١٥٠	١١٠	٣٧	٢٠	١٢٧		
قش النعم	٨٤٠	٤٨	١٢	٣٤٦	٣٨٢	٢٢	٥٥	١٨٥	١٧٢	٤٢	١٧	١٥٥		
قش الخشخاش	٨٤٠	٦١	٤١	٢٢٩	٢٣٢	٢٨	٦٠	١٨٤	١٢٢	٤٧	٢٢	١٢٢		
قش السليم	٨٤٠	٢٥	١٢	٣٨٧	٣٧٨	١٠	٥٥	٢٤٤	١٤١	٢٠	١٧	١٥٢		

٥ - عصافه الحبوب

القمه	٩٤٣	٢٩	٢٠	٥٥٧	٢٥٨	١٥	٤٠	٢٢٤	٢٢٩	١٢٠	٨٥	٤٠٧		
الخندروس	٨٥٧	٢٥	١٢	٣٢١	٣٢١	٤٠	١٠	١٢٩	٢٠٠	٦٧	٧٠	٢٢٨		
الشمر	٨٥٥	٢٩	١٥	٣٨٤	٢٩٩	٨٠	٣٥	١٧٣	١٤٤	٧٤	٥٥	٢٤٥		
الخرفاطل	٨٦٢	٥٠	٤١	٢٦٧	٢٦٧	٩٠	٨٠	١٩٩	١٣٦	٧٩	٤١	٢٨٦		
الدخن	٨٨٠	٤٨	٢٢	٢٩٠	٤٠٨	١٧	٧٠	١٣٦	١٥١	٦٢	١٢	١٩٤		
القمه الصفراء	٨٦٩	٣٥	٢٠	٤١٣	٢٨٩	١٦	٤٠	٢٢٢	٢٢٢	٤٢	١٧	٢١١		

المئة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قدره

ماهية الغذاء	عناصر خام								عناصر منقصة			الإنسان الطلياني بالنسبة إلى النشا	مراد آية بالنسبة منقصة في مئة جزء	القيمة الطليانية الشعرية في مئة جزء
	مراد جافة	مراد أزوتية	مراد دهنية	خلاصات غير أزوتية	سليلوز	مراد أزوتية	مراد دهنية	خلاصات غير أزوتية	سليلوز					
الآزوت (الثلب)	٩٠,٥	٣,٧	١,٤	٣٢,٧	٣٨,٨	٠,٤	١,٣	٠,٤	١,٩	٠,١	٢,٥			
التيل	٨٥,٧	٣,٥	١,٣	٣٩,٥	٤٤,١	٠,٤	١,٣	٠,٤	١,٣	٢,٢	٢,٥			
الحمض	٨٤,٥	٤,٧	١,٧	٣٧,١	٣٠,٤	١,٤	١,٧	٠,٥	١,٦	١,٤	٢,٥			
الفاسفورا والبرياء	٨٥,٥	١,٥٧	٢,٥	٣٢,٥	٣٢,٥	٥,٢	١,٥	١,٤	١,٥	١,٤	٤,٥			
الخصص	٨٦,٥	٩,٨	٢,٢	٣٣,٧	٣٩,٥	٤,٩	٢,٥	٢,٥	١,٥	١,٥	٣,٧			
الحليب	٨٥,٥	١,٨٣	١,٨	٣٨,٤	٣٩,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	٨,٣			
الزئبق	٨٥,٥	٦,٨	٥,٧	٤١,٥	٣٠,١	٢,٦	٢,٦	٢,٥	١,٥	١,٥	١,٥			
الصيغة	٨٨,٥	٦,٣	١,٥	٤٢,٥	٢٥,١	٢,٨	٢,٨	١,٥	١,٥	١,٥	٢,٥			
الباقية	٨٥,٥	٢,٢	٣,٨	٣١,٨	٣٢,٣	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	٢,٥			
أنفص	٨٦,٨	٤,٦	١,٥	٣٥,٤	٤٣,٥	٢,١	٢,١	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥			
الكائن	٨٨,٤	٢,٥	٢,٤	٣٥,٥	٤٥,٧	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥			
سليلوز	٨٤,٥	١,٦	٣,٤	٣٧,٤	٣٧,٤	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥			

٦- في الجبلور والعساقل

١٩٥٠	٠١	١٢٠٠	—	١٨٥٩	—	١٥١	٠٧	٢١٠	٠١	٢٥٠	٢٥٠	بطاطا عادية
١٩٥٧	٠٢	١٢٠٠	—	١٢٥٥	—	٠٩	٠٦	١٢٩٩	٠١	١٦	١٧٠	بطاطا كثيرة الماء
١٩٨٨	٠٢	١٢٠٠	—	١٩٧٥	—	١٥١	٠٨	١٢٩١	٠٢	٢٥٠	٢٦٠	بطاطا قليلة الماء
٢٤٥٨	٠٢	١٢٠٠	—	٢٤٥٦	—	١٩٣	٠٩	٢٧٧٣	٢٥٠	٢٥٠	٢٢٠	بطاطا شديدة الفقر بالماء
٣١٥٥	٠٢	١٢٠٠	—	٣١٥٣	—	٠٩	٠٨	٢٤٥٨	٠١	١٦	٢٨٤٤	بطاطا مجفدة
١٧٧٧	٠١	١٢٩٥	—	١٨٥٤	٠١	١٥١	٠٧	٢١٧٧	٠٥	٢٥٠	٢٦٥	بطاطا مطسوة
٦٨٨٨	٠٧	١٢٠٠	—	٦٨٥١	—	١٥٠	٢٣	٧٥٤٠	٠٥	٧٥٤	٨٨٠	بطاطا مجففة
٦٧٧	٠٤	٠٩٠	٠٦	٦٥٥	—	١٥٢	٤٤	٧٥٢	٠١	٢٥٣	١٢٠	كرنب
٨٧٧	٠٤	٠٨٧	٠٧	٨٥٩	٠١	٠٨	١٣	٠٣	٢٥	١٢٢	١٢٠	جزر
١١٥٦	٠٥	٠٨٦	٠٨	١٢٥٥	٠١	٠٩	٤٤	١١٣٣	٠٣	١٢١	١٦٨	سيمارون كبير
٥٠٠	٠١	٠٧٤	٠٣	٦٥٤	—	٠٩	٠١	٠٧	٠١	١٢١	١٠٥	شونلر حلي كبير
٧٥٤	٠١	٠٥٠	٠٣	١٠٥١	—	٠٨	٠٨	١٠٦١	٠١	١٢١	١٣٥	شونلر حلي صغير
٦٥٣	٠١	٠٧٢	٠٣	٨٥٣	—	٠٨	٠٩	٨٥٧	٠١	١٢١	١٢٠	شونلر حلي متوسط
٤٦١	٠٢	٠٧٧	٠٣	٥٥٥	—	٠٦	٠٨	٦٥٠	٠١	٠٩	٨٥	لفت اسود
١٦٤٤	٠٤	٠٩٢	٠٢	١٥٥٨	—	١٠	٠٧	١٦٩٩	٠٢	٢٥	٢٠٤	طرابوت
١٥٥٨	٠٣	٠٧٥	٠٥	٢٥٣٢	—	٠٩	١٥	٢١٤٤	٠١	٢٥	٢٥٠	شونلر سكري
٤٠٨	٠٣	٠٧٨	٠٤	٥٤٤	—	٠٨	١٥	٥٩٩	٠١	١٢١	٩٢	لفت

٧- في الحبوب والثمار

رقم	اسم	تاريخ الميلاد	تاريخ الوفاة	سنة الوفاة	مكان الدفن
٧٤٢	٩١	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٥	٣٣٠
٥٣١	٧٢	١٣٩٢	١٣٩٨	١٣٩٨	١٣٩٨
٧٤٣	١٠٠	١٣٠٠	١٣٠٣	١٣٠٥	١٣١١
٧٢٠	٦١	١٣٩٩	١٣٩٣	١٣٩٤	١٣٩٦
٧٥٨	٥٩	١٣٩٩	١٣٩٢	١٣٩٧	١٣٩٦
٦٦٤	٦٥	١٣٩٧	١٣٩٣	١٣٩٧	١٣٩٧
٥٩٧	٧٢	١٣٩٥	١٣٩٦	١٣٩٨	١٣٩٨
٦٣٤	٥٦	١٣٩٦	١٣٩١	١٣٩٦	١٣٩٦
٤٤٨	٩٢	١٣٩٣	١٣٩٣	١٣٩٠	١٣٩٢
٥٩٧	٧٤	١٣٩٥	١٣٩٢	١٣٩٨	١٣٩٨
٨١٥	٦١	١٣٠٠	١٣٩٣	١٣٩٧	١٣٩٧
٨٢٠	٥٥	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٨	١٣٥٨
٧١٣	٨٧	١٣٩٥	١٣٥١	١٣٩٣	١٣٩٦

التي جزء من الغذاء المذكور تحوي ما لدره

ماهية الغذاء	عناصر محام								عناصر منهضة				الحين الطبيعي بالنسبة للنشا	مواد أسيمة منهضة في مئة جزء	القيمة الطاقة التي تحتوي في مئة جزء
	مواد جافة	مواد أزوتية	مواد دهنية	مواد غير أزوتية	سليلوز	مواد أزوتية	مواد دهنية	مواد غير أزوتية	سليلوز	مواد أزوتية	مواد دهنية	مواد غير أزوتية			
ثفل الشيل الطري	٧٢٨	١٧٧	٤٠	٤٦٦	٠٧٧	١٠١	٢٠٣	٣٧٧	٠٠٤	٠٨٧	٠٠٩	٤٠٨			
ثفل الشيل الجاف	٩٠٠	٢٢٧٧	٠٥٤	٤٧١	٨٥٩	١٤٥	٩٠٩	٣٧٧	٢٠٣	٠٨٤	١٠١	٠٣٢			
ثجير الفتح الطري	١٩٨٨	٠٩٠	٠٧٧	١٣٧٢	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠			
ثجير الفتح الجاف	٩٠٠	٤٠	٣٧٢	٠٩٠	٠٩٠	٢٠٥	١٠٩	٠٩٠	١٠٩	٠٩٠	١٠٩	٣٦٦			
ثجير المنب الطري	٣٠٠	٣٠٤	٢٠٤	١١٠٩	٠٩٤	٠٩٤	١٠٩	٠٩٤	٠٩٤	٠٩٤	٠٩٤	٢٠٥			
ثجير المنب الجاف	٩٠٠	١٠٥	١٠٩	٢٦١٢	٢٨١٢	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	٢٠٥			
د - الاكسية															
كسب القطن غير المقشور	٨٩٥	٢٤٥	٦٠	٢٦٣	٢٥٠	١٨١	٦٠	١٣٤	٤٠	٠٨٤	١٧١	٣٩٢			
كسب القطن المقشور	٩١٢	٤٩٢	٩٧	١٩٢	٦٠٣	٤٢٣	٩٠	١٣٤	٤٠	٠٩٨	٤٠٩	٧٢١			
كسب القطن السوداني	٩٠٩	٤٤٥	٩٢	٢٢٨	٤٠٩	٤٠٩	٤٠٩	٤٠٩	٤٠٩	٤٠٩	٤٠٩	٧٥٧			
كسب قطنام (الكتينز)	٨٨٠	٣١٨	١٠٠	١٨٠	٢٠٢	٢٣٩	٩٠	١٠٩	١٠٩	٠٩٨	٢٢٦	٤٩٠			
كسب القطن المزيت	٨٩٥	٣٦٨	٢٠٣	٢٠٩	٢١٠	٢٦٦	٢٠٩	٢٦٦	٢٠٩	٠٩٨	٢٠٩	٣٥٨			
كسب الكاكاو	٩٠٠	١٨٨	١١٢	٣٦٤	١٥٥	٠٩٤	٠٩٤	٠٩٤	٠٩٤	٠٩٤	٠٩٤	٣٩٠			
كسب جوز الارابي	٩١٠	٤٠٩	١١٧	٢١٢	٤٠	٣٩٧	١١٢	١٣٤	٤٠	٠٩٨	٣٨٢	٨٢١			
كسب جوز الكاكاو	٨٩٧	٢٦٣	٠٨٨	١٩٠	٢٨٢	١٣٤	٠٩٤	٠٩٤	٠٩٤	٠٩٨	٣٨٢	٣٧٧			
كسب جوز التاربيول	٨٩٥	٢٠٩	٠٩٠	٢٨٧	١٤٧	١٣٧	١٤٧	١٣٧	١٤٧	١٣٧	١٣٧	٧٦٥			
كسب زور البطين	٩٠١	٣٦١	٢٢٧	١١٥	١٤٠	٣٣٥	٢١٦	١٣٦	١٣٦	٠٩٨	٣١٤	٩٤٠			
كسب زور القصار	٨٩٥	٣٢٠	٩٧	٢٩١	١١٢	٢٦٦	٠٩٢	٢٣٣	٤٠	٠٩٨	٢٣٣	٧٠٧			
كسب زور الكتان	٨٩٠	٣٣٥	٨٦	٣١٧	٨٧	٢٨٨	٢٠٩	٢٦٦	٢٠٩	٠٩٨	٢٦٦	٧١٨			
دقيق زور الكتان المزيت	٨٩٨	٣٧٤	٣٨	٣١٧	٩١	٣٢٢	٢٦٦	٢٦٦	٢٦٦	٠٩٨	٣١٤	٦٤٨			
كسب الصمغ	٨٩٥	٤٥٢	٤٠	٢٥٩	٦٥	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٠٩٨	٢٠٩	٧٤٩			
دقيق الصمغ المزيت	٩٠١	٤٧١	٢٠٩	٢٧٣	٧٠	٤٢٣	١٣٥	٢٦٦	١٣٥	٠٩٨	٢٦٦	٧٢١			
كسب القز	٨٩٥	٤٠٩	١٦٥	١٨٩	٢٠٩	١٥٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	٠٩٨	١٣٧	٣٤٢			
كسب الخشخاش	٨٨٥	٣٥٧	١٢٢	١٨٩	١٢٢	٢٨٧	١١٢	١٨٨	١١٢	٠٩٨	٢٦٦	٦٦٢			
كسب التريتون	٨٨٣	٧٢٢	١٣٨	٢٨١	٣٣٧	٤٢٣	٢٦٦	٢٦٦	٢٦٦	٠٩٨	٢٦٦	٥٦٤			
كسب السلم	٩٠٠	٣٣١	١٠٩	٢٦٦	١٢٠	٢٦٦	٢٦٦	٢٦٦	٢٦٦	٠٩٨	٢٦٦	١٠٩			
دقيق السلم المزيت	٩٠٠	٣٤٨	٤٠	٣٠٩	١١٧	٢٨٩	٤٠	٢٤٣	٤٠	٠٩٨	٢٤٣	٥٢٣			
كسب الانيسون	٩٢٦	١٨١	١٩٠	٢٧٣	١٦٥	٢٨٧	١٦٥	٢٨٧	١٦٥	٠٩٨	٢٧٣	٦٩٢			
كسب الشار	٩٠٥	١٧٥	١٣٩	٢٨٧	١٣٩	٢٠٩	١٣٩	٢٠٩	١٣٩	١٣٩	١٣٩	٥٢٣			
كسب الكزبرة	٩٠٠	١٤١	١٨١	٣٠٦	٢٠٩	١١٢	١٣٥	١٣٥	١٣٥	٠٩٨	١٣٥	٨٠٩			
كسب الكون	٩٠٠	٢٠٧	١٧٥	٢٥٨	١٨٢	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	٠٩٨	١٣٥	٨١٥			
كسب الصبر	٩٠٩	٤٠	١٣٥	٢٥٣	٢٩٨	٢٦٦	٢٦٦	٢٦٦	٢٦٦	٠٩٨	٢٦٦	٦٥٠			
كسب البقر	٩٢٥	١٣٥	٢٤٤	٢٦٥	٢٦٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	٠٩٨	١٣٥	٧٢٣			
كسب السمسم	٩٠٥	٣٩٨	١٢٦	٢٠٦	٦٨	٣٥٨	١١٢	١٣٥	١١٢	٠٩٨	١٣٥	٧١٠			
كسب البطيخ	٩٠٨	٣٩٤	١٢٦	٢٠٧	١١٧	٣٥٥	١١٢	١٣٥	١١٢	٠٩٨	١٣٥	٧٢٠			
كسب الجوز	٨٦٦	١٢٢	٢٧٦	٢٠٩	٦٠	٣١٥	١١٢	٢٢٥	١١٢	٠٩٨	٢٢٥	٧٨٥			

٩ - في بعض المواد الحيوانية المصدر

دم جمل	٩١٠	٨٢٩	—	—	—	٧٧٢	٢٥	—	—	١٠٠	٦٨٠	٦٧٧
دقيق السمك القليل الدهن	٨٧٢	٥٢٥	—	—	—	٤٧٢	١٠٠	—	—	١٠٠	٤٣٦	٤٤٠
دقيق السمك الغزير الدهن	٨٩٢	٤٨٤	١١٦	—	—	٤٣٦	١١٠	—	—	١٠٠	٤٠٩	٦٤٢
دقيق اللحم	٨٩٢	٧٢٣	١٣٢	—	—	٦٧٢	١٢٥	—	—	١٠٠	٦٣٦	٨٩٠
حليب البقر	١٢٣	٣٥	٢٠٤	—	—	٢٣٢	٢٠٩	—	—	١٠٠	٢٣٢	١٤٧
حليب البقر المخفوف	١٠٩	٤٠	٢٠٨	—	—	٢٣٨	٢٠٩	—	—	١٠٠	٢٣٨	٩٠
مضادة الزبدة	٩٠	٤٠	٤٠	—	—	٢٣٨	٢٠٩	—	—	١٠٠	٢٣٨	٩٠
مصل اللبن	٧٢٣	١٠	٢٠٨	—	—	٢٠٩	٢٠٩	—	—	١٠٠	٢٠٩	٦٠٩
دقيق الحوت القليل النظم	٩٢٧	٦٢٣	٢٥١	—	—	٢٢٣	١٠٩	—	—	١٠٠	٢٢٣	١٠٩
دقيق الحوت الكثير النظم	٩٤٤	١٠٩	٢١٩	—	—	٤٦٠	٢٠٨	—	—	١٠٠	٢٨٦	٨٦٤

١٨٩٥١ - علم الحبل، علم

المثلث والمثلث؛ غير مائي وقره كالمثلث ويتبع ويعتقد ويطلق به اللحم عرساً من الحبل (١. م.)



علم الحبل

١٨٩٥٢ - علم الحبل، علم

Ablepharus (S).
Abléphare (F). Ablepharous (E).
جنس زحافات صغيرة من الطائفتين وصليبة السقنقوريات. انزاعها الملوقة قليلة العدد أصنافها المناطق الحارة من العالم القديم || أجسامها صغيرة، مستديرة الخشاء، تطول من ١٥ إلى ١٠ سم. رؤوسها شبه مخروطية الشكل. عيونها صغيرة عديمة الحواجب. أذنانها دقيقة || جميعها ناضجة، قوتها الديدان والحشرات.

١٨٩٥٣ - علم الحبل، علم

هي السفة، علمها.

١٨٩٥٤ - علم الحبل، علم

هي ثغول الحفل، علمها.

١٨٩٥٥ - علم الحبل، علم

هو الجلع، علمها.

١٨٩٥٦ - علم الحبل، علم

Hirudo (S).
Sanguis (F). Leech (E).
علقة ج حلق؛ اسم شامل يطلق على اجناس وأنواع كثيرة من البلق الماسر. يعيش في الماء، قوته الدم يمتصه شيئاً يستطع.



علقة

١٨٩٥٧ - علم الحبل، علم

Hoemopsis vorax (S).
Sanguis du cheval, S. verte, Vorax (F).
علقة صغيرة القند أسفينية الشكل غضراء اللون، تعيش في الماء والرسل وقد تركب الحيوان إذا اقرب منها وهي تزدي الحبل إذا دخلت أنفها وبطلت في استنكها لذلك يحسن انزاعها عند رؤيتها قبل تقاليم شرها.

١٨٩٥٨ - علم الحبل، علم

Sanguis piscicole (F).
علقة صغيرة القند تحيلة الجسم تعيش على مختلف الأسماك البحرية وللجربة تمتص الدم وقد تسبب الموت.

١٨٩٥٩ - علم الحبل، علم

Aulostoma (F).
علقة صغيرة القند أسفينية الشكل ممرار اللون، تعيش في المياه العذبة تركب الأسماك والقشريات.

١٨٩٦٠ - علم الحبل، علم

نبت قصبته دقاق صبر رؤسها يتخذ منه المكناس ويشرب طيبته لاستسقاء (اللسان).



علقة الحبل

١٨٩٦١ - علم الحبل، علم

Hirudinae (S).
Hirudinées (F). Hirudinées (E).
طائفة من الديدان الحلقية لها وشتان انزاعيات والحركات اكثرها من التوريات المائية ومنها الارضية التي تعيش على الاشجار. منها المناطق الاسطوانية. تتميز بأجسامها المستطيلة الاسطوانية التي تبدو كأنها خالية من الرؤوس قوتها المواد الحيوانية. مسطها ماسر يمتص الدم.



علقة نهريه

١٨٩٦٢ - علم الحبل، علم

هي البيولوجية، علمها.

١٨٩٦٣ - علم الحبل، علم

Conchyliologie (F). Conchology (E).
علم يبحث في الاصداف والحار واشياها.

١٨٩٦٤ - علم البحار، علم

Océanographie (F). Oceanography (E).
علم يبحث في علم البحار ونبوتها وما هي عليه من مختلف الأحوال الطبيعية.

١٨٩٦٥ - علم التاريخ الطبيعي، علم

Histoire naturelle (F). Natural history (E).
علم يبحث في وصف الاشياء وتصنيفها.

١٨٩٦٦ - علم التربة، علم

Agrologie (F). Agrology (E).
دراسة التربة حكيماً وكبارياً وميكانيكياً وبيولوجياً. وهو أيضاً دراسة الآتربة الزراعية وصلاتها بالزروع.

١٨٩٦٧ - علم التصنيف، علم

Taxonomie, Taxinomie (F). Taxonomy (E).
هي التندة، علمها.

١٨٩٦٨ - علم الحجاب، علم

Tératologie (F). Teratology (E).
علم يبحث في اسباب غرائب المخلوقات ومن دواصها. كالانجاء في العيوب والشملة في النبات والاعراب الخ.

١٨٩٦٩ - علم الثدييات، علم

Mammalogie, Mammologie (F). Mammalogy (E).
قسم من علم الحيوان يبحث في الثدييات دون غيرها.

١٨٩٧٠ - علم الحشرات، علم

Entomologie (F). Entomology (E).
قسم من علم الحيوان يبحث في تصنيف الحشرات ونبوتها واطوارها وطبائنها وأضرارها.

١٨٩٧١ - علم الحفريات القديمة، علم

Paléontologie (F). Palaeontology (E).
هو الاساحة، علمها.

١٨٩٧٢ - علم الحيات، علم

Ophiographie, Ophiologie (F). Ophiography, Ophiology (E).
علم يبحث في وصف الحيات وتصنيفها.

١٨٩٧٣ - علم الحيوان، علم

Zoologie (F). Zoology (E).
فرع من التاريخ الطبيعي أو علم المواليد يبحث في الحيوان.

١٨٩٧٤ - علم الحيات الزراعية، علم

Zoologie agricole (F).
Agricultural zoology (E).
الدراسة المفصلة الواقة لجميع الحيوانات المفيدة والمضرة بالزراعة.

١٨٩٧٥ - علم الحشرات، علم

Oenologie (F).
Oenology (E).
دراسة كل ما يتعلق بالخمر كصنعتها وتخليطها وحفظها وامرارها الخ...

١٨٩٧٦ - علم الحبل، علم

Hippologie (F).
Hippology (E).
علم يبحث في الحبل يشمل كل ما ينص به من جميع الوجوه.

والنماز والفيزيولوجية . وعلم النبات الخاص الذي يبحث في التحلية والتصنيف والجغرافية وتختلف المعطيات والتعليقات الزراعية والعلمية والصناعية .

١٨٩٩٢ - علم الثبوت البحرية ، فيكولوجية

Phycolgie (F), Phycolgie (E).

١٨٩٩٣ - علم النسيج ، إستولوجية ، تساجة

Histologie (F), Histologie (E).

علم يبحث في النسيج المنسوجة وأغلايا التنشوية في الأحياء .

١٨٩٩٤ - علم النواة ، كاريولوجية

Caryologie (F), Karyologie (E).

١٨٩٩٥ - علم الهواء ، علم طبقات الهواء

Aérolgie (F), Aerologie (E).

١٨٩٩٦ - علم أمراض الحيوان

Zoopathologie (F), Zoopathology (E).

١٨٩٩٧ - علم حياة النبات

Phytobiologie (F), Phytobiology (E).

١٨٩٩٨ - علم قوة السوائل

Hydrodynamique (F), Hydrodynamics (E).

هو علم قوة الموائع من مائية وغيرها .

١٨٩٩٩ - علم وصف النبات

Phytographia (F), Phytography (E).

رابع نملة .

١٩٠٠٠ - علمانية

Sécularisme (F), Secularism (E).

العلمانية مذهب فلسفي إنكليزي ينفي الفكرة الدينية في المصير البشري .

١٩٠٠١ - علمية

Scientisme (F), Scientism (E).

العلمية مذهب فلسفي يمان التفوق المطلق العلم في كل شيء .

١٩٠٠٢ - علمية

في المنقب . أما كلمة علمية فهي من وضع الأير مصطفي الشهابي .

١٩٠٠٣ - علم

Hippotragus, Egcoceros (S), Hippotragus, Egcoceros (F), Sable antelope (E).

جنس حيوانات لينة عذرة وبائية الاختلاف من يقر الوحش . أنواعه الحالية ثلاثة جميعها كبيرة القوية تشبه من الارح . قربها ملوية حديده كالكسوف العربية وهي في الذكور أكبر مما هي عليه في الاناث . اذناها كبيرة مستطيلة . اذناها قصيرة أو متوسطة القف . اعطائها البلاد الافريقية . تأوي القبايلي والبروج والاحراج . تعيش بهاجات متوسطة العمد اجلها براوح بين ١٠ و ٤٠ ، وتعيش طوب ذكر مائم رافقه من الذكورين الى الخمسة ذكور يافئة لا تحمص بعد . اما الذكور المستفعل من النطمان وتجنس الى بعضها أو تعيش على انفراد .

١٩٠٠٤ - علم لزرق

Hippotragus leucophaeus (S), Hippotragus leucophaeus (F).

نوع من العلمب وهو اكبرها جنة وانسبها قوياً واجلها شكلاً يملو نحو ١٦٥ سم . ثوبه الى الزرق اللامع . رأسه اسود الجبهة واليالة العريضة . محمره الى اليانص

١٨٩٩٧ - علم الدواجن ، دجاجة

Zootchnie علم يبحث في أنسال وسلالات الدواجن ووسائل تربيتها وطرق استغلالها الخ...

١٨٩٩٨ - علم الزراعة

Agronomie (F), Agronomy (E).

هي العلوم الزراعية أو بالاحرى هي دراسة قواعد الفنون الزراعية التي تسمح بتطبيق العلوم على الزراعة .

١٨٩٩٩ - علم الزواحف ، زحفنة

Erpétologie, Herpétologie (F), Herpetology (E).

علم يبحث في وصف الزواحف وتصنيفها واحكامها العلمية .

١٨٩٨٠ - علم الشرايين

Artériologie (F), Arteriology (E).

١٨٩٨١ - علم الصحة

Hygiène (F), Hygiene (E).

علم يبحث في حفظ الصحة وقايتها .

١٨٩٨٢ - علم الصخور ، صماسة

Pétrographie (F), Petrography (E).

علم يبحث في الصخور وتركيبها .

١٨٩٨٣ - علم الصناعات الزراعية ، تكنولوجية

Technologie agricole (F), Agricultural technology (E).

درس جميع الوسائل العلمية والعملية المختصة بالصناعات الزراعية كصناعة السكر والكمحول والزيت والخمر والخبز .

١٨٩٨٤ - علم الطير ، طيريات

Ornithologie (F), Ornithology (E).

علم يبحث في الطير من جميع نواحيه الطبيعية والتأشيشية والاقتصادية .

١٨٩٨٥ - علم الغدد

Adénologie (F), Adenology (E).

١٨٩٨٦ - علم الكائنات

Ontologie (F), Ontology (E).

علم يبحث في الكائنات وباعيتها .

١٨٩٨٧ - علم المعادن ، معدنيات

Minéralogie (F), Mineralogy (E).

١٨٩٨٨ - علم المتعولات

Métaphysique (F), Metaphysics (E).

علم يبحث في اصول المبادئ وفي العلل المولية الاولى .

١٨٩٨٩ - علم المفاصيل

Arthrologie (F), Arthrology (E).

١٨٩٩٠ - علم الميكروبات ، ميكروبيولوجية

Microbiologie (F), Microbiology (E).

علم يبحث في تصنيف الميكروبات ووصفها وخصائصها وبترابها واضرارها وبكائناتها .

١٨٩٩١ - علم النبات ، بوتانيك ، فيتولوجية

Botanique, Phytologie (F), Botany, Phytology (E).

درس العلوم العلمية الذي يتناول النبات وهو قديم : علم النبات العام الذي يبحث في الثبوتية والايستولوجية

٣٠٠ منها الحولية والمحولة والمصرة . أصنافها شعبة الأرباء تشمل جميع الأصناف المختلفة الحمرية . منطها بري وبضها قرصية وطي . سقيا فراءه . أوراتها كاملة ، متقابلة ، سنانية النعل . أزهارها مستطيلة الزناد ، لاقسية التجميع والارتكاز || أشهر أنواعها ما يتبع .

١٩٠١٣ - عَلَقَبْ أَحْمَر * ، سِيلَان طَائِي ، صَمْنَع الدَّيَاب

Silene sermeria (S). Silène à bouquet, Attrape-mouches (F). Common catchfly (E). Gartenimkraut (D). Silene a mazzetti, Aochlappa moscha (I). عشية حولية برية طية مبدولة . ساقها فراء تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . أوراتها حافضة . نصلها يبقى الشكل جامد الصفة ، حابق الخضار . أزهارها طليقة التجميع ، حر البتلات || أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول .

١٩٠١٤ - عَلَقَبْ أَخْضَر الزَّهَر * ، سِيلَان أَخْضَر الزَّهَر

Silene viridiflora (S). Silène à fleurs vertes (F). عشية معمرة تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم . ساقها عشية . أوراتها سنانية . أزهارها أبطية الارتكاز . بتلاتها ثنائية التفصيص خضراء اللون || أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٩٠١٥ - عَلَقَبْ بَحْرِي * ، سِيلَان بَحْرِي

Silene maritima (S). Silène maritime (F). عشية برية معمرة تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . مهدا شطوط المنط ، ساقها ليفية فراء . أوراتها بيفية الشكل ، بحرية اللون ، أزهارها حنكوية التجميع . بتلاتها إلى الأبيض الاصفر للمواج || أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول . يقال أنها تجبة تقيد المدة والامعاء .

١٩٠١٦ - عَلَقَبْ سَحْلَبِي * ، سِيلَان سَحْلَبِي

Silene orchidea, S. stoeon (S). Silène orchidée (F). عشية حولية تربينية مهدا الشرق الاوسط . ساقها فراء زياء لزينة تملو من ١٥ إلى ٣٠ سم . أوراتها صفيية الشكل ، شبيكة النعل الخسل البشرة . أزهارها ودية اللون . بتلاتها مقنطية الأطراف المسنة المفلوكة || أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٩٠١٧ - عَلَقَبْ شَكَطَة * ، سِيلَان شَكَطَة

Silene schafta, S. inflata (S). Silène schafas, S. enflé, Behen blanc, Cornillef (F). Bladder campion, White bottle, White ban (E). Kropfleimkraut (D). Bubboline, Mazzettini, Stirtoli (I). عشية ردية معمرة تملو من ٨ إلى ١٥ سم . ساقها وطرصها نخيلة . أوراتها بيفية الشكل طول من ١٠ إلى ١٥ سم . أزهارها حراء اللون أو بيضاء . بتلاتها مقنطية الأطراف المسنة || أزهارها يستمر من آب إلى أيلول . وفي من البتلات العلية . يقال أنها تقيد المدة والامعاء .

١٩٠١٨ - عَلَقَبْ عَدَمِ السَّاق

هو عشية الدياب ، أطليه .

١٩٠١٩ - عَلَقَبْ قَرْصِي * ، سِيلَان الدُّبَاب ، لُسَيْعَة

Silene gallica (S). Silène de France, S. à cinq plaies (F). Little brown pigs, Small flowered catchfly (E). Französisches leimkraut (D). Silene cinque plaies, S. salvatico, Mazzettino (I). نبات عشبي طيبي محزل ، ساقه فراء زياء تملو من ٣٠

الانبر || موطنه أحراج وبراضي الترانسفال . إجله قليل لمدد براوح بين ٥ و ١٥ فرداً .

١٩٠٠٥ - عَلَقَبْ أَسْوَد * ، أَبُو عُرْفُ الْأَسْوَد

Hippotragus niger, Egcoceros niger (S). Hippotragus noir, Egcocère noir (F). نوع من العلقب كبير الجثة ينمو نحو ١٢٥ سم . قرنه بطول ١٠٠ سم . وهو غليظ الانتشابه ، ذيب الطرف ، حودي الجسم ، مائل الزنم الأخير . ثوبه إلى السود اللامع . بطنه خضراء وجليه ييش . موطنه فصيح الأرباء يمتد من الحبشة إلى الترانسفال . إجله براوح بين ٢٠ و ٤٥ فرداً .

١٩٠٠٦ - عَلَقَبْ أَغْبَر * ، أَبُو عُرْفُ الْأَغْبَر

Hippotragus equinus, Egcoceros equinus (S). Hippotragus chevalin, H. équien, Egcocère chevalin (F). نوع من العلقب كبير الجثة ، جسمه يطول نحو ٢٢٦ سم . قرنه إلى ١٥٠ . قرنه لا يفرق عن قرن العلقب الاسود شيئا . ثوبه إلى البنية السراء ، يابض رأسه قليل الانتشار ، جبل التضخيط ، يكتنف العين من مقصها ومؤخرها . موطنه فصيح الأرباء يمتد من ضفاف بحيرة فيكتوريا . نيازرا إلى أطراف السنغال || إجله لا قياسي المدة يختلف باختلاف أصنافه وسلالاته ، براوح بين ١٠ و ٥٠ نفراً .

١٩٠٠٧ - عَلَقَبْ

Eomecon (S). Eomécône (F). جنس نباتات عشية معمرة من فصيلة الحشائشيات ، أنواعه قليلة العدد ، سقيا فراء تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم . أوراتها قلبية الشكل ، مستديرة القامة . نصلها صمغ الصفة ، مسن الحافة ، جبل الخضار الزاهي . أزهارها أبطية وضامية الارتكاز . قطرها نحو ٥ سم . لون بتلاتها يختلف باختلاف الأنواع منها الأبيض والودي والبنفسجي والوشح . أما أسديتها ففسر || أزهارها يستمر ثلاثة شهور تمتد من أواسط الصيف إلى أواسط الخريف .

١٩٠٠٨ - عَلَقَبْ

Phoroptos (S). Phoropte (F). جنس حشرات ذرية من فصيلة الجربيات ورتبة القتراديات أنواعه عديدة تستغل حل الحبل والنم والابقار والأرانب تقسب لها الجرب الرطب (Gale bumide) الذي يكائن باسئمال بعض الادهان الكبريتية التركيب .

١٩٠٠٩ - عَلَقَبْ ، إِرْقَاع

Hauteur (F). المساة السودية من القاعة إلى التمة .

١٩٠١٠ - عَلَقَبْ هو سد الحصر ، أطليه .

١٩٠١١ - عَلَقَبْ

Desmodus (S). Desmode (F). Desmodus (E). جنس غشائيات من فصيلة الورقيات . أنواعه قليلة العدد . أجسامها صغرة القند ، طولها براوح بين ٧٥ و ٨٠ سم . وبسطةا من ٣٥٠ إلى ٣٦٠ سم . فرأطليها أسفينة قصيرة . أزوارها إلى الرتبة المفلوكة الصنانية . جلودها خلية اللمس . موطنها ييم المكسيك والبرازيل والشيلى . تعيش منفردة . ذكرورها تقرب أنثاه عند الكوم فقط . قرنها الدم تمتصه أينا استطاعت . تألف الأشجار أحمرية ووقاب الصخور .

١٩٠١٢ - عَلَقَبْ ، سِيلَان ، سِيلَنُوس ، تَمَنُوكَة

Silene (S). Silène (F). Campion, Catchfly (E). Leimkraut (D). Silene (I). جنس نباتات عشية من فصيلة القترنقيات ، أنواعه زهاء



علقب اسود



علقب اغبر



علز



علوك احمر



علوك اخضر الزهر



علقب سحلبى



علوك شكة

الى ٥٠ سم. اوراقها اعليجية الشكل مستطيلة الزام الاخير
نصلها خلى البشرة الزرقية. ازماره صغيرة لثقة و رودية
اللون، حلقية التجميع || ازماره يستمر من تموز الى
آب.

١٩٠٢٧ - عَلَيَّس

السُّلَيْس تبت يزقّم به ويتخذ منه الرق (السان).

١٩٠٢٨ - عَلَيَّس

Otolithe (F).

مكة بحرية تسمى حليلط، اطلها.

١٩٠٢٩ - عَلَيَّس

Parrotia (S). Parrotie (F).

جنس اشجار ونباتات برية و زينة من فصيلة المشرقات.
ازماره المرفوعة اربعة اوراقها متعاقبة عابله. ازمارها
عقودي التجميع تاجي الازتكاز. ازمارها عابدة البتلات،
سباعية الالدية و سبعة الياض مزدوجة فريقات
المبيض || اعرفها واشهرها الحليلط القاري.

١٩٠٣٠ - عَلَيَّس قَارِوسِي

Parrotia persica (S).

Parrotie de Persa (F).

نوع من الحليلط، مهدد بلاد ايران. ثمرته تملو من ٦
الى ١٢ م. اوراقها عابله تشبه اوراق تفول من ٤
الى ١٠ سم. نصلها جامد النسيج خلى الفروق. ازمارها
بنفسجية اللون وعلوها موج زقوي. ثنائياتها خلية.
اسديتها الى الحرة ثنائية || ازمارها يستمر من نيسان
الى ايار.

١٩٠٣١ - عَلَيَّسَة

هي القنبرة السوداء، اطلها.

١٩٠٣٢ - عَلَيَّسِي ، مَدِيد ، عَلَيَّسِي

Coupage (F). Cutting (E).

تهينة الملف قبل تقديده الى الحيوان وقد يكون اى غلط
الحبوب المخرقة مع النضافة والكسب والتين الخ. او
بقطع الاشباب والكلأ كالقصير والغيب. او بتشيف
الجذور والمسائل كالبزور والشمندر والبطاطا الخ.

١٩٠٣٣ - عَلَيَّسِي هو النسيج، اطلها.

١٩٠٣٤ - عَلَيَّسِيَّات

سبط من فصيلة الورديات يدعى السجيات.

١٩٠٣٥ - عَمَّاه

الماء المسحب المرتفع الكثيف.

١٩٠٣٦ - عَمَّاتَة فِيجَة

Amata phegea (S). Amata phégée (F). Amata phegea (E).

حشرة من فصيلة الباتيات ورتبة شرفيات الاجنحة.
مرتبها بعض المناطق الحارة من الاقاليم المعتدلة الحرارة.
فراشتها جارية قوتها رقيق الاعمال. مرتبها عابله ناعمة
تعيش على اوراق النبات ولاء الانجار || جسمها متوسط
لقد يطول نحو ١٤ م. بسطها نحو ٣ م. راسها اسود
عينها كبرتان. زباناها خيطان. شفها مستطيل.
جوشها وعلها الى الكسني الاسود المويج || وراشها لذكر
الى الجورة السوداء المويج يتخللها في الفزج الاسامي رقة
من ست بقع ويتخللها في الفزج الخلفي بقعة بيضاء
وتغطان || وراشها الاشي الى الجوزي الاكعب المويج
المدوم الرقة || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة



علوك قرسي



علوك نجيل



عمّاتَة فِيجَة

١٩٠٢٠ - عَلَوَك كِيد ، سِيلَان كِيد

Silene compacta (S). Silène compact (F).

حبة زينة حولية، مهدد الشرق الاوسط. ساقها فرما:
تلمو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اوراقها اعليجية الشكل مدعجة
الناضدة و ذرية الزام الاخير المذهب النضدة. نصلها
جامد النسيج، بحري اللون. ازمارها عابدة الازتكاز، حلقية
التجميع و لينة. بتلاتها بنفسجية الشكل و رودية اللون.
ازمارها يستمر من تموز الى آب.

١٩٠٢١ - عَلَوَك مُزْعَبَر ، سِيلَان مُهْدَب

Silene hispida (S). Silène hérissée (F).

حبة حولية يونانية المهد، ساقها فرما تلمو من ١٥
الى ٣٠ سم. اوراقها ثنائية النصل خلية البشرة. ازمارها
عقودية التجميع ثنائية الانقسام و رودية اللون || ازمارها
يستمر طوال فصل الربيع.

١٩٠٢٢ - عَلَوَك مَكْدُونِي ، سِيلَان مَكْدُونِي

Silene asteris (S). Silène Astérie (F).

حبة سبروتية مصرية، مهدد حطاب مغربية وهي من
النباتات الناضدة الاضداد الزينة. ساقها قوية لزجة
عابدة الفروع تلمو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها
صغيلة الشكل تلمو من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من
١٥ الى ٢٠ م. ازمارها ابرمية اللون و حلقية التجميع.
ازمارها يستمر طوال شهر حزيران.

١٩٠٢٣ - عَلَوَك نَحِيل * ، سِيلَان نَحِيل

Silene delicatula (S). Silène gracile (F).

حبة حولية دقيقة، مهدد الشرق الاوسط. ساقها نحيلة
فرما تلمو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها صغيلة الشكل
دقيقة. ازمارها فردية التجميع يضاء اللون || ازمارها
يستمر طوال فصل الصيف.

١٩٠٢٤ - عَلَوَم زُرَاعِيَّة

Sciences agronomiques (F). Agronomic sciences (E).

العلوم الزراعية دراسات تيمث في الآلية والنباتات
والحيوانات والحشرات والفطرو والامراض الحيوانية والاصوام
النباتية والكيمياء والكثير ياد والاقتصاد والصناعات الزراعية
و ترىة التبراج والابنية والرفية واستثمار التربة واستعمال
المعدات الآلية الخ.

١٩٠٢٥ - عَلَيَّات

Paraneoptera (S).

Parandoptères (F). Paraneoptères (E).

شعبة شحات من طائفة الحشرات اصلا تشمل ثلاث
طبقات وست رتبة والعديد من الفصائل || طبقاتها تعرف
بالقليات وديديات الجناح ونضفات الجناح. اما رتبها
فهي القليات والقلليات والصفانيات وديدية الاجنحة
ونضفانة الاجنحة وتختلف الاجنحة.

١٩٠٢٦ - عَلَيَّيَّة ، يَكْسِيد

Pyxide (F).

Pyxidum (E).

ثمرة كالجوز او كالحق تتفتح بالمرض فيفصل جزواها
الاعلى كانه غطه عليه.

الى ١٠٠ سم. اوراقها قرصية الانتشاب خفيفة ذرية تطول من ١٠ الى ١٢ سم. وتعرض من ١ الى ٣ سم. تصالها اسفنجية الصفحة || ازهارها حامية الارتكاز خفيفة للالوان واشكال التجميع || اشهر انواعه الزينية المناز الصواني .

١٩٠٩٣ - عَنَابٌ صِيَوَانِي * Butomus umbellatus (S). Butome en ombelle, Jonc fleuri (F). Flowering rush, Lily grass (E). Doldiger Wasserlesch, Blumen-Rohr (D). Butomo, Biedo, Giunco fiorito (I).

نوع من المناز وهو نبات عشقي سبوطي ممر. اوراقه تطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٢ سم. ثمراته الزهرية يطول نحو ٨٠ سم. ازهارها صيواني التجميع. ازهاره كثيرة العدد وريدي القصل والريشات ، قطر الزهرة الواحدة نحو ٣ سم || ازهاره يشتر من حزيران الى آب .

١٩٠٩٤ - عَنَابِيَّات Butomaceae (S). Butomacées (F). Butomaceae (E).

فصيلة نباتية من سيدات الفلقة يلهوها عادمة الاسن . اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها عشقية او مائية . اشهر اجناسها المناز.

١٩٠٩٥ - عَنَابَسَة * Porthetis elephas (S). Porthète (F).

نوع من الجناب من مستقيات الاجنحة وفصيلة المراديات. اجناسها جميع المناطق الحارة من العالي القديم || جسمها كبير القدر يطول نحو ٤٥ سم. عند الذكر ، ويطلق من ٧٠ الى ٧٥ سم. عند الانثى . نوبها الى الكهبة السمره . رأسها كبير الخبز . زباناها قلابا الشكل . كوسلها متين النعج وليف الخمار النعجي يشرف على قبة الرأس . قوائمها الخلفية كبيرة ، مستطيلة ، مشاوية الخنايب ، معدة لغفر || تجوب المراعي والمواقع الرطبة حيث تكثر الامشاب . مسرها نهاري . تظهر في حزيران وتبقى حتى اواخر آب .

١٩٠٩٦ - عَنَابَسِر Éléments (F). Elements (E).

العناصر هي المواد البسيطة التي يمتزجها العلم الحالي غير قابلة للتجزؤ الا بيسط || يعرف منها نحو ٩٠ تقسم الى فئتين : فئة العناصر الفلزية المعروفة بالمعادن وفئة العناصر اللافلزية .

١٩٠٩٧ - عَنَابَسِر غِلَايِيَّة Éléments nutritifs (F). Nutritifs elements (E).

هي العناصر التي يتרכب منها غذاء النبات والعناصر الغذائية تقسم الى أربع فئات : - الاول : العناصر الرئيسية وهي الأزوت، وسامض الفسفور والبوتاس . الثانية : العناصر الاولية وهي الكلسيوم والمنجنيزيا والحديد والكريت - الثالثة : العناصر الثانوية وهي الصوديوم والسليسيوم والكلور - الرابعة : العناصر الثالثية وهي البورق والمنجنيزيا والنحاس والزنك والارنيغ والرصاص الخ .

١٩٠٩٨ - عَنَاق

النجم الثاني ، اي الذي يلي الثالث ، من كوكبة بنات لمش الصغرى . والى جانبه قائد صغير وزائنه ايضا عناق والى جانبه الصديق وهو سهى والثالث الحور .

١٩٠٨١ - عَمِيس *
Aphotique (F). Aphotic (E).
عميس م. حمية - تمت تعريفه يطلق في الجيولوجية ، على كل منطقة عادمة النور كحجرة البحر البعيدة النور .

١٩٠٨٢ - عَنَاقِطِيق Via ١٩٠٨٣ - عَنَاب * Zizyphus seiva, Z. vulgaris, Rhamnus zizyphus (S). Jujubier, Gingeoller (F). Jujube tree, Zizyphus, Indian jujube (E). Jujubesum (D). Giuggiolo (I).

شجرة مشرشرة شائكة من فصيلة التيقيات . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، صفراء اللون ، بيضيه ، لامعة ، سفة . ازهارها صغيرة القدر ، صفراء اللون ، عشقية التجميع . ثمارها زيتونية الشكل والقد ، لمساء البشرة ، عنابية اللون عند النضج ، مأكولة ، لب الى البياض الاصفر وهو كثير المنافع للصحة ويقي الصدور .

١٩٠٨٤ - عَنَابِ يَرِي هو الفصال ، الحظيه .

١٩٠٨٥ - عَنَابِيَّة Jujube (F). ثمره العناب وهي مأكولة جزيلة الفع الصحي وتقيد الصدور .

١٩٠٨٦ - عَنَاقِ السَّمَق *
Pisana quadrata (S).
حشرة من المنجابات ، طولها نحو ٢ سم. جسمها مبطل الشكل المستطيل . نوبها الى الخلفي الاخير . يطنها ويطنها الى الحرة || تظهر الحشرة الكاملة في نيسان فتكرم وتضع مكباتها في ايار على مختلف اوراق السرمقات وانحسا الشرنق ينفق بعد متعه باسبوعين || اجسامها الحولية تراوح من اثنين الى ثلاثة . رقاتها حمة تنمض عصارة الوراق فتضمصها ويصطبها وقد تنخر الجلود فتحطبها .

١٩٠٨٧ - عَنَاقِ الشُّوك * Tingis cardui (S). Tingis des chardons (F).

حشرة من المنجابات ، طولها يراوح من ٣ الى ٤ سم. نوبها حطلي اللون يطول تسليق وتطليق . مدنها اسود . تعيش على مختلف انواع الشوك ونباتات فصيلة المركبات .

١٩٠٨٨ - عَنَاقِ مَلَطَح Galdete maculé (F). حشرة من البيريات تدعى بيري ملطح ، احليها .

١٩٠٨٩ - عَنَاقِيَّات * Tingidae (S). Tingidae (F). Tingidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة نصفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . تتميز بصغر فعا وبروانها اللبدي التركيب ، الشبكية الرول . ارساغها ثلاثية الفواصل . امساكها لافطة تنور في اعانيد عميقة || جميعها من الحشرات الخاملة تعيش على اوراق النباتات وسنوره .

١٩٠٩٠ - عَنَاقُ Cocher (la) (F). المناز كوكبة نجوم شمالية الموضع تدعى ذو الاعمه ، احليها .

١٩٠٩١ - عَنَاقُ هو القلق الحشي ، الحظيه .

١٩٠٩٢ - عَنَاب
Butomus (S). Butome (F).
جنس نباتات معمرة من فصيلة المنازيات . انواعه قليلة نحو خمسة : ثلاثة منها عشقية واثنان مائتان . جلورها ببدنومية مدادة . سوطها شمراعية منتسبة تطول من ٥٠



عناب



عناب السرمق



عناب الشوك



عناب صيواني



عناب

١١٠٩٩ - عُتَاقُ الْأَرْضِ

عتاق الارض نجم من كوكبة المرأة المسلسلة .

١١١٠٠ - عُتَاقُ الْأَرْضِ *

Lynx caracal, *L. melanotis* (S). *Lynx caracal*, *L. a oreilles noires* (F). Caracal (E).

ومن اسمائه : العنقوش والنمجل وأنجليل والفرانق . نوع من الفئس من فصيلة السنوريات ورتبة اللوامس . موطنه فصح الأرياف يمتد من تركيا الى سورية والجزيرة والبراق وأيران والأفغان وألند ومن الحيشة الى افريقية الشمالية . وهو كبير الجثة رقيق القوام ، طوله يراوح من ٧٠ الى ٩٠ سم . ارتفاعه من ٤٥ الى ٥٥ سم . أما ذنبه فين ٢٢ الى ٣٥ سم || ثوبه يختلف بالنسبة الى البلاد التي يعيش فيها وهو دائماً سوي اللون المروث بالابخر الاسمر والاسمر الجؤري . يلهه الى البياض الاسفر . اذناه كبيرتان ذلعتان طولهما خصلة من الشعر الاسود المنقصب || يألف الكهوف والادغال واحراج السنط والقصو .

١١١٠١ - عُنَاقِيَّةٌ مِي الْقَضَابِ ، اَطْلِبْ .

١١١٠٢ - عُنَاقِيَّةٌ ، رُتَبَاتٌ . *Arandides* (F). *Araneida* (E).

رتبة من الشكبريات فصائلها واجناسها كثيرة العدد ، اشهرها المناكب المرفقة .

١١١٠٣ - عُنَاقِيَّةٌ ذُبَيْبَةٌ مِي الْخُنْفَرَةِ ، اَطْلِبْ .

١١١٠٤ - عُنَاقِيَّةٌ ، عُنْكَبُوتِي . *Araneux* (F). *Cob-webby* (E).
نمت وصفي يطلق في بعض اجزاء النبات التي تشبه المناكب او شها .

١١١٠٥ - عُنَاقٌ . *Râne* (F). *Rein* (E).
هو سير اللجام .

١١١٠٦ - عُنَاقَةٌ . *Impotence sexuelle* (F). *Sexual impotence* (E).

خلل في الجهاز العصبي يمنع الحيوان عن اداء فريضة الكوم الطبيعية . وفي كثيرة في الذكور قليلة في الاناث .

١١١٠٧ - عُنَبٌ . *Raisin* (F). *Grapes* (E).
ثمر الكرمة . ج . عنبات والواحدة عنبٌ .

١١١٠٨ - عُنَبٌ الْيَحْرُ .
هو السلك المزودج السنبال ، اطلبه .

١١١٠٩ - عُنَبٌ التَّمَكَّة . *Raisin de table* (F). *Table grapes* (E).

هو العنب المأكول من اي شرب كان تمييزاً لآصناف الحور والكمول .

١١١١٠ - عُنَبٌ التَّمَلَبُ .
هو الفتاة ، اطلبه .

١١١١١ - عُنَبٌ الْحَيَّة .
هو القاشرا السوداء ، اطلبه .

١١١١٢ - عُنَبٌ الدَّب .
هو البهران ، اطلبه .

١١١١٣ - عُنَبٌ الذَّبِيب .
هو الر برق ، اطلبه .

١١١١٤ - عُنَبٌ الشَّط .
هو كركوب كينر . اطلبه .

١١١١٥ - عُنَبٌ الْعُرَابِ .
هو الصخرية ، اطلبه .

١١١١٦ - عُنَبٌ الْقَطَا .

هو النورانية الكنتية ، اطلبه .

١١١١٧ - عُنَبٌ الْحَيْد .
هو البياض ، اطلبه .

١١١١٨ - عُنَبَاتٌ مِي الْاُنْبِج .
اطله .

١١١١٩ - عُنَبَاتُ ه٥ . *Ambassie* (S).

Ambasse (F). *Ambassie* (E).

جنس اسماء بحيرة من شالكات الزعانف وفصيلة القرعيات . انواعها المرفقة ثلاثة ، اصلاتها اخوار مصبات الانهر المحتدة || اجسامها اعطليجية الشكل ، صغيرة القد ، اطولها فراوح من ١٢ الى ٢٢ سم . وذوها مقطوعة الاعظام ، كبيرة العين الجاحضة . زعانفها الظهرية شبه هرية الشكل . زعانفها الذيلية غائرة . اترابها تراوح من الطحلة الالهية الموج الى الطحلة النفسية || طولها فائرة الصنف مرغوب فيها .

١١١٢٠ - عُنْبَرٌ . *Ambre* (F). *Amber* (E).

مادة وتنجية بحيرة صلبة تقع في عدة اشكال واللوان انصها الاصفر والاشهب .

١١١٢١ - عُنْبَرٌ * . *Physeter* (S).

Cachalot (F). *Spermwhale* (E).

جنس حيوانات بحرية لبونة عطية الهامة من الحوات ذات الانسان . اجسامها حادة المقق ، وشعية الشكل ، طولها يراوح بين ١٨ و ٣٠ م . وذوها خضرة محيطها يراوح بين ٧ و ٩ امتار . اسنانها كبيرة القد ، صفراء اللون . طول السن الواحدة نحو ٢٤ سم . وضع ربيها من ٥ الى ٦ سم . اترابها الى الطحلة الفراضية الزرقاء الموج ، تتبع مع اقترابها من الظهر وتبتر عند البطن . يألف مياه بحار المناطق الحارة والمعتدلة . يعيش جماعات كبيرة ، سرها يمد من عشرة لزواج الى مة زوج .

١١١٢٢ - عُنْبَرٌ بُولُ .
هو حب السك ، اطلبه .

١١١٢٣ - عُنْبَرٌ دُمَاعٌ * . *Liquidambar* (S).

Liquidambar (F). *Sweet-gum tree* (E). *Amberbaum* (D). *Liquidambar* (I).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة القنليات . انواعها قليلة ، سوقها جالسة منتصبة صامة . اوراقها حايلة و كبيرة القد ، معتقة و متعاقبة و مدببة القصوص . ازهارها وصيدة المسكن و قذية التسجيع . ثمرها جراب صباية الاغنية ، يزودها صفة جنة || يستخرج من خام سوقها ، بالخر ، معة صخرة ذكية اللون ، طيبة ، حرة الاستعمال لتلشت اللبني وتقوي البياض || اشهر انواعها الثلاثة التالية .

١١١٢٤ - عُنْبَرٌ دُمَاعٌ أَمْرِيكِي ، عُنْبَرُ سَاكِلِ ،

شجرة المية . *Liquidambar styraciflua* (S).

Liquidambar à styrax, *Copaine d'Amérique* (F). *Storax*, *Satin walnut tree* (E). *Amerikanischer Amberbaum* (D). *Storax liquida* (I).

شجرة هرية الشكل تملر من ١٥ الى ٤٠ م . اصلاتها البلاد الامريكية . اوراقها خلبية لتنعين خلية الاغصان ، شابقتها الزهرية صفراء اللون ، غفرها الموج . ميعتها فائرة الصنف شاملة الاستعمال .



عتاق الارض



عنيس



عنبر



عنبر دماع

المروفة قليلة المد اعطائها بعض اصقاع المالن القديم والجديد . ترب في المواقف الرطبة انحصا حوائثي المناطق ويجاري الماء || سقها لينة او خشوية و منبطحة و فراء اورثها صغيرة و متعاقبة و منعقة و متناية النصال و رباعية الجاملة الزئ || ازهارها مرطبة مستطيلة المالحين و رباعية لتيلاز و يضاء اللون . تجامعا غنية و مكورة ، حراء اللون ، حامزة الطم قبل النضج التام || ثمارها الناعسة ترب .

١٩١٢٣ - عُبُوث ٥ Tricholoma (S). Tricholome (F).

جنس تطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريقيات . انواعها المروفة زعا ٤٥ . اعطائها معظم اقاليم مناطق البلاد المعتدلة الحارة . يودها ابيض اللون . اطراسها حادة الاطراف ، مظنها ليد التجصع وبعضها فارق . تعيش على المواد النباتية المنحلة . معظم انواعها كاعن الصنف .

١٩١٣٤ - عُبُوث اَبْيَس ٥ Tricholoma album (S). Tricholome blanc (F).

نوع من العنبوث الكاعن الصنف . يوجد في حراج الصنوبريات . ساقه منتفخة القاعدة و فراء اللون . اروسوته يضاء ، عاجية المواج و قطرها نحو ٩ سم . اطراسها متقاربة يضاء اللون .

١٩١٣٥ - عُبُوث اَحْمَر لَامِع ٥ Tricholoma rutilans (S). Tricholome rutilant (F).

نوع من العنبوث الكاعن الصنف . يوجد على جلوع الاشجار النخرة . ساقه الى الحمرة الصفراء المواج . اروسوته حراء اللون يطولها مواج اسفع ، قطرها نحو ١٥ سم .

١٩١٣٦ - عُبُوث جَبَّار ٥ Tricholoma colossus (S). Tricholome géant (F).

نوع من العنبوث الكاعن الصنف . يوجد في الغابات . ساقه مسفحة ، سمراد اللون . اروسوته كبيرة ، قطرها نحو ٢٥ سم . لونها الى الشفحة السمراد يطولها مواج اصفر .

١٩١٣٧ - عُبُوث دَكْمِي ٥ Tricholoma columbetta (S). Tricholome petite colombe (F).

نوع من العنبوث المأكول . يوجد في الغابات وسراج السديان . ساقه يضاء تملوها ، عند قاعدتها . رشفة غخراس . اروسوته يضاء اللون او وردية ، قطرها نحو ٨ سم .

١٩١٣٨ - عُبُوث رَكِيع السَّاق ٥ Tricholoma strictipes (S). Tricholome à pied élancé (F).

نوع من العنبوث الكاعن الصنف . يوجد في المراعي والغابات . ساقه رفيعة مستقيمة لونها الى البياض الاخير . اروسوته مظلية الشكل ، قطرها نحو ٧ سم . لونها الى البياض الماجي .

١٩١٣٩ - عُبُوث صَابُونِي الرَّاكِعَة ٥ Tricholoma saponaceum (S). Tricholome à odeur de savon (F).

نوع من العنبوث الكاعن الصنف . يوجد في الغابات والحرار . اروسوته لاقياضية القطر ، مظلية الشكل ، لونها الى الربعة الخضرار المواج . طعمه ورائحته كصابون .

١٩١٢٥ - عُبُوث دَمَاع شَرَقِي Liquidambar (S). Liquidambar oriental (F).

شجرة كبيرة اللد تملو من ١٥ الى ٢٥ مترًا . اعطائها بلاد الشرق الاوسط ، اورثها خاسية التفصيص . فصوصها قليلة الشكل ، عادمة التنسيت . نصلها مالى البشرة يصفر عند الامحال دين اى يكتشفه الاحرار المهود . شباتها لزريرة يضاء اللون يطولها مواج اسفر || ميتها غزيرة للمادة متوسطة الصنف .

١٩١٢٦ - عُبُوث دَمَاع قُرْمُوزِي Liquidambar formosana (S). Liquidambar de Formose (F).

شجرة كبيرة اللد تملو من ١٥ الى ٢٥ م . اعطائها الصين واليابان . اورثها ثلاثية او خاسية او سباعية التفصيص . فصوصها مسنة المخلعة . اعطائها وروقها خلية البشرة . شباتها لزريرة يضاء اللون يطولها مواج وردى || ميتها غزيرة للمادة متوسطة الصنف .

١٩١٢٧ - عُبُوث كَسْمِيرِي هُو النِيرْدِيَاءُ المِلْهَا . Succinea (S). Ambretta (F). Succinea (E).

جنس حوانات قازبة وبيرة من الرغويات مديات الاجبل وفضيلة المخرنوبات . انواعها المروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . بعضها قازب ويمش على النباتات المائية وبعضها بري ويمش بين الطحالب قرب صفات مجاري الماء || اصداها شبه بيشية اللون ، صغيرة اللد و رسة القهوات ، دقيقة الاقحاب المخرنة و تتميز بعدم استطاعتها استيعاب الاجسام .

١٩١٢٩ - عُبُوثِيَات Physeteridae (S). Physétérídes (F). Physeteridae (E).

فصيلة حوانات بحرية لينة من مرتبة مكاللات الاسنان ورتبة المخرنوبات || اجناسها المروفة ستة منتشرة في جميع بحار المناطق المعتدلة الحارة . ملجتها الحيالي جامعي . اجسامها تزد من ١٥ انزاج الى ١٥٥ ذوبًا || اجسامها مسفحة ، شبه وشية الشكل ، تطول من ٣ انصار الى ١٨ مترًا || اعرف اجناسها العنبر والاشم والموية .

١٩١٣٠ - عُبُوثِيَرِين Ambréine (F). العنبرين مادة يضاء تستخرج من العنبر الاشهب و عادمة الرائحة والطعم ، لا تلوب في الماء و تلوب في الكحول والايتر .

١٩١٣١ - عُبُوثِيَس ٥ Anableps (S). Anableps (F). Anableps (E).

جنس اسماك بحرية سرلوة من مفتوحات المخلات ليات الرضائف وفضيلة البشبات . انواعها المروفة قليلة المد اعطائها احر امركة الاستوائية . تعيش في المواقف التي يقل فيها انسياب الماء وتكثر فيها النباتات المائية . اجسامها شبه وشية الشكل تطول من ٢٥ الى ٢٥ سم . وروسها صغيرة وزمانها كذلك باستثناء الخوضية والذليلية الكبيرة اللد السانية الشكل || ويتميز العنبوس بيهذه الكورتين المسفوتين ، اقلها ، الى قسم علوي يشاهد ما يجري فوق سطح الماء و قسم سفلي يشاهد تحت سطح الماء .

١٩١٣٢ - عُبُوثِيَب Oxycoccus (S). Oxycoccus (F). جنس نباتات مدادة معصرة من فصيلة الملتحيات . انواعها



عنبرة



عنبس

عنوث
احمر لامععنوث
ابيضعنوث
دليعنوث
جبارعنوث
صابوني الرائحةعنوث
رقيق الساق



عنثوث قاروس عتَر مَلَح

ويجدها في المناطق والنياس || اجسامها متفائلة القد ،
يكثر فيها الصخر . رؤوسها شبه مكورة . عيونها متفائلة
عند الشقين . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة ،
مركبة من ١٦ فصلة . مرافقها قصيرة ، ملاصقة مستطيلة ،
رباعية المقل . كواسلها محمودة . بطونها مدقة الشكل
رواشنها قسطانية الخصب ، مرقوفة . قوائمها مستطيلة ||
قرونها دودية الشكل ، تميش كامل طولها البرقي في المنطق
اشهر اجناسها النمل .

١٩١٤٠ - **عنثوث قاروس** *
Tricholoma aequestre (S). *Tricholome aëstre* (F).
نوع من العنثوث المأكول . يوجد في جراج الصنوبريات .
اروسته الى الصفار المنش بالاسمر ، قطرها نحو ٨ سم .
اطرافها الى الصفار اللامع .

١٩١٤١ - **عنثوث كبريتي اللون** *
Tricholoma sulfureum (S). *Tricholome couleur de soufre*
نوع من العنثوث الكاعن الصف . يوجد في الغابات .
اروسته كدقيقة الين ، قطرها نحو ٤ سم . اطرافها
متباينة . رائحته تشبه رائحة الخبز .

١٩١٤٢ - **عنثوث مدع** *
Tricholoma portentosum (S). *Tricholome prétentieux* (F).
نوع من العنثوث المأكول . يوجد في الغابات . اروسته
الى الريدة السمره بطولها مواج بنفسجي ، قطرها نحو
٩ سم . اطرافها الى البياض الاخير .

١٩١٤٣ - **عنثوث الخسكان** *
Clyrea scraphaxidis (S).
Clyrea des sureaux (F). *Clyrea scraphaxidis* (E).

شجرة واشمة غاخلة من فصيلة النضاريات ورية مذمذات
الاجنة . تألف البراري والمواقع الرطبة وضفاف مجاري
الماء . عنانها تميش حل ازهار الخان والصفصاف .
يرقاتها تميش حل صفب التجيليات واوراق الصفصاف
والخان || جسمها صغير القد بطول من ٧ الى ٩ سم . ثوبا
يرتقالي اللون اسود الرأس وانتفيل الكسول والتجلبع الندي .
راسها صغير الحجم . عينها صغيرتان . زباناها خيطان
ظهورا ثنائي التجلبع رباعي النقط السود . غدها متباينة
التعزيز اللفيل . اسرافها رباعية المقل للظاهرة || لها
جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل
حزيران وبقية حتى اواخر تموز . لسرح في التبار وبنت
في اليل || البرقة عنه بطولها الادراك اتام تطول نحو
١٢ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، قليل التقويس ،
سداسي الراجب ، حنلي اللون ، اصفر المواج ، اسمر
الرأس والراوجب || طور الاكمال الذي يتفقي في القرية
يشتر نحو اربعة اشابيع .

١٩١٤٤ - **عنثوث** *
Psychoptera (S). *Psychoptère* (F). *Psychoptera* (E).

جنس حشرات من فصيلة العنثويات ورية ذوات الجنائين .
انواعه المعروفة عشرة اسطالها بعض مناطق البلاد المعتدلة
الحارة والمنسرة نحو البرادة || اجسامها تطول من ٧ الى
١٢ سم . رؤوسها مكورة . عيونها كبيرة ، متقاربة عند
الشقين . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١٦
فصلة . مرافقها قصيرة . ملاصقة شديدة الطول ، رباعية
المقل . كواسلها محمودة . بطونها مدقة الشكل . رواشها
قسطانية الخصب ، مرقوفة . قوائمها بالفة الطول ||
تألف المناطق وضفاف مجاري الماء ، قرونها رقيق الانهار .
يرقاتها دامة تميش كامل طولها البرقي في المنطق والاسمال
على المواد النباتية المنحلة .

١٩١٤٥ - **عنثوثيات** *
Psychopteridae (S). *Psychoptéridés* (E).

فصيلة حشرات من رية ذوات الجنائين . اجناسها وانواعها
المعروفة متوسطة المدد منتشرة في معظم اصقاع العالم . يكثر

١٩١٤٦ - **عنثوث** *
Baccifère (F). *Bacciferous* (E).
كل نبات ثماره عنية الشكل .

١٩١٤٧ - **عنثوث** *
Ural
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة مباشرة بالنسب .

١٩١٤٨ - **عنثوث** *
Baie (F). *Berry* (E).
الثمرة العنية ثمرة عنية غير متفظة لا ثلوة لها بل تحوى
رزة او عدة بذور كالمنية .

١٩١٤٩ - **عنثوث** *
Impuissance (F). *Impotence* (E).
عجز ذكر الحيوان من القيام بوظيفته التناسلية .

١٩١٥٠ - **عنثوث** *
Scalls (F). *Stall, Box* (E).
الحطيرة من خشب تمل الخليل .

١٩١٥١ - **عتادة** *
Entada (S). *Entada* (F). *Entada* (E).
جنس نباتات معمرة برية وترتيبية من فصيلة القرليات
وسيط السطيات . انواعها المعروفة عشرة منها الشجيرات
والجنيات المتسلقة . منبها الاسفاح الحار . اورانها
متفائلة مركبة ريشية شعية . ازهارها سابل متباينة
مقروية التجميع ناجية الارتكاز . ازهارها صغيرة القد
متباينة ، لبدية ، صفراء اللون . ثمارها بزور طيبة مقينة
تغلغلها مادة غابية لزجة تشمل في الهند لتنظيف شمر
الرأس .



عتاده

١٩١٥٢ - **عنتَر** *
Asile (F). *Robber-fly* (E). *عنتَر*
جنس حشرات قانصة مفترسة من فصيلة العنثويات .
انواعه عديدة معظمها متوسط القد جزيل النفع بقضي
على الحشرات الضارة || اشهر انواعها ما يتبع

١٩١٥٣ - **عنتَر الشواطي** *
Philonitus albiceps (S). *Asile des sables* (F).
حشرة من العنثويات ، طولها يراوح بين ١٤ و ١٨ سم .
ثوبا حنلي اللون ، اطحل المواج . عيونها خضراء ،
حلب جسمها واربلها يفس . تكثر في الاماكن للفاصلة
وفوق دبال الترويل || ابايل ال ايلول . تقترس مسا
استطاعت قصه من الحشرات .

١٩١٥٤ - **عنتَر الفسائل** *
Machimus pyraea (S). *Asile pyraea* (F).
حشرة من العنثويات ، طولها يراوح بين ١٠ و ١٥ سم .
ثوبا الى السرة . حلقها ابلق اللون . تكثر في الاماكن
الطليقة . تقترس الفسائل والياباب .

١٩١٥٥ - **عنتَر النحل** *
Dasygaster teutonius (S). *Asile teuton* (F).
حشرة من العنثويات ، طولها يراوح بين ١٢ و ١٦ سم .
جسمها اسود اللون ، جوشها اصفر . يكثر ويوجد في



عنتَر الشواطي عنتَر الفسائل



عنتَر النحل



عُثْر زَبُورِي

ايار الى آب . تفرس معظم عشائيات الاجنحة اخصها النمل وهي بذلك تختلف من ريفاتها النافعة .

١٩١٥٦ - عُثْر زَبُورِي *

Asilus crabroniformis (S). *Asile frolon* (F).
حشرة من الشتريات ، طولها يراوح بين ١٦ و ٣٠ سم .
نوعها الى الجلوة الحمراء . رأسها اصفر . زياتها الى
السرود . اربطها الى الصبغة الصنائية . مسرعا الحقل
والبياتين . تكثر من حزيران الى ايلول . تفرس الذباب .

١٩١٥٧ - عُثْرِيَّات

Asilidae (S). *Asilidae* (F). *Asilidae* (E).

فصيلة حشرات قانصة مفترسة من رتبة ذوات الجناحين .
اجناسها وانواعها عديدة جميعها متوسطة الحجم ، قوية الاربيل
الزياة ، مستطيلة الرطل ، غليظة الصدر والرأس والعرويات ،
قصيرة العظم ، قوية التناثر ، نشطة الحركة ، سريعة
الطيران . مكنها ونحي الشكل ، اغبر اللون ، تمتح
بدون انتظام حل الاشباب والاعشاب ونبات الزروع
وانصاف الشجر وأوراقها وفي الزبل والبنن . ريفاتها
عاشية و غامضة ، دامت بقه تكون واجبة تعيش في التربة
تفضل الدبال والرمل ويكثر وجودها تحت الحطب الملدن .



عُثْر

١٩١٥٨ - عُثْرِيَّة

Gonothalydia (F). *Gonothalydy* (E).

تصاب فري ، ذكور ائداه حقيبة اما اناثه فتفتر .

١٩١٥٩ - عُثْرِيَّة * نُهَيْد

Trochus (S). *Trochus*, *Topp-shell* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مبنات الاربيل
وأصيلة المتشليات . انزاهه المعاصرة المروقة قليلة العدد
أعطتها بحار البلاد الحارة . تعيش حل الصنوبر المغصوة
قرب الشطوط . اصداها غروطية كبيرة لقسه حيلة
الترابيق الخارجية ، ولثوية الصفحات الداخلية . اجناسها
عشيرة كبيرة . رؤوسها صنية ثنائية اللراس المميعة .
اربطها مهدية الحمار . اساطها قرنية المادة . اصداها
صناعية وطيوية مأكولة .



عُثْر نَيْط



عُثْر

١٩١٦٠ - عُثْرِيَّات ، نُهَيْدِيَّات

Trachidae (S). *Trachidae* (F). *Trachidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات معدرات الاربيل
اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المروقة قليلة العدد
أعطتها بحار البلاد الحارة . اصداها غروطية شبه هرية
الشكل متباينة الاحجام والترابيق الخارجية . صفحاتها
الداخلية مائلة ناعمة لثوية اما الخارجية فخشنة . اعرف
اجنسها واشهرها المنيل .



عُثْر

١٩١٦١ - عُثْرِيَّات *

Anabatidae (S). *Anabatidae* (F). *Anabatidae* (E).

فصيلة طير من الجوارث نبات المتناثر . اجناسها وانواعها
المروقة قليلة العدد شائعة الانتشار في معظم اقطار البلاد
الاستوائية والحارة . اجناسها رفيعة ، متوسطة القد أو
صغيرة متناظرة مستطيلة قليلة التفروس . اذنانها مستطيلة
ورتابية الرقار .

١٩١٦٢ - عُثْرِيَّة نَيْط *

Melanotus robustus (S). *Melanotus robustus* (F).

حشرة غامضة مفترسة من فصيلة السالوات ورتبة مشدات



عُثْر

الاجنحة . تألف الحقل المزدودة والادغال . غناصها
تعيش حل اوراق النباتات البرية . ريفاتها تركب جلود
النباتات الحولية من الاعشاب البرية الى الذرة وديار
الشس والبطاطا والشونيز والجزر ولا تمتع من الحشرات
الدنيا فتفترها . جسمها متوسط القد يطول من ١٥ الى
١٧ سم . قوبها الى الكسني اللع . رأسها متوج بانار
حلالي الشكل . فكها كبيران . زياتها عيطيان . عيناها
صفرتان . ظهرها يبلع التحزيب العدي . اسافها خماسية
المقل . جيلها رهاقي الحقل . تظهر الحشرة الجبلدة في
اوائل ايار وبقى حتى اواخر تموز . تسرح في الليل .
تساهد في حزيران . اناثها قريرة انابيب المكن تحت حله
الاجار او في سراديب الحشرات الخاشبة او في التربة .
البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم .
جسمها سلكي الشكل ، اصفر اللون امش الموج .

١٩١٦٣ - عُثْر

Raisin sec (F). *Raisin* (E).

هو الزبيب وقيل الاسود من الزبيب .

١٩١٦٤ - عُثْر * شَوْلَك بَيْشَه ، لُبَاكَة

Euphorbia resinifera (S).

Euphorbe à résine, *E. résinifère* (F). *Euphorbium*
gum-plant (E). *Wolfsmilchgunmi* (D). *Euforbo* (I).
نوع من الفربيون وهو نبات طمي برقي مسمر يعلو من
٥٠ الى ٢٥٠ سم . غرايبه مسطلة ربابية الزوايا ، قوبها
الى الاخضر الفاتح الاطبل الموج . لباته خيرة المادة
الجسالية الشديدة الناعمة القائمة الاستعمال الطبي .

١٩١٦٥ - عُثْر جَمِيل * ، بَيْت الْقُصْل

Euphorbia pulcherrima, *Poinsettia pulcherrima* (S).

Euphorbe superbe, *E. écarlate*, *Fille de consul* (F).
Poinsettia, *Easter flower*, *Flame-leaf* (E). *Weihnachtsstern* (D). *Poinsettia* (I).

نوع من الفربيون وهو جنبة زربية متجمع من ٦٠
الى ١٢٠ سم . اوراقه حراء اللون صنية التجميع مسطقة
نصلها يبغي الشكل ، اذني الناعدة ، ذوب الزايم الاخير .
انزاهه نجسبة للشكل ، كبيرة القد ، ارجوانية اللون . يتكاثر
بالتعجيل . يرغب في الموامع الدافئة وفي الارربة المتوسطة
الانساج الصعبة الدور .

١٩١٦٦ - عُثْرِيَّة ، عُثْرِيَّة

جنس حشرات من فصيلة الشجريات ، اطلب متجول .

١٩١٦٧ - عُثْرِيَّة

Courcier (F). *Charger* (E).

الجواد الصبور الرائع من عيرل الميدان .

١٩١٦٨ - عُثْرِيَّة * ، حَالِيَش ، حَالِيَش ، حَرَاة

Gryllotalpa gryllotalpa, *Gr. vulgaris* (S). *Courtilière*
Taupe-grillon, *Taupe-cricet* (E). *Maulwurfsgrille* (D).

حشرة دجوية مضررة من فصيلة الجديديات ورتبة مستقيبات
الاجنحة . طولها عند كمال بلوغها اي بعد انسلاخها
الخامس لا يقل عن ٥ سم . قوبها الى الصرة الكستنية .
ظهرها خللي النشاء . بطها الى الجلوة . رأسها غروطي
الشكل ، شديد الانساق يرتكز على حلقة صدرية شبه
اسطوانية . عيناها غروطيان بارزان . زياتها عيطيان
جميعها اللوف . جوشها وظهرها مفلان بشاه واق صلب .
قوائمها ست . قامتها الى الامامتين مسلمات بمبروتين
مستعين تحفر بها التربة . تألف الارربة الرطبة .

تعيش في دهايزٍ سطحية تسربها في جميع الاتجاهات. حياتها طولها من ٢٢ إلى ٢٤ شهراً تمر في أنثائها جنس انسلخات || قوتها للديدان والحشرات والجملور التي تفترض طريقها || اغراضها كثيرة لانها لا تقتصر على الدورات والجملور التي تلتهمها او تشووها بل تمتدحها الى جميع التتول التي تخلفه تربتها فتبويها وتبيتها || انثائها اكبر قدماً من ذكرها وهي تحت مكنها الذي يراوح حده بين ٣٠٠ و ٥٠٠ في اربل الخضر وفي اجساد غلغلها في التربة على اعقاب تراوح بين ٢٠ و ٢٥ م. مكنها ابيض اللون الملبس لل شكل يطول من ٢ الى ٣ م. وهو ينشق بعد مئته بنحو ٣٠٠ ساعة || تكاثره باستعمال اسد الحراشير الفعالة كالا كروبيد وفيلوسيكات البارديوم وغيرها.

١٩١٦٦ - **عُنْجُولُ البطاطَا * ، لَاحِظَةُ النَبْعِ *
Phthorimaea operculella (S). Taigne de la pomme de terre, Mineuse des feuilles de tabac (F). Potato tuberworm (E). Kartoffelmotte (D).**

فراشة صغيرة احد من فصيلة العنجيلات . طولها نحو ٨ م. يستطاع تراوح بين ١٦ و ١٨ م. وراشها ضيقة طحله اللون ، وراشها الاماميان ميمقان بالاسمر والخلفيان بهديبا المختار || مكنها ذري القند ، كروي الشكل، اسمر اللون. رقتها غبراء الجسم، وريدية المواج، طولها نحو ١٥ م. غادرتها بنية اللون تلصق فليمة حورية النوس تقسم بين الارزاق الجافة المتسائلة على التربة او في الخازن بين طيات الاكياس وطيا || اغراضها بالغة لان اجهالها الخولية مديدة تراوح بين ٦ و ٧ واكثر ولان رقاتها تامة تركيب البطاطا والباذنجان والتين والبنجور. اذما يبتدئ من الورقة التي تتلفها ويمتد الى الساق التي تلتها وينتهي بالدرجة التي تقربها وتدخلها فتعيش على ما تنحوه من مواد نشوية || وتقطب اوراق التبغ لانها تخلفها وتسرب نسيجها بين البشترين فيهدو شتالاً عاماً في المولد التتية الممطرة. تكاثره عند ظهورها يستعمل اسد الحراشير الفعالة المركزة على اليرودين.

١٩١٧٠ - **عُنْجُولُ الخُبْزِ * ، طَبُور ، أَلُوبِيَت * ، حُنْطَبُ الحنطة ***

Stotocroa cerealella (S). Aleutae des céréales (F). Grain moth (E). Getreidemotte (D).

فراشة صغيرة القند من العنجيلات . طولها نحو ٦ م. يستطاع تراوح بين ١٢ و ١٤ م. جسمها وراشها الاماميان الى الطلحة الربداء تشوها صفرة باحت. وراشها الخلفيان الى الاسمر ، لعداجها وصاصة || مكنها ذري القند ، بيضي الشكل ، يرتقالي اللون. رقتها غبراء الجسم طولها نحو ٥ م. غادرتها حنطة اللون تكمن في التلابة التي تنسجها لدلعل الحية || اغراضها محصورة بما تشبه اليرقة من صطب في الحبوب المخزونة لانها تنفجها وتعيش في دأخلها على المواد النشوية.

١٩١٧١ - **عُنْجُولُ القطن * ، دَوْدَةُ قَرْتَمَلِيَّة *
دَوْدَةُ القوز القَرْتَمَلِيَّة ***

Platyedra gossypiella, Gelechia gossypiella (S). Platyedra, Gélechia du coton, Ver rose du cotonnier (F). Pink bollworm (E). Roter kapselwurm, Baumwollmotte (D).

الحشرة الكاملة فراشة صغيرة القند من فصيلة العنجيلات. طولها يراوح بين ٢ و ٣ م. يستطاع نحو ١٥ م. جسمها

حنطلي حايق . وراشها الاماميان الى الصلبة الصنانية يطولها عنه قاعدتها وفي طرفها تدبج اسمر تقبل سرته مع ابيضاده . وراشها الخلفيان الى الكهبة الربداء طليها مشقة فضية . اما الادباب فرصاصية اللون || مكنها ذري القند ، بيضي الشكل ، الزاوي اللون عنه وصفه ثم يدير ويخضر ويستقر على الارزاق القرتلي ، تحته الاثني فربداً او مجسماً على اي جزء من النبات || رقتها تدريجياً الى ان تستقر على القرتلي. رأسها كسني اللون درقتها الصودية بنية زاهية اما النرجية لمابقة . ظهورها اخر اللون جزوي النيج . مدنها اسفر حنطلي . طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ م. || غادرتها صفرة ، طولها نحو ٦ م. لونها الى البني تعلو مائة صفراء. صلجتها رقيقة ناعمة نسجها كالنوس || رقاتها تركب القصبة الخازية انحصها القطن. تعيش في بد ههها على البرام الزعرية فتفتها وتنتات من محوياتها ثم تنابع عملها في الكنتاج لتسجم اليرود ، في الطواراة النشوية الاول ، قبل جباد لباها ولا تتأخر عن قرض القيل الجديد قبل اكبال نمو وسلاته .

١٩١٧٢ - **عُنْجُولِيَت *
Gelechiidae (S). Gélechiidae (F). Gelechiidae (E).**

فصيلة حشرات مؤذية من رتبة سرشفيات الاجنسة. اجناسها وانواعها زهاء ١٥٠٠ جميعها صغيرة الحجم . وراشها مستطيلة ملونة وبيدية الاطراف . حناها الخلفي مهبط الحافة . ملاسها الشفوية طويلة ذرية ملتوية نحو السواد. قروتها الاستشعارية غطيلة محببة . مكنها ذري القند ، لاقياس الشكل والتجميع . رقاتها ملونة ، صغيرة ، وضيقة ، سرية الحركة ، غاضلة ، تركب الانزاد والناثر والحبوب .

١٩١٧٣ - **عُنْجِيل *
Trachipterus (S). Trachipterus (F). Trachipterus (E).**

جلس اسماك بحرية من فصيلة العنجيليات انواعه المعروفة نحو ١٥ اطلانها بحار البلاد الحارة من المالين القديم والجديد. اجسامها مردنية الشكل مبطة . تتميز زعانفها المستطيلة الانقياسية كما يبدو في الرسم . اترابها ثنائية اللون يطولها تدبير جزوي وهي فضية الشطر الاحل عاجية الشطر الاسفل

١٩١٧٤ - **عُنْجِيلِيَت *
Tentoides, Trachipteridae (S). Tentoides, Trachipteridae (F). Tentoides, Trachipteridae (E).**

فصيلة اسماك بحرية من البطنيات ثلاثت الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة البدن يكثر وجودها في بحار المناطق الاستوائية || اشهر اجناسها العنجيل والشرياط والقفوت

١٩١٧٥ - **عُنْدَرِيَل *
العنديل حشر من المصافير (يحيط المحيط) .**

١٩١٧٦ - **عُنْدَرِيَس *
Indris brevicaudata (S). Indris à queue courte (F).**

حيوان لبن وسيد الجنس والنوع من البجوريات . موطنه جزيرة مدغشكر . يألف القناتاب الرطبة . ملجئه الحيائي جماعي . جماعته تد من خمسة الى عشرة ازواج || جسمه ابيض الشكل يرقف نحو ١١٠ م. وهو اكبر اجناس البجور . شكله وألوانه قرب الشبه بشكل الانسان . قوته



عُنْجُولُ البطاطَا



عُنْجُولُ الحبوب



عُنْجُولُ القطن



عُنْجِيل



عُنْدَرِيَس

Bukkum-wood (E). Sapanbaum, Rotes Brasilienholz (D). Brazilletto dell'Indie (I).

نوع من العنبر، شجرته سريرية شائكة تملو نحو ٨ أمتار. أوراقها مركبة حاملة، وريقاتها سنائية صغيرة. أزهارها عشقودية التجميع، يرتقالية اللون، غائفة العروق الطرية. أخشابها شديدة الصلابة، قوية المانة، جيدة الصنف. خشبها أحمر اللون شائع الاستعمال.

١٩١٨٥ - عُتْدَقَم قَارِح *، أَطْمُوَط، بُنْدُقِي هِنْدِي

Cesalpinia bonduc (S). Césalpinie bonduc, Bonduc, Chiquer, Chiquer, Chicot du Canada (F). Bonduc, Nicker tree, Gray bonduc (E). Nickerbaum, Gelmelner Schlüsselbaum (D). Bonduc, Niccheri, Occhio di gatto (I).

نوع من العنبر شجرته سريرية قليلة الشوك تملو من ٣ إلى ٨ أمتار. أوراقها مركبة، وريقاتها بيضية النصل. أزهارها عشقودية التجميع صغيرة القد، صفراء اللون. ثمارها طيبة وصابغة حواء الخشب. أخشابها صلبة متينة جيدة الصنف.

١٩١٨٦ - عُتْدَقَم هِنْدِي *

Cesalpinia pulcherrima, Poinciana pulcherrima (S). Césalpinie superbe, Flamboyant, Poincillade magnifique (F). Indian flower-fence, Peacock flower (E). Paradiesblume (D). Poinciana Indiana (I).

نوع من العنبر الزينة. شجرته شائكة، رقيقة، تملو من ٣ إلى ٨ أمتار. أوراقها مركبة حاملة، وريقاتها أحليجية صغيرة. أزهارها كبيرة القد، حواء اللون، عطرية العروق، هريمة التجميع. أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

١٩١٨٧ - عُتْدَقَمِيَات Cesalpinias (S).

Césalpinées (F). Cesalpinia (E). بسيط من فصيلة القرنيات وأجناسه وأنواعه زهاء ٦٠ فيها الأشجار والشجيرات والجنبات البرية والصناعية. أشهر أجناسه العنبر.

١٩١٨٨ - عُتْرُوسِ أَمَلَسُ ٥ Aneuris laevis (S).

Aneuris lisse (F).

حشرة دامت من فصيلة العروسيات. جسمها صغير بسيط. يطول نحو ٧ سم. عند الذكر رقيق ٧ سم. عند الأنثى ١١ سم. ثوبها إلى الجوزة. ظهورها كامل الحنجبة، بنفسجي اللون، أسود المواج، ورشها شفانان. رأسها مكور. خطها صغير، ملطيق. عيناها صغيرتان. عنقها قصير. كوسلها مقطوم القاعدة والطرف. حجبها نصف دائرية. ظهورها يلحف البطن دون الخار. حمار بطنها مجاع بالأسود. قوائمها صغيرة. تألف البراري الغلة. تعيش تحت القشور وفي الجحالة من المواد النباتية المنسلة.

١٩١٨٩ - عُتْرُ Chèvre, Capella (F). Capella (E).

النمر نجم من كوكبية مسك الأعنة. مركزه على المرقق الأسير. يستمر من نجوم البقرة الأول. يمد من الأرض نحو ٥٠ سنة ضوئية.

١٩١٩٠ - عُتْرُ، عُتْرُ Chèvre (F). She-goat (E).

الأنثى من الماعز أو أثنى التيس. ج. أمز وعزوز ونازار.

١٩١٩١ - عُتْرُ Ibis

هو الحاريس، أطله.

إلى البصرة السوداء. رأسه وكفاه وظهوره وساعده وفخذه إلى السواد القمعي. أذناه كيرتان كالسنان. جهته وعنده رصعة إلى الكعبة. يدها ورجلاه سود. ذنبه شديد القصر، يطول نحو ٨ سم. الأذن ثنائية الكندي، يحملها يوم نحو ١٥٥ بيضة تقع في تمامه جروا واحدا ترومه نحو ثلاثة أشهر. قوته القار والزمامات والجلبور يسى إليها في الليل من القرب إلى اللبر ويبعث في النهار حل انصاف الأشجار الرزمة الورقة اللال.

١٩١٧٧ - عُتْدَقَة Bas ventre (F).

Lower part of the abdomen (E).

المنطقة أسفل البطن.

١٩١٧٨ - عُتْدَقَة Chant du rossignol (F).

نغريد العنديل.

١٩١٧٩ - عُتْدَقِيب * Luscinia megarhyncha (S).

Rosignol chanteur (F). Nightingale (E).

طائر من الخراز وطيولة الحفليات يتميز بحسن صوته وقوة وسنم انشامه. طوله نحو ١٥ سم. ثوبه إلى البصرة الشقراء. يقيم عند الرأس والظهر ويبيض عند البطن. وهو من الطوائف يحرب البلاد في طلب الرزق والصيف والشتى. يأنف الحدائق والنبات والإذغال. قوته الحشرات واللهيدان والنمل. يمش في الموضع والجنبات الغناء الشائكة. انثاه تضع من ٦ إلى ١٢ بيضة تخصبها بتأخرية الذكر من ١٣ إلى ١٤ يوما.

١٩١٨٠ - عُتْدَقِيب اليابان Rossignol du japon (F).

طائر ياباني المهد جميل الثوب، يمدى بهندل، أطله.

١٩١٨١ - عُتْدَقَم Cesalpinia (S). Césalpinie (F).

جنس نباتات. برية وزراعية تربيت من فصيلة القرنيات. أنواعه نحو ١٠ منها الأشجار والشجيرات والجنبات. أخشابها ناعمة الرقة، صلبة العود، فاعرة الصنف، شائعة الاستعمال ويستخرج منها صبغات حمراء وصفراء غريبة فيها تصلح في تخفيف الصوف واللؤلؤ. أشهر أنواعه مايتج.

١٩١٨٢ - عُتْدَقَم بَرَزِيلِي، عُتْدَقَم فِرْتَمْبُوك Cesalpinia echinata (S). Bois du Brésil, B. de Fernambouc (F). Brasil-wood, Brazilletto-wood, Lima-wood (E). Brasilienbaum, Brasilienholz (D). Brasil-rosso, Legno del Brasile (I).

نوع من العنبر، شجرته سريرية شائكة تملو نحو سبعة أمتار. أوراقها مركبة حاملة. أزهارها إلى الصفرة. أخشابها شديدة المانة، فاعرة الصنف. خشبها أصفر اللون شائع الاستعمال.

١٩١٨٣ - عُتْدَقَم مَتَالِي *، فُولْدَقَة

Cesalpinia coriaria (S). Dividivi (F). Divi-divi tree, American sumach (E). Dividivistrach (D). Sommaco d'America (I).

نوع من العنبر، شجرته سريرية شائكة تملو نحو ٤ أمتار. أوراقها مركبة حاملة. وريقاتها بيضية الشكل صغيرة القد. أزهارها متوسطة الحجم، عشقودية التجميع. أخشابها جيدة الصنف وصابغة. غلاه سويها وثمارها داكنة صابغة.

١٩١٨٤ - عُتْدَقَم سِيَّان *، بَقَم هِنْدِي

Cesalpinia sappan (S). Césalpinie sappan, Bois de sappan, Brésillet des Indes (F). Sapan-wood tree,



عنديل



عنبر متالي



عنبر صيان



عنبر قارح



عنبر هندي



عتر الماء.



عتر



عفس



عصول



عنصيف

Micro-élément (F). عُنْصُرٌ مَكْرِي ١٩٢٠٢

هو كل عنصر غذائي جزئي النسيب يسبب انعدامه أو شحائه في التربة ما يدفعه الجمن أو الموز الذي تظهر حوارضه في النبات والآخر.

١٩٢٠٣ - عُنْصُرَةٌ هي للملح اللهب ، اطلبا .

Racial ١٩٢٠٤ - عُنْصُرِي تمت تعريفه بوصفه به الاجناس المتحدرة من اصل واحد.

Scille (F). ١٩٢٠٥ - عُنْصُلُ هو الاشقيال نبات دوفسي طيب ، اطلبا .

Scille d'automne (F). ١٩٢٠٦ - عُنْصُلُ جَرَسِيّ هو اشقيال الخريف ، اطلبا .

Jacinthe sauvage (F). ١٩٢٠٧ - عُنْصُلُ مَنَحْنَر هو اشقيال القباب ، اطلبا .

Jacinthe étoilée (F). ١٩٢٠٨ - عُنْصُلُ تَجَسِيّ هو الاشقيال التجسي ، اطلبا .

١٩٢٠٩ - عُنْصُلُ * ، جَوَلَنُ المَرْوَج

Endymion (S). Endymion, Agraphide, Jacinthe des prés (F). Blue hyacinth (E). نبات يصل من فصيلة الزنبقيات ، هذه غابات الابدال المتدلة الحارة من الشرق الاوسط واروبة . اوراته مستطيلة ميزانية التصل الجليل الخضار . غمرانه اموج الانتصاب ينتهي بثقل من الازهار المتعاقبة المحتصة العرف ، الجيلة الشكل ، السداسية البتلات الزرق || تنويره رديبي .

Félicia (S). ١٩٢١٠ - عُنْصِيف * Félicie, Piquette bleue (F). Blue daisy, Blue Marguerite (E). Félicie, Kapaster (D). Félicie (F). جنس نباتات برية وثريينة من فصيلة المركبات. انواعه عديدة منها المشية والليلية والحرلية والمصرعة . اوراتها لا قياسية الزركاز . ازهارها مختلفة الالوان يلف فيها الازرق . معظمها نبات سبروتي يعيش ويوجد في جميع الاروبة || اشهر انواعه الزريينة ما يلي .

١٩٢١١ - عُنْصِيفُ سَمَنْجُونِي Félicie coelestis (S). Félicie azurée (F).

عشبة ليلية ممرعة تفلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراتها متعاقبة ، لاطنة ، بيضيه الشكل ؛ نصلها خالي البشرة ؛ ملتف الاطراف . ازهارها حالية الزركاز ؛ فردية التجميع ؛ مستطيلة الزناد ؛ صمغونية اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

Félicie tenebris (S). ١٩٢١٢ - عُنْصِيفُ لَطِيف Félicie délicate (F).

عشبة ممرعة تفلو نحو ٣٥ سم. اوراتها متعاقبة خفيفة ؛ نصلها حاد الضام ، خالي البشرة ؛ باعت الخضار . ازهارها حالية الزركاز ؛ فردية التجميع ؛ لها بين الازرق والبيكي || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

Cigogne noire (F). ١٩١٩٢ - عُنْزُ هو القلق الاسود ، اطلبا .

Balistes (S). ١٩١٩٣ - عُنْزُ لَمَاء * ، قَنْفَر Baliste (F). Trigger-fish (E). جنس اسماك بحرية من رتبة ملحويات الفك . انواعه عديدة . اصطناعها جمار مناطق البلاد الحارة . جميعها من الاسماك لماكولة تتميز باشكالها البيضاء المخططة المادية الانحاق . رؤسها مسلحة زعانف مهازية الشكل مدينة الطرف متشفر وتنتصب عند الحاجة .

Baliste caprique (F). ١٩١٩٤ - عُنْزُ المَاءِ المَلَوْنُ سمكة بحرية قنصر المتوسط ، اطلبا .

١٩١٩٥ - عُنْزُبُ ، عُنْزُبُ هو سقاك الفك ، اطلبا .

Astragale (F). ١٩١٩٦ - عُنْزُرُوت هو الاسطراغالوس ، اطلبا .

Eragrostis (S). Eragrostide, * ١٩١٩٧ عُنْزُرُع Eragrostis (F). Love-grass, Tickle grass (E). Grasses Liebesgras (D). Eragrostis, Gramignone (I). جنس نباتات عشبية برية من المركبات وفصيلة التنبليات انواعه عديدة نحو ٢٤٥ منتشرة في جميع اصقاع العالم . معظمها حولي وبضها معمر . يكثر وجودها في المراعي الطبيعية وفي الاراضي البور . موطئا تحلة . صفها مشرب التصل ، خيطي الزام الاخير . ازهارها عقدي متشعب . رعاها الماشية وتضمن عليها .

١٩١٩٨ - عُنْزُرُعَة هي التث النسبي ، اطلبا .

١٩١٩٩ - عُنْسُ * Aquila sudax, Uroaetus sudax (S). Uraëta, Uraëta sudaclex (F).

العنس ، جمه عناس وينس ، طائر وحيد الجنس والنوع من صارة العقبان وفصيلة الصقريات . كبير الجثة طوله نحو ١٠٥ سم . ويصلته ٢٦٠ سم . منفر قوي البرة الحادة . ذنبه وتناجي الريش مقطوم الطرف . ثوبه الى السرة الخطية تلوها مشعة من السهبة يتخللها ثم من السرة الجوزية السوداء للمرج . عناء عنزوينتا اللون . منفره وعناله صفر || عيشته جبابعة ، سره يعلو من زربوين الى حسة ازواج . يأنف الجبال والسهول والاحراج . قوته كل ما استطاع اليه يدرك من الحيران والطير والزحافات والاسماك . يرب في الثمن والمنازل والطيال ولا ينف من الجيف || يلدن وكنه في الانجار القرينة الثانية . اثناء تحضن وحدها زنتين كبيرتين طول الواحدة عراخ بين ٨ و ٩ سم . ويرضعها من ٦ الى ٧ سم . وهو من العقبان التي تألف حياة الاسر بسهولة .

Myrobala aillé (F). ١٩٢٠٠ - عُنْصُ هو الاطليح المنح . من النباتات العلية ، اطلبا .

١٩٢٠١ - عُنْصُرُ Elément (F). Element (E). هو التعريف الروسي لكل مادة بسيطة لم يتخلل منها حتى الآن ، مواد أبسط منها .

١٩٢٢٢ - عَنْقُولَانَة كَثِيْمَة السَّيْبَة

Liatris pycnostachya (S). *Liatride à épi dense* (F).
بمجة تزيينية تملو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. اورثاها السفلى
خاسية أو سباعية العروق طولها نحو ٣٠ سم. وتعرض
١٥ سم. اورثاها العليا خلية النصل الذرب الجامة. ازهارها
روسيات صغيرة متتامة كثيفة التجميع ارجوانية اللون.
ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

١٩٢٢٣ - عَنْقُولَانَة تَجْيِلِيَة الْاَوْرَاقِ

Liatris graminifolia (S). *Liatride à feuilles de graminée* (F).
بمجة تزيينية تملو من ٤٠ إلى ٩٠ سم. اورثاها بمجلية
صفوية الشكل، خفيفة النصل. ازهارها روسيات صغيرة
متتامة، ومجمعة، ويضاء اللون أو حرجاء || ازهارها
يستمر من آب الى ايلول.

١٩٢٢٤ - عَنْقُوب *
Lucanus (S). *Lucane*,
Cerv-ant (F). Stag-beetle (E). *Hirschkäfer* (D).
يقال الذكر عنقوب والاثنى عنقابة. جنس شحرات ثلثة
من فصيلة المنطوبيات. الذكر اكبر قدماً من الاثنى وهو
كبير الحجم، غليظ الرأس، عظم التأثير، مستطيل
الزبان، كسني الاتحاد السفح المواجه. اما الاثنى صغيرة
الحجم والرأس والتأثير. اتحادها الى السرة المباشرة المعادة
المواجه || البرقة غرواء اللون، عمودية الشكل، تمشي
على جلود الانجار اليابسة.

١٩٢٢٥ - عَنْقُوب الصَّخَّاب

Dorcas (F). *Dorcas*, ج. عنقوب، اطله.

١٩٢٢٦ - عَنْقُوبِيَّات *
Lucanidae (S). *Lucanidae* (E).
فصيلة شحرات ثلثة من رتبة عذبات الاجنحة. اجناسها
وانواعها عديدة تمشي على جلود الانجار اليابسة تحت
قلتها وفي محيط انتشارها جلودها. اكثرها صغيرة ومتوسطة
القد وبعضها كبير جداً يراوح طولها بين ٧٠ و ٨٠ سم.
انواعها مختلفة الالوان يلب فيها الاسود والكسني المايق.
قرونها الاستشعارية ورقية الشكل، حشاشية المفاسل.
قرونها مستعرضة، اتحادها سفلية، اجناسها قوية.
ذكورها اكبر حجماً من اناثها واضم جثة واغظ اضاءاً
وتأثيراً.

١٩٢٢٧ - عَنْقُوبَة
Interligne (F). *Space-line*, *Lead* (E).
المنفة في المسافة بين غلي الزرع.

١٩٢٢٨ - عَنْقُوبَة
Turbine
دولاب مائي محرك بحوره عمودي أو ممتد. والمنفة
اشكال انهما استعمالاً:
T. radiale (F). Radial T. (E). عنفة شعاعية
T. hydraulique (F). Hydraulic T. (E). عنفة مائية
T. axiale, T. parallèle (F).
Axial T., Parallel T. (E). عنفة محورية
T. mixte (F). Mixed T. (E). عنفة مختلطة

١٩٢٢٩ - عَنْقُوب *
هو عنق الارض.

١٩٢٣٠ - عَنْقُولُون
هو السلح، اطله.

١٩٢١٣ - عَنْقُوبِيَّات مُنْتَحِيس (S).

Félicie reflexa (S). *Félicie réfléchie* (F).
عنفة ممرعة تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. اورثاها متعاقبة،
منقعة، بيضية الشكل، ذلقة الزام الاخير. نصلها
مجمع الفت، مائل البشرة، منقث الطرف، يلمت
الخضار الجري. ازهارها حامية الايتكاز، فردية التجميع
حرارة اللون || ازهارها يستمر من شباط الى ايلول.

١٩٢١٤ - عَنْقُوبِيل *
هو السون الجلي، اطله.

١٩٢١٥ - عَنْقُوس *
Anthistira (S). *Anthistirie* (F).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة النجيليات. انواعها
المعروفة قليلة السدد اصلاً، البراد الحارة || والمنطس من
النباتات الطرية على الساحل اللبناني. متنباهة محكولة
التجميع محفوة بتفتيات دقيقة تجعلها كالصفا.

١٩٢١٦ - عَنْقُوبِيلِيَّات *
Onitis belial (S). *Onitis belial* (F). *Onitis* (E).

شجرة جملة نائلة من فصيلة الجمليات ورتبة مضفات
الاجنحة. تألف المزارع والبساتين والبراري وكل مكان
يكثر فيه المائي والروث والسلح || جسمها متوسط القد
يملو من ٢٠ الى ٢٦ سم. لونها الى السواد اللامع. رأسها
يلسني الجسم، قصير الازار والخط. زباناها صغيران،
مهيضتا الاطراف. حينما صغرتان، ظهرها مضطوم
الطرف، لا يلمس كامل البطن. عندما كبرت، صغرتان،
قليلتا التحيز || الاثنى اصغر قدماً من الذكر وبهت قوياً
منه || لها جبل واحد في الحول. تظهر الخشرة الجملانية
في احوال الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف. مسرها
دجوي || والبرقة منه ادراكها الكمال الجسوري طول
من ٤٠ الى ٥٠ سم. جسمها مستطيل الجسم، منقث
الشكل، فليح التأثير، قصير الراجب، اضر العين،
اسود الرأس || طول الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع.

١٩٢١٧ - عَنْقُوب *
المنظ: تير النبات من الحر.

١٩٢١٨ - عَنْقُوب *
Sauterelle mûle (F). *He locust* (E).
المنظب الذكر من الجراد. ج. عنقوب.

١٩٢١٩ - عَنْقُوبِيل *
بيت المنكوب.

١٩٢٢٠ - عَنْقُوبَان *
Liatris (S). *Liatride* (F).
جنس نباتات عشبية سبوتية معمرة من النجيليات وفضيلة
المركبات. انواعها عديدة منقطة بري وبعضها تزييني.
جلودها دوصية كروية. سوقها بسيطة جملة. اورثاها
صفوية الشكل متتامة. ازهارها سفلى التجميع. يزورها
تزيينية القمة || احرف انواعها واشهرها ما يلي.

١٩٢٢١ - عَنْقُوبَانَة اَنْيَكَة
Liatris elegans (S). *Liatride élégante* (F).

نوع من العنقولات وهي بمجة تزيينية تملو من ٦٠ إلى
١٢٠ سم. اورثاها مستطيلة النصل، خفيفة الصفا
الجامة. روحياتها امليلية الشكل. ازهارها ارجوانية.
ازهارها يستمر من آب الى تشرين الاول.



عنقوب يلب



عنقوب ذكر



عنقوب اثنى

١٩٢٣٣ - عُنُقُ ، عُنُقُ Cou (F), Neck (E).

عق وعق. ج. اعناق .

١٩٢٣٤ - عُنُقُ Encolure (F).

Neck and shoulders of a horse (E).

جزء من جسم الفرس يمتد من الراس الى الصدر والكتفين .

١٩٢٣٥ - عُنُقُ Pétiole (F), Petiole (E).

علاقة فصل الورقة .



عقيد السديان

١٩٢٣٦ - عُنُقُ الحَبِيبَةِ

عق الحبة نجم تير من كوكبة حور وسيه . مركزه على عق الحبة .

١٩٢٣٧ - عُنُقُ القَرَسِ

عق القرس نجم تير من كوكبة نجوم القرس الاعظم .

١٩٢٣٨ - عُنُقُكَا Phénix (F), Phoenix (E).

العنقاء كوكبة نجوم مقبها الجنوب .

١٩٢٣٩ - عُنُقُكَا مَغْرُوبٌ هي الفقس ، اطلبه .

١٩٢٤٠ - عُنُقُكَا ، عُنُقُكَا ، قاصِصِيَا مَهْرَابِيَّةٌ

جنس نباتات عشية سويسية من القاصصيات وفصيلة

التفريجات الفراشية . انواعه نحو ٢٥ مظهرها بري وبضها .

عق ودرجتي .



عقيد الصنوبر

١٩٢٤١ - عُنُقُكَا Beryx (S), Bélyx (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة العقديات الشالكاكات

الزنانف . انواعه المرفوعة خسة موطها بحار المناطق

الحارة . جميعها صغيرة القد ، اهلبيعية الشكل ، زائفة

الالوان الجميلة اللامعة . عيونها كبيرة مستديرة ، زائفة

الظهيرة مسطيلة شائعة ، زائفها الشرجية فارقة || يعتبر

من الاسماك المادية البضة .



عُنُقُكَا

١٩٢٤٢ - عُنُقُكَا Oncodes (S).

Oncode (F), Oncodes (E).

جنس حشرات من فصيلة العقديات ورتبة ذوات الاجنحين .

انواعه المرفوعة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد

المعتدلة الحرارة || اجسامها مستضفنة الشكل ، تقطوع

من ال ٧ م . رؤوسها صغيرة . عيونها كبيرة ، متلاصقة

متد الشقين ، قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثنائية الفصل .

مراسفها ويلاسها شديدة الصغر . كواسلها شبه مكورة .

شخباتها تلتصق الارزعة . يطبخها انائية الشكل .

مرزاتها صغيرة . رواشها مستعرضة . قوائمها معتدلة الطول ||

تألف البرازي والمواقع الغلظة . يرقاتها تنطلق على بعض

انواع الناكب .



عُنُقُكَا

١٩٢٤٣ - عُنُقُكَا Oncodidae (S).

Oncodidae (F), Oncodidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الاجنحين . اجسامها وانواعها

المرفوعة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد باستثناء

المناطق الباردة || اجسامها حبابية اللسد ، مستضفنة

الشكل . رؤوسها صغيرة عيونها كبيرة ، متقاربة عند

الشقين . قرونها الاستشعارية ثنائية او لائحية الفصل ،

١٩٢٤١ - عقيد السديان * ، قَرْصِيَّةُ السَّيْدِيَانِ

الجُرَّارُوكَا ، بُمَيْيَكْسُ السَّيْدِيَانِ

Cnethocampa

processionaea, Thaumetopoea processionea (S).

Processionnaire du chêne (F), Procession moth,

Oak processionary caterpillar (E), Eichen-Prozessionspinner (D).

حشرة من فصيلة الثرسوليات ورتبة حشرقيات الاجنسة .

موطنها يشمل معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من العالم

القديم والجديد . فراشها صيغة تيش على غزونها الاسمان .

سرقها تعيش على اوراق الشيتان || جسمها متوسط القد

يطول نحو ١٥ م . بسطها نحو ٣٠ م . رأسها حنطي اللون .

عينها صغيرةتان . زياتهاا مشطيان مزدوجان عند الذكر ،

مشطيان بسطان عند الانثى . جوشها حنطي اللون اسمر

المزاج يطبخها اشبه الاذن ، احمر المزاج || روشنهاا

الاماميان الى الكهبة لتعلوها زركشة وضطوط مستعرضة الى

الثغرة السراء . روشنهاا الخلفيان الى الشبهة الثغرةا لتعلوها

مشحة حنطية خفيفة . اهدابها الى الحنطي الاكلف ||

لها جيل واحد في الحول . تظهر الفرائشة في آب . تسرح

في الليل . تماثل بعد ظهورها بمدة تراوح من ٤ الى ١٦

ساعة . تمتع المكان صفوا على لهاء الجروع والافصان ||

السرة تطول نحو ٣٢ م . جسمها اسطواني الشكل . ثوبها

المزاج الى الشبهة الزرقاء المزاج . جانباها الى الشبهة الثغرةا

تعمل في كل سكة من سكهاا البطنية ثلثة حراء لتعلوها

ضمة من الحلب السريع الانقسام يثري الجله اذا لاسه

ويجبه كالقارص . رأسها اسود || طود الاكمال الذي

يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن خلاف رقيق داخل

الجراب الجاهي الذي تاري اليه جميع اسابيع المشيرة .

١٩٢٣٢ - عقيد الصنوبر * ، قَرْصِيَّةُ الصَّنَوْبَرِ

الجُرَّارُوكَا ، بُمَيْيَكْسُ الصَّنَوْبَرِ الجُرَّارُوكَا

Cnethocampa pityocampa, Thaumetopoea

pityocampa (S), Processionnaire du pin (F), Pine

processionary caterpillar, Procession moth (E).

Pinien-Prozessionspinner (D).

حشرة مدلولة من الثرسوليات ورتبة حشرقيات الاجنسة .

موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشالية .

فراشها جارية قوتها يريق الزهار . سرقها تعيش على

اهداب الصنوبر || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ م .

بسطها نحو ٣٢ م . رأسها اكلس اللون . عينها معتدلتا

الحليم والكشور . زياتهاا مشطيان عند الذكر خطبان

عند الانثى . جوشها اكلس اللون ، اسمر التصبغ . يطبخها

الى الشبهة المقلوعة بالاسمر || روشنهاا الاماميان الى الكهبة

للندسة الموضحة بثلاثة خطوط حنطية . روشنهاا الخلفيان الى

البياض الاخير تملوها بقعة شهاب في حدود الزاوية الخارجية

السفل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفرائشة في مطلع

حزيران . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو

اربعة اسابيع و تمتع المكان على البناق واصول الاهداب ||

السرة تطول من ٣٠ الى ٤٠ م . جسمها اسطواني الشكل ،

كثيف الحلب ، كسني اللون ميقع بالجروي . رأسها

اسود . مدنها اسفر . ملها حنطي يثري الجله اذا لاسه .

والسرة تيل ذنوبها في طود الاكمال يويون تهرج عهاا

المشيرة وتنبعن في الجلالة نحو اربعة اسابيع ان ينتهي

هذا الطور .

رارها نائفة . اوراقها مركبة ، عابطة ، وثرية التجميع . وريقاتها سباعية أو تساعية العدد ، نصلها يغيي الشكل ، ذلق الزايم الاخير ، سنن الحافة ، عاتق الحصار على صفحتي العليا باحت على السفلى . ازهارها منتصبه متكرولة التجميع . ثمارها جرداء حواء اللون ، ثلاثية القلق .

Grappe, Racème (F).

١٩٢٥١ - عَفْشُودِي

Bunch, Racem (E).

شكل ازهار بسيط غير محنود تكون فيه ازهار فانثار محسولة على علاقات قصيرة متساوية الطول مرتكزة على محور مشترك . مثاله عتقود المتب والكشكش .

Uniforme (F).

١٩٢٥٢ - عَفْشُودِي

Grape-shaped (E).

نمت تعريفي يطلق على ما كان شكله كمنقود المتب .

Racémeux (F).

١٩٢٥٣ - عَفْشُودِي الشكل

Racemose (E).

ما كان ترتيبه أو تجميعه شبيه بالمنقود .

Enicurus (S).

١٩٢٥٤ - عَفْشُور

Enicura (F), Enicurus (E).

جنس طير من الجوارم منيات المناظر وفصيلة الدريعات . انوعه المعروفة نحو عشرة . اعطائها تمتد من الهند الى ماليزية وجاوا . تألف الغابات وصفاف مجاري الماء . قوتها الحشرات والديدان || اجسامها رفيقة هياكل تطول من ٢٥ الى ٢٧ سم . تتميز باذنانها المستطيلة القارعة . اوزانها بمقابلة بالاسود الاسم اللامع والابيض الناصع || تدفن اعشاشها في اناحيص تقيمها في صخور الصخور القريبة من مجاري الماء . اناتها تحسن من ه الى ٧ بيضات على مرتين في الحول . الذكور تناوب الاناث في الترشيم .

Spermophaga

١٩٢٥٥ - عَفْشُوس لاعم

sericeus (S), Spermophage soyeux (F).

Spermophaga sericeus (E).

حشرة واسعة حابية من فصيلة المنندوسيات وثرية مميزات الاجنسة . تألف الموائل التي يكثر فيها الابلاب . خنافسها تعيش على ازهار النباتات المختلفة الاجناس والفصائل . يترافها تعيش ضمن كباير الابلاب || جسمها صغير القد يطول نحو ٣ سم . ثوبها الى السواد البوروي يملو خل كثيف اشهب . راسها مستدل الجرم . جنتها صغيرتان . زباناها صروليان . فكها ذريان . ظهراها لا يلفح كامل السكة الشرجية . ارساغها رباعية العقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملدة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو ١ يوم . تمتع الممكن ميحاديها على الكباير قتلته مادة غروية لاصقة || البقرة عنه يولغها الادراك التام تطول نحو ٤ سم . جسمها مقبوس الشكل ، نودلي والرواجب ، حطلي اللون ، أغبر المزاج ، اسود الرأس || طول الاكداك الذي يستمر نحو ثلاثة أسابيع ينقضي فمن صلبة تغلق عند انطلاق الحشرة الجملدة .

Aniloca (S).

١٩٢٥٦ - عَفْشُوس

Aniloca (F), Aniloca (E).

جنس دويبات بحرية من عشريات متساويات الاطراف وفصيلة اليربوسيات . انواعه المعروفة قليلة اعطائها اليسر

بعضها مهذب الاطراف . ملابسها نحيلة او ضامرة . كرسها شبه مكورة . شيفاتها منبسطة تلحف الارزنة . يطنها انائية الشكل . وراشها صغيرة ، شخافة || يرقاتها صغيرة ، وضعة الشكل ، مجرمة بتأثير ثابتة تمكثها من التعلق على المناكب || اشهر اجناسها المنقود .

Bérycidés (F).

١٩٢٤٤ - عَفْشُودِيَّات

Berycidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف ، اجناسها وانواعها عديدة موطنها مجار المناطق الحارة . جميعها صغيرة القد ما كولة تتميز بالوانها الزاوية الاثوان ، بكبر عينها المستمرة . زعانفها الظهرية للامانة الشكل وزعانفها الشرجية الفارقة || اعرف اجناسها واشهرها المعتد والسفوق والسجلو والسيرة .

Verge de l'âne (F).

١٩٢٤٥ - عَفْشُور

هو جردان الحمار .

١٩٢٤٦ - عَفْشُورَة

اش الباشق .

١٩٢٤٧ - عَفْشُورِيَّات

Argonauta (S), Argonauta (F), Argonaut (E).

جنس سرائات حلاية رأسية الارسل من الاخطريات . انواعه عديدة منتشرة في جميع مجار البلاد الحارة . تتميز بالفتارة الشكل الشك السطح الذي يبدو بين الذكور والاناث . ذكورها صغيرة القد اخضرية الشكل حادة الصدفة قصيرة الملاصق باستثناء الرأس المستطيل . اناتها مستدرة الشكل نصفية الثلاث السدفي التركيب الرقيق الصفيحة . اشهر انواعه المعروفة :

Argonauta argo (S).

عتقريف للنبوط

Argonauta tuberculata (S).

عتقريف المخط المندني

Empusa (S).

١٩٢٤٨ - عَفْشُوس

Empuse (F).

جنس حشرات من فصيلة الصرغويات وثرية مستحبات الاجنسة . انواعه عديدة معظمها من حشرات المناطق الحارة . اخلاقتها اخلاق الشرايعف اما اشكلها فغريبة .

١٩٢٤٩ - عَفْشُوب السند يان

Oncopsis latio (S), Oncopsis des chènes (F).

حشرة من فصيلة الوزيديات وثرية متجانسات الاجنسة . جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٠ مم . || ثوبا متجانس الاثوان بين النقيين . فهو عنه الذكر اسود الرأس والكرول والحيفة ، جوري الظهران ، اسمر البطن والقوائم . وهو عنه الاثان جوري الرأس والكرول والحيفة ، اخضر الظهران ، حطلي البطن والقوائم || راسها مستعرض ، قليل التحو . جسمها مستدل الطول . عيناها كبيرتان . زباناها نحيلان ، صغيران . كرسها مستطيل الشكل . حجبها كبيرة ، حمرة . ظهرها كامل المنجية ، لاصق ورسها شخائبان ، شخافان . قوائمها نسيقة ، كثيفة . اغلب الشاك || تألف اثمار السنديان والمفصس اينا كانت . قوتها التمس تحسن من الارواق .

Euscaphis (S), Euscaphis

١٩٢٥٠ - عَفْشُودِيَّات

جنس نباتات معمرة من فصيلة النسيات . انواعه قليلة العدد مشهورة بري وبضعة زخية . جنتها وجبراتها تملو من ٢٠٠ الى ٦٠٠ سم . فروصها وانفاتها غليظة ،



(ذكر) (انثى)
عتقريف



عتق



عتق



عتقوس ناعم



عتقوش

بحري السفلى ، عناقيدها بحامية صغيرة القند || ازهرارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٢٨٣ - عُنْبِيَّة مَبْدُولَة

Parthenocissus vitacea (S). *Parthénocisse commune*, *Vigne vierge commune* (F).

جنية عارضة معمرة تطول من ١٠ الى ١٥ م . سريرها الحولية خضراء اللون . اوراقها خماسية الوريقات . تصالها سنانية الشكل تطول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٢ الى ٧ . عناقيدها خجورية الارتفاع ، متقابلة مع الاوراق . ازهرارها مغثرة . حبا اسود اللون ، ازرق المواج . ازهرارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٢٨٤ - عُنْبِيَّة مَسْكَنَة

Parthenocissus quinquefolia (S). *Parthénocisse grimpance*, *Vigne vierge grimpance* (F).

جنية عارضة مستقلة معمرة تطول من ١٠ الى ١٥ م . سريرها الحولية حراء اللون . اوراقها باعثة الخضر ، حلبة البشرة على سطحها . حولها ثنائية السلف ، داسية او سباعية الخيوط المحجة . عناقيدها طرية كبيرة القند || ازهرارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٢٨٥ - عَنِيَس *

Crotophaga (S). *Ani* (F). جنس طير من المتسلقات وفصيلة القيقويات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها يمتد من امريكا الاستوائية الى الوسطى || ملجئها الحيائي جماعي اسرابها متفرقة العدد ، تألف الثنائيات والقبائلي وتقترب من الاماكن المأهولة ولا تبعد عن تجمعات البشر لانها تنظفها من دوي القراد والطحل والتمر وغيرها من الحشرات الجذابة || قوتها جميع انواع الحشرات الدابة والحمنه . تتميز بخلاطة المغناطيس الذي لا يقل طولها عن طول الرأس . اجنحتها معتدلة الحجم . اذنانها مستقلة . ويضاهي ليد التجع . ارسافها نشطة . اصابعها قوية صلبة الاظفار || ومن مميزات ان الاثلاث تفرخ البيض في محاضن كبيرة تقيها بالاشترار مع الذكر كور في امالي الانجار الدائمة . تأري من ٥ الى ١٥ انثى || اعرف انواعه واشهرها النومان التالي :

١٩٢٨٦ - عَنِيَس السَّامِيس * عَنِيَس صَغِير *

Crotophaga minor (S). *Ani des savanes* (F).

نوع من العنيس قريب اليه بالحقق باستثناء المتقاد موطنه امريكا الاستوائية . جسمه يطول نحو ٣٧ سم . وبسطه نحو ٥٥ سم . لونه الى الزرق العابقة البنفسجية المواج . منقاده وزقده وقامتاه الى السوداء القاتم . حلقه حيت شهاد القرن || سره كبير العدد . قوته الحشرات .

١٩٢٨٧ - عَنِيَس الشُّورِي * عَنِيَس كَبِير *

Crotophaga major (S). *Ani des paléoviens* (F).

نوع من العنيس كبير القند موطنه امريكا الوسطى . جسمه يطول نحو ٥٥ سم . بسطه نحو ٦٥ سم . لونه الى الزرق العابقة . صدره اخضر المواج . ذنبه بنفسجي . منقاده وزقده وقامتاه الى السوداء . حلقه عيت صفراء اللون || قوته الحشرات وبعض الثمار اللينة .

١٩٢٨٨ - عَنِيَس *

Eunices (S). *Eunice* (F).

جنس دويبات بحرية من المخلقيات وفصيلة النيماتيد . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم مجار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها دويبة الشكل ، حلقية التركيب

Staphylea colchica (S). **عَنْه كَلْبِيَّة** . *Staphylea de Colchide* (F).

جنية مبروتية تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقها مركبة ثلاثية او خماسية الوريقات . نصلها يفي الشكل ، مائل الصنعة ، جميل الخضار . ازهرارها عتقودية ، متنبسة ، يفضاه اللون . ثمارها جراء مستقلة || ازهرارها يستمر طوال الصيف .

١٩٢٧٧ - عَنْه مَشْطَبَة *

Staphyles pinnata (S). *Staphyler penné*, *Patanotrier*, *Faux pistachier*, *Nex coupé* (F). *Common bladder nut*, *Anthonynut* (E). *Echte Pimpernuss* (D). *Stafliodendro*, *Nasotagilato*, *Fussaria*, *Falso pistachio*, *Noce di St. Antonio* (I).

شجرة مبروتية مبالوة تملو من ١٥٠ الى ٥٠٠ سم . اوراقها مركبة خماسية او سباعية الوريقات . نصلها يفي الشكل ، ضيق الزام الاخير ، سنن الحلقه ، بطول نحو ١٣ سم . ويعرض ٥ . ازهرارها عتقودية متنبسة ، يفضاه اللون . ثمارها جراء متسلية الطول والمرض || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٩٢٧٨ - عَنْه كَلْبِيَّة ، عَنْه اَمْرِيْكِيَّة

Staphyles trifolia (S). *Staphylier d'Amérique* (F). شجرة جادسة ، تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقها مركبة ثلاثية . وريقاتها اهليجية النصل المستدير القاطعة ، للشراي الحافة || ازهرارها عتقودية التتبع ، قصيرة القند ، يفضاه اللون . ثمارها جراء كروية مستقلة . ازهرارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٩٢٧٩ - عَنْهَات

Staphyleaceae (S). *Staphyléacées* (F). فصيلة نباتية من ذوات اللغتين عديدة المتحالات . اجنسلها وانواعها كثيرة العدد قريبة للشي من البسنتيات . ازهرارها خماسية الاجزاء . ثمارها حبة . يزورها نية الشكل صغيرة . اشهر اجنسلها ثلاثة : العنبة والعتقوت والمملسان .

١٩٢٨٠ - عَنِيَس

Parthenocissus (S). *Parthénocisse* (F). حرة من الجفنة الملاء . انواعها المعروفة ثمانية . جميعها جنات صرمة عارضة . اوراقها كفية ثلاثية او خماسية التتبع الاسمي . تتميز بحولتها الخمجية الاطراف وازهرارها لالامد الحوائق || الواصله منها عنية . اشهرها ما يتبع .

١٩٢٨١ - عُنْبِيَّة الْيَاكَا

Parthenocissus tricuspidata (S). *Parthénocisse du Japon*, *Vigne vierge du Japon* (F).

جنية عارضة معمرة تطول من ٥ الى ١٥ أمتار . اوراقها كفية عادمة التتبع ، تطول نحو ١٥ سم . نصلها يبدو اخضر الصنعة اشليا للالسة اللامعة ، اثير السفلى الحلبية البارزة المرقق ثم ينحرف الى الحرة التي تمتد في الحريف . ازهرارها مغثرة . عناقيدها كبيرة القند ، كثيرة الحب || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٩٢٨٢ - عُنْبِيَّة حَمَلَا

Parthenocissus himalayana (S). *Parthénocisse de l'Himalaya*, *Vigne vierge de l'Himalaya* (F).


جنية عارضة معمرة تطول من ٣ الى ٦ أمتار . وريقاتها ثلاثية اهليجية . الوسط منها تطول نحو ١٢ سم . نصلها مدبب النعمة ، بارز المروء ، جزوي الصنعة العاليه ،



عَنْه مَشْطَبَة



عَنِيَس الشُّورِي



عَنِيَس

Echter Brandschopf, Hahnenkamm (D). Sclamito cressa di gallo, Fior di velluto (I). عشية سريرية تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم. أوراقها كبيرة لينة أحليجية الشكل. نصلها متجمع الصفحة ، غائر المروق ، خالي البشرة ، بجمل الخضار القاصي . سبلها الزهرية خلية للمس ، لا قياسية الشكل الذي يختلف باختلاف الاصرام ، يكثر فيها المربي ويصرف الديك والبيكوروي . ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١٩٢٩٧ - عشية لفيية * Colasia argentea (S). Calosia argentea (F). عشية سريرية هرية الشكل تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم. ساقها مرهقة مشعشة . أوراقها شبيهة للصل ، خلية البشرة . ازهارها بيضاء اللون ، سبلية التجميع ، غروبية الشكل . سبلها تملو نحو ٨ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١٩٢٩٨ - شهون Aotement (F). Ripening (E). غابة تهر التقصيان في الكرمل والاشجار .



عشية خلية

١٩٢٩٩ - عواء ، بكار ، راعي الشاة le Bouvier (F). Boates, the Herdsman (E). العواء والبكار وراعي الشاة ثلاثة أسماء لكوكبية شمالية تقع بالقرب من القطب . مركزها بين المراء والقيطان . حدد نجميها اثنان وعشرون في الصورة وواحد خارجها . وفي صورة رجل يده اليسرى مصا || وتسمى العرب النجم الذي حل الرأس || القنطريوس . والذي حل الساعد || مصا القنطريوس . والذي حل يده اليسرى وحل الساعد من هذه اليد وما حول اليد من النجم || اولاد القنطريوس . وهناك ايضا || الازار || وورق الازار || او || الموز || . والخارج من الصورة نجم اخر نثر بين فخذه يدهي || السالك الرابع . || والسالك يسمي مفردا حارس الساء وحارس الشاة لانه يرى ابدأ في الساء لا ينبغي تحت شعاع الشمس || والعواء ايضا منزل من منازل القمر الشامية ينزلها القمر في الليلة الثالثة عشرة . وفيجب العواء يدهي فرع الدلو للمؤخر .

١٩٣٠٠ - عوكه ، لسيح ، وقوعة Jappement (F). Yelting (E). صوت الكلاب والذئاب وما اشبه .

١٩٣٠١ - عوكاد هي الروافض اسد قسي البير .

١٩٣٠٢ - عوكاد تناسلية Conduits génitiaux (F). Genital ducts (E). هي المسالك التناسلية في الحيوان .

١٩٣٠٣ - عوكو ، موكوم Avaries (F). Damage, Average (E). العواريات قد تكون خاصة وعينية ومشرقة ورواد بها مفاد بعض النقص اثناء نقلها بجرأ او برأ .

١٩٣٠٤ - عوكو ، عوكوي العوار والواري : تجربة يخطط جبرولما قشاش ثم تبس ثم تلوي ثم تحمل الى الاوعية الى مكة ضناع ويصعد سها غائق (السان) .

١٩٣٠٥ - عوكو هو سملة المرود ، اطلها .



مهنة نصية

مستطيلة ، ورؤسها صلبة ، خاسية الوماس البقية . انوارها مستطيلة الاوان البية || اشهر انواعها مهنة المحيط الهندي الذي يبلغ طولها نحو ١٥٠ سم . وعرضها ٣ سم. ثم عينة المتوسط الذي يبلغ طولها نحو ١٥٠ سم . وعرضها ٣ سم. ثم العينة المتوسطة التي يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط والتي لا يتجاوز طولها ٦٠ سم . وعرضها ٣ سم .

١٩٢٩٩ - عنيكة * Psyche (S). Psyché (F). Psycho (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مجتمعات الاصيل وقصيلة الاوربيات . انواعها المعروفة ثلاثة اعطائها منظر المناطق الشمالية من المحيط الاطلسي . اسرارها شديدة الكثافة ورافرة العدد || اسدافها شخاتية ، شخافة ، جرابية الشكل ، مدببة الاضباب ، متساوية المصاريع ، معدلة التبطيط . اجسامها صغيرة ، تبنية اللون . زعانفها اقنية الاكتساب ، مدهبة رقيقة المطروح المستطيلة ، مقطوعة الاطراف ، مدهبة الختار .

١٩٢٩٠ - عنيسيات * Euniciidae (S). Euniciidae (F).

نصيلة دوبيات بحرية من الخلدات ثنائية او الجوكية . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم || اجسامها حلقة مركبة يكثر فيها التبطيط ، تملو من ٧ سم. الى ١٥٠ سم. || اشهر اجناسها المتيس .

١٩٢٩١ - عنيق هو الرجلية ، اطلها .

١٩٢٩٢ - عنيول * Uniola (S). Uniole (F).

جنس نباتات عشبية ، هرية ، مرعوية ، حولية او معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة ستة ، ثلاثة منها اسبوعية منتبها يمتد من ايران الى الهند فالصين . وثلاثة امريكية منتبها يمتد من الارجنتين الى المكسيك || جميعها مرعوية شكلها قريب الشبه بالكرش .

١٩٢٩٣ - عهدة * Caution, Garantie (F). Security, Garantie (E).

هو الكفالة او الضمانة التي تقدم تنفيذاً .

١٩٢٩٤ - عهنة Colasia (S). Célosie (F).

جنس نباتات عشبية حولية تربيتية من نصيلة التلغيفيات . انواعه قليلة ، اعطائها البلاد الحساسة . أوراقها متعقة متعاقبة . ازهارها سبلية التجميع ، ليدة ، متراصة ، لا قياسية الشكل || اعرف انواعه واعلمها مابل .

١٩٢٩٥ - عهنة جكار ، عهنة هونطن Colasia hutsoni (S). Célosie, de Java, C. de Hutson (F).

عشبة سريرية تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. أوراقها بيضية ذلقة . نصلها احمر اللون ينلو مواج ازرق . سبلها الزهرية اسطوانية الشكل ليدة . ازهارها حمر القناعة . يبيض الاطراف || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١٩٢٩٦ - عهنة عنيكية * Celosia cristata (S). Celosia crista de coq, Crête de coq, Passe-vo-lours (F). Cock's comb, Coxcomb, Woolflower (E).

جنل آخر

تميش على الرمال وفيها. قوتها الحويثات والخشرات والديدان.
تتميز بسرعة الانتقال والانتفاخ في الرمل || أشهر أجناسها
الموير والجلبسيم.

١٩٣٢١ - عَوَلَك السِنْدِيَان *، عَوَلَك شَرِيف *

Anthaxia nobilis (S). *Anthaxie noble*, *Anthaxie des chènes* (F). *Anthaxia nobilis* (E).

حشرة خاضعة غاشية من فصيلة الزنبقيات ورنية منمدات
الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الأوسط الى اوروبا.
تألف جميع المراجع التي تذكر فيها الانحجار. خنافسها
تميش على بتلات الازهار وعلى الاوراق الفتية. يرقاتها
تسردب لحاء الافناد شكرها || جسمها صغير القيد يطول
من ٩ الى ١٥ م. ثوبها الى الخضار الاسفع الجليل.
الانثى اصفر قدأ من الذكر وتتميز باحجار الكوسل الذي
تقطعه في وسطه من الرأس الى الجناحة جعدة شفرار عابطة.
رأسها مستد الجرم ينور بمظفه تحت الكوسل. حينها
كبرتان. زباناها خيطيان. عدها قليتا التميز
جاملتا القشار الصلب الذي لا يخترقه الدوس. ارساغها
خامسة المقل || جيلها الحولي واحد. تظهر الحشرة
الجملانة في اوائل نيسان وتبقى حتى اواسط تموز. قرح
في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند ادراكها التام تطول
نحو ٢٥ م. جسمها سكي التركيب، مستطيل المقدم،
مستطيل الخصر، تبي اللون، كسني الرأس والشرح،
ضلع التأكير النكية. وهي مرقالة تحمل عند مؤخر سكتها
الحادية عشرة زائدة قرنية منشعبة الى شطرين || طور
الاكمال الذي ينتهي في آخر نلق تحفره البرقة، يستمر
نحو ١٥ يوما.

١٩٣٢٢ - عَوَلَك لَمَاع *، عَوَلَك نِيدُلَا *

Anthaxia nitidula (S). *Anthaxie luisante* (F). *Anthaxia nitidula* (E).

حشرة خاضعة غاشية من فصيلة الزنبقيات ورنية منمدات
الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الأوسط الى اوروبا.
تألف الجناات والمدايق والبراري. خنافسها تميش على
اوراق نباتات الفصيلة الوردية، يرقاتها تسردب افناد
واغصان الانجار الفصيلة ذاتها كالتفاح والاباص والمشمش
والفوخ والزعرور والورد والشرين || جسمها
صغير القيد يطول من ٥ الى ٧ م. ثوبها اخضر
الطهران ناري الكوسل والرأس، اسمر البطن والجرايز
والزباني. رأسها صغير الجرم ينور بمظفه تحت الكوسل.
عينها كبرتان، زباناها خيطيان || ظهرها ذلق المؤخر
اللاحت المستدير الطرف عدها متباينة التميز
القيق. ارساغها خامسة المقل || الانثى اصفر قدأ من
الذكر وابتت قويا منه ولقصر زبانا || لها جيل واحد في
الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتبقى حتى
اوائل تموز. تسرح في النهار وتبيت في الليل || تدرك
البرقة للكمال الجمودي في اواخر شهر كانون الاول.
فيصبح طولا عند ذاك نحو ١٢ م. جسمها متابع الحيد،
مستطيل المقدم، كامن المؤخر المستطيل، اغبر اللون،
الحادية عشرة زائدة قرنية جزلة فارقة الطرف || طور
الاكمال يستمر نحو ١٥ يوما وينتهي فسن صلبة
خاوية النشاء.

Armérie (F).

١٩٣٢٣ - عُوْد أَحْمَر

هو البيقان، اطلبه.

١٩٣٠٦ - عَوَاكُض جَوِّيَّة

Perturbations atmosphériques (S). *Atmospherical perturbations* (E).

اضطراب سير الحوادث الطبيعية الجوية بسبب بعض
الموامل الطارة الخلة.

١٩٣٠٧ - عَوَاكُشِب

هي الغشبات، الحويثات التي تميش على المشب.

١٩٣٠٨ - عَوَاكُشِر

المواشر: قوام ديش الطائر وكذلك الأعشار.

١٩٣٠٩ - عَوَامَة

Flotteur (F). *Water-gauge* (E).
اسطوانة صغيرة من خشب السنديان توضع على المياه الجارية
لقياس مرصها نصيبها.

١٩٣١٠ - عَوَامِل التَغْدِيَّة

Facteurs trophiques (F). *Trophic factors* (E).

١٩٣١١ - عَوَامِل لِنُوعِيَّة

Facteurs écologiques (F). *Ecological factors* (E).

١٩٣١٢ - عَوَامِل جَوِّيَّة، عَوَامِل مَنَاطِيَّة

Facteurs climatiques (F). *Climatic factors* (E).

١٩٣١٣ - عَوَامِل مَاحِدَة

Facteurs inhibiteurs (F). *Inhibitory factors* (E).

١٩٣١٤ - عَوَامِل مُحدِّدَة

Facteurs limitateurs (F). *Limiting factors* (E).

١٩٣١٥ - عَوَالَة *، سَمْتَشُوس *

Sminthus (S). *Sminthe* (F).

جنس حيوانات لبرقة قافسة من فصيلة البربريات. انولمه
عديدة. موطنها البلاد الاسوية والاروبية جميعها صغيرة
القد تطول من ٦ الى ٨ سم. واذناتها كذلك. انوالها الى
الكبة تسر وتيق مع اقترابها على ثوب الطير وتضفر
وتبيض عند البطن. اذناتها حشرقية أطوالها تمد من
١٤ الى ١٧. قوتها الاحشاب والجنور.

Sous-produits (F).

١٩٣١٦ - عَوَالِد *

By-products (E).

هي المواد الثانوية الممكن استعملها او استخلاصها بعد
تصنيع المواد الرئيسية. مفرها عائدة.

١٩٣١٧ - عَوَالِد

الموائد اربعة كواكب في وسطها كوكب يدعى الريح.
والموائد تنتمي الى كوكبة التنين.

Irvingie (F).

١٩٣١٨ - عَوِيَّة

هي الافرنجية، شجرة من السروبيات، اطلها.

Léopardau (E).

١٩٣١٩ - عَوِيَّر

جرو النهد لا يزال برقة امه.

Ocypodidae (S).

١٩٣٢٠ - عَوِيَّرِيَّات

Ocypodidés (F). *Ocypodidae* (E).

فصيلة دويبات بحرية من القشريات حشاريات الاربل
قصيرات الكليل، لامتساويات للالاط || اجناسها وانواعها
الحرة متوسطة المدد. اصطناعا لسطوط بحار البلاد الحارة.



عَوَانَة



عَوَلَك السِنْدِيَان



عَوَلَك لَمَاع

Wurz (D). Acoro, A. vero, Canna odorifera, Calamo aromatico (I).

نبات عشبي جنموري معمر من فصيلة النجيليات. جذاميره مدادة. ذكية الرائحة تستعمل في الطب وتدخل في تحضير بعض الطيوب. أوراقها صفية الشكل جامدة. النصل متضيق. شراخه ينشئ بفسه من الإزهار الخشوية. وهو من نباتات الصلور المقتمة التي ورد ذكرها في التوراة. يستعمل في معالجة الرمد والقرنات الصدرية. ويقال إن جلوره مقوية للأعصاب.

١٩٣٥ - عَوْدَل = مَيْاليل Metamère (F). Metamere, Somite (E).

نمت تعريفي يطلق على بعض أعضاء الجسم المتساوية المتتابعة كما هي الحال في سحج المفصليات.

١٩٣٦ - عَوْدَكَة = مَيْالِكَة Métamérie (F). Metamery (E).

هفة الأعضاء أو الأجزاء المجدولة.

١٩٣٧ - عَوْرَوْر = هُو أَيْقَاءُ الْبَرْي = أَلْبَلَب =

١٩٣٨ - عَوْرَر Carance (F). Deficiency (E). شاذة أو حارصه بسبب نقص في تمثيل عنصر غذائي تقتصر إليه التربة أو يفترق إليه ملت الحيوان.

١٩٣٩ - عَوْسَج = عُلُقُيق = بَاقُش = شَوْكَل Rubus (S). Ronce (F). Bramble (E).

جنس نباتات دظلية برية وزراعية من سبط الوردليات وفصيلة الورديات. أنواعه زهاء ٣٠٠ منتشرة في جميع أصقاع العالم. معظمها بري وبعضها زراعي. ثمارها شجائيل مأكولة تسمى «المقنع» وقد تربى أو يستخرج منها بصل التخضير والتقطير لتأديده كعولية للبلدة الطعم. أشهر أنواعها ما يتبع.

١٩٤٠ - عَوْسَجُ أَجْمَرِ الْمَتَبِ

Rubus phenicolastis (S). Ronce à poils rouges (F). نبات دخل معمر أزغب اللحاء، أحسن الشوك. ساقه قرمراء تملو من ١٠ إلى ٢٠ سم. أوراقه ثلاثية التفصيص، يفضية الشكل، خلية البشرة || أنزهاره عتقدي التجميع، ليد الإزهار الوردية اللون. ثماره لليلة الطعم والترف. برتقالية اللون.

١٩٤١ - عَوْسَجُ أَسْوَدَ Bourgène (F). هو التبق الأسود، ألبله.

١٩٤٢ - عَوْسَجُ أَصْفَرُ Rubus xanthocarpus (S). Ronce jaune (F).

نبات دخل سبروتي معمر أحسن الشوك. ساقه قرمراء مدادة. أوراقه مركبة ثلاثية النوريقات المسنة الحافة. أزهاره نوروية التجميع، يفضاه اللون. ثماره سكرية الطعم عادمة اللف، صفراء اللون.

١٩٤٢ - عَوْسَجُ الشَّتَالِ Rubus occidentalis (S). Ronce d'Occident (F).

نبات دخل معمر أحسن الشوك. ساقه قرمراء مستطيلة السروع تملو نحو ٣٠ سم. أوراقه مركبة ثلاثية أو خشية الورديات. نصلها مسن الحافة، أخضر الصفعة العليا، اطبل السفلى الخلية البشرة || أنزهاره نوروي التجميع، أزهاره مستطيلة الأذن، يفضاه اللون. ثماره إلى السواد اللامع.



عود الأنبياء



عود الحية



عود الرج

١٩٣٤ - عَوْدُ الْأَنْبِيَاء * = عَوْدُ الْبَرْي

Guslacum officinale (S). Gaïac officinal, Bois de gaïac (F). Official guslacum gum tree, Lignum-vitæ (E). Gusjakbaum, Pockholzbaum (D). Guslaco officinale, Gelsomino, Legno santo (I).

نوع من التيك وهو شجرة متوسطة القد من فصيلة النجيليات. أعطانها البلاد الأمريكية. أوراقها مركبة متقابلة. وريقاتها أبيضدة، شفعية، يفضية للنصل الجامدة الصفعة، الباق الغضار. أزهارها أبضية الإرتكاز، فردية التجميع، زرقاء اللون. ثمارها جلدية اللب. يزورها صفراء اللون، هدنية الثياب || خشبها نام الرقعة، شديد الصلابة، قليل الوزن، فاخر الصنف وقد يستخرج منه بالتقطير مادة رائحية، ورائحتها الرائحة للوز المر، تستعمل في عدة مستحضرات طبية أعصها علاجات السفلس.

١٩٣٥ - عَوْدُ الْبَرْي = هُو الْقَطْرُ = أَلْبَلَب =

١٩٣٦ - عَوْدُ الْحَجَرِ *

Ophioxylon serpentium (S). Ophioxyle, Ophioxylon, Serpentina (F). Serpentina, Serpent wood (E). Mardervurzel, Schlangenholz (D). Serpentina, Legno serpentino (I).

جنية برية من فصيلة النجيليات منبها الهند. ساقها قرمراء. أوراقها أبيضدة، متقابلة، ألهلجية النصل، ممتعة. أزهارها نوروية التجميع، تاجية الإرتكاز || يستخرج من ميدانها ويجلورها عصارة مضادة لم الحيات ويحاصل النبال.

١٩٣٧ - عَوْدُ الْخَبِيرِ

هو الزيرين اللبناني وهو يشبه اللب. ألبله.

١٩٣٨ - عَوْدُ الرِيح = هُو الْبَرَارِيس = أَلْبَلَب =

١٩٣٩ - عَوْدُ الصَلْبِ = هُو الْقَدْلَوَانِ = أَلْبَلَب =

١٩٣٠ - عَوْدُ الطَّيْبِ = هُو الْأَنْتِجِر = أَلْبَلَب =

١٩٣١ - عَوْدُ الْقَرَحِ Anacyle pyrèthra (F). هو الماتر قرمراء، ألبله.

١٩٣٢ - عَوْدُ الْمَاءِ = هُو صَفْصَفَانِ الْمَاءِ = أَلْبَلَب =

١٩٣٣ - عَوْدُ النَّدَى = عَوْدُ هِنْدِي = أَغْلَاجُونِ

Excoecaris agallocha (S). Agalloche, Arbre aveuglant, Bois d'Aloès, Bois de Calambac (F). Agallochum, Indian aloe tree, Calambac tree (E). Agallocha, Alderholzbaum (D). Agallocha, Calambucco, Falambo (I).

شجرة برية صابرة اللد من السوسيات تكثر في الحد الشرقية وسرنديرة. تنبت عند مصب الأنهر وفي الإخوار التي تنحدر المياه الحارة والبحرية. عصارتها حارة كارية لقطعة منها تقيش اللين وتغلطها. خشبها رائحي المادة مرغوب فيه. يستخرج منه أدهان عطرية تدغل في صناعة الطيوب وأخرى طبية تدغل في عدة مستحضرات ومعالجات. اشتمال خشبها ويعدنا حطري البية، فزاج الرائحة الذكية الأضخادة.

١٩٣٤ - عَوْدُ الْوَجْ = عَرِقُ أَكْوَر = وَجْ =

قَعْبُ الزَّيْرَةِ = زَيْكِر

Acorus calamus, A. aromaticus (S). Acoro, A. vral, Calamus, Roseau odorant (F). Sweet-flag, Sweet-sedge, Myrtle sedge (E). Echter-Kalamus, Acorus

أزهاره بيضاء اللون ، ثنائية التجميع أو فردية ، محورية الارتكاز ، مستطيلة الاذن ، ثماره الى السواد البنفسجي يزود من اجل ثمره المستحب الطعم الشائع الاستعمال .

١٩٣٥٢ - عَوَسَجِي Rubicole (F).

نمت ترميني يطلق على كل حشرة تعيش على العوسج .

١٩٣٥٤ - عَوَسَق Crécérille commune (F).

هو الماسوق ، اطلبه .

١٩٣٥٥ - عَوْسَجِدْ أَصْفَر Perotis chlorana (S).

Perotis jaune (F). Perotis chlorana (E).

حشرة خاضعة خاشبة من فصيلة الزنبقيات . اطلابها معظم اصناف الشرق الاوسط واروية الجنوبية والغربية وافريقية الشمالية . تألف البراري والارح والمواعي التي يكثر فيها القوز والزعزور . خنافسها تعيش على ما تقتضيه من نصال الاوراق . يرقاتها تعيش تحت القلف والحاء دون ان تصلى على الشجر وهي ترطب في القوز والزعزور والخنوخ في جسمها متوسط القد ، اهليجي الشكل ، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ثوبها الى الصفراء الخشن الماج . رأسها صغير الحجم ، ينور بجمه تحت الكليل . زباناها غليظان ، منشاريا الشكل . كولها عنود الصلب . الاذن الاكبر قدما من الذكر والقصير زبانا واكبر ثوبا || جيل واحد في الحيل . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى اوائل تموز . تساقط بعد ظهورها باسبوع . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة تنمطر بقاء ويبلغ طولها عند الادراك الثمار نحو ٢٤ سم . وهي مرقاة ، جسمها سمي التركيب ، مستطيل القدم ، كامن الخصر ، حنطي اللون ، اسير الرأس والشرج . وين ميزانها انها تحمل عنه مؤخر سكتها الحادية عشر زائدة قرنية طيبة بالملامة تقتني ثلاث اصابع || لتصل اليرقة في طور الاكمال عند منتصف نيسان وتظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار .

١٩٣٥٦ - عَوَسَجَ ٥ ، تَبَعَجَ Venturia (S).

جنس تطور مجهرية من السخايات وفصيلة المشويات . اصحابها مستديرة منخفضة المسام الحامضة بالار من اغلب الاوساط اللون . كتابتها ضصوصية بكتات غليظة . زبها اصفر اللون شفي التركيب تفصله ويرة متمزعة || انواعها عديدة اشهرها ما يتبع .

١٩٣٥٧ - عَوَسَجَ الإِجَاصِ ٥ ، تَبَعَجَ الإِجَاصِ Venturia pirina, Fuscladium pirinum, F. virescens, Megadadosporium pirinum, Cladosporium pyrom, C. dentriticum (S). Tavelure du poirier (F). Pear scab (E). Birnenschorf (D).

ضرر مجهرية شديد الاذى يصيب الاجاص في اوراقه وفناده وثماره || مظهره الخارجي يختلف باختلاف الضور للثمار . وهو في الورقة يقع بين لا قياسية الشكل والحجم تركب النصل على صفحتيه السفلى والعليا || وهو في الانثان والافناد والانصان يقع قرسية لا قياسية الشكل تطبق البشرة والقرشرة والشجر || اما في الثمار فهو يقع غنظلة الاشكال لونها الى البصرة تركب البشرة تنمطر الى سفن لب صلب يتبع برة ويعلق الثمرة فيها شقيقها || اضراره جسيمة لانه يطبق هيكل الشجرة بعد ان يسبب يباس الانثان والافناد ويعد ان يقضي على

Framboisier (F).

١٩٣٤٤ - عَوَسَجَ إِيدَه

هو الفرايبوز ، اطلبه .

١٩٣٤٥ - عَوَسَجَ ثَمَاحِي الْوَرَقِ

Rubus malifolius (S). Ronce à feuilles de pommier (F). نبات دغلي معمر شائك . ساقه فروع فناء مستطيلة السروع ، تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه بسيطة تقاسية الشكل تطول من ٦ الى ١٠ سم وتعرض من ٣ الى ٤ || ازهاره عنقودي التجميع ، صغير القد ، عاصي الازهار البيض القصيرة الاذن . ثماره الى الحمرة البنفسجية .

١٩٣٤٦ - عَوَسَجَ جَوِي Framboisier (F).

هو الفرايبوز ، اطلبه .

١٩٣٤٧ - عَوَسَجَ وَشِيح Rubus spectabilis (S).

Ronce élégante (F). نبات دغلي معمر شائك . ساقه متراكبة الفروع والافناد تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه مركبة ثلاثية . وريقاته سنائية مدببة ، نصلها خلي البشرة ، يسارو المروك || ازهاره ثنائية التجميع أو فردية ، كبيرة القد ، جميلة الحمرة الزاهية . ثماره صفر أو حر .

١٩٣٤٨ - عَوَسَجَ زَعُورِي الْوَرَقِ

Rubus crataegifolius (S). Ronce à feuilles d'aubépine (F).

نبات دغلي معمر شائك . ساقه فروع فناء تملو نحو ١٠٠ سم . اوراقه ضرورية الشكل ، ثلاثية أو خاشبة التفصيص الشاسري || ازهاره عنقودي التجميع كثير الازهار الوردية المشدة . ثماره برتقالية اللون مستحبة الطعم .

١٩٣٤٩ - عَوَسَجَ شَاكِعَ

Rubus fruticosus (S). Ronce commune, R. sauvage, R. frutescent (F). Common bramble, Black-berry (E). Brombeerastrauch (D). Rovo, Rogo, Roveto (I). نبات دغلي شائك معمر ميلول يكثر في الاماكن الرطبة . ساقه فروع متدلية . اوراقه مركبة . صالبيه اقنية الثنائية طيبة قابضة . ثماره ثمرية مأكولة مستحبة الطعم .

١٩٣٥٠ - عَوَسَجَ عَطِير Rubus odoratus (S).

Ronce odorante (F).

نبات دغلي عديم الشوك معمر . ساقه فروع منتصبه تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه ثلاثية أو خاشبة القصوص ، نصلها يعرض من ١٠ الى ٣٠ سم . وهو خلي البشرة على صفحتيه || ازهاره عنقودي التجميع . عاتيله مستطيلة ، مشعبة ، كثير الزهر . ازهاره كبيرة القند عطرية العرف ، حراء اللون . ثماره حارة الطعم شديدة الحيرة .

١٩٣٥١ - عَوَسَجَ لَدِيدِ الشَمَلِ

Rubus deliciosus (S). Ronce à mûres délicieuses (F).

نبات دغلي عديم الشوك ، سرح ، معمر . ساقه فروع منتصبه تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه ثلاثية أو خاشبة القصوص . نصلها يعرض من ٦ الى ٧ سم . وهو خلي البشرة على صفحتيه . ازهاره كبيرة القند ، بيضاء اللون ، فردية التجميع ، مستطيلة الاذن الحمر . ثماره ثمرية بنفسجية اللون لذيدة الطعم والورف .

١٩٣٥٢ - عَوَسَجَ عَدَاك Rubus procumbens (S).

Ronce rampante (F).

نبات دغلي سروي معمر . ساقه فروع ماعدة . اوراقه ثلاثية أو خاشبة التفريض ، غصراء البشرة الماعدة الحمل .



عوسج شائع



عوسج اسفر



عوسج الاجاص

التَّار || يكالغ باستعمال احد الادوية الفاطورية واعصبا سائل بوريد على الوجه التالي : - (١) قبل الايلال بمعدل يراوح بين ١ و ٢ ٪ - (٢) بعد سقوط التوجعات الزهرية بأسرع بمعدل ٨,٨ ٪ - (٣) بعد المكافئة السابقة بثلاثة أسابيع يضاف اليه ١ ٪ من الزرنيخات.

١٩٣٥٨ - عَوَظَبُ النَّفَّاح ° ° ، تَبَعُ النَّفَّاح

Venturia inaequalis, Venturia chlorospora mali, Fusicadium dendriticum, Napicladium soranet (S). Tavelure du pommier (F). Apple scab (E). Apfelschorf (D).

فطر مجهرى واسع الانتشار شديد الاذى يصيب التفاح في جميع اصنافه الملوحة || مظهره الخارجي غثيف بالصفة الى الضرر المتعارف فهو على الورقة يقع سحر لا قيمة تركب شغل التصل يورقه في الصفة العليا || وهو في الاثمار والانداد يقع قرصية لا يلمسه الشكل تطب القشرة والشكر اما في الثمار فهو يقع فيه مستدرة يملوها سفن ليد تراس مشقق صلب للمادة امر اللين || اضراره جسيمة لانه يطب هيكل الشجرة بهد ان يقضي على ثمارها . يكالغ باستعمال احدى الادوية الفاطورية القليلة المنصر النحاسي .

١٩٣٥٩ - عَوَظَبُ الْحَمْرُ ° ° ، تَبَعُ الْحَمْرُ

Venturia populina, V. crenulosa, Didymosphaeria populina, Pollichae elegans, Napicladium crenulosa, Fusicadium radium, Stigma radiosa (S). Tavelure du peuplier (F). Poplar scab (E).

فطر مجهرى يصيب الحمر فيؤذي. مظهره الخارجي يقع مقررة الزاوية تركب الاوراق والنولي فيؤذي نسج التصل وتقود الاوراق الى الاحمال الباكر ثم تطب الترابي فتصبها وقد تسبب ياسها || يكالغ بقطع الترابي الملويرة وسرقها مع الاوراق الساقطة .

١٩٣٦٠ - عَوَظَبُ الدُّوسَر ° ° ، تَبَعُ الدُّوسَر

Venturia graminicola (S). Tavelure du fromental (F). False oat scab (E).

فطر مجهرى تركب النورس فيؤذي . مظهره الخارجي يقع مستطيلة تركب الشرائف وقد تندهد الى السنايل وذلك ان ظروف خاصة ووسائل جوية معينة || اضراره زهيدة ان انحصرت الاصابة بالشراف وجسيمة اذا تزلت بالسنايل . مكافئته جديده لكنها مكلفة . لذلك يحدد الاقلاق من زروع الدوسر في تربة يكثر فيها الموب .

١٩٣٦١ - عَوَظَبُ الزُّعُرُور ° ° ، تَبَعُ الزُّعُرُور

Venturia crataegi, V. chlorospora, Megaladospo- rium crataegi, Fusicadium crataegi (S). Tavelure du Pâubépin (F). Hawthorn scab (E).

فطر مجهرى يطب التار ويؤذي الاوراق || مظهره الخارجي يقع لا قبليية الشكل والمجم تصيب الثمار فتصلها وتركب نصل الاوراق على صفحتها السفلى فتؤذي. اضراره محصورة على انتشاره على الثمار || يكالغ باستعمال احدى الادوية الفاطورية .

١٩٣٦٢ - عَوَظَبُ الصَّرْبَةِ ° ° ، عَوَظَبُ الصَّرْبَةِ

Venturia inaequalis cinerascens, V. aucupariae, Fusicadium orbiculatum (S). Tavelure du Sorbier (F).

فطر مجهرى واسع الانتشار قليل الاذى يقدّم زين

الاحمال ولكنه لا يؤثر في ادراك الثمر || مظهره الخارجي يقع تظهر في الربيع على صفحة التصل العليا عند انتساب البروق ثم تمتد وتنسج الى ان يستقر لونها على السمرة ويليه يباس النسيج || اضراره عمودية المواقب بسيطة لا تستوجب العناية .

١٩٣٦٣ - عَوَظَبُ الصَّفَصاف ° ° ، تَبَعُ الصَّفَصاف

Venturia chlorospora, Fusicadium salicidpermum, Septogium salicidpermum (S). Tavelure du saule (F). Willow scab (E).

فطر مجهرى يركب جميع انواع الصفصاف فيؤذي الاوراق ويصطب الاثمار || مظهره الخارجي يكون على شكلين : اما يقع صغيرة لونها الى السمرة تركب نصل الاوراق الفتية على صفحتها السفلى في اوائل الربيع ثم تمتد الى الاثمار فتصلها وتسبب يباس نولها . ولما يقع سحر تركب زام التصل الاخير على صفحتها وجانبى الصلع ثم تنتشر على النصف || يكالغ بقطع الاثمار الملويرة وسرقها مع الاوراق .

١٩٣٦٤ - عَوَظَبُ الْكَرَز ° ° ، تَبَعُ الْكَرَز

Venturia cerasi, Asteroma cerasi, Fusicadium cerasi, Megaladospo- rium cerasi, Cladosporium cerasi, Acrosporium cerasi (S). Tavelure du cerisier (F). Cherry scab (E).

فطر مجهرى يصيب الكاز فيطلبها ويصيب الاثمار والاوراق فيؤذيها || مظهره الخارجي يكون في التار فروع مبيدة تطرحا من ١ الى ٢ سم . تتصل الى يقع سحر مهدية الاطراف تنسج على كبر حجم الثمرة || وفي الاثمار فروع صغيرة مرصوفة بدون انتظام تتصلل بسرعة الى يقع طبل مرامنة قرصية || اما في الاوراق فانه يقع مهدية تركب نصل الصفة السفلى || اضراره محصورة على انتشاره على الثمار || يكالغ كثيره من المولوب .

١٩٣٦٥ - عَوَظَبُ الثَّرَان ° ° ، تَبَعُ الثَّرَان

Venturia fraxini, Fusicadium fraxini (S). Tavelure du frêne (F). Ash scab (E).

فطر مجهرى قليل الاذى يركب الاوراق فيصيب سقوطها . مظهره الخارجي يقع صغيرة تبلو على الاوراق مقررة الزوايا طلاء اللون ثم تنسج وتنتشر ويستقر لونها على السمرة فتصطب جفاف النسيج ويليه || اضراره عمودية لا تستلزم المكافئة .

١٩٣٦٦ - عَوَظَبُ ، عَوَظَبُ ، عَوَظَبُ

Osmanthus (S). Osmantha (F). Devil wood (E). Amerikanischer Ölbaum (D). Osmane (I).

جنس عجيرات وجنيات برية وزراعية من فصيلة الزيتونيات . انواعه الممرقة ٨ منها الشرق . اوراقها ابيدة ، ممتعة ، متقابلة ، زيتونية الشكل او بيضية . نصلها جلدي الصلصة جبل الخضر . ازهارها غبي التجميع ، عمودي الارتكاز . ازهارها رباعية التركيب ، ثنائية اللون ، صغيرة القبة ، يضاء اللون ، ذكية اللون المستص . تستعمل في تطهير الشاي || اشهر انواعه الزراعية الصناعية ما يلي .

١٩٣٦٧ - عَوَظَبُ أُسُود ° ° ، عَوَظَبُ أُسُود

Osmanthus Delavayi (S). Osmanthe du Père Delavay (F).

جنية سريرية ذفلة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . فروعها واثمارها مراكية . اوراقها بيضية الشكل تطل نحو ٢ سم . نصلها جامد الصلصة ، منشاري الحافة . زهرها مستطيلة الانبوب قصيرة القلفة . ثمرتها زرقاء اللون ، صراء المليج . ازهاره يستمر طوال شهر نيسان .



عوطب تنفاح



عوطب الحور



عوطب الزمرور



عوطب الكرز



عوطب الكرز على الثمرة

١٩٣٧٦ - عُوفْطُ **عُوفْ**

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السديديات . أنواعه المعروفة نحو ٤٢ مظهرها من نباتات البلاد الحارة والامتدادية || يوجد منها في لبنان المربب الازرق (Fuirens) ولا pubescent) منته بعض أشعة السوط حيث تتفتح البروية . قصبه ساقه مستطيلة ، بسيطة ، عادية المقعد ، زباه البشرة .

١٩٣٧٧ - عُوفْطُ **الأُدْغَالُ** *

Boarmia cinctaria (S).

Boarmie bandée (F). Boarmia cinctaria (E).

حشرة من فصيلة الأرفيات حرشفيات الاجنحة . موطنها الاصقاع المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها بجارية فوقها رقيق الازهار . رشفها تمشي على اوراق النباتات البغلة || جسمها متوسط القفد يطول نحو ١٢ مم . بسيطها نحو ٢٨ مم . رأسها اشهب اللون . عينها كبرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . بيضها وبطنها الى الشبهة || روشناها الاماميان الى الشبهة السوداء المزاج يتوسطها بقعة بيضاء وتعلوها رشفية وزوقة كستنية . روشناها الخلفيان الى الشبهة الخطية تعلوها زركشة كستنية وتشميع اسمر || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتج المكن ميساديا على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرعة تطول نحو ٢٩ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالمس انتشار . قوتها الى الخضار البحري تملو خسة خطوط قاطبة كستنية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي في التربة ضمن جراب من الطين والبراز والريال .

١٩٣٧٨ - عُوفْطُ **المُوسَجْ** *

Boarmia repandata (S).

Boarmie recroussée (F). Boarmia repandata (E).

حشرة من الأرفيات حرشفيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحارة من حوض البحر الايطي المتوسط . فراشها بجارية فوقها رقيق الازهار . رشفها تمشي على اوراق الصوج والشرين || جسمها متوسط القفد ، ابيض ، يطول نحو ١٩ مم . بسيطها نحو ٤٨ مم . رأسها احمر اللون . عينها كبرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . بيضها وبطنها الى الخطعة السوداء المزاج || روشناها ، عند الشقين ، الى الخطعة الخطية يطولها في الأزوج الامامي تشميع اسمر ويصلطو برشفية كستنية . ويصلطو في الأزوج الخلفي تشميع اريد وزوقة متعادلة سمره || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتج المكن ميساديا على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرعة تطول نحو ٢٨ مم . جسمها اسطواني الشكل ، مالمس انتشار قوتها بين الازهار والاسمر الجوزي المزاج تملو ثلاثة خطوط قاطبة بيضاء شديدة السمر . رأسها جزوي اللون . رواجها البطينية الوسطى ماصة ما يعود بها الى التقير والشب عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي في التربة ضمن جراب من الطين والبراز والريال .

Osmanthus aquifolium (S). Osmanthe à feuilles de houx (F).

شجرة سبروتية دغلة تعلو من ٣ الى ٦ امتار . فروعها وانفانها وانفانها مزركبة . اوراقها بيضيه الشكل تطول نحو ٥ سم . نصلها جامد الصفحة يحصل في كل شطر من شطريه ثلاثة لسان او اربعة مجعها غليظة القاعده مدنية الطرف . ازهارها خاتنة العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٩٣٧٩ - عُوفْطُ **عَطِيرُ**

Osmanthus fragrans (S).

Osmanthe odorant (F).

جنية باودسة تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . فروعها وانفانها مسجبة الارنكاز ، معتدلة الكثافة . اوراقها زيتونية الشكل تطول من ٦ الى ١٢ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها جامد الصفحة ، لامع البشرة ، حسن الحافة . زهرها قصيرة الاثريب ، كبيرة الفلقة ، فواصة العرف المستحب الاخاذ || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

١٩٣٨٠ - عُوفْطُ **مُسَلِّحُ**

Osmanthus armatus (S).

Osmanthe armé (F).

شجرة سبروتية دغلة تعلو من ٣ الى ٥ امتار . اوراقها سنانية ذرية تطول نحو ١٢ سم . نصلها جامد الصفحة ، حسن الحافة ، شاكك الاسنان والقصبة . ازهارها عطرة مستطيلة المالبق ، متدلية || ازهاره يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

١٩٣٧١ - عُوفْطُ **عُوفْطُ**

Theropichthe gélada (F).

فرد من فصيلة الحبريات مشهور باسم جلادة . اطلبه .

١٩٣٧٢ - عُوفْطُ **عُوفْطُ**

Welwitschie

جنس نباتات معمرة عارضة من فصيلة اللبديات . أنواعه المعروفة ثلاثة اوطنها البلاد الاستوائية . رشفها وفروعها معتدلة . اوراقها متقايلة ، قديفة ، مستطيلة ، جامدة اتصل للمالس البشرة . ازهارها رشيبة المسكن . ثمارها عتية . بزورها مأكولة . صدارة سقها لبنة مرطبة . لها فروعها صناعية لتجنية .

١٩٣٧٣ - عُوفْطُ **عُوفْطُ** ، **مُتَبَخْ** *

Microclimast (F).

Microclimata (E).

هو المناخ الموسمي وقد يختلف من المناخ الاقليمي . ويصير الموئل من العوامل الرئيسية في التوزيع الزراعي النباتي وفي كثافة الحشرات .

١٩٣٧٤ - عُوفْطُ **عُوفْطُ** *

Ctena (S).

Ctèna (F). Ctena (E).

جنس عناكب صغيرة من فصيلة الدوكيمات . انواعها المعروفة نحو ١٥ . اوطنها البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . تعيش في الاودية والهايز || اجسامها صغيرة القفد . بطونها قلبية الشكل . رؤوسها تركب صدورها وتقتسمها قليلاً . جرابها مستطيلة ، غليظة الاطراف . اثوابها الى الصدرة القليلة بالاحمر والاسمر . رؤوسها قوامية الاطواق السرد .

١٩٣٧٥ - عُوفْطُ **عُوفْطُ** ، **مُتَبَخْ** ، **عُوفْطُ**

Entretien (F). Ctena (E).

Keeping, Preservation (E).

القيام بالمحافظة على سلامة الشيء .



عُوفْطُ



عُوفْطُ



عُوفْطُ



عُوفْطُ الاذغال



عُوفْطُ الموعج

ظواهرها اصفر تملو رفقة كستية وتمشع يتي. ووشانا غشائيان. الصفحة العليا من بطنها صفراء توسطها بقعة سوداء. الصفحة السفلى صفراء || تعيش في المياه الراكدة. توجد في كل مكان.

١٩٣٨٦ - **عويج** (F). Short snake (E). الحية القصيرة اللطيفة

١٩٣٨٧ - **عومرة** (F). Synergie (E). تعاون عدة اعضاء لقيام بوظيفة.



عولقة غصير

١٩٣٨٨ - **عومريات** (F). Notonectidae (F). Notonectidae, Back swimmers (E). Rückenschwimmer (D).

فصيلة حشرات مائية من رتبة خلفيات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح. اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متوسطة القد او كبيرة ، قلب فيها الامتطالة. وروصها مستعرضة ، اعطالها صغيرة. عيونها كبيرة جاحقة. قرونها الامتصاصية صغيرة ، رباعية الفصل. كواسلها شبه متساوية الطول والعرض. حناياها مزوانية ، لاهيائية الحجم. ظواهرها كامل الخبيصة النضرورية. وراشها عند وجودها غشافة ، كبيرة. بطونها مجهزة باكتاف تقمية الاكتران ، مهيبة. قوائمها معدة للسباحة واليوم. اوصافها ثنائية العنق || تعيش في المياه الراكدة. جميعها ترمع على ظهورها. قوتها كل ما تستطيع قصه من حشرات وسويبات وقوام.



عوش

١٩٣٨٩ - **عويج** (F). القبطية القائمة الخلق التي في حقونها غطتان سوداوان.

١٩٣٩٠ - **عوهق** (F). Scopus umbretta (F). Umbrette, Hammer-head (E).

طائر من فصيلة الخفليات وحيد الجنس والزوج. اعطانه البلاد الافريقية || جسمه متوسط القد يطول نحو ٥٠ سم. رأسه كبير الجرم. منوج القفص بكفة صغيرة. منقاد غرزي الشكل ، غليظ المنطق ، منتفج للمقط الطولي || يتميز بتمصر عنقه الذي يبعد عن مائر اجناس فصليته || ثوبه الى السمرة المايقة الجوزية المراج. بطنه اقل سمرة من ظهروه. مناكيب جناحيه والاعواي والاياهر والكلك شديدة السمرة الجوزية السفاه. ذنبه قصير القد ، مستعرض الشكل. حذقة بينه غرزية اللون. منقاد اسود. رجلاه الى السمرة المايقة || يائث النياض ويجاري الماء والمنافع قوته الامتلاك والحيات والورغ والظلاء والصفاد والورقيات والبيذان || مسرعه من التجر الى الشرقة وبين الصعر الى القسق || يائث عنه في السند. اثناء تضع اربع بيضات تحضنها بمنارة الذكر نحو ثلاثة اسابيع ، تنقف الجلابيط عادمة الزغب وتبقى في العش بعهدة ابوها الى ان تكتمل اي نحو خمسة اسابيع.



عويسق

١٩٣٩١ - **عوهقان**

المسفان كوكبان الى جنبه الفردين على نسق طريقهما بما يلي القطب.

١٩٣٩٢ - **عويسق** (F). Tinnunculus cecris (S). Crécerelle crécerine, Crécerelle, Crésérine (F). Lesser kestrel (E).

طائر من الصقريات وهو نوع من الماسوق صغير القد

١٩٣٩٩ - **عولق** (F). Diphylia (S). Diphylia (F). جنس خفاش من فصيلة الفويات. وحيد النوع. موطنه البرازيل. جسمه صغير القد. ابر. طوله نحو ٧٠ م. بسطه ٢٠٠ م. فريسته اسفينة قصيرة. ثيابا ثنائية مدنية حادة. ثوبه الى الصبهة الصنانية يملو مراح اسفر. يعيش بجوامع قليلة العدد. قوته البند يمضه ابنا اسطاح. يائث الاجمار الحرجية للغة والاندور والكهوف.

١٩٣٨٠ - **عولكة غصير**

Ouroparia Gambir (S). Ouroparia Gambir (F). شجرة حرجية من فصيلة الفويات. منتجا يتد من اشد الى مائلي به || ساقها منتصبة فراء تملو نحو اربعة امار. اوراقها متباعدة. منقعة. فصالحا اعطيلية الشكل ، مدببة الاطراف ، نازرة الضلوع والعروق. انزهارها وريسي التبعج ، ابني الاكتران. انزهارها صغيرة مستطيلة الكلوس ، خابية البلات الصفراء غشافة العرف المائوس || يستخرج من سوقها بالخز عصاره رائحة قايضة تستعمل استعمال الكافور.

١٩٣٨١ - **عولقيات** (F). Vampyrellae (F). Vampyrellae (E).

فصيلة تطور مجهرية من رتبة السرديات ورتبة البيضيات.

١٩٣٨٢ - **عولقة** (F). Cogla breviceps (S). Cogla à tête courte, Cachalot nain (F).

نوع من العبر وهو من الحيات الصغيرة القد ، طوله نحو ثلاثة امار. ثوبه الى الزرقاء السمر. موطنه المحيط الهادي والحيط الهندي والبحر الاحمر. سره كثير البند براوح بين ٥٠ و ١٥٠.

١٩٣٨٣ - **عوركة بحيرية اللون**

Notonecta glauca (S). Notonecta glauque (F). حشرة مائية مفترسة من فصيلة المويبات. جسمها معتدل التبطيط يطول نحو ١٥ م. رأسها مستعرض ، بحري اللون. خطمها نسيط. صنها كيرتان جاحضتان. زباناها قصيران ، مغيلان. ظواهرها بحري اللون يملو تمشع اسمر. ووشانا غشائيان ، غشافان. بطنها اسود الصفحة العليا ، بحري اللون. حمار بطنها متكاثف الملب || تعيش في المياه الراكدة. توجد في كل مكان.

١٩٣٨٤ - **عوركة خضراء** (F). Notonecta viridis (S). Notonecta vert (F).

حشرة مائية مفترسة من فصيلة المويبات. جسمها معتدل التبطيط ، يطول نحو ١٥ م. ثوبها اخضر اللون. رأسها مستعرض. خطمها قصير. صنها كيرتان جاحضتان. زباناها قصيران ، مغيلان. حمار بطنها مرقوش بالاسود || تعيش في المياه الراكدة.

١٩٣٨٥ - **عوركة دسكة**

Notonecta maculata (S). Notonecta maculé (F).

حشرة مائية مفترسة من فصيلة المويبات. جسمها معتدل التبطيط يطول نحو ١٦ م. رأسها عريض ، اسفر اللون. خطمها قصير. صنها كيرتان جاحضتان. زباناها قصيران ، مغيلان. كواسلها اسفر اللون تملو تمسة سمر لاشواية الكثافة. حصفها مزوانية ، كستية اللون.

١٩٣٩٩ - عُويَية سَمَرَكَة

Gibberella baccata, *Calonectria varians*, *Fusarium fructigenum* (S).

فطر مجهرى يركب عدة الجوار مشرة وسرجية اغصنها اللينين الحامض واليوسني والكرو والدارق والتفاح والاجاص والزعرور والورد والسنب والصفصاف والصفراء والورد والمان واليوكا || يصيب ثمار الكرو والدارق والتفاح والاجاص فيطعمها من البشرة الى البزرة القابلة . مظهره الخارجى بقعة فغنية سمراء اللون تنقص وتغور في الحب وهو في اللينين الحامض واليوسني يقع سمر مسطيلة ، تركب الجذوع والسوق تنسب الصرم || وهو في الجزر والزعرور والورد يقع صغيرة مستديرة لونها الى السواد اللامع تملب اللحاء وتقرحه || اغصانه منطلة برطولة التربة وموزرة العوامل الجوية || يكافح كثيره من الفطور

١٩٤٠٠ - عَيْبَاب هو الانقسام ، اطله .

١٩٤٠١ - عَيْبَاكَة

حركة دورية تأخذ مياه البحر قترقع وتنخفض مرتان يومياً في اوقات شبه معينة لا يصحورة . استمرارها يدوم ١٢ ساعة و٢٥ دقيقة ، اندفاع المياه وارتفاعها يدوم المدة اما انخفاضها وتقلصها فيدوم الجزر والتعويض || ارتفاع مياه المدة في البحر الابيض المتوسط يراوح من ١٠ سم الى ١٥٠ سم . وارتفاعه على شواطئ الاطلسي يراوح من ٣ امتار الى ١٣ مترًا || اما نشاط العياجة وارتفاع مياهها فانه منوط بمدار الشمس وبمناخ القمر الذي يترصد الجاذبية .

١٩٤٠٢ - عَيْبَاكِي

نعت تعمرفي يطلق على الدورة الكاملة التي تقوم بها الكواكب بالنسبة الى الشمس . فالدورة القمر السابعية تستمر ٢٩ يوماً و١٣ ساعة وهي أطول من الدورة الفلكية .

١٩٤٠٣ - عَيْبَار

هو مقدار العنصر الحر الصرف الذي تحويه مادة معينة . تفرك مثلاً سبترتو حيار ٨٥ مئاة ان هذه المادة تحوي ٨٥ ٪ من الكحول || وهو أيضاً مقدار المعدن الثمين من ذهب او فضة الذي يوجد في العملة المسكوكة او الخلل . ومن هذا التمييز قولهم ذهب حيار ثمانية عشر ابي بالنسبة الى اربعة وعشرين من الذهب الخلل .

١٩٤٠٤ - عَيْبَاكَة خِلَابِيَة

Substitution alimentaire (F). *Allimentary substitution* (E).

العبارة الغذائية او عياضة الاغذية هي تبديل بعض الاكلات بنوعها بشرط ان تحوي الوحدات الغذائية نفسها .

١٩٤٠٥ - عَيْب

Vice (F). *Fault, Defect* (E).

النعيسة او الوصمة في الشيء .

١٩٤٠٦ - عَيْب رَاجِعْ أُنْد

Tendon failli, Nerf-ferrure (F). *عَيْب الوَكْر* || انتراب وتر الوظيف من العضلة في الجهة العليا الخلفية من الوظيف . وهو من عيوب الخيل .

١٩٤٠٨ - عَيْب يَبِيع الرَّد ، عَيْب مُبْطَل لَبِيع

Vice rédhibitoire (F). *Redhibitory defect* (E).

عيب غني يجعل المبيع غير قابل للاستهلاك او يحد من

طوله نحو ٢٢ سم . فوه الى الجوزة السرد ، انحر الريش ، اخفس القلوان والاباهر والكل || قوته الجنداب والملاء ، يكثر حيث يحل الجراد وقد يرافقه في رحاله .

١٩٣٩٣ - عُويَيات ، لُبُوث عُفِرِين

Myrmelconidae (S). *Myrmelconidae* (F). *Myrmelconidae* (E).

فصيلة حشرات من عصيات الجناس . اجناسها وانواعها عديدة ، قربها الانتشارية قصيرة متفيلة . انثاها تنجح مكبتها في التراب والربل وتنقث من حماض خضرة الجفة ، قوية التأثير ، كثيفة الحلب ، تنحفر في التربة ، حل بمرات لتلث ، حفرًا صغيرة قمية الشكل يسقط فيها النمل فتعمره .

١٩٣٩٤ - عُويَية هِي الحويان الرقي ، اطله .

١٩٣٩٥ - عُويَية

Gibberella (S). جنس فطور مجهرية من المناعيات وعلية المشطيات . اصنافها شائعة الانتشار اليوسني . قصها اسم اللوز يملو مراح ازرق || طويها البوي كلور الكن . يطها اطلبي مسطيل عديد الاوعية المتساوية للويرة في الانقسام المتعرج || انواعه عديدة منها اربعة مؤذية وهي ما يتبع .

١٩٣٩٦ - عُويَية التوت

Gibberella moricola, *Fusarium lateritium*, *F. utriculorum* (S).

فطر مجهرى يصيب اذنان التوت فيؤذيها . مظهره الخارجى يقع قرصية لا تليسه لونها الى البزرة السوداء تلو قشور الاذنان فتسبب ذبول الاوراق ثم يابسها ويابس التقصان والانتاد يد استمرار خشبها || يكافح بقطع الاغصان المبروبة فور ظهور المرض ثم تطهرها بأحد الفطاطير الفعالة المركزة على التماس .

١٩٣٩٧ - عُويَية الزرع

Gibberella zeae, *G. saubinetii*, *Fusarium graminearum*, *F. roseum*, *F. rostratum* (S).

فطر مجهرى يصيب ٣٦ نوعاً من البات تنتمي الى عدة فصائل . اغصنها الحنطة والشيطان والشعير . والارز والذرة . كما انه يركب جلور البطاطا واللوبيا ويصيب مشاتل البتونه ويؤذي الكتان والقنب والفجل والخيار والفلو . مظهره الخارجى مقيم يحل بالزروع والنباتات العائلة ليقوثر نموها او يموت وقد يسبب عدم الاسبال او الاسبال الفوضي اخلال من الحلب || اغصانه منطلة يمدى انتشاره المالك الى رطوبة التربة وعلامة العوامل الجوية || يكافح بتطهير البذار .

١٩٣٩٨ - عُويَية حَمَرَا

Gibberella moniliformis, *Ulsae Fujikuroi*, *Fusarium moniliforme* (S).

فطر مجهرى يركب عدة نباتات اغصنها قصب السكر والارز والذرة ولا يحد من الحنطة والشيطان والشعير . مظهره الخارجى على قصب السكر خطوط حر تلو القصبة عند طرفها يتمايلها يقع سمر توشم نصل حصف النواي فتخوي . وهو على الارز يقع حر تركب الساق في ايان عبا فتسبب نموها واسطالها غير الطبيعية ثم ذبولها قبل الاسبال او قبل الاثمار . وهو على الذرة يقع شخلة تركب الجذور فتسبب وتسب اصفرار الاوراق وقبحها || يكافح بتطهير البذار وباجناب الموانع الرطبة والازرة الكتية القوية الانعلاج .

استعماله فيجوز حيث الشاري فسح البيع ومطالبة البائع بالتعويض || والميراث التي يمتنعها القانون مبيعة فرد هي : القدام والنسعة وناج الحنبرة للزمن والقرعة والمرجع القديم المتوار والرماد للماريد واد الخنازير.

١٩٤٠٩ - عُيُونٌ * (F). Altonia (S). Altonia (F).

شجيرة بريقة وتزيينية من فصيلة السبديات . مهدا بنس مناطق افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعها في الجزائر في معظم اقتصاد البلاد المتصلة الحرارة || ساقها قصيرة فراء . اوراثها معتقة ، ضنية التجميع ، سنائية النصال الفسيحة . اعزادها بجيلة الشكل ، ليلكية اللون ، خاسية البيلات ، كثيرة الاسدية ، عادمة الروع .

١٩٤١٠ - عُيُتَام (F). Platane (F).

الصائم هو الدلب . واسدته عيشامة .

١٩٤١١ - عُيُتُون * (S). Clambus (S).

(F). Clamba (F). Clambus (E).

جنس حشرات من فصيلة الميثشيات ودية مخمدات الاجنحة . انواها المعروفة ستة منتشرة في بعض مناطق البلاد المتصلة الحرارة || اجسامها شديدة الصغر لا تتجاوز ١ م . رؤوسها كبيرة . عيونها صغيرة ، بارزة . قاذيرها وفكرها نظامية . قربتها الاستعمارية عيطية . كواسلها مستعرة . اعمادها لاحقة قوائمها شفيحة . انواها وحيدة اللون السوي وهي الى الشفحة او السمرة || تعيش على المواد النباتية الخضرية وفي الاخشاب الخشنة وفي الفروع والخلي .

١٩٤١٢ - عُيُتُونِيَّات * (S). Clambidae (S).

(F). Clambidae (E).

فصيلة حشرات من مخمدات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في جميع انحاء العالم || اجسامها شديدة الصغر ، لا تتجاوز ١ م . رؤوسها كبيرة . عيونها صغيرة ، بارزة . قاذيرها وفكرها نظامية . قربتها الاستعمارية سداسية الفصل . كواسلها قصيرة مستعرة . اعمادها لاحقة . ارفاغها وياحية المغل || تعيش في التدي والنباتي وفي الاخشاب الخشنة وفي الفروع والخلي وفي جميع المواد النباتية الخضرية || أشهر اجناسها الميثوث .

١٩٤١٣ - عُيُتُونُم اقليل الانثى وتدعى عيسوم .

١٩٤١٤ - عُيُتُجُون * Scardinus erythrophthalmus (S). Red-eye (F).

سمكة من الشبوطيات . تعيش في المياه العذبة لا فارق معدا بين البحيرة والنهر والجور . اقليمها البلاد الباردة والمتلة والحرارة || جسمها احليجي الشكل ، معتدل التبطيل ، يوصل من ٢٥ الى ٣٥ سم . سهقا مستديرا كبير . يوصا الى الخشبار الاترق المواجه يرق في الظهر ويضم في الجالين ويصغر الى الفقي في البطن . رأسها معتدل الحجم ، قصير الخلف ، صغير الشفق . عيناها مستديرتان ، صغرتان ، جيلتا الحمرة الترمزية || زعانفها ودية اللون حمراء المواجه ، الظهرية وحيدة مزوانية الشكل ، تملو مؤخر الظهر . الليلية فارقة || لحمها كامن الصنف ، قل من يرغب فيه .

١٩٤١٥ - عُيُدُ

العبد : شجر جبل ينبت عيداناً نحو الدراع اغبر لا ورق له ولا ثور ، كثير اللحاء والمقد يفسد بلماته الجرح الطري فيلثم (اللسان) .

١٩٤١٦ - عُيُدُكَان الحية Ophloxyloides (F).

سبط من فصيلة الدفليات . اشهر نباتات عود الحية .

١٩٤١٧ - عُيُدُكَانَكَة

هي كل شجرة سلية قديمة لها هروق نافذة الى الماء (اللسان) .

١٩٤١٨ - عُيُدُكُص عُيُدُكُف * Idus vulgaris (S).

(F). Ide commun (F).

سمكة نهريه يروض من مفتوحات اللانة وفصيلة الشبوطيات . اصطنها معظم النهر ومجيرات الشرق الاذلي واروية || جسمها احليجي الشكل ، يطول نحو ٣٠ سم . رأسها معتدل الحجم ، مخروطي الشكل ، قصير الخلف ، صغير الشفق . نوما الى الركة السمر السمر المواجه تشد سمرته في الظهر وتنف في البطن . زعانفها معتدل الاحجام ، الظهرية واحدة شبه هرية الشكل . الليلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٩٤١٩ - عُيُدُشُون * ، عُيُدُشُونُك * Iguana (S). Iguane (F). Iguana (E).

جنس حيوانات زسافة من فصيلة الميثشيات . انواها المعروفة اثنان يتيزان بذكر الجلة واصطنها التي تراوح بين ١٢٠ و ٢٠٠ سم . امتانها وبيج ظهورها معتقلة مختار من الهلب ضروري التركيب ، مشطي الشكل ، أسود اللون . انواها الى الزقة الغفراء يملوا توشم ويحيط وتبيع تراوح انواها من الصغرة الى السواد || وما من الحيوانات الخالصة الحاشرة التي تائف غيفاف الانهر ومجاري الماء . تعيش على الحجار . لحمها مأكولة ويربها كذلك .

١٩٤٢٠ - عُيُدُشُونِيَّات * Iguanidae (S).

(F). Iguanidae (E).

فصيلة حيوانات زسافة من ربة الظليات السليمات الالسة ، الربليات القوائم ، السطليات الازنان . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اصطنها البلاد الحارة . أشهر اجناسها الميثشون .

١٩٤٢١ - عُيُدُكَكَة Isogamy (F). hogamy (E).

العبدلة اجدى طرائق الانسال الشقي ؛ تتميز حدافياً بمساواة النمامات الروائية للذكورية والانثوية .

١٩٤٢٢ - عُيُدُكُم هو اللاذن الاكبري ، اطلبه .

١٩٤٢٣ - عُيُور هو الضلع ، اطلبها .

١٩٤٢٤ - عُيُور ، حمار الشبي Baudet (F). Ass (E).

هو الحمار اللعل للمتعب الصالح لثزو على الحجير واللاتان . ج امبار ومبار ويصور ويصور .

١٩٤٢٥ - عُيُور

العير : الايل . وقال ابو الهيثم : العير كل ما انتير عليه من الايل والحسير والبدل فهو عير .



عيتون



ميجوس



عيس بدول



عبدشون

cile (F). Jerusalem sage (E). Jerusalemssalbei (D).
Salvia arborea, S. di Gerusalemme, Salvione (I).
بجلة مريوية معمرة تملو من ٧٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها
خشيشية. فروصها فرقة متباعدة كثيفة الزغب القطعي
الشكل واللون. أوراقها احليجية النصل و خلية البشرة
ازهارها الى البياض الاخير. قناباتها مزينة بدماء اللون.
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. يقال انها من
النباتات الطبية النافعة.

19435 - عَيْرَازَةُ مُدْهَبَةٌ *Phlomis aurea* (S).
Phlomis dorée (F).
بجلة مريوية معمرة مزينة بكثيفة الخصل الاصفر. تملو من
٧٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها سنانية الشكل مقطوعة الطرف.
ازهارها الى الصفار المذهب الموجع || ازهارها يستمر
طوال فصل الصيف.

19436 - عَيْسِي *Dromadaires blanchâtres* (F).
Whitish dromedaries (E).
البس : الابل البياض يخالط بياضها شي من الشقرة.
واحد احمس والاثنى عيساء.

19437 - عَيْسَاء *Sauterelle femelle* (F).
العَيْسَاء : الجرادة الاثني.

19438 - عَيْسِرَكان *Arctostaphylos* (S).
Busserole, Bousserole (F).
جنس نباتات جنينة معمرة من فصيلة الخلتنيات. انواعه
عديدة جميعها بري. ساقها خفيفة بجلة مدادة. فروصها
متنصبة. أوراقها كاملة صغيرة لثة معتقة مقطوعة القاعدة
مسنة النصل. ازهارها حقنوية التجميع. ثمارها سنينة
الشكل حراء اللون او مرهه || اشهر انواعه عيسران
عنب اللب او عنب اللب.

19439 - عَيْسِرَكان عَيْسَبُ الدَّب * و عَيْسَبُ الدَّب *
Arctostaphylos uva-ursi (S). *Busserole raisin*
d'ours, Raisin d'ours, Bousserade (F). *Bear-berry,*
Bear's grape, Uva-Ursi (E). *Gemeine Bärentraube*
(D). *Uva ursina, Eva ursina, Orsella* (I).

نوع من البسران ساقه مدادة. فروصها تملو نحو ٣٠ سم.
أوراقها كاملة ايده. نصلها جامد الصلابة مائل البشرة.
ازهارها وردية اللون. صقودها الزهري يغم من ٥ الى
١٢ زهرة. ثمارها سنينة حراء اللون يقال ان الدينة تاكلها.

19440 - عَيْسِكَلان *هو الاشثيل النجي*، اطلبه.

19441 - عَيْسُوسُ زُباعِيّ البَيْعِ *

Allonyx quadrimaculatus (S). *Allonyx* (F).
macules (F). *Allonyx quadrimaculatus* (E).
حشرة وائمة قاصصة من فصيلة الزونحات وردية ممدعات
الاجنحة. موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض
المتوسط. خنافسها تعيش على رقيق اوراق النباتات الطرية
التي تكثر في غابات الصنوبر واخرجه. يرقاقها مقرنة
تغطي على اسديع الحشرات الخاشية التي تركب الصنوبر ||
جسمها صغير لثة يطول من ٤ الى ٦ سم. لونها اسود
اقراسي واليخض والظلمة والاحمر الكليل. ظهورها ثنائي
التبقيع الفسدي الابيض. زباناها صولجياتان. حينها
بارزتان. ارساغها خاسية القتل. || الاثني امير قدأ من
الذكر وابنت ثوبها منه واقصر زبانا لها جبل واحد

19426 - عَيْرُ السَّراةِ

طائر كويكة الحماة قصر الرجلين مسوطا اصغر المتقار
اكمل البينين صالي اللون الى الخضرة اصفر البطن وما
تحت جناحيه وباطن ذنبه كانه يرد وشي. يزعمون انه
ياكل النمل والعشب. ج مبرور السراة (السان).

19427 - عَيْرُ قَبِيان *هو سار قيان*، اطلبه.

19428 - عَيْرَون * *Irena* (E). *Irena* (F).
جنس طير من الجوارح سنات للتاثير وفصيلة الذكرويات
انواعه المعروفة ثلاثة اعطائها تمتد من الهند الى ماليزية
والفلبين. تألف الادغال والبراري. قوتها الحشرات
والدويبات من المتاكب الى المقارب والوزغ والعظاء
الصغيرة || اجسامها ريمية تطول من ١٨ الى ٢٢ سم.
متنقدها خفيفة. اجنتها معتلة الطول و ذلقة الاطراف.
اذنابها مقلوبة. انثواها تراوح من الرمكة السوداء الى السوداء
القاسم || تدفن اعشاشها في الاشجار المائية عند انتساب
الافضان او الاقصاد. انثاها تحضن نحو اربع بيضات
على مرتين في الحول. الذكر قرين لها الحاية والنفاد.

19429 - عَيْرَازَةُ ، فُلُومِيس *Phlomis* (S).
Phlomis (F).

جنس نباتات برية وريزينة من فصيلة الشفويات. انواعه
عديدة جميعها احشاب وجنيات. منها تالم البحر المتوسط.
أوراقها صالحة لاطنة. ازهارها مختلفة الالوان لها الابيض
والاخر والوردي والاصفر || اعرف انواعها واشهرها مائي.

19430 - عَيْرَازَةُ الخُصَل *Phlomis agraria* (S).
Phlomis des champs (F).

بجلة معمرة مزينة تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. أوراقها بيضية
الشكل و قلبية القاعدة. ازهارها ضمية متباعدة كالتنقيد.
عشبات تملو نحو حشر زهرات بنفسجية اللون. قناباتها
وفصل كرويه غرضية الشكل || ازهارها يستمر من
حزيران الى آب.

19431 - عَيْرَازَةُ سَامِيَة *Phlomis samia, Phlomis superba* (S). *Phlomis de*
Samos, Ph. superba (F).

بجلة تريزينة معمرة تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم. أوراقها
بيضية الشكل و قلبية القاعدة. نصلها مائل البشرة
خلى الصلابة السفل. ازهارها سنولية التجميع متباعدة
الرصف. ثيو صفراء اللون ثم تتحول الى الحمر.
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

19432 - عَيْرَازَةُ عَسْكَلِيَة *Phlomis tuberosa* (S). *Phlomis tubéreuse* (F).

بجلة مريوية تريزينة معمرة تملو من ١٠٠ الى ١٧٠ سم.
جذورها صقلية كروية الشكل. أوراقها قلبية النصل.
عشودها الزهري يطول من ٦٠ الى ٨٠ سم. ساقها الزهرية
عديدة و الواحدة منها تجمع من ٢٠ الى ٤٠ زهرة و لونها
الى الحمر || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

19433 - عَيْرَازَةُ لَرَجَة *هي الاذية*، اطلبها.

19434 - عَيْرَازَةُ مُحْشَوْنِيَة ، فُلُومِيس

Phlomis fruticosa (S). *Phlomis sous-ligneuse, Ph.*
de Palestine, Saugé en arbre, Bouillon blanc de Si-



عيرن



عيسران عنب اللب



عيسوس زباعي البيع

اجناسها وانواعها عديدة تكثر في البلاد الحارة والاستوائية.
جميعها قاذفة . احراف انواعها واشهرها العيفس .

١٩٤٨ - عَيْشُومَان * عود اجتر ، أرميريا

Armeria (S). Arméria, Armérie (F). Thrift, Pink (E).

Granelio (D). Armeria (I).

جنس نباتات عشبية مسمرة برية طيبة وزراعية تزيينية
من فصيلة الارصاسيات . انواعها عديدة سطوها شمراخية
تحمل الازهار تملو من ١٠ الى ٦٠ سم . اوراقها صفيحة
الشكل ، غنخلة الاجسام وعند السروق . ازهارها كثيرة
الالوان فيها الالبيض والوردي والبيجي والاحمر والازرقواني
والجويدي || ازهاره يستمر من الشهرين الى الاربعة
شهور .



عصم ثلاثي البقع

١٩٤٩ - عَيْشُومَان * عَيْشُوم

Taux

وقد يأتي بحماني غنخلة اخضها السمر والمعدل .

١٩٥٠ - عَيْشُومَان * عَيْشُوم

Rivage (F). Bank, Side (E).

العَيْشُومَان : ساحل البحر والشط والشاطئ . وصفة النهر
تدعى عيقة . ج عيقات .



عيس

١٩٥١ - عَيْشُومَان * عَيْشُوم

هي الركمة أي ساحة المزروعة او المزروبة وكل فناء من
الارض احتشيزت بجوانبه الاربية .

١٩٥٢ - عَيْشُومَان * عَيْشُوم

نبات كالبرقيع له سفة كسفة الفناء (اللسان) .

١٩٥٣ - عَيْشُومَان * عَيْشُومَان

Spermatophore (F). Spermatophore (E).

ج عياكم . البكمية حق صغير انتد لئلاسي الشكل قدر
قدر بزة الفيل او بزة للكان يلفق ولينة من الشلج
عند ذكور بعض الحيوانات الزحافة والقزابة والعديات
الرئوية والراسيات الاربلن الخ ...



ميفقان

١٩٥٤ - عَيْشُومَان * عَيْشُومَان

جنس دوبييات بحرية من القشريات عشاريات الاربل
قصريرات اللبيل وفصيلة القصوصيات . انواعها المروقة قليلة
العدد اعطائها بحار البلاد الحارة والمنتلة الحارة || اجسامها
صغيرة ، نصف كروية الشكل ، مخدبة الظهر ، منبسطة
البطن ، مفرقة المقدم والمقب ، مخرجة الانعام ، سادة
التأثير ، قوائمها دقيقة مستطيلة باستثناء الزوج الاسامي
المستفخم ، الكبير للاطراف المستنة للفتار الداخلية ||
اقوامها عديدة تكثر فيها الجلوة والجلوة البفسجية والسمره
الحديدية المراح .

١٩٥٥ - عَيْشُومَان * عَيْشُومَان

Hyène (mâle) (F).

Hyena (male) (E).

الصقح الذكر .



علاء

١٩٥٦ - عَيْشُومَان * عَيْشُومَان

العيلم اسم الضفدع والبر الكثرة للماء او للملحة . ج عيال .

١٩٥٧ - عَيْشُومَان * عَيْشُومَان

هي عضو البحر في الحيوان . تتكون من المقلة والجفون
والجهاز الدموي والاصحاب البصرية .

Cell (F). Eye (E).

في الحول . تظهر الحشرة الجملة في اوائل شهر ايار
وتبقى حتى اواخر حزيران . تسرح في البهار وتبيت في
الليل || البرقة التي تبلغ الكمال الجسدي بعد ستة اشهر
تتحول الى حورية في اوائل شهر نيسان . جسمها عند تمام
ادراكها يطول من ٧ الى ٩ م . وهو مردني الشكل ،
مستطيل المقدم والراس ، مستدق الطرف للذق ، سداسي
الرواجب ، ضليح التأثير ، اسمر اللون ، اسود الرأس .

١٩٤٢ - عَيْشُومَان * عَيْشُومَان

Phellodendron (S).

Phellodendria (F).

جنس اشجار برية وتزيينية من فصيلة السذابيات . انواعها
قليلة ، احيائها مرسحة ، تملو من ١٠ الى ١٥ م . اوراقها
متشابهة مركبة ريشية حاملة . ازهارها حشركية التجميع ،
طرنج الارتنكار . ازهارها صغيرة للقد عطرية العرف عديدة
الفصل والبلورات والاسدية .

١٩٤٣ - عَيْشُومَان * عَيْشُومَان

Broussailles (F).

Bushes, Brushwood (E).

المرج والنباتات الغلة الشائكة التي تمشي بين الاشجار
الحرجية .

١٩٤٤ - عَيْشُومَان * عَيْشُومَان

Macroslagon tricuspidata (S). Macroslagon

tricuspidate (F). Macroslagon tricuspidata (E).

حشرة واشمة شافرة من فصيلة الزناليات ورتية مبدلت
الاجنحة . تألف جمع الاماكن التي تكثر فيها الازهار
والزناوير والشفاوير . تختافها تمشي على ازهار الصيوانيات
والشفاويرات . يرقاها تمشي على جذ الزناوير من النسوة
الى الشهور والهدور || جسمها صغير القند ، يطول من
٧ الى ١٠ م . قوامها متعادل الاوران وسها وكويلها
ويطها الى الحشرة الناجية . صدرها الى السرة السوداء .
وعندما الى الحشرة الصنابية يطولها ثلاث بقع سود . وسها
صغير الجرم زائفا خطيان . عيناها صغيرتان . غنخاها
مقلقان ، وريشها شفافان ، بارزان تحت الظهران || لها
جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في اواخر
ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في البهار . تصافد
في اوائل تموز . الانثى تهريق الممكن مبياديا قرب عشاوات
الزناوير على النبات والحجارة والترية || البرقة عند الادراك
التام تطول نحو ١٦ م . جسمها بسيط الشكل ، سداسي
الرواجب ، ضليح التأثير الفكية ، حشكي اللون ، اسمر
الرأس والرواجب والشرج || طول الاكمال الذي يستمر
نحو ٣٥ يوما ينتهي في البرقة تحت الجملة .

١٩٤٥ - عَيْشُومَان * عَيْشُومَان

Lisse (F). Smooth (E).

الشجر البعلل ما كانت لحاء سوهه واغصانه مرسحة ناعمة
البشرة .

١٩٤٦ - عَيْشُومَان * عَيْشُومَان

Belostoma (S).

Belostoma (F).

جنس حشرات قازبة من فصيلة العيفيسيات . انواعها العفيرة
قلية اعطائها البلاد الاستوائية . تعيش في مناقها وانواعها .
جميعها مفرقة كبيرة القد طويلا يراوح بين ٦ و ٨ سم .
قوامها الحيوانات الدنيا والحشرات المائية . لسها مؤخر عثيف .

١٩٤٧ - عَيْشُومَان * عَيْشُومَان

Belostomatidae (S).

Belostomatidae (F). Belostomatidae (E).

فصيلة حشرات قازبة من نصفيات الاجنحة الخنلفة .

١٩٤٧٨ - عَيْنَة ، عَيْنِيَّة ، سَطْرَة

Echantillon (F). Sample (E).

Rhynopomes (S).

Rhynopome (F).

جنس خفافيش من حارة الرمات. انواعه قليلة جميعها صغيرة القد. أوربا من الريادي الاطلال الى الكستاني الاسمر. رؤسها صغيرة. اذناها كبيرة. فرائسها ذلقة. زوائدها ناعمة اسطوانية متراكبة. اذناها مضطربة دقيقة. ملوحتها فسح الارباع يمتد من الرقبة الشالية الى الشرة وحوض البحر الاحمر وسينديب والهند. يكثر ويوجد في وادي النيل. تمش منفردة او جماعات متوسطة العدد. تسرح في الليل. قوتها الحشرات على اختلافها. تألف الكهوف والمغاور وراقب الصخور وتجاوذاً لا تجار.

١٩٤٨٠ - عَيْنُون (F). Globularia (S).

جنس نباتات برية وتربينية معمرة من فصيلة المينويات. انواعه المعروفة ١٢ فيها الاشباب والجنبايات الليفية المحشوشة. اوراقها بسيطة. للقرصية منها ضمة التجميع والشراعية متعاقبة. انماها رؤسية كروية الشكل قريبة الشبه من اثمار المركبات. لونها الى الزرقاء زهره وتفتح حسب الانواع. وهو من النباتات التي ترعب في الاراضي الصخرية وتجود في الارربة الكلسية.

١٩٤٨١ - عَيْنُون حَيْطِيّ الزَهْر

Globularia trichosantha (S). Globulaire à fleurs filiformes (F).

نوع من المينون وهو حشيشة برية وتربينية معمرة تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها القرصية اطليجية الشكل. وحيده الشمل. ثلاثية الاثبات. اوراقها الشراعية سنائية النصل متعاقبة. ازهارها. كبيرة القد مستعرضة البلات الحيطية التخصيص.

١٩٤٨٢ - عَيْنُون حَظَر

Globularia alypum (S). Globulaire alype, Alype, Herbe terrible, Séné sauvage (F). Globulaire, Alype globe daisy (E). Strauchartige Kugelblume (D). Globularia alypum, Erbsen terribile (I).

نوع من المينون وهو عجلة دخلية معمرة تملو نحو ٦٠ سم. اوراقها ابيدة و متعاقبة و ملقية الشكل. جامدة النصل. رؤسها الزهرية لاطنة. حطرية الطرف المستحب. وهو من النباتات الطبية المديدة المنافع يوجد بين الصخور وفي المراتل القاحلة وعلى جوانب الاسراع واطراف الغابات.

١٩٤٨٣ - عَيْنُون حَيْطِيّ (S). Globularia nudicaulis (F).

Globulaire à hampe nue (F). نوع من المينون وهو حشيشة جبلية. معمرة. برية وتربينية تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها قرصية. ضمة التجميع. كبيرة القد. مقطوعة القاعدة. حادة التنوين. شراشها حيطي اللحاء. رؤسها الزهرية كبيرة القد. قطرها يراوح بين ٢ و ٣ سم.

١٩٤٨٤ - عَيْنُون قَلْبِيّ الْوَرَق

Globularia cordifolia (S). Globulaire à feuilles en cœur (F).

نوع من المينون وهو حشيشة جبلية معمرة برية وتربينية تملو نحو ١٥ سم. اوراقها قرصية. ضمة التجميع. قليلة الشكل. ثلاثية التنوين اللزقي. شراشها حادم الاوراق. ازغب اللحاء. رؤسها الزهرية كثيرة العدد. صغيرة القد. قطرها نحو ١ سم.

١٩٤٨٨ - عَيْن ، عَيْنُوع ، عَيْنُوع

Source (F). Spring (E).

مياه تخرج من جوف الارض وتساب على سطحها.

١٩٤٨٩ - عَيْن

« الحافس من كل شيء » وقد شاع استعمال لفظة عين دلالة على الاموال الثابتة فقط.

١٩٤٩٠ - عَيْن (F). Wild oxen (E). Boufs sauvages

العين. بقر الوحش.

١٩٤٩١ - عَيْنُ الْأَكِيَّة

Stipulaire (œil)

زعمة ثانوية تظهر في أبط الاذنة.

١٩٤٩٢ - عَيْنُ الْإِفْكَة

Bourtilon

نمعة في اسفل سرح الكرة تفتح وتغلق اذا جدد.

١٩٤٩٣ - عَيْنُ الْبَرِّ

Schaenus (S).

Choin (F). Bog-rush (E). Koptied (D). Sceno (I).

جنس نباتات حشيشية برية معمرة من فصيلة السعديات. انواعه عديدة مظهرها متغير وبمضها ينبت في الاراضي الرطبة. اوراقها صغيفة الشكل جامدة النصل تشبه اوراق الاسل.

١٩٤٩٥ - عَيْنُ التَّدْوُج

هو الادونيس الحرجي. اطله.

١٩٤٩٦ - عَيْنُ الثَّوَر

هو اثمار السباغين. اطله.

١٩٤٩٧ - عَيْنُ الثَّوَر

عين الثور نجم يتر من كوكبة برج ثور.

١٩٤٩٨ - عَيْنُ الْحَجَل

هو الادونيس الصبي. اطله.

١٩٤٩٩ - عَيْنُ الدَّلِيك

هو الدشم. اطله.

١٩٥٠٠ - عَيْنُ الشَّمْس

هو حبال الشمس. اطله.

١٩٥٠١ - عَيْنُ الطَّائُوس

هو البجربة. اطله.

١٩٥٠٢ - عَيْنُ الدُّرُوب

هو الدفيس لبات من المفديات. اطله.

١٩٥٠٣ - عَيْنُ الْقَطْ

هو الاثوان الاسفر. اطله.

١٩٥٠٤ - عَيْنُ الْهَدَّاد

هو اذان الفأر. اطله.

١٩٥٠٥ - عَيْنُ الْهَرِّ

Opale, Œil de chat (F).

Opal (E).

حجر كريم كثير الالوان. ويعد أيضاً حجر لبي.

١٩٥٠٦ - عَيْنُ مَحْشُوسَة

Corps certain (F).

Certain matter (E).

هي مادة الشيء التي تلمس وترى.

١٩٥٠٧ - عَيْنُ هَرَكَة

Œil composé (F).

Compound eye (E).



مينون

جنبي خشيب. جميعها ثريينية وأكثرها يستعمل لاستخراج السطر. سطرا دهن اصفر اللون ، فروع البرق الاخاذ يدخل في صناعة مطعم الطيور || أشهر أنواعه الرئيسية التي تحدث منها جع الفصرب المعروفة وبأ استجد من اسرام ، هي ما يتبع .



عين مبدول

١٩٤٩٥ - عَيْهُونُ الْمِطْرَ ، عَيْهُونُ لَتَلَتِي .

Pelargonium capitatum (S). *Pelargonium rosat*. *Geranium rosat* (F).

عشبة معمرة زباد اللحماء . ساقها فراء منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم . اوراتها مفصصة ومفرقة . تصلها هلي البشرة ، وردي الرائحة متد اللس . ازهارها نورية التجميع ، صفيرة اللند ، وردية اللون ، ارجوانية التجميع ، فواحة الرائحة للسطرية || ازهارها ربيعي . زراعتها صناعية يستخرج من ورقها وازهارها عطر الورد .

١٩٤٩٦ - عَيْهُونُ إِهْلِيْجِي الْوَرَق

Pelargonium oblongatum (S). *Pelargonium à feuilles oblongues* (F).

عشبة نجيمة معمرة صقولية الجنبنة ، حاملة لساق ، عديدة الفروع تملو نحو ٣٠ سم . اوراتها اعليجية الشكل ، ذرية الازم الاخير || ازهارها ال البيضاء الاصفر يعلو تريق احمر || ازهارها صيفي .

١٩٤٩٧ - عَيْهُونُ بَهِيْ

Pelargonium fulgidum (S). *Pelargonium declatant* (F).

عشبة معمرة صقولية الجنبنة ، ساقها غليظة لامية اسطوانية زباد اللحماء تملو نحو ٧٥ سم . اوراتها مفرفة ، خلية البشرة اللقصية المواج . ازهارها نورية التجميع مستعرضة البتلات العادة التفريش والتدرج ، الارجوانية اللون . ازهارها يستمر طوال الصيف .



عيون التجليات (١)

١٩٤٩٨ - عَيْهُونُ ثَلَاثِي الْوَرَق

Pelargonium bicolor (S). *Pelargonium bicolor* (F).

عشبة معمرة صقولية الجنبنة تملو نحو ٤٥ سم . اوراتها مفرفة ، غرولية ، مسنة . ازهارها عادة الورد السطري ثنائية اللون البنفسجي والاسمر الكسبي || ازهارها يستمر طوال شهر تموز .

١٩٤٩٩ - عَيْهُونُ جَعْدِيْ

Pelargonium crispum (S). *Pelargonium crépu* (F).

عشبة معمرة زباد اللحماء . ساقها فراء منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم . اوراتها مفصصة متعوجة . تصلها غشور اللس فواح الرائحة التجمانية . ازهارها مسطلية الاذن والبتلات النورية اللون ، الارجوانية التجميع || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .



عيون التجليات (٢)

١٩٥٠٠ - عَيْهُونُ حَدَب

Pelargonium gibbosum (S). *Pelargonium gibbeux* (F).

عشبة معمرة صقولية الجنبنة تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها وفروها غليظة الخند . اوراتها بحرية اللون ، مفصصة ، غرولية القصوص . ازهارها ال الصفرة الخضراء المواج السوية اللون || ازهارها يستمر طوال شهر تشرين الاول .

١٩٥٠١ - عَيْهُونُ سِنْدِيَا نِي الْوَرَق

Pelargonium quercifolium (S). *Pelargonium à feuilles de chêne* (F).

عشبة معمرة ذكية البرق . ساقها فراء منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم . اوراتها سنطانية الشكل متعوجة الاطراف .

١٩٤٩٥ - عَيْهُونُ مَبْدُول *

Globularia vulgaris (S). *Globularia commune*, *G. vulgaris*, *Marguerite bleue* (F). *Blue daisy*, *Globe daisy* (E). *Kalk-Kugelblume*, *Blaue Kugelblume* (D). *Margherita azzurra*, *Vedovella turchina*, *Morine* (I).

نوع من البتزين وهو عشبة برية معمرة تملو نحو ٤٥ سم . اوراتها الرميصة خماسية البرق ، لا قياسية التدرج . اوراتها الشراخية سائبة الفصل ، عابكة الخمار . ازهارها متوسطة القد ، كثيرة المد ، مشرة البتلات المفصصة . وهو نبات متعلمه الماشية فيبيدها ولا يخلو من بعض الخواص الطبية التي تنفع الصدر والم .

١٩٤٩٦ - عَيْهُونِيَّات

Globulariaceae (S). *Globulariaceae* (E).

فصيلة نباتية من فوات الثلثتين متصلة العائلات مرتفعة الميض .

١٩٤٩٧ - عَيْهِي ، طَيِّق

Identique (F). *Identical* (E).

Specimen (F). *Specimen* (E).

١٩٤٩٨ - عَيْهِيَّة ، تَمَدُّج

Gorilla (F). *Gorilla* (E).

هو ذكر النورلا اي الغول ، ج حيايمر .

١٩٤٩٩ - عَيْهِي

Chocard des Alpes (F).

العيق م . عيقة هو زمتم الجرد ، طائر من الغربان ، اطلبه .

١٩٤٩٩ - عَيْهَم

Eau douce (F). *Fresh water*, *Soft water* (E).

يقال لعين المذبة من عَيْهَم ويقال لعين الماخلة من زَيْشَم || والمعجم هو الفيل الذكر .

١٩٤٩٩ - عَيْهَم

جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات كثير بويضة مهدبة تبتدئ رنية يشاء اللون ثم تجمد وتضفر وتضفر على الخمرة التارية . اهدابها اصاسها . يرفها غيظي شفاف لا يخلو من بعض النقط السمية للراقة . ازهاره قليلة منها نزع واحد شار يلى عيوم التجليات .

١٩٤٩٩ - عَيْهَمُ التَجْلِيَّاتِ ٥٠ ، مَفْرَلُ التَجْلِيَّاتِ

Epichloë typhina, *Sphacelata typhina* (S). *Quenouille des graminées* (F). *Cattail fungus of grasses* (E). *Erstickungs-schimmel der Gräser* (D).

فطر مجهرى يركب بعض التجليات البرية والعلفية فيؤذيها . مظهره الخالجي غلاف ابيض اللون ثم يرتقال . يمتد كاللغمد من البصرة الى انتشار نمل المصفة . يظهر في حزيران ويبتدئ خليا رنيا ثم يكتف ويصلب فيسب ذبول المصفة ويمرل نحو الساك والازهار || وبهم من قال انه يؤذي الحيل والابقار التي تأكله مع الملف المصاب به .

١٩٤٩٩ - عَيْهُون

Pelargonium (S). *Pelargonium*, *Pelargonier* (F). *Pelargonium* (E).

جنس نباتات عطرية معمرة من فصيلة النورتيات . انواعه نحو ١٥٠ وضروبه زهاء ٥٠٠ معظمها لُين وبعضها

نصلها خلى البشرة، طري العرف الاخاذ المستحب .
انزاعها صيرانية التجميع ، صغيرة اللند ، متساوية البتلات
الوردية اللون || انزاعها يستمر من الصيف الى الخريف .

١٩٥٠٨ - عَيْنٌ قَدْ قَدْ قَدْ

Pelargonium tomentosum (S). *Pelargonium tomentosum* (F).

عشبة معمرة زباء اللحاء . ساقها فروعاً منتصبه ، تملو نحو
١٠٠ سم . اوراقها حلوة . نمتية العرف ، مستديرة الشكل ،
متسببة ، مبهمة التفصيص . نصلها خلى البشرة وهو ابيض
الحمل الكثيف المستطيل . انزاعها الى البياض الاكبر
يملو تديج وسلي قافى الحمرة || انزاعها يستمر من
نيسان الى حزيران .

١٩٥٠٩ - عَيْنٌ

التيق ويدعى رقيب الشربة نيم من كوكبة عسك الاعة .
مركزه على المكتب الايسر . يتبر من نجوم البعبه الاول
يحد من الارض نحو ٤٥ سنة ضوئية .

Hydrophasianus chirurgus (S). *Hydrophasianus de China, Chirurgian, Pana* (F).

طائي وحيد الجنس والنوع من طول الساق وفصيلة التفلقيات
اعطانه تمتد من الهند الى الصين ويتر الزايج سرديب .
يألف صفات البهرات والاحوار والمنافع . قوته الزغويات
والبلحيط || جسمه كبير اللند يطلو نحو ٥٠ سم . عند
الذكر نحو ٥٥ سم . عند الانثى . رأسه ويقدم عنقه وأعلى
جوشه الى البياض الناصع . مؤخر عنقه الى البياض
الاصفر يفصله عن بياض المقدم خط اسود . ظهره وذنيه
الى السمرة الزرقاء المايقة يطلو موج ارجواني . جرشه
الى السمرة السوداء . جناحاه الى البياض المايقي باستثناء
القوائم السود . حلقه حيه متعطف . منقاده اوراق
الانتشاب ، اخضر الملقط . رسافه الى الخضار البشري ||
يذئن عنه في محافل الارز او حل اوراق النيلوفر وبغيرها
من الاوراق التي تملو سطح الماء . الانثى تضع من ٣
الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

Ochne (F). *١٩٥١١ - عَيْنٌ التَّسْمِر*

هو الحزبيل ، اطلبه .

١٩٥١٢ - عَيْنٌ لَوْرِيَّةٌ ، عَيْنٌ عَرَضِيَّةٌ

Sous-yeux (F). *Sub-eyes* (E).
زيمات تنمو حول الزيمة الاصليه خلفها اذا تلتفت .

Ommatidia (F). *١٩٥١٣ - عَيْنِيَّةٌ*
Ommatidium (E).

العينية ، عند المفصليات ، هي العين الصغيرة البسيطة
التي تتألف من مجموعها العين المركبة .

انزاعها وردية اللون جميلة وبديعة بالاحر || انزاعها
يستمر طوال فصل الصيف .

١٩٥٠٢ - عَيْنٌ عَشِيَّةٌ

Pelargonium peltatum (S). *Pelargonium herra* (F).
عشبة معمرة لينة الساق البارزة المشقة . فروعها مفصلة
متدلية تطلو نحو ١٠٠ سم . اوراقها خماسية التفصيص ،
خالية البشرة . انزاعها كبيرة اللند يفضاه اللون او حمراء .
انزاعها يستمر من الربيع الى الخريف .

١٩٥٠٣ - عَيْنٌ كَبِيرُ الزَّهَرِ

Pelargonium grandiflorum (S). *Pelargonium à grandes fleurs* (F).

عشبة معمرة مزينة اللحاء . ساقها منتصبه ، لينة ،
عشوية ، جامدة ، تملو نحو ٤٠ سم . اوراقها قلبية او
كلوية الشكل ، خلية البشرة ، بحرية اللون . انزاعها
كبيرة اللند ، قطرها يراوح من ٧ الى ٨ سم . لونها الى
البياض المجلج بالاحر والبشجي || انزاعها يستمر
طوال فصل الصيف .

١٩٥٠٤ - عَيْنٌ مَجْدَعٌ

Pelargonium cordatum (S). *Pelargonium cordé* (F).
عشبة معمرة زباء اللحاء . ساقها فروعاً منتصبه ، تملو نحو
٧٥ سم . اوراقها حادة العرف ، قلبية الشكل ، مسنة
الحافة . نصلها انقب البشرة ، اطحل اللون . انزاعها
كبيرة اللند ، وردية اللون المجلج بالاحر || انزاعها
يستمر طوال فصل الصيف .

١٩٥٠٥ - عَيْنٌ مَحْطَطٌ

Pelargonium zonale (S). *Pelargonium zoné* (F).
عشبة معمرة مزينة اللحاء . ساقها منتصبه ، لينة ، جامدة ،
تملو نحو ١٠٠ سم . اوراقها سطحية التفصيص . نضوية
السط الاسمر الكسبي . انزاعها لوروية التجميع ، ضيقة
البتلات المستطيلة ، لونها يراوح من البياض الى الارجواني
والقرنيزي || انزاعها يستمر من الربيع الى الخريف .

١٩٥٠٦ - عَيْنٌ مَشْرُومُ البَتَلَاتِ

Pelargonium schizopetalum (S). *Pelargonium à pétales déchiétés* (F).

عشبة معمرة صقولية الجمثة . ساقها لحية غليظة تملو
من ٣٥ الى ٥٥ سم . اوراقها مفصصة وشرة التصل .
انزاعها مستطيلة الاذن ، مسترفة البتلات المشروعة .
الصفراء اللون ، الحافة بالاحر || انزاعها يستمر طوال
فصل الصيف .

١٩٥٠٧ - عَيْنٌ مَعْطَرٌ

Pelargonium odoratissimum (S). *Pelargonium très odorant* (F).

عشبة معمرة سرحة . ساقها فروعاً منتصبه ، تملو نحو
٥٠ سم . اوراقها مستديرة ، شبه قلبية ، مبهمة التفصيص .



عين عشق




عين كبير الزهر



عين محطط



عيق



غاب البحر



غادس

١٩٥١٩ - غادُس أسْمَر (S). Gadus aeglefinus (S).

Egle fin, Morue noire (F).
نوع من الغادس المتوسط القد . طوله يراوح بين ٤٠ و ٧٥ سم. اصطناعه شطوط بحار العالم القديم وهو لا يتعدى المياه الاقليمية لانه يعيش على اعماق تراوح بين ٢٠٠ و ٥٠٠ م.

١٩٥٢٠ - غادُس اصْحَل (S). Gadus luscus (S).

Gede tacaud, Baraud, Godde, Mollet (F).
نوع من الغادس المتوسط القد . طوله يراوح بين ٢٠ و ٥٠ سم. يتكثّر في البحر المتوسط . سره كبير البند . يألف المياه الاقليمية التي يراوح عمقها بين ١٠٠ و ٣٠٠ م.

١٩٥٢١ - غادُس العُمُق (S). Lota molva (S).

Morue barbus, M. longue, Molva (F).
نوع من الغادس الكبير القد . طوله يراوح من ١٢٠ الى ١٥٠ سم . اصطناعه معظم بحار العالم . يألف المياه البعيدة اللور التي يراوح بين ١٢٠٠ و ١٤٠٠ م.

١٩٥٢٢ - غادُس صَغِير (S). Gadus minutus (S).

Gade capelan, Capelan (F).
نوع من الغادس صغير القد . طوله يراوح بين ١٥ و ٣٥ سم. سره كبير . العدد يحجب منظم البحار . يألف المياه الاقليمية .

١٩٥٢٣ - غادُسيّات ، غادُسيّات (S). Gadidae (S). Gadidae (F). Gadidae (E).

فصيلة اسماك من المسمارات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بمسطاطة اجسامها النحيلة الحراشف الرقيقة الناعمة . اصطناعها معظم بحار العالم . تألف الحياة الجماعية . سرها يند بعض ثنائ الأولوف || أشهر اجناسها : الغادس والنبر والبقلة والدنلان واللط .

١٩٥١٤ - غاب البحر * ، غابِيَّة (S). Millepora (S).

Millepora (S). Millepore (F). Millepora (E).
جنس مديخ حجري من فصيلة النايبات . انزاله الممرية قليلة البند . اصطناعها بحار البلاد الحارة . جميعها قريبة الشبه من المرجان يتكثّر فيها اللون الرخاسي الاصفر المراج والاحمر الباهت والاصفر الخطني .

١٩٥١٥ - غابِيَّة (F). Futale, Bois (F).

Forest of high trees (E).
الغابة هي الاجرة او الحرجة التي سوكت اشجارها فيسقت وداخت وصارت صالحة للصناعة . ج غاب وفابات . وهي بمنأى الشامل مجموعة نباتية تميزت بيبنتها ومختلف نباتاتها الطولية .

١٩٥١٦ - غابِيَّة (F). Forestier, Sylvicole (F).

Pertaining to forests, Living in woods (E).
ما كان مختصاً بالغابات .

١٩٥١٧ - غابِيّات (S). Milleporidae (S).

Milleporidae (F). Milleporidae (E).
فصيلة مديخ حديرية تعيش وتتكاثر في بحار البلاد الحارة . أشهر اجناسها غاب البحر .

١٩٥١٨ - غادُس * ، غادُس ، غادُسيّات (S). Gadus (S). Gade, Morue (F). Cod, Codfish (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الغادسيات . طولها ماأكولة ويستخرجون من اكبادها زيت السك || انواعه عديدة تتميز باجسامها الاقليمية الشكل التي يراوح طولها من ١٥ الى ١٥٠ سم . فتركها وحيدة القدية الطرية . حيونها كبيرة جاسطة . أشهر انواعه ما يلي .

البراء. وبعضها مستج بضوط قاطبة فضة || هويا متوسط الصنف، مأكولة.

Ulmaceae

١٩٥٣١ - غارهاجيات

هي الأجرقيات، أكلها.

Lauraceae (S).

Lauracées (F), Lauraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة الثمرات، أنواعها المعروفة زهاء ٩٠٠ تنتمي إلى ٢٤ جنساً تنسب إلى ثلاثة أسباط. جميعها أشجار ونخيلرات، اشخاصها صلبة صناعية. أوراقها أليفة كاملة، بسيطة، متعاقبة، عميقة، جامدة النصل. أزهارها حنقودية أو حشوكية أو حلقية التجميع، محورية الإزكاكز، ثمارها زيتونية أو نورية الشكل منها المأكولة والطبية والصناعية.

Trigonelle (F).

١٩٥٣٣ - غاريقنا

هي الحلبة نبات عشبي من فصيلة القرنيات.

Agaricus (S).

١٩٥٣٤ - غاريقون

Agaric (F), Agaric (E).

جنس ططور كاملة التركيب من فصيلة الغاريقونيات. أنواعه زهاء ١٠٠٠، أصنافها العالم على اختلاف أقاليمه الممتدة من خط الاستواء إلى القطبين الشمالي والجنوبي. تعيش على الزبل والنبيل وتغفلت الأعضاء النباتية المنحلة وعلى خام السويق وقلعة الجذور... معظمها جنحالي يؤذي ويحيت وبعضها لذية الطعم مأكول || أشهر أنواعه ما يتبع.

١٩٥٣٥ - غاريقون عسكيد

Agaricus annularis (S), Agaric annulaire, Tête de méduse (F).

نوع من الغاريقون البري المؤذي الجمالي المادة القلابة. يكثر في غابات وأحراج جبال المناطق المعتدلة، يعيش ويتكاثر على اللحاء والأخشاب السائرة نحو الانحلال.

١٩٥٣٦ - غاريقون أعروش

Agaricus colubrinus (S), Agaric couleuvré, Couleuvrée (F), Toadstool (E).

نوع من الغاريقون البري المأكول، يكثر في أحراج البلاد المعتدلة، يعيش على مختلف المواد النباتية المنحلة.

Armillaire demiel (F), غاريقون عسكسي.

هو الطرح، أكلها.

Agaricus necator (S), غاريقون قتال.

Agaric meurtrier, Morton (F). نوع من الغاريقون البري الجمالي، مادته السائلة شديدة الأذى فتية، يعيش ويتكاثر على المراد المصنوعة المنحلة.

١٩٥٣٩ - غاريقون كبريتي

Agaricus sulfureus (S), Agaric soufré (F).

نوع من الغاريقون البري الجمالي المؤذي. يكثر في الغابات القليلة، يعيش على المراد الفسوية المنحلة. لونه إلى الأصفر الكبريتي وبين ورسود عند اكتمال نموه.

١٩٥٤٠ - غاريقون مخزلي

Polyporus officinalis (S), Polypore officinal (F). فطر من السيات، يعيش على خام الحاق وأغصان الأشجار المجريسة.

Laurus nobilis (S).

١٩٥٤٢ - غار *

Laurier d'Apolon, L. franc, L. commun, L. des poètes, L. sauce (F), Laurel, Roman laurel, Sweetbay (E), Edle lorbeer, Eblor lorbeerbaum (D), Alloro, Lauro franco, L. regio, L. poetico (I).

نوع أشجار برية وزيينية من فصيلة القاريات. ضروبها عديدة. بعضها تملو من ١٠ إلى ١٥ م. أوراقها أليفة متعاقبة، عميقة، سنائية الشكل. نصلها جافة الصلصة اللامعة، عايق الخضار، يطول من ٥ إلى ١٤ سم. ويعرض من ٢ إلى ٥ سم. أزهارها صغيرة القند، فضفية اللون، حشوكية التجميع، محورية الإزكاكز. ثمارها زيتونية الشكل والحجم، زرقاء اللون، سواد المواج، يستخرج منها زيت فاخر الصنف يدخل في صناعة الطوب. أوراقها فواحة العرف العطري وهي طيبة، نقيتها منه ويغسل لها كثره فلفلة || وقد مثل النار دوراً مرموقاً في إزنان التاريخ إذ كانت تضمر من إنيانه وأوراقه أكاليل الهبة للقائمين.

Persae borbonica.

١٩٥٤٥ - غار أحمر *

P. carolinensis (S), Laurier Bourbon, L. rouge, Persée de Caroline (F), Borbon laurel (E).

شجرة برية وزيينية من فصيلة القاريات. هيكلها جميل الشكل. ساقها تملو من ٨ إلى ١٥ أمتار. أوراقها أحليجية تطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. ويعرض من ٣ إلى ٥ سم. نصلها جامد الصلصة اللامعة الشديدة الخضار القواصة العرف المستحب. أزهارها جبرسية الشكل، حشوكية التجميع، محورية الإزكاكز، فضفية اللون، ثلالية التركيب، حلقية النصل والبرلات. ثمارها حصى الشكل والقند، زرقاء اللون، سود المواج، حمر الإذن || وهي من الأشجار البرية التي تجود في جميع الأثرية البعيدة النور، والمتوسطة الرطوبة.

Rosage d'Orient (F). ١٩٥٤٦ - غار شيعي *
هو صصلة الشرق، حبة برية وزيينية.

Persae indica (S).

١٩٥٤٧ - غار هندي

شجرة برية وزراعية من فصيلة القاريات. اشخاصها صلبة تصلح للصناعة. ساقها تملو من ٦ إلى ٨ أمتار. أوراقها بيضية مستطيلة، نصلها جامد الصلصة، جميل الخضار اللامع. ثمارها عنابية الشكل والقند، مأكولة، لذية الطعم، تنفع الصدر.

١٩٥٤٨ - غار ووردي هو البصل، أكلها.

Garrot (F), Withers (E).

عصر من جسم أخيربان يكون ما بين التمت والصورة في الحبل وما بين التمت والسنام في البير. وهو الذي يقلى عليه خضام البير إذا أرسل ليرعى حيث شاء. ج غراب.

Sillago (S).

١٩٥٥٠ - غار *

Sillago (F), Sillago (E). جنس اسماء بحرية من شالكات الزعانف وقصيلة التروحيات أنولها المعروفة قليلة العدد أصنافها تمتد من البير الأجر إلى الخليج والمحيط الهندي في أجسامها مستطيلة الشكل كبيرة القند، تطول من ٦٥ إلى ٩٥ سم. رؤوسها صغيرة أسفلية الشكل. عيونها صغيرة سامحة. زعانفها الظهرية الأخرى شراعية الشكل تحمل شعماً بالنة الطول. زعانفها الذيلية مقعرة. ألوانها إلى الشفقة السوداء أو الرمكة



غار



غار أحمر



غاريقون اسيد



غاريقون أعروش



غاريقون قتال



غاريقون كبريتي



غاريقون مخزني

١٩٥٦ - غاريقون مريه * ، طرثوث حلو

Agaricus edulis, *A. campestris* (S). *Agaric comestible*, *A. champêtre*, *Champignon de couche* (F). *Field agaric*, *Mushroom* (E).

نوع من الفاريقون الأكل المشهور ، واسع الانتشار يزرع في الغالب . أسرته عديدة ، ألوانها مختلفة يكثر فيها الأسفر والاحمر .

١٩٥٧ - غاريقونيات

Agaricaceae (S). *Agaricaceae*, *Agaricinées* (F). *Agaricaceae* (E).
فصيلة الفطور الفاريقونية من رتبة الفطريات . اجنتها وانواعها عديدة منها الأكلة كالغاريقون ومنها المؤذية زراعيًا كالعرق والزعاس والسلمة والنفيسة والكولبية والكليبيوب || تتميز بكمال شكل فطورها التي تتكون من قاعدة كروية تعلوها ساق اسطوانية تكلها ابرسة مستديرة . ينجبها غزير المادة ، لبد التجميع وافر الحيف ، يتكاثر ويعد طولًا كالحياطين المشفلة تعلوها دامل صغيرة عديمة الشكل تؤلف لولة الفطر وقاعدة الزكبان .

١٩٥٨ - غاز

Gas (F). *Gas* (E).
هو إحدى حالات المادة الثلاث . تتميز الغازات من السوائل والاجسام الصلبة بقدرتها المطلقة على التمدد . وهي تتأثر بالضغط والحرارة وكل منها وزن وكثافة .

١٩٥٩ - غاز الكبريت

ومن اسمائه غاز كبريتك وسامس كبريتك ، هو ثاني اكسيد الكبريت ، اطلبه .

١٩٦٠ - غاسترولوب * ، بطنية السنتات

Gastrolobium (S). *Gastrolobe* (F).
جنس نباتات جنينية سبوتية معمرة من سبط البذراريات وفصيلة الفروثيات الفرائية . انواعها المعروفة نحو ٣ منها استراليا . معظها بري وبعضها ترابي . هي كلها جيلة القاب . سبوتها فروع . اولانها صغيرة ملقمة متعاقبة . ازهارها عشوية التجميع صفراء اللون او حمراء .

١٩٦١ - غاسول

هو إشنان ابو ساق ، اطلبه .

١٩٦٢ - غاسول الفركنجي

Glaciale (F).
هو الفطيرة الجبلية ، اطلبها .

١٩٦٣ - غاسول زوي * ، لينة شاككة

Euphorbia spinosa, *Tidymallus diffusus* (S). *Euphorbe épineux*, *Hippophaes des grecs* (F). *Hippophaë* (E). *Pitula* (I).
جنبة برية طيبة من فصيلة البوتويات ، عصارتها لبينة حارقة تسمم البشر وتقتل الثوم . اصلها جبال حوض البحر المتوسط || ساقها عشوية فروع . فروعها منتصب شاككة . اولانها حاشنة ، رعية الشكل ، صغيرة القند ، جامدة التصل . ازهارها فردية ، حمراء ، خضراء اللون . يزورها مستطيلة ، مفلطحة ، مستطيلة اللون ، ناعمة القشرة زائدة اللبنة .

١٩٦٤ - غاسول مصري

هو الفطيرة العنقودية ، اطلبها .

١٩٦٥ - غاسيف

Chien de chasse (F). *Sporting dog* (E).
الغاسيف هو كلب الصيد من اي عرق كان . ج غصيف

١٩٥٦ - غاطية

الغالية من الكرم طالت ساقها وصمت وانتشرت .

١٩٥٧ - غاطية

Galatun (S). *Galatun* (E).

جنس حيوانات مائية من الرضويات صفيحات الحياض والارجل بين فصيلة السيرينيات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ بعضها نهري والآخر يعيش عند مصبات الانهر . يكثر ويوجد في القتل والنهر || اصلها شبه قبة الشكل ، كبيرة القند ، متساوية المصاريع . شامها ثنائية ، طويلة ، صغيرة || لها كامة الصنف قل من يربض فيها .

١٩٥٨ - غاطية

Aristolochia (F).
هي الزراوتة ، نبات يشبه المريون . ج غاغ .

١٩٥٩ - غاف

Prosopis (S). *Prosopis*, *Prosopis* (F). *Muzquit bean*, *Sorow bean* (E). *Prosopis*, *Ahrensachelle* (D). *Prosopis* (I).
جنس الشجار ونجيرات برية ودرزنية من فصيلة الفروثيات الفرائية . انواعها عديدة ، مهددا الحث . سبوتها فروع شاككة . اولانها مركبة ، ريشية . وريقاتها لشفية سنانية . ازهارها سبلي التجميع ، عذري الاذكاز . ازهارها صغيرة القند ، خافتة العرف ، مختلفة الالوان . ثمارها قرون رقيقة مستطيلة ، شبه مستديرة . يزورها فضية مفلطحة .

١٩٥٥ - غالفث

Agrimonia (S). *Agrimonia*. *Soubrette* (F). *Agrimonia*, *Cockle bur*, *Liverwort* (E). *Kleiner Odermennig*, *Laberkraut*, *Agrimonia* (D). *Agrimonia*, *Erba da sudata* (I).
جنس نباتات برية معمرة من سبط البذراريات وفصيلة الفروثيات . انواعها قليلة جميعها طيبة تفيد التهابات وغشاة العين || اشهرها الغالفث الفولاني .

١٩٥٦ - غالفث غولاني

Agrimonia eupatoria (S). *Agrimonia eupatoria* (F).
نوع من الغالفث وهو نبات طبي بري معمر سليل . اولانها متعاقبة ، حركية ، وريعية التجميع ، وريقاته ريشية الشكل ، تصلها يارب العروق ، سنن الحافة . ازهارها سبلية ، حمراء ، خضراء اللون ، تفيد غشاة العين والالتهابات اعصاب الجبال الحنجرية .

١٩٥٧ - غاف * ، غالفث ، لاني الماء ، غارب الماء

Phalacrocorax (S). *Cormoran* (F). *Cormorant* (E).
جنس طير من فصيلة البجيات وريعية كليات القدم ، انواعها نحو ٤٠ منها الكبيرة الجعة والمتوسطة . طوطا براوح من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اولانها عديدة الالوان تكثر فيها السمرة الخضراء الملاج . مناقيقها جالسة مستطيلة عمدة البحر الحادة || جميعها من طيور البلاد الباردة والشتتة تعيش قرب الماء تألف الاغوار والشلوط العسرية . قوتها الاسماك الصغيرة . تدفن بين المسور وفي الانجار . اولانها تنقع من ٤ الى ٥ يبيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ٤ اسابيع .

١٩٥٨ - غاف * ، ذيك البحر

Gallichthys (S). *Gal*, *Coq de mer* (F). *Sea-cock* (E).
جنس اسماك بحرية من شاككات الزمائف وفصيلة الاسقمريات . انواعها المعروفة قليلة اللبد ، اصلها بحار



غاريقون مريه



غاسترولوب



غاسول روسي



غاف



غاف



غاف غولاني



غاف

الى الصفرة الزاهية . يكثر في المروج وفي المراعي الطبيعية . يقال انه يفيد الدود وينشف السن . وهو ينثر الحليب ويتصلب في الصناعات الصبغية . صباغه احمر اللون .

١٩٥٦٦ - غَالِيُون صُلْبِيَّيْ *

Galium cruciata (S). *Galilae crosetta*, *Caille-lait crosetta*, *Crosetta* (F). *Crosswort bedstraw*, *Maywort* (E). *Kreuzabkraut* (D). *Pittimbrosa*, *Erba croce delle macchie* (I).

نوع من الغاليون البري الطبي . ساقه وفروعه واوراقه زباد . ازهاره صفراء اللون دقيقة الزناد . يتصلب في الصناعات الصبغية . صباغه احمر اللون .

١٩٥٦٧ - غَامَكة

Gametè (F). *Gamete* (E).

هي الجصيلة أي الحليّة التناسلية البسيطة الجبلية .

١٩٥٦٨ - غَالِطُ

Gadouè (F). *Night-soll* (E).

هو البراز أو المدّ من الاسمدة الضوية التنشيطية الخفصة .

متوسط ما يشمل من مواد رئيسية :

٠,٩٠ ٪ ازوت .

٠,٧٠ ٪ حامض سفغوري .

٠,٢٥ ٪ بوتاس .

١٩٥٦٩ - غَالِيَّة

Téléologie (F). *Teleology* (E).

نظرية فلسفية تركّز على الناية . وكل عمل سببه الهدف .

١٩٥٧٠ - غَالِيَّوْدِيَّة * ، عَشْبَر كَشْمِيرِي ، لَاعُورَة

Gaillardia (S). *Gaillardie*, *Gaillarde* (F). *Blanket flower* (E). *Malerblume*, *Kokardenblume*, *Burgunder* (D). *Gaillardo* (I).

جنس نباتات عشبية ثنائية مسرة من فصيلة المركبات

الانجورية الزهر . انواحه وضروبه كثيرة العدد . اوراقها

متعاقبة صغيرة القد سنانية النصل اللصيق . ازهارها متراكبة

الاربعوي والاصفر . زراعتها الثنائية شائعة ، تصلح في جميع

الآرربة والمواقع .

١٩٥٧١ - غِيَادَة

Téphrosie toxique (F).

Fish poison plant (E). هي الخورياء المسكرة ، اطليها .

١٩٥٧٢ - غِيَارِيَّة *

Mespilus pycnoloba (S).

Mespilus, *Mespilier*, *Néflier des bois* (F). *Mespilus* (E).

Mispel, *Mispelbaum* (D). *Mespalo*, *Nespalo* (I).

نوع من الاكيدنيا البرية من فصيلة الورديات . اصطلها

بعض جبال البلاد الممتدة الحارة . يكثر ويدها في

احراج الكركبات وهي حي شجيرة شائكة تملو من مرتين

الى ستة اثمار . اوراقها عاتلة ، اعليجية الشكل تطول

من ٨ الى ١٢ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ نصليها جامد

النسيج ، بارز البروق ، خلي البشرة على صفحت السفلى .

ازهارها كبيرة القد ، صفراء ، بيض البتلات . ثمارها

بنية اللون ، طرية السونق ، سائمة الطعم ، تؤكل بمد

المزاراة .

١٩٥٧٣ - غَبَّاش *

Photophobie (F).

Photophobia (E).

نعت تعريفي يطلق على كل من يخشى النور .

١٩٥٧٤ - غَبَّاش

Opatrium (S). *Opatre* (F).

جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة النديشيات . انواحه

نحو ٣٠ طوطا يراوح بين ٥ و ٨ سم . ثوارها عاتقة يكثر

فيها الاسود والاصفر والابيض . ريقاتها طامسة ، خاشبة ،

للمناطق الحارة . اجسامها شبه معينية الشكل ، مبطلة الجرم ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . وتعرض من ٢٥ الى ٣٥ سم . رؤوسها شبه يرمية الشكل ، ساحة الانضمام ، صغيرة الاشداد . زناقتها الظهريّة والشرجية متعاقبة يملؤها مع الزناقات الحوضيّة بعض الاالياف الحليّة المستطيلة الضروفية اللادة . زناقتها البطنيّة غارقة . لحونها كعانة الصفت ، قلّ من يربط فيها . اعرف انواعها واشهرها النوعان التاليان :

١٩٥٥٩ - غَالُ الْمُتَوَسِّط

Gallichthys egyptiacus (S).

Gal de la mediterrannée (F).

طوله نحو ٢٥ سم . ثوبه الى الشبهة الفضية . يكثر وجوده قرب الشطوط المصرية .

١٩٥٦٠ - غَالُ كَثِير

Gallichthys major (S).

Gal major (F).

طوله نحو ٣٥ سم . ثوبه الى الشبهة الذهبية الموج . يكثر وجوده قرب الشطوط الهندية .

١٩٥٦١ - غَالُ

الغال نبات . والغال ارض مطبنة ذات شجر . ج غلان .

١٩٥٦٢ - غَالِيُون

Galium (S).

Galilae, *Caille-lait* (F).

جنس نباتات عشبية ربية حولية أو مسرة من فصيلة

التفريات . انواحه المعروفة نحو ١٥٠ منها البالية والمرحوبة

والصبغية . ساقها مضطمة رباعية . اوراقها ضمية ،

متعاقبة ، صغيرة القد ، ضيقة النصل ، مدنية المقص .

ازهارها رباعية التركيب ، ابطية الارتكاز ، مستطيلة

الزناد ، يكثر فيها اللون الاصفر . اشهر انواعه ما يتبع .

١٩٥٦٣ - غَالِيُون اَبْيَض * ، نَصْبَقِي ، حَفِيْشَة

Galium aparine (S). *Galilae aparine*, *Grataron*, *Asparine*, *Rieble* (F). *Catch-weed*, *Cleavers*, *Goose grass* (E). *Klebelabkraut* (D). *Aparine*, *Asprella*, *Cappello da signosi* (I).

نوع من الغاليون البري الطبي . ساقه فروع زباد . فروع

دقيقة ، متصببة ، لينة . اوراقه جامدة النصل ، حليّة

البلرة . ازهاره بيضاء اللون مستطيلة الزناد النحيل .

١٩٥٦٤ - غَالِيُون المَنَاح

Galium palustre (S). *Galilae des marais*, *Caille-lait des marais* (F). *Marsh bedstraw*, *Water bedstraw* (E). *Sumplabkraut* (D). *Stellina ruvida* (I).

نوع من الغاليون المرصوي البري يقال انه ينثر الحليب .

يكثر في المنابع ويريد في المروج الرطبة ، ترعا الماشية

بشوة فيسبها ويسمن دحها .

١٩٥٦٥ - غَالِيُون حَقِيْقِي * ، غَالِيُون اَصْفَر ،

Galium verum (S).

Galilae jaune, *Caille-lait jaune* (F). *Cheese rennet*, *Yellow bedstraw* (E). *Echte Labkraut* (D). *Gaglio giallo*, *Erba zoffina*, *Erba nocca* (I).

نوع من الغاليون البري المرصوي . ساقه فروع . فروعها

نحيلة ورميدة . اوراقه ضيقة النصل الخليلي البشرة . ازهاره



غال



غاليون ابيض



غاليون المناع



غاليون حقيقي



غاليون صليبي



غارديده

١٩٥٨ - غشيس ، غشيس Goniosoma (S).
Goniosoma (F). Goniosoma (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السلمونيات متفحات المائدة.
انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها صغيرة القند مستطيلة
الشكل ، فضية اللون او ودية || اصطناعيا بحار البلاد
الحارة والمالحة الحرارة اعصها البسر الاحمر والخليج ||
اشهر انواعها النيص الغني الذي يكثر في المتوسط .

١٩٥٦ - غشيسه Tenebrio (S). Ténébrion (F).
جنس حشرات خاضعة مؤذية من فصيلة النشبات ، انواعه
نحو ٢٥ اشكالها واصحابها واثرها مخلفة ، تعيش على
بعض المواد النباتية منها الحبوب والقمح والجنود || اعرف
انواعه واضرها ما يلي .

١٩٥٨٧ - غشيسه التبغ Platysscelis gages (S).
Ténébrion du tabac (F).
نوع من النشبة وهي خنفساء فضية الشكل مقلعة طويلا
نحو ١٠ سم . ثوبها سوي السوداء فضي المراج الازرق .
تركب شتول التبغ الفتية فتقرض السوق عند سطح التربة .
تكاثرها يستعمل اسد الحواشير الفعالة تطفيرا على التربة
والنبات .

١٩٥٨٨ - غشيسه الدقيق Tribolium confusum (S). Tribolium confus, Ténébrion confus (F).
حشرة من النشبات صغيرة القند مقلعة طويلا نحو ٤ م .
لونها الى الكستني المائل يعلو موج احمر . تعيش على المواد
العضوية في المطابخ وتخزن الحبوب والمغالة . رقتها دقيقة ،
غبراء ، مستطيلة ، هليبة الجسم تعيش كاشرة على الفلتيق
والحبوب المكسورة .

١٩٥٨٩ - غشيسه المظاحن Tenebrio molitor (S). Ténébrion meunier, Ver de farine (F). Mehlworm (E). Mehlkäfer (D).
خنفساء من النشبات ، جسمها مستطيل الشكل مسطح ، طويلا
نحو ١٥ م . ثوبها الى البني الاسفع المراج . تعيش في
المطاحن والافران . رقتها تدعى دودة الدقيق .

١٩٥٩٠ - غشيسه Paillucida (F). Pellucid (E).
نمت تعريفي يطلق على كل ما هو نصف شفاف .

١٩٥٩١ - غشيسه Paillucitidé (F). Pellucidité (E).
النبشرة صفة ما هو غشس او ملبش .

١٩٥٩٢ - غشيات Tenebrionidae (S).
Ténébrionidae (F). Darkling beetles (E). Schwarzkäfer, Schattenkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشيات الاجنحة . اجناسها وانواعها
زده ١٠٠٠٠ مظهرها من الحشرات غير المؤذية . اشكالها
خنافسها مخلفة تكثر فيها الاستطالة ويحبب اقرب الاسود .
قربها الاستعمارية مركبة من ١١ فصلا . اراسع بزملمها
الاسمية والوسطى خمسية المقل اما الخلفية فرباعية || تألف
الاماكن والمواقع المظلمة والاقبية وما شبه . تعيش على
بقايا المواد العضوية والنباتية . رقتها دودة الشكل تعيش
في التربة على المواد النباتية والعضوية الممتلئة او على
دور الاغصان . اشهر اجناسها الازيدا والقباش والنبشبة
والنبشاش والافيتوفاغوس والاشلوس والميلازيا .

تعيش على جنود بعض النباتات البرية والزراعية اعصها
الكرمة || اشهر انواعها غياش الكرمة .

١٩٥٩٥ - غشاش الكرمة Opstrum sabulosum (S). Opstre sablonnier (F).

نوع من النباش طوله نحو ٨ م . ثوبه الى السواد الداكن .
يعيش في التربة الرطبة القليلة الانساج . يركب مع
يرقاته جلود الكرمة فيؤذيها .

١٩٥٧٦ - غشاش ، رشان Scarus ghobban (S).
Scaré var (F). Ghobban scar-fish (E).
سمكة بحرية من بنات مصقار . توجد في المتوسط وفي بحار
البلاد الحارة . ثوبها الى الربية الخضراء الزاوية . يقال
انها لا تتوكل في زمن مرض المرجان لما قد يحويه لحمها
من مواد سامة مؤذية .

١٩٥٧٧ - غشيب ، غشيب ، بلدم Fanon (F).
Dewlap (E).
ثي جلدي تحت عنق البقرة .

١٩٥٧٨ - غشبر Merlangus (S).
Merlan (F). Whiting (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة النادسيات . انواعه المعروفة
خسة تتميز باجسامها المستطيلة الشكل ويحرفها النحلة
الرقيقة ، طويها مأكولة . اكبادها واقره المادة الزيتية .
جميعها من الاسماك المقترسة الهمة ، تألف المسق وتعيش
اسرابا واقره العدد || اشهر انواعها الثلاثة التالية .

١٩٥٧٩ - غشبر المتوسط Merlangus punctatus (S).
Merlan pontassou, Pontassou (F). Pollack (E).
نوع من الغبر يكثر في بحار البلاد الافريقية اعصها
المتوسط والاطلس .

١٩٥٨٠ - غشبر شائع Merlangus vulgaris (S).
Merlan commun (F). Common whiting (E).
نوع من الغبر يوجد في معظم بحار العالم . يكثر في المحيط
الاطلسي قرب الشواطئ الافريقية والاروبية .

١٩٥٨١ - غشبر قشحي Merlangus carbonarius (S).
Merlan noir, Charbonnier (F). Coal-fish (E).
نوع من الغبر يكثر في مياه بحار الشمال وفي البسر الاسود
وفي المياه الاقليمية الممتدة من اليونان الى لسانيه .

١٩٥٨٢ - غشبركة Excale factoria (S).

١٩٥٨٣ - غشبرو Endrepanis (S).
Endrepanis (F).

جنس طير من الجوامث وريقات المناقير وفصيلة المغريات .
انواعه المعروفة قليلة العدد . اصطناعيا جزر الفيليبين ||
اجسامها صغيرة القند ، مستطيلة المتائدة الرقيقة ، صغيرة
الارصاف الدقيقة والاذناب المستديرة الاطراف . اثرها
تختلط بين الذكور والاناث || اشهر انواعها واجلها
غبرور صنتير . ثوب الذكر الى الصفار المذهب .
جناسه وذبته الى البنيجي . رأسه الى الخضراء الاسفع .
قنقه الى الحرة الابرومانية .

١٩٥٨٤ - غشبرون Excale factoria (S).
Caillie naine (F). Dwarf quail (E).

جنس طير من حمزة الجبلية وفصيلة الطيوريات .
انواعه المعروفة اربعة مظهرها الشرق الانسي . نغبه البني
بشكلها وثوبها غير انها اصغر قد وانح ثوبا واقل طويلا ،
تألف السهول والادغال وتدن في افحوص كالسنان .



غياش



غياش الكرمة



غبر



غبرور



غبرون



غشيشة التبغ



غشيشة الدقيق



غشيشة المظاحن

١٩٦٠ - عُشْبَاءُ الْهِنْدِ (F). Sorbier des Indes

شجرة من الفيراء مشهورة باسم عُشْبِ الْهِنْدِ ، أَلْبَانِ .

١٩٦١ - عُشْبَاءُ الْيَابَانِ (S). Sorbus japonica

Sorbier du Japon (F).

نوع من الفيراء وهي شجرة حرجية سبروتية مهددة بالانقراض .
تطول من ٥ إلى ١٥ م . أوراقها مفضضة ، بيضيه ، ذلقة ،
تطول من ٧ إلى ١٢ سم . وتعرض من ٤ إلى ٨ سم . نصوصها
صفيرة ، شبيهة ، مسننة الحافة . نصلها غلي الصفة
السفل ، كبير المروق التي يراوح عددها بين ١١ و ١٣
زويجا || أزهارها بيض . ثمارها بيضيه الشكل ، ارجوانية
اللون ، منشرة بالانفيس .

١٩٦٢ - عُشْبَاءُ امْرِيكَا (S). Sorbier americain

Sorbier d'Amérique (F).

نوع من الفيراء وهي شجرة سبروتية حرجية وتربيتية . أصلها
بلاد امريكة الشمالية . طول من ٤ إلى ١٥ متر . أوراقها
مركبة وزرية التجميع . وريقاتها ابيضجية ذلقة تطول
من ٢ إلى ١٥ سم . وعددها يراوح بين ٩ و ١٧ .
أزهارها كبيرة القد ، غراء اللون . ثمارها حامضه الطعم .
زاحية الحمرة الاربوانية ، كروية الشكل ، قطرها يراوح
بين ٨ و ١٠ م .

١٩٦٣ - عُشْبَاءُ بَرِّيَّة * ، عُشْبَاءُ مَضْمُحَّة

Sorbus torminalis (S). Sorbier torminal, S. alsiner, Aliser (F). Wild service tree, Chequer tree (E). Wilder Elsbeerbäum(D). Sorbezzolo, Ciavardello (I).

نوع من الفيراء وهي شجرة حرجية سبروتية شائعة تملو من
١٠ إلى ٢٠ م . أوراقها مفضضة ، مائلة للبشرة ، عديدة
المروق . نصوصها خفيفة لا متساوية العمق . عددها
يراوح بين ٥ و ٩ || بتلات أزهارها ذلقة ، بيضاء
اللون . ثمارها كروية ، مقطوعة الطرف ، حمراء اللون ،
قطرها نحو ١٥ م .

١٩٦٤ - عُشْبَاءُ ذَرِيَّة

Sorbus cuspidata, Sorbus vestita (S). Sorbier cuspidé (F).

نوع من الفيراء وهي شجرة سبروتية برية وتربيتية ترعب
في الموائل الباردة . تملو من ٣ إلى ٥ أمتار . ساقها
واغصانها وأغصانها وأغصانها مزينة البقاء ، زغبها لبد التجميع
قطني الشكل واللون || أوراقها ابيضجية ذرية تطول من
١٠ إلى ٢٣ سم . وتعرض من ٤ إلى ١١ سم . نصلها غلي
البشرة حل صفحتي . حثاره ثنائي التسنين ، عادم للتقصيص .
ثمارها كروية الشكل ، مقطوعة القاعدة والطرف ، ارجوانية
اللون ، صفراء المواج .

١٩٦٥ - عُشْبَاءُ سَوْدَاءُ الثَّعَرِ

Sorbus melanocarpa (S). Sorbier à fruits noirs (F).

نوع من الفيراء وهي جنبة عميرة برية وتربيتية تملو من
١٠٠ إلى ١٥٠ م . لثانها وأغصانها زاه البقاء . أوراقها
بيضيه مسطيلة . نصلها جامد التجميع ، مسنن الحافة ،
غلي الصفة السفلى . ثمارها كروية الشكل مقطوعة
الطرفين ، قطرها يراوح بين ١٠ و ١١ م . لونها ال
السواد اللامع .

١٩٦٦ - عُشْبِيَّاتٌ لَيْسِيَّة * ، رُوبِيَّاس

Goniosoma sphyraena, Argentina sphyraena (S). Goniosoma argentin, Argentine vulgaris (F). Common argentine, Silver-fish (E).

نوع من البعس . ممكة بحرية يبيض من السلمونيات .
أصلها من مناطق البسر الابيض المتوسط || سرسها
الانواط . لا تقرب من الشطوط والمجاذب الا في زمن
التسرة القوية يمتد من اوائل شباط الى اواخر آذار || جسمها
شبه ريشي الشكل بطول من ١٥ الى ٢٠ سم . رأسها
غرويقي اللون . لها واسع الشدق الذي ينتهي تحت العين .
زمنها البالية غافة . سفنها كبير القد ، ناضج تحمره
كل عام . ثوبها لضي اللون يلبس كمرق الزلزل . ظهرها
زلفي الخفار || لها متوسط الصفه ، مأكول || تصاد
من اجل الشحاح الزلزي الذي يملو جسمها وثنائها لانه
يدخل في صناعة تقليد الزلزل .



عُشْبِيَّاتٌ

١٩٥٩ - عُشْبُط ، عُشْبُط (E). Loose sheaf (F). Javelle

بعض قبضات مجومة من الزرع المحصد . والنبوط المكمنة
تدعى حمة ، راجعها .

١٩٥٩ - عُشْبُطْب ، هو البلمد ، الطلب .

١٩٥٩ - عُشْبِيَّاتٌ ، عُشْبِيَّاتٌ (F). Fraude, Tromperie

Fraud, Cheat (E).

البن والذين : الخديعة في البيع والشر .

١٩٥٧ - عُشْبِيَّة

Lonchocarpus (S).

Lonchocarpus, Cubá (F).

جنس اشجار وعجيرات برية وزراعية من فصيلة القرنيات
القرافية . منبها البلاد الحارة والاشترافية . يستخرج من
جلودها مادة الرتوتون التي تستعمل في اعادة الحشرات .

١٩٥٨ - عُشْبِيَّاتٌ ، عُشْبِيَّاتٌ (F). Sorbus (S).

جنس اشجار ونبات برية وزراعية من فصيلة الورديات
انواعها عديدة مهددة البقاء . أوراقها عابلة متناحية . أزهارها
نورية التجميع . ثمارها تفاحية الشكل . صتيرة القد ،
مرجانية اللون ، حلزوة الطعم ، يستخرج منها بعد التخمير
والقطيع مشروبات كحولية لا بأس بها || اما متوسط
ما تحويه ثمارها من عناصر مفيدة فهو .

مواد ازوتية ٧ %

غلوكوز ١١ %

صفحات ١ %

حامض تفاحي ٠.١٤ %

فيتامين ث ٢.٥ %

اغصانها علية جامدة ، ناعمة الزمرة تستعمل في صناعة
التزييل || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

١٩٥٩ - عُشْبِيَّاتٌ الْحَاكِلِينَ * ، شَجَرَةُ السَّمَنِ

Sorbus aucuparia (S). Sorbier des oiseaux, S. des oiseaux, S. sauvage, Cochane (F). Mountain ash, Rowan (E). Gemeine Eberesche, Eberesche Vogelbeere (D). Sorbo salvatico, Sorbastrelo, Timolina (I).

نوع من الفيراء وهي شجرة سبروتية برية شائعة تملو من
١٢ الى ١٦ م . لثانها وأغصانها وارادها خلية . أوراقها
مركبة وزرية التجميع ، وريقاتها سنانية ، ذلقة ، مسننة الحافة
عددها يراوح بين ١١ و ١٧ || أزهارها كروية الرائحة .
للثانية أو رباية الاقلام . ثمارها ارجوانية كروية ، قطرها
نحو ١٠ م .



غيراء الحاكيلين



غيراء برية



غُيَّرَة مَبْدُولَة



غُيَّرَة



غُيَّرَة



غُيَّرَة



غُيَّيْت

١٩٦١٤ - غُيَّيْتَة *

Fontinalis (S). Fontinalis (F). Fontinalis (E).
جنس طحالب من فصيلة المبرويات. أنواع المبروة قليلة العدد منها مجاري الماء والناث في البلاد الممتدة الحرارة. جميعها من الطحالب الشائعة المبروة. سيقانها دقيقة كالسنة فروع. اكياسها بيضاوية تاجية الارتكاز.

١٩٦١٥ - غُيَّيْتَة *

Ecaillure (F). Scalling (E).
التآكل القشور الامامي او الخلفي الذي يلف الجسم عند بعض الحيوانات انحصار الفجوات.

١٩٦١٦ - غُيَّرَة *

Saurothera (S). Saurochère, Oiseau de pluie (F).
يدعوونه طائر الغيث لانه يشتر بقرع المطر عندما يهجر البطاخ الى الغابات الغظيلة || جنس طير من فصيلة القيققيات. انواعه المبروة ستة موطنها يمتد من الهند الى جزر الاقريط. ملجئها الحياتي جماعي. جماعاتها قليلة العدد. قوتها الحشرات والديدان والثمار والبروز || اجسامها طولها من ٤ الى ٨ سم. بما فيه الذنب || رؤوسها مستدلة الحليم. مناقبها مستطيلة. بيضاء الاحديداد. اجنتها ذلقة. اذنانها بالغة الطول. مستندرة الاطراف. مجلعة بثلاثة خطوط سود مستعرضة يتداخلها تيجاج ابيض. انوثاها متراكبة الاوران فيها الانثى والاصفر والاشقر والابدر والايض والاسود || قدن احشاشها في الاشجار القريبة. انثاها تحضن من ٣ الى ٥ بيضات. التخصيم يستمر نحو ١٥ يوما تقوم به الاناث دون الذكور التي تكون لها الفداء.

١٩٦١٧ - غُيَّرَة *

Guettarda (S). Guetardo, Guettardie (F).
جنس طيور ونباتات برية طيبة من فصيلة الغرييات. انواعها المبروة ١٥ اصنافها بعض المناطق الاستوائية الاسيوية والاربعية || سيقانها فروع. اوراثها متعاقبة. معتقة. اذنيها. نصالها جامدة بيضه اللون او سناينة. انزاعها محوري الارتكاز. انزاعها ثنائية او ثلاثية التجميع. انثوية الكأس. فارشة البتلات. صطرية العرف. ثمارها انوية لائفة. اشهر انواعها الثلاثة التالية :

١٩٦١٨ - غُيَّرَة أَيْفَة *

G. formosa (S).
تقودها مطهرة تتصل لدمل الجروح والقروح.

١٩٦١٩ - غُيَّرَة لَنْبِيَّة السَكَن *

G. dioica (S).
تقبح ثقورها دافع لسمي.

١٩٦٢٠ - غُيَّرَة مَلْبِيَّة *

G. ambigua (S).
تقبح ثقورها مقر منشط.

١٩٦٢١ - غُيَّيْت *

Coroba cyanea (S). Guil-guil bleu, Oiseau bleu (F). Guil-guil, Bluebird (E).
طائر من فصيلة المبرويات. موطنه بعض مناطق امريكة الجنوبية. يأنف الحياة الجماعية. يعيش في الاجراج ويستر حل الثمار النانسية في الجبان والحدائق || جسمه صغير اللد. وشيق القوام. يطول نحو ١٢ سم. لونه جميل

١٩٦٠٦ - غُيَّرَة صَيَوَالِيَّة

Sorbus umbellata, Pirus meridionalis (S). Sorbier en ombelles (F).

نوع من الندياء وهي شجرة مبروية برية وتزينية تملو من ٣ الى ٦ امتار. هيكلها صيواني الشكل. اوراثها منمصة مستعرضة طولها من ٥ الى ٧ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. تصلها خلي الصفصفة السفلى. حنار ثنائي التسنين || ثمارها بيضه الشكل. اربواينة اللون.

١٩٦٠٧ - غُيَّرَة قَنْدَلِيَّة

Sorbus fenicia (S). Sorbier Anlandais (F).

نوع من الندياء وهي شجرة برية وتزينية مدها فلتنة. ترطب في الاقاليم الباردة. تملو من ٥ الى ١٢ م. اوراثها مركبة طولها من ٨ الى ١١ سم. وتعرض من ٤ الى ٧ سم. تصلها عديد المروق خلي البشرة. اريد الصفصفة السفلى. ثمارها مأكولة. قليلة الحوصفة. برقالية اللون. كروية الشكل. ثمرها يراوح بين ١٠ و ١٢ م.

١٩٦٠٨ - غُيَّرَة مَبْدُولَة *

Sorbus domestica (S). Sorbier domestique, Cormier (F). Common service tree (E). Echar Spierling (D). Sorbo domestico, Sorbo gentile (I).

نوع من الندياء وهي شجرة مبروية برية مبدولة تملو من ٣ الى ١٢ م. براعمها لزينة. اوراثها مركبة وتريه التجميع وريقانها سناينة ذلقة طولها من ٤ الى ٥ سم. وتعرض من ١٥ الى ٢٠ سم. مدها يراوح بين ١٥ و ٢١ سم. تصلها يجر خلي البشرة ثم يفقد الحبل مع البسر || انزاعها غبراء اللون. خماسية الاقدام. ثمارها اجاصية الشكل مأكولة. طولها من ١٥ الى ٣٠ سم. لونها الى الصفرة يملوا توشيح احمر ونقطة سمراء.

١٩٦٠٩ - غُيَّرَة مَعْبِيَّة الْوَرَق

Sorbus alnifolia (S). Sorbier à feuilles d'aune (F).

نوع من الندياء وهي شجرة حرجية مبروية مدها اليابان. تملو من ٥ الى ١٥ م. اوراثها بيضه ذلقة. تشبه اوراق الخش. طولها من ٦ الى ٨ سم. وتعرض من ٤ الى ٥ سم. تصلها اخضر الصفصفتين. سنان الحافة. انزاعها بيض. ثمارها بيضه الشكل. اربواينة اللون صفر المالح. طولها نحو ١٢ م.

١٩٦١٠ - غُيَّرَة

هي البورغ. اطليه.

١٩٦١١ - غُيَّرِيَّات

هي البزويجات. اطلبا.

١٩٦١٢ - غُيَّرِيَّات بُوْغِيَّة

هي البزويجات الغلغلية التي تمشي حل الحشرات والقشريرات.

١٩٦١٣ - غُيَّيْفِي *

Eremobius (S). Eremobia (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات. انواعه المبروة قليلة العدد جميعها من ثبوت بعض مناطق حوض البحر الايضي المتوسط || سيقانها قصيرة. فروع. كثيفة الزغب المستطيل. اوراثها متراكبة. غضة النصال. شبه صفصية الشكل. انزاعها صغيرة. وريدية اللون. تقودها ديبلي.

الآتربة الجصية وتُزَعَن فيها العسل والظم || أجسامها قريبة الشبه بأجسام ذكور النحل. قوتها الاستعارة مستطيلة. ظهورها وبطنها كثيفة الزغب. أنوفها تختلف مع اختلاف الأنواع.

١٩٦٢٨ - عُثْرِي

النثري والعثري من الزرع هو الذي تسقيه السماء. ويدعى المذي.

١٩٦٢٩ - عُجُوم

Gobio (S).
Goujon (F). Gudgeon (E).
جنس سمك نهرية من فصيلة الشبديات. أنواعه قليلة جميعها تسمى قوتها البندان والدماغس والقشريات وهي مستطيلة الشكل والمذبات. أعطانها بحيرات البلاد الاسبوية والاروبية تنبهرها الى الانهار في زمن السرة وقد يكون ذلك في اواسط ابريق ثم تعود اليها في اواخر الصيف || اشهر انواعه العجوم الشائع.

Gobio fluviatilis (S).
Goujon commun (F). Common gudgeon (E).
نوع من العجوم وهو سمكة نهرية تطول نحو ٢٠ سم. جسمها مستطيل الشكل، زعانفها كبيرة، عذاتها متدلّتان. ثوبها الى الربة القضيّة، ظهرها متتابع التجذيع الاصفر. رقب في المياه العذبة الصافية، سورها يمتد من ايار الى اواخر تموز. تلحق بانفائها فوق الصخور تلتصق بها وتبقى الى ان يمّ التفت وقد يكون ذلك بعد السرة باليومه او حصة اسابيع. لحمها للذيد الطعم مرغوب فيه.

١٩٦٣١ - عُذْكَو * عُزْوَ * قَرْدَبُ النَّاعِ،
عَصَا الرّاعي الزّياه
Polygonum lapathifolium (S). Renouée à feuilles de patience (F). Pale persicaria, Willow weed (E). Ampferknotenchen, Filzknotenrich (D). Persicaria, Erba pepe (I).
نوع من القردب وهو نبات بري متقبي ممر. ساقه فروعاً تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. فروعه دقيقة زياه اللحاء. اوراقه متناية حاضبة الشكل تطول من ٢ الى ٨ سم. نصلها خلى البشرة، الحبل الحصار. ازهاره سنبل التجميع. سنابلها تطول من ٨ الى ٨ سم. ازهاره وريدة اللون.

١٩٦٣٢ - عُذْكَو *
Aplisus (S). Apiste (F).
سمكة بحرية من شاكات الزعانف وفصيلة الطرنيثات. أعطانها تشمل جميع بحار المناطق الاستوائية وأحارن || جسمها بطول من ٣ الى ٥٠ سم. رأسها يرمي الشكل. عيناها ماصحتان. شفتها معدن الرخا. عذباتها صغيرتان. ثوبها الى الربة القضيّة المخاطوة للمياه الحمر. الذيلية الظهرية كبيرة، مستطيلة، شاككة المناخس. الذيلية مستديرة الطرف. الشرجية ثلاثية المناخس الحادة. الصدورية مستطيلة كالجنح وها الثنتان تسعين بها لقفز فوق الماء || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

١٩٦٣٣ - عُذَاف * عُذَاف * عُزْوَابُ الْقَيْظِ
Corvus frugilegus (S). Corbeau freux, C. chauve, Freux (F). Rook (E).
عذاف ونذاف ج. عذغان. طائر من الطيريات متبذل الخنجة طوله نحو ٥٠ سم. ثوبه الى السواد الاصفر المواج، ورشه يلس بحجرة. منقاره ورجلاه الرمادي الاصفر || وهو

اللون الساطع. وداؤه الى الزرقه الجبلية. جناحه وذنبه وامل ظهره الى السواد الاسم الاصفر. عناق قوائمه وأباهره الى الصفار الزاهر. منقاره دقيق مستطيل. حلقه صبه زرقاء اللون. جناحه ذلق الطرف. ذنبه قصير الجرم، غارقة الطرف. رسته دقيق الحبل اللون || طيرانه خفيف الحركة. قوته العسل والحشرات الصغيرة والبار الياينة || يذئن منه في الاجبار القنار الاربعة الظل. الاث تصح ٤ او ٥ بيزات تحفها بمنوبة الذكر نحو ١٥ يوما.

١٩٦٣٢ - عُثِل

يقال عُثِل المرج اذا كثر فيه الشجر وكذلك الحديقة واي مكان كان.

١٩٦٣٣ - عُثْ

نبت يتميز صبه ويؤكل في الجذب. صبه يشبه الجاورس. وهو من تجيل السباغ (السان).

١٩٦٣٤ - عُثْكَاء

هو الحاء، الحلبه.

١٩٦٣٥ - عُثْكَات * Capito (S).Capito (F). Capito (E).الاسم العلمي من اللاتيني يمين غليظ الرأس. جنس طير من فصيلة الثشائيات. انواعه المعروفة نحو ١٧ جميعها من حل امريكا الجنوبية والوسطى || اجسامها صغيرة القد تطول من ١٤ الى ١٧ سم. رؤسها غليظة. مناقبها غزوية الشكل و غليظة. سبالها كثيفة. تتميز بذبائين الاتواب بين الذكور والاناث. اثواب الذكور سراكية الاالوان الجبلية، يكثر فيها الاخضر ثم الاحمر والاسود والاصفر. الاثاب عامة الاحر كبيرة الاضفر والاخضر اجنتها صغيرة، ذلقة الاطراف. اذنانها مقنطة || قوتها الحشرات حل اختلاف فصائلها وانواعها || لكن اختلافها في تجلويث الاجبار وصفوها. اناتها تبيض من ٣ الى ٥ بيزات تحفها بمنوبة الذكور نحو ١٣ يوما.

١٩٦٣٦ - عُثْكَائِيَّات * Capitonidae (S).Capitonidae (F). Capitonidae (E).فصيلة طير من المتلفات. اجناسها وانواعها المعروفة مدينة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية وأحارن من المالن القديم والجديد || طيورها صغيرة القد او متوسطة، جميلة الاالوان المتناخضة والمزركية. تتميز بكثافة سبالها التي تمتد، في بعض الانواع و حتى الزود. مناقبها غليظة صبه غزوية الشكل. اجنتها محدلة الطول او قصيرة. اذنانها مقنطة او مستديرة. قوائها قصيرة، شديدة النشط || طيراتها قصير الشوط. تتساك الاجبار بشفة اما انتفاخا مل الارض فيطير || تدئن اعضائها اما في تجاويث الاجبار او في حاجر تحفها في التربة || اشهر اجناسها الثغاث والربكان ولقطرطوف.

١٩٦٣٧ - عُثْكَو * Eucera (S).Eucora (F). Eucora (E).جنس حشرات جارسه لافعة من عشائيات الاجنحة الحمويات وفصيلة القناريات. انواعها المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في جميع اصقاع البلاد الحارة والحامدة الحارة. قوتها رقيق الازهار ويكويها. مليتها الحياتي جامعي، جامعاتها قليلة العدد تختلف من ذكور واناث تمل سوية في سبل الحياة والبقاء. تنهي عشاؤها على الحيطان وفي



عُثْكَات



عجوم شائع



عذار



عُذْكَو



عذاف

- ١٩٦٥ - غُدَّة سَعْتَرِيَّة ، غُدَّة سَعْتَرِيَّة
Thymus (F). Thymus gland (E).
هي غدة العنق السفلى في الحويان .
- ١٩٦٥١ - غُدَّة سِفَاتِيَّة
Glande copulatrice (F). Copulatory gland (E).
- ١٩٦٥٢ - غُدَّة شَرَجِيَّة
Glande anale (F). Anal gland (E).
- ١٩٦٥٣ - غُدَّة شَعْرِيَّة
Buibe pileux (F). Hair-gland (E).
- ١٩٦٥٤ - غُدَّة صَبَاء
Endocrine, Glande close (F). Endocrine, Ductless gland (E).
- ١٩٦٥٥ - غُدَّة صَنْوَبَرِيَّة
Apophyse (F). Apophys (E).
هي الشرنوب ، اطليه .
- ١٩٦٥٦ - غُدَّة صَرَعِيَّة
هي البدة الكلية .
- ١٩٦٥٧ - غُدَّة عَجَالِيَّة
Glande périnéale, G. périnéenne (F). Perineal gland (E).
- ١٩٦٥٨ - غُدَّة لَوْرِيَّة
Glande alcaline (F). Alkaline gland (E).
- ١٩٦٥٩ - غُدَّة كُنْبَلِيَّة
Glande conglobée (F). Conglobate gland (E).
- ١٩٦٦٠ - غُدَّة كِلْسِيَّة
Glande calcifère (F). Calciferous gland (E).
- ١٩٦٦١ - غُدَّة لَاحِقَة
هي البدة الإضافية .
- ١٩٦٦٢ - غُدَّة لُعَابِيَّة ، لَوْرَة الرُّعَاب
Glande salivaire (F). Salivary gland (E).
- ١٩٦٦٣ - غُدَّة لُفَافِيَّة ، غُدَّة لِيْمْفَاتِيَّة
Glande lymphatique (F). Lymph gland, Lymphatic gland, Lymphaden (E).
- ١٩٦٦٤ - غُدَّة مَحْبَبَة
Glande vitelline (F). Vitelline gland (E).
- ١٩٦٦٥ - غُدَّة مَخَاطِيَّة
Glande muqueuse (F). Mucous gland (E).
- ١٩٦٦٦ - غُدَّة مَرِيئِيَّة
Glande oesophagienne (F). Oesophageal gland (E).
- ١٩٦٦٧ - غُدَّة مَصْلِيَّة
Glande séreuse (F). Serous gland (E).
- ١٩٦٦٨ - غُدَّة مَعِدِيَّة
Glande gastrique (F). Gastric gland (E).
- ١٩٦٦٩ - غُدَّة نُحَامِيَّة ، غُدَّة بَلْعَمِيَّة
Glande pituitaire, Hypophyse (F). Pituitary gland, Hypophys (E).
هي غدة قاعدة اللقفت .
- ١٩٦٧٠ - غُدَّة نَسَالِيَّة
Glande du byssus (F). Byssus gland (E).
- ١٩٦٧١ - غُدَّة نَكَفِيَّة
Glande parotide (F). Parotid gland (E).
- ١٩٦٧٢ - غُدَّة هَضْمِيَّة
Glande digestive (F). Digestive gland (E).
- ١٩٦٧٣ - غُدَّة دُور طَاعُون الْإِبِل .

- من القواقع يحرق الشرق الادنى واروپة وافريقية الشمالية والشرقية . يأتلف الحقل والسهول المزروعة المبيسة الانحجار . قوته الحشرات والديدان والحبوب . يذنب حبه في الاثغار . انتاه نضج من ٣ الى ٥ بضاعت تحضنها وسدما . يعتبر من الطيور الفارة لانه يلتمس البذار ويتغذى على الحب الناتش .
- ١٩٦٣٤ - غُدَّة كَلَّة
Anisogamie (F). Anisogamy (E).
- الندافة احلى طرائق الانسال الثقي و كسمن ، صدافاً ، بياضن النمامات الوراثية الذكرية والانثوية من حيث الشكل والحجم والرائل .
- ١٩٦٣٥ - غُدَّة
Glande (F). Gland (E).
عضو في الجسم يفرز مواد خاصة كاللعاب والدمع والرق والخليل الخ .
- ١٩٦٣٦ - غُدَّة إِضْطَالِيَّة ، غُدَّة لَاحِقَة
Glande accessoire (F). Accessory gland (E).
- ١٩٦٣٧ - غُدَّة الرِّحِيْق ، غُدَّة المَغْشَر
Nectaire (F). Nectary, Honey-cup (E).
عضو غدي يتميز به بعض الازهار يفرز عصارة سكرية تدعى الرحيق او مغشَر الزهر يجربها النحل .
- ١٩٦٣٨ - غُدَّة العَرَكِي
Glande sudorifère, G. sudoripare (F). Sudoriferous gland, Sudoriparous gland (E).
- ١٩٦٣٩ - غُدَّة انْتِجَارِيَّة
Glande lysigène (F). Lysigenous gland (E).
- ١٩٦٤٠ - غُدَّة بَلْعَمِيَّة
هي البدة النخامية .
- ١٩٦٤١ - غُدَّة تَسَالِيَّة
Gonade (F). Gonad (E).
هي المنسل ، اطليه .
- ١٩٦٤٢ - غُدَّة ثَوْبِيَّة
Glande moriforme (F). Moriform gland (E).
- ١٩٦٤٣ - غُدَّة قَدِيَّة ، غُدَّة صَرَعِيَّة
Glande mammaire (F). Mammary gland (E).
- ١٩٦٤٤ - غُدَّة حَمَضِيَّة
Glande acide (F). Acid gland (E).
- ١٩٦٤٥ - غُدَّة دَبْرِيَّة
Glande uropygiale (F). Uropygial gland (E).
- ١٩٦٤٦ - غُدَّة دَرَقِيَّة
Glande thyroïde (F). Thyroid gland (E).
- ١٩٦٤٧ - غُدَّة دُهنِيَّة
Glande sébacée (F). Sebaceous gland (E).
- ١٩٦٤٨ - غُدَّة دَمَطِيَّة
Glande uropygiale (F). Uropygial gland (E).
- البدة الأنطية غدة ، مركزها في الزنك اي القطن ، تفرز مادة دهنية يستعملها الطائر في سفل ريشه . وتسمى أيضاً غدة دبورية .
- ١٩٦٤٩ - غُدَّة رَحِيْقِيَّة
Glande nectarifère (F). Nectariferous gland (E).

انواعه عديدة . سوقها قرماء . فرونها زياد اللحاء . اوراقها مسنقة ، ضمية ، ثلاثية التجميع . نصلها اهليلجي الشكل . مقعر الصفحة . انزهارها مثل التجميع ، طرفي الأركاز . انزهارها عشوية ، صغيرة القد ، صفراء اللون ، غصير الملمح .

Scyllium (S). - عُزَاب ١٩٦٨٨

Roussette, Chien de mer (F). Dog-fish (E). جنس اسماك بحرية من القرشيات . انواعه المروفة قليلة . اجسامها مسطحة ريشية . جلودها غشيت مدببة الحراشف . لحوها مأكولة متوسطة الصنف || اعرفها واشهرها الفراء المنشفة والفراء المدبجة .

Scyllium catulus (S). - عُزَاب هُدْبَجَة ١٩٦٨٩

Roussette à grandes taches (F). Lesser spotted (E). نوع من الفراء ، موطنها المتوسط والمحيط الاطلسي . تقول ثوبها الى الصبغة الصفراء ، يملؤها تديج لا يقاسي الرقشة واللون تكثر فيه الاستدارة والسواد البنفسجي الموحج .

Scyllium canalicula (S). - عُزَاب مُنْمَشَة ١٩٦٩٠

Roussette à petites taches (F). نوع من الفراء ، موطنها المتوسط والمحيط الاطلسي . تقول ثوبها الى الصبغة المنشفة بالكعب .

١٩٦٩١ - عُزَابِيَات ، كَوْسَجِيَّات

Scyllorhinidae, Orctolobidae (S).

Scyllorhinidae, Orctolobidae (F). Scyllorhinidae, Orctolobidae (E).

فصيلة اسماك مفترسة من رتبة الاضلاع . اجناسها المعروفة قليلة العدد منها البويض والسروين . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مسطحة وضمية الشكل . اعطائها ذلقة شارقة . اسنانها مشاربة حادة تقطع كل شيء . زعانفها كبيرة . تضيق زعانفها التليبية المعلقة التلاصقية الجرم اذ يفوق حجم الفلقة العليا ضمت حجم الفلقة السفلى || اشهر اجناسها الفراء والكوسج .

le Corbeau (F). - عُزَابِيَة ، خِيَمَاءِيَّات ١٩٦٩٢

Corvus (E). العزَاب والخيما واليابي اسمان للكركية جنوبية الموضع مركزها خلف الباطية على جنوب السك الاوزل || عدد نجومها سبعة والعرب تسميها حمة « عين الاسد » او « عرش السك الاوزل » او « الأحال » . ومن هذه الكركية نجمان مزدوجان الاول منها يدعى « خيما » او « سبا » او « مقار العزَاب » . والثاني يدعى « الجناح » او « جناح العزَاب الايمن » .

Corvus (S). - عُزَاب ١٩٦٩٣

Corbeau (F). Crow (E).

سمي غراباً لوساده . ج غرابان واغربة واغرب وغرب وغرابين . كنيته ابو حاتم وابو جسدات وابو الجراح وابو سذر وابو زيدان وابو زاجر وابو الشؤم وابو شيث وابو التمتعق وابو المزال . ويقال له ابن الارض وابن برح وابن داية . جنس طير من فصيلة الترابيات ورتبة الجواثم . انواعه ١٠ منتشرة في جميع اقطار العالم . اشهرها العزَاب الاسم والايقم والاصم والاكسل والاورق والراغ والتندل . معظما من الترابيات وبعضها من الاوابه . قوتها الحشرات والديدان والطيور والاسماك والقرشيات وبقدر الزرور والحبوب النانتة . تدن في الانجار الطويلة . انها تصنع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها .

١٩٦٩٤ - عُذَّة تَسْلِيَّة ، عُذَّة شَقِيَّة

Glandes génitales, G. sexuelles (F). Genital glands, Sexual glands (E).

هي التند التي تفرز المواد التناسلية من شلج وبيضات .

١٩٦٩٥ - عُذْرَاتِي ، عُذْرِي ، مُتَعَبِي

Palustre (F). Paludal (E).

نمت ترميني يطلق على كل نبات يعيش في البندان .

١٩٦٩٦ - عُذَقَة

Testa التلاف الخارجى البيضاء والبزرة .

١٩٦٩٧ - عُذَقِي

Pluie (F). Rain (E). الغلق هو المطر فاذا كثر قطره فهو غادق . وغدت الارض : ابتلت بالانق فاصعبت .

١٩٦٩٨ - عُذَقِي

Très fertile (F). Very fertile (E). نمت ترميني يدل على الفزارة .

١٩٦٩٩ - عُذِّي

Glandulaire, Adénoïde (F). Glandular, Adenoid (E).

١٩٦٨٠ - عُذْرِي

Limnétique (F). Limnetic (E).

نمت ترميني يطلق على كل ما له صلة بالبندان والمناقع والاهوار والبحيرات . كنوع كنبوت القندرية .

١٩٦٨١ - عُذَا

Urine du chameau النذا هو بول الجمال .

١٩٦٨٢ - عُذَام

Aliment هو ما به نما الجسم والحفاظ عليه وهو جزء للامدة الغذائية الذي يتحول منه الحيوان ، في جهاز الهضم ، الى مائع ينقل الى الدم فيغذي الجسم . وهو عند النبات ما يتحول الى الورقة من نسيج صاعد باعل الى نسيج سوي كاسل . (راجع حلف) .

١٩٦٨٣ - عُذَامَة

Brasénis (S). Brasénis (F). غذامة ج غدم وغدام . نبات وسيد الجنس والنوع من فصيلة النيليزيات . اعطائه منافع العالم القديم . ساقه قرماء تكسوها غمامة خضراء . اوراقه مسنقة ، سنائية تقول من ال ١٠ سم . وترعى من ٣ الى ٥ سم . نصلها مائل البشرة للاسمة - اخر الصفحة السفلى وسحر العليا . انزهار صغيرة القد ، قلعها نحو ١٠ سم . ثوبها الى القبياض الاخير || انزهارها يستمر من تموز الى اواخر الخريف .

١٩٦٨٤ - عُذِّي ، عُذْوِي

Factus النذى والنذوي : كل ما في بطون الحوامل اعصها لثاء .

١٩٦٨٥ - عُذْر

Abocquer (F). To feed (E). غر طائر قرعته اي رقه . للفرار : لرق .

١٩٦٨٦ - عُذْر

قال الانبزي : القَرَّ طير سود يبيض الرؤوس من طير الماء . الواحدة غرة . الفكر والاني في ذلك سواء (ابن سيدة) . والفكر الجميل هو الاصفهورة ، الحليبا .

١٩٦٨٧ - عُزَام

Peperomia (S). Pépérômie (F). Pepper elder (E). Pfeffergesicht (D).

Pope porporino (I). جنس نباتات حنينة عشوية معمرة من فصيلة الفلفلات .



عزَاب



عزَاب مدبجة



عزَام منشفة

١٩٧٠٤ - غُرَابِيَّات المَنَافِير (F). Coraciostes (F). رتيبة من الطيور الجوارح تشمل بعض النعشال. اشتهرا للقرابات والرزوديات.



غُرَاب أَبْعَج

١٩٧٠٥ - غُرَامَة ج. غُرَاد. غُرَاب من الكَلَامَة (الأسان).

١٩٧٠٦ - غُرَاوَة. غُرَاوَة. Interligne (F). Space-line, Lead (E).

المسافة بين الرزاق والرزاق أو بين السريف والسريف أو بين الخط والخط في الفرس للنسق المسطر.



غُرَاب اَبْعَج

١٩٧٠٧ - غُرَاوَة. Étoile du matin (F). Morning star (E). القُرَاوَة هو نجم الصبح لانه يطرأ بطرقت الفجر.

١٩٧٠٨ - غُرَاوَة. Gratiola (F). Gratiola (S). جنس نباتات عشبية برية مسرة من فصيلة الخنازيريات. انواعها نحو ٢٠ منتشرة في جميع الاصقاع الممتدة الحارة. اوراقها متقابلة خاسنة ثلاثية أو خمسية البروق، اعطيلجية لتصل المسن الحافة. ازهارها فردية ابطية ثنائية اللون يعلب فيها الاصفر والوردي || اشهر انواعها الغراسيول الحنزينة.



غُرَاب اَبْعَج

١٩٧٠٩ - غُرَاوَة مَعْرِيلَة. حَفِيْظَة. القُرَاوَة، عَشْبَة القُرَاوَة

Gratiola officinalis (S). Gratiola officinale, Herbe au pauvre homme (F). Hedge hyssop, Poor-man's herb (E). Echta Gnsdenkraut (D). Gratiola, Piccola digitalis (I).

نوع من الغراسيول وهو نبات عشبي بري ممر جلمودي يعيش في الشامات وحل شفات الماء يملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه اعطيلجية شيفقة لتصل. ازهارها ابطية منتجة صفراء اللون، وريدة الصفحة || يستعمل كمناع مع العلم انه من النباتات السامة التي توجب الحذر.



غُرَاب الدَرَج

١٩٧١٠ - غُرَام. Gramme (F). Gramme, Gram (E). وحدة وزنية، الألف منها يساوي كيلوغرام.



غُرَاب لَبْنَانِي

١٩٧١١ - غُرَامَة. Amende, Pénalité (F). جزاء نقدي يفرض بصفة عقوبة. Fine, Penalty (E).

١٩٧١٢ - غُرَامَة إِجْرَائِيَّة. Amende de procédure (F). Fine of procedure (E). نوع من الغرامات المدنية تفرض لقضاء سير الإجراءات سيرا منتظما.

١٩٧١٣ - غُرَامَة جِنَائِيَّة. Amende pénale (F). Penal fine (E). عقوبة مالية تكون اضافية في الجنايات. واسلية أو اضافية في الجنح. ودائما اصلية في المخالفات. وهي تترجم المحكوم عليه ان يدفع مبلغا من المال الى الخزنة العامة.



غُرَاوَة غُرَاوَة

١٩٧١٤ - غُرَامَة مَدِينَة. Amende civile (F). Civil fine (E). هي الغرامة التي تحكم بها اسدى المحاكم المدنية بناء على ما نص عليه القانون المدني.

١٩٦١٤ - غُرَاب اَبْعَج * غُرَاب الَبَيْتَن، قَلَق Corvus cornix (S). Corneille mantelée, C. pendrée, Corbeau mantelé (F). Hooded crow, Gray-back crow (E). Nebelkrähe (D).

طائر من القربان القرموط. جسمه متوسط القد، يعلو نحو ٥٥ سم. رأسه وصدره وبقاعه وسفطاه وذنبه ورجلاه الى السواد المايق. ظهره وبطنه ابيض الى الفربدة المشطاه. سره كثير البند. يألف الخمول والسهول وصفات الانحر وشواطئ البحار.

١٩٦١٥ - غُرَاب اَسْمَم * غُرَاب لُوحِي Corvus corax (S). Corbeau commun, Grand corbeau (F). Common crow, Common raven (E).

طائر من القربان الاوابد جسمه كبير القد، طوله نحو ٦٥ سم. وبطنه نحو ١٠٥ سم. نوبه اسود اللون السوي اللامع يعلو حواج متداخل الحفرة والحرة || يألف الاجراع والجبال. يعيش اوزاجا لما مرتمها تحميم من اعتداه غيرها. قوته الحشرات والديدان والفضاء والقثبان والفضاد ويص الصنابير والحبوب والذباب الناتش.

١٩٦١٦ - غُرَاب اَعْمَم * Pyrrhocorax pyrrhocorax (S). Corbin crève (F). Carrion-crow (E).

طائر من القربان القرموط الجلف، طوله نحو ٤٢ سم. ثوبه اسود اللون السوي اللامع. منقاره ورجلاه الى الحرة، يألف سرود الجبال وهو حزين الجوده قيل له: « اعر من القربان الاصمم ».

١٩٦١٧ - غُرَاب الزَّوْع * غُرَاب اَوْرَق، شُوْلَك Corvus monedula (S). Corbeau choucas, Choucas (F). Jackdaw (E).

طائر من القربان القرموط صغير الجلف، طوله نحو ٣٦ سم. رأسه وظهوره وسفطاه وذنبه الى السواد الفصحي اللامع. صفه وصدره وبطنه الى الكهكة الطحلاء || يعيش جهادات كبيرة. سره كثير البند. يألف الاجراع المبرشة للشجر والبيوت الخربة والمنازل الصخرية. قوته الحشرات والديدان والحبوب والذباب الناتش.

١٩٦١٨ - غُرَاب القَيْظ. هو لنداف، اطله.

١٩٦١٩ - غُرَاب اللَّيْل. هو واثق الشجر، اطله.

١٩٧٠٠ - غُرَاب المَاء. هو اثناق وثاق الماء.

١٩٧٠١ - غُرَاب لُبْنَانِي * دُمْتَ Pyrrhocorax graculus (S). Corbin chocard (F). Chough (E).

طائر من القربان الاوابد صغير الجلف، طوله نحو ٤٠ سم. ثوبه اسود اللون يلمع بخضرة وزرقه. منقاره الى الصفرة. رجلاه الى الحرة. موطنه البلاد اللبانية ويروها. يألف الجبال في الصيف ويعيش على الشطوط في الشتاء. سره متوسط العدد. قوته الحشرات والديدان والذباب والحبوب الناتشة.

١٩٧٠٢ - غُرَايِي. Corscolide (F). Corscolid (E).

١٩٧٠٣ - غُرَايَّات. Corvidae (S). Corvidés (E). Corvidae (E).

فصيلة القربان من الجوارح القربانية للناثير. فيها القربان والنداف والغلق والنع.

١٩٧١٥ - غرانيث Granit (F). Granite (E).

هو الأمل، صخر بلوري شديد الصلابة متجانس الألوان يتكون من الفلسبا والفلق والرو .

١٩٧١٦ - غرانيثي ، ستاتي ، صواني Granitic (F). Granitic (E).

نمت تعريتي يطلق على ما هو صواني التركيب .

١٩٧١٧ - غروب - هو المحور القرائي ، اطلبه .

١٩٧١٨ - غروب

الغروب : داء يصيب الشاة فيتمتع غرطوها ويسقط منه شعر العين (السان) .

١٩٧١٩ - غربال Crible (F). Sieve, Riddle (E).

سيرة غريق الزواطي .

١٩٧٢٠ - غربالي Cribiforme (F). Cribiform (E).

١٩٧٢١ - غربلكة Criblage (F). Sifting (E).

تفرير الحبوب عن الثلب والاجرام الغريبة .

١٩٧٢٢ - غروبوس Cymothos (S).

Cymothos, Poux de poisson (F).

جنس دوبيات بحرية من القشريات مساويات الارجل وفصيلة الغروبوسات ، انواعه المروعة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه مبطلة ، قروية الشبه المبطلة ، طولها من ٣ الى ٥ سم . منها انواع تصطف على الاسماك .

١٩٧٢٣ - غروبوسيات Cymothoidae (S).

Cymothoides (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات مساويات الارجل ، اجسامها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها املجية مبطلة شبيهة باجسام الحدية طولها من ٥ الى ٥٠ سم . اخطامها مجهزة بدهة ماسة || بعض اجسامها يتطفل على الاسماك .

١٩٧٢٤ - غروبوس الجروح Grypotes (F).

Grypotes silvestris (S). Grypotes des forêts (F).

حشرة من فصيلة الوزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة ، جسمها صغير اللد يطول نحو ٥ سم . || رأسها مستعرض ، قليل النتوء ، اصفر اللون ، غطتها مثل الطول ، عينها كبيرتان ، زباناها قصيران ، نحيلان ، كولها بيضي الشكل ، اصفر اللون اسمر اللون . حنجرتها مزوانية ، صفراء ، ظهرها كامل الخشبية ، لاصف ، اخضر اللون ، بني اللون ، ووشاتها عشائيان ، شفافان . بطها الى الخلفي الاسمر . قوائمها كثيرة الملب الشائك || تألف الجروح اخصها جراح الصنوبر .

١٩٧٢٥ - غروبوس القصور Grypotes (F).

Grypotes puncticollis (S).

حشرة من فصيلة الوزيديات صغيرة اللد ، طولها نحو ٤ سم . جسمها مثالي الشكل ، زباناها خيطية مستطيلة ، ثوبها الى الصفار الخشن الناعم ، مرتها الصنوبر على اختلاف انواعه ، يكثر وجودها من نحو الى تشرين الاول ، اضرارها زعيدة لا تستجيب للعناية .



غروب الصنوبر



غريل



غرة



غرة جميلة

١٩٧٢٦ - غريبيل Cancellaria (S).

غريب من متب الثالوث المشهور وهو ارق النبت واثمه سواد .

١٩٧٢٧ - غريبيل Cancellaire (F). Cancellaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة الغريبليات . انواعه المروعة كثيرة المدد بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة والطيانية والبعض الآخر الذي يتناثر المنة ماصر منتشر في جميع بحار البلاد الحارة || اصداها شبه بيضية الشكل او بربجية ، ذلقة الاحقاب ، مضغنة الاريفة ، فربية القروعة ، مشبكة الصفحات الحارابية المبقعة بالالوان المابقة .

١٩٧٢٨ - غريبليات Cancellariidae (S).

Cancellariids (F). Cancellariidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل مشطيات الخياشيم . اجسامها وانواعها المروعة عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الحارة . جميعها رابدة تعيش على التبت البحرية || اصداها شبه بيضية الشكل ذلقة الاحقاب المزلنة ، صغيرة الاجسام المستطيلة ، قصيرة الرؤوس ، ثنائية القواس الشديدة الانفتاح ، صغيرة الارجل المزوانية الشكل || اعرف اجناسها الغريل .

١٩٧٢٩ - غرة Sison (S).

Sison amomum (S). Sison amomum, Berle aromatique (F). Bastard stone parsley, Hedge sison (E). Amomlein, Würziger Herrukümmel (D). Sisona, Amomo falso (I).

عشبة برية من فصيلة الصيرليات ، جذورها وثمارها عطرية طيبة ، كانت ولا تزال تستعمل كقوية . منها بعض مناطق حوض البحر المتوسط . توجد بين الدروع وقرب السيقان وجاري اللد || اوراقها متعاقبة ، مركبة . وريقاتها ودية التجميع ، مقروعة النصل . ثمارها جراء عديدة سكونة الطرف .

١٩٧٣٠ - غرة Fulca (S). Foulque (F). Coot (E).

الفر والفرج غر . جنس طيور مائية من فصيلة الطليقيات . انواعه ١٢ منتشرة في جميع اصقاع العالم . تتميز بمقاومتها القوية للمدبة الطرف . رؤوسها مدببة المربعة . اجسامها ثائرة وقصيرة . اذنانها صغيرة مستديرة . ارساها قروية . غالبا مستطيلة || اشهر انواعها الفر السواد والفر المتوجة .

١٩٧٣١ - غرة جميلة Anthocharis (S).

Anthocharis eupheno (S).

Anthocharis des crucifères, Aurore de Provence (F).

Anthocharis eupheno (E).

حشرة من فصيلة الكرونيات ورتبة حشرليات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها واضحة قويا رقيق الازهار . سرها تعيش على اوراق الصليقيات البرية والزراعية || جسمها مستطيل اللد يطول نحو ١٤ سم . يسطها نحو ٤٢ سم . رأسها اريد . عينها كبيرتان . زباناها صولجانيان . جوشها الى الطحلة الرصاصية اللوح . بطها الى الرتبة الاسمره || ووشاتها الاماميان ، منه الاكر ، الى الصفرة يملوها من الزام الثالث الى الطرف مشعة برتقالية نارية يطلوها اطار اسود .



غُرَّة سوداء

الناطق الحارة . أوراتها ابيدة و متعاقبة ، معتقة . نصلها جامد الصلابة ورائحتها . ازمارها فردية التجميع ، جميلة الشكل ، يضاء اللون ، فؤادة العرف الطوري المستتب . ثمارها صباغية ، غصنها احر اللون او اصفر || أشهر انواعها الثريونية ما يلي :

١٩٧٣٨ - غُرْدُونِيَّة قَسْمَرَجِيَّة

Gardenia thunbergia (S). *Gardénia de Thunberg* (F).
جنبة جاسدة ، مهدا بلاد افريقية الجنوبية . ساقها تملو نحو ٣٠٠ سم . أوراتها سائبة الشكل ، حلقية عايق اخضر اللامع . ازمارها طرفية الانكثار . حلوة الرائحة ، ثمانية كليلات البيض ، توجها اسطواني الانبوب ، خماسي او سداسي للتشريح الطولي || ازمارها يستمر من كانون الثاني الى آذار .

١٩٧٣٩ - غُرْدُونِيَّة وِسْبَانِيَّة

Gardenia rothmannii (S). *Gardénia de Rothmann* (F).
جنبة سرية مهدا بلاد افريقية الجنوبية . ساقها تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . أوراتها اعليجية الشكل ، نصلها فسفي اخضر الزاهي . ازمارها متوسطة القد ، عطرية الرائحة المستحبة ، سداسية البتلات البيض || ازمارها يستمر طوال شهر تموز .



فُرَيْل المنصف

١٩٧٤٠ - غُرْدُونِيَّة كِبَرَةُ الزهر * - غُرْدُونِيَّة

Gardenia jasminodes, G. *ياسمينية*
florida (S). *Gardénia à grandes fleurs* (F).
جنبة سرية شائعة الانتشار التريسي . مهدا الصين . تملو نحو ٢٠٠ سم . أوراتها اعليجية تملو من ٧ الى ٩ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ سم . نصلها جبل اخضر اللامع الزاهي . ازمارها فؤادة العرف الطوري ، تلو يضاء اللون ثم تتحرف الى الصفرة وهي كبيرة الحجم قطرها نحو ١٠ سم || ازمارها يستمر من اوائل تموز الى اواخر آب .



غُرْدُونِيَّة كِبَرَةُ الزهر

١٩٧٤١ - غُرْدُونِيَّة مَحْدُوكَة

Gardenia radicans (S). *Gardénia radicans* (F).
بجلة صغيرة للحد شائعة الانتشار التريسي . مهدا اليابان . تملو نحو ٦٠ سم . ساقها بجذارة . أوراتها سنائية لامة النصل . ازمارها فؤادة العرف الطوري . توجها اسطوانية ، بتلاتها عاجية ، منها البسيطة ومنها المكسبة || ازمارها يستمر من آذار الى حزيران .

١٩٧٤٢ - غُرْدُونِيَّة

Gordonia (S). *Gordonia* (F). *غردونية*
جنس نباتات معقودة التشريف على اسم المشتال الانكليزي « غردون » وهي من فصيلة الكاسليات . انواعها المعروفة ١٠ مهدا الشرق وبلاد الامريكية . منها القدية والارضية والتريونية . أوراتها ابيدة او عابلة و متعاقبة ، معتقة ، جامدة النصل الجلدي . ازمارها فردية التجميع ، لا قياسية الانكثار و يضاء اللون ، مستحبة العرف الطوري || أشهر انواعها ما يلي :

١٩٧٤٣ - غُرْدُونِيَّة خَمْليَّة الزهر *

Gordonia lasianthus (S). *Gordonia à fleurs velues* (F).
نوع من القردونية وهي جنبة سرية شائعة الانتشار التريسي تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . أوراتها ابيدة سنائية الشكل تملو من ٨ الى ١٣ سم . وتعرض ٣ الى ٥ سم . نصلها مائل البشرة ، مشطاري الحافة ، ياحت اخضر الفاتح . ازمارها يضاء اللون ، كبيرة القد ، قطرها نحو ١٠ سم . بتلاتها خلية البشرة . عرفها ذي الرائحة القوياسة || ازمارها يستمر من آب الى تشرين الثاني .



غُرْدُونِيَّة خَمْليَّة الزهر

ورما عند الاثنى الى البياض الاغبر الاصفر تملو في الزمان الرابع شمس طلال يقابلها هلال صغير اسود . وثنائها الخلفيان ، عند الشقين ، الى البياض الاغبر الاصفر المزاج تملو رفقة سحابة خفيفة وست نعل سد هاشية الانكثار || لها جبل واحد في الحبل . تظهر القشرة في نيسان . تسرح في النهار . تعاضل بعد ظهورها ستة اسابيع وتتبع المكان لطفا مستطيلة على نصل الاوراق || السرة تملو نحو ٣٤ سم . جسمها اسطواني الجرم ، مائل التشعار ، يملو حل قصير . ثوبها الى الطحلة السبورية المزاج يملو خطان جانبيان ابيضان وعشرة اطواق تحلة تنتهي عند اللب . اطواقها الى السرة السوداء . رأسها ومذنها ورواجها الى الربعة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٤ اسبوعا ينتهي ضمن غشاء متين داخل لفافة من الاوراق المفتولة .

١٩٧٣٢ - غُرَّة صَوْدَاة *

Fulica atra (S). *Foulque noire*, F. *morelle*, *Macroule* (F). *Common coot* (E).

طائر من الدر ، موطنه فسبح الاجرام يمتد من الشرق الى اربية و افريقية . يعيش جماعات كبيرة العدد . سر به يشل عدة مئات . طوله جثة يراوح بين ٣ و ٤٥ سم . رأسه ومنقه الى السواد المايق . ظهيرة وجناحه وذنبه الى السواد الرصاصي المزاج . بطنه وغوافيه الى السواد الازرق . جيته غير العجيبة . منقاره وذي اللون ، عتاده قرزي يتان . ساقاه وباطنيان تملوهما سلكة مستعرضة جزوية اللون غصراء المزاج || يائف النامق والبيحيرات . قوته الاغراض والنباتات المائية . يمش في شط يقيه على سطح الماء بين القصب والذرا والاسل وما اشبه . انشاء تصع من ٧ الى ١٥ بيضة تحضنها ويحدا نحو ثلاثة اسابيع .

١٩٧٣٣ - فُرَيْل الصَّفَصاف *

Gracila minuta (S). *Gracila de l'osier* (F).

حشرة خائبة من فصيلة القزليات . طولها يراوح من ٤ الى ٦ سم . جسمها مستطيل الشكل سوي اللون الاخر المزاج || تظهر الحشرة الجملة في شهر تموز وتتبع مكانها بعد التماثل ، في خلال شهر آب ، حل مختلف الميادان للقطرة من فضي الكليات والوقديات واغصنها الصفصاف والكستناء . يرتقيها فبراير اللون سمراء الرأس تميل على فنتان ويبدان النباتات المدكورة تضطها وتمنع استعمالها الصناعي .

١٩٧٣٤ - غُرْدُونِيَّة

في الجتم جنس اشجار من الكلوزيات .

١٩٧٣٥ - غُرْدُونِيَّة

Gazouiller (F). *To chirp* (E). *غرد الطائر* او *زقزق* : يغ صوته وطرب به او عند

١٩٧٣٦ - غُرْدُونِيَّة

Pharmacologie (F). *Pharmacology* (E).
علم اصول الادوية ونظريات قواعدها وطرق استعمالها .

١٩٧٣٧ - غُرْدُونِيَّة ، غُرْدُونِيَّة

Gardénia, *Gardénia*, *jardin du Cap* (F). *Cape-jasmine*, *Gardenia* (E). *Algenreichte gardenia* (D). *Gardénia* (I).

جنس نباتات برية وتريونية من فصيلة القويبات . انواعها نحو ٥٠ منها الشجيرات والجنبات . جميعها من نباتات

اختلفة ، يكثر فيها الطيب الأصفر والليسانت الوردية التي تعتبر كأساس النوع || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٩٧٥٠ - حُرْدُونِيَّة يَحْمُورِيَّة

Pyrethrum tchihatchewi (S). *Pyréthre gazonnant* (F).
نوع من الحُرْدُون وهو عشبة معمرة عديمة الساق ، خلية الاضواء تملو من ١٥ الى ١٠ سم . اوراقها خيطية التفريص . رواسبها الزهرية فردية التجميع تقوم على شراخ قرمي الانتفاخ || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

Garidella (S). **١٩٧٥١ - حُرْدُونِيَّة**
Garidelle (F). *Garidella* (E).

جنس نباتات عشبية ، حولية ، برية ، مفترية من فصيلة الفقيقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منها يتد من الشرق الاوسط الى اوروبا || سوقها عديمة الفروع او قليلتها تنتهي بالازهار . اوراقها متعاقبة ، مفصلة الى غرق خطية او شمعية . ازهارها خالصة التركيب . يتلها كلوية الشكل ، متجمعة ، صفراء اللون || تنموها ربيعي

Gardénia (F). **١٩٧٥٢ - حُرْدُونِيَّة**
هي النردية ، اطلبها .

Aléa (F). *Chance* (E). **١٩٧٥٣ - حُرْدُون**
هو احتمال حدوث شيء غير مضمون .

١٩٧٥٤ - حُرْدُون هو العلم ، اطلبه .

١٩٧٥٥ - حُرْدُون هو القنداء ، اطلبه .

Equisetum (S). **١٩٧٥٦ - حُرْدُونِيَّة**
Equisette (F). *Horsetail* (E).

هي الكنبات ينبت على شواطئ الأنهار لا ورق له وهو ذو امصاص النورية ، الواحدة في جوف الاخرى فاذا اجتلبتها خرجت كأنها خفافس اخرج من مكحلة . ج حُرْدُون .

Implant (F). **١٩٧٥٧ - حُرْدُونِيَّة**
اسم يطلق على النباتات القوية وعلى مركبات الحرمون التي تستعمل في التبييض الخلوي تحت الجلد .

١٩٧٥٨ - حُرْدُونِيَّة ، **حُرْدُون** ، **هَيْتْرَا**

Galiotis barbara (S). **١٩٧٥٩ - حُرْدُونِيَّة**
Grisson talra, *Huron*, *Myrase* (F).

حيوان لاحم مفترس من فصيلة السورديات . موطنه بعض مناطق امريكا الوسطى والبرازيل . يألف الاحراج والسياب القريبة العشب . ملجئه الحيواني جامي . جماعته تعد من ٦ ازواج الى ١٢ زوجاً || جسمه ابيض الشكل مستطيل . طوله نحو ١١٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٥٠ سم . رأسه معتدل الحجم والمنحرف . عيانه واذناه صغيرتان مستديرتان . سبيله معتدل الكثافة والطول . قوامه قصير . براءته حادة الاطراف القليلة التمييز . غذاه اللشبية تفرز مادة دهنية سكية العرف . وبره ناعم وقصير . ثوبه الى الشبهة السمراء السرية || الانثى تضع من جبرون الى ثلاثة جراء مرة واحدة في الحول || مسرعه جدوي . يتولد بصفة دائمة ويتسلق الاجسام بمنفعة . قوته كل ما استطاع اليه ميلا من الحيوان والطير .

Gordonia altamaha (S). **١٩٧٤١ - حُرْدُونِيَّة زَيَاة**
Gordone de l'Altamaha (F).

شجرة من الحردونية تملو نحو ٥ امتار . مهدا البلاد الارشكية . اوراقها عابلة اهلجية الشكل ، مقبوضة القاعدة ، طول من ١٥ الى ١٠ سم . وتفرس من ٣ الى ٥ سم . نصلها سنن الحافة ، ازغب الصفحة السفلى ، عمر في الحريف . ازهارها كبيرة القند مستعرضة ، قطرها نحو ٨ سم . زهرها بنفسجي الرائحة || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين .

١٩٧٤٥ - حُرْدُونِيَّة محوَرِيَّة الزهر
Gordonia axillaris, *G. anemala* (S). *Gordone à fleurs axillaires* (F).

نوع من الحردونية وهي جنبة سريرية صغيرة القند تملو نحو ١٠٠ سم . مهدا الصين . اوراقها ابيدة سنانية النصل . طول من ٨ الى ١٥ سم . ازهارها عابلية اللون ، كبيرة القند ، محورية الارتكاز ، ذكية العرف || ازهارها يستمر طوال شهر تشرين الثاني .

١٩٧٤٦ - حُرْدُونِيَّة ، **حَشِيَّة الحصى**
Pyrethrum (S).

Pyréthre (F). *Pyrethrum*, *Fever-few* (E). *Bertrame*, *Bertramawurz*, *Rote wucherblume* (D). *Piretro* (I).
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة المركبات الابنوبية الزهر . انواعها عديدة تشبه الاضواء منها الطبية والزريرية والسماعية التي يستخرج من زهورها بحد طعمها مسروق جميل المادة شديد الفاعلية يستعمل في القضاء على الحشرات . ومن قائل ان الانواع الطبية تستعمل في علاج بعض الحشرات اخصها المعاداة . جذورها غزيرة للمادة الفعالة ، شائعة الاستعمال الطبي || شهر انواعها ما يلي .

١٩٧٤٧ - حُرْدُونِيَّة شَرْوِيَّة
Pyrethrum cinerariaefolium (S). *Pyréthre à feuilles de cinéraire* (F).

نوع من الحردوب وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقها كبيرة القند ، قوية العرف ، ثلاثية التفريص . والسنين ، رباعية الفروق المتوازية المخطوط . نصلها خلي الصفحة السفلى ، فصي اللون . رؤسها الزهرية كبيرة القند قطرها يراوح بين ٤ و ٦ سم . زهورها كثيفة القند الدهنية يحضر منها مسروق الحردوب الذي يدخل في تركيب بعض الحواشير || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٩٧٤٨ - حُرْدُونِيَّة مشحَلَر
Pyrethrum uliginosum (S). *Pyréthre cardif* (F).

نوع من الحردوب وهو بجملة معمرة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها قزواء فناء . اوراقها سنانية ذلقة تملو من ٦ الى ١٠ سم . نصلها لادن الصفحة المتشاربة الحافة . رؤسها الزهرية صوانية التجميع ، كبيرة القند ، قطرها يراوح بين ٨ و ١٠ سم . ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

١٩٧٤٩ - حُرْدُونِيَّة وَرْدِيَّة
Pyrethrum roseum (S). *Pyréthre rose* (F).

نوع من الحردوب وهو نبات شحي معمر شائع الاستعمال الزريري . غرضه الزراعية زهاء ٧٠٠ تملو من ٣ الى ٧٥ سم . اوراقه لا تباينة التفريص . نصلها ماس البشرة اخضر اللون . رؤسها الزهرية عديدة الالوان المتباينة



حردوب



حزون



غرشاة

من الملب اللبظ الجامد تحت مكان الرعة وبطوق من الریش للشمش ركب قاعة المقت. ثوبه الى السواد اللامع ، يملو توشم ابيض مقبوض والحجم .

١٩٧٦٧ - غُرغُر لُتْبِرَاكِي (S). *Numida cristata*

Pintade huppée (F).

طائر من الغرغر . موطنه حوض الزبير ، يتميز بقبضته السوداء وبشبه الأريه الرصاصي اللامع الغليل التوشم . مستقره .

١٩٧٦٨ - غُرغُر مَشْكَلَس * *Numida mitrata* (S). *Pintade mitrée* (F).

طائر من الغرغر يتميز برقه القلبي اللحمية الخوي الشكل . ثوبه الى السواد اللامع يملو توشم ابيض ويكاد يكون تيقبها . موطنه افريقية الوسطى والشرقية .



غرها الزوال

١٩٧٦٩ - غُرغُر مَعْرُوف * *Numida meleagris* (S). *Pintade vulgaire*, *P. commune* (F).

طائر من الغرغر البري والداجن . سلالاته عديدة فوارها كثرة والحجم وكثرة البيض . منها الأبيض والبيضي والاحمر والاسود والاربد والمقرش . جميعها سهلة التدجين والريية . منها سلالات تبض في السنة نحو ٨٠ بيضة . يتناسب مع الدجاج والحش والملاوس . هجته جميلة الاشكال لا تختلف من الانسجام اللوني المألوف .

١٩٧٧٠ - غُرغُر لُتْبِرَاكِي (S). *Numida vulturina* (S). *Pintade vulturin*, *P. royale*, *P. vulturina* (F).

طائر من الغرغر ، جسمه حجم الدجاجة الكبيرة ، رأسه امط الجله المجد الاروق اللون ، يحمل عند فنته طرة من الريش البنام النقيق القصير . جوده ملتح بردة من الريش الطويل الاروق المفلح بالايض . ثوبه الى البدة الزرقاء يملو توشم ابيض . موطنه شمالي شرقي افريقية .

١٩٧٧١ - غُرغُرِيَات *Numididae* (S).

Numididae (F). *Numididae* (E).

فصيلة طير وحيدة الجنس من رتبة الدجاجيات . طيورها ربة الجفة ، دقيقة المقت ، صغيرة الرأس النتوج ، قوية المنقار الحاد الطرف ، صغيرة الجانح والذيل المكور الساقط ، متعددة الريش الاطلس العادم الصعبة . ثوبها سوي اللون الموشم . موطنها افريقية والجزر المجاورة كنفسكر وغيرها . تألف الدجاجة والدرج . اسرارها متوسطة البند . قوتها الجبوب والثار والنباتي والخمرات . يعضها الاشجار والصخور الثلاثة الزرقية . انثاهما تبض نحو ١٢ بيضة تحضنها بسعها في انصوص ترصمه بالحشيش والورق .

١٩٧٧٢ - غُرغُور * *Gerrhonotus* (S).

Gerrhonotus (F).

جنس حذاء من فصيلة الجوروريات . انواعه المعروفة نحو ١٥ ، طولها يراوح بين ٢٥ و ٣٠ سم . انثاهما الى السرة يملوها يتجلىع اسود ورفقة بيضاء . موطنها البلاد الحارة . تألف الاساكن الصخرية .

١٩٧٧٣ - غُرغُور * *Gorgonia* (S).

Gorgonia (F). *Gorgonia* (E).

جنس حويئات بحرية وركية راحة من فصيلة الغرغوريات . انواعه المعروفة قليلة العدد لكنها منتشرة في سطح محار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . مستعملاها قروية الشبه



غرغون

١٩٧٥٩ - غُرغُور * *Plantation* (F).

Planting (E).

هو زرع الغراس في التربة . وقد يتم على عدة اشكال : زينة ورميمات وخسعات .

١٩٧٦٠ - غُرغُور * *Plant, Plante* (F). *Plant, Slip* (E).

كل نبات قتي صغير له جذور يمكن نقله وقره في مستقره .

١٩٧٦١ - غُرغُور * *Anisosticta novemdecim punctata* (S).

Anisosticta à dix-neuf points (F). *Anisosticta novemdecim punctata* (E).

حشرة خاتمة من فصيلة النصبقيات ورتبة ملبدات الاجنسة . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى واروبه . تألف المولتج الرطبة وضفاف مجاري الماء . خنافسها ويرقاتها تعيش على الارق والقزريات والمنغريات . جسمها صغير القه يطول من ٣ الى ٤ سم . ثوبها الى الصفار الباهت الاصهب المبراج يعلو تنقيط اسود في الكوكيل والظهران . الكوكيل يصل ٦ نقط سود والظهران يصل ٢١ نقطة منها ١٠ نقط في كل غمد ونقطة صفية مشتركة تلمس الجناحة . رأسها صغير القه . عينهاا كبيرتان . زباناها صغيتان . اسافلها رباعية النعل . الانثى ابيض قدام من الذكر وانصر زباناها منه واكد ثوبا . لها ثلاثة اجبال في الحول . تخرج الحشرة الجملانة من بيئاتها الخشوي في اوائل الربيع . تسرح في النهار وتبيت في الليل . البقرة عت بلونها البادك التام تطول نحو ٥ سم . ثوبها الى السرة القاتمة يعلوها خل اصهب .

١٩٧٦٢ - غُرغُور * *Gargaria gonistae* (S). *Gargaria du genre* (F).

حشرة من لفصليات الاجنسة المتجانسة لفصيلة الدجاجيات . يكثر ويبدوها في البلاد الحارة . جسمها صغير القه . فيه غرغولي الشكل ، اسر القن . رأسها محدد عريض . شكلها قصير . ذرب الاطراف . عينهاا مكورتان . ناشرتان . كوسلها شبه جلولي الشكل تملو الخلف جانبية مديبة . ورشهاا لاسعة ثقبية اللون . قوتهاا خيشة تمكها من القفز . تعيش على الزوال وتمان كل موضع تقيم فيه .

١٩٧٦٤ - غُرغُور * *Numida* (S).

Numida (F). *Guinea-fowl* (E).

جنس طير من الغرغوريات . انواعه حسة جميعها افريقية للهد متشابة الحجم ، متقاربة الشكل . اجسامها ربة . متاقهرها ذرية ، حادة الطرف . اجنسها واذناها قصيرة . لثواها سوية اللون موشمة وجميلة .

١٩٧٦٦ - غُرغُر الحَشَكَة *Numida pitlorhynchos* (S). *Pintade pitlorhynche*, *P. à pinceau*, *Poule africaine* (F).

طائر من الغرغر . موطنه افريقية الشرقية . يتميز بلسة

ثمادها مختلفة الاشكال || اشهر انواعها غشب الانثياء وغشب القديسين والقرق والغلاب .

١٩٧٨٥ - غُرُقَلْ

غرقت البيشة : مذرت . والبليخ فسد ما في جوده .

١٩٧٨٦ - غُرُقُلَاخَة *
Garrulaxe (S). Garrulaxe (F). Garrulaxe (E).

طائر من فصيلة التيليات لاقتات التندل وربة الجرائم . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى ادفى وافريقية الشرقية وبنجارية ، تنجوا فخاباً واياباً في سبيل المصيف والمشتى . تألف الادغال والاحراج الميمنة الانجار || جسمها متوسط القد يطول نحو ٢٠ سم . لونها العلوي الى الشقعة الموشمة بالاسمر . واسها متوج بكشة معتدلة الحجم ، عاجية اللون . عتقا وصدرها الى البياض المائجي . بطنها وزمكاها الى البياض الاغبر . متقاد دقيق الجرم ، معتدل الطول ، شديد السرة . عينها صغيرتان عسليتان . جناحها معتدل الطول ، ذاق الطوف . ذنبها مستدير الطوف . رسماها دقيقان ، امحزان || طيرانها خفيف الحركة ، بيه الكسوط . قوتها التندل والاساربع والديدان والثمار العنقية || تدنن عشها في الدغل الكثيف على ارتفاع متر او مترين من سطح الارض . الاثنى تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوماً .

١٩٧٨٧ - غُرُمِيس *
Grammistes (S). Grammistes (F). Grammistes (E).

جنس اسماك بحرية من شاكيات الزعانف وفصيلة الغرغيات . انواعه المعروفة قليلة البدن اصطناعا بعض بحار المناطق الحارة اخضعها البحر الاحمر والمحيط الهندي || اجسامها صغيرة القد ، اعطليجية الشكل ، معتدلة التبطيط ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . اولياها قراوح من الركة الى الخضر الانس ، يطولها تحطيط قاطب ثلاثي الخطوط الغضبية او الحنية . وذووها كبيرة . اشداها رنية الانفراج . حيوها جاسطة . زعانفها الظهريه الاولى شاككة المناس . زعانفها القبلية مستديرة الاطراف || لحوها كاعنة الصنت قل من يرغب فيها .

١٩٧٨٨ - غُرُنْ
Corbeau (mâle) (F). Crow (male) (E).

هو الغراب الذكر .

١٩٧٨٩ - غُرُنَابٌ ، غُرُنَابْ
Corvultur (S). Corbivau, Corbeau-vautour (F). Corvultur (E).

جنس طير من الجرائم سفليات الناقير وفصيلة الغرغيات . له نوعان ، الغرناب الابيض المتق والغرناب الغليظ المتقاد . موطنها بعض المناطق الحارة من القارة الافريقية . يتميزان بكير الجسم وارتفاع القوائم وفلاظة المنقاد ويسودان اللون || قوتها الجيف والعضاء والورز والجردان والذئران والشفادوع والحشرات والديدان .

١٩٧٩٠ - غُرُنَابٌ غَلِيظٌ لِلنَّقَادِ *

Corvultur crassirostris (S). Corbivau à gros bec, C. d'Abyssinie (F). Abyssinian corvultur (E).

نوع من الغرناب . اصطناعه فصيلة الابرياء تمت من مؤوس البحر الاحمر الى الكنتو . جسمه كير القد يطول نحو ٨٥ سم . بسطه لا يقل عن ١٥٠ سم . متقاد ضخم غليظ . ثوبه الى السواد الغصبي يطول موج اخضر وازرق .

بمستمرات المرجان . لونه قراوح من الابيض القدس الى المرجاني الباهت ، ومن الابيض الاطلل الى الاخضر الامس .

١٩٧٧٤ - غُرُوبِيَّات *
Gorgonidae (S). Gorgonidae (F). Gorgonidae (E).

فصيلة حويئات بحرية من المزاريات الملوينات . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميعها المويئات الركية الرامحة على الصخور اخضعها صخور القاع || اشهر اجناسها القرفون .

١٩٧٧٥ - غُرُوفْ
Feuilles caduques (F). Deciduous leaves (E).

ورق الشجر حامة وورق الاجار الغنيفة خاصة .

١٩٧٧٦ - غُرُوفْ شجر يدنغ به (اللسان) .

١٩٧٧٧ - غُرُوفَةُ التَّجَارَاكَ
Chambre de Commerce (F). Chambre de Commerce (E).

منطقة مؤلفة من مثلي التجار ولوابي الصناعات تتلاقى بلسانهم لدى السلطات العامة وتجميع لهم الملوينات المترفة من التجارة والصناعة في الداخل والخارج .

١٩٧٧٨ - غُرُوفَةُ الزَّرَاعَةِ

Chambre d'Agriculture (F). Chamber of Agriculture (E).

غرفة الزراعة ، نورة تضم بعض الزراعي المستخين لخدمة المصالح الزراعية الموطية . والنرف الزراعة تابعة للدولة ولها قوانين خاصة .

١٩٧٧٩ - غُرُوفَةُ الْمُنَاصَاةِ

Chambre de compensation (F). Clearing-house (E). هو مركز اجتاج بثل المصارف ومصارف الصلفق لاجراء عمليات مضافة التماويل والاوراق المالية .

١٩٧٨٠ - غُرُفُوفْ

Gorfo (F). جنس طير من حدييات الرشي ، كفييات القندم ، مشهور باسم غُفُفَات ، اعطيه .

١٩٧٨١ - غُرُقَاء ، غُرُقِيْ ، قِيْعَكَ
Chorion (F). غُرُقَاء ، غُرُقِيْ ، قِيْعَكَ هو غلاف البيشة الداخلي مركزه تحت القيش .

١٩٧٨٢ - غُرُقَقْدْ
Blanc d'oeuf (F). White of egg (E). الغرقة : بياض البيض غرق الملح .

١٩٧٨٣ - غُرُقَقْدْ ، قُرَاجْ
Nitraria (S). Nitraria (F). Nitro bush, Saltrac (E). Salpeterstrauch (D). Nitraria (F).

جنس شاكات برية من فصيلة القرقديات . اصطناعه بعض المناطق الاسيرية والافريقية الشمالية والوسطى . انواعه شجيرات وجنبات شاككة او سرسة . اوراقها كاملة مضطربة جامدة التصل . ازهارها بياض اللون ، فردية او عكركلية . ثمارها عنية او نووية ، مديبة الطوف ، حر او سيد .

١٩٧٨٤ - غُرُقَقْدِيَّات ، قِيْدِيَّيَّات

Zygophyllaceae (S). Zygophyllaceae (F). Zygophyllaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القضاات . اجناسها وانواعها عديدة معظمها عشيبي وبعضها شجري وجنبي . اوراقها لا قياسية الترتيب والشكل فيها المتناقلة والمتقابلة وفيها البسيطة والمركبة . ازهارها خمسية التركيب عشوية .



غرولة



غريبس



غراب غليظ للناقاد



غرناق عادي

قرواء خشوية الساق تملو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. فروصها طاقية التجميع. اوراقها متعاقبة، لائفة، صغيرة، تصلها سناني الشكل، حذب المصفة، جناحه الانسيج، كثيف اللحم والندد، لونه الى الحماض الاصفر || رؤوسيات الزهرية مسننة اللحم، قطرها نحو ٤ سم. تطورها لسنوات كبيرة مسطحة صفراء اللون || يستخرج منها عصارة تقيد ضيق التنفس والالتهاب الرئوي.

١٩٧٧ - غُرُوقَة
Ebourgeoisement (F).
Nipping of buds, Bud-budding (E).

تقليم او ازالة الفرواق والبراعم المرضية الزائدة.

١٩٧٨ - غُرُوقُ هو البرعم، اطلبه.

١٩٧٩ - غُرُوقُ ، جِيرَانِيُومُ

Geranium (S). Géranium, Géraniar, Bec de cigogne (F). Geranium, Shepherd's needle, Crane's bill (E). Storchschnabel, Geranium (D). Geranio, Becco di cigogna, Becco di grus (I).

جنس نباتات خشية طلع من فصيلة الترنويات. انواعه عديدة منها البرية والعلية والزراعية التزيينية. ازهارها غنقطة التجميع والالوان لها الياض والوردي والاسمر والبنفسجي. تحارها تشبه سننار الفروق او الرحو. اعره انواعه واشهرها ما يلي



فرندلية خلية

١٩٨٠ - غُرُوقُ ارْمَني ، جِيرَانِيُومُ ارْمَني

Geranium armenum (S). Géranium d'Arménie (F). نوع من الفروق وهو خشية معمرة متصببة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها زياء الحماض، فروصها زهرية، اوراقها خالصة الاقسام. خصوصية متبادعة مسننة الحافة. اذهارها كبيرة اللند، قطرها نحو ٤ سم. بقلها زهرية الشكل، جزوية اللون، بنفسجية المواج، سود البقعة الوسطى || اذهارها يستمر من حزيران الى تموز.



فرنوق الجداول

١٩٨١ - غُرُوقُ اسْمَر ، جِيرَانِيُومُ اسْمَر

Geranium phaeum (S). Géranium brun (F). نوع من الفروق وهو خشية معمرة متصببة. ساقها تقاو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها خالصة او سباعية الاقسام السنانة الشكل، المسننة الاطراف. تصلها شديد الخشاش. يطو بقلبيج اسمر. اذهارها جزوية اللون او بنفسجية. اذهارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٩٨٢ - غُرُوقُ الجندكول * ، جِيرَانِيُومُ الصخرو

Geranium rivulare (S). Géranium des ruisseaux (E). نوع من الفروق وهو خشية معمرة متصببة ترطب في الارية الرملية. ساقها تملو نحو ٤٠ سم. اوراقها سباعية الاقسام المتبادعة التفصيص والشرج. تصلها خلل البشرة، بجري اللون || اذهارها يستمر من حزيران الى تموز.



فرنوق الروايي

١٩٨٣ - غُرُوقُ الروايي * ، جِيرَانِيُومُ حصي

Geranium collinum (S). Géranium des collines (F). نوع من الفروق وهو خشية برية معمرة تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها خالصة الاقسام. تصلها خلل البشرة، باعد الخشاش. اذهارها مهدبة البقلات لونها الى الازرقواني البنفسجي المواج || اذهارها يستمر طوال شهر ايار.

عنه ابيض القلق || طباطمه وعاداته لا تختلف من طباطم وعادات الغرب الا ان له اثبت طرياقا واطول فوطا. وهو صياح، هم، قلد || يثن وكته في الاذغال ويل الاخير النصلة الانقراض. وكته يرتكز مل مدادتين متصاليتين وهو كالصاج تقريبا. حياكه قصبان دقيقة متداخلة يطولا قوام تام. اثناء تحضن وحدها ثلاث بيضات بيضا اللكر بلن لما الغذاء.

١٩٧٩ - غُرُوقَات

Corbeu (F). جنس طير من الغربان يدعى غُرُوقَات، اطلبه.

١٩٧٢ - غُرُوقَات ، غُرُوقُ ، غُرُوقُ

Balaerica (S). Balaerique (F). جنس طير من الكراكي، موطنها البلاد الافريقية. انواها جملة الالوان الزامية التزيينية. رؤوسها خلية الريش الاسود المتصب. تيجانها التقنية ذنية اللون. اذانتها وسبقها طويلة. منازرها غروبية الشكل ذلقة. اجنسها مسطحة متفرقة الزوايا. اذانتها قصيرة مقطعية. ارسافها دقيقة سردي || تألف صفات الانهر والبيهرات والاسراج المبرمة الانجبار. قوتها الحروب والتجار والبرام والحشرات || تدن في افاحوس تحضرها في التربة. اناتها لما حشفتان في السة وفي كل حصة يهستان || ولما الجلس نوما لا غير الفروق الطاووسي والفروق المادي.

١٩٧٣ - غُرُوقَات طَاوُوسي ، غُرُوقُ طَاوُوسي

Balaerica pavonina (S). Balaerique pavonine, Grupeau, Oiseau trompette (F). طائر من الفروق موطنه يمتد من جبال افريقية الوسطى الى خطوط المتوسط وجزر الباليار || طوله نحو ١٠٠ سم. تاج قلته ذهبي اللون مستطيل الريش الحليطي الخرزوي. عسراه وقلته الى الحرة المرحانية. ثوبه الى الرينة. يمتد ويسمر عنه الظهر ويبر عن البطن. جناحه جملة بالايض والاسود، متقار وساقه سود.

١٩٧٤ - غُرُوقَات عادي * ، غُرُوقُ عادي

Balaerica regulorum (S). Balaerique commune (F). طائر من الفروق اذانتها قسيمة الاجزاء تمتد من افريقية الشرقية الى الجنوبية. طوله نحو ١٠٠ سم. تاج قلته اصفر اللون، ملحب المواج، قصير الريش الحليطي الجالس. عسراه وقلته الى الحرة المرزمية. متقار وساقه الى السرة. ثوبه الى الرينة الرصاصية. جناحه يبيض القردام، ذتي اسود.

١٩٧٥ - غُرُوقَات خلية *

Grindella (S). Grindella, Chrysophthalme (F). Grindella (E).

جنس نباتات برية طلية وزراعية تزيينية من الاسطريات وفضيلة المركبات. انواعها المعروفة قليلة العدد منها الاعشاب الحولية والجنات المعمرة جميعها امريكية المنبت || اوراقها متعاقبة. اذهارها رؤوسية صفراء اللون قريبة تشبه بازهار دوار الشمس || اشهر انواعها واعرفها الفرنديلية النضلية.

١٩٧٦ - فرندلية خلية *

Grindella robusta (S). Grindelle robuste (F).

نوع من الفرنديلية البرية اللبية المعمرة. مهدجا جفس اصفاغ امريكية السالية انحصا كايغورنية والشكسب والمكسيك. تثبت طويلا في المناطق السبعة || جنبتها

١٩٨١ - غرثوق عطر * ، جيرانيوم عطر ،
إبرة الزهراب

Geranium Robertianum (S). Herbe à Robert, Aiguille, Géraniun de Robert (F). Adder's tongue, Herb Robert, Fox geranium (E). Ruprechtstorchschnabel, Robertskraut (D). Geranio Robertino Erba Roberta (I).

نوع من الفروث وهو عشبة معمرة برية طيبة طالحة الاستعمال تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقها فراء مستعقة السلاحيات. اوراقها خاسية او سباعية الاقسام. ازهارها لالائحية الانقسام فيها الفردية والثنائية والثلاثية التجميع. لونها الى الياض الاخر يملو توشيح ليكي || ازهارها واوراقها صلبة يقال انها لا تخلو من بعض الحواش الطيبة الناعمة.

١٩٨١١ - غرثوق لضي * ، جيرانيوم لضي
Geranium argenteum (S). *Géraniun argenté* (F). نوع من الفروث وهو عشبة معمرة مستطيلة. ساقها مفردة تملو من ٧ الى ١٢ سم. اوراقها خاسية او سباعية الاقسام الثلاثية التشرع. نصلها خلي البشرى ، نفي الملوخ ، ازهارها فردية التجميع ، عرطوية البتلات الوردية اللون. ازهارها ينشر من محو الى آب.

١٩٨١٢ - غرثوق كبير الزهر ، جيرانيوم
كبير الزهر

Geranium grandiflorum (S). *Géraniun à grandes fleurs* (F). نوع من الفروث وهو عشبة معمرة تحيلة الساق متدلية الفروع تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها مستطيلة للماليق للتدلية الماء، نصلها خلي البشرى، بحري اللون، خاسي الاقسام اللالائحية التتبعين. ازهارها كبيرة القد ، متدالة النصل والبتلات. لونها الى الياكي الوردى الملوخ. ازهارها ينشر من حزيران الى تموز.

١٩٨١٣ - غرثوق ملتطح * ، جيرانيوم ملتطح
Geranium maculatum (S). *Géraniun maculé* (F). نوع من الفروث وهو عشبة معمرة مستعقة. ساقها مضلعة تملو نحو ٤٠ سم. اوراقها لثائية او خاسية الاقسام المسننة نصلها قليل الحسل ، شديدة الحفره. ازهارها منبسطة البتلات المستعرضة ، قطرها براوح بين ٣ و ٤ سم. لونها الى الياكي الباهت || ازهارها ينشر من نيسان الى تموز.

١٩٨١٤ - غرثوقيات
Geraniaceae (S). *Geraniacées* (F). *Geraniaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وفصيلة الفصليات انواعها المعروفة خمسة. موطنها بعض مناطق امريكا الاستوائية. قوتها الحشرات حل اغتلاف انواعها وراكها وبعض الثمار النعنية البرية || اجسامها ريمة تطلو من ١٦ الى ٢٢ سم. تتميز بكيك اذنانها المقطوعة الطرف. اجنسها صغيرة ، ذلقة تلحف قاعدة الذنب. مناقبها ضليعة ، مشرمة الاطراف. اثريها متباينة الالوان تكثر والتجميع.

١٩٨١٥ - غرنيس *
Agriornis (S). *Agriornis* (F). *Agriornis* (E).

جنس طير من الجرائم شرويات التاتير وفصيلة الفصليات انواعها المعروفة خمسة. موطنها بعض مناطق امريكا الاستوائية. قوتها الحشرات حل اغتلاف انواعها وراكها وبعض الثمار النعنية البرية || اجسامها ريمة تطلو من ١٦ الى ٢٢ سم. تتميز بكيك اذنانها المقطوعة الطرف. اجنسها صغيرة ، ذلقة تلحف قاعدة الذنب. مناقبها ضليعة ، مشرمة الاطراف. اثريها متباينة الالوان تكثر والتجميع.

١٩٨١٤ - غرثوق العرثيل * ، جيرانيوم يمسكي
إبرة الزهرابي

Geranium columbinum (S). *Geranium columbin*, Pied de pigeon (F). Long stalked crane's bill, Pigeon's foot crane's bill (E). Stelstorchschnabel (D). Becco di piccione, Geranio colombino (I).

نوع من الفروث وهو عشبة معمرة برية طيبة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. ساقها فراء ، دقيقة ، مستطيلة السلاحيات. اوراقها خاسية او سباعية الاقسام البنية ، ناص الحسل المنطرية الارتكاز. نصلها عاين الحصار ، ناص الحسل القصير. ازهارها فردية او ثنائية التجميع. وردية اللون ليكي الملوخ || يقال انها لا تخلو من المنافع الطيبة وقد تفيد الصدر.

١٩٨١٥ - غرثوق المروج * ، جيرانيوم مروجي
Geranium pratense (S). *Géraniun des prés* (F). نوع من الفروث وهو عشبة برية وردية معمرة. ساقها مستعقة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها سنائسية الاقسام اللالائحية المد. نصلها خلي البشرى عاين الحصار البحري. ازهارها مستعرضة البتلات الكبيرة لونها الى الزرة الارجوانية التوشيح || ازهارها ينشر من حزيران الى ايلول.

١٩٨١٦ - غرثوق دموي * ، جيرانيوم دموي
Geranium sanguineum (S). *Géraniun sanguin* (F). نوع من الفروث وهو عشبة معمرة متعينة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقها يزهرها طيبة الماء. اوراقها سباعية الاقسام ، لثائية او خاسية التشرع المستطيل. ازهارها فردية ، دقيقة الاذن ، سكية النصل ، قلبية البتلات الحمر || ازهارها ينشر من حزيران الى ايلول.

١٩٨١٧ - غرثوق رسادي * ، جيرانيوم رسادي
Geranium cinereum (S). *Géraniun cendré* (F). نوع من الفروث وهو عشبة معمرة مستطيلة. ساقها متدلية تملو من ٨ الى ١٥ سم. اوراقها خاسية او سباعية الاقسام اللثائية القصوص. نصلها بحري اللون ، واربد الزغب. ازهارها ثنائية التجميع ، بيضيه البتلات الحمر || ازهارها ينشر من حزيران الى آب.

١٩٨١٨ - غرثوق شكارى الورق * ، غرثوق
عسقلون

Geranium anemonefolium, *G. tuberosum* (S). *Géraniun à feuilles d'anémone*, *G. tubéreux* (E). نوع من الفروث وهو عشبة معمرة عسقلية الاروية. ساقها تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها خاسية الاقسام تشبه اوراق الشكار. نصلها مالى البشرى عاين الحصار. ازهارها ثنائية التجميع ، مستطيلة للماليق الحاملة الماء. بتلاتها كبيرة القد حراء اللون.

١٩٨١٩ - غرثوق عريض البتلات ، جيرانيوم
عريض البتلات

Geranium platyptalum, *G. ibericum* (S). *Géraniun à larges pétales*, *G. d'Ibérie* (F). نوع من الفروث وهو عشبة معمرة متعينة تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم. ساقها يزهرها زياء الماء. اوراقها خاسية او سباعية الاقسام الاحليلجية الشكل ، المنشارية الحافة. نصلها خلي البشرى ، بحري اللون. ازهارها صوانيسية التجميع. بتلاتها مستعرضة ، مقمرة الاطراف ، زرقاء اللون او بنفسجية || ازهارها ينشر من ايار الى آب.



غرثوق العرثيل



غرثوق المروج



غرثوق شكارى الورق



غرثوق عطر



غرثوق نفي



غريفيق غريفيق



غريفيق



غريفيق غريفيق



غريفيق



غريفيق



غريفيق

١٩٨٢٣ - غريفيق * ، إكسور

bora (S). Isore, Jamin sauvage (F). Wild jasmine (E). Isore (D). Isora, Gelsomino salvatica (I).
جنس نباتات شجرية وجنسية من فصيلة النويبات. أنواعه نحو ٢٠٠ أصنافها للمناطق الاستوائية. معطها بري ويشبه زراعي زينة. أوراقها مسطحة متعاقبة. انزهارها حشوي الشكل. جميع. تاجي الإزهار. أزهارها صغيرة القد. حورية العرف. يضاء اللون أو حراء.

١٩٨٢٤ - غريفيق * في الإليزيا ، أطبا .

١٩٨٢٥ - غريفيق
Garrya (S). Garrye (F).
جنس نباتات ممرية كريبية من فصيلة القرانيات. أنواعها ثمانية. سدها البلاد الأمريكية. جميعها جنبات صغيرة أو متصلة القد. أوراقها بيضاء متعاقبة. فصلها اللابسي الشكل. جلدي الصفحة. منخفض الحار. حابس. الخشار || أزهارها شريفة التجميع. غصاه اللون أو سفراء أو غراء.

١٩٨٢٦ - غريفيق * ، غريفيق ، غريفيق ، زيتون
Mela (S). Blairieu (F). Badger (E). Dache (D).
جنس حيوانات لبنة لاح من فصيلة السرعويات ورتبة الواسم. أنواعه ستة تقريبا بين الكلب والسنور. غلظها بين الذهب والسمور. أصنافها أنما القديم. جميعها قصيرة القوائم السيد. كازة الدم. غراء القوب. يضي الحاسر تحلل على كل إيل من إيلها جدة سواد. رؤوسها غريفيق الشكل. أعطائها مستطيلة. أذنانها قصيرة.

١٩٨٢٧ - غريفيق * Instinct

١٩٨٢٨ - غريفيق جدويق ، غريفيق رسيكيت
Instinct gregaire (F). Herd instinct, Gregarious instinct (E).
في غريفة التجمهر في الحيوان والنبات .

١٩٨٢٩ - غريفيق * Plant (F).
كل نبات في تمكه جلور من استمار الحياة .

١٩٨٣٠ - غريفيق * ، غريفيق Pollen (F).
Pollen (E).
الفريش والافريش والطلع والصالح واسه . راجع صلب .

١٩٨٣١ - غريفيق
Roelière de bambou (F).
Roed-bed of bamboo (E).
أحة الفريش طيعية كانت ام صنعية .

١٩٨٣٢ - غريفيق
Dendrocalamus (S).
Bambou (F). Bamboo (E).
جنس نباتات قصية برية ودرعية من حملة الحيزانيات وفصيلة النجيليات . أنواعه قليلة ترطب في الآرية الخفيفة الدبالية الرطبة . أشهرها غريفيق هندي .

١٩٨٣٣ - غريفيق هندي
Dendrocalamus henonis (S). Bambou de Hénou (F).
نوع من الفريش يملر من ٣ إلى ٥ أمتار . سلايانة متصلة الطول ياحت الخشار الخشبي . أوراقها طولها من ٦ إلى ١٠ سم. وتعرض نحو ٢ سم. نعملها لاس الخشار على صفحتيه || يرطب في الآرية الدبالية الخفيفة الرطبة .

١٩٨٣٤ - غريفيق
Grévilée (F).
في الغريفيق ، أطبا .

فيها الكمية والشحمة . جواشها منشدة دائما بالاسيد || تميز بجاعات متوسطة البند . تكثر أمشاشها في الأنجار المتوسطة الارتفاع . أنشأ تحض وسدا من ٤ إلى ٥ ييضات مرتين في الحول .

١٩٨١٦ - غريفيق
Balérique (F).
هو الترفاق ، أطبا .

١٩٨١٧ - غريفيق ، غريفيق
Grevillea (S). Grévilée (F). Silky oak (E). Grevillea, Seide neiche (D). Grevillea (I).
جنس اشجار وشجيرات برية ورتبية من فصيلة الفصيات أنواعها عديدة . أوراقها أبيضه متعاقبة لا تليبية الشكل . أزهارها نواحية مختلفة الألوان أكثر فيها الاصفر والاحمر . انزهارها سبلي أو حشوي التجميع . محوري الارتكاز . أشهر أنواعها ما يتبع .

١٩٨١٨ - غريفيق جبليق
Grevillea alpina (S). Grévilée alpina (F).
نوع من الغريفيق وهي جنبية ممرية تملر من ١٠٥ إلى ١٢٠ سم. أوراقها سنائية الشكل مقلوبة القاعدة . انزهارها حمر البتلات . صفر الانابيب . خلية البشرة . حشوية التجميع || انزهارها يشمر طوال شهر ايار .

١٩٨١٩ - غريفيق شاصية *
Grevillea robusta (S). Grévilée géanta (F).
نوع من الغريفيق وهي جملة ممرية تملر نحو ٩٠ سم. أوراقها سرعسية الشكل طول نحو ٢٠ سم. نصلها خلي الصفحة السفل . انزهارها برتقالية اللون . حمر الموج . حشوية التجميع || انزهارها يشمر من ايار الى حزيران .

١٩٨٢٠ - غريفيق حترعيت
Grevillea juniperina (S). Grévilée-Génévrier (F).
نوع من الغريفيق وهي جملة ممرية تملر من ٣٠ إلى ٦٠ سم. فروصها زباد السماء . أوراقها هدية شاككة طول نحو ٢ سم. انزهارها صفر البتلات حمر الانابيب . صبيانية التجميع || انزهارها يشمر من حزيران الى تموز .

١٩٨٢١ - غريفيق حطوطا
Grevillea glabrata (S). Grévilée glabre (F).
نوع من الغريفيق وهي جنبية ممرية تملر من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها وفروصها عادمة الزغب والخل . أوراقها بالغة الفريش . ثلاثية الفصوص المدية الشاككة الاطراف . انزهارها صغيرة القد . يضاء اللون . حشوية التجميع . انزهارها يشمر طوال شهر ايار .

١٩٨٢٢ - غريفيق * ، سكاوية صكرية
Archibuteo (S). Busaige, Archibuteo, Buse pattue (F). Rough-legged buzzard (E).
جنس طير من حمارة السقاوات وفصيلة البصقريات . أنواعه ثلاثة شديدة الشبه بالسقاوة الا أنها اكبر جنة . طولها وأروح بين ٨٥ و ٩٠ سم. سواقها كبيرة القد ، ذلقة الاطراف ، تلحف معطر الانذاب . أوسانها مسرولة . ألوانها الى السمة المشبة بالابيض والافير والاسهب والاطسل . جميعها من القاطع التي تجوب البلاد المتندلة الحارة . تكثر في شقوق الصخور الرقيقة الشارفة النائية عن كل عمار . أنشأ تحض وسدا من رتقتين الى ثلاث رتقات . قوتها القروغم والظاء والافاني والخشار على اختلافها .

١٩٨٤٤ - غزان عَيْن الطاووس

Gazania pavonia (S). *Gazanie cell de paon* (F).
نوع من الزئان المعمّر . ساقه غشوية قراء تملو نحو ٦٠ سم. فروصها كثيرة العدد ، قصيرة القند ، مراكية . أوراقها الجذرية والجذعية متوسطة الحجم ، ريشة التفرع . نصلها انضغض اللون مبهر الزغب . وريساتها الزهرية متوسطة القند ، اقراصها يرتقالية اللون ، نارية الملوّج . حناياها شديد السواد اللامع || تنوره يستمر من حزيران الى آب.

١٩٨٤٥ - غزان قُرْدِي الزهرة

Gazania uniflora (S). *Gazanie uniflora* (F).
نوع من الزئان المعمّر . ساقه غشوية متدلية الفروع . أوراقها احليجية مساوية . نصلها مائل الصفحة العليا ، خلي السفلى المنزهر الاقن . وريساتها الزهرية فردية التجميع كبريتية الصفار || تنوره يستمر من تموز الى آب.

١٩٨٤٦ - غُزَّة *

Gazza (S). *Gazza* (F). *Gazza* (E).
الاسم العلمي والفرنسي والانكليزي من العربي . جنس املاك بحرية من فصيلة الشبيبات شائكات الزعانف . انواعها المعروفة ثلاثة . اعطائها البحر الاحمر والحلج العربي والخط الهندي || اجسامها شبه بضيعة الشكل ، معتدلة التنبيط ، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوتارها السائلة الى الريدة الغضبية تبق عند التقلع وتضفر عند البلن . رؤوسها شبه اسفلية الشكل . اعطائها علومه الارتكاز متدفع . عيونها مستديرة ، كبيرة ، ماصة . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة متعاقبة . زعانفها الذيلية لارقة || طويها جيدة الصنف مرغوب فيها .

١٩٨٤٧ - غُزَلْ ، تشبب ، عخلاعة

Erotisma (F). *Erotism* (E).
شهوانية متطرفة مشيرة . وقد تكون حالة مرضية .

١٩٨٤٨ - غُزَلِي ، عخلاعي ، تسي

Erotique (F). *Erotic* (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالحلب البدوي او الخلاعي او الجنسي .

١٩٨٤٩ - غُزِيل . هو ابرة العجوز ، اطليا .

١٩٨٥٠ - غُضَّاس *

Cudonia confusa (S). *Cudonia confusa* (F).
ضفر كامن الصنف لامأكلي من فصيلة الخشرايات ودية الرقيات . يكثر وجوده في اخرج السورير . يعيش على المواد النباتية المنحلة . نكته مجمعة من الريدات الصغيرة نظرها نحو ٣ سم. لونها الى الصفار الاسمر الملوّج . معها مصراعي الانغلاق . ساقه معتدلة الارتقاع مبطة الشكل يملوها اخمد يمنة من القاعدة الى الاربعة .

١٩٨٥١ - غُضْرُوكَة *

Gasterochaena (S). *Gasterochène* (F). *Gasterochaena* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات عديدة الامشاج وفصيلة المستقيبات . انواعها الثائرة المتحجرة عديدة اما الحالية فنحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم || وهي من البوديات الثاقبة تعيش ضمن انبوب صدي المادة ثقافته المواد الكلسية .

Boue (F). Mud (E).

هو الطين يحمه السيل يقبي على وجه الارض مشتقاً ربكاً كان او يابساً || وهو التفل في اسفل القارورة .

١٩٨٦ - غُزِين ، غُزِين ، طعي

Alluvion, Limon (F). *Alluvium, Silt, Ooze* (E).
وهي اسماء التفتاة والطلح والطمح . والغرين واسب من التربة والبقايا الصغوية حطباً المياه المكرة فرسبت .

١٩٨٧ - غُزِيَّات

Garryaceae (S). *Garryacées* (F). *Garryaceae* (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الفللات . كانت في التصنيف السابق تتبع فصيلة القزانات . اجناسها وانواعها قليلة العدد اعطائها البلاد الامريكية || ثباتها جنات سبوتية معمرة ، تملو من مترين الى اربعة امتار . أوراقها ابيدة ، متعاقبة . نصلها جامدة حيلة الخضار الالامس . انحرافها شبري التجميع . انحرافها ثنائية المسكن ، صغيرة الجرم ، خضراء اللون . ثمارها فردية البزرة او ثنائيتها || اشهر اجناسها الغرية .

١٩٨٨ - غُزَّار . هو قصب الرمل ، اطليا .

Gazelle (F). *غُزَّال*
اسم شامل يطلق على بعض الحيوانات من ذوات الاظلاف الحيوات القرون منها الطي العربي والرثم والاريل والادم الخ . ج. غزلة وغزلان .

١٩٨٩ - غُزَّال

Bonita à ventre rayé (F).
سمكة بحرية تسمى « بويت مشيرة البطن » ، اطليا .

١٩٨٩١ - غُزَّان *

Gazania (S). *Gazanie* (F).
جنس نباتات حشوية من فصيلة المركبات . انواعها عديدة اعطائها معظم اسواق العالم القديم . سوقها زيا لانطامية التفرع . أوراقها خلية لاقياسية الترتيب منها الجذرية والجذعية التناقية . وريساتها الزهرية كبيرة القند صفر اللون . قبابات فلانها ملتصقة ، عديدة الصفوف ، قمية الشكل . ثمرتها مرانة . رؤوسها ثنائية الفلور المتتامة اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

١٩٨٩٢ - غُزَّان لَنَجِي

Gazania nives (S). *Gazanie neigeuse* (F).
نوع من الزئان المعمّر . ساقه غشوية قراء تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. أوراقها الجذرية والجذعية متوسطة القند مسطوية الشكل . نصلها انضغض الصفحة العليا ، ابيض السفلى بيانها كالتلج . وريساتها الزهرية كبيرة القند نظرها براوح بين ٧ و ٩ سم. اقراصها الى الصفرة البرتقالية الملوّج . حناياها اسمر الاقن اسنغ || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

١٩٨٩٣ - غُزَّان وِشِي الورق

Gazania pinnata (S). *Gazanie pennée* (F).
نوع من الزئان المعمّر . ساقه غشوية قراء . أوراقها الجذعية متوسطة القند وريشة التفرع . أوراقها الجذرية كبيرة النصل المهذب الاطراف المنطة . وريساتها الزهرية كثيرة العدد ، صغيرة الحجم ، كبريتية الصفار . تنوره يستمر من حزيران الى آب .



غُزَّان



غُزَّة



غُزَل



هَشَوَة



عشيل



عشبة الارضي شوكة



عشبة البقول



عشبة الجنجل



عشبة الحصيد



عشبة الذرة الصفراء



عشبة النور

19859 - **عَشِيَّةُ الْجُنْجُلِ** * (S). *Hypera rostralis*

Noctuelle du houblon, Toupet (F).

فراشة صغيرة للقد طولها نحو ١٢ سم. ثوبها الى الصبغة
الضبابية الغامقة المبراج. وراشها مدهية الخواشع المبراجي.
لها جيلان في الحول. ريقها تطول نحو ٢٢ سم. ثوبها الى
الغبرة يميلوا لتسليج اسمر. ولسها اسود || تركيب
الجنجل فؤذي لشد الانى.

19860 - **عَشِيَّةُ الْحَصِيدِ** * (S). *Agrotis segetum*

قراشة الحصيد

Euxoa segetum (S). Noctuelle des molsens (F).
Turnip dart moth (E). *Wintersaatsale* (D).

فراشة كبيرة للقد سمراء اللون مدهية الراشع طولها نحو ٢
سم. ولسها ٤ سم. وراشها الاناميان الى الصفراء الخلفي
اما الخلفيان فال ابيض الاضراس تتخلله عروق عابقة.
جلها يستمر نحو الستين. تمتع مكها ابتداء من اوتال
الربيع فينتف بعد اسبوعين || ريقها تطول نحو ٥ سم.
وهي شهاب اللون يملوا مواج زيتوني وضمان اسفرائن قاطبان
يتخللها في كل فصل من فصولها اربع نقط سود.
تركب الفصح والسلي والذرة والتبليات المرموية والبطاطا
والشندر والكمرة والتبغ والملفوف والبصل الخ...

19861 - **عَشِيَّةُ الذُّورَةِ الصُّفْرَاءِ** * (S). *Noctua Zeae*

الذرة الصفراء * ذودة الذرة

Noctua Zeae, *Leucanum Zeae* (S). Noctuelle du
maïs (F).

فراشة متوسطة للقد ثوبها الى الصبغة الوردية المبراج. اكبر
قدا وابق ثوبا من ذكورها. لها جيلان في السنة.
تظهر في حزيران وفي آب || ريقها سمراء اللون وردية
المبراج تطول نحو ٤ سم. تألف المواتع الربطة. تركيب الذرة
وسائر التبليات المملفة.

19862 - **عَشِيَّةُ السَّكِّ** * (F). Noctuelle du seigle

حشرة تدعى مدهية السليم. اطلها.

19863 - **عَشِيَّةُ الصُّنْبُورِ** * (F). *Panolis piniperda*

P. flammea (S). Noctuelle du pin (F).

فراشة من اللسقيات صغيرة للقد ثوبها الى البصرة الاخضرية،
تجيبها وزراكتها الروشية حيلة الشكل والانتظام.
ريقها غصراء اللون مخططة بالابيض تركيب الصنوبر من
حزيران الى تموز فلتبهم لورواته.

19864 - **عَشِيَّةُ الْقَصَبِ** * (F). *Sésamie*

هي السبزية * اطلها.

19865 - **عَشِيَّةُ الْفَصْحِ** * (S). *Agrotis tritici*

قراشة الحنطة

Agrotis tritici, *Euxoa tritici* (S). Noctuelle du blé
(F). *Turnip-line dart moth* (E).

فراشة من اللسقيات صغيرة للقد ثوبها الى القردة وراشها
الاماميان مبقجان بالاسمر. جلها يستمر نحو الستين.
تمتج مكها خلال شهر حزيران فينتف بعد اسبوعين.
ريقها كبيرة للقد تطول نحو ٥ سم. ثوبها الى الصبغة
الغصراء يملوا مواج اشتر وضمان اسفرائن يتخللها في
كل فصل من فصول جسمها اربع نقط سود || تركيب
الحنطة والسلي والذرة وتختلف التبليات المرموية
والمملوف والكمرة.

19866 - **عَشْرُوفَات** * (S). *Gastrochenidae*

Gastrochenidae (F). *Gastrochenidae* (E).

فصيلة حشرات بحرية من الرموويات صليحيات الخواشع.
اجناسها وانواعها الممارسة عديدة ومنتشرة في جميع بحار
العالم. اما القارة فن متحصرات الحقبة الثالثة ||
اشهر اجناسها المستق والرشافة والفتسلة.

19867 - **عَشِيَّةُ الْبَقْلِ** * (S). *Glycyphila*

Glycyphila (F).

جنس طير من الجوارث وبقات المناقير فصيلة المثرثات.
انواعه المعروفة ١٢ مولها تمتد من جزر الزابج الى
استراليا. ملجها الحيالي جامي. قوتا الحشرات الصغيرة
والذباب والحمام وحيث الاضرار || اجسامها صفيرة تطول
من ١٢ الى ١٥ سم. متقارفا مقيحة. اجناسها تلحف
الافتيك. اذناها خفيفة و طويلة. مغطوة الاطراف.
الرواق ملونة جليلة الغصاف الزاهي || تلتق في الاشجار
المعتلة الارتفاع. تحضن مرتان في الحول وفي كل مرة
من ٤ الى ٥ بيضات. الترخيم يستمر نحو ١٥ يوما
تقوم به الانثى بمناوبة الذكر.

19868 - **عَشِيَّةُ** (F). *Crépusculaire*

Crépuscule (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالفسق.

19869 - **عَشْرُوفَات** * (S). *Noctuidae*

Noctuidae, *Agrotidae* (S). *Noctuidae*, *Agroti-*
des (F). *Noctuidae*, *Agrotidae*, *Owlet moths*,
Cutworms (E). *Eulan* (D).

فصيلة حشرات من غنخلات القرون وروية حشراف
الاجنحة. انواعها زهاء ٢٠٠٠٠ مظهرها دجوي وبضها
يسرح في البهار. اجناسها متوسطة للقد. قرونها
الاستثمارية مخططة الشكل او خيالية || ريقها ماصة
البشرة داكنة الالوان. غادراتها تنعم في التربة تلتحف
بجلباب من اللبن.

19870 - **عَشِيَّة** * (F). Noctuelle

Noctua (E).

اسم شامل يطلق على عمة حشرات افراشة من فصيلة
اللسقيات || اشهر اللسقيات ما يتبع :

19871 - **عَشِيَّةُ الْاَرْضِي شَوْكِي** * (F). *Gortyna ochracea*

Gortyna ochracea (S). Noctuelle de l'arichaut (F).

فراشة صغيرة للقد تطول نحو ٢ سم. ثوبها الى الصفرة
الذهبية. وراشها مدهية الاطراف يملوا زواكن
وتجاذب متباينة الالوان || ريقها غصراء اللون، سوداء
الراس تطول نحو ٤ سم. تركيب الارضي شوكة والبطاطا
فصل السورق وتفضي عليها.

19872 - **عَشِيَّةُ الْبَقْلِ** * (S). *Hadena oleraceas*

Polia oleraceas (S). Noctuelle potagère (F). *Bright-*
line brown-eye (E). *Gemüseule*, *Salataule* (D).

فراشة صغيرة للقد طولها الزب مدهية الراشع بالخلفي
والاسمر. تظهر من حزيران الى تموز. تمتج مكها على
لصل الارواق دون تميز بين الصبغة اللبلى او السلي.
ينتف المكن بعد عشرة ايام من ريقها دقيقة سمراء اللون
تتطور بسرعة من السليخ الى السليخ حتى يبلغ طولها
نحو ٥ سم. ويستمر ثوبها الى البصرة الغصراء الزرنية
المواج || وهي في جميع الموراء البرقة لا تنقطع عن اكلها
اوراق البقول على اختلاف انواعها ولساها.

الاقليمي الترتيب || ايجالها الحولية ثلاثة تظهر من ايار الى ايلول || يرتبها غيرة اللون تطول من ٢٢ الى ٢٧ م. تركب البطاطا والجذر والملفوف والكرمة .

١٩٨٧٤ - عشية ملوثة

شجرة تدعى زنبلة دقيقة ، اطليا .
Noctuelle colorée (F).

١٩٨٧٥ - غسل
Pediluve (F).
النسل او غسل القوام عمل تقرضه الطيارة البيطرية ، قواء غسل قوام الحويان ببعض المحاليل الملوثة لاتقاء الحمى القلاعية وغيرها من الامراض .

١٩٨٧٦ - فستج

نبات مثل القنفاء . ترتفع قدر الشبر . لها ورقة لزجة وزهرة كزهره المرو الجبلي (السان) .

١٩٨٧٧ - عشوة * غلاديشيا

Gleditsia (S). Févier, Carouge à miel (F). Three thorned acacia (E). Gleditschbaum (D). Gledizia (I). جنس اشجار برية وريزينة من فصيلة القرظيات القراقية ، انواعها المعروفة خمسة جميعها شائكة . سوكيا منتصبه . اوراقها متناحية ، مركبة ، ريشية . ازهارها عويوة الايتكاز . ثمارها قرون خرنوبية خشفية لا تخلو من السكر . يستخرج منها بهد التشخير والتعطير قندي كسول لا بأس فيه || احرف انواع الفس واشهرها ما يلي .

١٩٨٧٨ - عشوة المتناقع ، غلاديشيا المتناقع

Gleditschia aquatica, G. monosperma (S). Févier des marécages (F).
شجرة برية وريزينة ترطب في المستنقعات وسائر الاراضي الرطبة . ساقها تعلو من ٦ الى ١٢ م. شوكها دقيق الجسم ، مقطوع القامة . اوراقها مستطيلة ، وريقاتها شقية رايح حدها بين ٢٠ و ٢٨ . نصلها ساني الشكل مالم البشرة || قرونها بيضيه مبطلة تطول نحو ٤ م. وتمرض ٢ سم. وهي وحيدة البزرة دمعة الباب السكري . ازهارها يستمر من ايار الى سزيان .

١٩٨٧٩ - عشوة اليابان ، غلاديشيا يابانية

Gleditschia japonica, G. horrida (S). Févier du Japon (F).
شجرة سبروتية تعلو من ٨ الى ٢٠ م. اشواكها متشعبة تطول من ٥ الى ١٠ سم. اوراقها مستطيلة . وريقاتها تمتد من ١٦ الى ٢٠ م. نصلها اعليجي الشكل ، مقطوع القامة ، مالم البشرة بطول نحو ٥ سم. ويمرض نحو ٢ م. قرونها كبيرة القند متعوجة تطول من ٢٠ الى ٥٠ سم. وتمرض نحو ٦ م. لبها غزير المادة السكرية || ازهارها يستمر من سزيان الى تموز .

١٩٨٨٠ - عشوة ثلاثية الشوك ، غلاديشيا ثلاثية الشوك

Gleditschia triacanthos (S).
Févier à trois épines (F).
شجرة سبروتية برية وريزينة تعلو من ١٠ الى ٤٠ م. ساقها متشعبة . اشواكها ثلاثية التركيب حادة الحية . اوراقها تطول من ١٤ الى ٢٠ سم. وتضم من ١٦ الى ٢٤ وريفة نصلها مالم الصفيحة محزب الخمار || قرونها محببة الشكل تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. لبها غزير المادة السكرية || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٩٨٦٦ - عشية الكلاء ، نيلية الكلاء

Neuronia popularis, Epineurion popularis, Helio-phobus popularis (S). Noctuelle des fourrages (F).
فراشة صغيرة القند حنطية اللون ووشانها الاسمان الى السمرة تدمرنها عروق يضر. ووشانها الخلفيان الى الثبيرة الخنطية يحويها حشار مهدد الاطراف . مسرحها جبري يستمر من تموز الى ايلول . الاثني تمتد مكثا على سوق واوراق الاشباب البرية فيقتطع من رقات دقيقة سرية التطور يبلغ طولها نحو ٤٥ م. في اقل من شهر . ثوبا الى السمرة يملؤها من كلتي جانبيها ثلاثة خطوط قاطبة صفراء اللون || تختبئ في النهار تحت الحجارة وتسرع في الليل قبتها اوراق الاعشاب النجيلية ان برية او مروعية وانخصها الذرة .

١٩٨٦٧ - عشية الملفوف * ، نيلية الكرنب دودة القتب

Barathra brassicae, Mamestra brassicae (S). Noctuelle du chou, Brassicaire, Ver du coeur (F). Cab-bage moth (E). Kohleule (D).
فراشة صغيرة القند حنطية اللون . ووشانها متناخلة الاوانا مبقية وبزركفة . لها جيلان الى الحول . تظهر من ايار الى ايلول || يرتبها صغيرة القند تطول من ١٦ الى ١٨ م. تعيش على اوراق الملفوف والنس والذرة والقمح وقد تقرض سوق شتول الملفوف لتطعمها وتقتضم اوراق التبع فتشوها .

١٩٨٦٨ - عشية حنكاه ، Noctuelle bale

شجرة تدعى اغرويس احلس ، اطليا .

١٩٨٦٩ - عشية رمدكاه .
Acronycta rumicida (S).
Noctuelle cendrée, Cendrée (F). Dark knot-grass moth (E). Ampferule (D).
فراشة صغيرة القند رمداء الثوب مبقية بالايض . ايجالها الحولية ثلاثة . تظهر من ايار الى ايلول || يرتبها صغيرة القند ثوبا الى السمرة الباقية ، طولها رايح بين ١٤ و ١٨ م || تركب الجنبيل والملفوف والشايك .

١٩٨٧٠ - عشية الزنجية

Noctuelle basanée (F).
شجرة تدعى اغرويس زنجي ، اطليا .

١٩٨٧١ - عشية حنطية * ، نيلية حنطية

Agrotis exclamatonis, Feltia exclamatonis (S). Noctuelle point d'exclamation, N. double tache, Double tache (F). Heart and dart moth (E). Kreuz-krautzackereule, Ausrufungszeichen (D).
فراشة صغيرة القند حنطية اللون ووشانها الاسمان الى الشقار الصاني يملؤها بتيجين ثنائي الشكل . ايجالها الحولية اربعة وحنطه || يرتبها كدراء اللون تطول من ١٦ الى ١٩ م. تركب القمح والسلت والشعير والذرة وتختلف النجيليات المروعية والشوندر والبطاطا والملفوف والقمح والكرمة والقمح .

١٩٨٧٢ - عشية قارعة ، Noctuelle ypsilon

هي فراشة البودة القارعة ، اطليا .

١٩٨٧٣ - عشية مصاحبة

Tryphaena pronuba (S). Noctuelle pronubée, Flancée (F). Common yellow underwing moth (E). Hausmütterchen (D).
فراشة صغيرة القند ، سمراء اللون ، فضية التيجين العتيق



عشية القح



عشية الملفوف



عشية حنطية



عشية مصاحبة



عشوة

١٩٨٩٩ - عُشَائِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ

Hyménoptères symphytes (F). Hymenoptera symphytes (E).

رتبة حشرات من طبقة عُشَائِيَّاتِ الجناح . أجناسها وأنواعها زهاء ٨٠٠٠٠٠ أجناسها متباينة الأجناس تراوح بين ٣ و ٤٠ م . جميعها كاملة التطور ، رباعية الأجنحة الشائبة . عادمة الانفصال الحسري ، بطولها لائحة بجوانبها . اغطائها قارضة أو لائحة . مرزات أنثى سبعة كاللشار تحترق اصطب الحاء وهي تستعملها في الحفر والحز والوزن في اشهر فصائلها : العليسات والحظاريات والتطريفات .

١٩٩٠٠ - عُشَائِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ الْمُخَصَّوَرَةِ

Hyménoptères apocrites (F). Hymenoptera apocrites (E).

رتبة حشرات من طبقة عُشَائِيَّاتِ الجناح . أجناسها وأنواعها زهاء ١٢٠٠٠٠٠ أجناسها متباينة الأجناس والالوان . جميعها كاملة التطور . غصورها دقيقة واضحة منها الابنوية الشكل والمردنية . أجنسها عُشَائِيَّةُ و رباعية . اغطائها قارضة أو لائحة . اشر انثى سبعة كاللشار تستعمل الحفر والحز والوزن في صائلها كثيرة السد ، اشهرها الأبرات والدحوريات والدلكيات والزيروريات والعلقيات والعلقيات والصغريات والعلقيات .

١٩٩٠١ - عُشْمِيرٌ

Hyperparale (F).

كل كائن مقلد يمشي حل مقلد آخر .

١٩٩٠٢ - عُشْوَةٌ

ثمرة السدر . ج . شو .

١٩٩٠٣ - عُصَبٌ

هو الاغصان ، اطلة .

١٩٩٠٤ - عُصَصٌ

Gallinosa (S).

Gallinosa, Gallinogée (F).

جنس نباتات عشية حرولية من فصيلة المركبات . أنواعها عديدة : جميعها برية . أوراقها متقابلة ، ناعما حادة أو زب . انزعافها حامية الارتفاع ، حديدية الالوان التي تختلف باختلاف الأنواع . وهو جميع أنواعه من النباتات المرعوية لكنه يمتد من الاغصان القصيرة التي تستدرف القرية وتكوي الزروع والرواحات .

١٩٩٠٥ - عُصْنٌ ، تَعَصِينٌ

Ebranchage (F).

Pruning, Lopping, Trimming (E).

هو اقتلاع الاغصان وقد يكون السبب حث الشجرة على الارتفاع أو تغيير هيكلها أو تجديد شبابها .

١٩٩٠٦ - عُصْنٌ

Branche (F). Branch, Bough (E).

الغصن هو الفرع على الساق غلط أو دق .

١٩٩٠٧ - عُصْنٌ ثَمَرِيٌّ

Branche frutière (F).

Limb (E).

غصن يكون عادة اذق من الاغصان المأولة الاخرى يحمل الثمر مباشرة .

١٩٩٠٨ - عُصْنَةٌ ، عُصْنٌ

Ramille (F). Twig (E).

الفصنة والغصين هو ما استبق من الاغصان بلغ الحول أو لم يبلغه .

١٩٨٨١ - عَسَوَلٌ

هو إثنان ابر ساق ، اطلة .

١٩٨٨٢ - عَسَوِيلٌ

نبت من السبخ (المان) .

١٩٨٨٣ - غِبْشٌ

Falsification, Fraude (F).

Falsification, Fraud (E).

خدع الشاري بتبديل ماعية المشتري أو تبديل صفاته . وفي اتانين اللذي هو الخداع المقرون بسوء آنية للاضرار بالغير كشف البادار والاصعدة والادوية الخ ...

١٩٨٨٤ - غِشَاءٌ ، غِلَافٌ

Tégument, Membrane (F). Membrane, Tégument (E).

ما يغطي أو يلفف جسم الحيوان والنبات كالجلد والوبر والریش وأغشاف والحاء .

١٩٨٨٥ - غِشَاءٌ جَرْمِيٌّ ، غِشَاءٌ وَحْشِيٌّ

Membrane germinale (S). Germinal membrane (E).

١٩٨٨٦ - غِشَاءٌ خَلَوِيٌّ

Membrane cellulaire (F). Cell membrane (E).

١٩٨٨٧ - غِشَاءٌ مَسْتَحِيٌّ ، غِشَاءٌ ثُخْرُوْبِيٌّ

Membrane alvéolaire (F). Alveolar membrane (E).

١٩٨٨٨ - غِشَاءٌ عَصَلِيٌّ

Myolemme, Sarcolemme (F).

كل غشاء يلفف العضلات الرئيسية .

١٩٨٨٩ - غِشَاءٌ غِرْبَائِيٌّ

Membrane criblée (F).

Sieve membrane (E).

١٩٨٩٠ - غِشَاءٌ عَطَائِيٌّ

Membrane recouvrante, M. tectoriale (F). Tectorial membrane (E).

١٩٨٩١ - غِشَاءٌ قَاصِلٌ

Membrane limitative (F).

Limiting membrane (E).

١٩٨٩٢ - غِشَاءٌ مُعَاطِيٌّ

Muqueuse, Membrane muqueuse (F). Mucosa, Mucous (E).

سادة مخاطية تلتف بغش أجزاء اعضاء الجسم الحيواني .

١٩٨٩٣ - غِشَاءٌ مَسْطِيٌّ

Membrane séreuse (F).

Serous membrane (E).

١٩٨٩٤ - غِشَاءٌ نَاقِصٌ

Membrane caduque (F).

Deciduous membrane, Decidua (E).

١٩٨٩٥ - غِشَاءٌ نَوَوِيٌّ

Membrane nucléaire (F).

Nuclear membrane (E).

١٩٨٩٦ - غِشَائِيٌّ

Membraneux (F).

Membranous (E).

١٩٨٩٧ - غِشَائِيَّاتٌ ، فُطُورٌ غِشَائِيَّةٌ

Hyménomycètes (F). Hymenomycetes (E).

مجموعة من الفطور الغصاعية من ذوات الفلقة البرقية .

١٩٨٩٨ - غِشَائِيَّاتُ الْجَنَاحِ

Hyménoptéroïdes (F). Hymenopteroides (E).

طبقة حشرات من شعبة الحسدليات وطائفة الجنحات اصلا . تشمل كل من رتبتي عُشَائِيَّةُ الاجنحة وعُشَائِيَّةُ الاجنحة المضمرة . اما انواعها فنحو ٢٠٠٠٠٠ تنتمي في ٩٦ فصيلة .

ظهور الصوم باستعمال سائل بوردو المحلول من ١ الى ١,٥ %

١٩٩١٥ - عُصَاة
Tamaris de Syrie (F).
هو الاثل السوري شجرته تملو نحو عشرة امتار اشجارها صلبة مشروب فيها . ج غضا .

١٩٩١٦ - عُصَاة ، دَلْعَان (F). Glaise, Argile verte (F).
تراب حصالي لايب سحر شديد الانساج والصلابة لونه الى اخضر الداكن . يستعمل في صناعة الفخار والحلف .

١٩٩١٧ - عُصَاة (F). Paragéneis (F).
الغضاة تهجين تكون فيه المحجن عقمة ان تصالبت فيها بينها وتكون ثنورة فوا ليا تو تصالبت مع كل من اوبوها .

١٩٩١٨ - عُصَاة (F). Pléthore (F).
الغضاة حي قرط التنو في الكبات .

١٩٩١٩ - عُصَاة ، دَلْعَان (F). Glaiseux (F).
الذي يحتوي على الفشار او الذي يشبه الفشار او الدلغان .

١٩٩٢٠ - عُصَاة
Clayey, Loamy (E).
نوع من الجراد ويسمى الجراد المبارك (السان) .

١٩٩٢١ - عُصَاة (F). Avortement (F).
هو لقاح الاثني الحامل ولدا لغير تمام .

١٩٩٢٢ - عُصَاة (F). Tunica (S).
حشية برية معمرة من فصيلة القرنفليات . ساقتها دقيقة فروعها تملو من ١٥ الى ٣٠ سم . اولواها جذعية الانتشاب .

١٩٩٢٣ - عُصَاة (F). Pelouse (F).
حشبة ، عسكية . فصلها مستطيل الصفعة الضيقة البحرية اللون . ازهارها صغيرة ، قدية الارتكاز ، خلفه الالوان منها الياض والياكي والوردي والمشمع . ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

١٩٩٢٤ - عُصَاة (F). Silicate d'alumine (F).
مركب طبيعي يحوي بعض الاليومين . الفشار كثيرة العدد ولايجال لذلكها جميعها انما تنحس منها الفلنسية والميكا والفشار والكولان .

١٩٩٢٥ - عُصَاة (F). Silicate de alumina (E).
مركب طبيعي يحوي بعض الاليومين . الفشار كثيرة العدد ولايجال لذلكها جميعها انما تنحس منها الفلنسية والميكا والفشار والكولان .

١٩٩٢٦ - عُصَاة (F). Cartilage (F).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٢٧ - عُصَاة (F). Cartilage, Gristle (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٢٨ - عُصَاة (F). Cartilage des os (F).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٢٩ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٣٠ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٣١ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٣٢ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٣٣ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٣٤ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٣٥ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٣٦ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٣٧ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٣٨ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٣٩ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٤٠ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٤١ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٤٢ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٤٣ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٤٤ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٤٥ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٤٦ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٤٧ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٤٨ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٤٩ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٥٠ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٥١ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٥٢ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٥٣ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٥٤ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٥٥ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٥٦ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٥٧ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٥٨ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٥٩ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٦٠ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٦١ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٦٢ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .

١٩٩٦٣ - عُصَاة (F). Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يدها اللون تكثر غصاة عند الحراف النظام .



عُصُوب جَسُور



لفشاء لاطخ



غُصَاة

١٩٩٣٩ - غُضُرُوفُ الْبَيْدَاءِ ، جُوتِي الْبَيْدَاءِ

Syrhaptus paradoxus (F). Syrrhapte paradoxal.
Poule des stappes (F). Black-bellied (E).

طائر من النصف طول نحو ٢٤ سم. يعيش أستراليا كبيرة
تجرب فاني آسية الشمالية والوسطى. قَلْبًا مخلق في سماء لبنان .

١٩٩٤٠ - غُضُرُوفُ الثِّبَتِ * ، جُوتِي الثِّبَتِ

Syrhaptus thibetanus (S). Syrrhapte du Thibet (F).

طائر من النصف طول نحو ٢٢ سم ثوبه ال بياض .

أستراليا قليلة المد . موطنه مرتفعات الثبت وبيهاها .



غُضُرُوفُ الثِّبَتِ

١٩٩٤١ - غُضَيِفَات

Pteroclididae (S). Pteroclididae (E).

فصيلة من الطير من رتبة الدجاجيات تعرف بالجنائيات .

١٩٩٤٢ - غُضِنٌ

Tunique (F). Tunica (E).

Tunique de l'oeil (F). غُضِنُ الْعَيْنِ

Tunique granuleuse (F). غُضِنٌ حُبْبِيّ

Granulosa tunica (E).

Tunique adventice (F). غُضِنٌ خِلَاجِيّ

Adventitia tunica (E).

Tunique fibreuse (F). غُضِنٌ لِيْلِيّ

Fibrosa tunica (E).

Tunique moyenne غُضِنٌ مُتَوَسِّط

(des artères) (F). Media tunica (E).

Tunique muqueuse (F). غُضِنٌ مُخاطِيّ

Mucosa tunica (E).

١٩٩٤٩ - غُضِنٌ مُنْعَطَفٌ ، غُضِنٌ أَعْوَج

Pli déjeté (F). Asymmetrical fold (E).

١٩٩٥٠ - غُضُرُوفَةٌ ، غُضُرُوفَةٌ

نبات يشبه الصنعة والكام . وتيل ثمرة خضراء ناعمة . وقيل
هو نبات لا يمتد عليه ثمر (السان) ج. غُضُرُوفٌ وَغُضُرُوفٌ .

١٩٩٥١ - غُضُرُوفٌ

Sacopteryx (S).

Sacoptéryx (F).

جنس غشائيش من عائلة الرامسات موطنه أمريكا الجنوبية

وقناريان . أجناسه قليلة تتميز بشاشة رؤوسها وبغصم

أذنانها المنفصلة || يعيش فيجارات كثيرة المد . يسرح

طوال الليل . قوته الحشرات . يأكل الأثمار الحرجية .

لا يتنفس النطر .

١٩٩٥٢ - غُضُرُوفٌ

Plethorice (F). Plethoric (E).

النبات الغضير ما كانت أعضائه غضة وأوراقه غضراء

سائنة زاجية . وهو قَلْبًا زهر ويشير .

١٩٩٥٣ - غُضَيِفٌ ولد البقرة القرشية .

١٩٩٥٤ - غُضَيِفٌ

Sistotrema confluent (S).

Sistotrema confluentia (F).

فطر من فصيلة السحيات . يوجد في غابات الصنوبر .

يعيش بمجموعات متماسكة على المواد الدبالية || ساقه قصيرة

حزنية منتجة الفرع خضراء اللون . نكتة قاذبة || مخددة

الجوانب لونها إلى الصفرة يطولها مراح اسمر || لحية

جامدة المكسر . يتغذى الحن ، مرة اللذان ، لا تكل .

١٩٩٣٨ - غُضُرُوفٌ حَلَقِيّ

Cartilage cricoide (S). Cricoid cartilage (E).

١٩٩٣٩ - غُضُرُوفٌ ضَلْعِيّ

Cartilage costal (F). Costal cartilage (E).

١٩٩٣٠ - غُضُرُوفٌ لِيْلِيّ

Fibrocartilage (F). Fibro-cartilage (E).

١٩٩٣١ - غُضُرُوفٌ مُتَكَكَّسٌ

Cartilage calcifié (F). Calcified cartilage (E).

١٩٩٣٢ - غُضُرُوفٌ

Cartilagineux (F). Cartilaginous, Gristly (E).

ما كانت نسجه غضروفية التركيب .

١٩٩٣٣ - غُضُرُوفِيَّاتُ الرِّعَالِيَّاتِ

Chondropterygienes (F).

صف اسماك كبيرة القد كالبحر تتميز بجذعها من الميكال

المضي . جاجها وسلسها الفقارية غضروفية التركيب .

فصائلها وأجناسها وأولادها كثيرة العدد لتلي ال ريتين:

السفنجيات وكاملات الرؤوس .

١٩٩٣٤ - غُضُرِيَّات

Alzoacea (S). Alzoacées (F). Alzoacea (E).

فصيلة نباتية من مستحلات القناعات . أجناسها وأولادها

عديدة ، مظهرها بري .

١٩٩٣٥ - غُضَيِفٌ

Samyda (S). Samyde (F).

جنس نباتات برية من فصيلة النضسيات . أنواعه المبروة

قليلة المدد . أعطانها المناطق الحارة من العالمين القديم

وأولادها . جميعها شجيرات وجنات متدلة الجرم . أولادها

أبيدة سنجية النصال . أزهارها طرفية الارتكاز . يفساه

اللون أو وردية .

١٩٩٣٦ - غُضَيِفِيَّات

Samydaceae (S). Samydaceae (F).

فصيلة نباتية من مستحلات القناعات مرتفعات المبيض .

أعطانها البلاد الحارة . أجناسها وأولادها قليلة المدد جميعها

اشجار وشجيرات منتصب السوق . قاذبة الاغصان . أولادها

أبيدة ، متعاقبة . جامدة النصال المتباينة الاشكال ،

مبشرة الغدد الراتنجية . أزهارها مستحبة العرف عديدة

الألوان ، يتكر فيها الأبيض ثم الوردي ثم الأصفر

والأخضر .

١٩٩٣٧ - غُضِنٌ

قيل في وصفه : « حجر بالهنة كالنخل ملواه غير ان نواه

مقشر بنير مله ومن اسفله الى اعلاه صف أخضر . م .

غضضة .

١٩٩٣٨ - غُضَيِفٌ ، جُوتِيّ

Syrhaptus (S).

جنس طير من فصيلة الغشائيات قريب الشبه من الحمام .

يتميز باستطالة ردة قوائم السقط . وريشتين من الألفيك .

ثوبه ال القهبة الصفراء تملوا رقشة حمراء متفرقة . راسه

إلى القهبة السوداء . عينه مكحلة بالجلوة . ساقه مسرولة

سحق الخالب || وهو شديد الطيران . يطير مسافات شاسعة

في طلب الرزق والامه . يقم في الغياي . قوته الجيوب والبرور

على اختلافها . يعيش أستراليا كبيرة . منه الغصون ترسمه

الانثى على الأرض قرب دغلة أو حويجة تبشرف فيه أربع

بيضات صغيرة مربعة تمحصها ٢٤ يومًا || له نومان مبروفان

خضفة البيداء وغمضة الثبت .



غُضَيِفٌ

Argyronète (F).

١٩٩٦٢ - غُطَّاسَة

هي الغصية المائية ، أظلم .

Podicipidae (S).

١٩٩٦٣ - غُطَّاسِيَّات

Podicipidae (F). Podicipidae (E).

فصيلة طيور مائية من رتبة كفيات القدم تتميز بأجسامها البيضية الشكل . امتلأها دقيقة مسطيلة ، ورواسها صلبة . أذناها حراثة . أرسافها خفيفة . أصابعها غليظة أطرافها عريضة مبعدة . ريشها ناعم ، حرري ، مصقول . أجنحتها قصيرة ذلقة ، أذناها مشعرة وعلية . أشهر أجناسها البطاس .

Pterocles senegalensis (S).

١٩٩٦٤ - غُطَّاط

Pterocle du Sénégal (F). Singed sandgrouse (E). قال المصري : « ضرب من الطفا » ظهر والبطون والإبدان سود بطون الإجنحة طول الإرجل والاعتناق لطاف لا يتجمع أرساباً وأكثر ما تكون ثلاثاً أو اثنين الواحدة غطاطة كذا قاله الجرجري وقال ابن سيده الغطاط الطفا وقيل الطفا ضربان فالقصار الإرجل الصغير الاعتناق السود القرواد الصهب الخوازي هي الكندرية والجولوية والوطاوي الإرجل البيض البطون الثغر الظهور الرأسية البدين هي الغطاط . وقيل الغطاط ضرب من الطير ليس من الطفا .

Neotragus pygmaeus (S).

١٩٩٦٥ - غُطَّاف *

Guevi (F).

حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من الغزلان . موطنه يمتد من ليبيريا إلى إفريقيا . يألف الغابات . ملجئه الحياتي جامي || جسمه صغير القد بطول نحو ٦٥ سم . ويرتفع نحو ٤٥ سم . قوائمه دقيقة . القوائم الأماميات أقصر من الخلفيتين . ثوبه إلى الشحنة السوداء المولج . صدره وبطنه إلى البياض الأبيض . قرنا الذكر قصيران دقيقتان . الإناث جاه ثنائية الأعلاخ || يعتبر من أسرع أنواع الغزلان وانفرا .

Vipère tigrée (F).

١٩٩٦٦ - غُطْرَب

الغُطْرَب حيَّة خبيثة تدعى أفسى ثمرة أظلم .

Vipère noire (F).

١٩٩٦٧ - غُطْرَب أَسْوَد

حيَّة خبيثة تدعى أفسى سوداء . أظلم .

١٩٩٦٨ - غُطْرَب الحَمْصِيَّات *

Aleurocratichus citri (S). Aleurode des citruses (F). ويدهى ذبابة الموالج البيضاء . حشرة من الطفريات صغيرة القد طولها يراوح بين ١ و ٢ م . حوريتها بيضية الشكل عمودية الظهر الأسود . حناصها كتيبة الأشباك الشمعية الأبيض . تركيب جميع أنواع الحَمْصِيَّات فتؤذيها لأنها تطب الأوراق بد أن تمتص صارتها .

١٩٩٦٩ - غُطْرُف الرِّمَان *

Siphonius granati (S). Aleurode des granadiers (F). حشرة من الطفريات صغيرة القد طولها يراوح بين ١ و ٢ م . جسمها اسمر اللون ، غير المادة الشمعية . تمتص مكها على الأوراق البنيات الحَمْصِيَّات فيقتف من حوريات مغلطلة الجسم الاسمر ، بيضية الشكل ، كتيبة الأهداب الشمعية الأبيض || تركيب أوراق وفئات الرمان والأجاص والسفرجل .

Plicatula (S).

١٩٩٥٥ - غُصَيَّة *

Plicatula (F). Plicatula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم وقصيلة القشاحات . أنواعها الماصرة المروية قليلة العدد منتشرة من المحيط الهندي إلى أطراف المحيط الهادي || أصداها صخرة الجرم ، مروحية الشكل ، متحفة القدم ، شماعة التخديد ، لاشعورية المصاروع ، المصراع الانسي محذوب الصفة قليل التخديد || تعيش لاصقة بالصخور البعيدة النور .

Gange 'brulé (F).

١٩٩٥٦ - غُصَّافَة

طائر من القفا يعرف بالغطاة الصحراوية .

Podiceps (S).

١٩٩٥٧ - غُطَّاس ، غُصَّاص

Grèbe (F). Grèbe (E).

جنس طيور مائية من فصيلة البطاسيات . أنواعه نحو ٣٥ أظلمها الماء . جميعها من القواطع ، ترتب في المياه العذبة . تتميز باستطاعة أمتانها ، غطاطها جالسة . أجنحتها قصيرة ذلقة . وهي تجيد السوم والتمسك ، قربها الأسماك الصغيرة والقشريات والحشرات والنفذات المائية . تدن في القصب والنازار والاسل حل صفات البحيرات والابار || أنثاها تقع من ٣ إلى ٦ بيضات تحضنها بتناوب الذكر مدة ثلاثة أسابيع . أشهر أنواعها البطاس المنرج والمطرق والأذن والصنجر .

Podiceps auritus (S).

١٩٩٥٨ - غُطَّاس آذِن

Grèbe oreillard (F).

طائر من البطاس متوسط الحجم طوله نحو ٣٥ سم . ثوبه متراكب الألوان الزاهية . غطله اسود الجسم ، أحر المنقط . أظلمه فصيلة الأرياء تشمل منظم بحيرات الشرق وأروبه التي يتفقد أكثرها في كل حول .

Podiceps minor (S).

١٩٩٥٩ - غُطَّاس صَغِير

P. fluviatilis (S). Grèbe castagneux, Plongeur nain, P. des fleuves... (F).

طائر من البطاس صغير الحجم طوله نحو ٢٤ سم . ثوبه متباين الألوان الزاهية . ظهره إلى السمرة يملوها موالج زرقوني . صدره إلى الوردية السوداء الموالج . بطنه اسهب اللون . صفته إلى الشقرة الكيتية . زفده أبيض . غطله اسفر الجسم ، اسود المنقط || أظلمه بحيرات ومنتاج وأجار العالم القديم يتفقد معظمها كل عام .

١٩٩٦٠ - غُطَّاس مُتَوَج *

Podiceps cristatus (S). Grèbe huppé (F).

طائر من البطاس كبير الحجم طوله نحو ٥٢ سم . ثوبه متراكب الألوان اللامعة . ظهره إلى السمرة السوداء الموالج . رأسه متوج القفن بقشنتين أفضة الأوتكاتز . محسره ويصنه بيض اللون ، سود الخناز الباعلي ، شقر الأهداب الخارجية . زوره وبطنه وغوايته فضية اللون ، صناعية الزرققة . زفده وصياحه جر . غطله اسفر الصفة العليا ، أحر السفلى ، أبيض المنقط . قاتمته إلى السمرة الخضراء . أظلمه الماء يجوب جميع البلاد متفقداً مياهاها السلية .

١٩٩٦١ - غُطَّاس مُطْرَق

Podiceps nigricollis (S).

Grèbe à cou noir (F).

طائر من البطاس متوسط الحجم طوله نحو ٣٢ سم . ثوبه متراكب الألوان الزاهية . صفته اسود . بطنه أبيض . وهو يجتنب المناطق الباردة ويجوب مياه البلاد الممتدة دون سواها .



غصية



غطاس متوج



غطاف



غُطْرَب الحَمْصِيَّات



غُطْرَب الرمان



ظفوف السنيان



ظفوف الفل



ظفوف القطن



ظفوف المنفوف



ظفوف النتن



غَفَّتْ ابن سينا

١٩٨٨ - غَفَّتْ ي ٥ Hydrobie (F).

نمت تعريف يملأ على النباتات والحشرات التي تعيش في الماء .

١٩٨٨ - غَفَّتْ ي ٥ Bifora (S). Bifora (F).

جنس نباتات عشبية حولية ييرة من فصيلة الخبيات .
انواعه المعروفة قليلة العدد منها بعض مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق أمريكا الجنوبية ||
جميعها كزبرية الشكل ، مسنجة الزخرفة . ازهارها صيواني التجميع . ازهارها بيضاء اللون . ثمارها شبه قلبية الشكل ، مبطلة الجرم ، محدة الراس للتمر || اعرف انواعها واشهرها التفصاة الحويصة .

١٩٨٢ - غَفَّتْ ي ٥ Bifora casticubata (S). Bifora casticubata (F).

نوع من التفصاة ، عشبية حولية ييرة . طويعة في بعض احزاب لبنان وسورية . ساقها ملساء فراء . اوراثها مركبة ، ويشية ، ثنائية التفرع . ازهارها صيواني . ازهارها بيضاء اللون . ثمارها معتدلة التبطيل قريبة الشبه بالخصي .

١٩٨٢ - غَفَّتْ ي ٥ Eupatorium (S). Eupatoire (F).

جنس نباتات صمرة من سبط الفصليات وفضيلة المركبات انواعه عديدة معظمها بري وبعضها زرع . ساقها غشوية . اوراثها لاقامية الانتظام والارتكاز منها البسيطة والمركبة ومنها المتعاقبة والمتعاقبة || ازهارها رؤسية صغيرة للعد . يزورها نحلة . يملؤها حلب مسن || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

١٩٨٨ - غَفَّتْ ابن سينا ٥ Eupatorium cannabinum (S). Eupatoire d'Avicenne, E. chanvrine, Chanvre d'eau, Chanvrine, Herbe de Ste Cunégonde (F). Water hemp, Hemp agrimony, Hemp weed (E). Hanfwasserdest. Wasserhanf (D).

بجلة سرونية مملوءة صمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراثها مركبة ثلاثية او خماسية الوريقات المستطيلة . نصلها اصصي الشكل ، مسن الحافة . ازهارها وردية اللون ، خماسية لولسية الرؤيات الصغيرة || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول . وفي رطب في المزارع الرطبة . كانت شائعة الاستعمال الطبي قديم الكلد وتستخدم في عدة علاجات لافسة اخرى .

١٩٨٥ - غَفَّتْ أُرْجَوَانِي Eupatorium purpureum (S). Eupatoire pourpre (F).

جنية سرونية صمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها اسطوانية سرسة . اوراثها السفلى خمسية براوح مبددا بين ٣ و ٦ . اوراثها العليا متعاقبة ، جميعها مسنقة ، متنايزة فنصل الحشن للملس || رؤياتها الزهرية هرمية كتجميع ، ارجوانية اللون || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين .

١٩٨٦ - غَفَّتْ أَسْمَر Eupatorium strorubens (S). Eupatoire brune (F).

جنية سرونية صمرة تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها ورديتها زياء اللحاء ، زغبية جزوي اللون . اوراثها معتدلة كبيرة للعد تطول نحو ٣٠ سم . وتعرض من ١٦ الى ٢٠ سم . نصلها

١٩٧٠ - غَفَّتْ السنيان ٥ Aleurodes quercus (S). Aleurode des chênes (F).

شجرة من الظفريات طويلا براوح بين ١ و ٢ م . ثمرها الى الصفار الباهت الشفاف المنش بالاسود || سورياتها مسنجة بنقط لامة متتابعة قاطية . وهي تركب اوراق السنيان فتزنها .

١٩٧١ - غَفَّتْ الفل ٥ Disaleurodes kirkaldyi (S). Disaleurode (F).

شجرة صغيرة من الظفريات طويلا براوح بين ١ و ١.٥ م . جسمها اسمر اللون ، مكنها اخضر . سورياتها تركب الاوراق على صفحتها السفلى وهي صفراء اللون ، غفراء اللوح ، يضاء الاهداب الشمية الثقيلة القصيرة .

١٩٧٢ - غَفَّتْ القطن ٥ Bemisia gossypiperda (S). Bemisia, Aleurode du coton (F).

شجرة من الظفريات طويلا نحو ١ م . لونها الى الصفرة الصنائية العابقة || سورياتها مستطيرة الشكل ، زيتية اللون ، مدبرة اخضر المنهدب . تركب اوراق القطن والبندورة والبادنجان .

١٩٧٣ - غَفَّتْ الملفوف ٥ Aleurodes brassicae (S). Aleurode du chou (F).

شجرة من الظفريات طويلا براوح بين ١ و ١.٥ م . ثمرها الى الصفرة تملو رقة سوداء . سورياتها مسطيلة الشكل ، صمراء اللون ، حليية المنافس ، تركب اوراق شتل الملفوف في اول ههها فتزنها لشد الانس .

١٩٧٤ - غَفَّتْ التتبع ٥ Aleurodes menthae (S). Aleurode de la menthe (F).

شجرة من الظفريات طويلا براوح بين ١ و ١.٥ م . اجنتها محبة العروق الوسطى || سورياتها يغبية الشكل ، غمدوية اللحم القليل اللادة الشمية . اهداب حشائرها حليية ، ثنائية التجميع || تركب اوراق التتبع فتزنها .

١٩٧٥ - غَفَّتْ لِيَات ٥ Aleurodidae (S). Aleurodidae (F).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنسة . اجنتها وانواعها حديفة جميعها صغرة القد سرسة المبراز يكر ويوجدوا في البلاد الحارة . تتميز برووسها المستعرضة صغرة كبيرة . قرونها الاستشعارية مركبة من عدة فواصل تراوح بين ٤ و ٧ . اغطالها بارزة مدية . جواشها عريضة . بطونها اسطوانية . ارجلها مسطيلة . اجنتها كبيرة . مستدرة الاطراف . اجسامها والجنسها مبدشة بمادة شمعية طليعية الشكل يضاء اللون || سورياتها مبطلة الجسم ، يغبية الشكل او مستديرة . ظهورها موشة بشده شمعي يخلط قدره باختلاف الاجناس .

١٩٧٦ - غَفَّتْ ي ٥ Immerger (F).

انفس في الماء فمده .
To immerger (E).

١٩٧٨ - غَفَّتْ ي ٥ الغفلنط . ج غفاطط : السخال الاناث .

١٩٧٩ - غَفَّتْ ي ٥ الغفلنط . ج غفاطط : السخال الاناث .

١٩٩٤ - عُقْر، عُقْر، بَيْل، ظَبْيِ أَسْوَد
Cervicapra (S), Cervicapre, Eléotrague, Antilope
des marais (F).

التفرج أغفار وفقرة وغفور ، والائى غفرة ، جس حيوان
من ذوات الظلف المجترات الخوقات القرون || أنواعه
خسة قرية الشبه من النزلان والظباء . أجسامها ربعة ،
ظهورها جالسة . قوائمها غيلة . أذنانها ممتدة الطول .
أنثا جاء الروس ، رباعية الاختلاف || أشهر أنواعه
ما يثير .

Cervicapra arundineum (S). غُفْر البُوصى - ١٩٩٥
Cervicapra des roseaux (F).

نوع من النور يشبه اليوم غير أنه أبيض الجسم ،
رشيق القوام وتصدر اللذب . ثوبه الى الزيدة السماء .
بطنه الى الياض الاخير . طوله نحو ١٢٥ سم . وطوله ٩٥ سم .
موطنه فسح الارعاء بمته من جنوب الصحراء الكبرى الى
شمالها المحيط الهادي || يألف النافع والودية الرحبة
الكثيرة البؤس . اجله مؤلف من ٥ أفراد : الفحل مع
انثيين واحدتين .

١٩٩٦ - غُفْر الحَبَشَة * ، بَهَار
Cervicapra bohor (S). Cervicapra bohor. Bohor (F).

من ٥ أو ٧ أفراد : فصل ٣ أنثى و ٣ أنثى و ٣ شواهد .

Pubescent (F). ١٩٩٧ - غفوري
نمت وصفي الدلالة على كون لحاء الشجرة يملؤها الغبار اي
الزغب .

Anobidae (S). **غفريات - ١٩٩٨**
Anobidés, Anobidés (F), Anobidae (E).

فضيلة شحات من رتبة عقيدتي الاجتمة. احتسابها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القفه تطلب فيها الاشكال الاسطوانية والاولوان السمره والبيضاء. احادها سامسة. قروها الاستعمارية منفردة الارتكاز غيبطة او مرصية مركبة من ١٥ او ١١ فاصلة. ارساها خاسية العقل. رتاقها خاشية تمشي في الاتفاق التي تنفجرها في مختلف الاحساب وتحت الماء وصل المواد النباتية المصنوعة كالنيز وما شئت.

١٩٩٩ - غفيرة التبغ هي النخيرة ، اطلبها .

٢٠٠٠ - عِفْرِيةُ الخُبْزِ *

حشرة مبلولة من التفريات طولها من ٢ الى ٣ سم. ثوبها الى الحنطلي الاحمر المواج. ظهورها مخد القند || يرقاها دامته تركب الخبز والقيق والكتب والمعاش.

Vrillette opiniâtre (F). هَفْرِيَّةُ الْحَسَبِ ٢٠٠١
مكتبة المطبعة الوطنية

٢٠٠٢ - غفيرة الصنوبر * *Ernobius mollis* (S).

Ernobie, Vrille des pins (F).
حشرة من الففريات جسمها أسطواني الشكاري بطول من ٦ إلى

النملبي الشكل ، عابق الخضار الاسمر الموج ، احمر
البروق ، ازغب البشرة ، مهدب الحافة || ازهارها مختلفة
الالوان منها الاحمر الزاهي والوردي والبيضي || ازهارها
يستمر من آذار الى آب .

١٩٩٨٧ - عَقَبَت وَرِيع
Eupatorium altissimum (S). *Eupatoire élevée* (F).
 بنبئة معمرة سبروتية تملأ من ١٢٠ الى ٢٥٠ سم. اوراتها
 لائقة. نصلها يسرق الصلصة ، ثلاثي القروى ، مسنن
 الزام الاخير || ازهارها حلقة التجميع . رؤيتها
 خاسية الازهار البهق || ازهارها يستمر من اليلول الى
 تشرين .

١٩٩٨ - غلث سمندر جي
Eupatorium coelestinum (S). Eupatoire azurée (F).
بجاء مسمرة ٿيڻ، تيلو من ٣٠ ال ٩٠ سم. اوراڻيا السلي
مقابلو ۽ عالميا متعاقب ٻي ممتعة نطول من ٥ ال ٨ سم.
وتعرض من ٢٠ ال ٣٠ سم. نصلها ريحي الشكل مقطوم
المتخاض || ازهارها صمبوزية اللون ، عطرية الرائحة .
ازهارها يستمر من مجوز ال ايلول

١٩٨٩ - حُلَّتْ صَغِيرَ الزَّهَرِ
Eupatorium micranthum (S). Eupatoire à petites
fleurs (F).
بجلة سبروتية سرحة مرطاة تلمو من ٥٠ إلى ١٢٠ سم.
أوراقها منتنة اهليجية مقطوعة || أزهارها صغيرة القند.
رويساتها تلمو من ٩ إلى ١٢ ذرة لونها أبيض الياض الوردي
الموازي || أزهارها يستمر من أبرد إلى تشرين

١٩٩٠ - عَثَّ عَطِر
Eupatorium aromaticum (S). Eupatoire aroma-
tique (F).
جنية سبوتية ممره تعلو نحو ١٠٠ سم. أوراقها معتقة ،
نصلها ثلاثي البروق ، يضي الشكل ، قلبي القاعد ،
يطول من ٨ إلى ١٤ سم. ويمرض من ٢ إلى ٤ || ازهارها
عديقه التجميع عديدة الزوايت المراكبة البيضاء اللون
الطوبى العرف || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول

١٩٩١ - عَثْ مَطْع

Eupatorium maculatum (S). *Eupatoire maculée* (F).

بُجَّة سِرْبِيَّة مِمْرَة تَعْلُو مِنْ ١٠٠ أَلِ ١٨٠ سَم. سَافَتَا
عُودَة زَيَّاه وَ اِخْدَافِيَّة حَر. اَوْرَاتِهَا الْبُغْل خُشِيَّة وَ
ثَلَاثَة اَوْ سَدَاسِيَّة التَّجْمِيع. اَوْرَاتِهَا الْغَلِيَا مُتَابِقَة. حَمِيَّة
مُحَنَّة. تَصْلَحَا سَنَاقِي الشَّكْل. سَمِيك الْبُغْصَة. ثُنَائِي
الرَّوْق لَظْلُفَة || رُوسِيَّاتَا قَصَم مِنْ ٨ أَلِ ١٠ اِنْجَار
وَرْدِيَّة أَوْ نَظْبِيَّة الْاَلْوَن || اِنْجَارَهَا يَسْتَمِر مِنْ آبِ اَل
اَلْمَل.

١٩٩٢ - عشيات
Eupatorioides (F).
سهل من فصيلة المركبات اجنامه وانواعه عديدة اشهرها
النفث والنولان والظلم والمغفوان والعنكب والميكانيه .

١٩٩٣ - عشرين



تقفر الحبيشة



غفرية الحيز



خفوية المينور

٧ م. ثوبها حطلي اللون ، ابرم الموج . رقتها تركب
الصنوبر للممر فترفض اللحاء والشكير .

٢٠٠٠٣ - **غُفْل** (E). *Métal cru* (F).
حالة المدن كما هو في الطبيعة .

٢٠٠٠٤ - **غُفْل** (E). *Inertia* (F).
٢٠٠٠٥ - **غُفْر** هو تجس الشعراء ، اطلبه .

٢٠٠٠٦ - **غُفُور** (E). *Melothria* (F).
جنس نباتات عشبية متسلقة من فصيلة القرقيات . مهدا
بعض المناطق الاسيوية والافريقية الحارة . حولتها طويلة
لاشعبة . اوراقها كبيرة قلبية الشكل او اهليجية .

٢٠٠١٤ - **غُفْلَة لحي** ، **غُفْلَة لحي** (E). *Umbra limi*
سكة من الغلاء تعيش في بحيرات المياه الباردة ، طولها نحو
١٢ سم. ثوبها الى السرة الحليقة يبق عنده الظهور .

٢٠٠١٥ - **غُفْلَة** (F). *Févier*
هي النسوة شجرة من القرقيات القرشانية ، اطلبها .

٢٠٠١٦ - **غُفْلَة** (S). *Glauca* (F). *Glauca* (F).
جنس حورانات بحرية من الرخويات صدمات الاربيل
خلفيات الخياشيم ، الزواحف المرفوعة عديدة منتشرة في المحيط
الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || جميعها بيضاء ، اسرارها

واقرة البعد . اجسامها هراطة ، مستطيلة ، حلابة ،
تنتهي باذناب دقيقة . رؤوسها رباعية القواس الحرويلة
الشكل . خياشيمها جانبية الاوتكار ، كفية ، رباعية
الازواج المتقابلة . انوارها جميلة الالوان الزاهية ، يكثر
فيها الازرق والاصفر والاسود والابيض والوردي .

٢٠٠١٧ - **غُفْل** (F). *Tégument* (F). *Tégument* (E).
هو ما يغطي بعض الاعضاء النباتية كالقشور في الحيوان ،

٢٠٠١٨ - **غُفْل** ، **غُفْل** ، **غُفْل** (F). *Galne* (F).
هو ما يلفظ الشيء . راسع غمد .

٢٠٠١٩ - **غُفْل** ، **غُفْل** (F). *Péricarpe* (F).
Pericarp (E).
يشترك غلاف الثمرة من ثلاثة اجزاء : الخارجي والمتوسط
والداخلي . فالخارجي يدعى الحاء والمتوسط السيوت والداخلي
الانلوكرب .

٢٠٠٢٠ - **غُفْل** ، **غُفْل** (F). *Périchondra* (F).
Perichondrium (E).

٢٠٠٢١ - **غُفْل** ، **غُفْل** (F). *Biosphère* (F).
Biosphere (E).
الغلاف الحيوي اسم يطلق على قشرة الارض السطحية
حيث يعيش الانسان والحيوان والنبات .

٢٠٠٢٢ - **غُفْل** ، **غُفْل** (F). *Hydrosphère* (F).
Hydrosphere (E).

٢٠٠٢٣ - **غُفْل** ، **غُفْل** (F). *Pericycle* (F).
Pericycle (E).
اسم يطلق على التسج الحشوية ، ان في لساق ام في الجذر ،
الكائنة بين الحزم الوعائية والشكير .



غلاف

٢٠٠١٠ - **غُفْل** (F). *Inerte* (F). *Inert* (E).

٢٠٠١١ - **غُفْل** ، **غُفْل** ، **غُفْل** (F). *Invagination*
دخول جزء من تسج في تسج آخر . وهو ان حسل في
الصران كان حتمالاً .

٢٠٢٤ - غِلَاف بَكِيس

Lithosphere (F).
Lithosphere (E).٢٠٢٥ - غِلَالِيَتْ Galilith (F), Galilith (E).
جيتين صناعي صاف يستخرجون منه مادة قاسية كالقطن
كبيرة الاسماك الصنعي.

٢٠٢٦ - غِلَاكُنْ

Gadiculus (S), Gadicule (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الغاديسات للمسافات. انواعه
قليلة. اصنافها يحار البلاد للمتدلة الحرارة انحصا شرقي
وجنوبي المتوسط. اجسامها صغيرة القد، اطليجية
الشكل، عديمة الزمافق، سفلية الشفق، كبيرة العين
المستديرة البارزة. احرف انواعها واشهرها التلان الغفي.٢٠٢٧ - غِلَاكُنْ لَفِيفِي Gadicularius argenteus (S).
Gadicule argenté (F).
سمكة من التلان اصنافها بعض مناطق البحر المتوسط. طولها
يراجح بين ١٥ و ١٢ سم. ثوبها وردي اللون. بطها
وصهرها الى الفضة، زعانفها ربادية. لحمها مستحب
الطعم.

٢٠٢٨ - غِلْبُولْ

Galbula (S).

Galbula (F), Galbula (E).

جنس طير من فصيلة الغلبوليات ورتبة الجواثم واهانت
المنائر. انواعه المعروفة ستة جميعها من طيور البرازيل
وفنزويلا. اجسامها ريمية رشيقة تطول من ١٨ الى ٢٤ سم.
تتميز باستطالة المنانيد الهززية الشكل. اجنتها
قصيرة. اذناتها مسطيلة، ورتاجية الرقاع. اقربها سراكية
الالوان الصفراء المروج. بعض انواعها ابيض الزور. ثاثة
المنانيد تلتصق دون سواها. قوتها الحشرات وبعض الثمار
المتينة البرية.

٢٠٢٩ - غِلْبُولِيَّات

Galbulidae (S).

Galbulidae (F), Galbulidae (E).

فصيلة طير من الجواثم واهانت المنانيد. اجنتها وانواعها
المعروفة عديدة. جميعها من طيور البلاد الامريكية
اشهر اجنتها الجفجار والتلبلول.

٢٠٣٠ - غِلْكَهْ لَمَزَلْ

Produit, Revenu (F).

Produit, Revenu, Income (E).

هي العمل او الربح وقد شاع استعمالها على حاصل الارض
الزراعية.

٢٠٣١ - غِلْطُونِيَا

Galtonia (S), Galtonia (F).

جنس نباتات ترابيية من فصيلة الزنقيات. مهدسا
افريقية الجنوبية. انواعها المعروفة قليلة. دروسها
مستديرة الشكل. ساقها اسطوانية تطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم.
اوراقها قرصية الالتشاح. صفحية. تطول نحو ٧٥ سم.
وتعرس من ٥ الى ٧ سم. تصلها الى الخضار
المايق الاذوق الملوحي. انبرازها معتدلي التجميع يطول
نحو ٣٠ سم. يحمل من ١٥ الى ٣٠ زهرة قمية الشكل،
كبيرة القد، يضاء اللون، متدلية. تنموها يستمر من
تموز الى ايلول.

٢٠٣٢ - غِلْكَتْ

Criblure (F), Siftings (E).

ما ينفية الغربال او يبقى بعد الفلته من حبوب صغيرة
وزرد غريبة واجرام. والثالث يصلح طعاما لطيور
الدواجن.

٢٠٣٣ - غِلْطِيْ

شجرة مرة قيل تهرجا يهلك السباع (السان).

٢٠٣٤ - غِلْطُوقُ ٥، غِلْطُوسَا ٥

Galeruca (S), Galérucque (F).

جنس حشرات من فصيلة النضاريات ورتبة مفدمات
الاجنحة. انواعه عديدة جميعها صغيرة القد، غيطية
الزرقا زاهية الالوان. رقاتها خاضعة. تركيب اوراق
النبات فتوحها. اشهر انواعها ما يتبع.

٢٠٣٥ - غِلْطُوقُ الدَّرَّكَارُ ٥

Galerucella luteosa (S), Galérucque de l'Orme (F).

حشرة من الفلروق جسمها ابيض الشكل يطول نحو ٧ مم.
ثوبها الى الصفراء الخشن يطول موج اطول. اجنتها
الحولية اثنتان. رقاتها صغيرة القد تركيب اوراق الدردار
تفترس النصل وتقضي عليه.

٢٠٣٦ - غِلْطُوقُ الشَّامِ ٥

الطلب تضارية القرميات.

٢٠٣٧ - غِلْطُوقُ الشَّيْطَانِ ٥

Galerucella tenella (S), Galérucque du fraisier (F).
Strawberry leaf beetle (E), Erdbeerblattkäfer (F).حشرة من الفلروق جسمها ابيض الشكل يطول نحو ٤ مم.
ثوبها حنطي اللون، اغبر المواج، جيلها الحولي واحد.
رقاتها تركيب اوراق الشيكك فتلتهم النسيج وتمتد من
المرق.

٢٠٣٨ - غِلْطُوقُ المَغْثِ ٥

Agelastica alni (S).
Galérucque de l'aune (F).حشرة من الفلروق طولها نحو ٦ مم. ثوبها الى الزرقة
البشجية. وسيدة الجبل الحولي. رقاتها صغيرة القد
تمتد بجسمه على اوراق المغث فتلتهم الواحدة بعد
الاخرى الى ان يتم اتلافها فتترك الارواق وتستقر
في القرية حيث تمخل وتبيض.

٢٠٣٩ - غِلْطُوقُ التَّرْجِسِ ٥

Malacosoma lusitanica (S), Galérucque des
narcissos (F).حشرة من الفلروق طولها نحو ٧ مم. ثوبها الى الصبغة
الصنايية البرتقالية. تركيب وكؤذي ريام وانواع الترجس
والزريق وسائر النباتات السكرية. رقاتها تمتد في
القرية عادمة الاذي.

٢٠٤٠ - غِلْطُطِيْ ٥

Gault
ساف من الطبقة الباشيرية يعرف بالالبسي، اطلبه.

٢٠٤١ - غِلْطَلْ

Pivot (F), Tap-root (E).

الفلغل عرق الشجرة اذا آمن في الارض. ج غلاغل.
راسع جنت.

٢٠٤٢ - غِلْطُوْ

Galago (F).

حيوان لبون من الليموريات يدعى دغفوس، اطلبه.

٢٠٤٣ - غِلْطُوقُ ٥

Galgulus (S).

Galgule (F), Galgulus (E).

جنس حشرات داسنة من لفصيلة الاجنحة المختلفة. انواعه
المعروفة نحو عشرة تعيش على شفاف المنافع ويجاري الماء
غائرة في الاسمال والاسمال. اجسامها صغيرة القد.

غلوق الدردار



غلوق الشيك



غلوق المغث



غلوق الترجس

٢٠٠٥٤ - **غُلْدَه ٥٥**، **قَار التَّيْل** **Golunda**
جنس دوبيات لبنة فاقمة من الجرديات وصيلة الفأريات.
انواعه قليلة مطبقة افرقية والحدس ورتديب. جميعها صغيرة
القد. اوراقها الى السرة المنشة بالاصفر والاحمر بطريا
الى الياض الاغبر. صوفها خشن للمس || تألف
المحلول والمراعي وزراعات البن. قوتها قليل وزمات البن
واوراقه وقد تهب الرز وتقرنه في اجسامها .



غلف

٢٠٠٥٥ - **غُلْنُوس** **Glinus (F), Glinus (E).**
جنس نباتات عشبية ، حولية ، برية ، مرعوية من فصيلة
الغبريات . انواعه المعروفة قليلة العدد منهاها صوف
البحر الابيض المتوص || صوفها مستطبة || اوراقها ملوقة
او بيضيه مقلوبة . ازهارها ابيض الازتكاز . ازهارها
صفراء او بيضاء اللون . تنويرها صيفي || اعرف انواعه
غُلْنُوس بشنبي وغُلْنُوس قديمي .

٢٠٠٥٦ - **غُلْنُوس بَشْنَبِي** **Glinus lotoides (S), Glinus lotoides (F).**
نوع من الغلنوس . ساقه مستطبة ، منتشعة ، مستطبة .
اوراقه شبه بيضيه النصال . ازهارها ابيض . ازهارها بيضاء .
تنويره صيفي .

٢٠٠٥٧ - **غُلْنُوس دِكْتَمُونِي** **Glinus dictamnoides (S), Glinus dictamnoides (F).**
نوع من الغلنوس يربط في المروج الرطبة . ساقه منتشعة ،
مستطبة . اوراقه صغيرة النصال ، ملوقة ، ازهارها صغيرة ،
قديمة اللون . تنويره صيفي .



غلفه

٢٠٠٥٨ - **غُلْنُوم** **Aglaonema (S), Aglaonema (F).**
جنس نباتات معمرة برية وتربيتية من فصيلة التلقاسيات .
انواعه المعروفة قليلة العدد اصلها بعض مناطق الهند وبنبر
الزنج || صوفها قصيرة . اوراقها متنامية ، منتشعة ،
محفونة الاضلاع ، سانية النصال المتعفة الاطراف .
ازهارها محوري الانتشاب ، صبي التجميع . ازهارها
صغيرة ، شبه انبوبية الشكل . منها الاحمر والاصفر
والوردي . اوراقها فواحة العرف الطري المستحب ||
تزرع في المراكز للزينة .

٢٠٠٥٩ - **غُلُوْبُولِين** ، **غُلُوْبُولِين** **Globulina (F), Globulin (E).**
مادة آسية تكون في كريات الدم .

٢٠٠٦٠ - **غُلُوْتَامِين** **Glutamine (F), Glutamin (E).**
مادة ازوتية تكون في بعض النباتات كالشوفور .

٢٠٠٦١ - **غُلُونِين** **Gluten**
هي المادة الازوتية في الدقيق ويركب بالفلورن من الفلورين
والجليدين .

٢٠٠٦٢ - **غُلُوْتِين** **Gluténine (F), Gluténin (E).**
مادة ازوتية ثانوية توجد في دقيق الحبوب .



غلوم

٢٠٠٦٣ - **غُلُوْدُس** **Glaucodes**
جنس فلور مجهرية من فصيلة المدكيات . يتميز بخصائصه
المحيطة الشكل ، المبشرة او التسمية التجميع ، السطحية
الارتكاز . انواعه التي اهم الاقتصاد الزراعي قليلة اعرفها
غلودس التفلح .

شبه بيضيه الشوزن ، مطبقة الشكل . تتميز بينها
الناترة الكبيرة وبامتداع قوائمها الخلفية التي تمكها من
الغفر . اوراقها مزيج من النشمة والشبهة يملوها تجميع
اسر ورفقة خضراء . قوائمها مطبقة بالاحمر .

٢٠٠٤٤ - **غُلُوْدِيَّات** **Galguliidae (S), Galguliidae (F), Galguliidae (E).**
فصيلة حشرات من نصفة الاجنحة المختلفة . اجناسها
وانواعها قليلة العدد . اصلها البلاد الحارة والمعدلة الحرارة
من القارتين القديمة والحديثة || مطر انواعها يعيش قرب
الماء او متنسأ في الامسال والاضلاع . بعضها خاضل
والبعض الآخر دامن || اعرف اجناسها واغبرها للتلؤلؤ .

٢٠٠٤٥ - **غُلْب** ، **كَرْكُومَة** **Scapella, Caralluma (S), Scapella (F), Carrion flower (E), Scapella, Scapella (D), Scapella, Fior di rospo (F).**
جنس نباتات برية وتربيتية من فصيلة الصقلابيات .
ازهاره نحو ٧٥ جميعها من نباتات المناطق الصحراوية
يقال ان مهدا الاسل كان بعض لاني افرقية الجنوبية .
اوراقها سيقان لحية ريمية الاضلاع السلة . ازهارها
لحية كبيرة القند تلؤلؤ الارواق .

٢٠٠٤٦ - **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** **Hyménium, Yolve (F), Hyménium, Skin (E).**
غلاف بشروي رقيق يحيط ببعض الفطور عندما تكون
في طورها للتوري .

٢٠٠٤٧ - **غُلْبُك**
لبت في الماء وقره هريض || وهو ورق الكرم ما دام
حل يجمر || وهو الطلح وكل خضرة حل رأس الماء .

٢٠٠٤٨ - **غُلْبُك** **Clé de voûte (F), Keystone of a vault (E).**
حجر شبه مخروطي الشكل يلقن به قوس البند .

٢٠٠٤٩ - **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** **Vincetoxicum officinal (S), Vincetoxicum officinal, Asclepiade officinale, Domphe-venin (F), Tamepison (E), Echte Schwalbenwurz (D), Vincetoxicum, Bozoli (I).**
مخفزي
جنية طبية معمرة من فصيلة الصقلابيات . ساقها منتشعة
غزيرة الصارة البلية اللبية والمفاداة السموم . اوراقها
متغابلة ، كاملة ، اهلجية . نصلها شديد الخضرة .
ازهارها غلقة التجميع ، بيضاء اللون يملوها مزاج فتى .

٢٠٠٥٠ - **غُلْبَة الدَّيْب** هي الحمرل ، اطلبه .

٢٠٠٥١ - **غُلْبُكَتَز** ، **لَبَنَز** **Galactase**
خيرة لبنة تذيب اللبنين في اللبن .

٢٠٠٥٢ - **غُلْبُكَشُور** **Galactose**
عرب من التلوكوز يحصل من تحول البنوز .

٢٠٠٥٣ - **غُلْمَة** **Nymphomania (F), Nymphomania (E).**
ازدياد شهوة السفا في اناث الحيوانات . اسبابها عديدة
منها طبيعية ومنها مراضة . فالاسباب الطبيعية تقود معظمها
الى العقم الدائم ، اما الاسباب المراضة فمعها وقتي . والاث
في هذه الحالة تنسى مغلف . راجع اختلام .

Glycérine (F). **غَلِيْسَرِين** ٢٠٠٧٦ -

Glycerin, Glycerium (E).

سائل متادل لا لون له يذيب في الماء ويحصل من متصين المواد الدنعية .

٢٠٠٧٧ - **غَلِيْسِين** هي البلية ، اطلبها .

٢٠٠٧٨ - **غَلِيْسِين عَسَلُوكِيَّة** *

Aplos tuberosa (S). Glycine tubéreuse (F).

نبات عشبي عارض ممر من فصيلة القرنيات الفراضية . جالوره مصقولة، اجاصية الشكل، مأكولة . ساقه ممددة . عارشة . طولها نحو ٤ أمتار . اوراقها مركبة . وريقاته وثرية التجميع ، بيضية الشكل، مستطبة العنقة || ازهاره عطرية الرائحة ، حمراء اللون ، ازهاره عنائيه محورية الانزكار .

Crassiceps (F). **غَلِيْظُ الرَّأْس** ٢٠٠٧٩ -

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان او حشرة مستطيلة الرأس .

Crassicole (F). **غَلِيْظُ العُنُق** ٢٠٠٨٠ -

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان مستطعم العنق .

Crassicorne (F). **غَلِيْظُ القَرْن** ٢٠٠٨١ -

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان مستطعم القرن .

Eudothèque (F). **غَلْبِيَّة** ٢٠٠٨٢ -

الغليظة شاة داخلي يظف فص الملك .

Glycose ٢٠٠٨٣ - **غَلِيْكَوْز**

الغليكوْز اي سكر النخب مادة يدهاء سكرية قابلة للاختبار تكون في البَّار والسَّل وبغيرها .

Pipe ٢٠٠٨٤ - **غَلِيْن**

غليْن ج. غلايْن ، اداة تستعمل لتسعين التَّن المفروم .

٢٠٠٨٥ - **غَمَّ** ، **غَمَل** ، **غَمَم**

Ensachage, Capuchonnage (F). Putting a hood (E). تغليف الازهار بالاكياس منفا لتجهيها . وتغليف البَّار لاصنائها . ويقال للبَّار والَّار الناجمة عن هذه العملية بلور او ثمار مشمولة او مشمولة .

Plafond (F). Celling (E). **غَمَّاء** ، **غَمَمِي** ٢٠٠٨٦ -

هو سقف البيت . ج اغمية واغاء . ويقال غمى البيت وبغيبه . غطاء بالخشب والطين .

Colymbus (S). ٢٠٠٨٧ - **غَمَّاس**

Plongeon (F). Diver (E). جنس طيور مائية من فئيات القدم موطنها البلاد الباردة تنح منها في الشتاء نحو الاقاليم المعتدلة . انواعها المعروفة اربعة جميعها كبيرة القد ، مستطيلة العنق، جبالسة المنق . اناذها واثقة . اجنحتها صغيرة . اناذها جعدة . ارسافها سريية || تألف البعاب والبعيريات ولاظهر على السواء . قوتها الاسماك الصغيرة والقشريات . تدثر في انفصيص رتبها على الشطوط وصفات الجبيرات واعواد الانهار . انماها تضع بيضتين متحفها بمنارة الذكور ثلاثة اسابيع || اشهر انواعه غمام الحسن وغمام القطب .

٢٠٠٨٤ - **غُلْدُوسُ النَّفَّاح** ، **بَلَطُش دُخَانِي** *

Glocodes pontgena (S). Bloch fumoux, Maladie de la sule (F). Sooty blotch (E).

نطر مجهري يركب اثناد ونمَّار للنفَّاح والاجاس . مظهره انجاسي على الافئدة يقع كالنمَّان حيث ولونا ، لا قياسية الشكل والحجم ، متتابعة الاتصال تسبب انصداع البشرة وبعض الاذى || وهو على البَّار يقع بسر لا قياسية الشكل والحجم تركب البشرة فتشوها دون ان تسلب الب . يتكاثر ويغفل في الاماكن الحارة المرتفعة للرطوبة النسبية . يتكاثر بمشاكل عليل بويود المركز من ٠.٦ الى ١ ٪ بشرط ان تحصل المكافئة في اياتن ظهور الوسم .

٢٠٠٩٥ - **غُلُوسِيَا** اطلب هيدرات الكربون .

Gludnum ٢٠٠٦٦ - **غُلُوسِيَوْم**

هو البريليوم . اطلبه .

Glouton (F). **غُلُوتُون** ٢٠٠٦٧ -

هو الثرة حيوان من السرمويات ، اطلبه .

٢٠٠٦٨ - **غُلُوكْسِيَّة** ، **سَلُوكَان**

Gloxinia (S). Gloxinie (F). Gloxinia (E). Gloxinien (D). Gloxinia, Algeria (I).

جنس نباتات عشبية مصدورية مسرة من فصيلة الجسريدات . انواعها المعروفة ١٢ اما ضردها وبغيبها فثلاثة العدد . جميعها زينة . سقها جنسورية . اوراقها مدعنة متعاقبة كثيرة اللند . فصلها جيل الخضار . خل البشرة ، بارز المروق والثراين . انواعها فردية ، طويلة الزناد ، بوقية الشكل ، بحلة الالوان الزاهية .

٢٠٠٦٩ - **غُلُوكُوْز** ، **سُكَّر العنب**

Glucose مادة سكرية يدهاء قابلة للاختبار تكون في البَّار والسَّل وبغيرها .

٢٠٠٧٠ - **غُلُوكُوْزِيْد** (F). Glucoside (E).

مركبات نباتية تحوي الكثير من الغلوكُوْز فيستخرج منها .

٢٠٠٧١ - **غُلُوم** ، **غُلُومِيَا**

Galeomma (S). Galeomma (F). Galeomma (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم وعصيلة اللشويات . انواعها المعروفة متصلة العدد منتشرة في منط بحار العالم القديم احصاها البحر الابيض المتوسط || اجسامها ملحقة باصداق شبه هورية الشكل تشب في الصغور البحرية وتنتشر عليها .

٢٠٠٧٢ - **غُلُومِيَّات** *

Galeommidae (S). Galeommidae (F). Galeommidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة من غابرة ومماصرة كثيرة العدد منتشرة في الطبقة البسيانية وفي منط بحار العالم . اصداقها صغيرة ، شبه مستديرة ، ثنائية المصارع عامة لتستين || اشهر اجناسها الغلوم والسلتين والميرابية ...

٢٠٠٧٣ - **غَلِيْدَايْن** ، **غَلِيْدَايْن**

Gladiine (F). Gladin (E). مادة البوريةية اي آحبة تكون في الدقيق .

٢٠٠٧٤ - **غَلِيْن**

Ebullition

٢٠٠٧٥ - **غَلِيْسَرِيْد** (F). Glycerid (E).

اسم شامل لاثريات الغليسرين من زيتين ويزفرين وتغلين وبغيرها بما يدل على تركيب الادمان .



غلوس النفاح



غلوكسنية



غلم



غليسن مصقولة

٢٠٠٨ - **فكاسة الحُسن**

Colymbus stellatus C. septentrionalis (S). Plongeon cas-marin (F). Red-throated diver (E).

طائر من النُاس كبير الجُفَة طوله نحو ٧٠ سم. رأسه وبقته الى الريدة المُخلد. ظهره الى السرة القاتمة وكذلك سائر صفته البيا من التفتن الى الذنب. صدره وبقته واطلاعه الى البياض الناصع. غطته اسود اللون || يَرحُج من البرد من الشمال الى الجنوب نحو المتوسط وشاطئ الهند.

٢٠٠٨٩ - **فكاسة القُطب**

Colymbus glacialis (S). Plongeon imbrin, P. glacial (F). Great northern diver (E).

طائر من النُاس كبير الجُفَة طوله نحو ١٠٠ سم. رأسه وظهره الى السواد الغامق. بقلته وسدره واسفل بقلته بياض. ابطاه جُمَّنة ومُبقجة بالاسود || يَرحُج من البرد من الشمال الى الجنوب نحو المتوسط الاروية.

٢٠٠٩٠ - **عُمرُوسيات**

نبات على شكل اللذان ينبت في الربيع.

٢٠٠٩١ - **عُمرُوسيات** هو الأريان ، اطله .

٢٠٠٩٢ - **عُمرُوسيات** ، **عُمرُوسيات**

Gnatophyllum elegans (S).
Gnatophyllum elegant (F).

حيوان بحري من التشريرات حشرات الارجل طول الدليل يمتد الى فصيلة القرصيات. اطلانه البحر الابيض المتوسط || جسده اهليجي الشكل ، منتفخ الدليل ، يطول نحو ٧ سم. متكه قصير القد ، مسن المختار . ثوبه الى الشقة المنقطة بالاصفر اللحي || يعتبر من الانواع الفاعرة الصف المرفوب فيها .

٢٠٠٩٣ - **عُمرُوسيات**

Ouroparis gambir (S).
Gambir (F).
شجرة برية ممررة من فصيلة الفويات منها الملايو . يستخرج من اوراثها بدق قلعها بلماء وقلها مادة صمغية رائتية تشبه الكاكو لها استعمالها الطبي والصناعي .

٢٠٠٩٤ - **عُمرُوسيات** ، **عُمرُوسيات**

Elytre (F). *Elytron* (E).
معدج أعاء . والاغدا هي الاجنحة العليا لخشرات رية عُمرُوسيات الاجنحة هي صلبة قرنية المادة ممها حفظ الاجنحة الرقيقة المرسدة تحتها المرفوعة بالوراث .

٢٠٠٩٥ - **عُمرُوسيات**

Gaine (F). *Sheath*, *Ocrea* (E).
قاعدة ملاقاة الورقة وهي تحيط بالساق قليلا أو كثيرا وقد تكون طويلة ناسبة في التنبليات .

٢٠٠٩٦ - **عُمرُوسيات** ، **عُمرُوسيات**

Etui médullaire (F).
Medullary sheath (E).

٢٠٠٩٧ - **عُمرُوسيات الحُناج**

Coléoptéroïdes (F). *Elytron* (E).
طبقة حشرات من شبة الحشرات وطالفة الاجنحة اصلا . تشمل رية واحدة تسمى غمفة الاجنحة . حشرتها تعرف بالغشاء او الخنفسه . جميعها غناش والذراء تسمى حوربة جميعا حوريات .

٢٠٠٩٨ - **عُمرُوسيات** ، **عُمرُوسيات**

Coléoptères (F). *Coleoptera* (E).
رية حشرات من طبقة عُمرُوسيات الحناج . اجناسها وانواعها زهاء ٣٠٠٠٠٠ منتشرة في جميع اقطار العالم ، جميعها ١٦ لمة والديد من الفصائل || جميع حشراتا تامة التطور قارضة . مجنحة . اجنسها موقفة من زوجين الزوجين لملحان للزواج السفل القشالي التركيب الذي يقتصر عند الطيران . معظمها من الحشرات المفترسة وبعضها يقتل بالوراد الضوية || رقاتها مفترسة او عاشية . حورياتها طليقة القيد . كلها مكونة من افرادات خاصة تسمى اليها بعض المواد الضوية وتلاها || أشهر فصائلها ، الميريد من اجناسها وانواعها في لبنان وسائر البلاد العربية ، هي القانسية : البطرشيات ، الجليات ، النصبقيات ، السالوليات ، السرفيات ، السويات ، الغلايات ، النشيات ، السرفقيات ، القانريات ، الكراشيات ، الككيات ، المتصيات ، الناصعات ، النصاريات ، والريشيات .

٢٠٠٩٩ - **عُمرُوسيات**

Epruvette graduée (F).
Graduated gauge (E). ج أمار . ويرث ايضا بالاناطل .

٢٠١٠٠ - **عُمرُوسيات**

Chaos (F). *Chaos* (E).
الدمر هو الخواء ، اطله .

٢٠١٠١ - **عُمرُوسيات** ، **عُمرُوسيات**

Submersion (F).
هو الاسقام بالنور أو التغطيس .

٢٠١٠٢ - **عُمرُوسيات** هو الورس ، اطله .

٢٠١٠٣ - **عُمرُوسيات**

Zostera (S). *Zostère* (F).
Eel grass, *Turtle grass*, *Grass warck* (E). *Zwerg-seagrass* (D). *Zostera*, *Alga del vetral* (I).
جس نباتات مائية من فصيلة عرائس الماء . انواعها المرفوعة ثلاثة . منها مدادة . اوراقها خيطية مستطيلة ، قوامها مخدبة . اطرافها خيطية ، جيجها تغلق من سنايل مكونة من صف واحد من الازرار البسطة .

٢٠١٠٤ - **عُمرُوسيات**

Gammarus (S).
Gammarus (F). *Gammarus* (E).
جس حوريات بحرية من القشريات القليسا وفضيلة القموسيات . انواعها المرفوعة كثيرة العدد معظمها يعيش في بحار وأهتر البلاد الباردة || اجسامها ممدودة القد . اطوالها اقراوح من ٢ الى ٣ سم . زياتها مركبة ثلاثية الفصل . الزوج الاول من قوائمها ملتصق بالراس وينتهي بملاط فكية . الزوجان الثاني والثالث ينتهيان بكلمات قافضة . اثوابها شبيبة الالوان وسها الابيض الشفاف .

٢٠١٠٥ - **عُمرُوسيات**

Gammaridae (S).
Gammaridae (F). *Gammaridae* (E).
فصيلة حوريات مائية من القشريات العليا مزودجات الارجل اجناسها وانواعها المرفوعة كثيرة العدد بعضها بحري والبعض الآخر يعيش في مياه البحيرات والاهر . معظمها من البلاد الباردة || اجسامها شبيبة الاجسام بكثر لها الصدر . جميعها ممدودة الحاف . عنبرها بسطة . زياتها ثلاثية الفصل . الزوج الاول من قوائمها الصغرية ينتهي بملاط فكية || أشهر اجناسها القموس .



فكاسة الحُسن



فكاسة القُطب



عُمرُوسيات



عُمرُوسيات



عُمرُوسيات



عُمرُوسيات



فُشَس



فُشَس دِينَ



فُشَس لِرَج



فُشَس وُرْدِي



فُشَس



فُشَس

٢٠١٠٦ - فُشَس *
Gamasus (S). Gamasae (F).
جنس قراد من فصيلة الفُشَس. أنواعه عديدة جميعها عراء صغيرة القند، طويلاً نحو ملليمتر واحد. وهي من الاشرات الثلاثة قوتها المواد الضوئية المنحلة || تتطفل على الحشرات اعصها نمذية الجناح تتغلبا من مكان الى آخر.

٢٠١٠٧ - فُشَسِيَّات *
Gamasidae (S). Gamasidés (F). Gamasidae (E).
فصيلة حشرات من القُرَادِيَّات. اجنسها المعروفة اربعة اما انواعها فعددية جميعها صغيرة القند، طويلاً وأزواج من ١ الى ٢ سم. وهي عراء عادية اللون. أنواعها سوية اللون المائلة الي تراوح من الاصفر الغام الى الاسمر المزوي || تتطفل على الطير والحيوانات والحشرات.

٢٠١٠٨ - فُشَسِيد *
Gomphidius (S). Gomphide (F).

جنس فطور من فصيلة السيمات. انواعه المعروفة قليلة العدد اصطياباً القليم الصنوبريات في المناطق المعتدلة الحرارة. يعيش على الجروح واللدبال والمواد النباتية المنحلة. بعض انواعه مأكول والبعض الآخر كائن الصف غير مرغوب فيه || اشهر انواعه الثلاثة التالية :

٢٠١٠٩ - فُشَسِيد ذَبِي *
Gomphidius glutinosus (S). Gomphide gluant
نوع من الفُشَسِيد المأكول. يعيش في المواقع الرطبة. ساقه مستقيمة، دققة الفشاء، صفراء القشم السفلي غبراء اللون، اروسه كبيرة القند، فيه قلنسوة الشكل، وقطرها نحو ١٢ سم. لونها الى الكستني البنفسجي المواج || لحيته جامدة، لذيذة الطعم، مستحبة للذائق.

٢٠١١٠ - فُشَسِيد لِرَج *
Gomphidius viscidus (S). Gomphide visqueux (F).
نوع من الفُشَسِيد الكامن الصف. يعيش في المراعي على الدبال. ساقه معتدلة الغلاظة والارتفاع، سمراء اللون، صفراء المواج. اروسه لزجة، قلنسوية الشكل، وقطرها نحو ٨ سم. لونها الى المغرة النحاسية المواج. اطراسه الى التبرة الصفراء المواج.

٢٠١١١ - فُشَسِيد وُرْدِي *
Gomphidius roseus (S). Gomphide rose (F).
نوع من الفُشَسِيد الكامن الصف. يعيش في ارجاج الصنوبر على المواد النباتية المنحلة. ساقه قصيرة مستقيمة القنق، بيضاء اللون، غبراء الفشاء. اروسه ثلاثية الفلقن، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الوردية الفليكي المواج. اطراسه لينة، لونها الى البياض الالفي.

٢٠١١٢ - فُشَس *
Rosée (F). Dew (E).
السنن هو الندى. تحمت الارض وكها الندى فهي غمة. وتحمق النبات عى او فسد من كثرة الانداه عليه. والسنن المكان الذي يركبه الندى.

٢٠١١٣ - فُشَس *
هو الفُشَسمان عارض يصيب الزرع.

٢٠١١٤ - فُشَس *
Capuchonnage (F).
هو اُتَم، و راجحه.

٢٠١١٥ - فُشَس *
Crossarchus (S). Crossarque, Mangue (F).
جنس حيوانات قرضابة من فصيلة الزباديات. انواعها المعروفة ستة موطنها بعض مناطق افريقية الشرقية والجنالية والوسطى. تألف الرياض والغابات وغطاء مجاري الماء والقفار. ملجئها الحيائي جاعي. جماعتها تد من ٢٠ الى ٣٠٠ زوج واكثر || اجسامها صغيرة، شوزها شوزن النسس، اطولها تراوح من ٦٠ الى ٧٥ سم. بما فيه الذنب الذي يطول من ١٧ الى ٢٥ سم. رؤوسها مخروية الشكل. عيونها واذاها صغيرة مستديرة. اعناقها معتدلة الطول. قوائمها قصيرة، خنسية الاصابع. اوبارها قصيرة غشية. صفحات انواعها تختلف مع النوع تكثر فيه الكمية وللشبهة والتجنيح الممترض || تعيش في اوجار تحفرها في التربة او في الوان المهجورة من النمل والارضة. قوتها الحويوط والحشرات والثار والحويوط. اشهر انواعها المعروفة التالية :

فُشَس جَلَد *
Crossarchus fasciatus (S). Crossarque rayé (F).

فُشَس سَعَم *
Crossarchus obscurus (S). Crossarque obscur (F).

فُشَس شَمِيَا *
Crossarchus gambianus (S). Crossarque de Gambie (F).

فُشَس الصَوَال *
Crossarchus somalicus (S). Crossarque de Somalie (F).

٢٠١١٦ - فُشَسُوج *
Dard (F). Dart, Stung (E).
ناية او اينة مشرة تكون في بعض الانحجار اعصها الفتح والاجاس. ج. خماليج.

٢٠١١٧ - فُشَسُوط *
Megaspira (S). Mégaspire (F). Megaspira (E).
جنس حيوانات برية من الحويوطات مدييات الاربجل ونصفية المنارات. انواعه المناصرة المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق امريكا الجنوبية اعصها البرازيل || تعيش في المواقع الظليلة الرطبة وقرب مجاري الماء || اصداهاها اسطوانية، برجية الشكل، مستطيلة، مقاربة الزلزلة.

٢٠١١٨ - فُشَسُول *
Acantholimon (S). Prickly thirt (E). Stachelgrasnelke (A). Acantholimon (I).
ج. خماليج. جنس اشباب برية وزراعية مدمرة من فصيلة الرصاصيات. انواعه عديدة، مهددا مرقعات سوس البحر المتوسط جميعها صغيرة القند، مثندوة، شائكة، اوراقها لا قياسية الشكل. ازهارها شذبية التجميع || اشهر انواعه الثلاثة التالية :

٢٠١١٩ - فُشَسُول أُنَيْق *
Acantholimon venustum (S). Acantholimon élégant (F).
نوع من الفُشَسُول وهو جملة سريرية صغيرة القند، تملو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها منبسطة الصفحة، حوشفية التصل. سبلتها تطول نحو ٨ سم. ازهارها وردية اللون متراكبة || ازهارها يستمر طوال الصيف. وهي من البقول المسقية، تكبر في اول الربيع وتؤكل مطبوخة.

٢٠١٢٠ - غُملُول سَبْطِي

Acantholimon glumaceum (S). Acantholimon en ôpi (F).

نوع من الفسلول وهو بجلة صبروتية صغيرة اللقد، تملو الشوك تملو نحو ١٥ سم. اوراقها هندية الشكل خضراء اللون. سبلتها مستطيلة. ازهارها حر البتلات، بيض الكرويس، سرد البروق. ازهارها يستمر طوال الصيف.

٢٠١٢١ - غُملُول شَكَلَك

Acantholimon acerosum (S). Acantholimon aciculare (F).

نوع من الفسلول، وهو بجلة صبروتية صغيرة اللقد، تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها ريمية الشكل تطول من ٥ الى ٩ سم. وتعرض عند قاعدتها نحو ٥ سم. اشواكها كثيرة. سائلها تطول من ١٠ الى ٢٥ سم. ازهارها قرزية. ازهارها يستمر طوال الصيف.

٢٠١٢٢ - غُملُول حُر القم، اطليه.

Goémon (F). Seaweed (E).

هو ساد الالغ، اطليه.

٢٠١٢٤ - غُملُول حَمِيَسَة

Argyroneta (S). Argyroneta (F).

جنس حناكب من فصيلة الغميسيات. انواعها للمروفة قليلة العدد. جميعها مائية تعيش في البحيرات والاهوار والانهر الراكنة المياه. ملابستها حكاكيد من الوناس رنية الشكل متينة الحيك تكتبها في الاعشاب المائية وتنقل اليها الهواء بواسطة الفتحات التي يجمعها بين حلب صدراسها وبطنها كذا علت سطح الماء وفاضت. اجسامها صغيرة اللقد، فضية اللون، وراسية الجرامز الكثيفة الحلب.

٢٠١٢٥ - غُملُول حَمِيَسَة حَمِيَسَة، غُطاسَة

Argyroneta aquatica (S). Argyroneta aquilique (F). Water-spider (E). Wasserspinn (D).

دوية من الحناكب الساعية القانصة من فصيلة الغميسيات. موطنها منظر مياه البلاد المعتدلة الحرارة. جسمها صغير اللقد يطول نحو ٩ م. عند التنكب ونحو ١٤ م. عند التنكية. صدراسها احمر اللون اسمر المالح. صناعها مركبتان زرقائتان. ثيسعها صغيران. فكها مستطيلتان. جرابها دقيقة. كيفية الحلب. بطنها يفيض الشكل، اخضر اللون، نفي المالح. قوتها الحشرات المائية لتلتقطها عاتمة حل سطح الماء او فائسة فيه. تتمر نحو ثلاث سنوات وتساند قبل نهاية اجلها بثلاثة اشهر. تنثر من الدويات النافعة.

٢٠١٢٦ - غُملُول حَمِيَسَات

Argyronetidae (S). Argyronetidae (F).

فصيلة من الحناكب الساعية القانصة وراعيات الروايا والملائن. اجناسها وانواعها للمروفة قليلة العدد. جميعها صغيرة اللقد تتميز بانسالة حلب جرابها الخلفية. اشهر اجناسها النبسية.

٢٠١٢٧ - غُملُول حَمِيَسَات

الغيمضاء احدى الشمرين، من منازل القمير. اطلب شمرى شامية.

٢٠١٢٨ - غُملُول حَمِيَسَات

يقال غنّ - التل اذا ادرك ثمره.

٢٠١٢٩ - غُنبَاط

Pitta (S). Brève (F).

جنس طير من الغنبايات الجواثم مشروبات المناخير. انواعها للمروفة خمسة اصنافها البلاد الاسيوية والافريقية. جميعها صغيرة اللقد، قصيرة الذنب، مستطيلة الساق. اوتها مختلفة الالوان، جميعها مطوقة الحامير، منشفة الصدر والبطن. قوتها الحشرات والبرور البرية. تدث بين الاغفال في افاحيص قليلة السمك. حشبتها تراوح من ٥ الى ٧ يفيضات ترخها الاثني بمثابة الذكر نحو ١٥ يوما.

٢٠١٣٠ - غُنبَاط حَمِيَسَات

Pittidae (S). Pittidae (F).

فصيلة طير من الجواثم لاقتات النمل ريقات المناخير. اجناسها وانواعها للمروفة متوسطة العدد. موطنها البلاد الحارة للمسترة نحو الاستوائية من العالم القديم. منظر طيورها صغير اللقد وبضها متوسطة ولكها جميعها مستطيلة الساق. تتميز بقلة الطيران وبسرعة العدو والرشاقة واللغة والفتح. تألف الاجراج النقلة وتعيش اسرابا صغيرة قليا يتجاوز عددها اربعة ازواج. قوتها الحشرات المختلفة اغصها النمل وبض البرور البرية. اعرف اجناسها واشهرها الغنباط.

٢٠١٣١ - غُنبَاط حَمِيَسَات

Pittidae (S). Pittidae (F).

فصيلة طير من الجواثم لاقتات النمل ريقات المناخير. اجناسها وانواعها للمروفة متوسطة العدد. موطنها البلاد الحارة للمسترة نحو الاستوائية من العالم القديم. منظر طيورها صغير اللقد وبضها متوسطة ولكها جميعها مستطيلة الساق. تتميز بقلة الطيران وبسرعة العدو والرشاقة واللغة والفتح. تألف الاجراج النقلة وتعيش اسرابا صغيرة قليا يتجاوز عددها اربعة ازواج. قوتها الحشرات المختلفة اغصها النمل وبض البرور البرية. اعرف اجناسها واشهرها الغنباط.

٢٠١٣٢ - غُنبَاط حَمِيَسَات

Pittidae (S). Pittidae (F).

فصيلة طير من الجواثم لاقتات النمل ريقات المناخير. اجناسها وانواعها للمروفة متوسطة العدد. موطنها البلاد الحارة للمسترة نحو الاستوائية من العالم القديم. منظر طيورها صغير اللقد وبضها متوسطة ولكها جميعها مستطيلة الساق. تتميز بقلة الطيران وبسرعة العدو والرشاقة واللغة والفتح. تألف الاجراج النقلة وتعيش اسرابا صغيرة قليا يتجاوز عددها اربعة ازواج. قوتها الحشرات المختلفة اغصها النمل وبض البرور البرية. اعرف اجناسها واشهرها الغنباط.

٢٠١٣٣ - غُنبَاط حَمِيَسَات

Pittidae (S). Pittidae (F).

فصيلة طير من الجواثم لاقتات النمل ريقات المناخير. اجناسها وانواعها للمروفة متوسطة العدد. موطنها البلاد الحارة للمسترة نحو الاستوائية من العالم القديم. منظر طيورها صغير اللقد وبضها متوسطة ولكها جميعها مستطيلة الساق. تتميز بقلة الطيران وبسرعة العدو والرشاقة واللغة والفتح. تألف الاجراج النقلة وتعيش اسرابا صغيرة قليا يتجاوز عددها اربعة ازواج. قوتها الحشرات المختلفة اغصها النمل وبض البرور البرية. اعرف اجناسها واشهرها الغنباط.

٢٠١٣٤ - غُنبَاط حَمِيَسَات

Pittidae (S). Pittidae (F).

فصيلة طير من الجواثم لاقتات النمل ريقات المناخير. اجناسها وانواعها للمروفة متوسطة العدد. موطنها البلاد الحارة للمسترة نحو الاستوائية من العالم القديم. منظر طيورها صغير اللقد وبضها متوسطة ولكها جميعها مستطيلة الساق. تتميز بقلة الطيران وبسرعة العدو والرشاقة واللغة والفتح. تألف الاجراج النقلة وتعيش اسرابا صغيرة قليا يتجاوز عددها اربعة ازواج. قوتها الحشرات المختلفة اغصها النمل وبض البرور البرية. اعرف اجناسها واشهرها الغنباط.

٢٠١٣٥ - غُنبَاط حَمِيَسَات

Pittidae (S). Pittidae (F).

فصيلة طير من الجواثم لاقتات النمل ريقات المناخير. اجناسها وانواعها للمروفة متوسطة العدد. موطنها البلاد الحارة للمسترة نحو الاستوائية من العالم القديم. منظر طيورها صغير اللقد وبضها متوسطة ولكها جميعها مستطيلة الساق. تتميز بقلة الطيران وبسرعة العدو والرشاقة واللغة والفتح. تألف الاجراج النقلة وتعيش اسرابا صغيرة قليا يتجاوز عددها اربعة ازواج. قوتها الحشرات المختلفة اغصها النمل وبض البرور البرية. اعرف اجناسها واشهرها الغنباط.



غُنبَاط



غُنبَاط



غُنبَاط الجُزُر اليونانية

او غيرها، وما تبقى فلوته يختلف مع النوع || يعيش اوراقاً كبيرة المدد قوته البلور والحربوب انحصها شلب الارز .

٢٠٦٤٢ - غُثَيْلِ اسود الزباني *

Podagrica fuscicornis (S).

Podagrica à antennes noires (F).

حشرة غامضة من فصيلة النضاريات ورتبة عذبات الاجنحة. تألف البراري حيث تكثر نباتات الفصيلة الخبازية. غناتها تعيش على بتلات الازهار. يرقاها تلثم الاوراق وتعيش في داخلها || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ سم. ثوبها لثاني اللون. رأسها وكوسلها بطنها وبرازها الى الحمرة البرتقالية. ظهرها الى الزرقه الصفاه. قليل الاحديداد، مستدير الطرف للاسف. زباناها خيطيان اسودان || لها جيل واحد في الحول. تطير الجملدة في ايار وينتهي شئ ليلول. تمتع الاثنى المكن وزباً تلتصقا بتصال الاوراق || البرقة تطول نحو ٧ سم. جسمها وشي الشكل، سداسي الواجه. ثوبها الى الصفرة اللطافة بطلوها غطان جانيان اسودان. رأسها وشرجها ودراجها الى السمرة || طور الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع وينتهي في التربة ضمن جراب من التراب والحواد الصوية والنباتية.

٢٠٦٤٣ - غُثُفُوسُ اقْرَن *

Gnathocerus Cornutus (S).

Gnathocère cornu (F). *Gnathocerus cornutus* (S).

حشرة ناعمة مؤذية من فصيلة اللبشيات ورتبة مفدمات الاجنحة. موطنها يشمل جميع الاقطار الممكنة. تألف مخازن التيق والبقالة وبيوت السكن. غناتها وبقاها تعيش على التيق وبركاها الممنوعة وعلى المواد السكرية والثمار المحففة || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ سم. ثوبها الى السمرة الكستنية الصبائية المواج، ذكروها مجهزة بزوائد رأسية فارقة تميزها عن الاناث وعن غيرها من الحشرات. رأسها مستقيم الجرم مجهز بقرنين متقابلين يكتنفان التآشير الفكية. عينها ناضرات. زباناها صولبانيان صميران. فكها ذريان. ظهرها لا يلحف كامل السمكة الشرجية. غمداه متابعتا التحزير القابلين والتقطيع التيق || لها جيلان في الحول. تسرح في الباري وفي الليل || والبرقة عند بلوغها الادراك التام، تطول من ٦ الى ٧ سم. جسمها اسطواني الجرم. ثوبها الى الصفار الباهت. رأسها الى السمرة. سمكتها الشرجية مجهزة بسكين ذرين || طور الاكمال الذي يستمر من ١٤ الى ٣٠ يوماً ينتهي طليقاً من كل غلاف.

Hérissonne (F).

She-hedgehog (E).

Lynx caracal (F).

Gongyle oculé (F).

٢٠١٤٤ - غُثَجَة

هي الفئدة اثنى القفدة.

٢٠١٤٥ - غُثَجُل

هو عنق الارض، اطلبه.

٢٠١٤٦ - غُثَيْجِل

هو للسانة النرة، اطلها.

٢٠١٤٧ - غُثَدُ صَوْلِي * ، رُتَقُ و رُجَبِيلِي

Hedychium (S). *Hédychie* (F). *Ginger lily, Garland flower* (E). *Schöne krauzblume* (D). *Coronarfa* (I). غُثَدُ صَوْلِي هو الاسم الهندي لهذا النبات. جنس نباتات

٢٠١٢٧ - غُثَبَاتُ التُّوسَط *

Rhinobatis rhinobatis (S). *Rhinobate de la Méditerranée* (F). *Rhinobatis rhinobatis* (E).

نوع من الغنابات. اصطناه معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. مسرحة اسماك الحجاج. قوته القشريات والرخويات والقشريات || جسمه وشي الشكل يطول من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. رأسه مبسط الجرم، مخروطي الشكل. عيناه مسطحتان. فم سفلي الاينكاز. واسع الشفق. اسنانه متراصة. مكافئة، متراصة. زعنفته الذيلية فارقة. كبيرة الغلظة العليا || ثوبه الى الكهية الزيتية المواج تملحا مشحة سمراء في الظهر، تبنية في البطن || لحمها كامن الصف، مأكول.

٢٠١٢٨ - غُثَبَاتُ جِدَّة

Rhynchobatus djiddensis (S). *Rhynchobate de Djedda* (F). *Rhynchobatis djiddensis* (E).

سمكة من الغنابات. اصطناه البحر الاحمر والخليج. مسرحة اسماك الحجاج || جسمها شبه وشي الشكل، مستعرض المقدم، مستدق الظهر، يطول من مترين الى ثلاثة امتار. رأسها مبسط الجرم، مخروطي الشكل. عيناه مسطحتان. لها سفلي الاينكاز. واسع الشفق. اسنانه مسطحة متراصة || ثوبها الى الريدة السمراء بطلوها يتبعج اخضر في الظهر وفي الزعانف || لحمها كامن الصف، مأكول.

٢٠١٢٩ - غُثَبَاتُ طَيَات *

Rhinobatidae (S). *Rhinobatidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية ولودة من السفنقيات ورتبة الاشفاق. اجناسها وانواعها المروفة نحو ٢٥. جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها وشية الشكل تطول من ١٠٠ الى ٥٠٠ سم. رؤوسها منبسطة، مخروطية الشكل، مسطحة فارقة ناعمة من التحامها بازوائها الصدوية الرجحة. اقوالها سفلية الاينكاز. واسعة الاشفاق. حيزها سطحية صغيرة. اسنانه مسطحة متراصة. كثيرة العدد. اصكانها الخيشوية سفلية الاينكاز كالافلام. زعانفها الذيلية فارقة. كبيرة الفلق العليا || اهرق اجناسها واشهرها الغنابات.

٢٠١٤٥ - غُثُفُوس *

Rhamphocerus (S).

Rhamphocère (F).

جنس طير من الجوانث وفصيلة البيرليات. انواعه المروفة ستة اصطناه اسرعة الاستوائية. ملجئها الجواني محامي الا في زمن القساذ والمخاضة. تألف الغابات. قوتها التمل والحشرات الصغيرة والذباب والطيور || اجسامها صغيرة. متابعها مستطيلة. اذنانها مخروطية صغيرة. الزواها متراكبة الاوان تكثر فيها الشقعة والطملة والشقعة. ميزنها مكحلة. محارها مسطحة بالاسود. صموردا موشة || تنش في الانجار الخصوة الارتفاع. انثاها تنبع من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول. الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الاناث بتناوبة الذكور.

٢٠١٤٦ - غُثَيْبِل

Padda, Munia (S).

Padda, Calfat (F). *Padda* (E).

جنس طير من الجوانث المخروطيات المناظر. انواعه عديدة جميعها اسيرة زانر يرقية الاصطنان. الزواها متعانلة الاوان المختلفة. رؤوسها سود. محارها سود. بطونها وردية



غنابات للتوسط



غُثُفُوس



غُثَيْبِل



غُثَيْلِ اسود الزباني



غُثُفُوس اقْرَن



غُثَدُ صَوْلِي

القد بطول نحو ٢٤ سم. رأسه حنوج بقترعة مستطيلة الرئش المنخفض على القنن والمقن. منقاده مخززي الشكل ، قليل الاحديداد ، جناحاه عريضان قصيران . ذنبه مستدير الطرف ، ساقاه مضطكة الارتقاع . ثوبه الى الشبية المقلوبة للمواج . قترعته عاجية اللون . جناحاه موشحان بالاسود ، قراءده بجملة بالابيض . الاثني عادمة التقرعة || يدلن القصورة في القرعة بين الحماش المنخفضة . الاثني مخضن وسطها من ٣ الى ٥ يغطس بينا الذكر يدين لها الفناء .



غندي

٢٠١٥٥ - غُدَّغَرِيَات * Rhinocerosidae (S). Rhinocérosidae (F). Rhinocérosidae (E).

فصيلة طير من طول الساق ، اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة العدد جميعها من طيور قلدونية الجندية || اعرف اجناسها واشهرها الفنتوش .

٢٠١٥٦ - غُدَّطُوس * Gnathoncus (S).

جنس حشرات مفترسة من فصيلة المستيريات ، انواعها المرفوعة قليلة العدد . جميعها صغيرة القند يسمية الشكل طويلا يراوح بين ٣ و ٤ سم. انواعها الى السرة السوداء المواج || ريقاتها مفترسة تعيش على المزاليل لتلهم الحوام ويكن الحالوش .



فنتوش

٢٠١٥٧ - غُدَّظ * Gnathos (S).

جنس حشرات مفترسة من فصيلة المستيريات ، انواعها المرفوعة قليلة العدد . جميعها صغيرة القند يسمية الشكل

٢٠١٥٨ - غُدَّفَاسَة * Gnaphosa (S). Gnaphosa (F). Gnaphosa (E).

جنس هناكب ساعصة قانصة من الرتيلاوات وفصيلة الكوكايات . انواعها المرفوعة نحو ٥٥ منتشرة في معظم اقطار البلاد الممتدة اخراة || اجسامها مستطيلة الشكل ، متوسطة القند ، متكافئة الجمل ، ممرار اللون ، قوائمها مستطيلة عقائبة . تعيش في البراري اللطيفة وفي الغابات . تسرح في النهار . ضعضها سنة لوزية الشكل تشبهها تحت الحجارة وفي تجاويف الاشجار وفي الجفنة || قترتها الحشرات الصغيرة ونسبا الذباب الذي تغضله على كل حشرة .



غظفوس

٢٠١٥٩ - غُدَّفَاف * Gnaphosidae (S). Gnaphosidae (F). Gnaphosidae (E).

هو الكرسيفة ، اطليا . ونسبا الحمار والجبلية .

٢٠١٦٠ - غُدَّفَر سِيلَان * Uropeltis grandis (S). Uropeltis de Cayen (F). Uropeltis (E).

نوع من الغنافر ، حية يبيض جاسة من فصيلة الفنتوشيات . موطنها جزيرة سيلان . طويلا نحو ٦٠ سم . جسمها اسطواني الشكل ، جامد السيف . رأسها صغير . خطها مخززي . عيناها صغيرتان . ذنبها مقطوع الطرف ، ازور الحلف يبرو كالهم . قوائمها الطوي الى الصفرة يميلوا تدبيج لولبي اسمر . ابطلاها ونسبها الى الصفرة الباهية المنمشة بالابيض والاخير || تألف المروج والغابات . قترها القار والغطاء والتأمين الصغيرة والحشرات والديدان .



غفاسة

٢٠١٦١ - غُدَّغَرِيَات * Uropeltidae (S). Uropeltidae (F). Uropeltidae (E).

فصيلة حيات يريضة ، جاسة ، عادمة السموم ، لافونية . اجناسها المرفوعة سبعة ، اما انواعها فحصر ٩٠ اعطائها تحت من الحليج الى الهند والبالقية بجزيرة سيلان وجزر الزانج || اجسامها اسطوانية تطول من ٣٥ الى

جلومرية مسرة من فصيلة الزنجيرليات . انواعها المرفوعة ٢٥ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة . قريبة الشبه من القنا . اوراقها ساجسة متعاقبة . ازهارها منبلة ، هابي ، كبير القند || ازهارها عديدة الالوان ، انبوية الشكل الثلاثية التفرع يميلوا توزيع انبوي مستطيل ينهي بثلاث صفحات ثنائية التخصيص . مآبرها عديدة تملوها سمات دقيقة || تجود في جميع الارابة الدنيا بالمواد المنسوبة لكبا تخشى المراتق الباردة || اشهر انواعها ما يلي .

٢٠١٤٨ - غُدَّصُورِي أُرْجُونِي

Hedychium coccineum (S). Hédychie écarlate (F). نبات تزييني يعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . بما فيه السنبلة الزهرية . اوراقه شبيهة خراصة خلية التصل تطول نحو ٥٠ سم . وتعرض نحو ٢ || ازهارها ابيضالية اللون ، شريفاتها صغيرة مستديرة ، قصورها خيطية تطول نحو ٣ سم || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٠١٤٩ - غُدَّصُورِي شَرْدِير

Hedychium gardenium (S). Hédychie de Garden (F). نبات تزييني يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه شبيهة مستطيلة مدنية الزام الاشعر . تصلها ماس البشرة يطول نحو ٥٠ سم || ازهارها صفراء اللون شريفاتها مستطيلة ، مآبرها وسماها حر || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٠١٥٠ - غُدَّصُورِي تحيل

Hedychium gracile (S). Hédychie grêle (F). نبات تزييني يعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم . ساقه دقيقة نحيلة . اوراقه سنبلة التصل تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم || سنبلة الزهرية متدلية تطول نحو ١٦ سم . لون ازهارها الى الياض الموشح بالاخضر ازهارها يدوم طويلا شهر الجول .

٢٠١٥١ - غُدَّوَانَة * Gondwana (F).

Gondwana (E). اسم يطلقه علماء الجغرافية والجيولوجية على قارة افريقية كانت في الازمنة السحيقة تشمل القسم الاكبر من الهند وكامل جزيرة مدغشقر واسرائيلية فانقسمت وانقسمت من بعدها في الاباح الثاني واصبحت كما هي الان .

٢٠١٥٢ - غُدَّغُدِّي * Ctenodactylus gundi (S).

Ctenodactyla, Gundi (F). حيوان لوبن قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدباغيات . موطنه اطراف الصحراء الكبرى من المغرب والتمال . جسده جنة الالب الصغير . يألف المناطق الصخرية البررة اذله صيفوتان . ذنبه جندة كاسية . جرامزه ورياسة الاسباح اطافرة قوية ذرية . ثوبه الى الربة الصهباء بلته ابيض || قوته الاعتشاب والجلور .

٢٠١٥٣ - غُدَّس * Gnels

حجر متبلور ثوري المصدر يكثر في الاراضي الاصيلة .

٢٠١٥٤ - غُدَّغَرِيَات * Rhinocerosidae (S).

Rhinocérosidae (F). طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الفنتوشيات . موطنه قلدونية الهندية . يألف البراري والاحراج البثرة الانجبار . ملحه الخياطي جامعي جاجاته قليلة العدد . قوته الحشرات واللوبيات وبعض الثار النتية والبرور || جسمه متوسط

٢٠١٦٧ - غُتُوج * Melopittacus undulatus (S).
Melopitte, Perruche ondulée (F). **Budgerigar (E).**
 طائر وسيد الجنس والنوع من الببغاوات. موطنه بلاد
 أستراليا. تربيته منتشرة في معظم أقطار العالم || يألف
 الإنسان لكنه لا يعيش منفرداً وأن عاش فلولت بحمد
 جسمه صغير القد مستطيل الذنب النقي. ثوبه جميل
 الألوان، متراكب الاخضر والاصفر والاحمر والبنفسج
 في لا مثيل له يتحلى ابريق الاذواق || قوته اللعين
 والفتن والتأثير الناضجة والمفوق وأنس || الاثنى تثنى
 عشها في تجويف جلع. حشفتها من ٤ الى ٦ بيضات
 تستمر نحو ١٥ يوماً.

٢٠١٦٨ - غُتُوج * Melopittacus (S).
Goniatites (F). **Goniatites (E).**
 جنس حيوانات من الرغويات وأسيات الاربيل وراعيات
 الخياشيم وفصيلة الغنياتييات. انواعها المعروفة نحو ٣٠٠
 جميعها من المتحجرات. احاطتها تستمر من الحقبة
 الالفينية الى اواخر الكربونية || اصدانها مكورة الشكل
 او مبطلة. قريبة الشبه بالنباتات.

٢٠١٦٩ - غُتُوج * Goniatites (S).
Goniatite (F). **Goniatites (E).**
 جنس حيوانات من الرغويات وأسيات الاربيل وراعيات
 الخياشيم وفصيلة الغنياتييات. انواعها المعروفة نحو ٣٠٠
 جميعها من المتحجرات. احاطتها تستمر من الحقبة
 الالفينية الى اواخر الكربونية || اصدانها مكورة الشكل
 او مبطلة. قريبة الشبه بالنباتات.

٢٠١٧٠ - غُتُوج * Goniatitidae (S).
Goniatitidae (F). **Goniatitidae (E).**
 فصيلة من الرغويات وأسيات الاربيل وراعيات الخياشيم.
 اجناسها وانواعها المعروفة عديدة. جميعها من متحجرات
 الحقبة الديفونية والكربونية من الاباج الاول المعروف
 بالقديم || اعراف اجناسها الغنياتييت والتكسينيت.

٢٠١٧١ - غُتُوج * Gouania (S). **Gouanie (F).**
 سمكة بحرية من شالكات الزعانف وفصيلة الشطاريات.
 اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || جسمها
 صغير القد، يطول من ٤ الى ٦ سم. رأسها صغير
 مستدير الخط القصير. عيناها ماحتان. زعانفها الظهرية
 والشرجية ضخمة، مستطيلة. الذيلية صغيرة، مستديرة
 الطرف. ثوبها الى الشفحة المتقطعة بالاحمر || تتميز
 بمحسنتها العظيمة الاعليسية الشكل التي تمكنها من
 الالتصاق بالأسماك الصغيرة حيث تكمن واحدة تقوم
 قرائنها.

٢٠١٧٢ - غُتُوج * Cryptobranchidae (S).
Cryptobranchidés (F). **Cryptobranchidae (E).**
 فصيلة حيوانات قاذرة من صف الصفصيات ورتبة
 السرفوتيات. اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم
 اقطار العالم || جميعها منقطة الخياشيم، قاذرة، تمشي
 في البر والماء || اجسامها مستطيلة، رباعية القوائم
 والاصابع، أسفلية الزروس، مستديرة المبرون الصغيرة.
 امودها امود المستدل || قوتها اللدين والحشرات
 واللوبيات.

٢٠١٧٣ - غُوارانه * Paullinia cupana, P. sorbilis (S).
Paullinie, Guarana (F). **Guarana (E).**
 جنبة معمرة عارضة ملتفة من فصيلة البسبنيات، مهدها
 بعض اصقاع امريكا الجنوبية انحصا البرازيل حيث
 يدعونها «غوارانه». منبتها الطوري شفاف الامازون

٦٠ سم. رؤوسها صغيرة. اعطائها متباينة الاشكال،
 منها المقنطرة والمستديرة والمخروطية. موطنها صغيرة. فكلها
 مستنة. اعانها معدية. اذنانها قصيرة. اثنائها مرقوشة
 متراكبة الألوان || أشهر انواعها غنر سيلان.

٢٠١٦٢ - غُفلة * Fieraster (S).
Fieraster (F). **Fieraster (E).**
 المنطلة ج غفل وغفل جنس اسماك بحرية من الملساوات
 انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بعض بحار البلاد
 الحارة والمتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط ||
 اجسامها مبطلة مستطيلة كدية الشكل تطول من ١٥ الى
 ١٥ سم. زعانفها الظهرية قليلة العدد، قاطبة، تمتد
 من النصف الى طرف الذيل. اثنائها تختلف مع الانواع منها
 الاصفر والاحمر والاصفر والاصفر والاصفر والاصفر ||
 تتطفل على كواكب البحر وقنايات البحر وتعيش في
 اثنائها الحفصية.

٢٠١٦٣ - غُفُوس اُفتم * Gnophos obscura (S).
Gnophos obscur (F). **Gnophos obscurata (E).**
 حشرة من فصيلة الافيئات ورتبة حرشفيات الاجنحة.
 موطنها معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط
 والاندلس وادوية. قرائنها جارية قوتها وحقن الارزاق.
 سرتها خاضعة قوتها اوراق النبات || جسمها نحيل قصيف
 يطول نحو ١١ مم. يسلها نحو ٣٠ م. رأسها اريد احمر.
 عيناها صغيرتان. زباناها غشيان. جوشها ويصلها الى
 الرعدة السراء المراج || وشاحها الاماميان الى الرعدة
 يطولها تمسح اكهب وثلاثة خطوط متفرقة وضعت متقطع
 جميعها الى السرة. حناها الخارجي مغرض سباعي الاسنان.
 وشاحها الخلفيان الى الرعدة يطولها غطان متفرضان احمران
 وضعت حناها شديد السرة. حناها الخارجي خماسي
 القفوس || لها جليل واحد في الحول. تظهر القرائنة في
 حمز وثني حتى ايلول. تسرح من النصر الى فحة الليل.
 تعامل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتص المكان جيداً
 حل الصفحات النفل من نصال الاوراك || السرعة تطول
 نحو ٢٤ م. جسمها شبه مردي الشكل. ثوبها يمان
 البنية التي توشع فيها ويرواح بين الاخضر والاحمر
 والاربد المرقوش بالاسمر تملو ثلاثة خطوط قاطبة. جميعها
 الى الجردة. رأسها اسود. وراعيها البنية الوسطى ماحتة
 مما يجعلها تنفوس عنه الانتقال || طور الاكمال الذي
 يستمر نحو ١٥ يوماً يتنقي في الاجلثة ضمن صلجة
 متبدلة الشباك.

**٢٠١٦٤ - غُفتم * قال الجوري: «الغتم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع
 حل الذكور والاناث». والغتم لا واحد له من لفظه
 والجمع اغتم واغتم وقنوم. اطلب شأن.**

٢٠١٦٥ - غُفتم * Ovidae (S).
Ovidés (F). **Ovidae (E).**
 فصيلة من مزدوجيات الاصابع المتهرات يقسمونها الى قسمين
 الفأنية والمزمية.

٢٠١٦٦ - غُفتم * Ganyemède (F). **Ganyemede (E).**
 اسد اثار المشرقي. اكتشفه غاليله بتاريخ ٧ كانون
 الثاني ١٦١٠ دورته الكائنة حول المشتري تستمر ٤ أيام
 و٤٢ دقيقة ٣٦ ثانية.



غنفس اُفتم



غُتُوج



غنياتييت



غنية

بارزة العروق المتوازية . نصلها مالم بشرة الصفحة العليا ،
خلى السفل ، طري الرائحة ، يستعمل كالشاي وينشط
الحضم || أنهارها يضاف اللون ، طرية العروق المستحب .
ثمادها اجناسية الشكل تنقل من ٣ الى ١٠ سم . لها اصفر
اللون وقد يكون ابيض او وردي او برتقالي في بعض
الفرووب || غروها مدينة . ثمراتها مشطرة على السلسل
البستاني من صور الى طرابلس .



غواة

٢٠١٧٨ - غُوَاةٌ نَفَاحِيَّةٌ ، غُوَاةٌ حَمْرَاءُ

Psidium pomiferum, *P. guayava pomifera* (S). *Goyavier pomme*, *G. rouge* (F). *Apple shaped guava*, *Red guava* (E). *Apfeltragerender Guava*, *Rote Guava* (D). *Guayava rosso* (I).

نوع من الفواطة الزراعية المشعة . ثمرتها تملو من ٣ الى ٦ أمتار . تعيش في مختلف الارربة الرملية والطينية . ثمادها نفاحية الشكل مأكلة لكها اقل جودة واغزر مادة ونتاجية من الفواطة الاجناسية .

٢٠١٧٩ - غُوَاةٌ ٥

حشرة من النوريات صغيرة الحجم تنقل مع ريقاتها على دبا الذباب . جسمها منزلي الشكل ، ازرق اللون عند الذكر ، اسود عند الانثى . رأسها مستطيل . زباناها دقيقتان صولجانان . اجنتها خفيفة ، قليلة العروق والاعصاب ، تزينة اللون عند الذكر ، ووردية عند الانثى . جوفها مسم . بطنها مستطيل مركب من سبع حلقات وقربات تنتهي بالزوائد التسلسلية . اشربتها مستقيمة مدبية الوحش .



غواة مقطع النمرة

٢٠١٨٠ - غُوَاكُو
سماد ازوتي فسفوري حصل من تجميع وتراكم سلح الطيور البحرية ردمه من الزن من بلاد الفيل والبيرو وغيرها من بلدان امريكا الجنوبية . وهو من انشاد الاسمعة الازوتية وقد زو وجوده الآن بعد استنزاف منظم وكامه .

٢٠١٨١ - غُوَاكُو الخَفَاشُ

Guano de chauve-souris (F). *Guano of flier-mouse* (E).

نوع من الغوانو يربطه في الغاور والكهوف ، يكثر في الجزائر والاندلس .

٢٠١٨٢ - غُوَاكُو السمَكُ

Guano de poisson (F). *Guano of fish* (E).

نوع من الغوانو يصنع بمعالجة بقايا الاسماك بالخاض الكبيرين .

٢٠١٨٣ - غُوَاكِيَاتُ ٥

Aganidae (S). *Aganidae* (F). *Aganidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة عشائيات الاجنحة المتفوسرة . انواعها عديدة جميعها ناعمة تنقل على بعض الانواع النباتية اعصابها اللبن وصل بعض الحشرات الضارة من ذوات الجنانين || حشراتا صغيرة الحجم طويلا يراوح من ١ الى ٥ ملستر . اجسامها ريمية . زباناها صغيرة دقيقة . اسرارها رباعية المقل . انواها متباينة الاولان بين الذكور والاناث || اشهر انواعها الفواطة وذكر الذكر التن .

٢٠١٨٤ - غُوَاكُو ٥ ، مِسْكُوْبِي ٥

Mystacops (S). *Mystacine* (F).

خفاش ويحد الجنس والزوج من عمارة الحشرات . موطنه زيلته الجدينية يتنيز بطولي جسمه للسلسلة التي تمكته



غواة

وقد انتشرت زراعيا في بعض المناطق الحارة الرطبة ||
ساقها مستطيلة كثيرة الااليات المتينة . اوراقها متعالية ،
مركبة ، وثرية التجميع . وريقاتها اطليجية النصال
الجامدة ، ناشرة الفسول والورق . انهارها عضوي
التجميع ، عضوي الاوتكاز . انهارها يضاف اللون ،
خداية التفصل ، رداية البتلات ، ثمانية الاسدية . ثمادها
جراة محرمة . ثلاثية الزوايا والثلث المستطيلة تحضن من
عصا الى ثلاث عصيات فيه مكررة الشكل قطرها نحو
١٥ سم . وطه العجات التي تحوي نحو ٥ % من الكافيين
تستعمل به التجميع استعمال البن او لتخضير بعض
انواع الشرب المنض السائل الاستعمال في البرازيل .

٢٠١٧٤ - غُوَاصُ ٥

Gnatus (S). *Gnatus* (F). *Gnatus* (E).

جنس حيوانات بحرية مفرمة من الرخويات واسيات
الاذيل . مزدوجات الخياشيم ، عشاريات الجرازم وصيلة
الورديسات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في البحار
الطبية || اجسامها اسطوانية مستطيلة . زعانفها طرفية
كلوية الشكل . رؤوسها شبه مكررة . حشرتها ماصة .
جرازمها بحجة متساوية الطول باستثناء الزوج القيق اذي
يلج طوله ضعف طول الجسم والذي ينتهي برسي متناية
الشكل تملوها الكلابي في الزام الاول ، والهام في
الزائم الثالث والاخير .

٢٠١٧٥ - غُوَاصُ

هو الغطاس من طير الماء وكيفية سيده انه يوصى في الماء
منكوبا بقوة شديدة ويمكث تحت الماء بعض الوقت ،
نحو ٨ دقائق ، الى ان يرى شيئا من السلك فيأخذه
ويصمده به || قال بعضهم : رأيت غواصا خاص طلع
بسكة فله غراب طليا فأخذها منه ففاس مرة اخرى
وطلع بسكة اخرى فأخذها منه الغراب ثم الثالثة فكذلك
فلما اشغل الغراب بالسكة وثب الغواص فأخذ برجل الغراب
وفاس به تحت الماء حتى مات الغراب ثم خرج هو من
الماء .

٢٠١٧٦ - غُوَاةٌ ٥

Psidium guayava (S). *Goyavier* (F). *Guava tree* (E). *Groese gelbe Guayava* (D). *Guzjava*, *Paidio* (I).

جنس اشجار وشجيرات مشرة برية وزراعية من فصيلة
الاسيات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠ مهدا لاسل امريكة
الاستوائية وبزوا الاثيل . اوراقها كاملة متعالية بارزة
العروق . انهارها محورية الاوتكاز ثنائية او ثلاثية
التجميع . قصيرة الزناد ، خداسة البتلات البيض . ثمادها
نورية حلرة ورائحة مأكلة وثرية || تتكاثر بالبر
والتلقيح والقطيع . الفرة الناجية من برة تدر بعد غرسها
في مستقرا بادم سنوات ويستمر نموها حتى عمر ١٥
سنة ثم يستمر سالما الى ان تبلغ ٢٥ سنة حيث يتنهد
دور الانحطاط والضعف || وهي تربي في الارربة
المستوية الانساج الغنية بالناصر البذالية والمواد البذالية .
اشهر انواعها الزراعية : الفواطة الاجناسية والنفاحية .

٢٠١٧٧ - غُوَاةٌ اِجْاصِيَّةٌ ، غُوَاةٌ بَيْضَاءُ

Psidium piriferum, *P. guayava pirifera* (S). *Goyavier poire*, *G. blanc* (F). *Pear shaped guava*, *White guava* (E). *Blutfrüchtige Guava*, *Weisse Guava* (D). *Guayava blanco*, *Guayabo* (I).

نوع من الفواطة الزراعية المشعة . ثمرتها تملو من ٤ الى ٨ أمتار . فرصها زنادها مسفلة . اوراقها متناية الشكل

موطنها بعض مناطق الشرق الأوسط والافصحى. تسرح في الليل وتعيش في التبار على الأشجار. اجسامها متوسطة القند تقطع من ٢٠ الى ٢٥ سم. رؤوسها مستعرضة مغلطحة. عينها كبيرة. سبالها كثيفة. حناقيها غروبية الشكل، واسمة الاشداق. اذنانها قصيرة. اجنحتها متدلة الطول، ذلقة الاطراف. اذنانها مقطوعة. انوثها الى الربة تملوا رقة سمراء وتنسج اسود يمتد حتى الحرات الاجنحة. قوتها الحشرات وبعض التار والذبور. تدفن في تجاويف الاشجار. اناثها تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بنوبة الذكر نحو ١٧ يوماً.

٢٠١٩١ - غُورِيَّة صَغِيرَة *

Trachys minutus (S). *Trachys menu* (F).
Trachys minutus (E).

حشرة خاضعة من فصيلة التزنيقيات ورقة سمفات الاجنحة. تألف الموائل الرطبة وضفاف مجاري الماء. خنافسها تعيش على اوراق الحور والصفصاف. يرقاتها مرقاة تلم فصل الاوراق وتعيش في داخلها. جسمها صغير القند يقطع نحو ٢ سم. ثوبها الى السمرة السوداء يعلوها مزاج ينسجي. رأسها غروبي الشكل. حناها كبيرتان جاسطتان. ذنانها صغيران دقيقان. ظهرها منحصر الوسط. مستدير الطرف للاسف. اوضاعها خاسية المقل. لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجمالنة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواسط الصيف. تسرح في التبار. تساقط بعد ظهورها بثلاثة اسابيع. تزحف المكان في فصل الاوراق الى الربة عند بلوغها الاذراك تمام تقطع نحو ٥ سم. جسمها اسطواني الشكل. عامم الارباب. نطش التثبير الشفوية. تبي اللون. الى طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في الجلالة ضمن صلبة خاوية النشلاء المركب من مواد نباتية مسبوكة بالويل.

٢٠١٩٢ - غُورِيَّة *

Godetia (S).
Godetia (F). *Godetia* (E).

جنس نباتات عشبية حولية مبروتية مخيلة من فصيلة الاسفديرات. اوراقها متعاقبة بسيطة. ازهارها عشقودية النجم، رباعية الفصم والبتلات، ثمانية الاسبدة، مختلفة الالوان. انوعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية:

٢٠١٩٣ - غُورِيَّة كَبِيرَة الزَهْر *

Godetia grandiflora (S).
Godetia à grandes fleurs (F).

نوع من النوسية. عشبة تزينية مبروتية مخيلة هرمية الشكل. سوقها موقفة تملو نحو ٤٥ سم. اوراقها سنانية ضيقة. ازهارها سنبل النجم. ازهارها كبيرة القند، تقطعها من ٨ الى ١٥ سم. ثوبها الى السمرة الصفراء المواج ومنها شروب يبيض، ويرقوشه باليلكي. تزويرها صيفي.

٢٠١٩٤ - غُورِيَّة مُسْتَحَبَّة *

Godetia amena (S). *Godetia plaisante* (F).

نوع من النوسية. عشبة تزينية مبروتية مخيلة. سوقها موقفة تقطع من ٤٥ الى ٦٥ سم. اوراقها سنانية النصال مسنة الحمار. ازهارها سنبل النجم. ازهارها عديدة الالوان التي تختلف مع الضروب منها اليلكي والاحمر الحصري والوردي والابيض والقرنوش بالابيض واليوزيا يتسمر من حزيران الى تموز.

من جمع جناحيه في ثناياها. يطير ويسير على الارض ويشق الاشجار يدين ترد. يعيش منفرداً. الذكر لا يقرب الانثى الا عند الكرم. يسرح في اوائل وائسار الليل. قوته الحشرات. يألف تجاويف الاشجار وارباب الصخور والفاور والكهوف.

٢٠١٨٥ - غُورِيَّة *

Scolopsis (S).
Scolopside (F). *Scolopsis* (E).

سمكة بحرية يروض من شالكات الزمانف وفصيلة الفرغيات. اعطائها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي. قلم تقرب من الشطوط الرملية اما يكثر بجوها قرب المباح جسمها اعليجي الشكل يقطع نحو ٢٢ سم. رأسها صغير القند وضلعها كذلك. حناها كبيرتان، جاسطتان. زعنفتها الظهرية وحيدة، مستطيلة، متساوية الارتفاع. زعنفتها الذيلية فاقرة. ثوبها الى الريمكة الفضية يبق في الظهر ويغير في البطن. ويملها غلالة خطوط وردية جانبية قاطعة وضلع ابيض الغي السرا يمتد من مقدم الحطم الى قاعدة الزعنفة الصدرية. لها متوسط الصف، مأكول.

٢٠١٨٦ - غُورِيَّة *

هو الرور. نبات من الخنجنيات، اطله.

٢٠١٨٧ - غُورِيَّة ثَلَاثِيَّة النَطَش

Limnobia tripunctata (S).
Limnobia tripunctuée (F).

حشرة لافضية من فصيلة النوريات. جسمها صغير القند يقطع من ٧ الى ١٠ سم. رأسها شبه مكور الشكل. زباناها عظيمان، اسمران. صدرها صناعي تعلو جده نغمة سمراء. بطها الى السمرة الصنابية. روثناها ثلاثيا لثقل السر. الاثني اكبر قدماً من الذكر. تزحف مكانها في الربة ليتفت من يرقات تعيش على المواد النباتية المنحلة.

٢٠١٨٨ - غُورِيَّة صَفْرَاء

Limnobia lutea (S).
Limnobia jaune (F).

حشرة لافضية من فصيلة النوريات. جسمها صغير القند يقطع من ٦ الى ٩ سم. رأسها شبه مكور الشكل. زباناها عظيمان، اسمران. ثوبها الى الصفرة الصنابية المواج. روثناها كبيرتان غضبان بالاسفر والوردي والاعصر. مرتمها المالح للثقل والحدائق والبساتين. الاثني اكبر قدماً من الذكر. تزحف المكان في الربة ليتفت من يرقات تعيش على المواد الفسوية والنباتية.

٢٠١٨٩ - غُورِيَّات *

Limnobiidae (S).
Limnobiidae (F). *Limnobiidae* (E).

فصيلة حشرات من ربة ذوات الجناحين. اجناسها واتواعها المعروفة عديدة، منظرها من علم الاثام الباردة. تعيش على رقيق الازمار والافرات الاوراق. يكثر بجوها في النباتات وقرب مجاري الماء. اجسامها مخيلة. رؤوسها مكورة، صغيرة، قرونها الاستشعارية غليظة. قوتها مستطيلة، قصية. يرقاتها خاضعة او داتة او واجة. جميعها تنغمن في الربة في زين الاكمال وتلتصق بصلبة تقدر نواصها عدد خاصة في مقدم الجسم.

٢٠١٩٠ - غُورِل *

Aegothel (S).
Aegothel (F). *Aegothel* (E).

جنس طير من فصيلة البدرغوسيات. انواعها المعروفة خمسة



غور



غورل



غورمة صغيرة



غور

يجب لف الزور في مستقرها يتم ذلك خلال شهر نيسان || أشهر أنواعها الزينية غور الفرجينية وغور ليندهيمر .

٢٠٢٠٠ - غُورَة فِرْجِينِيَّة *

Gaur de Virginie (F).

نوع من الغور . عليه عرولة طولها من ١٢٠ الى ١٦٠ سم . أوزانها ستانية النصال الجبلية الخضر المايح . مزرق النصال وأصباها الى البياض الاخير . أذناها صغيرة القذ ، جميلة الشكل يند حراء اللون ثم تتحول مع مرور الأيام الى الوردي وتنتهي بالابيض . تجلت أذناها تتبلج عند الغروب وتطيق عند الشروق || زراعتها لا تستوجب رعاية خاصة أما تقضي بف الزور في مستقرها .

٢٠٢٠١ - غُورَة لِينْدِهَيْمَر *

Gaur de Lindheimer (F).

نوع من الغور المصرة الزينية . تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . || أذناها كبيرة جميلة بيض الناخل ، حر الخارج || زراعتها توجب لف الزور في مستقرها .

٢٠٢٠٢ - غُورَتِي * ، غُورَلَا ، غُورُ ، طُغْمُوس

Gorilla gina (S). Gorilla (F). Gorilla (E).

حيوان لين ، وسيد الجنس والنوع ، من فصيلة اشياء الانسان ورتبة القرديات || وهو اكبر القرد جث وأقربها خلقاً وأشدّها قوّة وبشلاً || قامه الذكر نحو ١٨٠ سم . يبيت الاثني لا يتجاوز ١٤٥ سم || جسمه كثيف الشعر القصير . انفه انسل الشكل . اذناه صغيرتان . عتقه بالغ القصر || موطنه الامرج الافريقية الواقعة بين للدرجة الثانية من خط العرض الشمالي والدرجة الخامسة من خط العرض الجنوبي || يعيش بجاعات قليلة البدن . يألف البابات الكثيفة الانجار التي يتسلقها بمتعة || قوته التبار حل اختلاف أنواعها .

٢٠٢٠٣ - غُورِيَت *

Gorytes (S). Goryta (F).

جنس حشرات قانصة مقترنة من غشائيات الاجنحة الحسويات وفصيلة اللينوسيات . أنواعها المروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها شبيهة بالنسوج اثوابا الى البصرة السوداء البهجة بالاصفر || جميعها جاسة تقم خشاواتها في التربة .

٢٠٢٠٤ - غُوشُ ، غُوشِيَرَة الهِنْد .

Sorbus indica (S). Sorbier des Indes (F). Indian service tree (E).

نوع من الفيرار . منبتها الطوسي يمتد من الهند الى ايران . ثمرها تملو نحو عشرة امتار . خشها صلب ، فاخر الصنف ، تمل منه آلات الطرب .

٢٠٢٠٥ - غُوشَاكَر *

Steatornia caripensis (S).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الطناريات . موطنه بعض مناطق امريكا الوسطى . يألف الحياة الحماجية . سره يمد من ١٠٠ الى ٥٥٠ زوج . يسرح في الليل ويبعث في التبار في الكهوف والمغاور || جسمه كبير القذ يطول نحو ٤٥ سم . ثوبه الى الشفعة السمراء تنيق في الطهر وتحت في الصدر والبطن وتلمو بقعة بيضاء . وسواد متباعدة الاشكال تمتل كامل الثوب . حقة عنه الى

Goodenia (S).

Goodénia (F). Goodenia (E).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومصرمة من فصيلة الفوندريات . انواعها المروفة نحو ٧٠ مهدا استراليا || جميعها عشبية . المصرة منها عشبية الساق ، أوزانها متعاقبة ، مستطيلة . معظم أنواعها علفية .

٢٠١٩٦ - غُودَنِيَاَت *

Goodeniaceae (S).

Goodénia (F). Goodeniaceae (E).

فصيلة نباتية من ذات الفلتين متحدة الفلوات منخفضة المبيض . اجناسها المروفة ١١ اما أنواعها فاكتر من ٣٠٠ اصلانها بعض الاصقاع الحارة الاسيوية والامريكية والاستراليا || نباتاتها عشبية حولية وعرولة ومصرمة . أوزانها متعاقبة ، بسيطة ، أذناها متدغرة الراسات . زهورها لينة ، مزجسية ، خامسة الاجزاء . مقلاتها جازلة . مبيضها ثنائي الخدر ، عديد البويضات . اقلام السيات فردية ، يتكون تحت مبيضها الثنائي النصف ثنائية بلوطي الشكل يطوق اطراف من الزغب الحلي التركيب والشكل || أشهر اجناسها الفوند .

٢٠١٩٧ - غُور * ، جُور

Bibos gaurus (S).

Gaur, Boud gaur (F). Gaur, Indian bison (E).

نوع من ابقار الرشي ، موطنه يمتد من بورما الى شبه جزيرة ملقة . يعيش في الاحراج البذلة الكثيرة المشب . طوله يراوح بين ٣٠٠ و ٣٢٠ سم . وارتفاعه من ١٨٠ الى ٢٠٠ سم . ثوبه الى البصرة المايحة . قوامه يني . حادوكه مستطيل دقيق بارز . اذله لا يقاسي المدد يراوح من ٥ افراد الى ٢٥ فرداً .

٢٠١٩٨ - غُورَامِي *

Oosphronemus olfax (S).

Oosphronème de la Sonde, Gourami (F).

غورامي هو الاسم الملايزي . سمكة متعينة من شائكات الزعانف البلوسيات النيبية وفصيلة الحساكيات . اصلانها المنافع والبحيرات والاحوار الكثيرة في ماليزية وجاوا وصوتها || جسمها كبير القذ يطول نحو ٤٠٠ سم . رأسها شبه غروري الشكل ، فيق الخط الصغير . زعنفتها الظورية كثيرة المناسخ ، مستطيلة الشكل ، تمتد الى الواء . زعنفتها الخرسيتان صغيرتان مجهزتان بحسكتين خضرفيتين بالمتا الطول . الشرجية مستطيلة ، شاذكة . اما الذيلية فنبية مرمية . ثوبها الى البصرة الحمراء الغنية المراج يملو في ظهرها تتمايح معترض اسود . يملها فضي اللون منقط بالاسمر || لحمها فاخر الصنف مرغوب فيه رفر كثرة الحساك .

Gaura (S).

Gaura, Gaure (F). Gaura (E).

جنس نباتات عشبية وجميلة ، حولية وعرولة ومصرمة ، من فصيلة الاعدريات . أنواعها المروفة نحو ٢٠ جميعها امريكية المهد . معظمها بري وبضها ترتبي || سقها منتصبية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروعها دقيقة جازلة . أوزانها متعاقبة ، السفلى منها ريشية غريبة الوصل الحليجية عتزة ، اما العليا لسنانية النصال المايحة الخضار . أذناها مجموعة من الشاكل الطرية الارنكاز . أذناها رباعية البتلات الانساوية . اسديتها ثنائية او رباعية الازواج . ثمارها قرنية اللون . تنويعها غريري || ترقب في الاقربة التوسلة الانتاج وتقم التثليل ما



غورامي



غورَة فِرْجِينِيَّة



غورل



غوريت



غوشار



غُشْب



غُشَّة مَرَسِيَّة (١)



غُشَّة مَطْلَاة (٢)



غُشَّة مَجْدَلَة (٣)



غُولَان



غُرْنَاكَا



غُشَّة

القد ، طويلة الزغب ، زرقاء اللون أو بيضاء || يزور
القزوين ، يتكاثر بالبذور والعقل ، تلبس مشاتله في آذار
ونيسان وتنتقل الشتول الى مستقرها في اواخر ايار فتضرس
بعد قطف دروسها موتها . اما العقل فتضرس في آذار ونيسان .
والنولان يرغب في الاثرية البليزية الجسية المعرعة للشمس .
وهو لا يتطلب حناية خاصة وجل ما يجب الانتباه اليه
هو مكافحة الارق عند ظهوره لانه يمتص نسغ الاوراق
ويؤذي النبات . يكافح باستعمال مركبات النيكوتين
وقهرا من الحواشيد القاتلة .

٢٠٢١٤ - غُولَان طَيَّاسِي (S). *Ageratum conyzoides* (F).
٢٠٢١٤ - غُولَان طَيَّاسِي (S). *Ageratum conyzoides* (F).

نوع من الغولان ، وهو عشبة ترابية زرقية جميلة .
ساقها فراء ، حرمية الهيكل ، وتدية الجذر . اوراتها
بيضية التصل للسنان الحافة . ازهارها صغيرة القدد ، زرقاء
اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين .

٢٠٢١٥ - غُولَان فِرْدَوْسِي

٢٠٢١٥ - غُولَان فِرْدَوْسِي (S). *Ageratum corymbosum*, *A. celestinum* (F).

نوع من الغولان ، وهو عشبة سرورية ترابية تملو نحو
٨٠ سم . اوراتها متعقة . نصلها قلمي القفافة ، يضي
الصفحة المائلة . ازهارها خلية البشرة ، زرقاء اللون .
ازهارها يستمر من حزيران الى اواخر تشرين .

٢٠٢١٦ - غُولَانَا * وِغُون (S). *Lama vicugna* (F).
٢٠٢١٦ - غُولَانَا * وِغُون (S). *Lama vicugna* (F).

غُولَانَا هو الاسم الشائع في بوليفيا والبيرو . نوع من
اللاما ، حيوان لبون عاش من فصيلة الجمليات . موطنه
جبال بوليفيا والبيرو من ارتفاع ٣٠٠٠ م . فصاعداً ||
جسمها رقيق القوام بطول نحو ٢٠٠ سم . ويرتفع نحو
١٠٠ سم . وبرها فاخر الصنف ، غالي الشن || الاثن
ثانية الاخلاط . صلبها يدوم نحو ١٧٠ يوماً . اللابان
من الغولانكا يستعمل لدر الحليب ونقل الاتقال .

٢٠٢١٧ - غُولَانَا * وِغُون (S). *Gunnera* (F).

جنس نباتات عشبية دمامة مسرة دمامة من فصيلة
الغولانيات . انواعها عديدة جميعها من نباتات المناطق
الحارة . اوراتها قرصية الانتشابه ، متعقة ، كبيرة القدد ،
مقصصة ، قلبية القفافة نصلها بطول من ٣٠٠ الى ٣٠٠
سم . ازهارها صغيرة القدد ، متبيلة التجميع ترتكز على
شراخ يملو من ٦٠ الى ٤٠٠ سم || جميع انواعها دمامة
غزيرة النسغ ، جذورها وارواها مضادة للجفاف . قشورها
صلبة . صباغها اسود اللون .

٢٠٢١٨ - غُولَانَا * وِغُون (S). *Gunnera* (F).

٢٠٢١٨ - غُولَانَا * وِغُون (S). *Gunnera* (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين .

٢٠٢١٩ - غِيَاب ، غِيَابِي (F). *Contumace* (F).

٢٠٢١٩ - غِيَاب ، غِيَابِي (F). *Contumace* (F).

هي سالة الملكيت بالحضور امام الحكمة وقد تحلف اما
جهلاً او عمداً فاعتبر في حالة غياب رسك عليه غيابياً .

٢٠٢٢٠ - غِيَابَات * وِغُون (F). *Pogonophora* (F).

٢٠٢٢٠ - غِيَابَات * وِغُون (F). *Pogonophora* (F).

النباتات فتة حيوانات بحرية دودية الشكل كثيرة القوس .

الزرقاء السوداء . سباله كثيفة مستطيلة سوداء اللون .
مفادع ذوب المقطع المحجن ، واسع الشفق الرسب ، لونه
الى الطحلة تلوينا مابة جراء . ساقه الى السرة الزرقية
المزج || طيرانه خفيف الحركة ، معتدل الشوط ، كبير
التحليق || قوته الثار والبورو وبسبب الحشرات الكبيرة ||
عنه القوس يندبه ايناً كان بين تخاليف حضور الكهوف
والغاور . الاثني نضع من يبيشتم الى اربع يبيشتم
تحضنها بمناولة الذكر نحو ١٨ يوماً .

٢٠٢٢٠ - غُولَانَا * وِغُون (S). *Steatormithidae* (F).

فصيلة طير من الجوارث مشقوقات المنابر . اجناسها وانواعها
الحرة قليلة العدد . موطنها بعض مناطق امريكا الوسطى ||
طيرها كبيرة القدد تتميز بمناقتها الفضية الشبه مشورية
الشكل ، وباجنحتها المسطحة || سرعها دجوي يستمر
من الغرب الى الشرق . قوتها الثار والبورو || اصف
انواعها وابهرها النشار .

٢٠٢٢٧ - غُولَانَا * وِغُون (F). *Amblypyge*, *Phryne* (F).

جنس عنكب وايحة من الزوفيات . تتميز بجملها من
مؤخر الجوف ويطنها المركبة من ١١ سكة . اجسامها
صغيرة ، مبطلة ، دمامة القفافة ، تطلو نحو ٤٥ م . ||
موطنها يشمل معظم اقطار البلاد الحارة .

٢٠٢٢٨ - غُولَانَا * وِغُون (S). *Heiella phalloides*, *Morchella esculenta* (S).

Heiella phalloides, Morchella esculenta (S).
Morille, Morille, M. de moine (F). Morell, Bisphora's
mित्र mushroom (E). Spelzermorchel (D). Spiznoga (F).
جنس فطور مأكولة من فصيلة الفشاريات ورتبة الزوفيات .
انواعها عديدة جميعها صالحة للاكل لكنها تختلف حسن
بعضها بحدة الطعم وبقدار الحجم .

٢٠٢٢٩ - غُولَانَا * وِغُون (F). *Benthos* (F).

فطور ج افراط . اسم يطلق على الامعاق البحرية المختلفة
الامداد وعلى الكائنات الهية الثابتة والمتحركة التي تعيش
في هذا المحيط . في الكائنات الثابتة نذكر الخليات
والاسفنجيات والشوكيات والعلمليات ... ومن الكائنات
المتحركة نخص بالذكر البديان والمشتربات والصفحيات
الخياشيم والمدليات والنجميات ...

٢٠٢٢٠ - غُولَانَا * وِغُون (F). *Benthique* (F).

نعت تعريفية يطلق على الامعاق البحرية وعلى الكائنات
الحية التي تعيش وتتكاثر في هذا المحيط .

٢٠٢٢١ - غُولَانَا * وِغُون (F). *Benthique* (F).

٢٠٢٢٢ - غُولَانَا * وِغُون (F). *Benthique* (F).

٢٠٢٢٣ - غُولَانَا * وِغُون (F). *Benthique* (F).

٢٠٢٢٣ - غُولَانَا * وِغُون (F). *Benthique* (F).

٢٠٢٢٣ - غُولَانَا * وِغُون (F). *Benthique* (F).

٢٠٢٢٣ - غُولَانَا * وِغُون (F). *Benthique* (F).

٢٠٢٢٣ - غُولَانَا * وِغُون (F). *Benthique* (F).

٢٠٢٢٣ - غُولَانَا * وِغُون (F). *Benthique* (F).

٢٠٢٢٣ - غُولَانَا * وِغُون (F). *Benthique* (F).

٢٠٢٢٣ - غُولَانَا * وِغُون (F). *Benthique* (F).

٢٠٢٢٣ - غُولَانَا * وِغُون (F). *Benthique* (F).

٢٠٢٢٣ - غُولَانَا * وِغُون (F). *Benthique* (F).

٢٠٢٢٣ - غُولَانَا * وِغُون (F). *Benthique* (F).



غفل باهت

زبانها مشطيات قصيران . جوشها مستطال المخزر . بطنها اسطواني الشكل || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في القبار . تماثل به ظهورها مدة وميزان فراوح من بينين الى اربعة ايام . تمتع المنكر مباحداً على سوق الثبات وقرويه || السرة تقبل نحو ١٢ م . جسمها اسطواني الشكل ، اسمر اللون يميل تقبيل اسود ورقشة صفراء . رأسها كسني اللون . رواجبها الصدرية شريطية . رواجبها البطنية شديدة القصر عجمية الاطراف . تلحف بطنها باغشية غروية للمادة تأخذ شكل القرباب لتلتصق بها فئات الصالح والاراق والتفشور . طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوماً ينتهي ضمن قرباب السرة . الذكر يترك القرباب ويطير اما الانثى للمرأة فلا تخرج القرباب الا عند التماثل ولا تود له .

٢٠٢٢٩ - عَيْدَانَة النَّيَّاتِ * Psychidae (S).

Psychidae (F). Psychidae (E). فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٤٠٠ منتشرة في معظم اصقاع العالم . تسرح في القبار . طيرانها خفيف الحركة ، كثير المرتفعة والجرم || اجسامها صغيرة . قصيفة . ذكورها مجنحة . انثاها مدار . عيونها جرداء . قرونها الاستعمارية مشطية مزدوجة . ملابسها شديدة القصر . مراشعها اربعة . حذائها خير موسودة . بطنها كثيفة الخمل . رواجبها صغيرة . مستديرة الاطراف ، قليلة الحرافش البهيرة ، سوية الالوان . جرمها تامة النسج . غنايبها الخلفية ثنائية المناسخ او رواجبها || اساريها عراطة انما يلحف بطنها باغشية غزالية للمادة تخرج منها فئات الصالح والارواق وكل ما يلتصق بها || عاوداتها طبقة تحسور ضمن غلاف السرة || اشهر اجناتها العبدانة والكنكرونة .

٢٠٢٣٠ - عَيْدَانَة السُّوسُ * Gadus mediterraneus (S). Gade mediterranean (F).

Mediterranean gadefub (E). سمكة بحرية يربوس من فصيلة الغاديات ورتبة للمساوات . اصطنها معظم اقالم البحر الايطي المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || تعتبر من الاسماك البنية . لا تقترب من الشطوط والمجاوح الا في زمن التسفة . لمنجها الحيائي كرسومي . اسرابها وافرة البدن || جسمها اعليبي الشكل ، مستدل التبطيل يطول من ٢٢ الى ٢٧ سم . حراشعها صغيرة رقيقة . ثوبها الى الريدة الرصاصية القصية المواج تترك في الظهر وتنبير وتبيض في البطن . زعانفها الى اخضر البصري . خملها الجانبي جالس الابتعاد الاقني || رأسها غروطي الشكل ، ذلق الخلم . فكها الاعلى يحمل في مقدسه عذتين دقيقتان . والفك الاسفل يحمل مذبذبة واحدة عيناها كيرتان بارزتان ، ابرجارتان ، زعنفتان الظهريّة واحدة ، مستطيلة ، رقيقة المقدم || لحمها متوسط الصفت ، مأكول .

٢٠٢٣١ - عَيْدَانَة كَلَّة Libéralité (F). Liberality (E).

الثيقة العطاء بسنداء وبصيرة .

٢٠٢٣٢ - عَيْدَانَة كَلَّة Parthénogenèse (F).

Parthenogenesis (E). البندلة وتدعى ولادة المفازي ، منفتح تماثل تقوم به بعض طائري الحشرات والنلوبيات الدنيا في زمن قوم من حياتها اذ ان بويضاتها تحسور وتفتق كالوا انثا كانت

٢٠٢٣١ - عَيْدَانَة كَلَّة هو غشب القديمين ، اطليه .

٢٠٢٣٢ - عَيْدَانَة عَقْرِيّ هو حرد الانبياء ، اطليه .

٢٠٢٣٣ - عَيْدَانَة Scarus stellatus (S).

Scarus stellatus (F). سمكة بحرية من بنات مصفار يقال ان لحمها يلذي في بعض فصول السنة وذلك عندما ترحى زيمات المرجان . وهي من اسماك المتوسط والخليج .

٢٠٢٣٤ - عَيْدَانَة باهتة * Polyplaca diluta, Aphasia diluta (S).

Asphale délayée (F). Polyplaca diluta (E). حشرة من فصيلة الحرشفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم الاقاليم المعتدلة الحارزة من الفرق الاوسط والاولاد واروبية . فراشها جاسوة قوتها رقيق الازهار . سرفتها تمشي على اوراق الشبان || جسمها صغير قصيف يطول نحو ١٢ م . بطنها نحو ٢٣ م . رأسها اسمر . عيناها كيرتان . زبانها غشيات مستطيلتان . جوشها وبطنها الى الحطلة الخطية المواج || ورشها الاماميان الى الحطلة الخطية تملوها جذتان مترفعتان بينتان وخسة خطوط متعرجة سنخية . ورشها الخلفيان الى الحطلة التبرء البيضاء المواج . اهدابها الى الصهبة || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الفراشة في آب . تسرح من القرباب الى فحة الليل . تماثل به ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتج الممكن مباحداً تحت التفشور او بين شقوق الحما || السرة تطول من ٢٤ الى ٢٧ م . جسمها شبه اسطواني الشكل مستطال الرأس والسمة الصدرية الاول . ثوبها الى الحطلة الاسمر يملوها عند تبجي قاطب اسود وخسة خطوط جانبية ، نخبلة ، مسرفة ، صفراء اللون . رأسها يبيضي الشكل ، كسني اللون ، مدهسا . رواجبها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينتهي ضمن صلبة تحميها السرة بين شقوق الحما .

٢٠٢٣٥ - عَيْدَانَة Pluie abondante (F).

النيت : المطر الجود الكثير . Abundant rain (E).

٢٠٢٣٦ - عَيْدَانَة عَقْرِيّ Orbicole (F). Orbicular (E).

نمت تمريني يطلق عل ما هو موسوي في جميع اقطار العالم .

٢٠٢٣٧ - عَيْدَانَة كَلَّة هو ولد الذهب وهو اكبر من الحسل .

٢٠٢٣٨ - عَيْدَانَة كَلَّة صَوْبَة اللون * Psyche unicolor (S). Psyché unicolore (F).

Psyche unicolor (E). حشرة من فصيلة البنديات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها مجت من الشرق الاوسط الى اروبة وافريقية الشمالية . فراشها حشفة تمشي على مخزوبها الاسما . حرقها خاضلة قوتها اوراق النباتات البرية الحولية والحمولة || ذكورها مجنحة انثاها مدار . جسم الذكر صغير قصيف يطول نحو ٦ م . بسطه نحو ١٩ م . رأسه الى الخلفي الاسمر . عيناها صفيرتان . زبانها مشطيات مزدوجتان . جوشه وبطنه الى الخلفي الاسمر المواج . رواشته حنطية اللون ، صفراء المواج || الانثى معررة تقول نحو ٩ م . ثوبها الى الخلفي تملوها ورقشة سوداء . رأسها صغير الجرم . عيناها صفيرتان .



غيدس المتوسط

Glaucomyidae (S). ٢٠٢٤٧ - غَيْشَرِيَّاتٌ ٥

Glaucomyidae (S). Glaucomyidae (E).

فصيلة حيوانات مائية بحرية ونهرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم. أنواعها المعروفة نحو ٢٠٠ ينتمي جنس واحد || أعطائها مصبات أنهر الخند والعين واليزيا. تعيش منفعة في الإسمال والريال. أجسامها صغيرة. أصدانها ثنائية المصاريح، شبه أهدليجية الشكل، عابقة الألوان التي يكثر فيها الأخضر المتفاوت الماحات || جنسها الوحيد يدهى الغيشر.

٢٠٢٤٨ - غَيْشَصٌ ، نَقْصُ الْقِيَمَةِ

Moins-value (F). Inferior value (E).

هو انخفاض قيمة الشيء بين زمنين.

Tare (F). Waste, Damage (E). ٢٠٢٤٩ - غَيْشَصٌ

غرض اللوازم من خيل وبقر وغيرها كثيرة أهمها ما يمتري قوائم الخيل وسببه تمدد الشاء الآسي في المفاصل. وهي حل نوسين :

Tares molles (F). Soft wastes (E). ٢٠٢٥٠ - غَيْشَصُ الْحَوْشَبِ

تتحصل من تمدد الشاء الآسي في المفاصل. منها غيش الحوشب والمرقوب.

Tares dures (F). Harsh wastes (E). ٢٠٢٥١ - غَيْشَصُ الرُّكْبَةِ

تزيادات أو انتشارات تمدد لذات السب. منها الجرد والنخس والمرت والمش.

Molette (F). ٢٠٢٥٢ - غَيْشَصُ الرُّكْبَةِ

Wind-gall (E).

انتفاخ رخو مفصل أو وترى سببه للإجهاد.

Vessigon du genou (F). ٢٠٢٥٣ - غَيْشَصُ الرُّكْبَةِ

Vessigon of the knee (E).

ورم رخو مفصل أو وترى يحصل في بعض أنحاء الركبة.

Vessigon du jarret (F). ٢٠٢٥٤ - غَيْشَصُ الرُّقُوبِ

Vessigon of the hough (E).

ورم رخو مفصل أو وترى يحصل في بعض أنحاء الرقوب.

Eponge (F). Heel (E). ٢٠٢٥٥ - غَيْشَصُ المِرْقِ

هو انتفاخ رأس المرق عند الخيل.

٢٠٢٥٦ - غَيْشَصَةٌ

غاية تكثر فيها الرطوبة أو جداول الماء.

٢٠٢٥٧ - غَيْطٌ

هو الخغل، الحلبه.

٢٠٢٥٨ - غَيْطَلٌ

أطلب هرقلية ناقة.

٢٠٢٥٩ - غَيْطَلَةٌ

الغيطلة : البقرة الوحشية. وقيل البقرة ملطاً تسمى غيطلة في زين الدرع. ج غياطل.

Bande d'oiseaux (F). ٢٠٢٥٩ - غَيْشَصٌ

Flight, Flock (E).

الغيف جماعة الطير. والرف كذلك والسرب أيضاً.

٢٠٢٦٠ - غَيْشَصٌ

Fourré (F). Thick (E).

شكل من أشكال الحراج.

Coléoptile (F). Coleoptile (E). ٢٠٢٦١ - غَيْلَفٌ

غند زبارة بعض بلور الاعتقاب.

مذكوبة || من هذه الحشرات واللويبات تخص بالذكر اللواتر والارقيات وبراغيت الماء والآبروت والصفيحات.

٢٠٢٦٢ - غَيْرُ جَائِزٍ

Illicite (F).

Illicit, Unlawful (E).

٢٠٢٦٣ - غَيْرُ شَرْعِيٍّ

Illegitimate (F).

Illegitimate (E).

٢٠٢٦٤ - غَيْرُ قَائِلٍ الْإِثْقَالِ

Main mortable (F). Mort main (E).

هي حالة الاموال الموقوفة التي لا تباع ولا توهب ولا يمكن انتقالها الى الورثة.

٢٠٢٦٥ - غَيْرُ مُتَحَوِّلٍ

Inconverti (F).

Unconverted (E).

٢٠٢٦٦ - غَيْرُ مُتَسَاوِيٍّ الْأَوْرَاقِ ، لَا مُتَسَاوِيٍّ

Anisophylle (F).

Anisophyllous (E).

٢٠٢٦٧ - غَيْرُ مُتَسَاوِيٍّ الْبَتَلَاتِ ، لَا مُتَسَاوِيٍّ

Anisopétale (F).

Anisopetalous (E).

٢٠٢٦٨ - غَيْرُ مُتَشَابِهٍ الْأَجْزَاءِ ، لَا مُتَشَابِهٍ

Anisomère (F).

Anisomeric (E).

٢٠٢٦٩ - غَيْرُ مُتَسَاوِيٍّ

Anisométrique (F).

Anisometric (E).

٢٠٢٧٠ - غَيْرُ مُتَعَدِّدٍ

Indéfini (F). Indefinite (E).

٢٠٢٧١ - غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ، غَيْرُ وَاجِبٍ

Indu (F). Undue (E).

هو دفع مبلغ لا يقابله التزام وقد يحول القانون حق استردادته.

٢٠٢٧٢ - غَيْرُ مُقَدَّرٍ

Indéterminé (F).

Indeterminata (E).

٢٠٢٧٣ - غَيْرُ مُنْهَكَمٍ ، طَالَعٌ

Indigeste (F). Undigested (E).

٢٠٢٧٤ - غَيْشَصَةٌ ٥

Abramsus globosus (S).

Abrée sphérique (F).

حشرة ناتجة من مشعات الاجنحة، ديبوسات القرون، خماشيات الاجزاء. موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبا || جسمها صغير القد، نصف كروي الشكل، جويي اللون، اسفح المواج. قرونها الاستشعارية خامسة الفصل، ديبوسية الأطراف || قوتها كل ما استطاعت قتصه من اللويبات الصغيرة والديدان.

٢٠٢٧٥ - غَيْشَصَةٌ ٥

Glaucomya (S).

Glaucomya (F). Glaucomya (E).

غيشر هو الاسم الهندي. جنس حيوانات مائية من الرغويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الغيشرييات. أنواعها المعروفة نحو ٢٠٠ موطنها اغوار الانهر الهندي والصينية والماليزية.. تعيش منفعة في الاسمال. جميعها صغيرة القد، ناهية الصوم للاماكولة.



غيشة

٢٠٢٦٧ - غَيْثَوْدِيَّة الشَّيْء

Guignardia theae (S). Brown blight (E).

فطر مجهرى يركب أوراق الشاي فينثيا ، مظهره الخاربي يقع حنطية اللون يابسة المحور الاطبل . وهي سرية الانتشار والاذى نيا او ساجتها التولم الجوية || لم تكافح حتى الآن حنطاً على اوراق الشاي من المواد الحنطية .



غَيْثَوْدِيَّة الشَّيْء

٢٠٢٦٨ - غَيْثَوْدِيَّة العَرِيْشِ

Guignardia baccae, Physalospora baccae, P. reniformis, Phoma flaccida, Ph. reniformis, Ph. Cookei, Macrophoma flaccida (S). Excoriosis de la vigne (F). فطر مجهرى واسع الانتشار يركب الجفنة والمتقوس . مظهره الخاربي يقع صغيرة بيضية الشكل حنطية اللون تنتشر على قشور الجفنة وعلى العنب قرب اذراكه قشيب احمرار البشرة ثم يبيضا || يكافح باستعمال اسد الفوطير النعناع على رشتين او ثلاث رشات قبل حسرة العنب .



غَيْثَوْدِيَّة العَرِيْشِ

٢٠٢٦٩ - غَيْثَوْدِيَّة يَدَوْدَلِيَّة ، بلاك روت الكَرْمَةِ ، عَنَنْ أَسْوَد

Guignardia bidwellii, Sphaeria bidwellii, Physalospora bidwellii, Laszadia bidwellii, Phoma uvicola, Phyllosticta labruscae, P. ampelopsidis, Naemospora ampellicida (S). Black-rot de la vigne, Pourriture noire de la vigne (F). Black-rot of grape (E). فطر مجهرى يسبب اوراق الكرمه وناقيدها قيرقيا ويمتعا || مظهره الخاربي بقعة او بقع جزوية اللون حنطية اللونج شبه مستديرة الشكل تملط تصل الاوراق السفلى ثم تمتد الى ما فوقها وتركب العناقيد قرب حصرمتها فتسقطها وتلويها || تتكاثر في ظروف طبيعية معينة تمضها العوامل الجوية اللامعة || تكافح مثل اليلديور باستعمال ذات الفوطير .



غَيْثَوْدِيَّة يَدَوْدَلِيَّة

٢٠٢٧٠ - غَيْثَبِء هو الظلم ، ذكر النمام .

٢٠٢٧١ - غَيْثَوْدِيَّة

Cnemidophorus (S).

Cnemidophorus (F). Cnemidophorus (E).

جنس حيوانات زحافة من العنقاء وفضيلة التدييات . انواعه المعروفة قليلة العدد اصطلحتها بعض مناطق الجنوب الشرقي من امريكا الشمالية || تألف البراري والقبليان . تتميز بسرعة الحركة والانتقال . قربها الحشرات والبهيدان الطواجا وسيدة الالوان السوية . تكثر فيها الربة السمره والسمره .



غَيْثَوْدِيَّة

Tortue (mâle) (F).

Turtle (male) (E).

الزئيم : ذكر السلاحف ويدهى الايسم والليليم ، ويقال لهاها اللليل .

Nuage (F). Cloud (E).

غَيْثَم ، سَحَاب

الزئيم او السحاب غبار ماء علا في الجو وتكاف . ويكون عادة قتيبة التيارات الهوائية الصاعدة من الارض الى طبقات السكالك . وتعتبر الغيوم من عوامل المناخ الهامة لانها مصدر الاسطار والتلوج وسبب الفسح وانخفاض الحرارة || والغيوم عديدة الاشكال ولكل منها اسم يميز خاص يدل على نوعها ويتوسط ارتفاعها التقريبي من سطح الارض . امرفها واشهرها ما يلي :

Nimbus

Cumulo-nimbus

Stratus

Cirro-stratus

Cumulus

Cirrus

Cirro-cumulus

Nuage artificiel (F).

Artificial cloud (E).

دخان كثيف يحصل من حرق بعض المواد الحنطية وغيرها يستعمل لمنع جلد الربيع من بعض النباتات ، اغصنها الاشجار المثمرة .

٢٠٢٦٤ - غَيْثَمَاء

النباه : الشجرة الغضراء الورق اللطيفة الاغصان .

Fourré de bois (F). Wooded (E).

غَيْثَمَاء

النباه هي الاجبة .

٢٠٢٦٦ - غَيْثَوْدِيَّة

جنس فطور مجهرية من السحابيات وفضيلة المشروبات تتميز باصالتها البسيطة المستديرة التي تفرز في نسج النبات المنار . نكاتها عديمة النكات ، بولها شفاه ووحيد الحلية || انواعه الاقتصادية الزراعية ثلاثة وهي .

Guignardia (S).



ف

prunier, Tordeuse verte du prunier (F).
Argyroplote pruniana (E).

حشرة مؤذية من فصيلة الفانلات حرشيات الاجنحة .
موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها خضفة .
سرقها خاضعة تركب اوراق الخوخ والزعرور فتفعلها
وتعيش عليها || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٧ سم .
يسقطها تراوح من ١٢ الى ١٦ سم . رأسها مستدق الجرم
اسمر اللون . عينها زيتان صغيرتان . زبابها خيطان
ملابسها قصيرة . مرشها جذعة . جوشها ويطنها الى
الكهبة السراء الموج || روشاها الاماميان الى التبردة
يعملها تبييض وتوشم اسمر . روشاها الخلفيان الى الريدة
السراء . احداها لضية || الاثنى امير قدام من الذكر
واغلف بطناً منه اطول روشاً || لها جيل واحد في الحول .
تسرح من الغروب الى ضمة الليل ومن الفجر الى الشرق ||
الاثنى تلقي المكن مباحداً على الصلحاح العليا من نعال
الاوراق . الطور البري تسرح نحو حشرة اسابع وينقضي
على اوراق الاجنار التي تقتلها السرعة وتميش من غصينها
وعلاياها . والسرقة عند بلورها الادراك تطول نحو ١٦ سم .
جسمها مستدق المقدم والمؤخر ، اخضر اللون ، زيتي
المواج . يملو ثلاثة صفوف قاطبة من الثعلل السمر المتريجة
هللب دقيق || رأسها ودونها الصدرية الى السرة القاتمة .
رواجها الى الخفسار الاطحل || طور الاكمال الذي
يستمر نحو ٣٨ اسبوعاً ينقضي فمن صلجة تنسجها
السرقة بين شقوق اللحاء او تحت القشور الصلبة .

٢٠٢٧٧ - قاتلة الدراقين الشرقيّة *

Laspeyresia molesta, Cydia molesta (S). Tordeuse
orientale du pêcher (F). Oriental fruit-moth (E).
Pfirsichtriebbohrer (D).

حشرة من الفانلات . فراشها صغيرة القد ، يسقطها تراوح
من ١٢ الى ١٤ سم . روشاها الاماميان الى الكهبة يعملها

Tortricidae (S).

Tortricidés (F). Tortricidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشيات الاجنحة . اجناسها
وانواعها تمتد نحو ٤٥٠٠ جميعها صغيرة القد . رواشها
حريضة ، قائمة الزوايا الخارجية . قرونها الاستشعارية خيطية
الشكل . اضلاعها ظاهرة : حويناها بارزة . اقواسها
متراكبة الالوان المزركشة || يرقاتها قاذرة تقضم
البراعم والاوراق والانثان وتقترض السوق والثمار والحبوب .

٢٠٢٧٣ - قاتلة اليبس *

Evtria hercyniana (S). Tordeuse de l'épicéa (F).

حشرة من الفانلات . فراشها صغيرة القد حطلة اللون
يسقطها تراوح بين ١٠ و ١٢ سم . رواشها مهدبة الختار ،
غبراء اللون ، مشيجة بالاسمر || يرقاتها دقيقة الجسم ،
سنتطية اللون ، تركب بنتاق اليبسة تنقضي عليها بعد
ان تغلفها بجيرها الحريرة .

٢٠٢٧٤ - قاتلة الأشجار الحرجية *

Cacaecia podana (S). Tordeuse des arbres forestiers (F).

حشرة من الفانلات . فراشها صغيرة القد سنتطية اللون .
رواشها مبقجة بالاسمر || يرقاتها تركب مختلف الاجنار
الحرجية ولا تلتصق من بعض الاجنار المشرقة فتقتل
الاوراق وتقتسلها وتقترض البراعم والانثان النامية .

٢٠٢٧٥ - قاتلة الجتنان

Tordeuse des vergers (F).

فراشة صغيرة تدعى ببروة ملوطة ، اطلبها .

٢٠٢٧٦ - قاتلة الخوخ الحفسراء *

Argyroplote pruniana (S). Argyroplote du



قاتلة الاشجار الحرجية



قاتلة الخوخ الحفسراء



قاتلة الدراقين الشرقية



فأنتة السرو



فأنتة السنايل



فأنتة السنايل



فأنتة السنايل



فأنتة السنايل



فأنتة الكرم (البقرة)



فأنتة السرو



فأنتة السرويات



فأنتة خسرا

تركب نواحي القنفل فتفعلها وتقضمها وقد لا تنف من الورد والجلاب وغيرها .

٢٠٢٨٣ - فأنتة الكرم * ، بمرال الكرم *

Sparganothis pilleriana, *Tortrix pilleriana*, *Aenophthira pilleriana*, *Aenactra pilleriana* (S). Tordeuse de la vigne, *Pyralis de la vigne* (F). *Sparganothis pilleriana* (E). Springwurm, Springwurmwickler, Laubwurm (D).

حشرة من القناتلات . فراشها حنطة اللون مراء الرأس . بسطها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . ورشها الاماميان الى الصغرة تملوا زركمة حراء . ورشها الخلفيان الى الصغرة للمخة الموالج || ورقها سيد الروس ، خضر الظهور ، صفر الجوانب الملقطة بالابيض مدها اخبر اللون . ارجلها سمر || تركب برام الكرم ولورثها تنسلت البرام وتقتل الاوراق وتقضمها . وقد تركب بعض النباتات الاخرى كالمان والورد والرميح والتيلك . لكنها لا تؤذي اياها الكرم .

٢٠٢٨٤ - فأنتة الورد *

Tortrix bergmanniana (S). Tordeuse du rosier (F). Bergmann moth (E).

حشرة من القناتلات . فراشها حنطة اللون ، بسطها تراوح بين ١٢ و ١٥ م . ورشها الى الجوزة يملوا بتجديع اصفر || ورقها خسرا اللون تركب الورد فتقتل الاوراق وتقضمها مع اللروق وتقضم البرام والتوايح .

٢٠٢٨٥ - فأنتة الورديات *

Cacaecia rosana (S). Tordeuse des rosacées, T. du polier et du pommier (F). Rosa twist moth (E). Heckenwickler (D).

حشرة من القناتلات فراشها سمر الجسم بسطها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . ورشها حنطة اللون ، الامامية منها مجعدة بثلاثة خطوط حر معمرة || ورقها الى السرة الخضراء الموالج . وهي تقتل اوراق معظم اشجار التفصيلة الوردية اعصها التفاح والاياسوس والسفرجل والمغوخ والشمش والورد ، فتقسط بشرة الاوراق ويغلاها وقد تقتك بالبرام وبالآثار البنية .

٢٠٢٨٦ - فأنتة خسرا *

Argyroprope variegata, *Olethreutes variegans* (S). Tordeuse verte des arbres fruitiers (F). Bud moth (E). Grauer Knospenwickler (D).

حشرة من القناتلات فراشها حنطة اللون . بسطها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . ورشها الاماميان الى الصغرة المبهمة بالازرق . ورشها الخلفيان الى الوردية . اطرافها مبهمة فضية || ورقها خسرا اللون تركب الاشجار المشرعة اعصها التفاح وتقتل الاوراق البنية وتقضي عليها .

٢٠٢٨٧ - فأنتة *

Hemerocallis (S). Hémerocallis (F). Yellow day-lily (E). Helle Taglilie (D). Giglio dorato, Bellezza di un giorno (I).

جنس نباتات شبيهة بجنسها من فصيلة الزنبقيات . اوراقها قرصية الانتساب ، ثنائية الصف ، متعابلة . نصلها ضيق الصغرة مستطيلة || انوارها مائية كبيرة القد تركب على سراج قوي نشيط || انوارها مائية جيمها زينة سمر وفيه ترعب في الازرق المتدلة الانساج المنزيرة المادة الدالية || اشهرها ما يتبع .

تجبع ابيض . ورشها الخلفيان الى الوردية || لها جيلان في السنة . ورقها صغرة نحيلة تركب الدوايح وتؤذي على الشكل التالي : ينصهر ضرر ورقات الجبل الاول بقرض ولحم البرام والاغصان الثانية . اما القصر الناجم من ورقات الثاني فينصهر بقرض آثار وقرض

Evetria buoliana (S). * فأنتة السرو * Tordeuse des pousset du sapin (F). European pine shoot moth (E). Kieferntriebwickler (D).

حشرة من القناتلات فراشها صغرة اللند بسطها تراوح بين ١٧ و ٢٠ م . ورشها الى الحرة المبقية والبقية والقنطريش ، اهداب اطرافها الخارجية كثيفة التجميع خضر اللون . ورقها مستدقة ، نحيلة ، بيضاء التوب بقرض بانك السرو والصور تيش في داخلها فتدبب تحبيها وقد تقودها الى اليابس .

٢٠٢٩٩ - فأنتة السنايل *

Cnephasia pyrophaga (S). Tordeuse des épis (F).

حشرة من القناتلات . فراشها صغرة اللند حنطة اللون . ورشها الى الصغرة يملوا توضع اخضر || ورقها خسرا اللون مسدقة ، تقول نحو ١٠ م . تركب سنايل القمح وتقضي على البر .

٢٠٢٨٠ - فأنتة السنديان *

Tortrix viridana (S). Tordeuse du chêne (F). Carnation tortrix (E). Grüner Eichenwickler (D).

حشرة من القناتلات بسطة فراشها تراوح بين ١٥ و ٢٥ م . ورشها الاماميان الى الخضار الفاتح الاصفر الموالج وورشها الخلفيان الى الشبه البهراء || ورقها تركب البرام ثم الاوراق فتقتلها وتلتهمها . يكثر ويهدمها من جزران الى آب السنديان والشرم والتبولا والحور الجرجاج .

٢٠٢٨١ - فأنتة العنب * ، كوشيليس الكرم *

عدا قناتلات الكرم

Clysis ambigua, *Cochylis ambigua* (S). Cochyli de la vigne, Taïgne de la grappe, Ver coquin (F). Grappe berry moths (E). Traubenwickler, Gosewurm, Menwurm, Sauserwurm (D).

حشرة من القناتلات بسطة فراشها تراوح بين ١٤ و ١٦ م . ورشها مبهمة الخار . لون الامامية منها الى الوردية يملوا موالج اصفر ويجمع اسود . اما الخلفية فالوردية لفضية الموالج || ورقها دقيقة ، تنقف حنطة اللون ثم تتلون بعد كل انسلخ الى ان تستقر على الاحمر الساكن || لها جيلان في السنة تركب في جيلها الاول اناظر الكرم قبل ثابرها ويهدم . وتركب في جيلها الثاني حبوب العنب في تخلف ادوارها فتخربها وتسبها .

٢٠٢٨٢ - فأنتة الورد *

Tortrix pronubana, *Cacaecia pronubana* (S). Tordeuse de l'aillet (F). Pink twist moth (E).

حشرة من القناتلات بسطة فراشها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . ورشها خضر اللون مبهمة الخار الخارجي . ورشها الاماميان بجناح بالاسمر || مكها السور اللون شديد الصان تحمض الاثى لطخ مستطيلة على القوس ولا اوراق فينف من ورقات دقيقة نحيلة لونها الى الخضرة الاسمر .

٢٠٢٩٧ - فَاخِصَّة ، نَيرَ الحَمَامَةِ Phaeat

الفاخصة أو نير الحمامة نجم ثير مزدوج من كوكبة الحماة .

٢٠٢٩٨ - فَاخِصَّة شَرِيفِيَّة

Zenaidinae orientalis (S). Métopélie orientale (F).
طائر من الفلاحت جيل الشكل حسن المندم والصوت
كثيثة ست الروم وبيا كرم . موطنه الهند والبراق وسورية
والاناضول . طوله نحو ٢٣ سم . ثوبه متراكب الالوان
فيه الاصعب والخطي والرمادي والبشجي والاصفر
والاخر والاسود وهو مطوق العنق || قوته الحبوب على
استناتها . ينش في الادغال القليلة الارتفاع اناته تبيض
بيشتين مرتين او ثلاث مرات في السنة .

٢٠٢٩٩ - فَاخُورِي

ثيت طيب الريح . قال ابو حنيفة : هو المرور العريض
الورق . وقيل : هو الذي خرجت له جاسع له وسطه كانه
اذناب الثالب عليها نور اخر طيب الريح . وقيل هو
ريحان الشيرج . ج . فياخير .

Potier (F). Potter (E).

٢٠٣٠٠ - فَاخُورِي

هو من سن اللبن وعمله فخاراً .

Chamois (F).

٢٠٣٠١ - قَادِر

هو الشواجح ج فؤاد . وقيل القادر من الوصل الذي قد
أسن وهو بمنزلة القارح من الخيل والبازل من الايل والبقير
والثمن .

٢٠٣٠٢ - قَادِم هو الشاقول . ج فوادم .

Niveau (F). Level (E).

٢٠٣٠٣ - قَادِن

هو الرهاه اي ميزان الاستواء .

Aulacode (F).

٢٠٣٠٤ - قَارِ البُوص

هو القباغ . اطلبه .

Golunda (F).

٢٠٣٠٥ - قَارِ التَّيْلِ

هو القلندة . اطلها .

Putois félide (F).

٢٠٣٠٦ - قَارِ الخَيْلِ

يعرف بابن حرس منن . اطلبه .

Ichnumon

٢٠٣٠٧ - قَارِ فِرْعَوْنَ

هو القنسر المصري . اطلبه .

٢٠٣٠٨ - قَارَكَة ، قَارَكَةُ البَيُوتِ

Mus musculus (S). Souris commune, S. domestique,
S. ordinaire (F). House mouse (E). Hausmaus (D).
نوع من الجرذ صغير القد . موطنه العالم . ضروبه عديدة
يوجد منها في الصين وسها نحو ٣٠ ضرباً || جسمها
وشيق يطول من ٨ الى ١٠ سم . وذنبها كذلك . ثوبها
الشائع الى الريدة الرصاصية يطولها مواج اصفر . ظهرها
احمر من بطنها الذي يحيل الى الصفرة . اذناها كبرتان .
حراشف ذنبها تبلغ ١٨٠ واطباء الاثنى ١٠ || تألف
البيرت وتمتد على جميع المأكول والحجوب .

٢٠٣٠٩ - قَارَكَةُ أَرِيَّة * ، سَقَطِم

Mus arianus (S). Souris arienne (F). Arian mouse (E).
نوع من الجرذ صغيرة القد موطنها آسية الوسطى حتى العراق .
نوبها الى الصبهة السمراء يطولها الى البياض الاخير . طولها

٢٠٢٨٨ - فَاخِصَّة بُرْقَالِيَّة

Hemerocallisaurantia (S). Hémérocalie orangée (F).
نوع من الفاختة اوراتها تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . وتعرض
من ١٢ الى ١٦ سم . نصلها اخضر اللون حل صفحتيه .
شراغها الزهري يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . ازهارها تطول
نحو ٧ سم . وهي برقالية اللون عادمة البرق || ازهارها
يشت من عمود الى ايلك .

٢٠٢٨٩ - فَاخِصَّة صَفْرَاءَ

Hemerocallis flava (S). Hémérocalie jaune, Lis jaune (F).
نوع من الفاختة اوراتها تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . وتعرض
من ١٥ الى ٢٠ سم . نصلها جيل اخضر الزاهي || شراغها
يطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . ازهارها تطول من ٧ الى ١٠
سم . وهي جيلة الصفار الكبريتي . قواسة البرق المستحب .
ازهارها يشت من سزيران الى تموز .

٢٠٢٩٠ - فَاخِصَّة صَيَابِيَّة

Hemerocallis fulva (S). Hémérocalie fauve (F).
نوع من الفاختة اوراتها تطول من ٦٠ الى ٨٠ سم . وتعرض
نحو ٣٠ سم . نصلها بحري الصفحة السفلى . اخضر البيا .
شراغها يطول من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . ازهارها تطول نحو
١٠ سم . وهي صفراء اللون . صنيابة المراج . عادمة
البرق . ازهارها يشت من تموز الى آب .

٢٠٢٩١ - فَاخِصَّة صَبِيغِيَّة

Hemerocallis graminea, H. minor (S). Hémérocalie
graminée (F).
نوع من الفاختة اوراتها صفية الشكل تطول من ٣٥ الى
٥٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم . نصلها الى الخضر
الباعث || شراغها يطول من ٤٠ الى ٥٠ سم . ازهارها
تطول من ٦ الى ١١ سم . وهي ذهية اللون قواسة البرق
السل || ازهارها يشت من ايار الى سزيران .

٢٠٢٩٢ - فَاكُورَة ، فِينْدَاكِي

Facture (F).
Invoice (E).
القائورة او البيان بالامان هي وثيقة حسانية مسروقة
فيها بالتفصيل بيان المبيعات او مختلف الاشياء مع اثمانها .

٢٠٢٩٣ - فَاخِص

الثقة الحامل او الثقة الخالئ السينة .

٢٠٢٩٤ - فَاج * Phalus (S). Phaje (F).

جنس نباتات معمرة من فصيلة السبليات . انواها المعروفة
قليلة ، منها الهند وبنيزيا . سرقها سرقة متعمدة عادمة
الورق ، تطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم . تنتهي بازهار عتقوي
التجميع . ازهارها كبيرة القند طولها يراوح بين ١٢ و
١٥ سم . بتلاتها يبيض الصفحة الخارجية حر الداخلية
الي بعلوا زراويق مختلفة الالوان تراوح من الاخضر الى
الاصفر والخطي . اوراتها فارشة جلعية الانتساب تطول
من ٦ الى ٩ سم .

٢٠٢٩٥ - فَاجِين * Fagine (F). Fagine (E).

مادة دهنية تستخرج بالتقطير من ثمار شجر الزان .

٢٠٢٩٦ - فَاحِصَة Castoreum

هي المندبادستر . اطلبه .



فَاخِصَة



فَاخِصَة



فَاخِصَة



فَاةُ أَرِيَّة

٢٠٣٢٣ - **قاس** Hache (F), Axe (E).
أداة حادة القص يقطع بها القش والاشجار والحطب .



فأرة الاذغال

٢٠٣٢٤ - **قاس** Hédysaron (F).
هو الينوصارون ، الطيب .

٢٠٣٢٥ - **قاسخ** ، **قبطل** ، **مسلخ** Résolutoire (F).
Cancelling, Abrogating (E).

٢٠٣٢٦ - **قاسرى** Bryons (F).
هي القنشارة ، الطيب .



قاسيا البطيخ

٢٠٣٢٧ - **قاسى** Sécuriforme (F), Securiform (E).
نمت قمرىي يوصف به الاشياء التي تشبه القاس .

٢٠٣٢٨ - **قاسيك** ، **قاسيك** ، **قاسيك** Pentatome, Punaise (F), Bug (E).

جنس حشرات من فصيلة القاسيات. أنواعه عديدة تتميز بأجسامها المشقة بمادة حديدية كروية الزائفة . ألوانها مزرقرة ومزركشة . أرساغها ثلاثية العقول . قرونها الاستشعارية خاصة القواصل ، جميعها ممتص حصاره النباتات التي تركبها || أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .



قاسيا البوصير

٢٠٣٢٩ - **قاسيك البطيخ** * Aspongopus viduatus alger (S), Punaise du pastèque (F).

حشرة من القاسيا جسمها مغطى بقدر مطبق الشكل يعطى نحو ١٦ م . ويعرض نحو ٦ فوهيا الى الزرق السراة الموج . قوامه المهادا الى الجوزة || تركب اوراق ونواحي البطيخ وسائر النباتات القرصية والذرة .



قاسيا الشليم

٢٠٣٣٠ - **قاسيك البوصير** * Carporcoris verbasci (S), Punaise des molènes (F).

حشرة من القاسيا طولها يراوح بين ١٢ و ١٤ م . فوهيا الى الحرة الجوزية تعلوها الزغارف والزراكن السود . أربطها سود للمفاصل حمر السيقان || اصطناعا قسيمة الارباء تركب البوصير وسائر نباتات القصبلة الخنازيرية وبعض النباتات الصناعية ومنها السبع الذي تمتص حصاره اطرافه لثانية وارقائه الفتية .



قاسيا القطن

٢٠٣٣١ - **قاسيك الشليم** * Aelia acuminata (S), Punaise du seigle (F).

حشرة من القاسيا صغيرة القدر مغطاة الجسم طولها يراوح من ٨ الى ٩ م . ويعرضها م . فوهيا حنلي القرن الحقل الموج . ظهرها ثلاثي الخطوط القاطية الصفراء اللون . تركب الشليم وبعض النباتات البرية .



قاسيا الملقوف

٢٠٣٣٢ - **قاسيك القطن** * Nezara viridula (S), Nézara verta, Punaise du coton (F).

حشرة من القاسيا جسمها مغطى الشكل الأخضر اللؤلؤ يعطى من ١٢ الى ١٦ م . ويعرض نحو ٣ م || اصطناعا قسيمة الارباء تشمل جميع البلاد افارة والمتدلة || تركب القطن والبقول وبعض النباتات الصناعية كالبنج . تمتص حصاره النواحي والاوراق الفتية .



قاسيا الملقوف

٢٠٣٣٣ - **قاسيك الملقوف** * Eurydema oleracea, Pentatoma oleracea (S), Pentatome du chou, Punaise du chou (F).

حشرة من القاسيا صغيرة القدر مغطاة الجسم طولها يراوح

نحو ١٠ سم . وذنبها ١٤ || تعيش في الحقول وقرب البيوت . قتيها جميع الملواد المفضية والنباتية .

٢٠٣٣٤ - **قارة الأذغال** * Mus agrarius (S).

قارة الموش Souris agrieus (F), Agrarius mouse (E).
نوع من الجرذ صغيرة القدر موطنها الشرق الاوسط واروپة . نوبها الى الصهبة الصناعية . ثبج ظهرها اسود . بطنها وعنواحي جرائنها بيض . طولها نحو ١١ سم . وذنبها ٩ سم . اذناها مستدلتان . حارشت ذنبها ثيلج ١٢ ، اطراف الاذن ٨ || تعيش بجاعات كثيرة العدد . تألف الاذغال وجوانب الحقول المزدرة . قتيها الجرب اخصيا الخنقة ثم السائل والجنور والبصل والخشرات والديدان .

٢٠٣٣٥ - **قارة البحر** Rat de mer (F).

هو الراسون ، الطيب .

٢٠٣٣٦ - **قارة الحراج** Mulot (F).

هي النديمة ، الطيب .

٢٠٣٣٧ - **قارة الحصاد** Souris des moissons (F).

هي الزبانة ، الطيب .

٢٠٣٣٨ - **قارة الصحرارة** Souris du désert (F).

هي الفصام ، الطيب .

٢٠٣٣٩ - **قارة القيط** في حكر الحقل ، الطيب .

٢٠٣٤٠ - **قارة عجمية** Spalax

هي الخلد ، الطيب .

٢٠٣٤١ - **قارود**

هو الثور وهو كل شيء متفرد . والشجرة القارودة هي المتحنية من ثيرها .

٢٠٣٤٢ - **قاروش** Agé (F), Agé (E).

هو للسمن من الحيوان . كقوك ه أنها بقرة لا قاروش ولا بكر ه اي لا مسنة لا فتية .

٢٠٣٤٣ - **قاروطان**

القاروطان كوكبان متباينان امام سرور نبات نش .

٢٠٣٤٤ - **قاروط** ، **عجيط** Gaulé (F).

مصا طويلة تستعمل لنسج ثمار الشجرة .

٢٠٣٤٥ - **قاريات** Muridae (S).

Muridés (F), Muridae (E).

فصيلة حيوانات لبوة قاضية من مرتبة قردنيات الثوروز ورتبة القوام . اجناسها ٨٦ وانواعها ٧٢٠ لما عمارتها فتلوات الجرذيات والقناديات والكبريات . جميعها حيوانات صغيرة القدر ، مدنية الزلقوم ، مستطيلة الذنب || موطنها العالم . تسرح في الليل . تركس حل الارض ، تعوم في الماء وتنقل الاشجار . قريبا ما استطاعت اليه سبيلا من غنظت المواد النباتية والبعضوية الحيوانية . فلارها لا يفيقه خصب . اناتها تقع في الماء الولد من ٢ الى خمس موات .

٢٠٣٤٦ - **قارود** نمل اسود فيه حرة .

٢٠٣٤٠ - **فَاشَرَا اِثْرِيْقِيَّة** (F). *Bryone africana*
هي الخلدوس ، اطليه .

٢٠٣٤١ - **فَاشَرَا بَيْتْضَاءُ ، كَرْمَة بَيْتْضَاءُ ، حَاتِقِي الشَّعَر**
Bryonia alba (S).

Bryone blanche, *B. monoïque* (F). *White bryony* (E). *Geimne Zaurübe*, *Zaurübe* (D). *Brionia blanca*, *Fescera* (I).
نوع من الفاشرا المبارشة تكثر في الاسراج البقلة والمواقع الرطبة . ثمارها عنية بيضاء اللون . جذاميرها غليظة مستطيلة تتمدد في القلب يستخرج منها عصارة حريفة ، منهجة ، مهيجة ومغطة . وهي سهل شديدة الفعل يستعمل في حالات الاستسقاء والصرع وفي المنص الناتج عن الدود وفي الحشيات الصفراوية . وقد قال فيه ابن البطار . انه يحقن الشعر من الجلود واما ثمره المتقوي فلدغج الجلود .

٢٠٣٤٢ - **فَاشَرَا حَبِيبِيَّة**
Bryonia abyssinica (S). *Bryone d'Abyssinie* (F).
نوع من الفاشرا موطنه الحبشة وهو نبات زراعي شائع الاستعمال . اوراقه كبيرة الحجم متعاقبة . انماها خضراء اللون . ثمار عنية حامدة الخنع . جلوره دوفضية الشكل ، جامدة القلب ، تؤكل بعد تقمها بالماء الساخن وتغيره مرتين او ثلاث مرات .

٢٠٣٤٣ - **فَاشَرَا اسْوَدَاءُ ، عَنَبِ الْحَبَةِ ، حَبِيبِيَّة**
Bryonia dioica (S). *Bryone dioïque*, *Vigne noire*, *Naveit du diable* (F). *White wild vine*, *Common bryony*, *Snake bryony* (E). *Rote Zaurübe* (D). *Barbone*, *Raps del diavolo*, *R. di serpente* (I).

نوع من الفاشرا ثنائي المسكن يكثر قرب السياجات وفي المواقع الرطبة أعصها البرية || ثمار عنية بيضاء اللون غنية بالماء الفعالة المر || جلوره غليظة موهدة الدون المنافع الطبية أعصها ما لها صلة بالصدر كذات الجنب وما يشبه .

٢٠٣٤٤ - **فَاشَرَا هِنْدِيَّة**
Bryonia grandiflora (S). *Bryone à grandes fleurs* (F).
نوع من الفاشرا موطنه الهند . وهو نبات حولي زراعي . يفتي . اوراقه كبيرة القند مأكولة تتمدد استعمال الاسياخن . ازهاره جميلة الشكل حمراء اللون . جلوره دوفضية فزرمة المادة الفتوشية .

٢٠٣٤٥ - **فَاشَرُشَيْنِ ، شَفِيْدَاكُرْ ، هَنَزَاكُ جَشَّان**
Tamus (S). *Tamlier*, *Bryone douce*, *Racine vierge* (F). *Black bryony*, *Ladie's seal*, *Mandrake* (E). *Echte Scherwurz*, *Schwarzswurzel* (D). *Tameroo*, *Radice vergine*, *Brionia nera*, *Cerasiola*, *Vite nera* (I).

جنس نباتات عشبية طيبة معمرة من فصيلة الديويسقوريات . انواعه قليلة العدد سوقها عارضة لفرع تظلون من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقها قلبية الشكل مدببة الزام الاخير . ازهارها خضراء اللون . ثمارها حضية الشكل والقند . جلورها سحرابة غليظة سواء اللون . خصائصها الطبية كخصائص الفاشرا الا انها اصعب منها قليلا . اما الازراق فتشفي قروح الحيوان وفضاها ينفع التواء العصب .

٢٠٣٤٦ - **فَاشَرُشَيْنِ اِكْرِيتِي**
Tamus cretica (S). *Tamlier de Crète* (F).

نوع من الفاشرشين ، موطنه جزر البحر المتوسط ، يكثر في جزيرة اكرت || اوراقه ثلاثية الفصوص ، مستعمرنة اللصين الجابنيين ، مستطيلة الفص الوسطي . ناصالها لامة

بين ٦ و ٧ م . ثوبها اخضر اللون كثير الزواكش الحمر في الالات والنبات في الذكور || تركب معظم القبول اعصها للمفلوف وقد لا تمت في الكرمية .

٢٠٣٤٤ - **فَاسِيَاءُ الْمُفْلُوفِ الْحَمْرَاءُ**
Eurydema ornatum, *Pentatoma ornatum* (S). *Punaise rouge du chou*, *Eurydème ornée* (F).
حشرة من الفاسياء صغيرة القند مبطلة الجسم طولها يراوح بين ٨ و ١٠ م . ثوبها مركب التزاويق والزواكش الحمر والسود . رأسها مستعرض الشكل ، اسر اللون ، اخر المختار ، جرشها الى الحمرة تملوه حشر نقط سود . تركب المفلوف والقت ولا تمت في البطاطا .

٢٠٣٤٥ - **فَاسِيَاءُ زَمْرَدِيَّة**
Palomena prasina (S). *Palomane verte* (F).

حشرة من الفاسياء طولها نحو ١٢ م . وعرضها ٧ م . ثوبها الى الخضار الزمردي تملوه نمشة حنطية خفيفة وسنار خري يراوح عرضه بين ١ و ٢ م || اطالها تشقل جميع البلاد حمرة الخراقة . تركب معظم نواحي الاشجار باستثناء الصنوبريات . وتركب التبغ وغيره من النباتات الصناعية كالخروع والكتان .

٢٠٣٤٦ - **فَاسِيَاكِيَات**
هي فصيلة خاسيات القواصل ، اطليا .

٢٠٣٤٧ - **فَاسِيَاءُ الْعَاب**
Pentatoma rufipes (S). *Punaise des bois* (F).

حشرة مؤذية من فصيلة الفاسياليات . جسمها مفلطح ، عيني الشكل بطول نحو ١٤ م . ثوبها اصفر اللون ، كثيف التبييض الاسمر . يطها اخر مجذع الاسود ، وهو جلاني التبييض عند الذكر ، سباحة عند الانثى ، رأسها مخروطي . غصنها مستطيل المك . عيناها صغيرتان ماصتان . زباناها سطيحان ، اسمران ، كوسلها قليل العرض ، مقرن الجابنيين . حشمتها حراء الطرف . ظفورها حشطي اللون ، اصفر الخنجر . قشراتها شفاف . قوامها الى الحمرة القرمزية الباهتة || تركب اوراق الاشجار الحرجية باستثناء الصنوبريات || رانحتها كرمية .

٢٠٣٤٨ - **فَاش**
Dermanyssus (S). *Dermanysse* (F).

جنس قراد من فصيلة النمشيات انواعه عديدة جميعها حمراء ، صغيرة القند ، بيضبة الشكل ، مبطلة . طولها نحو ملير واحد . انزواها الى الرتبة ، ظهورها مزركشة بالاصفر والجلوي . تركب الطير والخفاش ولا تمت في الانسان .

٢٠٣٤٩ - **فَاشَرَا ، فَاشَرَا ، فَاشَرِي ، فَش**
Bryonia (S). *Bryone* (F). *Bryony* (E).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة القرقيات . انواعه المروقة ١٢ حية طيبة منها للمادة والمبارشة . اوراقها متعاقبة كبيرة القند . نصلها مفروق الصفحة ، ازغب البشرة ، كرية الرائحة . ازهارها الى البياض الاخير ، ثمارها نورية ، صغيرة القند ، صفراء اللون او حمراء او سوداء . جلورها نشوية التركيب ، جلوسورية او دوفضية الشكل . اما ناعها فيقترب بمجده نسا الحبوب وقد يستعمل استعماله وذلك بعد استزاف ما فيه من خواص مرة ممتة يصفها واستغنافا بولسطة الماء . بزورها زيتية ، زبنا اصفر اللون . يصنع الصناعة || اشهر انواعها الفاشرا البيضاء والسوداء والحبشية والهندية .



فاسياء المفلوف الحمراء



فاسياء زمردية



فاش



فاشرا سوداء

جالة رضية ، يزورها صغرة || انزهارها يسمر طوال شهر آب .

٢٠٣٥٥ - فاصولياء لينا

Phaseolus lunatus (S). Haricot de Lima (F).
نوع من الفاصوليا الزراعية المصرة . ضرورها كثيرة العدد .
سوقها عارضة تطول من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها كبيرة
القد ووريقاتها اعطليجية ، مستطيلة الزام الاخير انصب
المذهب . انزهارها صغرة الحجم ، بيضاء اللون ، خضراء
المواج . عناقيدها الزهرية صغرة . سفاتها منجلية الشكل
تطول من ٣ الى ٥ سم . يزورها كلوية ياروح طولها من
١٥ الى ٢٥ سم .



فانشرئين مبدول

٢٠٣٥٦ - فاصولياء معروفة

Phaseolus vulgaris (S). Haricot commun (F). French beans, Kidney beans (E). Gartenbohne, Bohnen (D). Fagiolo, Fagiolino (I).
هي الفاصوليا الزراعية البذائية المشهورة . ضرورها
المعروفة نحو ٥٠٠ . جميعها شائعة الاستعمال منتشرة في معظم
اصقاع العالم || سوقها متباينة القد مختلفة الاشكال تنمو
من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها بيضيه متشعبة النصل
المذهب النعسة || انزهارها ليلية ابيض اللون . عناقيدها
كثيرة . سفاتها لاصلية الشكل تطول من ١٠ الى ٣٠ سم .
يزورها مختلفة الاشكال والاصحاب ، غنية بالمواد الغذائية ،
تركيبها الجولي يفسل :



فاصولياء اسبانية

١٧,٤٥ ٪ من المواد الاوتية .

١٥,٣٩ ٪ من المواد البعنية .

٥٩,٦٩ ٪ من هيدرات الكربون .

اما متوسط ما تشكله القرون الخضراء المطفة الطبع فهو

١,٨٥ ٪ من المواد الاوتية .

٥,٢٠ ٪ من المواد البعنية .

١٠,١٧ ٪ من المواد الاستخلاصية .

٢٠٣٥٧ - فاصولياء مهزلية

Phaseolus (F).
بجارة من فصيلة القرنيات اجناسها وانواعها عديدة معظمها
من نباتات المناطق الحارة والمعتلة اشهرها الفاصوليا .



فاصولياء ليا

٢٠٣٥٨ - فاصولياء

Excédent de compte (F). Excess account (E).

Surdent (F). Irregular tooth, *Wolf's tooth*, (in horses) (E).

من زائلة .

Anémophile (F). **طايح** ٢٠٣٦٠

نمت ثريفي يثقل على كل نبات تثر الرياح طلع انزهاره .

Anemophilous (E).

فاطوره ٢٠٣٦١

Fongicide, Anticryptogamique (F). Fungicide, Anticryptogamic (E).

اسم شامل يطلق على جميع المواد والوسائل المركبة للخصلة

في مكافحة الفطور الطفيلية .

فاطوس ٢٠٣٦٢

قال الجاسط ولفاطوس مكنة عطية تكسر السفن والملاصون

يعرفونها فيصطلون غرق الحيفس ويعلقونها على الشية فاتها

تهرب || وقال التروني هذا هو صوت الحيفس .



فاصولياء معروفة

شديدة الخضار || انزهاره صغرة الحجم منتقية اللون .
ثمارة خصية القد والشكل لونها الى الاحمر الوردي تملوه
ماجة صفراء . جلده سحزاني ، غروي ، اسود اللون ،
جامد القلب يتصل بجميع الخصائص الطيبة المائدة الى
الفانشرئين المبدول .

٢٠٣٦٧ - فانشرئين مبدول * انبتس مالتيا

بالميسون ، ين ميمون

Tamus communis (S). Tamier commun, Taminier, Tame, Tamne, Herbe aux femmes battues, Sceau de Notre-Dame (F).

نوع من الفانشرئين موطنه حوض البحر المتوسط . ساقه

غرياء تطول نحو ٣٠٠ سم . اوراقها ملينة ويعد لبلق وهي

قلبية الشكل مديدة الطرف . نصلها خماسي او سداسي

البرق مالى البثرة الخضراء اللامعة . ثمارة خصية القد ،

حمراء اللون . جلده سحزاني الشكل ، اسود اللون ، جامد

القلب ، يستعمل استعمال الفانشر .

فاشن ٢٠٣٦٨

Synchrone (F). Synchronous (E).

نمت ثريفي يثقل على التواتر المتوازي زناً وقياساً .

فاصل ٢٠٣٦٩

Clôture (F). Enclosure (E).

هو كل ما يفصل ارضين متلاصقتين . لذلك قد يكون

حائطا او سياجاً او حنطاً الخ .

فاصلة ، صلاصية ٢٠٣٧٠

Mérithalle, Entre-nœud (F). Internode (E).

هي الجزء من الساق النباتية الكائن بين عقدتين متتابعتين .

فاصلة ، فصلية ٢٠٣٧١

Article

كل جزء من الأجزاء المتعاقبة المتتابعة في القصور المركب .

فاصولياء ، فاصولياء ، فصولية ، حبش ٢٠٣٧٢

Phaseolus (S). Haricot (F). Kidney-bean (E).

جنس نباتات زراعية حولية او معمرة من فصيلة القرنيات

القرنانية . انزاهه المعروفة نحو ٦٥ اصنافها فسيحة الانواع

تشمل جميع المناطق الحارة والمعتلة . معظمها غذائي يزود

بلحي ثمارة القرنية الخضراء او لاصتار حيوه الجافة .

وبعضها زراعي يزود لحاج زهره او لكثرة وكثافة غفرته

وسرعة نموه || سوقها ملينة ، حارضة . اوراقها معتقة ،

مركبة ، ثلاثية الوريقات . انزهارها عقودية . ثمارة

قرنية . يزورها مستطيلة الشكل ، ثنائية الفلق ، عديدة

الالوان || اشهر انواعها ما يتبع .

فاصولياء اسبانية ٢٠٣٧٣

Phaseolus multiflorus (S). Haricot-fleur, H. d'Es-

pagne (F). Scarlet runner (E).

نوع من الفاصوليا البهرقية الزينية المصرة . ساقها

عارضة تطول من ٣ الى ٤ امتار . اوراقها شديدة الخضار .

عناقيدها الزهرية كثيرة العدد والازهار . الوانها مختلفة

تختلف مع القسور لها الابيض والبنفسجى واللثاني واللثاني

الاقوان || انزهارها يسمر من حزيران الى ايلول .

فاصولياء حنطونية ٢٠٣٧٤

Phaseolus caracalla (S). Haricot caracalla, H. lins-

con (F).

نوع من الفاصوليا البهرقية الزينية المصرة . ساقها

عارضة تطول نحو اربعة امتار . اوراقها كبيرة . ووريقاتها

منتقية اللون . انزهارها صغرة الرائحة ، سحزانية الشكل ،

ليكية اللون الاصفر المواج . عناقيدها حمسة . سفاتها

٢٠٣٧١ - **فَالِيْدَلَجْ جَبَكِي** هو قرمل امر، اطبله .

Activation

٢٠٣٧٢ - **فَالِيَّة**

للشظ الكامن .

٢٠٣٧٣ - **فَالِيْس** هو كنف السر ، اطبله .

Plein (F).

٢٠٣٦٤ - **فَاعِيْمٌ**

نمت تمريني يلقط حل كل تبع يصل بقعدة العنم .



فاجر

٢٠٣٧٣ - **فَالِيْدَاتُ الْأَجَشِيَّةُ**

Aptérygotes (F). Apterygota (E).

فئة من الحشرات تشمل جميع التي لا جناح لها أصلاً أي اللامدة الجناح طبعياً لا جميعها من الحشرات الصغيرة والشديدة الصغر . فصائلها وأجناسها وأنواعها عديدة مجسمها أربع رقب : الكهدليات ، الخيلانيات ، لائلات الحثك ، غلغرات الحثك . ورثتها هذه تنضم إلى ثلاث شعب : الكهدليات والخيلانيات وهدييات الأذنان .

Hekderma (S). Hélderma (F).

٢٠٣٦٥ - **فَاعِرَةٌ** حيوان وسيد الجلس والنوع من فصيلة الفلغرات . وينيز بطلاقة جثته واسطالها . طوله نحو ١٠٠ سم . ثوبه إلى السرة الكتنية المنسجة بالأصفر يملوها زراكن سود . فترته الحشرات والصفادع والوزع يقتصصها في الليل . يعيش في دهايز فيسية يحفرها على أعماق تراوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم .

٢٠٣٧٤ - **فَال**

Rachianectes glaucus (S). Baleine grise, Rachianecte glauque (F). Grey whale (E).

حيوان بحري لين من فصيلة الفاليت . موطنه بجمار المحيط الهادي يحورب فيها من الجنوب إلى الشمال إلى ثوبه إلى الكبة وهو كبير البطة طوله براوح بين ١١ و ١٥ م .

Fagara (S).

٢٠٣٦٦ - **فَاعِرَةٌ**

Fagarier, Poirvior des nègres, P. du Japon (F). Tooth-ache tree (E). Fagarischebaum (D). Fagara (I). جنبة برية وزراعية من فصيلة الباليات . مهدا بعض المناطق الحارة اصحابها الافريقية والمغنية . اوراثها متعاقبة مركبة ، ووريقاتها خيطية دقيقة تنبو كأنها شفاقة . أنوارها حقنوية التصبغ ، محورية الإرتكاز . ثمارها كمبرية صغيرة ثقلت حبوب سود مرة الطعم قابضة تقوي المعدة والمغم وتقطع الإسهال المزمن وتكسب آلام الأسنان . وقال ابن سينا أن غصارتها تستعمل مضغفة وأنها قابضة تقطع البلع وتقرح على الجسم وتقضي على الديدان .



فاعة الجنان

٢٠٣٧٥ - **فَالِج** هو البشل ، اطبله .

٢٠٣٧٦ - **فَالِجٌ ، دَهَانِجٌ ، لِرْمِلٌ ، قُرْعُونٌ**

Camelus bactrianus (S). Chameau, Ch. à deux bosses (F). Bactrian camel (E).

جل ذو ستامين موطنه اواسط آسيا ، يكثر في التبت وتركستان وإيران . وهو أضخم من الجمل العربي والقرص منه . يستعمل في نقل الإحمال . أما وبره فكثيف وطويل يستعمل استعمال شعر الماعز .

Héldermaecidae.

٢٠٣٦٧ - **فَاعِرَاتُ**

Helodermitidae (F). Helodermitidae, Helodermitidae (E). فصيلة حيوانات زساقفة من رتبة المطاليات المشقوقات الألسنة الزربايات القزاقم . أجناسها وأنواعها عديدة جميعها غليظة الاجسام اللانفسية . أنوارها إلى السرة تلوها زراكن مختلفة الاشكال والالوان لا أشهر أجناسها القافور .



فالج

٢٠٣٧٧ - **فَالِجُ الْحَشْرَةُ الْمُزْمِنُ**

Cornage chronique (F). Chronic Roaring (E).

مرض في الحول يصير من الحبوب البيلة البيع يبرف بصوت خاص يسمع عند التنفس في أثناء العمل ويحدث في أثناء الراحة .

Phagocyte

٢٠٣٦٨ - **فَاعُوسِيَّة**

وتدعى حشامة ، خلية تحرق بالأجزاء البصوية وغير البصوية في الجسم وتبسمها .

٢٠٣٧٨ - **فَالِيَّاتٌ**

Rachianectidae (S). Rachianectidae (F). Rachianectidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية لبيونة من مربية وديشات الإحناك وربة الحرقوات لا لها نوع واحد معروف يدعى الفال أو البال الأشهب أو بال كليفورنية .

Balsamita (S).

٢٠٣٦٩ - **فَاعِيَّة**

Balsamita (F). Costmary (E). جنس نباتات حشوية عطرية معمرة من فصيلة المركبات اللبونية الزهر . أنوارها المعروفة ١٢ جميعها فرعاء السوق الزباء تلو من ٣٠ إلى ١٢٠ سم . أوراثها مستطيلة مسننة . نصلها ضيق الضفحة السميكة الجامدة الخيلية البشرة . عرفها فواح الرائحة النعنية . رؤسائها الزهرية مكورة الشكل ، مستطيلة المالحق ، ثاجية الارتكاز لا احرف أنوارها واشهرها فاعة الجنان .



فالة

٢٠٣٧٩ - **فَالِيَّةٌ**

Adesmus (F). Adesmus (E).

جنس حشرات قانصة مغترسة من مفدمات الاجنسة وفصيلة القيشيات . أنوارها المعروفة عديدة اصنافها تحوم المناطق الصحرارية من العالم القديم لا اجسامها مكرومة ، عدية ، ضيقة المؤخر الذرب . أطولها تراوح من ١٠ إلى ٢٢ سم . تتميز باستقالة القوائم الخلفية لا أنوارها متباينة الألوان يكثر فيها الابدرد المشمش بالاطمل .

٢٠٣٧٠ - **فَاعِيَّةُ الْجِنَانِ**

Balsamita suzevalensis (S). Balsamite odorante, Baume des jardins, Menthe de Notre-Dame, Menthecoq (F). Astmary (E). Tanacetbaum (D). Balsamita Atanasia, Tanacet, Erba di san Pietro (I).



فالية زيعة

٢٠٣٨٠ - **فَالِيَّةٌ زَيْعَةٌ**

Phalera bucephala (S).

Phalère bucephale (F). Phalera bucephala (E).

حشرة مدترنة من فصيلة الشوطليات وربة حشرقيات الاجنسة . موطنها يمتد من الشرق الأدنى إلى اوروبا وافريقية الشمالية . غراشها جارة قوتها رقيق الأجزاء .

نوع من الفاعية وهي بجلة مدرة زباء . فروعها كثيرة المدد تلو من ٩٠ إلى ٩٠ سم . أوراثها ضيقة التصل السيلك المستطيل . أزهارها بيض اللسانيات . أزهارها يمتد من تموز إلى آب لا أوراثها وأزهارها عطرية الحرف الفواح للتحبب .

٢٠٣٨٩ - **فَالِدَة حَقَّة** (F).
Vested Interest (E).
هي التي تحب اما على اساس القانون او على ما اتفق عليه المتعاقدون.

٢٠٣٩٠ - **فَالِدَة خَاصَّة** (F).
Particular advantage (E).
هي في عقد الشركة عناية أحد الشركاء دون الآخرين بنسبه حقوق اوفر من حقوقهم . وقد لا يكون ذلك الا بموافقة الجمعية التأسيسية .

٢٠٣٩١ - **فَالِدَة رِبَوِيَّة** (F).
Usurious Interest (E).
هي التي تتجاوز الحد الذي عينه القانون لسر الفائدة .

٢٠٣٩٢ - **فَالِدَة غَيْر مُبَاشَرَة** (F).
Advantage indirect (F). Indirect advantage (E).
هي التبرع بطريقة غير مباشرة . او اخفاء حصة وراه عند معاوضة . او الاراء من دين . او التنازل عن حق الانتفاع . الخ .

٢٠٣٩٣ - **فَالِدَة قَانُونِيَّة** (F).
Lawful Interest (E).
هي التي يعيد للقانون سمها اذا ما فأت المتعاقدان تتيهه في العقد .

٢٠٣٩٤ - **فَالِدَة قَضَائِيَّة** (F).
Judicial Interest (E).
هي التي تسري منذ اعلان صحيفة الدعوى او اذكار دعوي .

٢٠٣٩٥ - **فَالِدَة مُعَدَّة** (F).
Set Interest (E).
هي الفائدة الواجب تسديدها حتى لو لم تحقق الشركة اي ربح .

٢٠٣٩٦ - **فَالِدَة مُركَّبة** (F).
Compound Interest (E).
هي التي تحسب على مبلغ اصلي فوائده مرة اخرى .

٢٠٣٩٧ - **فَالِدَة مُسْتَحِقَّة** (F).
Due interest (E).
هي التي اجل دفعها وتقابلها غير المصلحة .

٢٠٣٩٨ - **فَالِي** (F). Axis (E).
الفالق هو قطب دورة الأرض المحورية وهو الفقرة الثانية من السمت تأتي بهد الفقرة وهي اول فقرة تلي الرأس . ويختلف العائق عن غيره من الفترات المتبقية بتمتده التسلولي الواضح .

٢٠٣٩٩ - **فَيَانَه** (F).
Fabiana (F). Fabiana (E).
جنية ممررة ، ابيدة ، وانتجية ، لزجة من فصيلة الباذنجانيات . مسقوفة الثمرين على اسم الحاكم فينيانو . ساقها صلبة تملو من ستر الى سترين . اوراقها لاطنة ويضية الشكل ، متنبهة كالغراشيش . ازهارها محورية الاوتكار ، يضاء اللون قطرها نحو ٤ سم . طولها نحو ٣ سم . قنويرها يستمر من ايار الى محو .

سرقها تعيش على اوراق الستيان || جسمها كبير القد يطلق من ٢٤ الى ٢٦ سم . بسطها تراوح من ٦٠ الى ٦٤ سم . رأسها اصفر صفاني المواج . جنتها كبيرتان . زباناها مشطيان مزموجان عند الذكر ، مخطيان عند الانثى . مرفقها معتدل الطول . جوشها وبطنها الى الصفرة الخنطية المواج || وشناها الامامية الى الربعة البنيراء تملوها خطوط ممرضة بنية وبقعة طرفية صفراء . وشناها الخلفية الى الياض الساجي تملو مابة كثينة . تزنيها حشطي . اهدابها كثينة || لها جيلون في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في الليل ، تماثل بهد ظهورها بنمو اربعة اسابيع وتحتج للمكن لطخا على الصفحات المغل من نصال الاوراق || السرعة تطول من ٥٢ الى ٥٥ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، كثيف الحلب ، مستنقظ البطن ، مدبب الثرج . ثوبها الى الصفار الجليل يملو عند ثلاثي السكم خطوط سود وبقعة حراء ونقط بيض . رأسها كسئي اللون يملو خط اصفر قاطب ينشط عند الاقنكن . مدبها الى الصفرة السمراء . وواجبها سود . حليها كبريتي || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي ضمن صلبها . تحببها السرعة في شقوق السماء او تحت القشور .

٢٠٣٨١ - **فَامِنِي** (F). Famenian (E).
نسبة الى منطقة فامن البلجيكية . تمت ترميها يطلق في الجيولوجية على الساف الاخير اي الاصل من الاراضي الديفونية المائدة الى الحفنة الثالثة من الاباج التقدم . جميع متحجرات هذا الساف من صفديات الارجل ونصيلة الكجانيات .

٢٠٣٨٢ - **فَالِيح** (F). Fongivora (F). Fongivorus (E).
نمت ترميها يطلق على كل حشرة او دوية تعيش على اللغطور .

٢٠٣٨٣ - **فَانِيد** (F). Pénide (F).
نوع من سكر انبات كان يستخرج في الماضي من القرموس وقد بطل استخراجه الآن .

٢٠٣٨٤ - **فَارُوَّة** (F). Sambucée (F).
نمت ترميها يطلق على النباتات التابعة الى فصيلة القويوات او القبرية الشبه منها || وهو سبط من فصيلة القويوات يشبل بعض الاجناس والانواع .

٢٠٣٨٥ - **فَالِيحَة** (F).
منسج من الارض بين مرتفعين ج . فوائج .

٢٠٣٨٦ - **فَالِدَة مُرَدَّة** (F). Inceret (E).
الفائدة هي المرء اي ريع الاسوال للقرضة .

٢٠٣٨٧ - **فَالِدَة اِسْتَفَائِيَّة** (F).
Conventional Interest (E).
هي الفائدة المشروطة صريحا في عقد الاقراض على ان لا تزيد على ما يحدده القانون .

٢٠٣٨٨ - **فَالِدَة بَسِيْطَة** (F).
Simple Interest (E).
هي التي تسري على اصل الدين فقط وتقابلها الفائدة المركبة .

Orifice anal (F). **فتحة شرجية** ٢٠٤١٢

Anal aperture (E).

Parapode (F). Parapodium (E). **فتحة** ٢٠٤١٣

الفتحة التو الخارجي المهاد في الحلقة او الحيدة والمقصة وما اشبه .

Anneau (F). Ring (E). **فتحة** ٢٠٤١٤

الفتحة هي الحلقة ، ج . فتوح .

Stade (F). Stadium (E). **فتحة** ٢٠٤١٥

هي في الحشرات مدة كل طور من اطوار الانسلاخ .

Malapterurus (S). **فتحة** ٢٠٤١٦

Malapétura, Silure électrique (F). Catfish (E).

جنس اسماك مكهربة من السلوريات العادة الحارشف . انواعها عديدة جميعها كبيرة القد اسطوانية الشكل ، مفلطحة الرأس ، سداسية المذبات || اشهر انواعها فترة النيل .

٢٠٤١٧ - **فتحة النيل** ، **فتحة النيجر** ، **زغادة النيل** ، **زغاشة النيل** ، **برادة**

Malapterurus electricus (S). Malapétura du Nil, M. du Niger (F). Electric catfish (E).

اشهر انواع الفترة واكبرها بيضة وهي من اسماك المياه العذبة تكثر في النيل والنيجر وفيها من الانهر الافريقية . جسمها اسطواني الشكل يطول نحو ١٥٠ سم . ثوبها الى الخصرة السراء يمتد مع اتزابه من ثقب الظهر ويمتلو رقعة سوداء || رأسها مخروطي الشكل ، شطها مقعوم الطرف . سداسي المذبات || وهي من الاسماك المكهربة التي تكهرب من سلسلتها فتأخذ الرعدة الا اذا اخذت بذنبها لانه حال من المدة الكهروكاثية .

٢٠٤١٨ - **فتح**

دود احمر يأكل الخشب الواحدة فتحة قال الشاعر :

غسدة غادتهم قتلى كآتهم

غشب تنقص في اجوافها الفتح

Hernie (F). Hernia (E). **فتق** ٢٠٤١٩

خروج عضو او حشو من الاحشاء كلياً او جزئياً من الجوف الذي هو فيه .

Hystérocele (F). **فتق الرحم** ٢٠٤٢٠

Hysterocèle (E). مرض صلب الشتاء يصيب البقر والضأن .

Exomphale (F). **فتق السرة** ٢٠٤٢١

Exomphalos (E).

عارض يصيب السرة يداوى بالافسد او بالكوي بواسطة محلول الحامض النيتريكي .

Kératocèle (F). **فتق القرنية** ٢٠٤٢٢

Keratocèle (E). فتق يصيب قرنية عين الحيوان .

٢٠٤٢٣ - **فتق المنكوف** هو قزوة المنكوف ، الملهبا .

٢٠٤٢٤ - **فتق كبدي**

Hépatocèle, Hernie du foie (F). Hépatocèle (E).

فتق يمر في كبد الحيوان .

٢٠٤٢٥ - **فتحة**

الفتحة ، ج . فتل وفتل ، ما ليس بورد ولكن يقوم مقامه .

والفتحة السحاة التي في شق التواء (السان) .

Déchaumage (F). **فتح** ٢٠٤٠٠

Ploughing up fallow ground (E).

الفتح او الشطب هي الحراثة السطحية التي تعقب الحصاد وكل زراعة صيفية غالباً شق التربة لتجويها ولتفنش الترسس والجذام .

٢٠٤٠١ - **فتح**

هو محراث الفتح اي شق التربة وينسق فاتحة وشاحبة .

٢٠٤٠٢ - **فتح** ، **فتح**

Bergeronette printanière هو اللعرة الملهبا ، ج فتاتح .

٢٠٤٠٣ - **فتاحة** طيرة متفكة بحيرة .

٢٠٤٠٤ - **فتاغيات**

Anniellidae (S). Anniellidae (F). Anniellidae (E).

فصيلة حيوانات زحافة سرلودة من رتبة السطاليات . انوعها المعروفة اثنان . اصلطانها وسائل كليويين من اعمال لمركبة الشبالية || اجسامها مرقاة ، عادية القوائم ، شبه دودية الشكل ، تطول من ٨ الى ١٢ سم . جلدها ملس ، نام السوف . رؤوسها صغيرة ، ذقنة ، فكوكها العليا شارفة اما السفلى فشديدة القصر . حيوانا صغيرة مائعة تلصقها بخون متحركة . اذنانها ممشاة || جميعها جلابة تألف اليرمال واللاتربة الرملية . فتها الحشرات . انانها سرلودة تنقع من فتيتين الى اربع فتيتحات || اما نوعها فها :

Anniella pulchra (S). **فتاحة جميلة**

نوعها اسيد في ابل معدها ثم ينحرف الى القفي .

Anniella geronimensis (S). **فتاحة جيرونيميس**

نوعها الى السرة الجلوية .

٢٠٤٠٥ - **فتاق**

الفتاق هو حرجون الكباشه واصل الياف الابيض والخميرة الكبيرة .

٢٠٤٠٦ - **فتح**

الفتح : ثمر النبع يشبه الحبة الخضراء .

٢٠٤٠٧ - **فتح شقاق**

Ranchage (F). Dressing (E). حرث الارض حرارة متباعدة الاثلام .

٢٠٤٠٨ - **فتح اعتماد** ، **فتح ائتمان**

Ouverture de crédit (F). Opening of credit (E).

مقد يقرم به شخص مالي ان يضع رهن تصرف شخص آخر مبلغاً معيناً من المال يتناوله دفعة واحدة او عدة دفعات .

٢٠٤٠٩ - **فتح حساب جكر**

Ouverture en compte-courant (F). Opening at current or running account (E).

فتح ائتمان بموجب حساب جار اي ان المفتوح له او المؤمن يمكنه بعد سحب المبالغ ان يردحاً ثم يردح فيسحبها مراراً .

٢٠٤١٠ - **فتحة** ، **فترجة**

Orifice, Ouverture (F). Aperture (E).

٢٠٤١١ - **فتحة تناسلية**

Orifice génital (F). Genital aperture (E).



فترة النيل

فيسر مع التسخ ويستقر في فصل الاوراق || مظهره الخارجي ارتقاء في الفصل يمشي شوب في الخشب ثم زوال اللون الاخضر من اطراف العسل واستبداله بالاحمر البنفسجي الذي يتصرف فيما بعد نحو الاصفر الخفي وينتهي بالبذبل والياس .



فتة

٢٠٤٣٤ - **فَتِيخِيَّات (F).**
عارة بطور مجهرية من فصيلة البوطيات . تشمل عدة اجناس اعرفها اقتصادياً الاربعة التالية : السماد ، الشبكة ، الفتية ، والفتية .

٢٠٤٣٥ - **فَتِيخِيَّات (S).**
Ampullariidae (F). Ampullariidae (F).

فصيلة من الرخويات مديات الاربل اسميات الخياشيم المشطية . اجناسها وانواعها متوسطة العدد اسماؤها انهر البلاد الحارة ومجرباتها وينامها وانحصها افريقية || اصداها متباينة الاشكال والاحجام ، منها المفروطة والكروية والمستديرة والمبطلة || اعرف انواعها واشهرها الفتية .



فتية

٢٠٤٣٦ - **فَتِي**
الفث نبات يختبئ حبه ويؤكل في الجذب وتكون خبزيته خفيفة || ويل هو الهيد || ويل هو شجر ينبت في السهول والاكام وله حطب كالحمص .

٢٠٤٣٧ - **فَتَاغِيَة (S).**
Helogale (F). Helogale (F).

حيوان لاحس مقترن من فصيلة الزباديات . موطنه بعض مناطق السودان والمليقة . يكثر وجوده قرب بحيرة نيترا . ملجته الخياشيم جاحي ، جاحته تعد من ٣ الى ٦ ازواج || جسمه صغير القد ، بطول نحو ٤٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم . رأسه مخروطي الشكل ، ذلق الحظ . عيناه واذا صغرتان ، مستديرتان ، سباله كيف الهلب الطويل . قوائمه قصيرة خامة الاصابع . ثوبه الى الزبدة السوداء || يعيش في اوبار يجفها في التربة . قوته الاناعي والجردان والقران والعلاجيم .

٢٠٤٣٨ - **فَتَاغِيَة (S).**
Cleistogamie (F). Cleistogamy (E).

الفائدة حالة كل نبات لا تفتح اكام ازهاره بل تتحول الى اجربة مغلقة تضم الطبل والمغدة .



فتية شائعة

٢٠٤٣٩ - **قَرْجِيل (S).**
Fothergilla (F). Fothergilla (F).

جنس مجربات برية وتزيينية من فصيلة المشركات . سورها متصبية تملو من متر الى ستة امتار . اوراقها عابلة ، متضالقة ، بسيطة ، كاملة ، ملتوية الاطراف . ازهارها سفيل التجميع ، طرفي الارتكاز || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٢٠٤٤٠ - **قَرْجِيل قَلَانِي**
Fothergilla involucrata (S). Fothergillie à involucra (F).

نوع من القرجيل . موطنه يمتد من المنة الى ايران . سالة شائعة ترتفع نحو ستة امتار . اوراته الهلالية المتصال طول من ١٢ الى ١٨ سم . وتقرض من ٥ الى ٨ سم . ازهارها سفيل التجميع . ازهارها وريسية ، كثيرة الادمة

٢٠٤٤١ - **فَتَّة * باسَمِين هندي**

Plumeria (S). Frangipaner (F). Frangipane, Pogodre, Temple-tree (E). Jaminzunge (D). Frangipana, Plumeria (I).

جنس اشجار ومجربات برية وزراعية تزيينية من فصيلة التفليات . مديها البلاد الحارة . انواعها نحو ٤٠ مظهرها بري وبهضها تزييني . سورها هشة الخشب . اوراقها متضالقة متفنة . نصلها الهلالي الشكل ، جامد للصفحة ، عابق الخضار . ازهارها كبيرة القد ، حيلة الشكل متصبية ، معقوفة التجميع ، تاجية الارتكاز ، عطرية الرائحة ، متعددة الالوان ازهارها من الالبيض البلق الى الاحمر القرمزي عصارها سامة يقال انها تقضي على الثمل .

٢٠٤٤٢ - **فَتُوح (S).**
Griffes (F). Claws, Clutches (E).

في الخالب وسهم من قال برائن الاسم .

٢٠٤٤٣ - **فَتِيخِيَة (S).**
Ampullaria (S).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مديات الاربل وفصيلة الفتية . اجناسها المعروفة قليلة العدد نحو ١٢ اسماؤها انهر ومجرباتها البلاد الحارة || اصداها متباينة الاشكال والاحجام منها الكبيرة والكثيرة ومنها الصغيرة . جميعها بطينة حلزونة متفرقة الثروات ، دقيقة الاغقاب .

٢٠٤٤٤ - **فَتِيخِيَة (S).**
Verticillium (S). فريسيولوم (S).

جنس بطور مجهرية من الفتية وفصيلة البوطيات . جرابه الكيدي جالس القاعدة ، متصب القوام ، لاقياسي الشكل . كنانته قائمة ، قاصدية ، عديدة الفروع الهدية الانحاسية الارتكاز || انواعها المؤذية قليلة ، اعرفها ما يلي :

٢٠٤٤٥ - **فَتِيخِيَة الرُّتَقَال (S).**
Verticillium heterocladum (S).

نظر مجهرية مركب ثمار الرتقال الباضية حل الشجرة والحلوظة في اماكن رطبة يفسدها ويغطها || مظهرها الخارجي بقعة رصاصية اللون تركب القشرة عند خاتم الثمرة فتضفي به ان تقضي على جيوب الكحول والادمان الاثرية .

٢٠٤٤٦ - **فَتِيخِيَة الثَّوْت (S).**
Verticillium mori (S). Feu volant (F).

نظر مجهرية مركب الثوت في جميع اصفاته من الجنود الى الاوراق . شبيهه سيال شديدة الميوعة يسير في الاوعية ويتغلغل على التسخ الحولية فيغطها || مظهره الخارجي ذبول فنبالي يحل بالاوراق والتواحي فيلويها ويسبب ييلها .

٢٠٤٤٧ - **فَتِيخِيَة شائعة (S).**
Verticillium albo-atrum (S). Verticilliosis, Maladie laune (F). Potato wilt (E). Welkekrankheit der Kartoffel (D).

نظر مجهرية عديم الانتشار يصيب عدة نباتات مختلفة اغصانها الاحقان والايانلس والبطاطا والبن والبنوترة والريسية والبنغونية والبنغ والجزر والخلوخ والنبطية والزان والشم والشنادر والشيالك والقتن والقيقب والكشمش والبيك والشمش والسمان والجزر وششينة الديتار . الخ . مركب الجنود فيقرح المرادة ويغسل شبيهه على الاوعية



فتجة

وتدية غليظة مأكولة إنما يزرع خاصة من أجل خربلاته البغلة المأكولة التي تجنى كاللوبيا الخضراء قبل دخولها في طور الادراك.

٢٠٤٥٣ - فجل برّي * ، فُجيلة

Raphanus raphanistrum (S). Radis sauvage, Rave-luche (F). Wild radish, White charlock (E). Hedrich Reticul, Wilder Reticul (D). Rafano raphanistro, Rafano salvatico (I).

نوع من الفجل البري المبدول زيت في جميع الأبرية والأماكن وهو إذا كثر في الزروع والحقول، ويمتد من النباتات الضارة الواجب إبادتها || وهو أيضاً من النباتات المرهوبة التي تتشظى النار .

٢٠٤٥٤ - فجل حار ، فجل أسود

Raphanus niger (S). Radis noir, Rave noire (F). Black radish (E). Schwarzer Rettich (D). Rafanistro negro (I).

نوع من الفجل شروبه عديدة بعضها زراعي شائع الاستعمال جنوره غليظة مستطيلة حارقة الطعم قشورها أل الجلوة البنفسجية السوداء . وهي مفيدة لاد الحفر || زيت بزوره يتحل بمخامس زيت الفجل نفسه .

٢٠٤٥٥ - فجل زراعي *

Raphanus sativus (S). Radia cultivé (F). Common cultivated radish (E). Garten Rettich, Rettig, Radies (D). Rafano, Ramolaccio, Ravanello (I).

نوع من الفجل شروبه كثيرة العدد . جميعها مأكولة الجنور المختلفة الاشكال والاحجام والالوان . وهو من النباتات السريعة النمو . بعض شروبه تدرك بعدة ثلاثة اسابيع من بزرها || يرغب في الأبرية البدائية ، اللينة ، القليلة الاندماج || وهو مشهور بمخامسه النافعة . جنوره وارواقه تقوي المعدة وتدر البول وتنشط لبن المرشحات وتزيد قدره . زيت بزوره يدهي تخمجة وهو ينفع من حصوات المرارة .

٢٠٤٥٦ - فجل ياباني * ، ديكون

Raphanus acanthiformis, R. macropoda (S). Daikons (F). Daikons (E).

نوع من الفجل الزراعي المأكول . مهدد اليابان . شروبه كثيرة العدد مختلفة الاشكال والاحجام والالوان . تكثر فيها الاستعمال . جنوره بعض شروبه تدرك من ٥٠ الى ١٠٠ سم . وروثها يراوح بين ٤ و ١٥ كيلو .

٢٠٤٥٧ - فجل آسيوي *

Feijoa (S).

Feijoa (F). Feijoa (E).

شجرة معمرة من فصيلة الآسيات . مهدد بعض مناطق البرازيل . ساقها غراء فناء ، ترتفع من ٣ الى ٦ أمتار . اوراقها أبيض ، صغيرة اللد ، أشبه الشكل ، لامة الصفحات العليا ، باحة السفلى . ازهارها محورية الاوتكاز فردية . فصلها وبثلاثها وأسدتها حراء اللون . مخامرها عتيبة بيضية الشكل ، فسنتقية اللون ، حامية الب ، مأكولة . لحمها قريب الشبه بالشليك (الفريز) || تنموها صيفي ،

٢٠٤٥٨ - فجلوة

Vacuo

النزعة في الورقة أي البروتولايته .

٢٠٤٥٩ - فجليلة الشط * ، بئيس الشط ، رشاد البحر

Bunias kakile (S).

Bunlade kakile, Roquette de mer (F). Common sea

ناشرة ، نحو ١٥ ، تلحقها خمس أو ست قنابات حلالية الشكل ، باحة الخضار .

٢٠٤٤١ - تفصيل منفي الورق *

Fochergilla minifolia (S). Fochergille à feuilles d'aune (F).

نوع من التفصيل . منته بعض مناطق أمريكا الشمالية . ساقه ترتفع من متر الى مترين . اوراقه قريبة الشبه بأوراق اللثث تطول من ٤ الى ٨ سم . وتعرض من ٢ الى ٥ سم . ناعما كثيفة الزغب على الصفحات العليا ، خلية الصفحات السفلى . ساقها ازهرية تطول نحو ٣ سم . ازهارها يضاء اللون ، عطرية العرف ، سرسة لا طوق لها .

٢٠٤٤٢ - فليدة *

Cleistogame (F).

Cleistogamous (E).

نمت تفريفي يطلق على الزهرة التي بدلاً من أن يفتح كما للانصباغ ، يتحول الى جراب أجوف مغلق يضم الحليل واللقطة تأمينا للانصباغ .

٢٠٤٤٣ - فج

Gorge (F).

لفج هو حق كاس الزهرة ج . فجاج .

٢٠٤٤٤ - فج

الفج من الفجر ، ما لم يفتح . الفجر كلها فجة من حين فتحها حتى تفسحها .

٢٠٤٤٥ - فج

Mutation

كل تبدل فيمالي يحصل في الانتقال الوراثي لصفات نوع أو ضرب من النبات .

٢٠٤٤٦ - فجل قطبي

Aurore boréale, A. australe (F). Polar light (E).

٢٠٤٤٧ - فجلوم

Noix (F). Walnut (E).

الجرم : الجوز الذي يؤكل .

٢٠٤٤٨ - فجل

Raphanus (S).

Radis (F). Radish (E).

جنس نباتات عشبية من الهضبات وفصيلة الصليبيات انوازه المعروفة ست منها المناطق المعتدلة . منها البرية والزراعية والحولية والحدوة . جلورها غليظة عديدة الاشكال . سيقانها منتصبه فرعاء . اوراقها متعاقبة مستطيلة مسننة الحافة . السفلية منها مشبهة الغريش والتشريح . ازهارها عتدية للتجميع هامة أو ناصية الاوتكاز ، صفيرة اللد ، يضاء اللون أو صفراء أو بنفسجية . مخامرها خربيات مستطيلة منطقة . بزورها كروية || أشهر انواعها ما يتبع .

٢٠٤٤٩ - فجل أسود

هو الفجل الحار ، اطليه .

٢٠٤٥٠ - فجل الجيمال

Sisymbre, Vêlar (F).

هو البسيرة ، الحلبا .

٢٠٤٥١ - فجل الخيل

هو المهيان ، اطليه .

٢٠٤٥٢ - فجل الهند * ، فجل جاكوا ، صفري *

Raphanus caudatus (S). Radis serpent, Mougri (F).

Snake radish, Mougri (E).

نوع من الفجل الزراعي البقل مهدد جاكوا والهند اقلية عند مو شاطئ البحر حتى ارتفاع ٥٠٠٠ م || جنوره



تفصيل منفي الورق



فجل الهند



فجل بري



فجل زراعي



فجل ياباني



فجيلة الشط

Charbon de bois (F).
Charcoal (E).

الفحم النباتي أو فحم الخشب هو الخشب المحروق بمعدل من الهواء . يتم ذلك بالمشعة .

Erwinia atroideae

٢٠٤٧٢ - قَحْمَةُ السَّاقِ

وصم بكتيري شديد العدوى ينشأ فرونيته سقولية ، الخلبا .

Sphacelotheca

٢٠٤٧٣ - قَحْمِيَّةٌ ٥

جنس فطور مجهرية طفيلية من فصيلة الراهوريات تتميز بحلو حبيها المائل من الأريقات البارزة || أنواعه عديدة جميعها مؤذية تصيب التنبيلات اشهرها ما يلي .

٢٠٤٧٤ - قَحْمِيَّةُ الدَّخَنِ ٥

Sphacelotheca holci-sorghii, S. raillana, Ustilago holci-sorghii, U. raillana, Sorosporium raillanum (S).
فطر مجهرى يصيب ازهار الذرة والذخن على اختلاف انواعهما || مظهره الخارجى كحل خيطية بوفية تنشئ المتكون من زائداته دون أن تقرب من الاغشية الزهرية . صفته البريى سريع الانحلال . يورقات سمر اللون ، كروية الشكل ، خشكة البشرة ، قطرها براوح بين ٨ و ١٢ م . || يكافح مكافحة فمعية الذرة .

٢٠٤٧٥ - قَحْمِيَّةُ الذَّرَّةِ ٥

Sphacelotheca sorghi, Ustilago sorghi, Sporisorium sorghi (S). Charbon couvert du sorgho (F). Covered smut of sorghum (E).

فطر طفيل مجهرى يصيب المطر والمتكون فؤذجا ويصطب الازهار ويمنعها من البعد || مظهره الخارجى يتور بوفية لونها الى القلرة ، يبيض القاعد ، حشلية القمة ، سماء البشرة تنفلق من غيرات كروية لونها الى السرة للقائمة . يكافح يتغير البذر بمسحوق كربونات النحاس او سلفات النحاس .

٢٠٤٧٦ - قَحْمِيَّةُ الزَّهْرِ ٥

Sphacelotheca cruenta, Ustilago cruenta (S).

فطر مجهرى يصيب الزهر فيقضي عليه . يتمز اولاً بصفته البريى الكتلوي الشكل السريع الانحلال . ثانياً بقرويه الفمعية المستطيلة التي تتركب جميع اغشية الزهر مع زائدات وراشات وسمايل المتكون . ثالثاً بأورقاته المغطاة القائمة على سن البونيات بهد تحويلها الى بؤر بوفية || وهو من الاوصاف المصودة الانتشار على كثة اذاها لانها تتطلب العديد من العوامل البيئية المواتية || يكافح مكافحة فمعية الذرة .

Symptôme (F).
Symptom (E).

٢٠٤٧٧ - قَحْنٌ ٥ ، عَرَضٌ

ج فوألن وأعراض .

٢٠٤٧٨ - قَحْوَةٌ

هي الشقران الاسود ، وصم فطرى يصيب الكربة .

٢٠٤٧٩ - قَحِيجٌ

فحج الامنى : صوباً من فيها وكشيش الامنى صوباً من جيلها .

rocket (E). Echter Meersenf (D). Baccheroni, Ravastrello maritimo (I).

نوع من البنباس وهي عشية حولية يقال انها طيبة منها دبال الشطوط البحرية والبرية . جلوريا سترابية وتدية . سوقها وقروها ذباب . اوراتها خلية البشرة . ازهارها صغيرة القد ، يضاء اللون . وهي عشية مرصوة متوسطة المادة اللدائية تنشط الدار .

Spadice (F). Spadix (E).

٢٠٤٦٠ - قَحَالٌ

هو ذكر النخل خاصة ينبغ به سولمها . ج . فصاحيل .

Symptomatologie (F).

Symptomatology (E).

الشفاعة علم يبحث في امراض الامراض .

Test

٢٠٤٦١ - قَحْصٌ

Analyse du sol (F).

٢٠٤٦٢ - قَحْصُ التُّرْبَةِ

راجع تحليل التربة .

Fossette (F). Small cavity (E).

٢٠٤٦٤ - قَحْصَةٌ

الفصصة ثلمة صغيرة تكون في بعض الجيوب والبلور . والنفرة المصودة عند رباط الاصداف البحرية من فوات الصراعين تدعى ايضاً فصصة . ج . فصاص .

٢٠٤٦٥ - قَحْمِيَّةُ مَرَجَانِيَّةٍ ٥

Embothrium coccineum (S). Embothrie écarlate (F).

جنبة ترينية معمرة من فصيلة الفصليات . صلتها منصبة فراع تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . افنانها حوشية الباه . اوراتها بسلية ، متعاقبة ، متفكة ، قصيرة الزناد . نصلها اطيالبي الشكل لامع الصفحة املبا باحت السفل . ازهارها عشوية التجميع ، ثنائية الترتيب ، تاجسية الارتكاز ، حراء اللون || ازهارها يشتر من تموز الى آب .

Etalon (F). Stallion (E).

٢٠٤٦٦ - قَحْلٌ

الذكر من كل حيوان . ج . فحول وفحول وفحالة وفحولة .

Carbonizer (F). To carbonize (E).

٢٠٤٦٧ - قَحْمٌ

حول الشيء الى فحم .

Charbon (F). Coal (E).

٢٠٤٦٨ - قَحْمٌ

اسم شامل يطلق على بعض مركبات الكربون غير المتبلور . اشهر انواعه الحجرى والنباتى .

٢٠٤٦٩ - قَحْمُ المَطَامِ

Noir animal, Charbon d'os (F). Bone-black, Animal charcoal (E).

سماد فسفوري يحصل من حرق العظام بطريقة خاصة .

Houille (F).

Coal, Pit-coal (E).

٢٠٤٧٠ - قَحْمٌ حَجَرِيٌّ

مادة معدنية سوداء اللون تستخرج من الارض كتمتبل وقوداً . انواعها متعددة تختلف باختلاف نسبة الكربون التي تحويها .



فمعية مرجانية



فمعية الدخن



فمعية الذرة



فمعية الزهر

٢٠٤٩٢ - فِدَادَة كَالِحَة * *Ula nebulosa* (S).

Chouette nébuleuse (F).
طائر من الفداد كبير الجثة طوله نحو ٦٠ سم. موطنه أمريكا الشمالية، يأوى إلى الإسراج الكثيفة، يصيد الجرذ والقار والارانب والسناجب والصفادع والأسماك.

٢٠٤٩٤ - فِدَادَة *Grenouille* (F).
هي الضفدع، أطليه.

٢٠٤٩٥ - فِدَادَات *Ululens* (F).
عمارة من فصيلة الببويات تشمل ثمانية اجناس: الخيم والخليل والصدى والضوح والفداد والنهام والمرفع والمرد.

٢٠٤٩٦ - فِدَار *Concassee* (F). *Breaker* (E).

٢٠٤٩٧ - فِدَارَة * *Pratie* (S).

Pratie (F). *Pratie* (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة اللوبيليات، ساقها منتصبية أو مستقيمة، أوراقها متعاقبة، متعاقبة، أزهارها عويزية الارتكاز، فردية، مستقيمة المالحق، ثمارها عينية متباعدة الخصب يكثر نيسا الآخر || أنواعها المروقة قليلة العدد، أشهرها التالية.

٢٠٤٩٨ - فِدَارَة ضَخْمَة التَسْنِين * *Pratie macodon* (S). *Pratie à grosses dents* (F).

نوع من الفداد، ساقها قصيرة منتصبية فراء، أوراقها صغيرة مسطوية الشكل، شبه لحمية النصال، غسفة التسنين اختاري، أزهارها حلزونية العرف، قصيرة المالحق، صفراء اللون، قطرها نحو ٣ سم، || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف.

٢٠٤٩٩ - فِدَارَة قُرْمَة * *Pratie perpusilla* (S).

Pratie naina (F).
نوع من الفداد، ساقها جذعة، أوراقها شديدة الصغر، أزهارها مستطيلة المالحق، صغيرة القد، بيضاء اللون، تخليق التويجات || تنويرها من حزيران إلى تموز.

٢٠٥٠٠ - فِدَارَة مَحْرَسَة * *Pratie angulata* (S). *Pratie anguleuse* (F).

نوع من الفداد، ساقها محرسه فراء تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقها متعاقبة، بيضية الشكل، نصلها مزرقية البشرة، أزهارها مستطيلة المالحق، بيضاء اللون، مرققة بالآخر، ثمارها عينية حراء اللون || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف.

٢٠٥٠١ - فِدَارَة مَدَادَة * *Pratie repans* (S).

Pratie rampante (F).
نوع من الفداد، ساقها مدادة زائفة، أوراقها مستطيلة الاعتناق التي يتجاوز طولها طول النصال، نصلها شبه قلبية الشكل، عمادة التسنين، أزهارها مستطيلة المالحق، بيضاء اللون، مشيرة بالنفسني، ثمارها عينية مرجانية || تنويرها يستمر من حزيران إلى تشرين الأول.

٢٠٥٠٢ - فِدَام *Chausse* (F). *Filter* (E).

مصفاة تمر بها السوائل لتفقي

٢٠٥٠٣ - فِدَان *Bœufs de travail*, *Bœufs de labour* (F). *Oxen* (E).

الفدان هما الثوران اللذان يقدن جليهما، ج. قَدَن وأندنة.

٢٠٤٩٠ - فَحِيل *Raceur* (F). *Thorough* (E).

نمت تعريف يطلق على الحيوان الذي يطلع في القتل صفاته ذكراً كان أو أنثى.

٢٠٤٩١ - فَنَج *Happeau* (F). *Snare* (E).

أداة تصاد بها الطيور والقوارض.

٢٠٤٩٢ - فَنَاز *Clarcé de la lune* (F).

الفتح هو ضوء القمر.

٢٠٤٩٤ - فَنَد *Cuisse* (F). *Thigh* (E).

عضو من أعضاء الجسم الحيواني، وما فندان، ج. اخذ.

٢٠٤٩٥ - فَنَد الدَّب *Volume*

نجم من كوكبة الدب الأكبر.

٢٠٤٩٦ - فَنَد التَّلُوج *Volume*

الفداد، ج. حسم الشيء.

٢٠٤٩٨ - فَنَدَام *Oton*

الاندام حبيب الحظلة لا تزال صساتها حائلة بها وتكون غالباً محبوب نجلية أو صديقة.

٢٠٤٩٩ - فَنَدَام *Grenier* (F). *Granary*, *Store-house* (E).

هو التابار، أطليه.

٢٠٤٩٠ - فَنَاد *Chouettes* (F).

Screech-owls, *Barn-owls* (E).
جنس طير من الببويات وحصارة الفداديات، أنواعه عديدة جميعها من الرؤاس الكواسر. كبيرة القد، خفيفة الرأس، عريضة الحصر المستدير، قوية المنسر، اقربها إلى البصرة الموحدة طولها ورقفة صغيرة البقعة وبعض التباذيع، قوته القاربات على اختلافها والصفادع والمطام... ينس في تجاريف الأشجار القديمة المهدور في الأكرار الكبيرة المروكة. أناته تبيض مرة واحدة في العام، حفتها تراوح بين ٤ و ٦ بيضات || أشهر أنواعه الثلاثة التالية.

٢٠٤٩١ - فَنَادَة الشَّرَق * *Ula noctua* (S).

Chouette chevêche (F).
طائر من الفداد اصطناعه نسخة الإرجاء تمتد من الصين إلى أطراف أوروبا ومن حضايا إفريقيا الشرقية وبرتغيات التيونية إلى تمام مراكشي القديمة أو في الأكرار الكبيرة المروكة. ٤٠ سم. يأوى إلى الإسراج والخواب، مسرعه يدوم من القسق إلى الفجر، يصيد الجرذ والقار والمطام والصفادع وجميع أنواع الحشرات والديدان.

٢٠٤٩٢ - فَنَادَة الشَّيَال *Ula lapponica* (S).

Chouette lapone (F).
طائر من الفداد كبير الجثة طوله نحو ٧٠ سم. يأوى إلى إسراج البلاد الباردة لخصها الشمالية || وهو يلي الطيران لا يصف عن شيء يمكن منه وقد يقتصر السناجب والقوارض.



فِدَادَة الشَّرَق.



فِدَادَة الشَّيَال



فِدَادَة كَالِحَة

٢٠٥٠٤ - قَدَر

Chmolis (F).

الفرد والفرد هو السموة. ج. فطور وفرد.

٢٠٥٠٥ - قَدَر

Conasser (F).

To bruise, To crush (E).

فَدَر الحجابة : كسرهما صفاراً .

٢٠٥٠٦ - فُلَس

Araignée (F).

هو العنكبوت. ج. فسة .

٢٠٥٠٧ - فُلَس الماسكن ، عَنكَبُوت المازول

Tegenaria domestica (S). Tégénale domestique,

Araignée domestique (F). House-spider (E).

نوع من العناكب الساعية المترتبة القانصة ثنائية الروايا سداسية المشاتين ينتمي الى فصيلة العنكبوتيات || جسمه صلب. القد بطول نحو ٨ سم. عند الذكر ونحو ١١ سم. عند الانثى. صدره معدن الجرم لونه ال الصعرة الحمراء المالح. صبا زهيتان. شيفاه صبتان ذريان. فكاه دقيقتان صمجان. جرمه نملة كثيفة الحلب. بطة افير اللون تملو بعض الزراكش والنمط || يأن الماسكن المأولة والمرايب. قوته الحشرات الصغيرة والذباب والوطام. يتربس لها في حده ويسى اليها ركضاً وقفزاً. حبه كبير القد، اقني السطح، قمي المركز، يقبه في الزوايا يلجأ اليه في النهار ويسرح في الليل || يأنه لشعري يستمر نحو ١٧ اسبوعاً يقفها في مكانة بطولية الشكل ينسجها في شقوق الخيطات او تحت الاخشاب وبيتها || يعيش نحو ثلاث سنوات. ملجته الحياتي لا يختلف من ملجن غيره من العناكب || يعتبر من الدواب النافعة اللائمة.

٢٠٥٠٨ - قَدَش

Araignée (female) (F).

Spider (female) (E).

الفدش انثى العناكب (كراغ) .

٢٠٥٠٩ - قَدَح

Distorsion (F). Distorsion (E).

الفدح انتواء بطراً على عضو من الجسم او على قسم منه .

٢٠٥١٠ - قَدَحَم

الفدحَم القدم : البتل الكثير الماء .

٢٠٥١١ - قَدَن

Niveler (F). To level (E).

قَدَن : مَهْد .

يسط الارض ويصلاها .

٢٠٥١٢ - قَرَأ

Onagre (F). Onager (E).

مَرَّة من الحمر الوحشية حديثة الانواع تتميز باذنانها النقية واذانها الصغيرة واعرافها القصيرة السبب المنتصب وسوارفها القليلة الاستدارة || اصطلحوا بعض فياني وجبال العالم القديم . تميش جامات. ارباعها لاقية يراوح عدد افرادها بين ٥ و ٢٠ رأس الزلل فعل يقوده ويحبب الى ان يتنخل على امره فيتنسى . لعرف انواعه فراد التبت واهنت والفراد الاشوري .

٢٠٥١٣ - قَرَأ آشوري *

Equus hemippus (S). Hémippe, Onagre de Mésopotamie (F). Syrian wild ass (E).

نوع من الفراء ثوبه اللون موطنه يمتد من جبال ايران الى العراق السورية حتى تدمر . وهو متوسط القد يملو نحو ١١٥ سم. ويطول ٢٠٠ سم. بما في ذلك الذنب الذي يبلغ ٤٥ سم. رمله يراوح بين ٥ و ١٢ .

٢٠٥١٤ - قَرَأ التبت *

Equus hemionus (S). Hémione (F). Kiang (E).

نوع من الفراء موطنه التبت ويص فياني آسية الوسطى . وهو كبير الجنة يملو نحو ١٢٠ سم. ويطول ٢١٠ سم. بما في ذلك الذنب الذي يبلغ ٥٠ سم || رمله يراوح بين ٨ و ٢٠ .

٢٠٥١٥ - قَرَأ الهند ، قُولَان

Equus indicus (S).

Onagre de l'Inde, O. de Brisson, Koulan, Ghour,

Ghor-Khur (F).

نوع من الفراء موطنه الهند والافغان والتركستان وبران وهو متوسط القد حجمه حرم الفراء الاشوري الا انه افصح ثوباً واعرض ثوباً واطول اذنأ || عدد رمله يراوح بين ٨ و ١٥ .

٢٠٥١٦ - قَرَأَل

ما في كرش الحيوان من القرش .

٢٠٥١٧ - قَرَاَج

هو الفرقة نبات منقي ، اطليه .

٢٠٥١٨ - قَرَاَج ، قُرَاد

Cépea (F).

Tuft of shoots (E).

جاء التلامي الي تفرخ حول اربعة الشجرة المقطوعة .

٢٠٥١٩ - قَرَادَة

هي العائقة ، اطليه .

٢٠٥٢٠ - قَرَوَر

وله لتسبة والماء وقبرة .

٢٠٥٢١ - قَرَارِيَة *

Ferraria (S).

Ferraria (F). Tiger flower (E). Tigerblume (D).

Gladole indienne (I).

جنس نباتات دوفسية من فصيلة السوسنيات انواعه قليلة جميعها زينة. سوقها طرية . اوراقها لاجعة زاهية الخضار مشربة اخضر بالاحمر والبي . انماها جملة الشكل كبيرة القد ثمرة موشحة لكها سريمة القليل اما اصنفها فندغة صماتها كبيرة وهدبة || يستخرج من دوائها مادة صمغية حريفة تستعمل في الطب || اشهر انواعها مايلي .

٢٠٥٢٢ - قَرَارِيَة صَوْدَاك

Ferraria atrata (S).

Ferraria noirâtre (F).

نوع من القرارية السورية صماتها تملو نحو ١٥ سم. انماها الى الحرة الابروانية النيرة اللبنة الاصفر والاصفر || انماها يستمر من آذار الى نيسان .

٢٠٥٢٣ - قَرَارِيَة مَسْمُوجَة

Ferraria undulata (S). Ferraria ondulée (F).

نوع من القرارية البروتية . صماتها تملو الى ٢٠ سم. انماها الى الخضار الاصفر تملو رقة جزوة بتلاتها مياوية النصل . مقطوعة الاطراف || انماها يستمر من آذار الى نيسان .

٢٠٥٢٤ - قَرَارَا

Ecrémeuse (F). Separator (E).

آلة تفرز الكتانة من الحليب مع بديل القوة الشابة .

٢٠٥٢٥ - قَرَا سَة

Equitation (F).

Horsemanship, Riding (E).

هو فن استقاء الخيل .

٢٠٥٢٦ - قَرَا سَة الجَو

Prévision du temps (F).

Prévision from time (E).

هو تشخيص الجو .

٢٠٥٢٧ - قَرَا سِي كِي ن

هو اليبون الهندي ، اطليه .



فلس الماسكن



فراء آشوري



فراء التبت



قَرَارِيَة

٢٠٥٣٣ - قراقشة (F). *Papillon* (F). *Butterfly*, *Moth* (E).
اسم شامل يطلق حل جميع الحشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة، وبهم من خصص الاسم بحشرات الفصيلة القراقشية دون سواها.

٢٠٥٣٤ - قراقشة الحصيد (F). *Noctuelle des moissons*
هي غشقة الحصيد، اطبا.

٢٠٥٣٥ - قراقشة الحنطة (F). *Noctuelle du blé*
هي غشقة القمح، اطبا.

٢٠٥٣٦ - قراقشة الزعرور
هي كرنيبة الزعرور، اطبا.

٢٠٥٣٧ - قراقشة السمسم
Antigaster catalanalis (S). راجع دودة السمسم.

٢٠٥٣٨ - قراقشة التفافيد (F).
هي غشقة الكربة، اطبا.

٢٠٥٣٩ - قراقشة اللث (F).
هي كرنيبة اللث، اطبا.

٢٠٥٤٠ - قراقشة الملفوف (F). *Noctuelle du chou*
هي كرنيبة الملفوف، اطبا.

٢٠٥٤١ - قراقشة جوارك القطن (F). *Earias insulana*
هي دودة القطن الشوكية، اطبا.

٢٠٥٤٢ - قراقشيات (S). *Papilionidae* (F). *Papilionidae*, *Swallowtails* (E). *Ritter* (D).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة، صولجانايات القرن، اجناسها وانواعها كثيرة الممد منتشرة في جميع اصقاع العالم.

٢٠٥٤٣ - قراقشية (S). *Papilionaceae* (F). *Papilionaceae* (E).

سبط من فصيلة القراقشيات اجناسه نحو ٣٠٠ منها الاشجار والجنبايات والمثلثات والاعشاب الحولية والمعمرة، معظمها زراعي غذائي او علقي وصناعي.

٢٠٥٤٤ - قراط (S). *Coregonus fers* (S). *Féra*, *Férat*, *Ferrat* (F).

سمكة ثورية من السلمونيات. اصطناعها بمجرات صوبيرا وإيطاليا الشمالية وقد انتشرت تربيتها في الاخوار والاضواض للصنعية المصنقة الثور. جسمها بطول نحو ٥٠ سم. ثوبها الى السمرة الخطية الخضراء المولج. يعطها الى الثيرة البيضاء. لحمها جيد الصنف مرغوب فيه كسالم الثور.

٢٠٥٤٥ - قراغ، قُغرة، قَجْوَة (F). *Lacuna* (F). *Lacuna*, *Air-cell* (E).

كل قراغ في النسيج النباتية.

٢٠٥٤٦ - قراغ حَجْرِي (F). *Vacuome*
هو في النسيج الحية جيوب دقيقة خالية من الهواء.

٢٠٥٤٧ - قراغي (F). *Lacuneux* (F). *Lacuneux* (E).
نعت تعريفي يطلق على النسيج النباتية التي يتخلل خلاياها فراغات مليئة بالهواء او بغيره من السوائل المختلفة. يقال نسيج قراغي.

٢٠٥٤٨ - قراسيون، بَادَاوَرْد (S). *Marrubium* (S). *Marruba* (F). *Horehound* (E).

جنس نباتات عشبية برية طيبة حمرة من فصيلة الشفويات. انواعه عديدة جميعها حطرية تتميز برعها الصواع القريب لثبه من اللسك. سرقها فراء غشوية مزقية. اوراقها متعابلة متفحة بيضا. فصلا كثيرة اللوق، متجمعة الصفحة الخطية البشرة، مسنة الحار. ازهارها صغيرة اللة، ضمية التجميع. محورية الانتكاك || اعرف انواعه مائي.

٢٠٥٤٩ - قراسيون ابيض * **حشيشة الكلب، قلبه، مقل الصنف**

Marrubium vulgare (S). *Marrube commun*, *M. blanc* (F). *Common white horehound* (E). *Maurandom*, *Weisse Andorn* (D). *Marrubio comune*, *Marrubio*, *Mentastro*, *Erba apiola*, *Prasline* (I).

نوع من القراسيون وهو عشبة مبلولة تنبت في الاراضي البور وعلى جوانب الطرقات. تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم. ساقها فراء كثيفة الزغب الابيض. اوراقها صغيرة اللة، بيضا الشكل، سمكة التصل الحشن. ازهارها الى البياض الاخير || وهو قوي الرائحة المرصبة، مر، حريف، لاذع وقايش. يدر البول ويخفف الحرارة ويفيد التشنج ويسمى حالات السعال.

٢٠٥٥٠ - قراسيون اسود * **بَلَوَط الارض**

Ballota nigra (S). *Ballota fetida*, *B. noire*, *Marrube noir* (F). *Fœtid-horehound*, *Black horehound* (E). *Schwarze Bulle*, *Fenweibel*, *Zahnlose* (D). *Marrubio bastardo*, *M. nero*, *Ballota fetida* (I).

نبات عشبي طيب ري من فصيلة الشفويات سطري الرائحة القوية، يدر البول ويطرد الودم ويزيل الحامض البولي ويفيد التشنج || ساقه فراء. اوراقها متعابلة، اهليجية، صغيرة اللة، فصلا شثن الصفحة، مسن الحافة. ازهاره دقيقة متطيلة ضمية التجميع، محورية الانتكاك لونها الى الجوزة.

٢٠٥٥١ - قراسيون القلب * **بَكَلَة الامهات**

Leonurus cardiaca (S). *Léonure cardiaire*, *Agripaume*, *Cardiaque* (F). *Common mother-wort* (E). *Echtes Herzenspenn* (D). *Cardiaca*, *Leonuro*, *Melissa salvatica* (I).

عشبة برية طيبة مبلولة من فصيلة الشفويات. ساقها تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها متفحة متعابلة، فصلها مفرض الصفحة شديد الغضار. ازهارها صغيرة اللة، ضمية التجميع، محورية الانتكاك لونها الى الحمرية تملوها رقة بيضاء || كان ولا يزال يستعمل في علاج امراض القلب عند الاطفال وبهم من قال ان مثل لقيه يشفي الكلب.

٢٠٥٥٢ - قراسيون مائي *

Lycopus (S). *Lycopo*, *Marrube aquatique*, *Pied-de-loup* (F). *Gipsywort*, *Water horehound* (E). *Gemeiner Wolfstrapp* (D). *Licopo*, *Marrubio aquatico*, *Erba sega* (I).

نبات عشبي طيب ري معمر من فصيلة الشفويات يكثر في الشائع والمواقع الرطبة. ساقه فراء. اوراقه متعابلة، لائفة، سنائية، تصاها منشاري الحناجر، خلى البشرة. ازهارها بيضاء اللون، صغيرة اللة، ضمية التجميع، محورية الانتكاك || يقال انه يطر الجرب ويسلمها وهو حريف لاذع يستعمل في التخفيف الاسود.



قراسيون ابيض



قراسيون اسود



قراسيون القلب



قراسيون مائي



قراغ

اينس الختار || ازهره خبي الشكل ثلاثي الاعزام
يستمر من ايار الى تشرين الاول .

٢٠٥١٨ - فَرَاقِيَّة ٥. *Vacume (F). Vacum (E).*
الفَرَاقِيَّة مذهب فلسفي حكيم قديم الهند يقول بان الفراغ
موجود في الطبيعة .



فَراَمباز

٢٠٥١٩ - فَرِيُونِ الْأَقْدَمِينَ ٥ ، يَتَوَحَّ هِنْدِي
وَكُوم هِنْدِي

Euphorbia antiquorum (S). Euphorbe des anciens (F). Ancient milk-wort (E). Wollmilchder alten (D).
Euforbio indiano, E. triangolato (I).

نوع من الفريون البري الطبي المعمّر كان يستعمل في الماضي لعدة علاجات اخصها الاستسقاء والطحال وهو يستعمل الآن في الطب البيطري لانه سهل حنيف لا يتخلو من السموم القاتلة .

٢٠٥١٩ - فَرَاقِيَّة شجر تحمل منه الرجال (السان) .

٢٠٥٢٠ - فَرَامباز ٥ ، عَوْسَجْ رِنْدَه ٥ ، عَوْسَجْ جَوِي
Rubus idaeus (S). Framboisier (F). Red raspberry, Raspberry-bush (E). Echter Himbeersruch (D). Lampine, Lampona, Rovo idao, Mora prugnola (I).
جنية مشمرة من جنس المليق وفصيلة الورديات . اوربها ممرّة . سوطها متعصبة عمولة شائكة . اوراقها مركبة متعاقبة . وريقاتها لاقامية المدد الذي يراوح من ٢ الى ٥ نصالها بارزة الفروق سفنة الحافة ، مزينة الصلصلة السفلى . ازهارها متعددية التجميع ، محورية الاذنكاز ، مستطيلة المالبق ، يضاء اللون ، غمارها شاميل جزوية اللون او بنفسجية مابقة . وهي مأكولة مستحبة العلم تعتبر من المرطبات اللذيذة || زراعتها تقوم في المرق نفسه من ١٠ الى ١٢ سنة . تتكاثر بالانماخ التي تفرس على ابعاد ينيّة تراوح بين ١٠٠ و ١٢٠ سم . وابعاد مستطلة تراوح بين ١٢٠ و ٢٤٠ سم . وهي رطب في الاربة الحربية القليلة الانماخ وفي المواقف الظليلة الرطبة .



فَرِيُونِ الْأَقْدَمِينَ

٢٠٥٦١ - فَرِيُونِ الْقَمَجَر ٥ ، يَتَوَحَّ السُّعُورَه
رُغَادَه

Euphorbia helioscopia (S). Euphorbe héliscopie, Réveil matin, Herbe aux verrues (F). Sun spurge, Wort-grass, Wort-Wort (E). Sonnenwollmilch (D). Euforbio mirasole, Rogna, Titimalo elioscopio (I).

نوع من الفريون البروتي البري الطبي المعمّر . يقال ان ضياد اوراقه او مصارته يقتضي حل التآكل .

٢٠٥٥١ - فَرَامبازَه ٥ ، مَصَمَكَة
Framboise (F). Raspberry (E).
ثمرة الفَراَمباز وهي غنية بالفيتامين « ث » للثة غرام من ثلبها المأكول يحوي من ٢٠ الى ٢٥ مغ . فيتامين « ث » .

٢٠٥٥٢ - فَرَان ٥
Fournier (F).
هو الفران من الطيور الامريكية ، اطلبه .

٢٠٥٥٣ - فَرَاقِي شجر الجبر ، اطلبه .

٢٠٥٥٤ - فَرَاقِيَة
Fraise (F).
هي الشيكه ، اطلبه .

٢٠٥٥٥ - فَرَاقِيَات
سيط من فصيلة الورديات يعرف بالثليكيات .

٢٠٥٥٦ - فَرَاقِيَة
Callis (F). Quail (E).
ولحدة الفري اي الساق .

٢٠٥٥٧ - فَرِيُون ، يَتَوَحَّ ، تَاكَوْت ، عُنْجُد
Euphorbia (S). Euphorbe (F). Spurge, Devil's milk (E). Wollmilch (D). Euforbio, Titimalo (I).

جنس نباتات برية ورتيية من فصيلة الفريونيات . ازهاره نحو ١٦٠٠ منها الحولية والممرّة ومنها الشبيهة والقيغية واخشوشة والاحميه الاوراق كالعصار || اصطناعها البلاد الحارة . جميعها دماة لبنة المصارّة . معظمها طلي جحالي للمادة || اعرف ازهاره ما يتبع .

٢٠٥٥٨ - فَرِيُونِ اَيْبَسْ اِتْوَلِي
Euphorbia marginata, E. variegata (S). Euphorbe marginée (F).

نوع من الفريون الحولي . ساقه متعصبه مزينة تقلم من ٦٠ الى ٩٠ سم . اوراقه الجاحية متعاقبة اما العليا والعامية فتصالبة وهي لائقة ؛ نصلها يضي الشكل ، ساج للصفحة ،

٢٠٥٦٤ - فَرِيُونِ رَائِع
Euphorbia fulgens (S). Euphorbe éclatante (F).

نوع من الفريون البروتي المعمّر . ساقه مخشوشة نجيله تعلق نحو ١٢٥ سم . اوراقه متعاقبة ، سفنة ، متدلية ، نصلها خبيق الصفحة يطول من ١٠ الى ١٥ سم . ويمرض نحو ٢ ، ازهاره محورية الاذنكاز كبيرة لتندد البتلية الشكل ، للمراء اللون || ازهره يستمر طوال الحريف .



فَرِيُونِ الْقَمَجَر

٢٠٥٧٧ - قَرْجِي، عَكْلِي، أَصْلِي

Congénital (F), Congenital (E).

تمت تعريف رادف الصفة الوراثية حسنة كانت أو سيئة .

٢٠٥٧٨ - قَرْجَانَة ، قَطْر الحَقْل (F).

جنس قطر مأخوذة من فصيلة الفاريقونيات . أشهر أنواعه الفاريقون المروي .

٢٠٥٧٩ - قَرْخ

ولد الطائر هذا الأصل وقد استعمل في كل صغير من الحيوانات والنبات والاشجار فمرة وجمع القلة أفرغ وأفرغ والكثرة فرخ .

٢٠٥٨٠ - قَرْخ ، بَقِيلَة ، وَكَوْة ، وَدَة ، حَنْب

Rejet, Rejeton (F).

Young shoot, Sprout, Offshoot (E).
الفرخ والنبلة والكركة والركلة والطلب والمروى قضبان تنشا من براعم عرضية على موضع ما من ساق الشجرة ولا سبل الاربعة المغطوة .

٢٠٥٨١ - قَرْخ * (F), Perche (E), Perca (S).

جنس اسمك من فصيلة القرشيات ورثة النطشيات الشائكات الزعانف . أنواعه عديدة جميعها من اسمك المياه العذبة تعيش في الأنهر والبحيرات والاحواض . طولها يراوح بين ٢٠ و ٤٠ سم . ألوانها تختلف مع فصول السنة ، يكثر فيها اللون الأخضر المذهب يملوه يتبع معروض اسم يحزم الطيور والاطل ويتهي عند البطن || عرف أنواعه وأشهرها :

الفرخ المذلول (F), Perche fluviatilis (S).

Commune (F), Common perch, European perch (E).

الفرخ الإيطالي (F), Perche d'Italia (S).

الفرخ التركستاني (F), Perca schrencki (S).

Perche du Turkestan (F).

الفرخ الكندي (F), Perca gracilis (S).

Perche du Canada (F).

٢٠٥٨٢ - قَرْخ لِيْلِي

Latès du Nil (F).

هو لاس النيل ، اطلبه .

٢٠٥٨٣ - قَرْخ البَطْ

Caneton (F).

الذكر من صغير البط .

٢٠٥٨٤ - قَرْخ التَحَلْ ، فِرْخ التَحَلْ

Essaim d'abeilles (F), Bee-swarm (E).

ثول من التحل هجر غليته لتسير خلية جديدة . والفرخ يتألف من ملكة وذكر وراملات .

٢٠٥٨٥ - قَرْخَة البَطْ (F), Canette (E).

الانثى من صغير البط .

٢٠٥٨٦ - قَرْخَة عَصِيْبَة

Poularde (F).

فرخة تخصي وتسمن . وتسمى ايضاً مغطوة .

٢٠٥٨٧ - قَرْخَة سُلْطَانِيَّة

Poule sultane (F).

هي البرهان السلطاني ، اطلبه .

٢٠٥٨٥ - قَرْيُون لَسِيْرُس * ، قَرْيُون

مُتَصَالِب ، حَبَّ المُلْكَة

Euphorbia lathyris (S), Euphorbe épurge, Eupurge, Catapuce, Catherinette (F), Capen-épurge, Myrde spurge, Wild caper (E), Springwolfsmilch (D), Catapuzza, Euforbio latiride, Gomitaria (I).

نوع من القريون وهو نبات لين يري حول يكثر في المروج الرطبة ويصير من النباتات الضارة || ساقه تملو من ٦٠ الى ١٥٠ سم . اورقه متعاقبة متصالية رباعية ، نصلها سناني الشكل وحيد الفلج . عادم اللون ، بحري اللون ، يطول من ٦ الى ١٢ سم . ويثمر نحو ٢ سم . ازمارده خيشي الشكل ، رباعي الاطراف القرقة ، يستمر من حزيران الى تموز .

٢٠٥٨٦ - قَرْيُون مَعْرُوسِي * ، شَعْرُوسِي عَمَقِي

Euphorbia officinarum (S), Euphorbia officinale, E. des apothicaires, E. de Juba (F), Poisonous gumthistle (E), Gebräuchliche wolfsmilch (D), Euforbio officinale, E. del spezieria (I).

نوع من القريون البري الطبي للممر . ساقه منتصب . عراحيبه منفصلة تلتص نحو ٨ سم . لونها الى الخضار الباهت . حمار ضلوعها قرني للمادة غير اللون || عصارته غزيرة المادة الجسالية الشائكة الإسهال الطبي .

٢٠٥٨٧ - قَرْيُون مَدَلِّي (S), Euphorbia pendula (E).

نوع من القريون السروتي للممر . ساقه منتصبه قراء . فروعه عراحيب اسطوانية دقيقة اسلية الشكل ، متدلية . نوصلها تطول نحو ٥ سم . اورقه حراشف لحمية مثلثة الزوايا ، بحرية اخضر ، متعاقبة الايتكاز .

٢٠٥٨٨ - قَرْيُونِيَّات ، يَتْرُوسِيَّات

Euphorbiaceae (S), Euphorbiacées (F).

Euphorbiaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . أنواعها نحو ٣٥٠٠ تنتمي الى ٢١٠ اجناس . جميعها من النباتات السامة للبيئة الضارة || اصنافها البلاد الحارة . معظمها بري وديسي وبعضها طبي وصناعي .

٢٠٥٨٩ - قَرْثُ السَّرِجِيْن ما دام في كرش الحيوان .

٢٠٥٩٠ - قَرْخ ، لَغْر (E), Vulva (F).

هو مجسمة الاضواء التناسلية الخارجية في انثى الحيوان يشمل الشفرين والثرنية وبالطارة والكنية .

٢٠٥٩١ - قَرْخ الأَرْضِ هو سورجان الجبل ، اطلبه .

٢٠٥٩٢ - قَرْجَاكِر

Compas

هو البركار ، اطلبه .

٢٠٥٩٣ - قَرْجَاكِرِي (E), En cercle (F), At circle (E).

نعت تعريفي توصف به الخطوط الدائرية .

٢٠٥٩٤ - قَرْجَمَة

Orific (F).

اطلب خفة .

٢٠٥٩٥ - قَرْجَمَة

Pansage (F), Grooming (E).

تنظيف جلد الحيوان بما عليه من اوساخ ولقار وفئار ...

٢٠٥٩٦ - قَرْجُون ، مَيْحَسَة

Etrille (F).

إداة من حديد تستعمل لتطيف جلد الحيوان .



فريون ليريس



فريون عذري



فرخ

والسمنية بين الكواكب . وهو يمداد المسافة التي يجتازها النور بمدة ٣٢٥٠٠٠٠ سنة .

Parade (F).

٢٠٦٢٥ - فرسكوس

كوكبية نجوم شالية الملقح تدعى سيوس .

Lieue, Parasange (F).

League, Parasang (E).

الفرسخ وحدة قياسية مسافة قدعة كانت تساوي في الماضي نحو ٤٠٠٠ م . وتساوي الآن نحو ٥٢٥٠ م .

Parsec (F), Parsec (E).

٢٠٦٢٢ - فرسخ فلكي

الفرسخ الفلكي وحدة قياسية اصطلاحية تستعمل لتقدير هن المسافات الفلكية . طولها نحو ٣,٢٥٦ سنة ضوئية .

Actinostemma (S).

Actinostemme (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القرصيات . مهدا بعض مناطق الشرق . سوقها عارضة ، جوائها مدرة . اورائها كفية الشكل . ازهارها وسيدة المسكن ، المشكة منها متفردة التجميع اما الملقية لفردية او ضمية التجميع . ثمارها اصوية الشكل . تافهة العلم ، تستعمل كحفظات لها نوحا معروفان .

٢٠٦٢٣ - فرسج

٢٠٦٢٤ - فرسج عثكوي

Actinostemma paniculatum (S).

Actinostemma paniculé (F).

نوع من الفرسج . ساقها عارضة تطول نحو اربعة امتار . اورائها كفية خاسية الفصوص الاصوية تطول نحو ١٥ سم وتعرض نحو ٧ سم . ازهارها عثكوي التجميع . ازهارها صفراء اللون . ثمارها اصوية الشكل مالة تطول نحو ٧ سم .

٢٠٦٢٥ - فرسج مقصص

Actinostemma lobatum (S).

Actinostemme lobé (F).

نوع من الفرسج . ساقها عارضة تطول نحو اربعة امتار . اورائها كفية ثلاثية او خاسية الفصوص تطول من ٦ الى ١٢ سم . وتعرض من ٤ الى ٨ سم . تصالها خلية المروق على المستعنين . ثمارها اصوية الشكل ، صغيرة القد ، تطول من ٢ الى ٤ سم . وتعرض من ١٥ الى ٢٥ سم .

Pêcher (F).

٢٠٦٢٦ - فرسك

هو الدراق ، اطلبه .

٢٠٦٢٧ - فرسين

الفرسين : طرف خف البعير والشاة . ج فراسن .

٢٠٦٢٨ - فرش

هو الشفنين الصجور ، اطلبه .

٢٠٦٢٩ - فرش الصبح

هو الشاة الخشة ، اطلها .

٢٠٦٣٠ - فرشاح

الارض الواسعة العريضة وقيل السحاب الذي لا مطر فيه .

٢٠٦٣١ - فرشة

Litière (F).

Stable-litter, Straw (E).

فراش من حشيش او قش او تبن وغيرها من المواد النباتية يفرش تحت الدواب في الاصطبلات لترقد عليه .

٢٠٦٠٩ - فرس البحر ، فرسك

Hippopotamus (S).

Hippopotame (F), Hippopotamus (E).

جنس حيوانات لبونة من ذوات الحوافر عظيمة القد ، مسكية الجلد ، ليس في جسمها شيء يشبه الفرس . رأسها وتوايه مشبه الغنافة والكبر . جسمها بالغ الضخامة ، عنقها وتوايها وذنبها قصيرة || مهدها البلاد الانريقية الحارة . تعيش في مياه الأنهار وتل سفانها . قبح الاغشاب .

٢٠٦١٠ - فرس السباق الانكليزي

Pur sang anglais (F), English blood-horse (E).

هو الفرس الانكليزي الاصيل يعتبر اجود سلالات غيول السباق .

Cheval barce (F).

African horse (E).

مصر من المياد القوية الشيطنة . مهدها بلاد المغرب . يقال انها سلالات مختلفة نتجت من تصالب الخيول العرب مع غيول المغرب الاصلية وذلك على اثر الفتح العربي .

Mante religieuse (F).

٢٠٦١٢ - فرس التبري

هي السروقة ، اطلها .

٢٠٦١٣ - فرس انكليزي اصيل ، فرس السباق

Pur sang anglais (F).

English blood-horse (E).

الفرس الانكليزي الاصيل او الخيول الكرم هو اسبق الخيل كافة . نشأ من اب عربي وام انكليزية واصبح صرماً صريماً معروفاً له كتب انسابه المفضوعة وله شهرة العالمية التي تنفي عن كل تعريف .

٢٠٦١٤ - فرس بوني ، بوني

Poney, Ponet (F).

Pony (E).

نعت تعريفي يطلق على كل جواد صغير لقد صغير الوزن .

٢٠٦١٥ - فرس حجاب

Cheval trotteur (F).

Trotter horse (E).

كل فرس ركض الخلب . والخيول الحجابة سلالات تميزت بهذا النوع من السير السريع الخاص .

Petit cheval (F).

Equuleus (E).

الفرس الصغير كوكبية نجوم شالية الملقح مشهورة باسم قطرة الفرس ، اطلها .

٢٠٦١٧ - فرس عربي اصيل

Pur sang arabe (F), Arabian blood-horse (E).

هو الفرس العربي الخيول الكرم وهو اقبل الخيل واجلها واسلمها الركوب || سلالاته المشهورة عديدة اصعبها كجيلات السجور والمقلاويات وام عرب و الشريعات والنبات والمعتقيات واهل ابيات والمجلف .

٢٠٦١٨ - فرساح

الفرساح : الارض الواسعة الواسعة . ج فراسح .

٢٠٦١٩ - فرساح

Mégaparsec (F).

Megaparsec (E).

الفرساح وحدة قياسية تستعمل في تحديد الابعاد الفضائية



فرس البحر



فرس عربي اصيل

انتار. هيكلها هيكَل اللّدار. اوراقها متنفقة مسطيلة الزناد
تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٢ الى ٣. نصلها
احلياني الشكل، ذلق الزّام الاخير || ازهارها وردية
او غريزية اللون. عناقيدها لينة قلبية من الاستدارة.
ازهارها يستمر من ايار الى آب.

Noyaux de basabumé (F).

Stone of bdellium tree (E).

٢٠٦٢٢ - فَرْص

الفرص : نوى اللّعل .

Mârier (F).

٢٠٦٢٣ - فَرْصَاد

هو التوت ، الملبه .

Mûriforme (F).

نمت وصني ترف به الاشكال الشبيهة بشاميل التوت .

Pâpin de raisin (F).

Grape-stone (E).

٢٠٦٢٥ - فَرْصِيد ، فَرْصِيد

الفرصيد والفرصيد : حجم العنب والزيبيب .

Acineux (F).

Acinose, Acinuous (E).

٢٠٦٢٦ - فَرْصِيدِي

ما كان شكله شكل الفرصد .

Arbres à pépins (F).

Stone-trees (E).

٢٠٦٢٧ - فَرْصِيدَات

هي الاشجار الفرصدية البذور كالكروية والطناح والاجاص
والفبرجل الخ...

Acnéique (F). Acinetic (E).

٢٠٦٢٨ - فَرْصِيمِي
نمت ترميني يملك كل ما يوقف حركة التلب .
التيحيتال الانبساطي نبات فرصي .

٢٠٦٢٩ - فَرْصُوس

الفرص : ثمر النوم ما دام اخر .

Imposition

٢٠٦٣٠ - فَرْصُوس الصَّبِيكَة

هو اتباع نظام تقني لاجل تقدير الاموال وما يكتبها ان
تتمثل من الضرائب .

Hakea (S). Vauhier (F).

٢٠٦٣١ - فَرْصُوح
جنس الشجار وجبات برية وزراعية تربيته من نصيلة
الفضيات . ازهاره عديدة . اقلها اقليم الزيتون . سيقانها
فراء . اوراقها متناحية ، جلدية النصل . ازهارها صغيرة
لقد ، عذوقية التجميع ، بشارنة الاسدية المنسوفة .
اشهر ازهاره ما يتبع .

٢٠٦٣٢ - فَرْصُوح صَفْصَافِي لَوْرَق

Hakea saligna (S). Vauhier à feuilles de saule (F).

نوع من الفرصاخ وهو جنبة تربيته سرورية تملو من ٢٥٠
الى ٣٥٠ سم. اوراقها وحيدة الصلخ ، عادمة الحروق
تطول من ١٠ الى ١٢ سم. وتعرض من ١ الى ٢ ؛ نصلها
مائل البيرة ، بحري اللون ، ابري النفضة || ازهارها
غبراء اللون متقنوية التجميع ، محورية الارزكاز || ازهارها
يستمر من نيسان الى تموز .

Hakea suaveolens (S).

Vauhier à odeur suave (F).

٢٠٦٣٣ - فَرْصُوح عَطِر
نوع من الفرصاخ ، وهو جنبة تربيته سرورية تملو من ١٠٠
الى ٣٥٠ سم. فربوها خلية اللحاء ، فضية اللون . اوراقها
مفروسة ، غطيلة التشرج ؛ نصلها جامد التسنج ، شاتك
الاطراف المدهية || ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة القد ،
فواحة البرق المعري || ازهارها يستمر من ايار الى
تموز .

Hakea laurina (S).

Vauhier laurier (F).

٢٠٦٣٤ - فَرْصُوح عَطَرِي

نوع من الفرصاخ وهو شجرة تربيته تملو من ٤ الى ١٥

٢٠٦٤٥ - فَرْصُوح كَثِير الزَّهَر

Hakea florida (S).

Vauhier multiflora (F).

نوع من الفرصاخ وهو جنبة تربيته سرورية تملو من ١٥٠
الى ٢٥٠ سم. اوراقها صغيرة غنية . نصلها عادم الحروق .
سفن الحافة ، مدبب المقصبة || ازهارها صغيرة عطرية
المرف ، بيضاء اللون . عناقيدها كثيرة العدد ، متوسقة
الحجم || ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٠٦٤٦ - فَرْصُوح مَهْدَب

Hakea acicularis (S).

Vauhier à aiguilles (F).

نوع من الفرصاخ وهو جنبة تربيته سرورية تملو من ١٠٠
الى ٢٥٠ سم. اوراقها خطية عذبة المنقطة السفلى ،
شاذكة المقصبة المدهية || ازهارها غبراء اللون ، عذوقية
التجميع . ثمارها جارية عذوقية ، ثنائية التواضع الطرفية .
ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٠٦٤٧ - فَرْصُوح الشَّوْطِي

Garypus littoralis (S).

Garypus des rivages (F). Garypus (E).

دورية من الفرصاخ تنتمي الى فصيلة الكرنسيات وربة
المقربات الكاذبة . جسمها صغير القد يطول من ٥ الى
٧ م. فربوها الى الرتبة السحلاء . صدرها مزني الشكل ،
يطول تحفده اسر . مقننها مستطولان يمتدبان بملقطين
كلافتا المقارب لوتها الى السرة . يلبها احلياني الشكل
مقطوع الطرف ، عادم الذنب ، واضح التقسيم السحكي .
صينها مركبتان ، صغيرتان . جرابها دقيقة ، مبررة
الحلب . الذكر اصغر قدماً من الانثى || تألف الشواطئ
البحرية . مسرحها جبوي . قوتها الحشرات الصغيرة والحوام .
تصر نحو خمس سنوات || تقتر من القويبات الناقمة
الامروية .

٢٠٦٤٨ - فَرْصُوس

الشاة الفارضي اى المسنة وقيل المكسورة القرنين .

Hypothétique (F).

Hypothetic (E).

٢٠٦٤٩ - فَرْصِي

٢٠٦٥٠ - فَرْطُ

جنس البّار بواسطة الضرب بالصا وهي علية يكتر استماعا
في الزيتون والجوز واللوز . وهي مفرية لانها تحش وتغلب
البّار وتحت الارواق وتكسر الانثان وقد تؤذي الاغصان .

٢٠٦٥١ - فَرْطُ التَّطَوُّر

Hypermétamorphose (F).

Hypermétamorphosis (E).

Blano-estoc (F).

Thrust (E).

٢٠٦٥٢ - فَرْطُ القَتْل

هو قطع الشجر الحربي باسارت .

٢٠٦٥٣ - فَرْطُوس

Pénis de l'éléphant et du porc (F). Penis of the elephant and pig (E).

هو قتيب الفيل والخنزير .



فرع الشواطئ

Phryganeidae (S). * فَرْطُوسِيَّات ٢٠٦٦٤

Phryganidés (F). Phryganeidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تعيش قرب مجاري الماء || اجسامها لاقبسية الشكل ولحمي، تطلو من ٢ الى ٦ سم. اثيرها مزركشة || اشهر اجناسها الفَرْغُون.

٢٠٦٦٥ - فَرْقَار

شجر صبور على النار تنخل منه المساس والقصاص.

٢٠٦٦٦ - فَرْقَارَكَة * دِيكُ الرِيح (F). Girouette

هي الدرة جهاز يدل على جهة مهب الريح.

٢٠٦٦٧ - فَرْقَارَكَة Tussilage (F).

هي حشيشة السعال، اطليه.

٢٠٦٦٨ - فَرْقَرِين Pourprier (F).

هو البقلة الحقة، اطليه.

٢٠٦٦٩ - فَرْقَرِين * * فَرْقَرِين * فَرْقَرِين

Euphorbia pepius (S). Euphorbe des vignes, Esule (F). Wild purslane, Purple spurge (E). Gartenwolfs-milch (D). Euforbio delle vite, Calenzuola piccola, Pepilo (I).

نوع من الفربيون وهو نبات عشبي بري طلي سمير. يرب في الاراضي الملاحية وفي الآخرة الرملية. يكثر في الكروم وعلى جوانب الطرقات. ساقه فروع تملو من ٥ الى ١٠٠ سم. عصارته لينة، لزجة، يبيضا اللون، حريفة، ناطقة، تستعمل في القضاء على التآليل. اوراقه متناحية، رديئة الشكل، صغيرة القد، مدببة المقعدة. ازهاره عثكولية التجميع وردية اللون.

٢٠٦٧٠ - فَرْفُر Poule d'eau (F).

هو برهان فرفور، اطليه.

٢٠٦٧١ - فَرْفَرَان Guttier (F).

هو الجندم الحندي، اطليه.

٢٠٦٧٢ - فَرْفُور هو الميراث الزياء، اطليه.

٢٠٦٧٣ - فَرْفُورَة * فَرْفُورَة Purpura (S).

Pourpura (F). Pourpura (E).

جنس اصداف بحرية كثير الانواع جميعها متشابهة الاشكال متباينة الاحجام يستخرج منها الابرواجون. اصطناعها بجانر البلاد الحارة والمعتدلة يكثر ويوجد في المتوسط.

٢٠٦٧٤ - فَرْفُورَة Mulle brun (F).

سمكة بحرية تدعى ملرستوج اسمر، اطليه.

٢٠٦٧٥ - فَرْق Delta Céphée, Alfirk (F).

Alfirk, Alphirk (E).

الفَرْقُ نجم من كوكبة قيفاوس يدعى ايضا «دلتا قيفاوس» وهو من النجوم النابضة للاستسفرة الومع. يبدو ان حجمه ينفق سيم الشمس نحو عشرة آلاف مرة.

٢٠٦٧٦ - فَرْق Dichotome (F).

Dichotomous (E).

نمت وصي يستعمل كدلالة على الوقت المزدوجة والانصاف والاثنان : تقول ساق فرقة وفن فرق.

Groin (F). * فَرْطُوسَة ، فَرْطُوسَة ٢٠٦٥٤

Snout (E). هو غظم الخنزير ويسمى بالفرنسية :

٢٠٦٥٥ - فَرْطُوس Sparassis (S).

جنس فطور من فصيلة اللبوسيات. انواعه قليلة تتميز بقصر وفلاحة سوقها، يفسخنها نكمتها الفارشة الخفيفة التي يبلغ قطرها نحو ٤٠ سم. ويتنديدها للتركيب الموج. لوها الى البياض اللبني ونسها الى الصفرة، لحسبها يبيضا القطع خافتة اللون || تركيب جملوح الصنوبر تشبه عن الحب وانغراف لونه نحو الجوزة المابقة ثم انقراض وانحلت الحواجز الخلوية التي تنتهي دقيقة كاللبار.

٢٠٦٥٦ - فَرْق Branche (F).

Branch, Bough, Limb (E).

كل ضمن غلط وحمل انصافا حلت اقتناء.

٢٠٦٥٧ - فَرْق ، عَظَب ، سَكِيل ٢٠٦٥٨ - فَرْقَة * ، فَمَلَة الرَأْس

Descendant (F). Descending (E).

هو كل من ولد من اصل في جبل القصب المنحدر. الاولاد هم الفروع والاباء هم الاصول.

٢٠٦٥٨ - فَرْقَة * ، فَمَلَة الرَأْس Pediculus capitis (S). Pou de tête (F). Louse (E).

حشرة من الفريجات، طولها يراوح من ٢ الى ٣ سم. تركيب قراس. مكها يدعى صتيان وهو ابيض اللون تنمحه الاثني على الشعر فينتفخ بعد ستة او سبعة ايام. والفريجة تعيش نحو ٧ اسابيع وتبيض نحو ٣٠٠ مكته.

٢٠٦٥٩ - فَرْقُوع Hyenon (F). Young hyena (E).

صغير الضبع ويدعى بهذا، والاثني فرولة. ج فرامل وفرامل.

٢٠٦٦٠ - فَرْقَعِيَّات Pediculidae (S).

Pédiculidés (F). Pediculidae (E).

فصيلة من الطفيليات، اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد مغلطمة الجسم المبطط، صغيرة الرأس، كبيرة العيونات، ثوبا الى السلطة المابقة || اشهر اجناسها الفرعة والسمة والبطيخ.

٢٠٦٦١ - فَرْقُ أَوَّل ٢٠٦٦٢ - فَرْقُ ثَانِ

الفَرْقُ الاول او فَرْقُ الدلو المقدم منزل من منازل القمر البائية. الدلو اربعة كواكب، اثنان منها هما الفَرْقُ الاول، واثنان الفَرْقُ المؤخر || وقب الفَرْقُ الاول يدعى الصرفة.

٢٠٦٦٢ - فَرْقُ ثَانِ ٢٠٦٦٣ - فَرْقُ ثَانِ

فَرْقُ الثاني او فَرْقُ الدلو المؤخر منزل من منازل القمر البائية. وما لشر المؤخر من الدلو || وقب الفَرْقُ الثاني يدعى المواء.

٢٠٦٦٣ - فَرْغُون * Phryganea (S).

Phrigane, Phrygane (F). Phryganea (E).

جنس حشرات من فصيلة الفَرْغُونِيَّات ورتبة جملونيات الاجنحة. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في سائر انظار البلاد. المعتدلة الحرارة والحارة || حشراتا الجملانة تعيش على اليابسة. اساديمها تعيش في الماء ملتحفة بجلايين متباينة الاشكال مصنوعة بالريال وسحات الاصداغ وفحات المواد الخشبية وغيرها.




فرمة



فُورُون



فَرْفُور



فَرْقُونَة (صفحة)



فَرْقَى لَوْز



فَرْقَن

الصفتة السفل من بطنها تيرية اللون . قوائمها مستقيمة
الانفاذ والناثيب || مرتعها اشباب البراري والحراج .

٢٠١٨٩ - قَرْم ، قَرْمِيَّة
Hachage (F).
Chopping (E).
هو قلع او تجزئة اللب الطويل او الكبير الحجم قبل
تقديمه الى الماشية .

٢٠١٩٠ - قَرْمَل ، كَبْجَاة ، كَبْجَاة
Frein (F). Braka (E).
اداة الكبح . اشكالها عديدة وغلفة اما احدها واحدة .
ج فرامل .

٢٠١٩١ - فُورْمَالْدِهَيْد ، فُورْمَالْدِهَيْد
Formaldéhyde, Aldéhyde formique (F). Formalde-
hyde (E).
اطلب فورميد .

٢٠١٩٢ - فُورْمَالِين ، فُورْمَالِين
Formaline (F).
Formalin (E).
اطلب فورمالين .

٢٠١٩٣ - فُورْمُول
Formol
هو الفورمول ، اطلبه .

٢٠١٩٤ - فُورْمِيُوم ، فُورْمِيُوم
Phormium (S). Phormier (F).
جنس نباتات صخرية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انزاعه
قليلة معطلمها بري . اوراقها قرصية الانتشاب ، ثنائية
الترتيب ، مستطيلة الجرم . نصلها خطي الصفتة ، جامد
التسج البني التركيب . ازهارها كبيرة القند حنقونية
التجميع ترتكز حل شراخ مستتب غليظ || احرف انزاعه
واشهرها سالي .

٢٠١٩٥ - فُورْمِيُوم كُوك ، فُورْمِيُوم كُوك
Phormium cookianum (S). Phormier de Cook (F).
نوع من الفربيوم الزنبقي . اوراقه تطول من ٦٠ الى
١٠٠ سم . نصلها قدي الشكل ، بارز الحد ، جامد
الصفتة ، اخضر اللون ، احمر الكنظر . شراخه يعطر
من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ازهارها كبيرة القند منتصبه ، لونها
الى الصفرة يعلوها موج اخضر || ازهاره يستمر طوال
فصل الصيف .

٢٠١٩٦ - فُورْمِيُوم مُتَصَلِّب ، كَتَّان لَيْقَنْدَه
Phormium tenax (S). Phormier tenax, Lin de la
Nouvelle-Zélande (F). Flax lily, New Zealand flax (E).
Neuseelandflachs, Zähe Flachsliile (D). Formio
tiglioso, Lino della nuova Zelanda (I).
نوع من الفربيوم الزراعي الصناعي . يزرع لاوراقه
اللينة الشائكة الاستعمال في شي الصناعات النسيجية .
اوراقه جامدة التصل تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم .
وتتفرش من ٤ الى ٦ نصلها اخضر اللون اسمر الموج
يعلو على كامل امتطالته ككل احمر . شراخه الزمري
يعلم من ٣ الى ٤ امتار . ازهارها كبيرة القند منتصبه صفراء
للون او حمراء .

٢٠١٩٧ - فُورْن
Four (F).
Oven, Bakehouse, Kiln (E).
بناء خاص مختلف الاشكال والاحجام ويولد البناء والرؤد
يسعمل في تقجير الحرارة اللازمة لقلع بعض الاعمال
الصناعية .

٢٠١٧٧ - فُورْقَى ، فُورْقَى
Lin purgatif (F). Purgative flax (E).
هو الكتان المسهل .

٢٠١٧٨ - فُورْقَى التَحَلُّل ، فُورْقَى التَحَلُّل
Essaim d'abeilles (F). Bee-Swarm (E).
ثول من النحل هجر غليته لتسير غلية جديدة .

٢٠١٧٩ - فُورْقَاه
هي الشاة والتمزج البينة ما بين الطيرين .

٢٠١٨٠ - فُورْقَد
الفرقة نجم من كوكبة فيفاوس قريب من القطب الشمالي
يعتق به . وما فرقدان .

٢٠١٨١ - فُورْقَد
الفرقد : ولد البقرة وقيل ولد البقرة الوحشية . والفردود
كلذك .

٢٠١٨٢ - فُورْقَع لَوْز *
Agrypnus notodonta (S).
فرع لوز هو الاسم المسمى خشرة من السالويات كبيرة
القند ، طولها نحو ٤٠ سم . لونها الى الخفي الاسمر .
زبانها متوسطة الطول ، منشارية الشكل ، اوساغها
خلفية المغل || رقاتها سلكية الجسم ، مستطيلة ، صفراء
اللون ، تعيش حل جلود الزيات وقد تركب البطاطا .
اغراضها زبيدة لا تستوجب المكافحة .

٢٠١٨٣ - فُورْقِيَّة ، فُورْقِيَّة
Dichotomie (F). Dichotomy (E).
الفريقية ، في علم النبات ، طريقة انقسام جزلي مفرق .
وفي علم الفلك ، حالة القمر عندما يكون نصفه فقط
مضاء .

٢٠١٨٤ - فُورْقَل
الفرق هو المتفرق نشره من الجسم وما اشبه . يقال لوز
فرق وجوز فرق ...

٢٠١٨٥ - فُورْقَل
Bauhinia acuminée (F).
هو البوبينية المظنة ، اطلبها .

٢٠١٨٦ - فُورْقُولَة
Virachola ilvia (S).
خشرة من الحرف ، ديدانها تركب الزمان . اطلب هرض
الزمان .

٢٠١٨٧ - فُورْلُودَة *
Firolida (S).
Firolida (F). Firoloids (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل
وضفيلة القريانات . انزاعها المعروفة قليلة المدد منتشرة
في بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة شبه
اطلبيجية الشوزن ، حلابية المادة ، شفافة ، عادية
الاصداف ، قليلة الخياشيم المجموعة مع سائر الاحشاء في
جراب صغير مركزة تحت البطن .

٢٠١٨٨ - فُورْلُودَة مُرْبَعَة *
Verlusia quadrata (S).
Verlusée carré (F).

خشرة غاضلة من فصيلة الكورسيات ورتبة مختلفات
الاجنسة . جسمها معتدل التبطيط ، مربع البطن ، يطول
نحو ١٢ مم . ثوبها الى الخفي المنضب الموج . رأسها
شبه مربع الشكل ، غطلمها مستطيل . ازهارها ناشز . عيناها
صغيرتان ، بارزتان . زبانها مستطيلان ، اسودا الطرف .



فُورْمِيُوم مُتَصَلِّب



فرع الرب



فرع البقر



فرع الحمير



فرع الخبز



فرويلة عسقلية



فريدي شائع



فريدي مسجج

Poulette (F).

Young hen, Pullet (E).

أي الفروج وهي الفتية من النجاج .

٢٠٧٢٢ - فُرُوعُ هَيْكَلِيَّة

Branches charpentières (F). Carpenter branches (E).

يسمى من دعاما فروع بحجرية . هي الفروع الخشبية التي تحمل الإغصان ويتألف منها هيكل الشجرة الرئيسي .

Orion

٢٠٧٢٤ - فُرُوع

الفروع كوكبة نجوم تدعى الجبار أو الجوزاء .

٢٠٧٢٥ - فُرُوعِيَّةٌ عُسْقُولِيَّةٌ * ، قَحْمَةُ السَّاقِ

Erwinia arôdeas (S). Maladie de la jambe noire (F). Black leg (E).

وصم تشبه بكتيريته من الكرويات . يترى أنواع كثيرة من النبات اغصانها التيج والمفروق والجذور والبطاطا الخ ... نماذج شديد ألحاح في القيق يركب الساق فيسم بعض اقسامها بعد ان يسحب لموداعها وتلفها وقد تمتد الى السنج والجذور فيسود كيقم مستطيلة متشابكة سواء اللون تحرقها حالات سر تقضي على اغصانها ثم تحجر السنج وتلفها . الجروح والحلوس ولا تقتك الا في ظروف متعاضة معينة اغصانها الرطوية المستمرة وكثرة القيوم او قلة الفصيح . لما انتقله من التربة الى النبات قيم بواسطة الاوراق السخل التي تلتصق التربة .

٢٠٧٢٦ - فُرُوعِيٌّ هِي السَّاقُ ، اُطْلَبُ .

Achérine nahe (F).

٢٠٧٢٧ - فُرُوعِيَّةٌ

هي التونة من الاسماك الصغيرة الدقيقة ، اُطْلَبُ .

Fritillaire (F).

٢٠٧٢٨ - فُرُوعِيَّةٌ

هي المرار نبات من الزنبقيات ، اُطْلَبُ .

٢٠٧٢٩ - فُرَيْدِيٌّ هِي سَرْجَانٌ

Pagellus (S). Pagel, Pagelle, Pageau, Pageul (F). Braize, Red porgy (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبرويات ودية شائكات الزعانف . انزاع سمية ، اطباها مياه المناطق الحارة والمعتدلة . تتد منها تمش في المتوسط . اجسامها الارباعية الشكل طولها يراوح من ٢٠ الى ٧٥ سم . ورونها كبيرة القدد . زعانفها الظهرية مستطيلة شائكة . انزاعها الى الحمرية المجرانية تزهر وتبيض وتتبع بالفصيح والاصفر والحلطي والاسمر . جبينها ماركة لذينة اللحم . اعزها واشهرها الفريدي الشائع .

٢٠٧٣٠ - فُرَيْدِيٌّ شَائِعٌ *

Pagellus erythrinus (S). Pagel commun (F). Common braize (E).

نوع من الفريدي كبير القدد ، مرجاني الثوب ، طوله يراوح . عند اكباله ويولده الاربع سنوات ، من ٦٠ الى ٧٥ سم . وهو من الاسماك المشهورة المستعينة المبذولة في المتوسط .

٢٠٧٣١ - فُرَيْدِيٌّ مُسَجَّجٌ * ، فُرُوعِيَّةٌ

Pagellus mormyrus (S).

Pagel marbré, Mourme (F). Mormyrus (E).

نوع من سمك الفريدي . موطنها البحر الايفس المتوسط .

الارتكاز ، سداسية التيلات ، لونها الى الحمرية النيفسية . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٠٧١١ - فُرَيْسَعُ الرَّبِّ *

Haemodipus ventricosus (S). Pou du lapin (F). Louse of rabbit (E).

حشرة صغيرة من الفريسيات ، طولها يراوح من ملليمتر الى ملليمترين ، جسمها اغبر اللون ، يضيء بشكل مفلطح . تركب الارباب ونفيدة .

٢٠٧١٢ - فُرَيْسَعُ البَقَرِ * ، دَبَابَةُ البَقَرِ

Haematopinus erythrocephala (S). Grand pou du boeuf (F). Big louse of ox (E).

حشرة من الفريسيات . طولها نحو ٦ مم . جسمها اكعب اللون ، احليجي الشكل عذب الظهر || تركب الابقار وتؤذيها .

٢٠٧١٣ - فُرَيْسَعُ الجُرَذِ * ، فُرَيْسَعُ البَقَرِ

Polyplax spinulosa (S). Pou des rats (F). Louse of rats (E).

حشرة صغيرة من الفريسيات ، طولها نحو ١ مم . لونها الى الوردية البهراء || تركب الجرذ والفأر .

٢٠٧١٤ - فُرَيْسَعُ الحَمِيرِ * ، دَبَابَةُ الحَمِيرِ

Haematopinus asinus (S). Pou de l'âne (F). Louse of ass (E).

حشرة صغيرة من الفريسيات ، طولها نحو ٤ مم . جسمها يضيء بشكل ، لغير اللون || تركب الحمير والبغال والخلل .

٢٠٧١٥ - فُرَيْسَعُ الخَنْزِيرِ * ، دَبَابَةُ الخَنْزِيرِ

Haematopinus suis (S). Pou du porc (F). Louse of swine (E).

حشرة صغيرة من الفريسيات ، طولها نحو ٥ مم . جسمها مبط الشكل ، اسمر اللون ، رأسها غروبي مستطيل ، قرونها الاستعمارية خاسية المعقل . حلها دقيق وصغير . تركب الخنزير وتؤذي .

٢٠٧١٦ - فُرَيْسَعِيَّاتٌ

Haematopinidae (S). Haematopinidae (F). Haematopinidae (E).

فصيلة حشرات جديلة من المسمقيات . اجناسها نحو ٢٠ جميعها صغيرة الجسم ، مفلطحة الشكل ، مبطعة ، كثيرة الغلب . قرونها الاستعمارية ثلاثية او خاسية المعقل . مقامها ارساغها سادة وقوية || تركب الحيوانات اللبونة الوحشية واللباجنة . اشهر اجناسها الفرغ ومن انواعه فرغ البقر والحمير والارباب والخنزير .

٢٠٧١٧ - فُرُوعِيَّةٌ هِي الشَّعْنُ المَعْرُوفُ ، اُطْلَبُ .

Vernonie (F).

٢٠٧١٨ - فُرُوعِيَّةٌ

هي السرفل ، اُطْلَبُ .

٢٠٧١٩ - فُرُوعِيَّةٌ

الفريدي ولد البطل . في فراهيد . ومنهم من قال الفراهيد : صغار النمر .

٢٠٧٢٠ - فُرُوعٌ ، فُرُوعِيَّةٌ

Fourrue (F). Fur (E).

كل جلد يفرى به . ج . فراه .

٢٠٧٢١ - فُرُوعِيَّةٌ

Poulet (F). Chicken (E).

القي من الدجاج . ج . فراريج .

Physopoda du tabac (F). ٢٠٧٤٣ - **فُورِيدُ التبغ** *
حشرة من الفريسي ترتكب أوراق التبغ فتقطع الخشب وتمتص عصارة الخلايا والنسج الناضج . أظلم فريز يد التبغ .

Sidérite (F). ٢٠٧٤٤ - **فُورُز**
هو الفتح نبات طبي من الشفويات .

Vaseline (F). ٢٠٧٤٥ - **فُورِين**
هو الزاوين ، أظلمه .

٢٠٧٤٦ - **فَسَاءُ الصَّنَوِيرِ ***
Chlorochroa pinicola (S). **Puasie des pins (F).**
حشرة مؤذية من فصيلة الفاسياتيات ، جسمها مفلطح ، أحليجي الشكل ، يطول نحو ١٢ سم . ثوبها إلى الخضار الأصفر المولج . يبتلى إلى الخطي الأصفر يطول في جانبها تجلعي دقيق أسود || وألها شبه مخروطي ، مقطوع الطرف . عظمها معتدل الطول . عينها صفراء ، زباناها مستطيلان اسمران . كرسلاها أخير الخمار الخاربي . حشيتها خراء الطرف . ظهرها أريد اللون ، أخضر الخشب . قشرها شفاف . قوائمها إلى الخمار اللامس || ترتكب أهداب الصنوبر || راحتها كريمة .

Anserine féde (F). ٢٠٧٤٧ - **فَسَاءُ الكَنْب**
حبة كريمة الرائحة تسمى منتنة ، أظلمها .

Putréfaction (F). ٢٠٧٤٨ - **فَسَادٌ وَفَسْخٌ**
Putrefaction (E). انحلال المواد العضوية بتأثير الجراثيم .

٢٠٧٤٩ - **فَسَالَةُ الكرم ، فِشَلُ الكرم**
Aubernage, Cabuchage, Court-noué, Roncat (F).
مرض فيزيولوجي يجهول الأسباب يصطبف الكرمة بكامل أعضائها شتوئ .

٢٠٧٥٠ - **فُسْتَقُ ***
Pistacia vera (S). **Pistachier, Pistachier du Levant (F).** **Pistachio tree (E).** **Echte Pistazie, Pistazienbaum (D).** **Pistachio, P. verde (I).**

شجرة زراعية عميرة تعيش من قرنين إلى ثلاثة قرون . وهي من سبط المستقيات وفصيلة البطيانيات . حشوها وأصراعها عديدة ، منها حشوش البحر المشط ، أشوها القشقي الحليي يختلف أصراعها كالمناشري والمراسي والبائوري والعليسي ونساب الجمل . ثم الفستق التوتوي والمفرقي والصغلي والقرنبيسي والأراني . أقلها واسع الانتشار وهو انسج من إقليم الزيتن لأنها تتحمل الصقيع حتى بعض درجيات تحت الصفر . غير أنها ترفح في المواسم الدارية من الرياح المحار وفي الممارض الفرية والفرية الشالية || وهي تجود في جميع الأربطة الخفيفة القليلة الاندماج ، والرافة المادة الكلبية ، المادة الرطوبة المستحكة || تملو من ٤ إلى ٨ أمتار وقطر دوحها براوح من ٣ إلى ٧ أمتار . جلودها منتصبة ودية تقود في الأرض على أعماق عمدة . ساقها منتصبة عقدية فراء . أوراقها مركبة ورية . وريقاتها أحليجية أو بضية الشكل . تصلها شمس الصفعة الجامعة الكثيرة العروق النقيقة المتوازية . أزهارها ثنائية المسكن ، حادة البتلات ، عورية الإرتكاز ، تنشأ على الفروع المحولة . الذكورية منها قدية التجميع ، خالية الاسمية ، أما الانثوية فصغودية وهي وسيدة المبيض والمعدر . ثمارها زيتونية الشكل تتكون عند اكتمال نضجها

مسرحةا قرب الشطوط || جسمها أحليجي الشكل يطول نحو ٦٠ سم . ثوبها إلى الشبهة الوردية الغصية المولج يطولها في جانبها كسجيب أسود والحمل || أحلمها جيد الصنف في الربيع والصيف ، متوسط في الخريف والشتاء .

٢٠٧٢٢ - **فُورِز**
Fraise (F). **Strawberry (E).**
هي ثمرة الشيك وتدعى شول فريز وشول شيك .

٢٠٧٢٣ - **فُورِيْزَة ***
Fraese (S). **Frésie (F).** **Fraesia (I).** **Knickschwartzel (D).**

نبات دوسي زريبي من فصيلة السوليات . وحيد الجنس والنوع ، عديد الضروب والمجن . أوراقه قرصية الانتشاب ، سداسية الشكل ، ثنائية الصف . أزهاره بيقة الشكل ، سداسية الاقسام ، حصرية العرف ، منها الأبيض والأصفر والبرتقالي والوردي الخ ... وهي متباينة الإرتكاز من جهة واحدة جسمها شراخ يحيل يطول نحو ٣٠ سم . ثم يروح تحت صبه الأزهار || أزهاره يستمر طوال فصل الربيع .

٢٠٧٣٤ - **فُورِيْزَة ***
Farysia (S).
جنس تطور بجمرية طفيلية من فصيلة الراهويات تتميز بطولها البسيط التركيب ، ثم بيغها الضمي التجميع ويوبيتها الفرية الانقسام وتكثر || يصيب السدييات على اختلاف أنواعها النباتية .

٢٠٧٣٥ - **فُورِيْزَة**
Proie (F). **Prey (E).**
كل ما استولى عليه الحيوان الضاري لفته .

٢٠٧٣٦ - **فُورِيْش ، مَكْر**
Acaule (F). **Acaulous, Stemless (E).**

الفريش والمكر هو من النباتات ما أنبت على وجه الأرض ولم يبق على ساق ج . فرائش .

٢٠٧٣٧ - **فُورِيْش**
الفريش : الفرس يده تنجها بقس ليال وهو غير أثبات أنزو عليها || والفريش أيضاً الثور الذي لا سنام له .

٢٠٧٣٨ - **فُورِيْزَة ***
Calocera (S). **Calocère (F).**

جنس تطور غشائية من فصيلة البديسيات . أنواعه قليلة العدد كثيرة الانتشار الذي يمس معظم مناطق الشرق الأوسط وأروية وأمريكا الشمالية || تعيش على المواد الدالية والخشبية المنحلة . أشهر أنواعها وأضرها الفرية الكرية .

٢٠٧٣٩ - **فُورِيْزَة لُزْجَة ***
Calocera viscosa (S). **Calocère visqueuse (F).**

نوع من الفرية . أظلمها أقلم الصنوبر في معظم أقطار العالم . تعيش على النبات المقطوعة المفتة || تحتها غشوي السمية الجامدة . وتيسها متشعبة ، لزجة ، تملو نحو ٥ سم . لونها إلى الأصفر الناري .

٢٠٧٤٠ - **فُورِيْزَة**
Fénugrec (F).
هي الحلبة الرومية . أظلمها .

٢٠٧٤١ - **فُورَ**
هو ولد البقرة الوحشية .

٢٠٧٤٢ - **فُورَاة**
Tigress (F). **Tigress (E).**
أنثى الببر وتدعى فورة ويقال لولها الفور .



فُورِيْزَة



فُورِيْزَة



فستق

من غلاف خارجي مثل الفستق لونه الى الخضرة يملوها
تؤشج ربادي . من غلاف داخل غشحي المادة مؤلف
من مصراعين يتشقان عن صلام اسفر اللون مأكول لملحه
قشرة رقيقة لونها الى الحمرية || يتكاثر الفستق بالذر
بالتلصق . فالتكاثر بالذر يكون في شتات خاصة
تتركز على طبق من الحصى مهمتها استنفاد الماء . وقد
يم عادة في شهر شباط ويكون ذلك اما ثراً على كامل
الشتل او عن طريق تناثره يمدد الواحد منها من الآخر
من ٣٠ الى ٤٥ سم . ويبقى الفستق في الشتل من سنتين
الى ثلاث سنوات قبل ان تنقل الى مستقرها || اما التكاثر
بالتلصق فيجوز على الفيل اي الفسفرة والبطم الاخير
والصفاكاه وعلى مائر اجناس سبط الفستقيات . والمعلوم
يشترى به خمس سنوات في حين ان الفسرة لا تشر قبل
تسع او عشر سنوات || ونجربة الفستق تبلغ كلال نحوها
بسر ٣٠ سنة وتشر على حالها نحو ١٥٠ سنة قبل ان
تنتحل في طور الانحطاط الذي يدوم نحو نصف قرن .



فستق حبيبة

٢٠٧٠٢ - فستق ملتغاشي * ، حصص بختارة،

فونكزية Voandzeia subterranea (S).

Voandzeia, Pistache malgache, Pois bambara (F).

نبات عشبي حولي زراعي وحيد الجنس والنوع من فصيلة
الفرقيات القرارية . هذه البقول الافريقية افارقة . ساقه
مدادة . اوراقه مركبة ، مستطيلة الزناد القائم ، ثلاثية
الورقات الطويلة الساندة النصال . ازهارها ابطية الارتكاز
تنشب على السوق للمدادة وهي صغيرة القند ترتكز
مائلين لبقية الفستق تنسل بالايزار ، به تأبيرها وتكوين
الثمار ، نحو التربة فتدخلها على اعماق تراوح من ٥ الى
٨ سم . حيث تستقر الى ان يتم نمو الثمار ونضجها . اما
الثمار فهي غالباً فردية الحبة ونادراً مزدوجة وهي تحوي
على البوب غزير المواد الغذائية المرموقة التي تعتبر من اكل
الافاغية التي تنتجها المملكة النيبانية || يقول « بوانام »
وفيهر من سلطوا حبوب الفستق الملتغاشي انها تحوي العناصر
الرئيسية التالية :

مواد ازوقية	١٨,٦٨ ٪
مواد دهنية	٦,١٤ ٪
مواد هيدروكربونية	٥٧,٠٧ ٪

زراعتها لا تختلف عن زراعة الفستق حبيبة ونتاج الثمر
يراجع من ١٥٠ الى ٢٥٠ كيلو من الحبوب المملفة .
اما شتمه فيستعمل كعلف لفاشية اخصها الايقار لانه
يكثر الدر ويشط في المواد الزبدية .

٢٠٧٥٣ - فستق

Pistache (F).

Pistachio, Pistachio-nut (E).

ثمره الفستق . لياها جامد المكسر . فستق اللون ، للذيد
الطعم الحامض والنتكهة المشبعة . متوسط تركيبة التمصري
ما يلي :

مواد آحبة	٢٢,٧ ٪
مواد دهنية	٥,١١ ٪
حبيبات الكروبيون	١٢,٠ ٪

٢٠٧٥٤ - فستقيات (F). Pistacia (E).

سبط من فصيلة البطيئات يشمل ثمانية انواع معدها بعض
مناطق حوض البحر المتوسط . جميعها اشجار وشجيرات
برية وزراعية وافر الماددة الراتنجية الغلظلة العرف الشائعة
الاستعمال الصناعي || اشهر انواعه الفستق .

Physoestegia (S).

Physoestégie (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . اوراقها
اهليجية او سنانية مسنة المختار . ازهارها مثل التجميع
ازهارها صغيرة وريدة اللون او بقصية || انواعها المرموقة
قليلة المدد ، اشهرها قتالية .

٢٠٧٥١ - فستق عيبد * ، فستق سوداكي

Arachis hypogaea (S). Arachide, Pistachier de terre,

Pois de terre, Cacahouette (F). Earth nut, Ground

nut, Pea nut (E). Echte Erdnuss, Erdmandel (D).

Arachide, Pistacchio di terra, Mani (I).

نبات عشبي حولي زراعي صناعي من فصيلة القرقيات
غروبوه واصرامه عديدة تقسم الى قسمين : الافريقية
وهي مدادة قليلة الزغب والاسيوية وهي متصببة السوق
مزرقة الاصاه || جلوره كثيفة متشعبة . سيقه فراء
متركة ، اصمها اسطوانية ، اطرافها مفصلة . اوراقه
متناقبة مركبة لاقبسية التجميع يكثر فيها العدد الشففي
المركب من زوجين . وريقاتها بيضبة الشكل نصلي
يختلف باختلاف الاصرام منه مائل الصفة العليا خلي
البغل كما في الاصرام الافريقية ومنه مذهب المتصفين
كما في الاصرام الاسيوية || ازهارها ابطية تنشب عند
قواعد الفروع بين اللذانيتين هسيتين وهي صغيرة القند صفراء
اللون تتركز على ساقين لبقية الفستق تنسل بالايزار ،
به تأبيرها وتكوين الثمار ، نحو التربة فتدخلها على اعماق
تراوح بين ٦ و ١٠ سم . حيث تستقر الى ان يتم نمو
الثمار ونضجها || اما الثمار فثلاثية ، اسطوانية ، عذوة ،
متعقبة الوسط . طولها يراوح بالنسبة الى غروبها بين
٢ و ٤ سم . وهي تحوي على البوب او البويين في الاصرام
الافريقية وعلى ثلاثة الايبب في الاصرام الاسيوية .
اما البوبها فهو غزير المواد الغذائية المرموقة التي تتركب
من العناصر الرئيسية التالية :

مواد ازوقية	٢١,٨٠ ٪
مواد دهنية	٥,١٧٥ ٪
مواد هيدروكربونية	١٧,٦٦ ٪

زراعتها المنتشرة في جميع البلاد افارقة اخصها البرازيل
والكسبك وبعض مناطق امريكة لثالية والسنغال والسنودان
وبصر والمهد . وهو مزروع على الشراطين البنيانية السورية
المروية الممتدة من حكار الى الاذقية || عيبد في جميع
الآربة الزراعية الكاملة التركيب الممكن دجا . بأصا
يفضل الرسوية المتوسطة او القليلة الانتاج الغنية بالمواد
الصفوية وبتمصري البواس والفسفور || يبلو في
القدم الواحد من ٦ الى ٧ كيلو من الحبوب المملفة او نحو
٣ كيلو من الايوبب اي الحب المادد التخلاف . وذلك
في اواخر شهر نيسان . فينتش الحب وتظهر يوارضه بهد
الذر بثلاثة اسابيع . عندئذ يشار بالري ويدلم عليه



فستق ملتغاشي

٢٠٧٠٦ - فُسْتُجَة صَغِيرَة الزَّهَر
 Physostegia parviflora (S).
 Physostégia à petites fleurs (F).
 نوع من الفستوية. ساقها قوية تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها لامعة سنانية الشكل. نصلها منشورية الحثار. سبلتها الزهرية تطول نحو ١٥ سم. ازهارها لينة بنفسجية اللون صغيرة القد. تطول من ١٠ الى ١٥ م. لوفا الى الوردي في تنويرها. يستمر من حزيران الى آب.

٢٠٧٠٧ - فُسْتُجَة مُسَنَّكَ
 Physostegia denticulata (S).
 Physostégia denticulée (F).
 نوع من الفستوية. ساقها قوية متصلة الصلبة تملو من ٢٠ الى ٦٥ سم. اوراقها اهليلجية تطول نحو ٨ سم. نصلها غصراه اللون القاتم - مسننة الحثار. ازهارها وردية اللون و معتدلة القد. تطول نحو ٣ م. || تنويرها يستمر من حزيران الى آب.

٢٠٧١٤ - فُسْفَات الكِلْس
 Phosphate de chaux, Ph. de calcium (F). Calcium phosphate (E).
 مركب فسفوري يستعمل في تحضير السورفسفات.

٢٠٧١٥ - فُسْفَات الكِلْس الطَبِيعِي ، فُسْفَات مُعَدَّنِي
 Phosphate de chaux naturel, Ph. minéral (F).
 Natural calcium phosphate, Mineral phosphate (E).
 مركب فسفوري طبيعي يستعمل اما مباشرة في تسميد التربة او في تحضير السورفسفات.

٢٠٧١٦ - فُسْفُس
 Peribalus (S). Péribala (F).
 ففسس ج. فسفس جنس حشرات شديدة النتن من فصيلة الفاسيات. انواعه عديدة جسمها صغيرة القد و محببة الشكل. مبطلة. طويلا وراوح بين ٧ و ١٠ م. ارجلها مختلفة الالوان منها الاخضر الباهت والرمادي والحظلي والسمك والزرکن. وهي شديدة الاذى تركب الاحشاب البرية والزارعية وسبا البقول والنباتات الصناعية كالتمغ والخروع.

٢٠٧٦٧ - فُسْفُسَة مُسَطَّحَة
 Brachynema cinctum (S). Brachynème ceint (F).
 حشرة مؤذية من فصيلة الفاسيات. جسمها كثيف الحمل القصير ومقلطح. مبطط و يطول نحو ١١ م. || لوفا الى الفشار الانسى. رأسها شبه مخروطي. خطها مستطيل المنك. عينها لاثرتان. زواياها اخضران. كوسها احر الحثار. صفيحتها مخروطية الشكل و يفساه الطرف. ظهورها وردي اللون و اخضر الخنجر. بطها الى الخضار الباهت يمتطع حثار احر. قشراتها شفافة. قواها الى الخضار الاصفر الاسمر || تركب جميع انواع السرمقات فتتصص عصارة الارواق والنواهي || راجحها كرية.

٢٠٧٦٨ - فُسْفُسَة
 Phosphatage (F).
 تسميد التربة بالفوسفات. و منهم من كتبها فسفلة.

٢٠٧٦٩ - فُسْفُور ، فُسْفُور ، فُسْفُور
 Phosphore (F). Phosphorus (E).
 جسم بسيط لا يوجد في الطبيعة الا متحدا مع غيره من العناصر. وهو اهم الاغذية النباتية بعد الآزوت. يوجد في

٢٠٧٥٨ - فُسْتُولِيَة
 Fistulana (S).
 Fistulane (F). Fistulana (E).
 جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الغليش ونصيلة النسيجات || انواعها الفائرة كثيرة البدن جميعها من متحبرات الطبقة الطليثرية و اما الانواع الماصرة فتلاصق جميعها من دويبات اهد الصلبة || تعيش قرب الشواطئ مدفونة في الرمال المغمورة بالماء. اصدانها ابوية طليقة.

٢٠٧٥٩ - فُسْتُخ
 Pourridié, Rosellinia (F).
 جنس فطور مجهرية عديدة الانواع (رايح و زائليتي).

٢٠٧٦٠ - فُسْتُخ ، اِنْعَاء
 Réssilation (F).
 Cancelling (E).
 هو ابطال مقول عقد باتفاق المتعاقدين.

٢٠٧٦١ - فُسْتُحَة
 Eclat (F). Shiver, Splinder (E).
 هي الملوقة، قسيب يفسخ عن جذع امه.

٢٠٧٦٢ - فُسْتُيَلَا
 Phacidiella (S).
 جنس فطور مجهرية يعرف بالريح و اطليه.

٢٠٧٦٣ - فُسْفَات ، فُسْفَات ، فُسْفَات
 Phosphate
 ملح يحصل من امتزاج حاسف الفسفوريك باحدى القواعد من معادن او قلقات او غيرها كالبيوتاس والكلس والهديد الخ. وهو من الاسماء الزراعية الجزئية للتمغ التي تعد النبات ببعض الفسفور. مصادوه عديدة تقسم الى خمس فئات :

١ - فة الفوسفات الطبيعي وهي تشمل الابيت والرمال الفوسفاتية والباثير الفسفافية والفوسفات الحجر والفسفوريك ...

٢ - فة الفوسفات الفسوي وهي تشمل مختلف مساحيق الطغام ورياد النظم.

٣ - فة الفوسفات المستخرجة من التمدن وهي تشمل التوبال اي السكروي حل اختلاف انواحه.

٤ - فة الفوسفات التي حولجت كيميائيا وكيمياويا وهي تشمل البازيفسفات والفوسفات الراسب ...



لسعة

في فصل عاين الخضر ثم تصفر وتيس، فتذبل الاوراق وتيجها وتميت النبات . راجع سرج .

٢٠٧٧٨ - **فُشِيَكَة** *Cisticola ordinaria* (F). هي الكززان للبدل طائر من العجاير . اعليه .

٢٠٧٧٩ - **فُشِيَكَة** *Rejaton* (F), *Shoot* (E). كل دله او قضيب ينمو على اربعة قطعت مسح الربة . ج . فائلل . والسائل والفلال صغار النخل تفرس تقضم قصير نخلا .

٢٠٧٨٠ - **فُشِيَكَة، فُشِيَكَة، فُشِيَكَة** *Physiologie* (F), *Physiology* (E). علم يبحث عن ظواهر الحياة في الياهي ومن وظائف اعضاء الخلقة .

٢٠٧٨١ - **فُشِيَكَة** *Bryone* (F). هو الفاشرا ، اعليه .

٢٠٧٨٢ - **فُشَاغ ، فُشَاغ** *Smilax* (S). *Salsaparilla*, *Smilax* (F), *Sarsaparilla* (E).

جنس نباتات ليفية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠٠٠ صيها جنات سريعة، معطها بري وبصها زراعي . اوراقها ابيدة ، معتقة ، متعاقبة ولا تلتصق الشكل ، كثيفة اللوزق . انوارها صغيرة القد ثلاثية او خماسية البتلات . انوارها صبراني او صفوي التجميع ، ابيلي الايتكار . ثمارها عتيبة لا افرق انواعها واشهرها ما يلي .

٢٠٧٨٣ - **فُشَاغ امريكي** *Salsaparilla d'Amérique* . هو الاربية البامرية ، اعليه .

٢٠٧٨٤ - **فُشَاغ صيني ، فُشَاغ قاسر** *Smilax aspera* (S), *Smilax rude*, *Salsaparilla d'Europe*, *Lisaron épineux* (F), *Prickly ivy*, *Rough bindweed* (E), *Stechwinde* (D), *Smilax*, *Smilaclo*, *Rovo cervino* (I).

نوع من الفشاغ الطبي البري المبدول . ساقه ليفية سريعة مضطعة تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه قلبية القامدة، نصلها جامد التسج الاخضر للامع الشاك الحافة . ثماره حر || انزهره يستر من آب الى تشرين الاول .

٢٠٧٨٥ - **فُشَاغ شاك** *Smilax bona-nox* (S), *Smilax épineux*, *Salsaparilla bonne-nuit* (F), *Rough bindweed* (E), *Rauhe Stechwinde* (D), *Smilax spinosa* (I).

نوع من الفشاغ الطبي البري والزراعي . ساقه ليفية سريعة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه اعطليجية الشكل . نصلها متقضب الوسط . جامد التسج ، صباغي اللوزق ، شاك الحافة || انزهره يستر من نيسان الى تموز .

٢٠٧٨٦ - **فُشَاغ صيني** *Smilax china* (S). *Smilax de Chine*, *Salsaparilla equine*, *Squine* (F), *China smilax*, *Chinese root* (E), *Chinasteckwinde*, *Chinawurzel* (D), *China carnosa*, *Salsaparilla della China*, *kina* (I).

نوع من الفشاغ الزراعي مهدد الهين . جدو وكلي الشكل تكتنه بعض الصائل المستطيلة الحمراء اللون . ساقه ليفية قليلة الشوك . اوراقه بيضية الشكل ، قلبية القامدة ، مدينة المعصعة ، نصلها جامد التسج الاخضر للامع ،

الربة الزراعية وفي النجج النباتية والحلوانية لاسا في النظام || والفسفور اخر جسم صلب ، شفاف ، كروي اللون ، كربه الرائحة ، نفيط للمادة البامة للفتاة . يتألق في الغلام ، يستعمل في الهوا ولا يلوب في الماء . ريز (P-قو) ثقله النجي ١٨٤ و١٩٨ وزنه الذري ٣٠,٩٨ . ينصهر بجمرة ٢,٤٤ مع حيث يناع كازيت وينحل ٢٩٠ مع || ويوجد ايضا الفسفور الاخر الذي يعض من الكوردي بالتسجين العالي، وهو اخر اللون عادم المم والرائحة لا يتألق في الغلام ولا يستعمل الا عند ٢٦٠ مع . يستعمل في عدة صناعات انصها صناعة القاب .

٢٠٧٧٠ - **فُشُورِيَت** *Phosphorite* نوع من نيفات الكلس الطبيعي التحصير للشمعي الرؤل . يستعمل في تحضير الفسفور واليوربفاتا .

٢٠٧٧١ - **فُشُكُل ، فُشُكُل ، فُشُكُل** *Darnier* (F), *Loas* (E). الفرس الذي يبي في الحلية آخر الجبل .

٢٠٧٧٢ - **فُشُكُل** *Plançon*, *Plantard* (F), *Sapling* (E). هو كل قضيب كبير من الخور والصفصاف وما شبه شلب وحضر للفرس ان في البندانة او في المستقر .

٢٠٧٧٣ - **فُشُكَة** *Bouture* (F), *Slip* (E). هي العقلة كا انزمت قبل تقليمها وتحضيرها للفرس .

٢٠٧٧٤ - **فُشُكَة** *Phasma* (S). *Phasme* (F), *Phasme* (E).

جنس حشرات من فصيلة الفسيدات . انواعها المعروفة عديدة اعطتها غابات البلاد الاستوائية والحارة || اجناسها اسطوانية تشبه القضبان طول من ١٠ الى ٤٠ سم . تعلوها مناس حادة . ولونها صغيرة . قربها الاستعمارية دقيقة مستطيلة . اجنتها ، عند بعض الانواع ، بيضاء وشفافة معتدلة الطول ، وعند البعض الاخر جداد لا عمل لها . قروانها مسنة الانقضاء والسفان والارصاع || الوابها تمانق البيئة وهي غالبا بلون الانثان والقضبان .

٢٠٧٧٥ - **فُشِيَتِيَة** *Phasmidæ* (S). *Phasmidæ* (F), *Phasmidæ* (E).

فصيلة حشرات من مستقيبات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها من احافير العصر الباليوسوني الماتة الى اوائل الاباج الرابع . اما المعاصر منها فلا يقل عن ٢٠٠ نوع معظمها من حشرات الغابات الاستوائية والحارة || من ميقات حشرتها انها جنانية الاشكال والاحجام تمانق الموائل التي تقطن فيها . بعضها يشبه القضبان والبعض الاخر يشبه الازواك || اعرف اجناسها واشهرها الفسمة والفاطيلة .

٢٠٧٧٦ - **فُشُكَة** *Rachitisme* (F). هي الخروعة ، اعليه .

٢٠٧٧٧ - **فُشِيَتِيَتَا ، فُشِيَتِيَتَا** *Mosaïque* (F). *Mosaic* (E).

مرض يكتري ويصيب بعض النباتات انصها التسج والبطاطا والحمس . يقال انه ينتشر بواسطة بعض انواع الارق . مظهره الخارجي بقع سرجية للشكل والرتيب ، لاقباسة المبدع ، تركيب فسج الازواك فخير مظهره اللون



فسة

Statice (F). **٢٠٧٩٥ - فُشَاغُش - فُشَاغُش**
هو الأربيل وأحدته نشفاشة .

٢٠٧٩٦ - فُشَق - فُشَق : تباعد ما بين القرنين .

Roncet (F). **٢٠٧٩٧ - فُشَل الكَرَم**
هو فسالة الكرم ، أطلبها .

Synchronisme (F). **٢٠٧٩٨ - فُشَن** ٥

Synchronism (E). **الفن والإفئان وأسد .**

Synchronique (F). **٢٠٧٩٩ - فُشَتِي ٥**
Synchronistic (E).

Carpoasceae (S). **٢٠٨٠٠ - فُشِيغِيَات**
Carpoascees (F). Carpoasceae (E).
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزقيات . تتميز بأوراقها
المحفونة في الإصان . فصائلها أربع الإردادات
والخساريات والمشرقيات والورشيقيات .

Dicranocère (F). **٢٠٨٠١ - فُشِيغ ٥**
Dicranoceros (E).

نمت قهريني يطلق على كل حيوان منشعب القرن وحل
كل حشرة منشعبة الزبان .

Smilacina (S). **٢٠٨٠٢ - فُشِيغَة ٥**

Smilacine (F). Smilacina (E).
جنس نباتات عشبية ممررة من فصيلة الزقيات قريبة
الشيء من الفُشَاغ . سوطها مدادة كاسية ، أوراقها متعاقبة
خالية الصفحات السفلى . أزهارها عنقودي التجميع
طولي . ثمارها عنبية || تزرع لقرون في معظم المواقع
لاتها لا تنضج البرد . تروبق في الإترية المعتدلة الانساج
الوافرة المواد الغذائية من عضوية وبمعدنية || أنواعها
المعروفة قليلة أشهرها التالية :

٢٠٨٠٣ - فُشِيغَة بَقْلِيَّة ٥

Smilacina oleracea (S). Smilacine légumière (F).
نوع من الفشينة . مهددا بجلد الهند والافئان . ساقها
تطول نحو ١٢ سم . أوراقها متوسطة العدد ، سنانية
الشكل ، تطول من ١٥ إلى ١٨ سم . أزهارها عنقودي
التجميع . أزهارها وردية اللون ، جلبةلية الشكل . ثمارها
عنينة اردوانية يملؤها مواج وردي || تنويرها يستمر
طوال شهر ايار .

٢٠٨٠٤ - فُشِيغَة عُنُقُودِيَّة ٥

Smilacina racemosa (S). Smilacine à grappes (F).
نوع من الفشينة . مهددا بعض مناطق أمريكا الشمالية .
ساقها تطول من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . أوراقها سنانية الشكل
تطول من ٨ إلى ١٥ سم . وتعرض من ٣ إلى ٧ سم .
أزهارها عنقودي التجميع ، كثير العدد ، يطول نحو
١٠ سم . أزهارها بيضاء اللون ، ثمارها عنبية ، ينتجسية
حطرة || تنويرها يستمر من ايار إلى حزيران .

٢٠٨٠٥ - فُشِيغَة تَجْمِيغَة ٥

Smilacina stellata (S). Smilacine étoilée (F).
نوع من الفشينة . مهددا الشرق الأدنى . ساقها متباعدة
الأوراق ، تطول من ٤٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها قليلة العدد ،

مادم الفوك || حسانته مأكولة وهي لا تتحلل من بعض
العناصر الطيبة النافعة .

٢٠٧٨٧ - فُشَاغ مَخْرَنِي ٥ ، صَبِيرِين

Smilax officinalis (S). Salseparilla officinale (F).
Sarsaparilla (E). Salsaparilla (D). Salsaparilla offi-
cinalis (I).

نوع من الفشاق الطبي البري والزراعي . حسانته اهليجية
الشكل ، جوية اللون ، شائعة الاستعمال الطبي . ساقه
ليفية تطول من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . أوراقه بيضية الشكل ،
نصلها جامد النسيج عابق الغمرة اللامعة ، شائك الحافة .

Gousse d'anagrye (F). **٢٠٧٨٨ - فُشَة**
Shell of bean-trafoil (E).

هي حنبلية البنيون تطول نحو ١٥ سم . وتعرض نحو ٢ سم .
زهورها مستديرة ، مفلطحة ، قلبية ، ينتجسية اللون ،
جسمانية المادة اللزنية . ج . فش .

Bryone (F). **٢٠٧٨٩ - فُشَرَا**

هي القاشرا ، أطلبها .

٢٠٧٩٠ - فُشَع

فشع النبات . يست اطرافه . ونشمت الذرة : يست اطرافها
فحان تعلقها .

٢٠٧٩١ - فُشَع ٥ ، مِعَالِيَّة

Podocarpus (S). Podocarpe (F). Chinese yew tree (E). Podocarpus,
Steinleib (D). Podocarpus, Lauro del Giappone (I).
جنس اشجار حرجية وزيينية من فصيلة السنوبريات
الطقسويات . نواحه نحو ٤٠ جميتها من اشجار المناطق
الحارة والمعتدلة . سوطها منتصبه تطول ، حسب الانواع ، من
مترين إلى ٢٥ م . أوراقها متعاقبة ضيقة النصل السليك .
أزهارها الذكورية قدية الشكل اما الانثوية فضيلة التجميع
وهي عمودية او طرفية الارتكاز || اغصانها صلبة لا
يتسربها فساد || اشهر انواعها ما يلي .

٢٠٧٩٢ - فُشَع قَلْبِي الْوَرَق

Podocarpus nerifolia (S). Podocarpe à feuilles de
laurier rose (F).

نوع من الفشع وهو شجرة حرجية سر روية تطول من ١٥ إلى
٢٠ م . اغصانها فارشة لا متدلية . قنبها صوبانية الشكل .
أوراقها مستقيمة الارتكاز ، منجلية الشكل ، تطول
من ١٥ إلى ٢٥ سم . وتعرض من ١ إلى ٢ سم .
زهورها اردوانية اللون ، بحرية المراج .

٢٠٧٩٣ - فُشَع كَبِير الْوَرَق

Podocarpus macrophylla (S). Podocarpe à grandes
feuilles (F).

نوع من الفشع وهو شجرة حرجية وزيينية جميلة الشكل تطول
من ١٥ إلى ٢٠ م . قنبها فارشة لا متدلية . اغصانها انقية الارتكاز
متدلية الأطراف . أوراقها جالسة تطول نحو ١٢ سم .
وتعرض نحو ١ سم . زهورها سنوبرية الشكل ، جوية
اللون تطول نحو ٢ سم .

٢٠٧٩٤ - فُشَع نَاجِي

Podocarpus nageis (S). Podocarpe Nagei (F).

نوع من الفشع وهو شجرة حرجية سر روية تطول من ١٥
إلى ٢٥ م . اغصانها فارشة متدلية الأطراف . أوراقها
بيضية سنانية تطول نحو ٩ سم وتعرض نحو ٤ . نصلها
اغصن الصفحة العليا اصفر الفل . زهورها تكبر
نحو ٢ سم . وهي جوية اللون . ينتجسية المواج .



فشاغ مخرنى



فشع

ملونة || معظمها يعيش تحت الحجارة وبعضها في قرى النسل. قوتها للمواد المضوية والنباتية المتحللة || لشهر أجناسها القصاع.

٢٠٨١٧ - فصص ، فصصية ، رطبة ، قصب

Medicago (S). Luzerna, Lupuline (F). Lucern (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البقوليات. أنواعه عديدة منها البرية والأزراعية جميعها معروضة عطرية. جلورها وندبة قليلة الانقسام تنور نحو ٢٠٠ سم. سويها مستقيمة فراءه. اوراقها مركبة ثلاثية اللويقات ، زنادية الرضلى اي العليا. ازهارها عقدوية التجميع فيها الياض والازرق والبنفسجي. ثمارها حنابل سطروية تغلف البذور. يزورها صغرة ، دقيقة ، لونها الى الجوزة يطعمها مواج اغصر او اصفر || احرف ازهارها واغصانها ما يلي .



فصص مزروعة

٢٠٨١٨ - فصص برية ، قصب

Medicago ciliaris (S). Luzerna sauvage (F). Sea hedgehog medick (E). Hornigel, Dornenkron (D). Medica sativata, Trifoglio tarpaterra (I).
نوع من الفصص البرية تكثر في المزارع المتلفة الرطوية اغصانها الجبال. وهي من اجود النباتات الممرضة العلفية. تتميز بكثافة زيتها وبإعداد حار وريقتها. ازهارها الى الزرة العابقة.

٢٠٨١٩ - فصص مزروعة ، فصصية معروكة ، برسيم حجازي

Medicago sativa (S). Luzerna cultivée, Trèfle de Bourgogne (F). Lucern, Alfalfa, Common medick (E). Luzerna, Blauer Schneckenklee (D). Luzerna, Medica, Merica, Lupinella (I).
هي الفصص الزراعية الكلتية المشهورة بما تحويه من مواد غذائية مبهضة (رابع حلف) || فروها دقيقة متصدة قليلة الحبل. وريقتها قليلة الانقسام المبرحة. ازهارها بنفسجية اللون || تزرع في جميع البلاد المعتدلة الحرارة. تقم في الخيف الواحد نحو ١٢ سم. ترغب في الاثربة المبيقة النور، المعتدلة الانقسام ، اللينة بنامر الكلس والنسفرور والبوتاس. وهي تحشى الاثربة الطينية والطينية الجصية || تحشى في العام الواحد من اربع الى ثمان مرات. اما سبب هذا التفات فيفيد الى الاكلم وموقع ازراعه واسكانية الري || اما متوسط التاج الدائم في الخلف الواحد فتراوح بين ٢٥٠٠ و ٤٠٠٠ كيلو غرام اغصر. وادأ قسنا الاتاج بالكل الى الجاف في الخلف يمكن متوسط محصول الدائم السنوي من ٧٥٠ الى ١٢٠٠ كيلو.



فصص مشجرة

٢٠٨٢٠ - فصص مشجرة ، قصب

Medicago arborea (S). Luzerna en arbre (F). Tree medick, Moon trefoil (E). Baumartiger Schneckenklee (D). Erba medica arborescente, Medica citra (I).
نوع من الفصص البرية وهي جنبة فراء تمل من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. وريقتها بيضيه الشكل ، جميلة اغصان الجصري. ازهارها منجنوبية متصدة العرف الخاف. يقال انها طرية ازهارها تقيد الاسد.



فصصاء

٢٠٨٢١ - فصص

Déplétion (F). Depletion (E).

٢٠٨٢٢ - فصصاء ، قارة الصحرعاء

Mus barbarus (S). Souris de Barbarie, S. du désert (F).
نوع من الجرذ صغيرة اللد موطنها فصص الاجراء يمتد من افريقية الشالية الى الصحرعاء وغينية. طولا نحو ١٠ سم.

سنانة الشكل ، لاطة ، طول من ١٥ الى ١٠ سم. وترعرش من ٢ الى ٤ سم. ازهارها شكلية التجميع. ازهارها منبسطة البتلات ، نجمة الشكل ، خضراء اللون ، يش الحفاف. ثمارها عنية شديدة الحرارة القائمة || تنويرها يستمر من ايل الى حزيران.

٢٠٨٠٦ - فصص

Caieu, Cayeu (F).
سن الثوية وانماها.

٢٠٨٠٧ - فصص ، قصب

Lobe
كل جزء من الورقة او الزرة بالغ التفرض مستدير.

٢٠٨٠٨ - فصص الحصار

هو الاقسن ، اعليه.

٢٠٨٠٩ - فصص التلك

Loge pollinique (F).
Pollinic call (E).
غياه يلف جدرات الطلع في متك الزرة.

٢٠٨١٠ - فصص حيداري

Lobe pariétal (F).
Parietal lobe (E).

٢٠٨١١ - فصص كتي

Lobe maxillaire (F).
Maxillary lobe (E).

٢٠٨١٢ - فصصاء

القص حب الزبيب. الواحدة فصصاء.

٢٠٨١٣ - فصصاء ، فصص

Saignée (F). Bleeding (E).
فتح حرق الدم.

٢٠٨١٤ - فصص

Syrinx, Siringe (F). Syrinx (E).
الفصص عضو الصوت في الطير. مركزه عند انشعاب القصبة الرئوية.

٢٠٨١٥ - فصص

Thorictus (S).
Thoricta (F). Thorictus (E).
جنس حشرات من فصيلة الفصصيات ورتبة غفريات الاجنحة. انواعه المروقة قليلة البد منتشرة في بعض مناطق حوض البحر المتوسط و اغصانها المتصدة من لبنان الى اليونان || اجسامها صغيرة ، معتدلة الانحداب ، طول نحو ٣ م. وروسها غروية. ميوتا بارزة. ثآنيها وبلاصها نظامية. قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف و جانبية الاركان. كواسلها قصيرة محدبة. انماها مائلة و لافة. قوائمها لظيفة. ازهارها وسيدة اللون ، تكثر لها الشفصاء المراء فالدبة فالجوزة || تعيش تحت الحجارة. سرسها دجوي. قوتها للمواد المضوية والنباتية المتحللة.

٢٠٨١٦ - فصصيات

Thorictidae (S).
Thorictidae (F). Thorictidae (E).

فصيلة حشرات من غفريات الاجنحة. اجناسها واثرها المروقة قليلة البد ، اصحابها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة ، معتدلة التطيط ، طول من ٤ الى ٤ م. وروسها غروية الشكل. ميوتا بارزة. ثآنيها وبلاصها نظامية. قرونها الاستشعارية دبوسية ، مركبة من ١١ فصص. كواسلها محدبة. انماها لافة. قوائمها لظيفة. ارانها حاسبة القتل. انواعها

Sépale (F). Sepal (E).

٢٠٨٣٢ - فصيلة

ورقة كأس الزهرة. ومنهم من سماها كأسية.

Métatars (F).

٢٠٨٣٤ - فصيلة الرُسع الأوتى

Metatarsus (E).

هي الرُسع، أطليه.

Phasmoptera (S).

٢٠٨٣٥ - فصليات

Phasmoptères (F), Phasmoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة مستقيبات الجناح. فصائلها وأجناسها وانواعها كثيرة البدن معظمها كبير القد لاقياسي الشكل والون || وهي تتميز بتأثيرها الضعيف وبسيفانها القصيرة التي لا يمكنها من القفز، يمكن أحياناً كبير الحجم يشبه بر الحنطة.

٢٠٨٣٦ - فصيلة هي الفاصولاء، أطليه.

Cisticole (F).

٢٠٨٣٧ - فصيلة

هي الكروان طائر من الدخليات، أطليه.

٢٠٨٣٨ - فصيص

صوت الجنادب.

Lobule

٢٠٨٣٩ - فصيص**٢٠٨٤٠ - فصيصي، فليبي**

Lobulaire, Lobulé (F), Lobular (E).

ما كان شكله أو تفرّضه يشبه الفص أو الفتلة.

Polystigma (S).

٢٠٨٤١ - فصيصة

جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات تتميز ببنية دمية جامدة القصر الآخر. أصنافها كثيرة. ينفذ بسيط التركيب، أحليبي الشكل، ثنائي العدد، تتجمعه تكات يفضية لونها إلى السرة الفاتحة || له نومان مزيان هما فصية الخوخ وفصية الورد.

٢٠٨٤٢ - فصيصة الخوخ

Polystigma rubrum, Libertia rubra, Polystigmia rubra (S).

فطر مجهرى يصيب أوراق الخوخ فيذبلها ويؤذي الشجرة. مظهره الخارجي يقع لاقية الشكل والحجم تملو نصل الاوراق فتبدو صفراء اللون ثم حراء بنفسجية تملو خلايا النسيج تتسحب ذبول الاوراق واعمالها بالكم ثم ازهار الشجرة في تشرن بعد ان تفقد عليها دورها الحولية الليلية. يكاثف باستعمال سائل يورود المحلول ١ ٪ ثم يؤد القعد. ومن الانفصل اعادة النسيج مرة ثانية تكون بعد الاولى بثلاثة اسابيع.

٢٠٨٤٣ - فصيصة الورد

Polystigma ochraceum, Polystigmia (S).

فطر مجهرى يصيب أوراق الورد وهو شديد الشبه بفصيص الخوخ || مظهره الخارجي يقع لاقية الشكل والحجم تملو نصل الاوراق لونها الى الجوزة الباقية تسحب خلايا النسيج وتصبغ الاحياء الباكر الذي يفسم الشجرة بعد ان يفقد عليها اتران دورها الحولية || يكاثف كالخوخ باستعمال سائل يورود المحلول ١ ٪

٢٠٨٤٤ - فصيل

الفصيل: ولد الهيمية اذا فصل عن رضاع امه.

وذئها ١٢ سم. ثوبها الى الصبغة الصناعية، يملو ظهوها عشرة خطوط سم رقابية. بطنها وخواتي جرمها بيض. جبرها سرداب قصب عديد الانفاق والمناظل تحزن فيه ما تدمر من حيوي وجنور.

Coprinus (S).

٢٠٨٢٣ - فصيلة

Coprini (F), Coprinus (E).

جنس فطور من فصيلة الشاريتيات. انواعه المعروفة قليلة البدن اصنافها بعض مناطق الشرق الاوسط واروية. تعيش في التربة على الدبال وعلى المواد النباتية المنحلة في المراتق المنحلة الرطبة. معظم انواعها سريع الطيب والازوال. بعض انواعها كثيف التجميع، كشته تدم من ١٥ الى ٢٥ ذوباً || اشهر انواعها الفصيلة القرفة والفصيلة السوداء.

٢٠٨٢٤ - فصيلة سوداء

Coprinus atramentarius (S).

Coprini noir d'encre (F).

نوع من الفصيلة المأكولة. لحيتها متصلة الصنف. اروسيتها قمية الشكل، معتدلة الحجم، ممراد اللون، يملوها موج اريد اسود. ساقها معتدلة الطول، ريداء اللون، يكتنفها طوق شفافى المادة لاقياسي الارتكاز.

٢٠٨٢٥ - فصيلة قرفة

Coprinus comatus (S), Coprin chevelu (F).

نوع من الفصيلة المأكولة. لحيتها جيدة الصنف في اول بعدها ثم لينة عند الادراك التام. اروسيتها كبيرة القد، كثنائية الشكل، لونها الى الوردية الموشحة بالاسمر العاني. ساقها معتدلة الطول، طحلاء اللون، يكتنفها طوق كالسوار لاقياسي الارتكاز يكثف ويؤذي في القسم الاعلى.

٢٠٨٢٦ - فصيل

نوع من المغرب ويقل ولدها الصغير.

Cresels (S).

٢٠٨٢٧ - فصيلة

Créséis (F), Cresels (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل وفصيلة اللقبايات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع مجار البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة بما فيها البحر الابيض المتوسط. جميعها مية تعيش بعيداً عن الشطوط. اسرابها وافرة العدد || اجسامها صفراء، اريدتها او زعنجانها قليلة الانفلاق. اصداؤها خرزوية اللون، مسقة الاطراف، شائعة، سريعة الطيب.

Phosphore (F).

٢٠٨٢٨ - فصفور

هو الفسفور، أطليه.

٢٠٨٢٩ - فصيصة هي الفصصة، أطليه.**٢٠٨٣٠ - فصل، ققم**

Sevrer (F), To wean (E).

فصل الخليب من الرضيع.

Saison (F), Season (E).

٢٠٨٣١ - فصل

الفصل زمن من زينة السنة الاربية وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء.

Disjonction (F).

٢٠٨٣٢ - فصل

Severance of causes (E).

هو في قانون اللامعات الفصل بين قضيتين كانتا متصلتين حتى تنظر كل منها على حدة.



فصيلة سوداء



فصيلة قرفة



فصيلة



فصيلة الخوخ



فصيلة الورد

٢٠٨٥٢ - فصية

Protea (S).
 Protée (F). Silver tree (E). Proteusstrauch,
 Silberbaum (D). Protea, Legno argentino (I).
 جنس نباتات جنية ممرة من فصيلة الفصيات. أنواعها
 عديدة معظمها بري وبعضها زينة. أوزانها صغيرة
 الحجم، كاملة النصل الفضي، أزهارها وريسية، طرفية،
 ترشح اللسوق بنزارة وهي كبيرة القند، أرجوانية اللون
 أو استنفية أو ليلية، أخشابها خفيفة متينة تستعمل في
 عدة صناعات || أشهر أنواعها ما يلي.

٢٠٨٥٣ - فصية بهية

Protea speciosa (S).
 Protée superba (F).
 نوع من الفصية وهي جنية زينة تملو نحو ٢٠٠ سم.
 أوزانها مستقيمة قصيرة الزناد، نصلها بيضي الشكل بطول
 من ٨ إلى ١٢ سم || أزهارها وريسية، خضراء، كبيرة
 القند، بيضاء اللون، حراء الرض، قناباتها ملغنية
 الصفحة، كثيفة الاهداب المزينة، صلب الخشار.

٢٠٨٥٤ - فصية حرسية

Protea cynaroides (S).
 Protée ardent (F).
 نوع من الفصية وهي بجلة زينة سرية تملو من ٥٠
 إلى ٦٠ سم. أوزانها مستقيمة مستديرة الزناد، نصلها بيضي
 الشكل بطول من ٨ إلى ١٢ سم. صفحت خلية البشرة
 الفصية || أزهارها وريسية، خضراء، حراء اللون أو
 وردية، حبيها حبيم كرز الأرضي شوكي الكبير القند.

٢٠٨٥٥ - فصية مستطيلة الزرق

Protea longifolia (S). Protée à longues festilles (F).
 نوع من الفصية وهي بجلة زينة تملو نحو ١٠٠ سم.
 أوزانها سنانة مستطيلة طويلا براوح بين ١٥ و ٣٥ سم.
 أزهارها بنفسجية عاقبة، قناباتها بحرية الخضار بطولها
 ترشح لوزق || أزهارها يستمر من أيار إلى آب.

٢٠٨٥٦ - فصية مغنرية

Protea mellifera (S).
 Protée mellifère (F).
 نوع من الفصية وهي جنية زينة تملو من ٢٠٠ إلى
 ٣٠٠ سم. أوزانها خلية تطلو من ٨ إلى ١٢ سم. وتعرض
 ١٠ إلى ١٥ سم. نصلها مائل البشرة، ذلق الزام
 الأخير || أزهارها وردية أو بيضاء اللون، كبيرة القند،
 غزيرة اللسوق اللثري، قناباتها دقيقة الصفحة الداخلية
 وهي حراء اللون مجلعة بالاسود || أزهارها يستمر من
 كانون الثاني إلى نيسان.

٢٠٨٥٧ - فصية

Jus de raisin (F).
 Juice of grapes (E).
 عصير العنب يتم ويحفظ في القناني الخشكة الباردة فلا
 يفسد.

٢٠٨٥٨ - فصية

Pollination (F). Pollination (E).
 الفتلح زبن ظهور الطلع وانتشاره عند النبات.

٢٠٨٥٩ - فصية

Autogamie (F).
 Autogamy (E).
 هي الانجاب الذاتي الذي تأثيره مركز على تأخير مدقة الزهرة
 من ولج أسيها.

٢٠٨٦٠ - فصية

Mycétogénèse (F).
 Mycetogenesis (E).
 الانتظار علم يبحث في إثبات لتطور ونشها.

٢٠٨٥٥ - فصية

Famille (F). Family (E).
 الفصيلة في تصنيف الاحياء هي جماع اجناس لها صفات
 مشتركة. أو جماع الاجناس التي تتشابه بخصائص البناء
 المشتركة. وتربيب الفصيلة يأتي بعد الرتبة وقبل الجنس.
 راجع تصنيف.

٢٠٨٥٦ - فضاء اوسط

Mésosphère (F).
 Mesosphere (E).
 الفضاء الاوسط أو الوسطي طبقة من الجو تقع بين الفضاء
 السديمي والفضاء الشاردي. تبدأ هذه الطبقة من ارتفاع
 ٣٠ كيلومتر من سطح الأرض، لما سماكتها فتراوح من
 ٤٠ إلى ٨٠ كيلومتر وذلك لانها تتنير مع فصول السنة
 ومع المواسم نظراً لانفعالها المكسي بالعوامل الحركية والحرارة
 وسرعة الصوت.

٢٠٨٥٧ - فضاء سديمي

Stratosphère (F).
 Stratosphere (E).
 الفضاء السديمي طبقة من الجو تقع بين الفضاء الكوني
 والفضاء الاوسط. تبدأ هذه الطبقة من ارتفاع ١٢ كيلومتر
 من سطح الأرض. سماكتها نحو ٢٥ كيلومتر. تتميز
 بكثرة مجاري الهواء وبالحارة القليلة الفروقات اذ انها
 تراوح من ٥٠ إلى ٦٠ درجة ستيفراد تحت الصفر.

٢٠٨٥٨ - فضاء شاردي

Ionosphere (F).
 Ionosphere (E).
 الفضاء الشاردي أو الدلفي طبقة من الجو الخارجي تقع
 بعد الفضاء الاوسط وتمتد عمقاً الى حيث تنقطع العوامل
 الشاردية.

٢٠٨٥٩ - فضاء كوني

Troposphere (F).
 Troposphere (E).
 الفضاء الكوني أو الجو الارضي طبقة من الجو تغطي الكرة
 الارضية. تبدأ من سطح الأرض حتى ارتفاع ١٠ إلى ١٢
 كيلومتر. تتميز بكثافة الهواء وبالحار والرياحات
 المختلفة وبالزوايا والنيوم والامطار.

٢٠٨٥٠ - فضة

Argent (F). Silver (E).
 معدن ابيض اللون يراق لا يتأثر بالماء والماء. يذوق جميع
 المعادن في دفع الحرارة والتور وفي ايسالته الكهربائية.
 رمزها (ف- Ag) وزنها الذري ١٠٧,٨٨، قتلها الذري
 ١٠٥,٥ تنصهر في نحو ١٠٠٠° سع || وهي
 متوصلة اللينة قابلة للتشديد والطرق والمقل. مرهنا
 الانسان واستخدمها منذ اقدم العصور. توجد في الطبيعة
 اما في نقية بصورة بولورات أو ذرات مختلفة الاحجام
 مرصوة داخل يمد الصخور، أو مزوجة بتناسر مختلفة
 كالكبريت والزنك والبروم والكلور || ام
 مصادر استخلاصها في العالم كبريتيد الفضة الذي يحوي
 نحو ٨٦٪ من الفضة الصرفة وكلوريد الفضة الذي
 يحوي نحو ٧٥٪.

٢٠٨٥١ - فصيات

Proteaceae (S).
 Protéacées (F).
 فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة، حديدات القمامة،
 مرتقنات البيض. أنواعها زهاء ١٠٠٠ متنبها البلاد
 الحارة. فيها الاشجار والشجيرات والجنابت والاعشاب.
 أوزانها متناظرة مستنسة. أزهارها خشوية وريامية الاجزاء،
 سبيلة أو متفردة التجميع. ثمارها مختلفة الاشكال
 والاحجام والخواص بعضها مأكول.

Cryptogamique (F). - ٢٠٨٧٥ **فُطْرِيّ**
Cryptogamic (E).
نمت تعريفي توصف به الاصنام المتأينة من الفطور .

Fongiforme, Fongoide (F). - ٢٠٨٧٦ **فُطْرِيّ**
Fungiform, Fungoid (E).
ما كان على شكل الفطر او هيبته .

Champignons (F). **Fungus (E).** - ٢٠٨٧٧ **فُطْرِيَّات**
شعبة من النباتات الدنيا تنتمي الى صف المشريات . تشمل اربع رتب وهي البويضيات والدماعيات والزقيات وانحاضيات وفي كل منها مراتب وفصائل وانجاس وانواع عديدة .

Bale de myrte (F). - ٢٠٨٧٨ **فُطْرِيَّة**
Berry of myrtle (E).
هي حبة الاس . ج. فطس .

Hyménomycètes - ٢٠٨٧٩ **فُطُور غِشَائِيَّة**
هي الفشائيات فطور من رتبة الدماعيات منها الفنايقين وانجاس اخرى عديدة .

- ٢٠٨٨٠ **فُطُور مَعْدِيَّة**
هي الفطريات فسيلة فطُور من الدماعيات .

Adénophore (F). - ٢٠٨٨١ **فُطْرِيَّة**
هي الاسنفورة ، اطلها .

Autogame (F). - ٢٠٨٨٢ **فُطِيح**
Autogamous (E).
نمت تعريفي يوصف به كل نبات اغصابه فطاحة .

Sanderling - ٢٠٨٨٣ **فُطْرِيَّة**
هي الذرجة ، اطلها .

- ٢٠٨٨٤ **فُطْرِيَّة**
مفطر ذوات الخف .

Prion (S). **Prion (F).** - ٢٠٨٨٥ **فُطْرِيَّة**
Prion (E).
جنس طير من كفيات القدم وفصيلته جلديات اماء .

انواعها المعروفة قليلة العدد . اطانها تمتد من بحار القطب الجنوبي الى المحيط الاطلسي حتى تقوم اذوية || اجسامها مستقلة القند . اجنحتها مستطيلة ، لاحفة ، ذلقة . اذنانها غشوية الشكل تتألف من ١٢ رلفة . متقيدة ضلعية ، مستقلة الطول ، متعقبة البهرة ، تملو سطوح الماكها العليا بعض الرقام || اطيائها تختلفت مع الانواع . اعرف انواعها فطيمة اريال وفطيمة جمدة .

Prion ariel (S). - ٢٠٨٨٦ **فُطْرِيَّة اُريال**
Prion ariel (F).
نوع من الفطيمة . ثوبها الملوي الى الزرقه الشبه المراج .

صدرها وبطنها واغنيكها الى البياض الساجي || اطانها المحيط الاطلسي . يكثر وجودها في زمن التساقط والخفانة على المهادج الافريقية والاسبانية .

Prion vittatus (S). - ٢٠٨٨٧ **فُطْرِيَّة مُجَدَّة عَمَك**
Prion orné (F).
نوع من الفطيمة . ثوبها الملوي الى الزرقه الزمادية المراج .

يملوها في جناحيها وذنبها جميع اسود . صدرها وبطنها الى البياض الاغبر || اطانها القطب الجنوبي وجواره .

Sevrage (F). **Weaning (E).** - ٢٠٨٨١ **فُطَام**
انتقال اولاد الحيوانات من دور الرضاعة الى دور الانضواء بغير الحليب .

- ٢٠٨٨٢ **فُطَح**
عرض في وسط الرأس .

Polliniser (F). - ٢٠٨٨٣ **فُطَح** ، **تَبَع**
to pollinate (E).
فطح وزبح وأبر : نقل غبار الطلع من متك زهرة الى سيمعها او ميام غيرها من الانواع .

- ٢٠٨٨٤ **فُطَح**
قيل الفطيمس " دهر " لم يُفْتَقَر فيه الناس بعد . وقال ابو حبيبة " هو زمن كانت الحبايرة فيه رطبة " . الفراق بين الصغبيين يفقد عيليارات السنين لان الزنن التي كانت الحبايرة فيه رطبة يعود الى اوائل الحقبة السحيقة من اناج ما قبل الكمبري . راجع حياة .

- ٢٠٨٨٥ **فُطَح**
Proton
وضع مصري للدلالة على الذؤفة .

Champignon (F). - ٢٠٨٨٦ **فُطْر**
Mushroom, Fungus (E).
كل نبات من غشيات الريح ينتمي الى شعبة الفطريات . ج. فطور .

Ophiobius (S). - ٢٠٨٨٧ **فُطْر السَّاق**
فطر مجهري من اذريات ركب الحنطة وغيرها في اسافل سوقها فيصيب لها مرض الساق .

- ٢٠٨٨٨ **فُطْر الصُّوْتَان**
هو الصفوان فطر من السيات ، اطله .

- ٢٠٨٨٩ **فُطْر اَلِيَمَة**
Acrospace (F).
Acrospace (E).
جنس فطور مجهرية تركب قم التجليات ، اي اطرائها الثانية ، فتؤذيها .

- ٢٠٨٩٠ **فُطْر الكَبِد**
Fistuline (F).
هو الفطيسولينا فطر مأكول من السميات . يعيش حل جلدوع بعض الاغيار الخرجية في المواقع الخليلية الرطبة . وهو كبير القند ، كبدي الشكل ، حشطي اللون ، حابق القاعدية .

- ٢٠٨٩١ **فُطْر المَرَجَّان**
Clavaria (F).
هو اللهبسية ، اطلها .

- ٢٠٨٩٢ **فُطْر سَاقِ الثَّرَوِج**
Ophiobolus graminis (S).
نوع من فطور الساق يركب سوق التجليات فيؤذيها .

- ٢٠٨٩٣ **فُطْر مَالِطَة**
Champignon de Malte (F).
هو الطرثوث ، اطله .

- ٢٠٨٩٤ **فُطْر مَرَجَّاني**
Clavaria corall (F).
هو اللهبسية المرجانية ، اطلها .



فطيمة

٢٠٨٩٥ - قَعْرِيةٌ شَعْرَاءُ *

Dasyllirion acrotichum (S). *Dasyllire cheveli* (F).
نوع من القعرية الزرقية . ساقها قصيرة . أوراقها كثيفة
التجميع طول نحو ١٥ سم . وتعرض نحو ١ سم . نصلها
جميل الخضار الزاوي ، شاتك الحافة ، أصفر الشوك .
ينتهي بمصلة من الياف الاسفرتيق . ازهارها الى
الخضار البتسقي . تنورها يستمر طوال الصيف .



فَقْ

٢٠٨٩٦ - قَعْرِيةٌ مُشَارِبَةٌ

Dasyllirion serratifolium (S). *Dasyllire denté* on
sle (F).
نوع من القعرية الزرقية . ساقها تملو نحو ٣ أمتار .
أوراقها لينة متراكبة طول من ٧٥ الى ١٠٠ سم . وتعرض
نحو ٣ سم . نصلها أخضر اللون ، أزرق المويج ، مشاري
الحافة ، تسنيت نحو ٣ سم . سبلها الزهرية متصلة القدة ،
ازهارها الى الخضار الباقي اللامع . تنورها يستمر طوال
فصل الصيف .



فَر

٢٠٨٩٧ - قَعْرِيةٌ تَجِيلِيَّةٌ

Dasyllirion graminifolium (S). *Dasyllire graminoides* (F).
نوع من القعرية الزرقية . ساقها تملو من ١٥٠ الى
٢٥٠ سم . أوراقها لينة متراكبة طول نحو ١٥٠ سم .
نصلها عصي الشكل ، جميل الخضار اللامع ، قصير
الشوك الميثر ، وينتهي بمصلة صغيرة من الياف الاصفر .
ازهارها الى الخضار البليتات العادم القدة . تنورها يستمر
طوال فصل الصيف .

٢٠٨٩٨ - قَعْمٌ ، زَهْرَةُ التَّكْبُوتِ

Anthericum Phalangium (S). *Phalangère*, *Anthérie* (F).
Spider-wort (E). *Kleine Grasililla* (D). *Antico* (I).
جنس نباتات عشبية جذمورية مصرة من فصيلة الزنبقيات .
انواعه قليلة العدد تتميز بأوراقها القرصية الانتساب
المزايية للنصل || احرف انواعه الزرمانية الزرقية ما يلي .



قعرية شعراء

٢٠٨٩٩ - قَعْمٌ زَلْبَكِي الزَّهَرُ *

Anthericum liliago, *Phalangium liliago* (S). *Phalan-*
gère à fleur de lis (F).
نوع من القعم ، فزوبه ثلاثة . موه شمراغية مرسعة تملو من
٣٥ الى ١٠٠ سم . أوراقه قرصية مزايية النصل
طول من ٣٥ الى ٦٥ سم . وتعرض نحو ٦ سم . ازهار
حامية الاكازار حاملة البرق ، يضاء اللون طول نحو
٢ سم . اسديتها مقوصة || ازهاره يستمر من أيار الى
حزيران .

٢٠٩٠٠ - قَعْمٌ مُتَشَعَّبٌ

Anthericum ramosum, *Phalangium ramosum* (S).
Phalangère rameuse (F).
نوع من القعم . ساقه شمراغية فزواء تملو من ٣٥ الى ٦٥
سم . أوراقه قرصية الانتساب مزايية النصل طول من
٤٠ الى ٣٥ سم . وتعرض نحو ٤ سم . ازهارها تاجية حاملة
البرق يضاء اللون طول نحو ١ سم . اسديتها جالسة .
ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .



قعم زنبقي الزهر

٢٠٩٠١ - فَنَاءٌ ، قَعْرَاءُ ، قَعْمٌ

Epanouissement (F). *Blowing*, *Opening*, *Expansion* (E).
فنا وأفنى الشجر : تفتح ثور . والقفا هو سالة الازهار
المتفتحة .

٢٠٨٨٨ - قَطْ * ، فَيْسَلُ الْبَحْرِ

Tricheus (S). *Morse*, *Éléphant de mer*, *Cheval marin* (F).
Walrus (E).
جنس حيوانات بحرية لبونة من فصيلة الفظيات أو فيلة
البحر . له نوايا الفظ الشائع والفظ النبطي || والفظ
يشبه القنفذ لكنه اكبر جنة وأقيع منظرأ . طول الذكر
نحو ٦ أمتار وله نابان مستطيلان متدليان من فكه الاعل .
أعطانه مناطق الجليد الدائم . يعيش أسراباً متوسطة العدد .
قوته الاسماك والاسداف .

٢٠٨٨٩ - قَطَبَاتٌ ، فَيْسَلَةُ الْبَحْرِ

Trichocidae (S). *Trichocidae* (E).
Trichocidae, *Odobacnidae* (F). *Trichocidae* (E).
فصيلة حيوانات بحرية لبونة من رتبة زصفريات الافدام ،
وهي وحيدة الجنس ثنائية النوع فيلها تستجر من سباع
البحر .

٢٠٨٩٠ - قَسَائِيَّةٌ

Efficacité (F). *Efficacy*, *Effectiveness* (E).

٢٠٨٩١ - قَعْرٌ * ، زَنْبَقُ الْفَرْسِيَّةِ ، زَهْرَةُ مَحْبُوبَةٍ

Agapanthus (S). *Agapanthe*, *La africain*, *Tubereuse*
bleue (F). *Blue african lily*, *Blue lily of the Nile* (E).
Afrikanische Liebesblume, *Maube Tuberosa* (D).
Tuberosa turchina (I).
نبات عشبي جذموري معمر وسيد الجنس والنوع من
فصيلة الزنبقيات ، فزوبه حديدية . أوراقه صفوية للشكل
طول من ٢٥ الى ٣٥ سم . وتعرض من ١٢ الى ١٨ سم .
شراخه يملو من ٤٥ الى ٨٥ سم . وينتهي بقرص من الزهر
صيواني التجميع يمد من ١٥ الى ٣٥ بوصة حاملة البرق
تطول من ٣ الى ٤ سم . ألوانها تختلف مع الفزوب كثير
فيها الأزرق والايص || ازهاره يستمر من تموز الى
آب .

٢٠٨٩٢ - قَعْرِيةٌ

Dasyllirion, *Bonspartes* (S). *Dasyllire* (F).
جنس نباتات برية وزرقية من فصيلة الزنبقيات ، انوعها
حديدية جميعها من نباتات المناطق الحارة . اوراقها وسقها
لبنية التركيب . اوراقها ضيقة النصل ، مستطيلة ،
متراكبة ، متدلية . ازهارها سنبل التجميع يرتكز على
شمراخ منصعب مستطيل || تعيش في جميع الاثربة أما
تختفي كثرة الكلس والرطوبة والمعارض الثلالية الباردة .
احرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٠٨٩٣ - قَعْرِيةٌ بَحْرِيَّةٌ

Dasyllirion glaucophyllum (S). *Dasyllire glauque* (F).
نوع من القعرية الزرقية . ساقها تملو نحو ٤ أمتار .
أوراقها متراكبة لينة طول من ٦٥ الى ١٥٠ سم . وتعرض
من ١٥ الى ٢٥ سم . نصلها بحري اللون ، شاتك الحافة
المسنة . أصفر التسنين . سبلها كبيرة القدة منطقة الزام
الايصر . ازهارها الى الخضار الازرق المويج . تنورها
يستمر طوال الصيف .

٢٠٨٩٤ - قَعْرِيةٌ تَرْغُونِيَّةٌ

Dasyllirion longistimum (S). *Dasyllire tétragone* (F).
نوع من القعرية الزرقية . ساقها تملو نحو ٢٥٠ سم .
أوراقها متراكبة لينة طول من ١٢٥ الى ١٨٥ سم . نصلها
ورباعي الزوايا يعرض نحو ٦ سم . لونه الى الخضار البليت .
سبلها الزهرية كبيرة القدة . ازهارها الى الخضار الباقي .
تنورها يستمر طوال الصيف .

Vertébrés (F).

٢٠٩١٥ - **فَقَارِيَّات**

هي الفقريات ، اطلبا .

٢٠٩١٦ - **فَقَاش البُنْدُق**

Casse-noix vulgaire (F).

طائر يلقى الحشاش ، اطلبا .

Bulle (F). Bubble (E).

٢٠٩١٧ - **فَقَاعَة**

Tétron (F). Puffer (E).

٢٠٩١٨ - **فَقَاقَة**

هي النفقة ، سمكة نهريّة تكثر في النيل والنيجر ، وقيل الفقاقة طائر (كذا) .

Eucinetus (S).

٢٠٩١٩ - **فَقَالَة**

Eucinéte (F). Eucinetus (E).

جنس حشرات من فصيلة الفقاقيات ورثية غديسات الاجنحة . انواعها المعروفة ١٢ اصلها من معظم المناطق الشمالية وجبال المناطق المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، مبطلة ، شبه اطيالية الشكل ، تعلو من ٣ الى ٧ م . رؤوسها صغيرة الجرم ، مستعرضة القفن . عيونها صغيرة ، بارزة . تأثيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية غليظة او قلاوية . كواسلها شبه مربعة . احمادها لاسفة ، رباعية الاضاد النحيلة القاطية . قوائمها نشيطة . اثارها ملونة يكثر فيها البني || الجملانة منها والبرقة تعيش في الجملانة وفي الاشجار النخرة على المواد النباتية المتحللة .

Eucinetidae (S).

٢٠٩٢٠ - **فَقَالِيَّات**

Eucinetidés (F). Eucinetidae (E).

فصيلة حشرات من غديسات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة بمجموعة العدد ، منتشرة في معظم حراج البلاد الباردة والمعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، شبه اطيالية الشكل ، مبطلة ، تعلو من ٣ الى ٧ م . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة القفن . عيونها صغيرة ، بارزة . تأثيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية تساعية . الفصل . كواسلها شبه مربعة . احمادها لاسفة . قوائمها نشيطة . ارساغها خماسية المقل . اثارها ملونة || جميعها دامة تعيش على المواد النباتية المنحلة || اشهر اجناسها الفقاقة .

٢٠٩٢١ - **فَقَح** قح الجرو : قح صيله .٢٠٩٢٢ - **فَقَح**

قح الشجر : أنشقت عيون ورقه وبدت اطرافه .

٢٠٩٢٣ - **فَقَحَة**

هي سلفة الدبر .

Cuscuta à odeur suave (F).

٢٠٩٢٤ - **فَقَد**

هو الكشوث الطمر ، اطلبا .

٢٠٩٢٥ - **فَقْد البَصَر** ، **فَقْدَان البَصَر**

Caligatio

Creuser (F). To hollow (E).

٢٠٩٢٦ - **فَقَر**

قعر الأرض : قفرا . والفقرة : ج قعر .

Anémie (F). Anæmia (E).

٢٠٩٢٧ - **فَقَر الدَّم**

عدم كفاية الدم اما من حيث تركيبه او من حيث مقداره . اسبابه عديدة اشيعها اللل والنود في المدة او الاما .

Epanthe (F). Epanthous (E).

٢٠٩٠٢ - **فَقَار**

نمت تدريجي يطلق على كل ما يعيش طقيلياً على الارض .

٢٠٩٠٣ - **فَقَر** ، **فَقَم**

الفقر والققم : ازرار الورد عندما تنفتح .

٢٠٩٠٤ - **فَقُو**

هو الياسم ، اطلبا .

٢٠٩٠٥ - **فَقْرَة**

Fragrance (F).

هي لرائحة المتحبة ، يقال فقرة الطيب .

٢٠٩٠٦ - **فَقَاح**

Inflorescence (F).

فقاخ وفقحة كل لبت : زهره .

٢٠٩٠٧ - **فَقَاح**

هو ذمرة الربيع ، اطلبا .

٢٠٩٠٨ - **فَقَاح** ، **فَقْر**

Sideritis (S).

Sideritide, Siderite, Crapaudine (F). Iron wort (E). Gledkraut (D). Basilica salvatica (I).

وأحدته فقاقة . جنس نباتات عشبية برية طيبة من فصيلة الفقيوات . مهدد المناطق الاسيوية والاروبية للمعتدلة الحرارة .

٢٠٩٠٩ - **فَقَاحَات**

Spandillidae (S).

Spandillidés (EF). Spandillidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الياشيم الرباعية ، حامدات الخاص . اجناسها وانواعها عديدة معظمها من احافير الاراضي النائية || انتشروا في معظم بحار العالم اخصها بحار البلاد الحارة || امرف اجناسها المعاصرة واشهرها الفقاقة والنفسية .

٢٠٩١٠ - **فَقَاحَة**

Spandylus (S).

Spandyle (F). Spandylus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الياشيم الرباعية ، حامدات الخاص وفضيلة الفقاقيات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اسدانها شبه بيضية الشوزن ، لانسارية المصاريع الشائكة تعلوها زعمات متباينة الاستطالة ، دقيقة الاطراف القوية || تعيش لاصقة بالصخور المتوسطة التور .

٢٠٩١١ - **فَقَار الجَوْزَاء**

Baudrier d'orion (F).

فقار الجوزاء كواكبها ، وهي الثلاثة المستعرضة الرباسية في وسط الجوزاء . تسبها العرب النظم وتسميها ايضاً نطاق الجوزاء ومنطقة الجوزاء ويد الجوزاء . وهي مثل في الانتظام والالنتام .

٢٠٩١٢ - **فَقَار الشَّجَاع**

فقار الشجاع كواكب .

٢٠٩١٣ - **فَقَارَة** ، **فَقْرَة**

Vertèbre (F).

Vertebra (E).

هي الفقرة ، اسطوانة عظمية صغيرة يتألف منها العمود الفقري الحيواني .

٢٠٩١٤ - **فَقَارِيَّ**

Rachiden (F).

Rachidian, Spinal (E).

نمت تدريجي يوصف به ما هو مختص بسلسلة الفقار .



فَقَاة

٢٠٩٥٨ - فُل * ، يَاسَمِين زَيْتُونِي

Jasminum sambac, Mogorium sambac (S), Jasmin sambac, J. d'Arabie (F), Arabian jasmine, Double jasmine (E), Arabischer Jasmin, Sambac Jasmin (D), Mugarino doppio, Gelsomino d'Arabia (I).

جنس نباتات زَيْتُونِيَّة - سَبْرُونِيَّة ، معمرة من سبط الياسمينيات وصفيّة الزيتونيات . اولاه اربعة جميعها جنات فراء صغيرة اللد تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها كاملة متقابلة بيضبة الشكل . فصلها جاسد الصفحة ، ملس البشرة شديد الخشاش اللامع . ازهارها بيضاء اللون ، ذكية العرف المطر الفواح || اشهر اولاه القفل المكسب الذي يتميز بازهاره الكبيرة المتراكبة البتلات العديدة المستعرضة . ثم القفل الطويق وهو صغير الازهار ، خاسي البتلات المنذغة . والقفل يتكاثر بالتمثيل وزراعه لا تتلصق بتناية خاصة .

٢٠٩٥٩ - فُل * ، فَلِيل

Faille, Barfe, Géoclase, Paraclose (F), Fautz (E). تصدع في الصخور يسبب انشقاقها .

٢٠٩٦٠ - فُل * حَوْضِيّ

Fosse d'effondrement (F), Trough fault (E).

٢٠٩٦١ - فُل * حَادِي

Faille normale (F), Normal fault (E).

٢٠٩٦٢ - فُل * قَاغِي

Faille béante (F), Open fault (E). تصدع واسع النق .

٢٠٩٦٣ - فُل * مَدْرَج

Faille à gradins (F), Step fault (E). تصدع متتابع الشقوق .

٢٠٩٦٤ - فَلَاحَة ، فَلَاحَة ، سَهْب

Steppe ج. فلوات وياني وسهوب. سهل مَرَامِيَّة الاطراف شاسعة اللدى صحراوية التبوّث.

٢٠٩٦٥ - فَلَاحِي

Steppique (F), Steppical (E). ما هو غنص بالفلاحة كالسط والتبوّث .

٢٠٩٦٦ - فَلَاحِيَّة

Charrue fossoyeuse, Charrue rigoleuse (F).

٢٠٩٦٧ - فَلَاح

Laboureur, Cultivateur (F), Husbandman, Cultivator (E). من ماث حرت التربة وزرعها .

٢٠٩٦٨ - فَلَاحَة ، حَرَاثَة

Labourage (F), Tillage, Ploughing (E). شق التربة وقلبها بالحرث .

٢٠٩٦٩ - فَلَاحِيْس

Phalaris (F). هو البشته نبات عشبي علني من النجيليات .

٢٠٩٧٠ - فَلَاحِيْس مُعْتَد

Phalaris noueux (F). هو البشته العتدية ، نبات عشبي علني من النجيليات .

٢٠٩٧١ - فَلَاحِيْس

Pallas (F), Palias (E). اسم علم لسطوري لسيار بين المشتري والمريخ اكتشفه « أولبر » عام ١٨٠٢ .

٢٠٩٧٢ - فَلَاط

Voltmètre (F), Voltmeter (E). مقياس انقلط .

٢٠٩٤٩ - فَلَاحِي المَتَاع *

Géophaps, Colombi-Caille (F). طائر من الفمقي وصفيّة الحاميات طوله نحو ٢٤ سم . صغير المنقار ، قصير الجناح المستدير ، مستطيل الارباع . لونه ثوب الفمقي للمسي لكنه مادم للكلشة ومال من لينة الحمره . وهو قريب الشبه من السباث || يَأْتِي المَتَاع والمِراسي . يَمُتُ الفمقي في التربة بين الادغال والاعشاب الكثيفة .

٢٠٩٥٠ - فَلَاحِي مَدَمِي ، يَحْمُوم

Phaps lophote, Colombe polonardée (F). طائر من الفمقي وصفيّة الحاميات . طوله نحو ٣٣ سم . يتميز بكشة مستطيلة تملو مؤخر الرأس . رأسه وصنقه ومصره ويطن الى الرتبة الراديّة . يملو مقدم صدره بقمة حمره كائها صقعة من البلم . ظهرو زيتوني ، اجنته الى الخشاش النحاسي للزئور بالابيض . منقاره اسود . قوته حمر || يَأْتِي صفاف الانهار والمستنات . قوته الحبوب . يَمُتُ في الاجبار والشجيرات الكثيفة . اناته يفتش يفتش .

٢٠٩٥١ - فَلَاحِيَّة * ، جَوَز الَأَمِي

Fevilles (S), Févillée, Avila, Noix de serpent (F), Nhandroba (E). جنس نباتات جينية عارية ، ثنائية المسكن من فصيلة الفريجات . ازهارها المعروفة سمكة منبتها معظم مناطق البلاد الحارة والاستوائية || سبقها عارية عشوية مستطيلة . اوراقها معتقة ، كفية الشكل ، خاسية التفصيص . ازهارها عبقريّة الصبح . ازهارها خاسية البتلات الصفرة . ثمارها تملو جواز الثعبان وهي بطيخية الشكل ، صفيرة اللد ، مائلة السطح ، وتلف بعض البلور المركزة على محور الثمرة الثلاثي الاصل . || يستخرج من بزودها مادة زيتية لها استعمالها الطبي .

٢٠٩٥٢ - فَلَاحِي

Mâchoire (F), Jaw (E). احد جزئي الفم حيث فرزت الانسان وما فكان علوي وغلي .

٢٠٩٥٣ - فَلَاحِي

Maxille (F), Maxilla (E). ها في الحشرات فكان عريضان متساويان ، مركزهما في مقلة الرأس بين التآخير ، يحصلان الملاصق الفكية .

٢٠٩٥٤ - فَلَاحِي

من الانماط الزراعية . راجع تمرية .

٢٠٩٥٥ - فَلَاحِي ، اِكْثِيل شَمَلِي

Couronne bordale (F), Corona boronalis (E). الفكة او الاكثيل الشمالي كوكبية تجوم شمالية الميق مركزها بين البلم والصفبان والجانبي . عدد تجومها ثمانية وهي مستديرة الشكل وفي استداراتها ثلثة لذلك يقال لها ايضا « قصعة الساكنين » . ومن تجومها الثمانية المزدوجة نجم . من المربية للرابية ، يدعى « ثير الفكة » . ونجم من المربية السادسة يدعى « ثير القصعة » .

٢٠٩٥٦ - فَلَاحِي

Entorse (F), Sprain (E). زوع للمفاصل وريبطها عن مواضعها .

٢٠٩٥٧ - فَلَاحِي

Maxillaire (F), Maxillary (E). ما هو غنص بالفك .



فَلَاحِي المَتَاع



فَلَاحِي



فَلَاحِي



فلبوس الاجامس



فلبوس البتولا



فلبوس الحليجي



فلبوس نمطي



فليت



فلحوس

Philepitus (S).
Philepitus (F).

مطار وسيد الجنس والنوع من الجواثم مشروحات المفاير
وضيلة التنجيات. اصطناع بعض مناطق افريقية الشرقية
وبجزيرة مدغشكر || ثوبه الى الشفعة السراء. رأسه
وزوره واطل صدره الى السرة الباقية. بطنه رافنيكه
واباهره مرققة || تحته الحشرات الصغيرة والنمل والبلور.
يدفن عشه في الشجيرات الكثلة. الاثني تحفن نحو
بيضات من مرتين الى ثلاث مرات في الحيل. الاكر
يؤين لها الغذاء.

٢٠٩٨١ - فلتكان

مطار زعموا انه يصيد القردة (السان).

Répartir (F).

To divide, To distribute (E).

فلج الارض الزرارة : قسمها || فلج المال بينهم :
قسمه بالتساوي.

Molcié (F). Half (E).

فلج

فلج كل شيء : نصفه.

Fente branchiale (F).

Branchial fissura (E).

٢٠٩٨٤ - فلج عيشي

٢٠٩٨٥ - فلتكة

القلعية : ساقية الزرع. ج. فلجان.

Blastomère (F). Blastomere (E).

٢٠٩٨٦ - فلتجة

اسم تعريفي يطلق على كل بلسيدة او بوسية من البوسيات
المتأينة من لتكم البيسة في طور نموها المتدري المادي.

Labourer (F).

To plough, To till (E).

٢٠٩٨٧ - فلطح

فلطح : حرث

٢٠٩٨٨ - فلطحس

الكلب المسن والدب ايضا.

Hemigalea (S).

Hémigale (F).

٢٠٩٨٩ - فلطحوس

جنس حيوانات لاحة مفترسة من فصيلة الزباديات.
موطها ملقة وصوتها وبوزها. تألف الاخراج والفايات.
سرحها دجوي. ملجتها الحياتي فودي لا تجتمع الا في
زين الوداق والكوم || اجسامها مستطيلة الشكل، هيفاء
تطوي من ٨٠ الى ٩٠ سم. بما في الذنب. دروسها
زائفة. اعطامها ذائقة. عيونها صغيرة. اذانها دقيقة
جالسة. قوائمها قصيرة. اذنانها مستطيلة جللة. وبرها
قصير، متوسط النعومة. انزواها الى الشبه القشراء يطولها
تجنيح مترنق اسود او تبيج كسني وذلك بالنسبة الى
النوع || قوتها ما استطاعت اليه سبيلا من الحيوان والطير
والاناعي والزرع.
نوعها المروغان :

٢٠٩٩٠ - فلطحوس مجدع

Hemigalea Hosi (S). Hémigale de Hosi (E).

سرحه جبال بونيو.

٢٠٩٩١ - فلطحوس مجدع

Hemigalea Hardwicki (S). Hémigale zébrée (F).

سرحه ملقة وصوتها وبوزها.

Polycotylédon (F).
Polycotylédon (E).

٢٠٩٧٣ - فلتان

متعدد الفلق.

Astronomie (F). Astronomie (E).

٢٠٩٧٤ - فلكاكة

هي علم الفلك، علم يبحث في الاجرام السماوية على
اختلافها كالنجوم والكواكب والمذنبات الخ. وذلك
من حيث نظر دورها وابعادها وزواياها المقدرة والقوانين
التي تقدر ظواهرها المنظورة.

Phyllobius (S).

Phyllobie, Coupe-bourgeois (F).

٢٠٩٧٥ - فلبوس

جنس حشرات لاهمة من فصيلة السويات. انواعه عديدة
تركب معظم الانجاش المشرية والحرجية. جميعها صغيرة
لقد طولها يراوح بين ٤ و ٧ مم. اجسامها مهيبة القشار
سفعية للماجة. امتاها غليظة الشكل قصيرة القد مستقيمة
الانتشاب. يكثر وجودها في الربيع. يرقاها تيش في
اتربة على المواد العضوية حتى اكمال طولها البري.
انصراره محصورة بما تقتضيه الحشرات الكاملة، من اثنى
في قرض البرام واطراف الاوراق.

٢٠٩٧٦ - فلبوس الاجامس

Phyllobius pyri (S). Phyllobie du poirier (F).

Large green weevil, Pear leaf eating weevil (E).
Breiter Birnengrünrüssler, Grünrüssler (D).

نوع من الفلبوس. مرته الانجاش المشرية اخصها الاجامس.
طوله يراوح بين ٥ و ٧ مم. ثوبه الى الخضار الملعب.
ظهوره كثير التخطيط. مدبه اسير الخضار يامت للماجة.
متك قصير القد بالغ التعديبه. زبانه الى الشفرة الخطية.
يسرح في البهار. يكثر في اوائل الربيع. قوته اطراف
الاوراق الفتية ولا يمتف من البرام.

٢٠٩٧٧ - فلبوس البتولا

Phyllobius betulae (S). Phyllobie du bouleau (F).

نوع من الفلبوس. مرته الانجاش الحرجية اخصها البتولا.
طوله يراوح بين ٤ و ٦ مم. ثوبه الى الخضار اللامع.
ظهوره مبهر السهف والحلب المتصبغ الفقيق. زبانه
وسيقانه وارساه الى الصغار الخطي. متك ضيق الطرف،
مادم التخذيد || يسرح في البهار. يكثر في اوائل الربيع.
قوته الوراق الفتية.

٢٠٩٧٨ - فلبوس الحليجي

Phyllobius oblongus (S). Phyllobie oblongue (F).

Leaf eating weevil, Brown leaf weevil (E).
Gemmer Blattrüßler, Schmalbauch, Obstblüme-
grünrüssler (D).

نوع من الفلبوس مرته الانجاش المشرية. طوله يراوح بين
٤ و ٦ مم. ثوبه الى السواد اللامع. ظهوره احسل
السهف الدقيق. يسرح في البهار. يقضم البرام والاوراق.

٢٠٩٧٩ - فلبوس فضي

Phyllobius argentatus (S). Phyllobie argentée (F).

نوع من الفلبوس مرته الانجاش الحرجية على اختلاف
انواعها طوله يراوح بين ٣ و ٥ سم. ثوبه الى السواد
النفراء يطولها موانع فضي. زبانه وسيقانه وارساه حنطية
اللون. متك عروطوي الشكل غليظ القاعدة || يسرح
في البهار. يكثر في اوائل الربيع. قوته البرام والاوراق
الفتية.

٢١٠٠٥ - **فلطبي** (F). Voltaique (F). Voltaic (E).
نمت توصف به الكهربية الفلطة المصدر .

٢١٠٠٦ - **فلطبة** (F). Voltage (F).
هو فرق الجهد بين طرفي السلك الموصل . وهو مقدار
الفلط لازم لتشغيل آلة ما .

٢١٠٠٧ - **فلتت** (S). Valvata (S). Valvate (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأرجل
وفصيلة التفلقات . أنواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة
في بعض بحار البلاد الباردة || أصدافها حلزونة ، مبطنة
شبه مستديرة الشكل يكثر فيها اللون الأبيض .

٢١٠٠٨ - **فلتتات** (S). Valvatidae (S). Valvatides (F). Valvatides (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأرجل
أمايات الخياشيم . اجناسها وأنواعها المعاصرة المروفة
قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الباردة والمنسقة
نحو الباردة || أصدافها متباينة الاكسال يكثر فيها
التخطيط والاستدارة || اعرف اجناسها الفلتتات .

٢١٠٠٩ - **فليل** (S). Piper (S).
Poirier (F). Pepper (E). Pfeffer (D). Pepe (I).
جنس نباتات مختلفة الاحجام معمرة من فصيلة الفليليات .
أنواعه نحو ٦٠٠ اصنافها المناطق الحارة من المالين القديم
والجديد . معظمها شجيرات ونباتات برية متسلقة وبشيرة
زرعي وتربسي . اوراقها معققة متشابحة ، نصلها جلدي
الصفحة . ازهارها محورية الارتكاز ، قدية التجميع ،
متدلية . ثمارها كروية الشكل ، صغيرة القذ يكثر فيها
اللون الكحلي ثم الجلوي || اشهر أنواعه ما يتبع .

٢١٠١٠ - **فليل أحمر** هو الفليلية ، أطلبه .

٢١٠١١ - **فليل أسود** ، **فليل عطر**
Piper nigrum, P. aromaticum (S). Poirier noir (F).
Black pepper plant (E). Schwarzer Pfeffer, Gemeiner
Pfeffer (D). Pepe nero, P. aromatico, Pevera (I).
نوع من الفليل وهو شجيرة زراعية متسلقة ، حواملها غليظة
تنبها حل الارتقا والتشبت || ثمارها حارة مشهورة
تستعمل في الطعام .

٢١٠١٢ - **فليل الصقلية** (S). Agnus castus (S).
هو الأذنة والسراد وكث مريم ، النع .

٢١٠١٣ - **فليل الماء** * ، **زنجبيل الكلاب**
Polygonum hydrotipar (S). Cursage, Poivre d'eau,
Piment d'eau (F). Water pepper, Lake weed, Biting
persicaria, Cursage (E). Pfeffer-Knöterich (D). Polli-
gono piperino, Pepe d'asino, Polygono acre (I).
نبات عشبي بري من فصيلة البيلطليات . يعيش في
الناقع . ساقه عقدا ، اوراقه وجلودر سريفة الطم كانت
تستعمل قديما في الطب .

٢١٠١٤ - **فليل حلو** * ، **فليل إرتنجي**
Pimenta (S). Pimenta, Piment des anglais, Poivre
de la Jamaïque, Toute-épice (F). Allspice, Pimento
(E). Pimentbaum, Pimentmyrte (D). Pimento (I).
شجرة برية وزراعية من فصيلة الأسيات . مهدا البلاد

٢٠٩٩٢ - **فلدة** * (F). Phyllode (F).
ورقة مرضية ناتجة من شذو جسموري . ج فلد .

٢٠٩٩٣ - **فلدة صبار** (F). Feldspath (F). Feldspar (E).
في صوانات الايونين مع إحدى الترواح القلوية كالبوتاس
والصوديوم والكلس والمغنيزا ... || يكثر وجودها في الصخور
الاصيلة والبركانية . وهي تتولد مع الطلق والمرو مواد
الاميل البلورية .

٢٠٩٩٤ - **فلدوس** ، **ليلدوس** * (F). Phyllocloda (S). Phyllocloda (F). Phylloclode (E).
بصلة صغيرة معمرة من فصيلة الخنثيات . مهدا بعض
جبال حوض البحر الأبيض المتوسط . ساقها فرعاء تملو
من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها كثيرة العدد ، صغيرة القذ ،
تطول نحو ١٠ سم . وتفرس نحو ٢ م . نصالها مائلة ،
خضراء اللون ، مستنة أطوار . ازهارها صوانية التجميع .
ازهارها كبيرة جلجلة الشكل ، مستطيلة المالحق المسلية
الانتشار . لونها الى الزرقاء البنفسجية . توبجاتها خاسية
الاسنان . كمايرها خاسية للمصارع || تنويرها يستمر
من حزيران الى آب .

٢٠٩٩٥ - **فلز** ، **فلز** (F). Métal (F).
هو المعدن ، أطلبه .

٢٠٩٩٦ - **فلز التوكايس** (F). Bronze de cloche (F). Bell-metal (E).
مزيج من نحاس ووزنك وأحمد وقصدير يستعمل في صناعة
الاجراس والتوانيس .

٢٠٩٩٧ - **فلزات ليرية** (F). Métaux alcalins (F). Alkaline metals (E).
٢٠٩٩٨ - **فلس** (F). Squamule (F). Squamula (E).
فلس ج فلوس هي الحراشف الصغيرة التي تكشي جلود بعض
الاسماك أو رواثن بعض الحشرات .

٢٠٩٩٩ - **فلسا** * (S). Valis (S).
نظر مجهرى من التلصبيات يدعى ذئلب ، أطلبه .

٢١٠٠٠ - **فلسي** (F). Lépidote (F). Lapidot (E).
نمت تعريفه رمسي يطلق حل الاغشية النباتية الحرشية
البشرة .

٢١٠٠١ - **فلسي** (F). Felsitic (F). Felsitic (E).
نمت تعريفه يطلق حل الآربة والصخور الفلصيتية التركيب .

٢١٠٠٢ - **فلصيت** (F). Felsite, Pétrosilex (F). Felsite (E).
طبقات صخرية ثوارة تحيضة متجانسة لا قياسية السمك .

٢١٠٠٣ - **فلصبي** ، **فلسي** (F). Felsitique (F). Felsitic (E).
يقال صخور فلصية وربة فلصا .

٢١٠٠٤ - **فلط** (F). Volt
هو وحدة هبوط الجهد ، يبر عنه بفرق الجهد بين نقطتين
من سلك موصل اذا كان الجهد الذي يؤدبه الكولوم بين
هاتين النقطتين يساوي جولاً واحداً . ج فلفط .



فلت




فليل أسود



فليل الماء



فليل حلو



أللك البروج بأقسامه وأرقامه وعلاماته وأسمائه وصوره وشهوره



فلفل عرق الذهب



الفلفل كبابية



فلقوس



فلكوس



فلكية

الشمس الظاهر بما فيه النجوم وتلقى الثوابت. وهو منطقة سماوية عرضها نحو ١٨ درجة تطوق الفضاء بموازاة مدار الشمس. وتقسّم إلى قسمين، البروج الصاعدة والبروج الهابطة. فالصاعدة تتألف من ستة بروج والمهابطة كذلك. وهي بإحداثياتها من القرب إلى البعد: الحمل، الثور، القديسين، السرطان، الأسد، العقرب، الميزان، والقرب. والرامي، الجدي، الدلو، الحوت، اسبا البروج الصاعدة فهي الجدي والدلو والحوت والقديسين والثور والحمل. والبروج الهابطة هي السرطان والأسد والعقرب والميزان والقرب والرامي.

٢١٠٢٤ - فلك اطلب مدار .

٢١٠٢٥ - فلك هي أم الخلول، اطلبها .
Arche (F).

٢١٠٢٦ - فلكوس، صبار رومى

Phyllocactus (S), Phyllocactus (F).
جنس نباتات لحية معمرة من الصباريات. أنواعه عديدة أصلها البلاد الاستوائية. سوقها أوراق متتابعة ملفطة وغنجد. أزهارها كبيرة القند مستطيلة البتلات المندبة. ألوانها تختلف مع أنواعها منها الأبيض والوردي والأزرق والقرمزي. ثمارها سائرة العلم مأكله || أشهر أنواعه القزينية :

Ph. à grandes fleurs (F).
Ph. crénelé (F).
Ph. anguleux (F).
للكوس كبير الزهر
للكوس مفرغ
للكوس مصلع

٢١٠٢٧ - فلكية نبت تمرغني يطلق حل يحرق النجوم والكواكب السابرة. فالبروم الفلكي هو دوران الأرض اليومي. والساعة الفلكية هي دوران الأرض السنوي.

Orbital (F).
Orbital (E).
٢١٠٢٨ - فلكية، مدار كوكبي
نبت وصفي خاص بمدار الكواكب، أي كوكب كان.

Arcaea (S).
Arcades (F), Arcades (E).
٢١٠٢٩ - فلكيات
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفائح الخياشيم. اجناسها وأنواعها المروعة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || أصدانها متباينة الأشكال والأحجام والألوان. مصلحتها منصف. مصاريها لانتظامية منها المتساوية ومنها المتفاوتة. اجسامها صاعدة الخافض، مستطيلة الأبريل || احرف اجناسها وأشهرها الفلكية والحويلة والظفرية.

Arca (S).
Arche (F), Arca, Ark, Ark shall (E).
٢١٠٣٠ - فلكية
وتدعى أم الخلول وفلك. جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفائح الخياشيم وفصيلة الفلكيات. أنواعها المروعة كثيرة العدد || مظهرها من متحيرات الحقبة السيلورية، أي أنه يبدو في أقدم التكوين الجيولوجية. أما الأنواع الماصرة فتنتشر في جميع بحار العالم اعصها اكتسبت || أصدانها شبه بيضية الشكل أو أخضيرية، مستطلة الجسم أو صغيرة، محززة الأصداف الملونة || تعيش لاصقة بالصخور المنورة المتوسطة النور.

أحمارها أوراقها محقة متباينة كبيرة النصل. ثمارها حمية للقد والشكل، قمرزية اللون، مطرة، يستخرج منها حطر يحل على حطر القرنفل. أما مسحوقها فيستعمل استعمال بعض القويات في عدة مأكول.

٢١٠١٥ - فليل رومى هو الفليفلة، اطلبها .

٢١٠١٦ - فليل عرق الذهب
Piper longum (S), Polvriar long (F), Long pepper (E), Langer Pfeffer (D), Pepe longo, Albero del pepe (I).
نوع من الفلفل وهو شجرة كزينة جلة الشكل. أوراقها موشحة بالأصفر ثمارها متنايلة مستطيلة متدلية، حبوبها كروية صغيرة أرجوانية اللون ذهبية للمالح.

٢١٠١٧ - فليل كبابية، حب العروس، كبابية
Piper cubeba (S), Polvriar cubèba, Polvra à queue, Cubèba (F), Cubeb pepper (E), Cubebenpfeffer, Cubebenstrauch (D), Cubebe, Pepe à coda (I).
نوع من الفلفل الأبيض وهو شجرة جلة الشكل والمحام. أزهارها حنانيه مستطيلة مرجانية أو أرجوانية اللون.

٢١٠١٨ - فليليات
Piperaceae (S).
Pipéracées (F), Piperaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين جذومات القمامة، مرتعدات الخيش. أنواعها زهاء ١٠٠٠ تنحصر إلى عشرة اجناس معظمها جنات وأصايب. أوراقها لأقياسية الانظام فيها المتعاقلة والمتناوبة والصفية. أزهارها ثدية الشكل، سلبية التجميع، لأقياسية الارتكاز، منها المحورية والتاجية والمتعاقلة مع الأوراق. ثمارها حنبة كروية صغيرة القند غثلفة الأبرال.

٢١٠١٩ - فليكة، زبارة
Cotyldon (F).
Cotyledon (E).
صفحة ورقية تلحف جبين البزرة و رابع زبارة.

٢١٠٢٠ - فليكة، فلق، فلق
Lobe (F).
Lobe, Lobus (E).
كل جزء من الورقة أو الزهرة بالغ التضربين مستديره.

٢١٠٢١ - فلقوس، شبرقة
Valgus hemipterus (S), Valgus hemiptère (F).
سحرة من فصيلة الجمليات ورقية مقدمات الاجنسة. موطنها يشمل معظم مناطق البلاد المتناهية الحارة من العالم القديم || جسمها صغير القند يطول نحو ٨ م. عند الذكر ونحو ١ م. عند الانثى. ثوبها إلى السمرة السوداء تلوها زغارف فليسة يبيض اللون عند الذكر. ظواهرها يلفح ستة اعشار الجسم. قصصية الانثى تنتهي بجز مستن مستطيل يركتها من منح المكان حتى في الخشب اليابس || تظهر من نيسان إلى اواخر حزيران. مسرحها يستمر طوال النحر. مرتها الانتار || يربتها حنطية اللون، سوداء الرأس، تنقب الخشب وترسده اثنياً بأعجاء القلب فيقود كأنه سليماً في حين انه لا يحتمل أية صفة.

٢١٠٢٢ - فلقية، فقي
Lobulaire (F).
Lobular (E).

٢١٠٢٣ - فلك، فلك البروج
le Zodiaque (F), the Zodiac (E).
الفلك وفلك البروج وبروج الاطلاق واحد. هو بحري

قوائمها خاصة الأصابع ، حادة الاظفار . اصولها ناعمة لينة || ألتائها مجهزة بحجاب في أسفل البطن تقيح فيه الرضيع حتى للقطام || أشهر اجناسها الفلتنجير واليهكوتان والكوتولج والكوتور .

٢١٠٣٨ - **فَلْتُولَة** * (F. Euplura, Euplura).

فلتول هو الاسم الملائحي . حيوان لينة مقعر وسيد الجنس والنوع من فصيلة الزباديات . موطنه جزيرة مدغشقر . يألف الثعالب الساحلية . يسرح في النهار . قوته الحشرات والورديات والديدان || جسمه مستطيل الشكل ، كثيف الوبر المستطيل الناعم . طوله نحو ٨ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٣ سم . ارتفاعه الى الحاركة لا يتجاوز ١٨ سم . رأسه صغير الحجم ، غرطي الشكل وأفر السبال . عيناه صغيرتان وأذناه كذلك . قوائمها خاصة الأصابع الصغيرة النعيلة . غالبة رقيقة بحجة الاطراف . ثوبه الى النشفة السوداء ، صدره وبعده الى النشفة البرتقالية المالح .

٢١٠٣٩ - **فَلْتَم** ، **تَوَف** (F. Vagin d'insecta, Vagina of the insect).

عضو من شوار انثى الحشرات وهو القناة التي توصل الفرج بجيب الزكة .

٢١٠٤٠ - **فَلُو** (F. Poulain, Yearling, Foal, E).

الفلو والفلو والمهر هو ولد الفرس قبل بروز ثنيته اثنتين . ج . الفلاء .

٢١٠٤١ - **فَلُول** (F. Voluta).

الفلول حيوان بحري من الرخويات يدعى خدرقة ، أطلبا .

٢١٠٤٢ - **فَلُولَة** (F. Pouliche, Filly, E).

الفولة والفولة هي انثى الفلر .

٢١٠٤٣ - **فَلُولَة** * (F. Vallota, Vallota).

مشية دوفسية وسيدة الجنس والنوع كثيرة الصروب من فصيلة الترجسات . مهدا أفريقية الجنوبية . دوفسها مستدرة الشكل . أوراتها جلدية الانتساب ثنائية التصنيف المتقابل . نصلها بطول من ٤٠ الى ٨٠ سم . ويعرض نحو ٣ سم . لونه الى الفشار المائج . شرعاعها الزهري أجوف القصية بطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . أزهارها متعاقبة الارتكاز . كبيرة لثقة ، تطول من ٨ الى ١٠ سم . ألوانها تختلف باختلاف الصروب منها الاحمر والكروزي والوردي والايض والموشح . تنورها يستمر من ايار الى آب . ترغب في المواتع الرطبة والمارش الجنوبية . تعيش في المراكن ولا تخفى سوى البرد .

٢١٠٤٤ - **فَلُولِيَة** * (F. Fallugia, Fallugia).

جنبة ثزينية مصرة من فصيلة الورديات . منبتها بعض اسواق امريكا الشمالية . ساقها منتصبة فراء تملو من ٨٠ الى ١٠٠ سم . افئادها الحولية مزينة الاحمر . أوراتها متعاقبة صغيرة الحجم ، ثلاثية التلق . نصلها خضر الصفحات العليا ، بيض السفلى . أزهارها مائجة اللون ممتدة بالوردي ، طهرها نحو ٣ سم . || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢١٠٣١ - **فَلْمَار** * (F. Fulmar, Fulmar).

طائر من الرغاء يدعى رغاء الجليد ، اطلبا .

٢١٠٣٢ - **فَلْتَجَر** * ، **كُسْكُوس** * (F. Phalanger, Phalanger, Couscous).

Phalanger (S). Phalanger, Couscous (F). Phalanger, Couscous (E).

جنس حيوانات لبونة من الجرابيات الشاجرات . وفصيلة الفلتجريات . اقوامها المعروفة اربعة موطنها استراليا وفينيا الجديدة . تألف الثعالب الباسقة الانجار . قوتها الاوراق والازهار والتلج والمصاير ويضها والحشرات . ترقد في النهار في قن الانجار القريبة وتسرح في الليل في طلب القوت وتنتقل بين الانجار تحليفا في القفص || اجسامها قريبة اليه من السور . رؤوسها شبه غرطية الشكل . أذنانها صغيرة . قوائمها خاصة الاصابع . أغشيها الجناحية تمتد من الزور الى رؤوس الاغصان . أذنانها مستطيلة اعادة . ألوانها دقيقة وبيقة || ألتائها رباعية الاغلاف .

٢١٠٣٣ - **فَلْتَجَر أَبَلَق** * ، **كُسْكُوس أَبَلَق** * (F. Phalanger maculatus (S). Phalanger maculé, Couscous tacheté (F).

نوع من الفلتجر قد قد السور . موطنه بعض مناطق استراليا ، أعصها الشمالية وجزر فينيا الجديدة واسبون وسيرام وبنما . ثوبه الى الرعدة السوداء الملقطة بالايض الابيض . يتميز بكبر عينيه وبصغر أذنيه .

٢١٠٣٤ - **فَلْتَجَر السالب** * ، **كُسْكُوس السالب** * (F. Phalanger Celebensis (S). Phalanger de Célebes, Couscous de Célebes (F).

لوع من الفلتجر . قد قد السور . موطنه يمتد من القسم الشرقي الى الجنوبي من جزيرة السالب . ثوبه الى الرعدة الشبه الغصية المالح .

٢١٠٣٥ - **فَلْتَجَر دُوبِي** * ، **كُسْكُوس دُوبِي** * (F. Phalanger ursinus (S). Phalanger ourson, Couscous ourson (F).

نوع من الفلتجر قد قد السور لكنه مكردم الشكل . موطنه القسم الشمالي من جزيرة السالب . يتميز بخلافة الرأس الذي يشبه رأس الثوب . ثوبه الى الرعدة السوداء السوية . بط الى الثيرة .

٢١٠٣٦ - **فَلْتَجَر شَرَقِي** * ، **كُسْكُوس شَرَقِي** * (F. Phalanger orientalis (S). Phalanger oriental, Couscous oriental (F).

لوع من الفلتجر . قد قد السور الاجل . موطنه فينيا الجديدة وتيسور واسبون وسيرام وسلا وارو... ثوبه الى الرعدة السوداء يمتد بعض النفي في الظهر . ويتميز ايضا بكبر العين وبصغر الاذن .

٢١٠٣٧ - **فَلْتَجَرِيَات** * (F. Phalangeridae, Phalangeridae).

فصيلة حيوانات لبونة من الجرابيات الشاجرات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . معظمها من حيوانات استراليا وبعضها من الجزر القريبة منها || تألف الثعالب والحراج . تتساق الانجار بمجموعة ممتدة وبنما انواع مجهزة بنشاء جناحي الشكل يمكنها عند انتشاره من الانتقال بين الانجار تحليفا في الغشاء || جميعها وريقة ثائرة وبشها مباشرة || اجسامها صغيرة او متوسطة القد . تتميز باستطالة الاذنان .



فلنجر



فلنرك

٢١٠٥٤ - **فليرة** * ، **كليكار** * . Equula (S).
Equule (F). Equula (E).

كليكار هو الاسم الهندي . جنس اسماك بحرية من فصيلة الكليكات . أنواعها المعروفة نحو ٢ . اصطناعها المحيط اشندي والبحر الاحمر . اجسامها شبه بيضية الشكل ، مبطلة ، صغيرة القدة او متوسطة ، تقبل من ١٢ الى ٢٤ سم . رؤوسها معتدلة الخيم ، نائزة الاعظام الثلاثة . اشدافها صغيرة . صيبتها كبيرة جاسطة . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة ، متقابلة يتداخلها بعض المناسخ الحادة . زعانفها الذيلية غارقة . لجوها جيدة الصنف ، مرغوب فيها .

٢١٠٥٥ - **فلوكس** . Phlox (F).
هو الشوافة جنس نباتات زربية شائعة الاستعمال ، اطباها .

٢١٠٥٦ - **فلوميس** . Phlomis (F).
هو الميزارة ، اطباها .

٢١٠٥٧ - **فلوميس لزقي** . Phlomis visqueous (F).
هو الاذينة ، اطباها .

٢١٠٥٨ - **فلوميس فلسطيني** . Phlomis de Palestine (F).
هو الميزارة الفلسطينية ، اطباها .

٢١٠٥٩ - **فلبة** . Marrube blanc (F).
هي القرايصة الابيض ، اطباها .

٢١٠٦٠ - **فلبة** . Poulot (F).
هي الفتوتج البري ، نبات عشبي صطري ، اطباها .

٢١٠٦١ - **فليجييات** * . Schizomycetes (F).
Schizomycophyta (E).
فئة من نباتات وسيدات الخلية الحفصية تتكاثر بانقسام الخلية الى فليجين متساويين .

٢١٠٦٢ - **فليدة** * . Phyllidia (S).
Phyllidia (F). Phyllidie (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل اماميات الخياشيم . فصيلة الفليديات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من سفل المحيط الهندي والبحر الاحمر تعيش على صخور التوتلي . اصداؤها الطليجية ، صغيرة القدة ، مستطيلة ، مدنية المقدم والمؤخر ، جلدية القشار المدرن للبقع بالاسود والابيض . خياشيمها كثيرة العدد ، حشائية الارتكاز . لواسها رباعية ، منها زوج علوي شبه انبوي الشكل وزوج سفلي مخروطي مكرز قرب الفم . ابدنها لحية معتدلة الانعظام العلوي .

٢١٠٦٣ - **فليديات** * . Phyllidiidae (S).
Phyllidiidae (F). Phyllididae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اكثرها من متحيريات الاذينة العائرة . المماسر منها يعيش على شواطئ بحار البلاد الحارة . اصداؤها حشائية التركيب والاحجام منها وسيدات المسامير ومنها مديات . جميعها تستنشق الماء . خياشيمها حشائية الارتكاز . اعرف اجناسها المعاصرة القليلة .

٢١٠٤٥ - **فلور** * . Phyllirroe (S).
Phyllirrhoë (F). Phyllirroe (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل خلفيات الخياشيم . فصيلة الفلوريات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اصطناعها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط . جميعها مية تسرح في الليل . اجسامها حلالية شفافة مبطلة لا تخلو من المواد الفسفورية المغسية . رؤوسها ثنائية القراس التي تبدو كقرون الثيران .

٢١٠٤٦ - **فلوريات** * . Phyllirrhoidae (S).
Phyllirrhoides (F). Phyllirrhoidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل خلفيات الخياشيم . انواعها قليلة العدد جميعها جنس واحد الفلور . جميعها مية لا تقرب الشطوط . تسرح في الليل . اجسامها شفافة تحمل بعض المواد الفسفورية المغسية .

٢١٠٤٧ - **فلوريد** . Fluorure (F). Fluoride (E).
ملح الحامض الفلوريدريكي .

٢١٠٤٨ - **فلوريد الباريوم** . Fluorure de baryum (F).
Barium fluoride (E).
مركب الفلور مع الباريوم .

٢١٠٤٩ - **فلورين ، فلور ، فلور ، فلور ، لافست** . Fluor (F). Fluorine (E).
غاز اصفر اللون ، كبريه الرائحة ، نشيط التفاعل . ثقله الذري ١٩.٠١ رقه الذري ٩ .

٢١٠٥٠ - **فلوس** * ، **زب الكرم** * ، **ستير** . Phallus, Ph. impudicus (S). Phallo, Phallus impudique, Satire (F). Phallus, Devil's horn, Stink horn (E).
Gichtschwamm (D). Spugnolo (I).

فطر دهامي من فصيلة الفلوريات شائع الانتشار يوجد في جميع المواقع الرطبة من الاقاليم الحارة والمعتدلة . شكله ما سحره الرسم . ساقه اسطوانية ، ابرسته مخروطية . لها الى الخضار القائم . يؤكل في اول عهده ، عند انطلاق النلاف ، قبل امساكه وتصلب خلاياه . اعرف انواعه الصيني والكليبي .

٢١٠٥١ - **فلوس صيني** . Phallus mokusin (S).
Phallus de Chine (F).
نوع من الفلوس صغير القدة والساق ، حشني اللون ، اخر الارسوة النضجة الشكل .

٢١٠٥٢ - **فلوس كنكبي** . Phallus canis (S).
Phallus de chien (F).
نوع من الفلوس . ساقه دقيقة ، مستطيلة ، جزؤية اللون ، حشنية الملامح . ابرسته غليظة ، يابطة الشكل ، خرية اللون .

٢١٠٥٣ - **فلوسيات** . Phallaceae (S).
Phallacées (F). Phallaceae (E).

فصيلة الفطور القلوية من رتبة الدهاميات . اجناسها وانواعها مدبة يكثر وجودها في المناطق الحارة والاعتدالية . اعرف اجناسها واشهرها الفلوس ثم الديكتوفوره الذي يركب الانسان في المواقع الرطبة فيرق نحو ويؤذيه .



فلور



فلوس



فلبة



فلبة

Trilobites (F).

٢١٠٧٢ - فُلبَيَات *
فلة من القشريات تدعى ثلثيات الفلق ، أغلبها .

Navicella (S).

٢١٠٧٤ - فُليكة *
جنس حيوانات مائية من الرخويات بمديات الأبريل

Navicella (F). Navicella (E).

وفصيلة الزيفيات ، أنواعها المروعة قليلة البدن مواطنها
أنهر الهند || أصنافها كبيرة القد ، شبه بيضبة الشوزن ،
فصحة التجويف المقعر ، جذوية اللون أو بيضاء ||
أجسامها كبيرة ، رؤوسها حلالية الشكل ، ثنائية القراس
الحيزنة المستطيلة الجاهزة || جميع أنواعها مأكولة .

Pébrine, Gaxtine, Ectise (F).

٢١٠٧٥ - فُلييل
القليل أو مرض التفلفل أو المرض الفلفلي أو ندوة دودة

الحمر . مرض طفيلي يصيب دود القز فيقتله بعد شدة
الأكل ويسببها نحو الموت || مظهره الخارجي نقط سود
مبشرة تركب الجسم من الرأس إلى التخرج || يمتد من
الأمراض المميتة إذا حل بالندى في طورها الثاني ، أما إذا
اعتراها في الطور الرابع فأسبابه تكون قليلة الأدنى وفير
بمئة .

Phyllum (S).

٢١٠٧٦ - فُليكة *
جنس حشرات من مستعديات الاجنحة وفصيلة القسفيات .

Phyllis (F). Phyllium (E).

أنواعها المروعة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد
الحارة والاشترالية من العالم القديم || أجسامها مستطيلة
القد تطول من ٥ إلى ١٠ سم ، بطونها مبطنة بفضية الشوزن .
رؤوسها مكورة صغيرة . قرونها الاستشعارية دقيقة
وقصيرة . اجنحتها كثيرة الاصاب الفقيقة ، قصيرة ،
لا تلتصق كامل الأيل . قرونها معتدلة الطول ، مستقيمة
الانحناء والسيلقان يبدوا كأنها جمنحة || وهي من الحشرات
التي تقاتل البعثة التي تعيش فيها . يرقاها برتقالية اللون
أو حمره .

Crinière du lion (F).

٢١٠٧٧ - فُليكة
شعر زبرة الأسد .

Mane of lion (E).

Liège, Suber (F).

٢١٠٧٨ - فُليين ، فُلق
مادة دسنة ، مطاطة ، خفيفة ، تموم في الماء لا تمتصه
ولا تفسدها الرطوبة ، تقطع من لحاء البش أي سديان
الفلين .

Cork, Suber (E).

Bouchon (F). Bush (E).

٢١٠٧٩ - فُليكة
هي السداة ، أغلبها .

٢١٠٨٠ - فُليين ، بَهَنِي
Liègeux, Subéreux (F). Like cork, Suberous (E).

تمت تعريتي يطلق على التسج النباتية الفليلية التركيب
أو اللشبية والفلين

٢١٠٨١ - فُليين
Phellogène (F) Phellogenetic (E).

تمت تعريتي توصف به النباتات التي تلج الفلين .

٢١٠٨٢ - فُليتين
Subérine (F). Suberin (E).

للمادة البصورية التي يتركب منها الفلين .

Tuf (F). Tuff, Tufa (E).

٢١٠٧٤ - فُليس
اسم نقي يطلق على تكوينين مختلفين من طبقات الأرض .

التكوين الرسوبي والتكوين التوراني .

Tuffeau, Tufeau (F).

٢١٠٧٥ - فُليسة
Micaeous chalk (E).

صفائح مفسدة بلاتينية التركيب ميكية تكون مهلة
الحفر لينة للكسر عند استخراجها من الأرض ثم تتصلب
ويبدأ رويداً مع تعرضها للهواء .

Géilif (F).

٢١٠٦٦ - فُليج ، صَدِج *
Frost-cleft (E).

تمت حال توصف به الاشياء الفلغولة أو القابلة الانصدام
والقلع من تأثير قمل الصقيع فيها .

Capsicum (S).

٢١٠٦٧ - فُليكة
Piment (F). Pepper (E).

جنس نباتات زراعية حولية وعشلة ومعمرة من فصيلة
الباذنجانيات . منهاها المناطق الحارة والمعتدلة . أنواعها
قليلة ، ضرورها كثيرة البدن . أوقاتها بسيطة متعاقبة ،
أزهارها عشوية بيضاء اللون . ثمارها قرون مختلفة الاشكال
والاجسام والألوان . بزورها مستديرة ، مبطنة ، رقيقة ،
منقبضة للمتش . || أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢١٠٦٨ - فُليكة زراعية * ، فُليل زُي ،

فُليل أحمر .

Capsicum annuum (S).

Piment annuel, Poivre long, P. de Guinée, Poivron,
Corail des jardins, Capsique (F). Capsicum, Red pepper (E).
Echte Belstboere (D). Peperonia, Pimento (I).
نوع من الفليكة ضرورها وأصنافها كثيرة العدد شائعة
الزراعة والاشتغال . جميعها نباتات حولية وعشلة تزهر
لثمارها المأكولة الحارة أو غير الحارة .

٢١٠٦٩ - فُليكة ليبة *
Capsicum frutescens (S). Piment frutescent (F).

نوع من الفليكة العشوية التي تعيش من ٤ إلى ٦ سنوات.
ساقها قزواء تلو من ٩٠ إلى ١٨٠ سم . فروعها دقيقة ،
منسلفة مرتفعة الاطراف . أوقاتها بيضبة الشكل مدببة
الزمام الاخير . تصلها مالب الصفحة الخضراء يطول من
٧ إلى ١٠ سم . ويؤرض من ٥ إلى ٨ سم || ثمارها
بيضبة الشكل ، كبيرة القد تبدو خضراء اللون ثم تتحول
الى الحمره وتستقر عليها .

٢١٠٧٠ - فُليين *
Schistocarpe (F).

Schistocarpos (E).

تمت تعريتي يطلق على كل نبات تتفاد ثماره عند الإمداءك .

٢١٠٧١ - فُليكة ، فُصيص
Lobule (F).

Lobule, Lobulus (E).

الفلغة الصغيرة القدر .

٢١٠٧٢ - فُليكة *
Oides onotica (S).

Otode oreille de lièvre (F).

فلر من فصيلة الخشاريات ورتبة الزيفات . يكثر وجوده
في الحراج الطيلة اغصان حراج السديان . يعيش مجموعات
على الدبال والمواد النباتية المنسلة . مجموعة تعد من زوسين
الى حصة ازواج . سيقانها جيدة . نكاحها مستطيلة الشكل
مغلقة ، جوفاء ، تبدو كأذان القزاع ، لونها الى الصفار
الذهبي ، قواعدها بيض الدامل || تعتبر من الفطور
الكاذبة الصنف اللامأكولة .



(١) فليكة زراعية



(٢) فليكة زراعية



فليكة ليبة



فليكة



فليكة



فليكة



فليوت أخضر



فليوت المشعر



فليوت مغتب



فليوت مرفرف



فليوت مرن



فليوت بقشر



فناة

Fleur

٢١٠٩٠ - فليور

هو الفلور أو اللاصف .

Fomahaut (F).
Fomahut (E).

٢١٠٩١ - فَم الحوت

فم الحوت نجم ثير من كوكبة الحوت الجنوبي . مركزه على النجم . يبعد عن الأرض نحو ٢٤ سنة ضوئية .

Pylote (F).
Pylorus (E).

٢١٠٩٢ - فَم الحيدكة ، بَوَّاب

Stomatopoda (S).
Stomatopodes (F). Stomatopoda (E).

٢١٠٩٣ - فُصَّيات الأرجل

رتبة حيوانات من القشريات .

Cour de ferme (F).
Farm-yard (E).

٢١٠٩٤ - فَنَاقَه
ساحة تحيط بها أبنية المستل .

Branchus (F).
Forked, Ramifying (E).

٢١٠٩٥ - فَنَاقَه
فناه وفناره : شجرة كثيرة الاغصان وأصاة النخل .

٢١٠٩٦ - فَنَاقَه

بقرة القطيع لا عمل ولا درّج فنوات .

٢١٠٩٧ - فَنَاقَه * ، عَنَب العُصْب

Paris incompleta (S). Parisetia, Raisin de renard (F).
Fox grape, Herb Paris (E). Einbeer, Parisbeere (D).
Paride, Uva di volpe (I).

نبات عشبي بري طيب ، من الحليويات وفضيلة الزينة .
يكثر في المراعي الطيبة وفي بعض الاحراج . جلوره شقية . اوراقه مهوية وسنة .

Ramure (F).
Branches, Boughs (E).

٢١٠٩٨ - فَنَاقَدَة

مجموع اغصان وافئاد واغصان الشجرة .

Vanadium

٢١٠٩٩ - فَنَاقِدِيوم ، فَنَدَم

معدن ابيض اللون متبلور . ثقله النوعي ٥.٥ وزنه الذري ٥١.٣ . يمتد مع الاروكسين والكور والازوت . يذوب في المحالض المنفردة يستتداه الحامض الكلوريدي . يكتسب اصلاحه حديثة تستعمل في قش الصناعات والصبغات .

Scyphozoires (F).
Scyphozoa (E).

٢١١٠٠ - فُجَنَاجِيَّات

رتبة حيوانات بحرية هلامية من شعبة المحفوفات . فاضلتها وانجنتها وانواعها عديدة . اشهرها المحفوفات .

Lynx pardé (F).

٢١١٠١ - فَنُجَل

هو الثوق الفهدي ، اطلبه .

Gastiller commun (F).

٢١١٠٢ - فَنُجَنَكُفَت

هو الارادة جنبة طيبة معمرة ، اطلبه .

Fongique (F). Fungie (E).

٢١١٠٣ - فُنْجِي

ما كان فطري الطبيعة أو الصفة .

Rameau (F). Bough (E).

٢١١٠٤ - فَنَد

هو النعن الصغير أو الصلة بين النعن والافئان .

Pholiota (S).

٢١٠٨٣ - فُليُوت *

Pholiota (F). Pholiota (E).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريقونيات . انواعها المعروفة عديدة اصالتها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . يكثر وجودها في الغابات والمضارب والجبال . معظمها يعيش على المواد النباتية المتحللة . تتميز بوضعها الاسمر اللون ووفرة عدد مجموعاتها || اعرف انواعها واشهرها السعة التالية .

٢١٠٨٤ - فُليُوت اُسْمَر *

Pholiota picta (S). Pholiota brune (F).

نوع من الفليوت . يعيش على اربوات المستور . ساقه جزلة ، مبطلة ، عريضة ، صلبة ، شبه فخرافية . نكهته قديمة الشكل ، قطرها نحو ٣ سم . لونها الى السمر السليم المالح . يفرغ منها رائحة لا مألوفة || لحيته حاضرة العلم ، كاعلة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٥ - فُليُوت الشاحر *

Pholiota carbonaria (S). Pholiota des charbonnières (F).

نوع من الفليوت . يتكاثر في موانع المشاعر . مجموعته وثرية المعد الذي يتألف من ٣ او ٥ او ٧ وحدات . ساقه دقيقة ، صفراء اللون . نكهته لزجة ، صابغة الشكل ، قطرها نحو ٢ سم . لونها الى الصبغة السمره || لحيته كاعلة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٦ - فُليُوت مُكَتَب *

Pholiota mutabilis (S). Pholiota changeante (F).

نوع من الفليوت . يعيش على اربوات الانجراف العروة . مجموعته وثرية المعد تتألف من ٥ او ٧ او ٩ وحدات . ساقه دقيقة ، عريضة ، مبطلة حتى الزام الثالث . نكهته جامدة ، حامدة الزجاجة ، قطرها نحو ٣ سم . لونها الى الصبغة البرتقالية وهي مستحبة الرائحة عند الس || لحيته جيدة الصنف ، مأكولة .

٢١٠٨٧ - فُليُوت مُحَرَّشَف *

Pholiota squarrosa (S). Pholiota écaillée (F).

نوع من الفليوت . يعيش على اربوات الفص والسبتيان . ساقه مبطلة محرفة الاطراف حتى اوائل الزام الرابع . نكهته مغلية الشكل ، صفراء اللون ، مدروسة والخراشف السمر . قطرها نحو ٥ سم . اطرافها الى الصفراء الاغصير المالح . لحيته كاعلة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٨ - فُليُوت مَرَن *

Pholiota lenta (S).
Pholiota flexible (F).

نوع من الفليوت . يعيش على الدبال في الموانع الظليلة . ساقه معتدلة الجرم والارتفاع . غشاء اللون يميلوا زغب اصفر . نكهته صابغة الشكل ، قطرها نحو ٥ سم . لونها الى النمرة الصفراء . اطرافها الى الصفراء الباهت || لحيته جيدة الصنف ، مأكولة .

٢١٠٨٩ - فُليُوت نَصَر *

Pholiota flammans (S). Pholiota éclatante (F).

نوع من الفليوت . يعيش على اربوات الصنوبريات . مجموعته وثرية المعد . ساقه معتدلة الجرم ، محرفة حتى اواسط الزام الرابع . نكهته صابغة الشكل ، صفراء اللون ، ذكية المالح ، قطرها نحو ٢ سم . رائحتها رائحة القلت || لحيته كاعلة الصنف ، غير مرغوب فيها .

كيرتانه ، مستديرتان ، حولتا الاركتاز . زعنفتها النظرية الاولى ثلاثية الشع المستطيلة المنحصر النوبة || لحما متوسط الصنف ، مأكول في بعض فصول السنة ، سام في فصل الربيع .

٢١١١٥ - فندقيات

Ballistidae (S).
Ballistidae (F). **Ballistidae (E).**
فضيلة اسماء بحرية من ملحوبات الفلك شاكاتك الزعانف . اجناسها وانواعها عديدة اصنافها بجار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . مسرحها حشاش المهادج ، قوتها الرخويات ونواحي الرجان والمرجان || اجناسها شبه يضيء الشكل ، مبطلة الجسم ، عادمة الاعناق ، تطول من ٤٠ الى ١٠٠ سم . قشورها مراكب الفلوس الحريشة . رؤوسها مسلحة بزنانف مهازية مدببة حادة تستقر وتثبت عند الحاجة . اسنانها صلبة قوية تمكنها من سحق صدف الحمار والرخويات ومن هرس نواحي الرجان والمرجان || انوثها ملونة فيها الازرق والاصفر والبني والاسود والاحمر والبرتقالي والاحمر القويدي والبي والارصاعي والاسود || لحومها جسيمة الصنف ، مأكولة في بعض فصول السنة ، سامة في فصل الربيع من اواخر آذار الى اواخر حزيران || اشهر اجناسها الفنداق أو حشر الماء .

٢١١١٦ - فندقس

Phoenix (S).
Phénix (F). **Phoenix (E).**
طائر عراني ورد ذكره في اساطير الاولين . اما اليوم فلاسم يطلق على ديك من الفروسيات هو الفندك الياباني الطويل الزنكي الزاوي الالوان .

٢١١١٧ - فندقل

Funicule (F). **Funicle (E).**
هو من الزباني سويها التليق الذي يحمل في نهايته الصق

٢١١١٨ - فندقلي

Funifère (F). **Funifer (E).**
نمت تعريفي يطلق في علم الاحياء على كل عضو مجهز بزوائد خيطية الشكل دقيقة شبيهة بالفنقل .

٢١١١٩ - فندك

Fennec (S).
Fennec, Fenec (F). **Fennec (E).**
نوع من الثعالب صغير الجثة ، ناعم الوبر ، وطيح للقدم ، يمتد بكبر اذنيه وامتداده ويحاطه ذنبه || قوته الصافير والموبيات والحشرات والزحافات واليرابيع ... مسرحه من القروب الى الشرق ، ويبره نفق مستطيل وسيد المدخل . اثناء تقعر من ٣ الى ٤ جراه || موطنه فصيح الاربعاء يشمل القارة الافريقية مع الجزيرة العربية وجوارها || ضروبه المروفة اربعة :

٢١١٢٠ - فندك اغبير

Fennecus pallipes (S).
Fennec pala (F).
ضرب من الفندك موطنه افريقية الشرقية والقرية وبلاد الثوب وكردفان . ثوبه دلي القرن ، ظهره احمر الملبج ، الذي اسود الطرف . جسمه يطول نحو ٥٠ سم . منه الذنب الذي يبلغ ٢٥ سم .

٢١١٢١ - فندك البركادي

Fennec sabora, Sabora (F). **Sabora fennec (E).**
ضرب من الفندك موطنه الثوب وصماري الجزائر وتونس وسورية والصوم والافان . ثوبه بلون الرمل الاسمر . ظهره

٢١١٢٠ - فنداق

Facture (F). **Invoice (E).**
هي الفاتورة أي قائمة الحساب .

٢١١٢٦ - فندة

Vanda (S).
Vanda (F). **Vanda (E).**
جنس نباتات اسيمة من السحليات . انواعها المروفة نحو ٣٥ اصنافها البلاد الحارة . جميعها بيرة وتزيينية . ازهارها كثيرة متباينة الاشكال الجميلة . الوانها زاهرة زاهية || تزور في المراكب : تحشى الصنح || اشهر انواعها واعما زروعة الثلاثة التالية :

٢١١٢٧ - فندة البغثال

Vanda coerulea (S).
نوع من الفندة . مهدا البنغال وقد انتشرت زراعتها في معظم اقطار المسكونة || ازهارها كبيرة جميلة زرواء اللون .

٢١١٢٨ - فندة التيمور

Vanda insignis (S).
نوع من الفندة . مهدا بلاد التيمور وقد انتشرت زراعتها في كل مكان || ازهارها متوسطة الفندة ، سطحية اللون مبقعة بالارزواني .

٢١١٢٩ - فندة الجزور

Vanda lindeni (S).
نوع من الفندة . مهدا جزر الزابج ، ازهارها حنقودية التجميع لونها الى الصغار الكبريتي الالام الجميل .

٢١١٣٠ - فندود

Ramaria botrytis (S).
Ramaria chou-fleur (F).
فطر من فصيلة الدبويات . اصنافها غابات جبال البلاد المعتدلة الحرارة . يمش على المواد النباتية المتحللة . سانه شديدة القصر منتجة مع التكملة . نكهته تحت لحمي تتكون قشبه فيه مجموعات من المراجين الصغيرة تبدو كزهره الانبيط قشورها يروج من ١٠ الى ٢٠ سم . لونها الى النبرة الصفراء الملبج ، هارجتها الى الصفرة السوداء السقاء || لحيتها جميلة الصنف ، لذينة الطعم ، مرغوب فيها .

٢١١٣١ - فندية الزهر

Ramiflore (F).
نمت تعريفي يطلق على كل نبات ازهاره فندية لاتنتش .

٢١١٣٢ - فندقيات

Placrythinens (F).
هي الحيات مجسمة قرد العالم الجديد .

٢١١٣٣ - فندقس

Groin (F). **Snout (E).**
هي القروطة والقروطة أي علم الحزير .

٢١١٣٤ - فندر المتوسط

Ballistes capricus (S). **Balliste capricus (F).**
Trigger-fish, Ballistes (E).

نوع من الفندر . سمكة بحرية يهوي من فصيلة الفندقيات ودية ملحوبات الفلك شاكاتك الزعانف . اصنافها بعض اقالم البحر الابيض المتوسط . مسرحها حشاش المهادج ، قوتها التشرية والرخويات ونواحي الرجان والمرجان || جسمها يضيء الشكل ، مبطط الجسم ، عديم الفتق ، يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . سرانقتها جامدة حريشة . ثوبها متداخل الالوان يغلب فيه البنفسجي للفتات المماجات يملو بتيج ازرق واجر وتضلع اصفر وبرتقالي وكسني ويؤوي || راسها مخروطي الثوزن صغير الطعم والنم والشاذ . اسنانها قوية ، حادة ، ثنائية الصف . عيناها



فندة



فندود



فندر المتوسط

فَنِيْهِيمُ (F. Fenihiem) : جنس من الفئاض، جسمه بطول نحو ٤٨ سم. منه الذئب الذي يبلغ ٢٢ سم.
٢١١٢٢ - فَنَكْ زَرْدَه * زَرْدَه
Fennecus zarda (S). *Fennec zarda*, *Rondr du zahara* (F). *Zarda fennec*, *True fennec*, *Sahara fox*, *Fennec of bruce* (E).



فَنَكْ زَرْدَه

شرب من الفلك موطنه الصحاري الأفريقية ووادي النيل والنوبة وصنار وفزان والجزيرة حتى سيناء وسوريه. وهو أصفر شربوب الفلك وأحسبها شكلاً وأقربها الفل. ثوبه بلون الرمال يمتزج مع اقترابه من ثوب الفلور. جسمه بطول نحو ٤٠ سم. منه الذئب الذي يبلغ ١٨ سم.

٢١١٢٣ - فَنَكْ لَفِي * أَسْ
Fennecus chama (S). *Fennec chama*, *Chama*, *Asse* (F). *Caama*, *Asse* (E).

شرب من الفلك موطنه غابات نهر الأورنج من أفريقية الجنوبية. جسمه بطول نحو ٦٢ سم. منه الذئب الذي يبلغ ٣٠ سم. ثوبه إلى الصبغة الرملية الملوحة. ظهره فضي اللون. طرف خلفه وذنبه إلى السرة السوداء.

٢١١٢٤ - فَنَكْ * هَسْتَه * زَنْبَقُ الْهَكَر
Funkia, *Hosta* (S). *Funkie* (F). *Plantain lily*, *Japanese day lily* (E). *Herzillie*, *Hosta*, *Tagillie* (D). *Funkia*, *Hosta*, *Giglio plantaggine* (I).

جنس نباتات عشبية جذموية معمرة من فصيلة الزنبقيات. أنواعه قليلة مهددة الصين واليابان. موطنها شرابية الانتشاب.

أزهارها صفويدة التجميع. أوراقها مستطبة ضيقة قاعدة. أعرف وأشهر أنواعه اليابانية ما يلي.

٢١١٢٥ - فَنَكْ سَتَانِيَه *
Funkia lancifolia, *Hosta lancifolia* (S). *Funkie lancifolia* (F).

نوع من الفئكة أوراقها سنائية النصل حيلة أخضراء طولها من ١٠ إلى ١٢ سم. وعرضها من ٤ إلى ٥ سم. شرابها نحو ٢٣ سم. ثوبه من ٢٠ إلى ٢٥ سم. صفويدة يحد من ٦ إلى ١٠ أزهارها طولها نحو ٣ سم. لونها إلى البياض الناصع. أزهارها يستمر من تموز إلى آب.

٢١١٢٦ - فَنَكْ سَبُولَه *
Funkia Sieboldiana, *Hosta Sieboldiana* (S). *Funkie Siebold* (F).

نوع من الفئكة أوراقها بيضية الشكل، نصلها عديد اللوح. طولها من ٢٥ إلى ٣٠ سم. وعرضها من ١٧ إلى ٢٣ سم. ثوبها الأزرق المسحب. شرابها الزهري يحد من ٣٠ إلى ٤٠ سم. صفويدة يحد من ٥ إلى ٨ أزهارها طولها من ٧ إلى ١٠ سم. لونها إلى الزرقة البنفسجية المزججة. أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

٢١١٢٧ - فَنَكْ قَلْبِيَه *
Funkia ovata, *Hosta coerules* (S). *Funkie bleue* (F).

نوع من الفئكة أوراقها قلبية الشكل، نصلها مائل إلى البثرة، بارز اللوح، حبل أخضراء تملوه زنته يحد من ٢٣ سم. ثوبها الأزرق المسحب. شرابها الزهري يحد من ٣٠ إلى ٤٠ سم. صفويدة يحد من ٦ إلى ٩ أزهارها طولها من ٣ إلى ٤ سم. لونها إلى الزرقة الجدية. أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

٢١١٢٨ - فَنَكْ يَابَانِيَه *
Funkia subcordata, *Hosta japonica* (S). *Funkie du Japon* (F).

نوع من الفئكة أوراقها بيضية الشكل، نصلها مائل إلى البثرة.



فَنَكْ لَفِي

٢١١٢٩ - فَنِيْهِيمُ
Aphanomyces (S).

جنس فطور مجهرية من الفيشيات أنواعه عديدة تتطفل على الحيوان والنبات، أشهرها وأضرها ما يلي.

٢١١٣٣ - فَنِيْهِيمُ لَاسِ *
Aphanomyces Levis, *A. cochlioides* (S).

نوع مجهرية من الفئوس يسبب بؤر الشوفن عند انتشارها فيقضي عليها وإذا أصابها بعد الانتاش في زين الفصاح والادبائ أوق بها الإضرار الجدية. أما إذا أصاب الشتول يحد فيها نفاها تقاومه ولكنها تفتأ وينخفض انتاجها. مظهره على الأوراق أخضراء زيتوني الملوحة يحد ذيل النصل في النهار ووصله في الليل. وهو في الجذور عند قطعها حروق سود مجهرية. يمكنه باجتناب الزراعة في المراتح الملوحة وبطويرة البذر والتربة.

٢١١٣٤ - فَنِيْهِيمُ مَسْجُورِي
Aphanomyces Magnoli (S).

نوع من الفئوس يتطفل على السلاطين البهري فيؤذي ويسبب هلاكها.

٢١١٣٥ - فَنِيْهِيمُ
Flacherie (F). *Flaccidity* (E).

ويسمى «فلأشري» مرض ميكروبي فلك يسبب دود الفز في جهازها الهضمي عند انسلاخها الرابع.

٢١١٣٦ - فَنِيْهِيمُ
Venidium (S). *Vénidie* (F).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة المركبات. أنواعه نحو ٢٠ معظمها بري ويصنف تربي. أوراقه متضاربة وبائية الشكل، ملتوية؛ نصلها قديم القدر خل البثرة. ورويشاته الزهرية كثيفة التجميع ظهرها نحو ٦ سم. لونها مسنة الطوف، برتقالية اللون. طليها مفرع الشكل قنانيته متضاربة مرسومة، ثلاثية أو رباعية الصفوف. أشهر أنواعه ما يلي.

فَنِيْهِيمُ لَاسِ



نحو ١٣٥ سم. ويصلو ٧٥٠ أما طول ذنبه فلا يقل عن ٧٥ سم. وهو اجلس واكمل شكله من الاعرف. ثوبه كثيف الورب القصير. كبير الرقعة السوداء.

٢١١٤٦ - قهنة أعرف * *Cynailurus jubatus* (S). *Guépard à crinière* (F). *Hunting leopard*, *Che-tah* (E). *Tschitah*, *Gemähne gepard* (D).

نوع من القهنة اصطناعه تسمية الاربعاء تحت من الهند الى بلاد العرب وافريقية الشرقية والبرية والشمالية || جسمه يطول نحو ١٣٥ سم. ويصلو ٧٥٠ سم. اما ذنبه فلا يقل عن ٧٥٠ وهو رقيق القوام صغير الرأس مستدير. متوسط الاذن اعرف العنق. ثوبه قصير الورب. صغير الرقعة.

٢١١٤٦ - قهنة أوبير * *Cynailurus lanus* (S). *Guépard laineux* (F).

نوع من القهنة اصطناعه تشبه بلاد افريقية الجنوبية. جسمه يطول نحو ١٠٥ سم. ويصلو ٦٠٠ سم. اما ذنبه فلا يقل عن ٥٥ سم || ثوبه كثيف الورب المستطيل. وقلته الى الجفوة السوداء.

٢١١٤٧ - قهنة *Barbus perince* (S). *قهنة* سمكة نهريّة من الشبليات تعرف باسم بني دجلة. يكثر وجودها في دجلة والفرات.

٢١١٤٨ - قهنة نباتية *Phytonymie* (F). *Phytonymy* (E).

القهرسة النباتية مجموعة الالفاظ والمصطلحات الخاصة بالمادة الى النبات.

٢١١٤٩ - قهنة *Atlas*, *Vertèbre atlas* (F). *the first cervical vertebra* (E).

القهنة هي اول فقرة من العنق تلي الرأس. وهي موصل العنق بالرأس او مركب الرأس في العنق.

٢١١٥٠ - قهنة * *Promececephalus* (S). *Tétrodon* (F). *Globe fish*, *Puffer* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة القهنتيات. انواعها عديدة معظمها من اسماك بحار البلاد الحارة. تتميز بقرابة اجسامها المتضخمة التي تبهر كالنفاخ غالية من الرأس.

٢١١٥١ - قهنة سمكة * *Canthaster valentini* (S). *Tétrodon venimeux* (F). *Venomous Globe-fish* (E).

نوع من القهنة. سمكة بحرية يمرض اصطناعها بعض مناطق البحر الاحمر والمحيط الهندي. لديها الحياتي جماعي. اجسامها كثيرة البدن || جسمها يطول من ٢٤ الى ٣٥ سم. رأسها يرمي الشكل. عيناها كبيرتان. جاحشتان. وفتحها الاركان. ثوبها الى الطحلة القفصية المرقشة بالبي ويملوها اربع جذات سود متفرقة. الاول عند عتق الرأس والاخر عند قاعدة الزعنفة الذيلية || لها سام لا يترك.

٢١١٥٢ - قهنتيات *Tetrodontidae* (S). *Tétrodonitidae* (F). *Tetrodontidae* (E).

فصيلة اسماك من رتبة مسلمات الفكوك حركات الانسان. اجناسها وانواعها كثيرة البدن. اصطناعها بحار البلاد الحارة. جميعها من الاسماك المتضخمة القوية الاشكال والاقواب.

٢١١٥٣ - قهنة *Arnæble* (F). *قهنة* هي الاطن. اطلبه.

٢١١٣٧ - قيدوم آذربايجاني الزهر

Vanidium calendulaceum (S). *Vanidia à fleurs de soude* (F).

حشبة حولية سريرية زينة مزينة الساق والفرع تملو نحو ٣٠ سم. فروها انيقة الانتشار. اوراقها مالة الصفة العليا الخضراء اللون. اما السفلى زرقاء طنية. وورساتها الزهرية تشبه وريسات الاذنين. طباها حشبي اللون. لسنتها برتقالية || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

٢١١٣٨ - قيدوم مهدب * *Vanidium wyleyi* (S). *Vanidia hirsute* (F).

حشبة حولية زينة سريرية مزينة الساق والفرع المتضخمة. تملو نحو ٢٥ سم. اوراقها غبراء اللون حشبية النصل حل صفحتي || وورساتها الزهرية متصلة الهند. طباها جزوي اللون. لسنتها حشبي الزام الاول. مذهبة الثاني والثالث. برتقالية الزام الاخير || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف.

٢١١٣٩ - قيتيق الفيتيق نجم لير من كوكبة برج الثور.

٢١١٤٠ - قيتيق الفحل الكرم من الابل الذي لا يركب ولا يان.

٢١١٤١ - قيتيلة *Vanille* (F). هي القيتيلة. اطلبها.

٢١١٤٢ - قهارة * *Anémophilie* (F). *Anemophily*, *Anemogamy* (E).

القهاراة التأثير الطبيعي الذي كونه الرياح يتقلها الريح اي جذرات الطلع من الاسدية الذكرية الى الملقات الانثوية.

٢١١٤٣ - قهنة *Cynailurus* (S). *Guépard* (F). *Cheetah*, *Chita* (E). *Gepard*, *Jagdeoparden* (D).

القهنة واحد القهنة. جس حيوانات مفترسة من فصيلة السنوريات. انواعها المعروفة ثلاثة شكلها بين النمر والكلب. جسم كلب يحمل رأس سنور. مزاجه كزاج النمر في طبعه مشابه لطبع الكلب. ومن خلقه انه يأنس لمن يحسن اليه ويكابر القهنة اقل قناديب من سفارها. يقال ان اول من اصطاد به كليب بن وائل واول من خله على الخيل يزيد بن معاوية بن ابي سفيان || ويضرب بالقهنة للثقل في كثرة النوم. وهو احيى الجفة. رقيق القوام. مستطيل القنب. جسمه يطول من ١٠٥ الى ١٣٦ سم. ويصلو من ٦٠ الى ٧٥ سم. اما طول ذنبه فيراوح بين ٥٦ و ٧٦ سم. وهو مرقط النوب اما رقبته متفرقة لا يتجمع كالحلق كما في النمر وليس لبرائه اكام كما في بران السنوريات. قوته ما استطاع اليه سبيلا من الظلم والمها والنم والمزى والايال ويختلف المبررات. الاثني نفس من ٣ الى ٥ جراء توموا وتربها بمنزل من الذكر || اما نواحه الثلاثة فهي :

٢١١٤٤ - قهنة أوقط * *Cynailurus guttatus* (S). *Guépard moucheté* (F). *Chita* (E). *Fahhad* (D).

نوع من القهنة اصطناعه تسمية الاربعاء تشبه الهند والافغان وبران وحوض بحر ترون وبلاد البرية وافريقية الشرقية والشمالية مع الصحراء الكبرى والسفال || جسمه يطول



قهد ارقل



قهد ارقر



قهد اور



قهنفة



قهنفة سمكة

٢١١٦٥ - فُوتُوْمِتر ، مِهيتره .
Photomètre (F).
Photometer (E).

٢١١٦٦ - فُوتُوْمِترِيه ، هِيَمَاه .
Photométrie (F).
Photometry (E).

٢١١٦٧ - فُوتُون ، فُوتُون .
Photon (F).
Photon (E).

٢١١٦٨ - فُوتِينِيه * ، لَامِعَه .
Photinia (S).
Photinia, Photinia (F). May bush (E). Glanzstrauch (D). Fotinia, Arguta (I).

جنس الشجار من فصيلة الورديات. انواعها قليلة، أكثرها بري وبعضها زراعي. زينة || موطنها مالة متنبه اوراقها ايلدها نصلها جامد الصفة، جبل الخضار اللامع. ازهارها مختلفة الالوان يكثر فيها الازهر .

٢١١٦٩ - فُود .
Tempe (F). Temple (E).

هو في الحشرات الجزء الجانبى الخلفى من درع الرأس من في الحشرات . وما فوقه والجمع أوداد .

٢١١٧٠ - فُودَتِج ، فُودَتِج .
٢١١٧١ - فُودِيل * .
Photodilus (S).
Photile (F).

جنس طير من الرواس الكواس وفصيلة الببويات . انواعه المرفوعة قليلة الحد اطلاقا تمتد من الاناث الى الهند وسواها || اجسامها صغيرة تطول من ٣٣ الى ٣٧ سم . رؤوسها مكورة . اجنتها لافحة . اوتها لثالية اللون . تتميز بلذات رؤسها الشديدة التنوع || ملجبات الحبات جامي . تألف القباب والحراج . قوتها الثيران والرفافات والصفاد وكل ما تيسر لها .

٢١١٧٢ - فُودَان .
Effervescence (F).

النجان الذي يحصل عند اقلاق الغاز واعلاصه من السائل الذي كان متحدا به .

٢١١٧٣ - فُودَان .
Folsemmement (F).
Expansion, Swarming (E).

ازدياد حجم الكلس والارثية الكلية بتأثير الماء .

٢١١٧٤ - فُودَالِدِيَه .
٢١١٧٥ - فُودُومِل .
Formol

مطهر قوي يستخدم في تطهير الاماكن الموبوءة وبمكافئة الاضرار الفطرية ويحرق بعض انبثات الزراعية .

٢١١٧٦ - فُودُودِيُوم .
Fusidium

٢١١٧٧ - فُودُوسِيَا ، جَمِيل .
Fuchsia (S).
Fuchsia (F). Garden fuchsia (E). Fuchsia, Tapezenblume (D). Fuzia (I).

جنس نباتات زينة معمرة من فصيلة الاسخريات . انواعها المرفوعة نحو ٥٠ اما غروبها فحوال ٥٠٠ سوقها وفروعها خشبية . اوراقها متعابلة ثنائية او ثلاثية

٢١١٥٤ - فُهيتره * .
Clavagella (S).
Clavagelle (F). Clavagella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم وفصيلة الفُهيترات . انواعها المنتشرة المتصيرة توجد في الطبقة البيسانية . انواعها الماصرة قليلة اطلاقا البحر الابيض المتوسط والمحيط الهادي || اصداها ثنائية المصارع ، شبه انبوية الشكل مستطيلة تنتهي بكرة متقوية .

٢١١٥٥ - فُو .
هو ناردين الحدائق ، اطلبه .

٢١١٥٦ - فُوَاخِكَه .
Xylosma (S). Xylosme (F).

شجرة برية وزينية من فصيلة التنضيات . منها الصين ساها متنبه سرسة . اجنتها وانادها شاككة . اوراقها ابيده متعابلة معتقة . نصلها يضي الشكل ، مدبب القنصة جامد الصفة . لامع البشرة . ازهارها وبيده الشق صغيرة القد ، اصفر اللون ، فواصة العرف المطري . ازهارها متفردية التجميع يحوي الايتكار . ثمارها منية الشكل والذو . بتنجسية اللون يملوا مواج اسود . ثمرها يفسر من آب الابل .

٢١١٥٨ - فُوالِيَا .
Pivoine (F).

هي الريح ، اطلبه .

٢١١٥٩ - فُوالِيَسِي .
Cardiosperme (F).

هو البكتف ، اطلبه .

٢١١٦٠ - فُوب .
F.O.B.

خالص الى السفينة . صيغة اشتراط تجب حل البائع تسليم المبيع ، دون اجرة نقل ، على ظهر السفينة الناشئة .

٢١١٦١ - فُوه * ، فُوه الصبائين .
Rubia tinctoria (S). Garance, Garance tinctoriale (F). Madder, Dyer's madder (E). Firberste, Rote (D). Garanza, Rubbia, Robbia dei tintori (I).

نبات جذوري صباغي معمر من فصيلة الفويات . جذاميره مادة حمراء اللون مستطيلة الفروش الكثيفة التجميع . ساقه رباعية الاصلع شاككة الحروف ، تملو نحر ٢٠٠ سم . اوراقها متعابلة ، ضمية ، رباعية او سداسية التجميع . نصلها سناني الشكل ، ازغب الصفة السفلى ، مدبب الحاد . ازهاره خالية التركيب لونها الصفرة يملوا مواج اخضر || جذاميره غنية بالمواد الخشبية الحمراء وفي لا تحلو من المنافع الطبية اجنتها در البول .

٢١١٦٢ - فُورَتِجِ المَاء .
Menthe aquatique (F).

هو ننع الماء ، اطلبه .

٢١١٦٣ - فُورَتِجِي بَرِي .
Poultice (F).

هو ننع الحقل ، اطلبه .

٢١١٦٤ - فُورَتِجِي مِصْرِي .
Véronique d'eau (F).

هو فيرونيكا سيق المي ، اطلها .



فهيتر



فوة



فوتيه



فوديل

Fuchsia ٢١١٨٤ - **فوشين**
صياغ آخر يستعمل في تلون الانسجة المضوية تشكين من درهما المجهري . وهو يستحضر من تأكيد الانثيين بالنيروبزين .

Foussa (F). ٢١١٨٥ - **فوشه**
الفوشة حيوان لاس مفترس يسمى صاس ، اطله .

Anarchisme (F). ٢١١٨٦ - **فوشيزم**
Anarchism (E).
الفوشية ملعب سياسي قوامه ابدال اعمال السلطة الحاكمة بالمبادعة القروية .

Virulence (F). ٢١١٨٧ - **فوشه**
Virulence, Malignity (E).
خاصة في بعض الميكروبات تجعلها اذا دخلت جسماً تكررت فيه بسرعة وخلفت افرازات وبيلة تحدث اوهم المراتب .

Pellicule d'un noyau (F). ٢١١٨٨ - **فوشه**
Pellicle of the stone (E).
الفوشة ج فوش . هي شفاء التلوة .

Nauclea (S). Naclée (F). ٢١١٨٩ - **فوشل**
Nauclea (E). Morgenstern (D). Nauclea (I).
حس نباتات برية من فصيلة الفويات ، انواعها المعروفة نحو ٥٠ اصلها المناطق الحارة من القارتين الاسيوية والافريقية . مظهرها اشجار شائكة السوق والفروع وبعضها جنبات متسلقة . اوراقها معتقة ، متعاقبة ، بيضيه الشكل ، فصلها جامد المسحة ، مائل البصرة كثير المروق . ازهارها ابطية شعاعية ملونة || اشهر انواعها الفوشل الهندي .

Nauclea (S). Naclée (F). ٢١١٩٠ - **فوشل هندي ، فوشل سرح**
Nauclea inermis (S). Naclée inermis (F).
نوع من الفوشل وهو جنبه متسلقة سرسة تملو من ٣ الى ٥ امتار . ساقها قليلة الفروع ، سمكة القشور الطيبة الناقمة . تستعمل ضد الحميات .

Dividivi (F). ٢١١٩١ - **فوشل**
هي المتمد الساق ، اطله .

Métahumain (F). ٢١١٩٢ - **فوشل بشري**
نعت تعريفي يطلق على ما هو فوق التفكير البشري وادراكه .

Fucū, Varech ٢١١٩٣ - **فوشس**
هو الصريع جلس نباتات بحرية من فصيلة الفوشيات .

Fucacea (S). ٢١١٩٤ - **فوشسيات**
Fucacées (F). Fucaceae (E).
فصيلة نباتات مائية من رتبة الخفيات السمر . اجناسها وانواعها كثيرة المدد معظمها بحري المنبت .

Vochysiacae (S). ٢١١٩٥ - **فوشيزيات**
Vochysiacées (F). Vochysiacae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة العائلات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة المدد اعلاها مطم اصقاع امريكة الاستوائية || جميع نباتاتها معمرة ، بعضها شجري

التجميع . ازهارها جملة الشكل ملونة الكزوين ، رباعية الفصل والفصلات ، ثمانية الاسبدة || ترطب في الازرة المتوسطة الاندماج والربولة ، الثنية بالمواد المضوية والمانسار المعنية . غير انها تحشى المراض الطليقة الكثيرة الاشخاص || اشهر انواعها ما يتبع .

Fuchsia fulgens (S). ٢١١٧٨ - **فوشيا بهيجه**
Fuchsia elatans (F).
نوع من الفوشيا وهي جملة رفعة تملو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها صفراء . ساقها وفروعها كثنية . اوراقها خضراء اللون ، بيضيه الشكل ، مفترقة الفصل ، طولها من ١٠ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٥ الى ١٢ سم . ازهارها صفودية التجميع متدلية . كزوها وفصلها مستطيلة مرجانية . يتلاتها الى الحرة الاربوانية الساطعة || ازهارها يستمر طوال الصيف .

Fuchsia triphylla (S). Fuchsia à feuilles ternées (F). ٢١١٧٩ - **فوشيا ثلاثية الأوراق**
نوع من الفوشيا وهي جملة سرولية صغيرة لثة تملو من ٢٥ الى ٤٥ سم . اوراقها خضيه ، ثلاثية ، حنانية الشكل ، طولها من ٤ الى ٨ سم . فصلها اخر اللون ، لمع المواج ، خلي المروق . ازهارها صفودية التجميع متدلية ، ارقبا الى الحرة القزمية || ازهارها يستمر طوال السنة .

Fuchsia magellanica, F. macrostemma, F. coccinea, F. corallina (S). Fuchsia commun (F). Common fuchsia (E). ٢١١٨٠ - **فوشيا شائكة**
نوع من الفوشيا وهي جملة سرولية تملو نحو ١٠٠ سم . فروعها تحلة حمار اللون . اوراقها معتقة اهلجية . ازهارها متدلية جرسية الشكل . كزوها وفصلها ارجوانية اللون . يتلاتها الى القرقة البنفسجية المواج || ازهارها يستمر من نحو الى تشرين الثاني .

Fuchsia corymbiflora (S). Fuchsia en corymbe (F). ٢١١٨١ - **فوشيا حلقية**
نوع من الفوشيا وهي جنبه جادسة تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . فروعها دقيقة كثنية اللون . اوراقها اهلجية ذلقة تطول من ٢٠ الى ٣٢ سم . فصلها خلي البصرة اخر الصفحة . ازهارها كبيرة لثة طليقة التجميع . كزوها ويتلاتها الى البياض الاخير ، فصلها ارجوانية حاققة المواج . ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

Fuchsia splendens (S). ٢١١٨٢ - **فوشيا لامعة**
Fuchsia brillante (F).
نوع من الفوشيا وهي جملة سرولية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروعها جزوية اللون لزجة . اوراقها الى الخضار الزاهي . ازهارها فردية ، ابطية ، مستطيلة المالحق ، متدلية . كزوها وفصلها ارجوانية اللون . يتلاتها صفودية . ازهارها يستمر طوال الصيف .

Fuchsia arborescens (S). Fuchsia arborescent (F). ٢١١٨٣ - **فوشيا شجيرة**
نوع من الفوشيا وهي جنبه جادسة فراه مهدا المكسيك . تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها بيضيه الشكل ، ذلقة الزام الاخير . طول نحو ٣٠ سم . فصلها خلي البصرة جزوي اللون . ازهارها صفودية التجميع ، طرفية الاوتكاز ، متصلة اللد ، ودية اللون ، متنبية . ازهارها يستمر من الخريف الى الربيع .



فوشيا بهيجه



فوشل

حبويه اليابسة صغيرة اللد عادمة التجليط تحمل غبراس وبريات القبول المادي .

٢١٢٠٣ - فول هندي
Pois d'Inde (F).
هو القنديل الباتر ، اطلبه .



فول (١)

٢١٢٠٤ - فول هندي مسهل
Strychnos ignatii
هو ستر يكتوس اينيلاس ، اطلبه .

٢١٢٠٥ - قوتع
وماثر احمر الرجلين كان رأسه شيب مصعوب ونها ما يكون اسود الرأس وماثر خلقه اغيره ابن سيده .

٢١٢٠٦ - قوتف
Enveloppe (F), Wrapper (E).
الفولت : ضاء كل شي .



فول (٢)

٢١٢٠٧ - قووم
All (F).
هو الثوم للزراعي ، اطلبه .

٢١٢٠٨ - قوومارين
Fumarine (F), Fumario (E).
مادة قلووية ضالة تستخرج من الشاهترج الخرنبي .

٢١٢٠٩ - قوومالكه
Fumana (S).
Fumane (F), Fumana (E).
جنس نباتات عشبية مجعولة من فصيلة الاذنيات .

انواعها المعروفة قليلة المدد جميعها برية . منها غابات وجراج وادغال بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || اوراقها وانماها صلبة العرف || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :

٢١٢١٠ - قوومالكه حربية
Fumana arabica (S).
Fumane arabique (F).

نوع من القنواة . فرومها متصبية . اوراقها متراكبة ، قصيرة الاذنيات ، غطية التصلال المستطيلة المنطقفة الرؤوس . انماها صغيرة صفراء اللون || تنويرها ديمبي .

٢١٢١١ - قوومالكه لرجية
Fumana glutinosa (S).
Fumane glutineuse (F).

نوع من القنواة . فرومها متصبية . اوراقها متراكبة ، مضائية ، لزجة . نصالها ضيقة ، مستطيلة . انماها ال الصفار الباهت . تنويرها ديمبي .

٢١٢١٢ - قوومالكه متحنبة
Fumana procumbens (S).
Fumane penchée (F).

نوع من القنواة . فرومها متحنبة . اوراقها مترافدة ، جلالة ، غطية . انماها ابطي الارتكاز . انماها صغيرة صفراء اللون . تنويرها صيني .

٢١٢١٣ - قوومة
Phoma (S).
جنس ظفود مجهرية من الصنبيات . بكتيدته كروية الشكل او بيضية مفلطحة تنشا تحت الادمة ثم ترقى ال السطح . مقه يركز على حلويات دقيقة . شغيراته قصيرة ، بروفاته مستطيلة ، بسيطة ، شائعة || انواعها عديدة تركب تختلف امقادات النبات . اشهرها :

٢١٢١٤ - قوومة البطيخا
Phoma solanicola (S).

فطر مجهرى يصيب سوق البطيخا وعروقها فيؤذيها ويثير نموا || مظهره الخارجي لطح مستطيلة ، ييش او صفر .



فوية البطيخا

والبيض الآخر جنبي . اوراقها كاملة ، متقابلة او ضمية . انماها خشنة ، متدعة الاوصات . ثمارها جرد مستطيلة تحضن بعض البذور المدية الاح .

٢١١٩٦ - فول * ، بالقلي ، بالقلاء ، جسمى
Vicia faba, Faba vulgaris (S). Fève (F). Broad bean (E). Buffbohnen (D). Fava (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة الفصائيات القتراشية . وهو نوع عديد القصبوب والاصرام فوارقها اختلاف علر السوق ولون الانماز وحجم القرون وشكل الحبوب . والقول نبات غليظ الجذور المخورة القليلة الانتساب ساقه متصبية ، مرعبة ، جواء ، محزوزة ، عادمة الفروع تعلمو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . اوراته متوالية مركبة . وريفاته شفعية الترتيب ، بيضبة النصل البحري اللون . انماها كبيرة اللد ، عتقودية التجميع ، ابطية الارتكاز ، يضاء القرون او حراء تملوا رقة بنفسجية سوداء المزاج . ثمار القرون مفلطحة مستطيلة تملف الحبوب التي يراوح عددا بين ٣ و ٨ . وحبوبه هذه التي تحتر من اش رائشت المأكلا الزراعية تحوي نحو ٨١٪ من البوسلات المقلاتية ، ترميها :

مواد ازوتية ٢١,٠١٪

مواد دهنية ١,٥٢٪

مواد هيدروكربونية ٥٥,٢٥٪

والقول يرغب في الارابة المتدعة ويفضل منها العلية الرملية ثم العلية الكلكية الرملية ثم العلية . وهو قليل الجودة والانتاج في اليل ، يفضل الري الذي يلائق مزاجه ويضاهت انتاجه || حاجته ال الاسمدة المعدنية تقتصر على الحامض السفوري والبوتاس . لزوم الكوم الواحد يقدر بنحو ٥٠ كيلو منها ٣٠ كيلو سوسفات و ٢٥ كيلو كلورور البوتاس تدر على التربة وتطر جيداً .

٢١١٩٧ - فول انجيل
Fève de cheval (F).
هو القبول المصري ، اطلبه .

٢١١٩٨ - فول اينيلاس
Strychnos ignatii (F).
هو ستر يكتوس اينيلاس ، اطلبه .

٢١١٩٩ - فول مسيبي
Haricot-seabe (F).
هو القنديل السبي ، اطلبه .

٢١٢٠٠ - فول صوفه كاتي
Arachide (F).
شائع باسم فسول صيد ، اطلبه .

٢١٢٠١ - فول كلكس
Physostigma venenosum (S). Physostigma vénéneux, Fève de Calabar (F). Calabar bean (E). Kalabarbohne (D). Fava del Calabara (I).

نبات عارض مسم من فصيلة القترينات . اوراته متقابلة انماها ارجوانية . يزود سامة لكنها لا تخلو من اللانح الطلية وقد تشمل في علاجات البين .

٢١٢٠٢ - فول مصري * ، فول انجيل
Vicia faba equina, Faba equina (S). Féverolle, Fève de cheval (F). Horse bean, Tick bean (E). Pteridbohne (D). Fava cavallina, Favetta cavallina (I).

ضرب من القبول زراعت واسعة الانتشار تكثر في مصر والسودان . ساقه وقيمة تملو نحو ١٠٠ سم . نصل وريفاته عابق الخضار . ثماره قرون صغيرة اسطوانية متصبية .

للملفوف والقنيط واللفت والسلم والحدود || مظهره الخارجي يقع مستعرضة تملو اطراف التصل . تبدو قمرية اللون من ممر حنطية المواج تفرح السج المنصاعة وتنفق عليها || يركب النبات في مختلف ادوار له يعيش في التربة || يكالغ اولا باجتناب تكرار زراعة الصليبيات في نفس الموقع . ثانياً يظهر البذار ، قبل نثره ، يحملون بيكلوريد الزنك المركز ٪ .

Phoma linicola (S). * قُوْمَةُ الكَتَانِ *
فطر مجهري يصيب سوق الكتان فيلوجيا . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستطيلة حنطية اللون يركب الساق في زامة الأول من التربة وصاعداً تفرح السماء والبشرة وتذبل النباتات . يكالغ يظهر التربة والنبات .

Phoma apicola (S). * قُوْمَةُ الكَرَفَسِ *
Gale du céleri (F).
فطر مجهري يصيب الكرفس واليقنوس في اجنتها وازاد اوراقها || مظهره الخارجي يقع حنطية تفرح البشرة ورفنها تقسب رغاوة وبذيل الانصاف الموصومة || يكالغ يظهر التربة والبذار .

١٢٣٣ - قُوْمِيسُ الجَدُورِ * ، قُثُود *
Hymenochaete noxia, Fomes lamarconis, Fomes noxius (S). Hymenochaete (F).
فطر من السميات موطنه البلاد الحارة . يركب جنود عدة نباتات انصفا القشقة والين والثاني والقطن || مظهره الخارجي انكاش فيصاف فذويل في الارواق يعقبها جيمش ويباس في الاثنان والثاني || وهو على الجذور خيطوط حفية مَرَامَة حنطية اللون تملق الجلود وقد تغلفها قشطب الجرامة والايلات || اما الفطر فهو كاشية من دلة زبام الجسم ، خيوانية النكمة المستمرة الخيطوط الجفوية اللون || ليس له علاجات شافية سوى الآن .

١٢٣٤ - قُوْمِيسُ لِيْمِي * ، سُمِيَّةٌ وَشَاحِيَّةٌ *
مرض الجندور الأبيض
Fomes lignosus, Fomes semitostus, Rigidoporus microporus, Polyporus zonalis (S). Polypore zonale, Maladie des « racines blanches » (F). White rot (E).
فطر من السميات موطنه البلاد الحارة يركب جنود عدة نباتات انصفا الكاكار والقشقة والمنا والنيثيل . مظهره الخارجي انكاش جزئي يحمل بعض اقسام الشجرة يسبب جفاف الارواق والاثنان بعد هجوم التواي . وهو على الجندور خيطوط متوازية جندورية اللعة الموصومة كعب النسبة . تبدو يضاء اللون ثم تبتنية وتنتهي بالوردي . شبيهه كيف الحيف يقتسم الجرامة فيطبعها مع اوعياها لا علاج له ، اما اجتنابه فيصور وذلك بالابتعاد عن ارميات الاشجار الحرجية اليابسة المتروكة في التربة . او بقتل هذه الارومات قبل المباشرة بالدرس .

١٢٣٥ - قُوْمُوسِيسُ *
Phomopsis (S).
جنس فطور مجهري من فصيلة الصنفيات . يتميز ببيكنياتة الاقياسية الشكل ، فطراته خرزوية او خيطية . بويغاته بسيطة ، شفافة ، مستطيلة ، جالسة او منقطة . اعرف انواعه ما يتبع .

١٢٣٦ - قُوْمُوسِيسُ التَّطُوبِ *
Phomopsis abietina (S).
فطر مجهري يصيب افئاد التنوب في نوابها . مظهره الخارجي اطار يملق التواي على حدود زامها الاشير

تركب الساق والمرووق قسب جفاف النج والصداق البشرة || يكالغ يظهر التربة .

١٢٣٥ - قُوْمَةُ التَّفَاحِ *
Phoma umbilicaris (S).
فطر مجهري يصيب ثمار التفاح والاجاص في ابان تمها . مظهره الخارجي بقعة حنطية تركب الثمرة عند خاتنها ثم تتد قلبك بعد ان تنفق البشرة ويطلع من الفطج ريفها ويصلها || يعتبر من الاوصام الملوثة الانتشار والاذى التي لا تستوجب المعالجة .

١٢٣٦ - قُوْمَةُ الْجَزَرِ *
Phoma sanguinolenta, Ph. rostrupli (S).
فطر مجهري يصيب الجزر في قرص سينه وقد يمتد الى الارواق || مظهره الخارجي يقع خطوطه اللون تبدو ميمرة ثم تنتشر وتتشارك تفرح الامة والبشرة وتصلها . ينشط في الارربة للبالية الرملية ويلاشي بقدر ما يزداد انصاف التربة .

١٢٣٧ - قُوْمَةُ الحُصْفِيَّاتِ *
Phoma citricarpa (S).
فطر مجهري يصيب اوراق وثمار الحصفيات . مظهره الخارجي ، على الوراق ، يقع صغيرة مستديرة ممره اللون تركب التصل على سفحت العليا || وهو على الثمار يقع مستديرة قطرها من ١ الى ٥ مم . تبدو ميمرة ثم تمتد وتتشارك خيلق ساحتها نحو ٢ سم ٢ . تكون في اول معدها غبراء اللون ثم تتحرق نحو المعطي وتنتهي بسلاسر . بيكنياتة فردية او ضمية للتصيص ، حنطية او ممره اللون ، قطرها من ١٥٠ الى ١٢٥ ميكرون . بويغاته اطيالية او مريدية الشكل ، قياسها نحو ٤×٩ ميكرون . يسبب الثمار ويقتصر مدة حفظها || يكالغ ينضج الاشجار بسائل يورود الملول ٪١ على ثلاث او اربع مرات ، الاول بعد اكبال الاجزاء بالسور والثانية بعد الاول بثلاثة اسابيع والثالثة بعد الثانية باربعة اسابيع والرابعة بعد الثالثة بخمسة اسابيع || ومنهم من استعمل الفواطير غير المركزة على النحاس وقد يكونوا مسميين .

١٢٣٨ - قُوْمَةُ الْاَنْزَمِي *
Phoma lavendulae (S).
فطر مجهري يصيب انزاس في فروعها الحرة والجدية فيلوجيا || مظهره الخارجي ذويل يحمل بالفروع القديمة والجدية سبب انتشار الورص بين الامة والبشرة التي تسر وتيس || بيكنياتة كروية قطرها يراوح بين ٨٥ و ١٥٥ ميكرون . بويغاته اسطوانية قياسها نحو ٢×٨ ميكرون || يكالغ يظهر التربة بالكلس الحراق بعد اتلاص ومروق النباتات المصابة .

١٢٣٩ - قُوْمَةُ الدَّرَةِ *
Phoma insidiosa (S).
فطر مجهري يصيب اوراق الدرة فيلوجيا . مظهره الخارجي يقع لاجسية الشكل والحجم تركب نسل الوراق . تبدو حنطية ثم تنصرف الى الرادي بعد ان يكتنفها اطار اصعب مابق || بيكنياتة مستديرة قطرها يراوح بين ٧٥ و ٨٠ ميكرون . بويغاته اطيالية قياسها ٢×٦ ميكرون .

١٢٤٠ - قُوْمَةُ الصَّيْصِيَّاتِ *
Phoma lingam (S).
فطر مجهري يصيب بعض نباتات الفصيلة الصليبية انصفا



قوة التفاح



قوة الحصفيات



قوة الدرة



فوس الجندور

٧١٢٤٧ - فيتامين (F). Vitamine (F). Vitamin (E).
 للفتيامين اسم يطلق على بعض المواد اللازمة لنماء الجسم ونموه مع العلم ان نقص نسبة من هذه الاغذية يسبب بعض الأمراض الميعة المعروفة بأمراض البوز || والفتيامينات اذا ليست مركبات غذائية تستخدم في بناء الانسجة او مركبات ضوئية تحترق تولد طاقة حرارية يستخدمها الجسم في نشاطه .. بل هي مواد واقية لازمة يفتقر اليها الجسم في جميع احواله وامراضه || والفتيامينات عديدة الانقسام تختلف باختلاف غاياتها وفعاليتها. أهمها حالياً الفيتامين **١** و **٢** و **٣** و **٤** و **٥** و **٦** و **٧** و **٨** و **٩** مليغرام. متوسطها جسم وزنه ٧٠ كلو يقدر بنمو:

فيتامين ٥	٧٠,٠٠٠ مع
فيتامين ٦	١,٥٠٠ مع
فيتامين ٢	١,٥٠٠ مع
فيتامين ١	٣,٥٠٠ مع
فيتامين ٥	٥٠,٠٠٣ مع

٧١٢٤٨ - فيتامين (A). Vitamine A (E).
 يفيد العين لان نقصه في الجسم يسبب تصطب المتصبه وضعف البصر والمسا || مصادره حيوانية ونباتية كما هي مدونة ادناه وقد جاء ترتيبها بالنسبة الى غناها .
 مصادره حيوانية : زيت كبد النحاس ، زيت كبد التونا ، السمك ، الكبد النوي ، النخاع ، صفار البيض ، البيض ، الكلوة ، الزبدية ، الشففة ، الجبن ، السم ، لحم البقر ، الحمار ، الحليب المكثف المحلى ، الحليب المالحزج ، اللحم المدخن .
 مصادره نباتية : يقطنوس طرخشقون ، هندباء ، سلق ، اسبانخ ، ملوخية ، قرع سلو ، حبيص ، خس ، مشمش ، قرع ، ورق النفل ، جزر ، بزيلا ، غووخ ، قلفلة ، زيتون ، شوندر ، كرفس ، بطندرة ، لوز ، موز ، ثوم ، جوز .

٧١٢٤٩ - فيتامين (B). Vitamine B (E).
 اسم شامل يطلق على عدة فيتامينات تدور في الملم . نشاطها كثير الفوائد اخصها تأمين النشوة ومضادة مرض البربري وداء الذئب || اما التمييز عن فوائدها ومصادره فهو منوط بالمدى اللانحاس كما في التصنيف التتابع حيث ذكرنا انواعها الثلاثة المشهورة مع مصادرها التي جاء ترتيبها بالنسبة الى غناها .

٧١٢٥٠ - فيتامين (B). Vitamine B (E).
 فيتامين **١** و **٢** و **٣** و **٤** و **٥** و **٦** و **٧** و **٨** و **٩** و **١٠** و **١١** و **١٢** و **١٣** و **١٤** و **١٥** و **١٦** و **١٧** و **١٨** و **١٩** و **٢٠** و **٢١** و **٢٢** و **٢٣** و **٢٤** و **٢٥** و **٢٦** و **٢٧** و **٢٨** و **٢٩** و **٣٠** و **٣١** و **٣٢** و **٣٣** و **٣٤** و **٣٥** و **٣٦** و **٣٧** و **٣٨** و **٣٩** و **٤٠** و **٤١** و **٤٢** و **٤٣** و **٤٤** و **٤٥** و **٤٦** و **٤٧** و **٤٨** و **٤٩** و **٥٠** و **٥١** و **٥٢** و **٥٣** و **٥٤** و **٥٥** و **٥٦** و **٥٧** و **٥٨** و **٥٩** و **٦٠** و **٦١** و **٦٢** و **٦٣** و **٦٤** و **٦٥** و **٦٦** و **٦٧** و **٦٨** و **٦٩** و **٧٠** و **٧١** و **٧٢** و **٧٣** و **٧٤** و **٧٥** و **٧٦** و **٧٧** و **٧٨** و **٧٩** و **٨٠** و **٨١** و **٨٢** و **٨٣** و **٨٤** و **٨٥** و **٨٦** و **٨٧** و **٨٨** و **٨٩** و **٩٠** و **٩١** و **٩٢** و **٩٣** و **٩٤** و **٩٥** و **٩٦** و **٩٧** و **٩٨** و **٩٩** و **١٠٠** و **١٠١** و **١٠٢** و **١٠٣** و **١٠٤** و **١٠٥** و **١٠٦** و **١٠٧** و **١٠٨** و **١٠٩** و **١١٠** و **١١١** و **١١٢** و **١١٣** و **١١٤** و **١١٥** و **١١٦** و **١١٧** و **١١٨** و **١١٩** و **١٢٠** و **١٢١** و **١٢٢** و **١٢٣** و **١٢٤** و **١٢٥** و **١٢٦** و **١٢٧** و **١٢٨** و **١٢٩** و **١٣٠** و **١٣١** و **١٣٢** و **١٣٣** و **١٣٤** و **١٣٥** و **١٣٦** و **١٣٧** و **١٣٨** و **١٣٩** و **١٤٠** و **١٤١** و **١٤٢** و **١٤٣** و **١٤٤** و **١٤٥** و **١٤٦** و **١٤٧** و **١٤٨** و **١٤٩** و **١٥٠** و **١٥١** و **١٥٢** و **١٥٣** و **١٥٤** و **١٥٥** و **١٥٦** و **١٥٧** و **١٥٨** و **١٥٩** و **١٦٠** و **١٦١** و **١٦٢** و **١٦٣** و **١٦٤** و **١٦٥** و **١٦٦** و **١٦٧** و **١٦٨** و **١٦٩** و **١٧٠** و **١٧١** و **١٧٢** و **١٧٣** و **١٧٤** و **١٧٥** و **١٧٦** و **١٧٧** و **١٧٨** و **١٧٩** و **١٨٠** و **١٨١** و **١٨٢** و **١٨٣** و **١٨٤** و **١٨٥** و **١٨٦** و **١٨٧** و **١٨٨** و **١٨٩** و **١٩٠** و **١٩١** و **١٩٢** و **١٩٣** و **١٩٤** و **١٩٥** و **١٩٦** و **١٩٧** و **١٩٨** و **١٩٩** و **٢٠٠** و **٢٠١** و **٢٠٢** و **٢٠٣** و **٢٠٤** و **٢٠٥** و **٢٠٦** و **٢٠٧** و **٢٠٨** و **٢٠٩** و **٢١٠** و **٢١١** و **٢١٢** و **٢١٣** و **٢١٤** و **٢١٥** و **٢١٦** و **٢١٧** و **٢١٨** و **٢١٩** و **٢٢٠** و **٢٢١** و **٢٢٢** و **٢٢٣** و **٢٢٤** و **٢٢٥** و **٢٢٦** و **٢٢٧** و **٢٢٨** و **٢٢٩** و **٢٣٠** و **٢٣١** و **٢٣٢** و **٢٣٣** و **٢٣٤** و **٢٣٥** و **٢٣٦** و **٢٣٧** و **٢٣٨** و **٢٣٩** و **٢٤٠** و **٢٤١** و **٢٤٢** و **٢٤٣** و **٢٤٤** و **٢٤٥** و **٢٤٦** و **٢٤٧** و **٢٤٨** و **٢٤٩** و **٢٥٠** و **٢٥١** و **٢٥٢** و **٢٥٣** و **٢٥٤** و **٢٥٥** و **٢٥٦** و **٢٥٧** و **٢٥٨** و **٢٥٩** و **٢٦٠** و **٢٦١** و **٢٦٢** و **٢٦٣** و **٢٦٤** و **٢٦٥** و **٢٦٦** و **٢٦٧** و **٢٦٨** و **٢٦٩** و **٢٧٠** و **٢٧١** و **٢٧٢** و **٢٧٣** و **٢٧٤** و **٢٧٥** و **٢٧٦** و **٢٧٧** و **٢٧٨** و **٢٧٩** و **٢٨٠** و **٢٨١** و **٢٨٢** و **٢٨٣** و **٢٨٤** و **٢٨٥** و **٢٨٦** و **٢٨٧** و **٢٨٨** و **٢٨٩** و **٢٩٠** و **٢٩١** و **٢٩٢** و **٢٩٣** و **٢٩٤** و **٢٩٥** و **٢٩٦** و **٢٩٧** و **٢٩٨** و **٢٩٩** و **٣٠٠** و **٣٠١** و **٣٠٢** و **٣٠٣** و **٣٠٤** و **٣٠٥** و **٣٠٦** و **٣٠٧** و **٣٠٨** و **٣٠٩** و **٣١٠** و **٣١١** و **٣١٢** و **٣١٣** و **٣١٤** و **٣١٥** و **٣١٦** و **٣١٧** و **٣١٨** و **٣١٩** و **٣٢٠** و **٣٢١** و **٣٢٢** و **٣٢٣** و **٣٢٤** و **٣٢٥** و **٣٢٦** و **٣٢٧** و **٣٢٨** و **٣٢٩** و **٣٣٠** و **٣٣١** و **٣٣٢** و **٣٣٣** و **٣٣٤** و **٣٣٥** و **٣٣٦** و **٣٣٧** و **٣٣٨** و **٣٣٩** و **٣٤٠** و **٣٤١** و **٣٤٢** و **٣٤٣** و **٣٤٤** و **٣٤٥** و **٣٤٦** و **٣٤٧** و **٣٤٨** و **٣٤٩** و **٣٥٠** و **٣٥١** و **٣٥٢** و **٣٥٣** و **٣٥٤** و **٣٥٥** و **٣٥٦** و **٣٥٧** و **٣٥٨** و **٣٥٩** و **٣٦٠** و **٣٦١** و **٣٦٢** و **٣٦٣** و **٣٦٤** و **٣٦٥** و **٣٦٦** و **٣٦٧** و **٣٦٨** و **٣٦٩** و **٣٧٠** و **٣٧١** و **٣٧٢** و **٣٧٣** و **٣٧٤** و **٣٧٥** و **٣٧٦** و **٣٧٧** و **٣٧٨** و **٣٧٩** و **٣٨٠** و **٣٨١** و **٣٨٢** و **٣٨٣** و **٣٨٤** و **٣٨٥** و **٣٨٦** و **٣٨٧** و **٣٨٨** و **٣٨٩** و **٣٩٠** و **٣٩١** و **٣٩٢** و **٣٩٣** و **٣٩٤** و **٣٩٥** و **٣٩٦** و **٣٩٧** و **٣٩٨** و **٣٩٩** و **٤٠٠** و **٤٠١** و **٤٠٢** و **٤٠٣** و **٤٠٤** و **٤٠٥** و **٤٠٦** و **٤٠٧** و **٤٠٨** و **٤٠٩** و **٤١٠** و **٤١١** و **٤١٢** و **٤١٣** و **٤١٤** و **٤١٥** و **٤١٦** و **٤١٧** و **٤١٨** و **٤١٩** و **٤٢٠** و **٤٢١** و **٤٢٢** و **٤٢٣** و **٤٢٤** و **٤٢٥** و **٤٢٦** و **٤٢٧** و **٤٢٨** و **٤٢٩** و **٤٣٠** و **٤٣١** و **٤٣٢** و **٤٣٣** و **٤٣٤** و **٤٣٥** و **٤٣٦** و **٤٣٧** و **٤٣٨** و **٤٣٩** و **٤٤٠** و **٤٤١** و **٤٤٢** و **٤٤٣** و **٤٤٤** و **٤٤٥** و **٤٤٦** و **٤٤٧** و **٤٤٨** و **٤٤٩** و **٤٥٠** و **٤٥١** و **٤٥٢** و **٤٥٣** و **٤٥٤** و **٤٥٥** و **٤٥٦** و **٤٥٧** و **٤٥٨** و **٤٥٩** و **٤٦٠** و **٤٦١** و **٤٦٢** و **٤٦٣** و **٤٦٤** و **٤٦٥** و **٤٦٦** و **٤٦٧** و **٤٦٨** و **٤٦٩** و **٤٧٠** و **٤٧١** و **٤٧٢** و **٤٧٣** و **٤٧٤** و **٤٧٥** و **٤٧٦** و **٤٧٧** و **٤٧٨** و **٤٧٩** و **٤٨٠** و **٤٨١** و **٤٨٢** و **٤٨٣** و **٤٨٤** و **٤٨٥** و **٤٨٦** و **٤٨٧** و **٤٨٨** و **٤٨٩** و **٤٩٠** و **٤٩١** و **٤٩٢** و **٤٩٣** و **٤٩٤** و **٤٩٥** و **٤٩٦** و **٤٩٧** و **٤٩٨** و **٤٩٩** و **٥٠٠** و **٥٠١** و **٥٠٢** و **٥٠٣** و **٥٠٤** و **٥٠٥** و **٥٠٦** و **٥٠٧** و **٥٠٨** و **٥٠٩** و **٥١٠** و **٥١١** و **٥١٢** و **٥١٣** و **٥١٤** و **٥١٥** و **٥١٦** و **٥١٧** و **٥١٨** و **٥١٩** و **٥٢٠** و **٥٢١** و **٥٢٢** و **٥٢٣** و **٥٢٤** و **٥٢٥** و **٥٢٦** و **٥٢٧** و **٥٢٨** و **٥٢٩** و **٥٣٠** و **٥٣١** و **٥٣٢** و **٥٣٣** و **٥٣٤** و **٥٣٥** و **٥٣٦** و **٥٣٧** و **٥٣٨** و **٥٣٩** و **٥٤٠** و **٥٤١** و **٥٤٢** و **٥٤٣** و **٥٤٤** و **٥٤٥** و **٥٤٦** و **٥٤٧** و **٥٤٨** و **٥٤٩** و **٥٥٠** و **٥٥١** و **٥٥٢** و **٥٥٣** و **٥٥٤** و **٥٥٥** و **٥٥٦** و **٥٥٧** و **٥٥٨** و **٥٥٩** و **٥٦٠** و **٥٦١** و **٥٦٢** و **٥٦٣** و **٥٦٤** و **٥٦٥** و **٥٦٦** و **٥٦٧** و **٥٦٨** و **٥٦٩** و **٥٧٠** و **٥٧١** و **٥٧٢** و **٥٧٣** و **٥٧٤** و **٥٧٥** و **٥٧٦** و **٥٧٧** و **٥٧٨** و **٥٧٩** و **٥٨٠** و **٥٨١** و **٥٨٢** و **٥٨٣** و **٥٨٤** و **٥٨٥** و **٥٨٦** و **٥٨٧** و **٥٨٨** و **٥٨٩** و **٥٩٠** و **٥٩١** و **٥٩٢** و **٥٩٣** و **٥٩٤** و **٥٩٥** و **٥٩٦** و **٥٩٧** و **٥٩٨** و **٥٩٩** و **٦٠٠** و **٦٠١** و **٦٠٢** و **٦٠٣** و **٦٠٤** و **٦٠٥** و **٦٠٦** و **٦٠٧** و **٦٠٨** و **٦٠٩** و **٦١٠** و **٦١١** و **٦١٢** و **٦١٣** و **٦١٤** و **٦١٥** و **٦١٦** و **٦١٧** و **٦١٨** و **٦١٩** و **٦٢٠** و **٦٢١** و **٦٢٢** و **٦٢٣** و **٦٢٤** و **٦٢٥** و **٦٢٦** و **٦٢٧** و **٦٢٨** و **٦٢٩** و **٦٣٠** و **٦٣١** و **٦٣٢** و **٦٣٣** و **٦٣٤** و **٦٣٥** و **٦٣٦** و **٦٣٧** و **٦٣٨** و **٦٣٩** و **٦٤٠** و **٦٤١** و **٦٤٢** و **٦٤٣** و **٦٤٤** و **٦٤٥** و **٦٤٦** و **٦٤٧** و **٦٤٨** و **٦٤٩** و **٦٥٠** و **٦٥١** و **٦٥٢** و **٦٥٣** و **٦٥٤** و **٦٥٥** و **٦٥٦** و **٦٥٧** و **٦٥٨** و **٦٥٩** و **٦٦٠** و **٦٦١** و **٦٦٢** و **٦٦٣** و **٦٦٤** و **٦٦٥** و **٦٦٦** و **٦٦٧** و **٦٦٨** و **٦٦٩** و **٦٧٠** و **٦٧١** و **٦٧٢** و **٦٧٣** و **٦٧٤** و **٦٧٥** و **٦٧٦** و **٦٧٧** و **٦٧٨** و **٦٧٩** و **٦٨٠** و **٦٨١** و **٦٨٢** و **٦٨٣** و **٦٨٤** و **٦٨٥** و **٦٨٦** و **٦٨٧** و **٦٨٨** و **٦٨٩** و **٦٩٠** و **٦٩١** و **٦٩٢** و **٦٩٣** و **٦٩٤** و **٦٩٥** و **٦٩٦** و **٦٩٧** و **٦٩٨** و **٦٩٩** و **٧٠٠** و **٧٠١** و **٧٠٢** و **٧٠٣** و **٧٠٤** و **٧٠٥** و **٧٠٦** و **٧٠٧** و **٧٠٨** و **٧٠٩** و **٧١٠** و **٧١١** و **٧١٢** و **٧١٣** و **٧١٤** و **٧١٥** و **٧١٦** و **٧١٧** و **٧١٨** و **٧١٩** و **٧٢٠** و **٧٢١** و **٧٢٢** و **٧٢٣** و **٧٢٤** و **٧٢٥** و **٧٢٦** و **٧٢٧** و **٧٢٨** و **٧٢٩** و **٧٣٠** و **٧٣١** و **٧٣٢** و **٧٣٣** و **٧٣٤** و **٧٣٥** و **٧٣٦** و **٧٣٧** و **٧٣٨** و **٧٣٩** و **٧٤٠** و **٧٤١** و **٧٤٢** و **٧٤٣** و **٧٤٤** و **٧٤٥** و **٧٤٦** و **٧٤٧** و **٧٤٨** و **٧٤٩** و **٧٥٠** و **٧٥١** و **٧٥٢** و **٧٥٣** و **٧٥٤** و **٧٥٥** و **٧٥٦** و **٧٥٧** و **٧٥٨** و **٧٥٩** و **٧٦٠** و **٧٦١** و **٧٦٢** و **٧٦٣** و **٧٦٤** و **٧٦٥** و **٧٦٦** و **٧٦٧** و **٧٦٨** و **٧٦٩** و **٧٧٠** و **٧٧١** و **٧٧٢** و **٧٧٣** و **٧٧٤** و **٧٧٥** و **٧٧٦** و **٧٧٧** و **٧٧٨** و **٧٧٩** و **٧٨٠** و **٧٨١** و **٧٨٢** و **٧٨٣** و **٧٨٤** و **٧٨٥** و **٧٨٦** و **٧٨٧** و **٧٨٨** و **٧٨٩** و **٧٩٠** و **٧٩١** و **٧٩٢** و **٧٩٣** و **٧٩٤** و **٧٩٥** و **٧٩٦** و **٧٩٧** و **٧٩٨** و **٧٩٩** و **٨٠٠** و **٨٠١** و **٨٠٢** و **٨٠٣** و **٨٠٤** و **٨٠٥** و **٨٠٦** و **٨٠٧** و **٨٠٨** و **٨٠٩** و **٨١٠** و **٨١١** و **٨١٢** و **٨١٣** و **٨١٤** و **٨١٥** و **٨١٦** و **٨١٧** و **٨١٨** و **٨١٩** و **٨٢٠** و **٨٢١** و **٨٢٢** و **٨٢٣** و **٨٢٤** و **٨٢٥** و **٨٢٦** و **٨٢٧** و **٨٢٨** و **٨٢٩** و **٨٣٠** و **٨٣١** و **٨٣٢** و **٨٣٣** و **٨٣٤** و **٨٣٥** و **٨٣٦** و **٨٣٧** و **٨٣٨** و **٨٣٩** و **٨٤٠** و **٨٤١** و **٨٤٢** و **٨٤٣** و **٨٤٤** و **٨٤٥** و **٨٤٦** و **٨٤٧** و **٨٤٨** و **٨٤٩** و **٨٥٠** و **٨٥١** و **٨٥٢** و **٨٥٣** و **٨٥٤** و **٨٥٥** و **٨٥٦** و **٨٥٧** و **٨٥٨** و **٨٥٩** و **٨٦٠** و **٨٦١** و **٨٦٢** و **٨٦٣** و **٨٦٤** و **٨٦٥** و **٨٦٦** و **٨٦٧** و **٨٦٨** و **٨٦٩** و **٨٧٠** و **٨٧١** و **٨٧٢** و **٨٧٣** و **٨٧٤** و **٨٧٥** و **٨٧٦** و **٨٧٧** و **٨٧٨** و **٨٧٩** و **٨٨٠** و **٨٨١** و **٨٨٢** و **٨٨٣** و **٨٨٤** و **٨٨٥** و **٨٨٦** و **٨٨٧**

موت الصيصان الحديثة التلق. مصادره عديدة أشهرها : زيت وشم الحطلة ، وشم الزروع ، الكبد البقر ، زيت فستق البعد ، زيت الفلفل ، زيت التوت ، زيت الصويا ، الحنظل ، الزباد ، القرفة ، عضلات البقر ، دهن الخنزير ، زيت الزيتون ، زيت الجوز ، الزبد ، الحنظل الكامل .

Vitamines (F).

٢١٢٥٠ - فيتامينات

انظر الجدول في الصفحة المقابلة .

٢١٢٥١ - فيتين زيتي* ، فيتودكتة زيتية

Phytodecta olivaceus (S). Phytodecta olivacea (E).

حشرة غاشقة من فصيلة التضاربات ورية غمدات الاجنحة . تألف البراري والاشراج الكثيفة . غناها ويراقتها تعيش على نباتات القرنيات القرشية وأصحاء الزوال والقنطول . جسمها صغير اللد يطول من ٤ الى ٨ م . ثوبها لك الصغار الزيتي الاسمر المبرج يملو في الظهور توشيح قائم وعطان أسودان قاطبان . رأسها كبير الجسم . حينها صغيرتان . زانها غيطان . ظهورها محدد الاحدياب . مستدير الطرف الاضف . غمداها متتابها التثقيب الخفيف . أرسافها رباعية العقل الظاهرة . لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في ايار وتبقى حتى ايلول . تسرح في النهار . تساد بعد ظهورها باربة اسابع . تمتع المكان رزنا لاقياسية الحنظل ضمن شفاء غروي المادة يلتصق بفضلات الازراق وبشرة البعاد . البرقة عند بلوغها الادراك تمام تطول نحو ٨ م . جسمها وشي الشكل ، سداسي الرواجب . ثوبها الى الصغار القاتم يطول تثقيب اسمر . رأسها وشربها ورواجها الى السمة . طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتغني في القرية تحت الحجارة ضمن جراب من التراب والمواد النباتية .

٢١٢٥٢ - فيثوبنيس الاجناس

Phytopte du poirier . هو غاشية الاجناس ، اطبا .

٢١٢٥٣ - فيثوبنيس الكرمية

Phytopte de la vigne . هو غاشية الكرمية ، اطبا .

٢١٢٥٤ - فيثوتوما

Phytotoma (S).

Phytotoma (F).

جنس طير من الجالوم سيات. المناقير فضيلة القطنحيات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من طير امريكا الجنوبية . اجسامها متوسطة القد تطول من ١٨ الى ٢٠ سم . مناقيرها قصيرة . مستعرضة الاشفاق . اوتها متراكبة الالوان الجنبلة . اطراف اجنحتها واذاها تتهني دائما بالاسود الاسف . صخورها ويطونها ييض . ملجأها الحياتي . حام . تألف الغابات والاشجار القريبة من مجاري الماء . ثوبها البودر وتألف البانمة وبعض الحشرات والديدان .

٢١٢٥٥ - فيثوتوميية ، صمحة

Phytotomie (F). Phytotomy (E).

الفيتوتوميية علم يبحث في قسيع النبات .

غوش مجفف ، حبوب القرنيات ، مشش مجفف ، كستناء ، بزيلا غصراه ، نياض البيض ، اسبانغ ، ورق الفجل ، حنظل ، طرخشقون ، حبوب الزروع ، ملحون ، قرفة ، بقونس ، غنيس الحليب ، وشم الزروع ، محار .

٢١٢٥٥ - فيتامين (ث)

Vitamin C (F).

يتم من افيه الفيتامينات واثيرها الجسم . نفسه يسبب شمت البنية والصداع وسوء الهضم واين القامسل وتأكل الانسان والحفر المروف بقاء الاستربوط . مصادره الرئيسي النبات حيث يكثر في بعض التار والاوراق كما هو من في التصنيف التابع . وقد جاء ترتيب المصادر الواردة بالنسبة الى غناها فالاولى للاتي :

اعرف مصادر فيتامين (ث) للمالوفة : ثمره الترسين ، ثمره الزعرور ، ثمره الاكدينا ، بقونس ، قليقة ، ملحون ، قرفة ، حنظل ، ورق الفجل ، بزيلا غصراه ، برتقال ، ليمون ، كرفوت (ليمون الجنة) ، يوسني ، اسبانغ ، سلق ، سمعة ، كستناء ، طرخشقون ، كبد في ، فراسكين ، باذانجان ، غنبداء ، قوم ، كرات ، بتورده ، كرفس ، بطاطا ، فجل .

٢١٢٤٦ - فيتامين (ج)

Vitamin G, Vitamin P.P. (F). Vitamin G, (E).

يساعد وينشط جيل الشعيرات الدموية فيزيدها متانة ويصحبها من سرية الاثران . مصادره عديدة اعصها الليمون والبرتقال ثم الخوخ والشمش ثم الاسبانغ واليقونس والحنظل .

٢١٢٤٧ - فيتامين (د)

Vitamin D (F).

هو ما يدعونه فيتامين اشعة الشمس لانه يتكون في الجسم عندما يتعرض لاشعة الشمس وذلك لان الازرسترون الموجود في المادة المعنية التي يفرزها الجسم يتحول بفعل الاشعة وراء البنفسجية الى فيتامين (د) . والفيتامين (د) يؤمن توازن وتثيل الكلسيوم والفسفور في الدم والنظام . خلوه من الجسم يسبب خواصة النظام وليها وانماقها وتشويه شكلها مما يؤدي الى الكسح . مصادره زيت كبد القداس المحروث . زيت السمك .

٢١٢٤٨ - فيتامين (ك)

Vitamin K (F).

Vitamin K (E).

يمتد الزيف ويساعد على تجلط الدم تجلطاً طبيعياً لذلك فهو من الضروريات لان نفسه في الجسم سيء المواقف . والفيتامين (ك) يقسم الى فئات اشهرها (ك) و(ك٢) . ومصادر الفيتامين (ك) هي الاسبانغ والمفلون والقنطيل واعشاب البحر وهو يستخرج ، للاستهلاك الدلاحي ، من دقيق القمح . اما الفيتامين (ك٢) فيستخرج من دقيق السلك .

٢١٢٤٩ - فيتامين (هـ)

Vitamin E (F).

Vitamin E (E).

هو ما يدعونه فيتامين التناسل او الفيتامين المانع العقم وهو العسلال الرئيسي في نمو الحويرات التناسلية ومن الزرم ضروريات التنشور الجنيني ونسجه المولدة . وهو ذو علاقة كبرى باتزان ييض الساباج لان نقصه في الغذاء يؤدي اولاً الى انخفاض عدد البيض . ثانياً الى تدني صبة الميكوك الصالح لتفقيس . ثالثاً الى ارتفاع نسبة التفتلة ثم الى



فيت زني

جدول بأشهر الثمار الفنية بمختلف الفيتامينات مع المقدار النوعي والمحوى للتوسيدي والملاقة الحرارية الخ...

Tableau des Vitamines, teneur en glucides et valeur calorique des principaux fruits

الموضوع	مقدار الفيتامينات الموجودة في كل ١٠٠ غرام من سويقي الثمار المأكولى										
	التصير عن المقدار بالوحدات الدولية						التصير بالمليغرام عن الحامض الاسقربوطي				
	فيتامين «أ»			فيتامين «ب»			فيتامين «ث»				
	الحده الأقصى	المعدل الوسط	الحده الأدنى	الحده الأقصى	المعدل الوسط	الحده الأدنى	الحده الأقصى	المعدل الوسط	الحده الأدنى	حماض الفاكهة	اللوحة القياسية
										سكر ونشا	عوى
										بالغرام	الناتج
										%	مقدار الطاقة الحرارية
أجاص	١٠٠	—	١٢	—	٣٠	—	٥	—	٢	—	٢,٤٦
أكيدنيا	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١,١٥
أنانس	١٦٠	—	١٠٠	—	٢٥	—	٢٠	—	١٥	—	—
برباريس	—	—	—	—	—	—	٢٠	—	—	—	—
برتقال	٤٠٠	٣٠٠	٩٠	—	—	—	١٠٠	—	٥٠	—	٦,٠٠
يندى	—	—	—	—	٢٠٠	—	٣٠	—	—	—	—
بيلسان	—	—	—	—	—	—	١٠	—	—	—	—
تفاح	—	—	—	—	—	—	٢	—	٣٨	—	٠,٦٤
تمر	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
تين أخضر	—	١٠٠	—	—	٣٥	—	٥	—	—	—	١,٠٥
تين ناشف	—	٥٠	—	—	٢٥	—	—	—	—	—	١,٠٥
جوز طازج	—	—	—	٤٥٠	—	—	٣٠	—	—	—	—
خوخ	١٥٠٠	—	١٠٠	—	٤٠	—	١٠	—	٥	—	٠,٩٥
خوخ مجفف	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
دراق	٢٠٠٠	—	٧١٠	—	٩	—	١٠	—	٥	—	٠,٨١
زبيب	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
سفرجل	—	—	—	—	—	—	١٥	—	٥	—	٠,٩٣
شوك القصار	—	—	—	—	—	—	٦٥٠	—	٤٥٠	—	—
عنب	—	٥٠	—	٧٥	—	٣٠	٤	—	٣	—	٠,٢٧
عوج	٨٠٠	—	٢٨٠	—	٣٠٠	—	١٤	—	١٠	—	—
غيراء الخليلين	—	—	—	—	—	—	٨٠	—	٢٠	—	—
غيراء برية	—	—	—	—	—	—	٢٥	—	—	—	—
فراز (فراولة)	—	٦٠	—	—	١٠٠	—	٥٠	—	٢٥	—	١,٨٤
فراز	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
فراز	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
قام	—	٢	—	—	—	—	١٥	—	٥	—	٠,٩٨
قام آبي	١٠٠٠	—	١٠٠	—	٢٨	—	١٠	—	١٠	—	٠,٨٥
كرز	٦٠٠	—	٥٠٠	—	—	—	٥	—	١٠	—	٠,٦٨
كستناء	—	—	—	٩٠	—	—	٣٠	—	—	—	—
كشمش	—	—	—	—	—	—	٣٠	—	٢٥	—	٢,٣٥
كشمش احمر	—	—	—	—	—	—	٥٠	—	٢٥	—	١,٩٠
كشمش اسود	٥٠٠	—	٣٠٠	—	١٢	—	٢٢٠	—	١٥٠	—	٢,٠٠
لوز	—	—	—	—	—	—	٥	—	—	—	—
ليون	—	٩٠	—	—	—	—	٥٠	—	٥٠	—	٢,٤٦
مشمش	٢٠٠٠	—	٧٦٠	—	٩	—	١٠	—	٥	—	١,٢٧
مصبة (فرايزوار)	—	—	—	—	—	—	٢٥	—	٢٠	—	١,٦٤
موز	٢٨٠	—	٢٥٠	—	٥٠	—	١٠	—	٣	—	٠,٢٦
نسرين	—	٥٠٠٠	—	—	—	—	١٠٠٠	—	—	—	—
يوسى (مستدين)	—	—	—	١٠٠	—	—	٣٠	—	٢٠	—	—

٨٠ م. ثوبها متناخل الا لوان . رأسها وصدرها الى الشقار الحظلي . بطنها الى البياض النقي . ورشاتها الامامية بلون صفرها يترسها توسيع وتغطيل ويكسر لكل واحد منها ثقبين قصي مستطيل . ورشاتها الخلفية بلون بطنها . تظهر في لبنان من ايار الى آب . ابيالها الحولية اربعة . ورقاتها خمسة تركب مختلف اوراق التيساتات الزرافية والريضية . اغصانها قليلة لا تستعرب الكمامة .

٢١٢٦٢ - فيتونوتركا نحاسية *

Phytometra chalcites, Plusia chalcites (S).
Phytometre cuivré (F). *Phytometra chalcites* (E).
حشرة مؤذية من فصيلة الفيتونات حشرقيات الاجنحة . موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قشياً رقيق الازهار . سرقتها خاضعة تمش على اوراق النباتات البرية اعصها الباذنجانيات ومنها البتورة || جسمها شبه مدني الشكل بطول نحو ١٥ م . بطنها تراوح من ٣٦ الى ٤٠ م . رأسها معتدل الحجم ، سطحي القرون ، اشقر الموج . عينها زيتانية ، نازفاتان . زبابها غشيان . ملابسها صلبة . مرشها معتدل اللون . جوشها وبطنها الى الصخرة الخشنة الموج || ورشاتها الامامية الى الصخرة تملموا زركشة سمراء وبقيتان متلاصفتان نحاسيتا اللون . ورشاتها الخلفية الى الصخرة الخشنة السوية . اعلاها الى الحظلي الاكلث || لها ثلاثة ابيال في الحول . تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان || الطور البرقي في الجبل الاول والثاني يستمر نحو ٣٨ يوم ويستمر في الجبل الثالث نحو ٢٠ اسبوعاً || السرعة في اذناها الكمال الجسموري طول نحو ٤٠ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، زني القرون . سطحي الموج تملمو ثلاثة خطوط لبيعية قاطبة ورشها جانبيا فيها متناخل الاغصان والاصفر . رأسها شديد الصخرة . مذها ورواجها الى الحظلي الاصفر || طور الكمال الذي يستمر في الجبلين الاول والثاني نحو ١٥ يوم ، يستمر في الجبل الثالث نحو ثلاثة اسابيع ويتغني فمن صلبة لتسبح السرعة بين قصبان النبات المائل او تحت الاوراق الساقطة التي تلصق التربة .

٢١٢٦٤ - فيتونوتركا * فوئوليا

Phyteuma (S). *Raiponce, Raponce* (F). *Rampion* (E). *Lange Tenfelskralle* (D). *Raponzolo* (I).
جنس نباتات عشبية مسمرة من فصيلة الجريسيات . انواعها عديدة . معظمها بري وبعضها زراعي بقلي وريضي . جلورها وشية الشكل . اوراقها منعقة بسيطة ، القرصية منها مستطيلة الزنات ، كبيرة التصل اما الخلفية فمضرة . اغصانها حامية ، لانياسية التجميع ، يكثر فيها القون الاروق . اشهر انواعها ما يلي .

٢١٢٦٥ - فيتونوتركا دبحية الورق

Phyteuma scorzoneraefolium, Ph. betonicifolium, Ph. Micheli (S). *Raiponce de Micheli* (F).
نوع من الفيتونه وهي عشبة بقلية سبريتية تملمو من ٤٠ الى ٧٠ م . جلورها وتدي الشكل جامد للمادة اللصية المأكولة البيضاء القون . اوراقها القرصية ضيقة التصل ، قلبية القاعدة ، شبه اوراق الدبق . اغصانها ليلكية اللون ، سلبية التجميع ، اسطوانية الترتيب ، ثنائية او ثلاثية السيات .

٢١٢٦٦ - فيتونوتركا سلبكية * عصا يعقوب

Phyteuma spicatum (S). *Raiponce en épi* (F).
نوع من الفيتونه وهي عشبة بقلية سبريتية عديدة القروب .

Phytoclea (S). *Phytécie* (F). * **فيتونوسية** *
جنس حشرات من فصيلة القترنيتات انواعها عديدة جميعها صغيرة القند ، مستطيلة الشكل والزباب . طول اجسامها يراوح بين ٨ و ١٥ م . انزايها مختلفة الا لوان يكثر فيها الاصفر والاصفر || وهي تمش على ازهار المحاصيل دون ان تلتها . اما ورقاتها فتركب السوق وتنتعها عند مجام التربة .

٢١٢٥٧ - فيتونوترجيكية

Phytologia (F).
Phytology (E).
الفيتولوجيكية علم يبحث في النبات ، راجع علم النبات .

٢١٢٥٨ - فيتونوتركا *

Phytometra, Plusia (S).
Phytometre (F).
جنس حشرات فراشية من فصيلة الليليات . انواعها عديدة . اجسامها مختلفة القند والا لوان . قرنها الاستشعارية غشيلة . وراشها الامامية زركشة || انثاها اكبر حسيباً من ذكورها تمتع مكثها افرادها على نصل الاوراق . ورقاتها قيامة تسطو على عدة نباتات بقلية وصناعية وريضية . بعضها من الفراشات القاطعة التي تجوب البلاد في طلب البيت والنبات المائل || ابيالها الحولية عديدة يراوح بين ٣ و ٥ م . اشهر انواعها ما يلي .

٢١٢٥٩ - فيتونوتركا اخضنة نيرات *

Phytometra pulchrina (S).
نوع من الفيتونوتركا الابدية . متوسطة القند ، بطنها نحو ٥٠ م . صدرها الى الجوزة الزرافية . بطنها الى الصخرة الخشنة الصفراء الموج . وراشها سمر الحار || تظهر في لبنان من ايار الى حزيران وين آب الى ايلول ، ابيالها الحولية اربعة || ورقاتها تركب اوراق نباتات الفصيلة النجانية دون ان توقع بها شديدة الاذى .

٢١٢٦٠ - فيتونوتركا المكشوش *

Phytometra festuca, Plusia festuca (S).
نوع من الفيتونوتركا الابدية . متوسطة القند . بطنها نحو ٤٠ م . ثوبها الى الصخرة الخشنة . صدرها احقر من بطنها . ورشاتها الامامية مجتمعة بخطوط عابقة مستطيلة || تظهر في لبنان من حزيران الى ايلول . ابيالها الحولية اربعة . تمش ورقاتها على النباتات النجيلية اعصها المكشوش والبطوط والسادي .

٢١٢٦١ - فيتونوتركا همام *

Phytometra gamma, Plusia gamma (S). *Gammia, Noctuelle gamma* (F). *Silver y moth* (E). *Lam-maeule, Ypsioneule* (D).
نوع من الفيتونوتركا القاطعة . متوسطة القند طويلاً نحو ١٧ م . وبطنها ٤٠ م . ثوبها الى الصخرة البنية . صدرها احقر من بطنها . ورشاتها الامامية بلون صفرها تترسها خطوط سمر ويريد على كل واحد منها عند اواخر زامه الثاني علامة فاقرة يضاء القون تشبه سرف غا ثلاث اسرف الالجمدية اليونانية || تظهر في لبنان من نيسان الى تشرين . ابيالها الحولية عديدة تراوح بين ٤ و ٥ م . ورقاتها خمسة تدمي حدة غما || تركب اوراق مختلف البقول والنباتات الصناعية والريضية .

٢١٢٦٢ - فيتونوتركا مبيكة *

Phytometra ni, Plusia ni (S).
نوع من الفيتونوتركا القاطعة . كبيرة القند ، بطنها نحو



فيتونية



فيتونوتركا المانزات



فيتونوتركا المكشوش



فيتونوتركا غا



فيتونوتركا مبيكة



فيتونوتركا نحاسية



فيتونه

* ٢١٢٧٢ - فِتُونُومُ اسْوَدِ الْخَشَبِ *

Phytonomus nigrirostris (S). Phytonome à rostre noir (F).

حشرة صغيرة اللون من فصيلة السويات طولها ٤ م. لونها الى الخضار الداكن. خطمتها الى السرة القامشة. رقباتها ترتكز برام وأزهار ولوالباقا على اختلاف أنواعها الخشبية.



فيتون احمر الذنب

* ٢١٢٧٤ - فِتُونُومُ النَمَلِ *

Phytonomus solius, Ph. punctatus (S). Phytonome du trèfle (F). Clover bud weevil, Lesser clover leaf weevil (E). Schwarzsüßliger, Blattnager, Kleeblattnager (D).

حشرة من فصيلة السويات. طولها ١٢ م. رقبها خضراء اللون وقطعها من الرأس الى السرة غطت ابيض كالثلج. وهي ترتكز مع رقبها اوراق الفل قدسدها وتقع بها الانثى.



فيتونوم اسود الخلف

* ٢١٢٧٥ - فِتُونِيَاتِ *

Phaetonidae (S). Phaetonidae (F). Phaetonidae (E).

فصيلة طير من كليات القدم وشمالات الكف. مركها المرمي بين البجع والقطاير. اصحابها اقربها من البجع وتقترب ببيضها من القطاير. طيراتها سفيف مستدل الارتفاع بعيد الشوط. قوتها الاسماك صغارا بالنطس الى الماء كما يفعل الفان. انواعها المبرقة اربعة تنتمي الى جنس واحد يدعى فيتون.

* ٢١٢٧٦ - فِتَج *

Erection هو الانتشار.

* ٢١٢٧٧ - فِتَجْرَكَة مَحْتَوَلَة *

Pygæra curtula (S). Pygære circonceise (F). Pygæra curtula (E).

حشرة من فصيلة الشوطيات ورتبة حشرقيات الاجنسة. موطنها المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اوروبا. فراستها جارية قوتها رقيق الانهار. سرتها تميش على اوراق الحور والصفصاف. اجسامها متوسط اللون بطول نحو ١٦ م. سطحها نحو ٣٦ م. رأسها شبه اللون. عينها صفيرتان. زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر، وخطيان عند الانثى. جوشها ويطعا الى الشبه. ووشها الاماميان الى الشبه يملو تحسب حنطي وبقعة بيضاء تتألفها اخرى طرية الى الربة القلبية. ووشها الخلفيان الى البياض التبي المروج. احداها تينة. لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز. تسرح في الليل. تماثل بعد ظهورها بنمو اربعة اسابيع وتتح للكن على الصفصاف السفلى من نعال الارباق. البقرة تقطو نحو ٣٤ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، فردي التعلو السكية الجانبية. فوها الى الخطي الاسمر يملو خط لبيبي فانغ اسود وشمعة مشطية متفرعة تنتمي بالمرق حمر ترزير التعلو. منها ورواجها الى العطلة السراء الى طور الاكسال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتبقى ضمن صلبة تحبها الرقة في شقوق حاد الحور او الصفصاف.



فيتونوم الفل

جلدها وشعي الشكل، كبير القد، جامد المادة الحبية للأكلية البياض اللون. ساقها قوية متصببة جفءا تنلو من ٥٠ الى ١٠٠ م. اوراقها القرمزية يضيئة الشكل، قليلة القامحة، كبيرة التصل، مأكولة، طعمها يشبه طعم البندق. انزعاجها سبيلة التجميع، كبيرة القد. لونها يختلف باختلاف الفسروب فيها الاغبر والسستوني والازرق على اختلاف مجامته. جميعها ثنائية السات.

* ٢١٢٦٧ - فِتُونُومَة مَدَوَارَة *

Phyteuma orbiculare (S). Raiponce orbiculaire (F).

نوع من الفيتومة وهي عشية برية ورتيبية تنمو من ١٥ الى ٥٠ م. اوراقها القرمزية مستطيلة الزناد، يضيئة التصل للزرق الزام الاخير. انزعاجها خفية التجميع، ثلاثية السات، لونها الى الزرق المابقة. انزعاجها يستمر من ايار الى تشرين الاول.

* ٢١٢٦٨ - فِتُونُومَة وَضِيْمَة ، لَفَت بَرِي *

Phyteuma humile (S). Raiponce naine (F).

نوع من الفيتومة وهي عشية برية ورتيبية صغيرة القد تنمو من ٥ الى ١٥ م. اوراقها القرمزية صفية الشكل. انزعاجها خفية التجميع، بنفسجية اللون، عطفا يحمل من ١٢ الى ١٥ زهرة. انزعاجها يستمر من تموز الى آب.

* ٢١٢٦٩ - فِتُونُومِيْزَا الْبَهْش *

هي لغة البهشية، المطلب.

* ٢١٢٧٠ - فِتُونُومِيْزَا قَرْنَاء *

هي لغة الكرزيتم، المطلب.

* ٢١٢٧١ - فِتُونُون، طَائِرُ الْمَقَالِبِ *

Phaeton (S). Phaéton, Oiseau des tropiques, Paille-en-queue (F). Phaeton (E).

جنس طير من فصيلة الفيتونيات. اترابه المبرقة اربعة. اصحابها مجامح البلاد الاستوائية والجمارة. اجسامها متوسطة القد، متفاداة جالسة، مسنة الخامل. اجنتها كبيرة، ذلقة. اذنانها مستطيلة الزنار. اوسانها قصيرة، حطاب اصحابها شامل الكفاف. اعراف انواعها واشهرها الفيتون الاخر الذنب.

* ٢١٢٧٢ - فِتُونُون أَحْمَرُ الذَنْبِ *

Phaeton rubricauda (S). Phaéton à queue rouge (F).

طائر من الفيتون. طول الكمال نحو ٩٠ م. منها نحو ٥٠ م. للزنان. ثوبه متراكب الاوان الهلدة والمروضة، فيها الالبش والوردي والمرباني والاخر والاسود. ذنبه احمر اللون. متفاده مرباني، حدة عينه كستيتية. رسنه واصابعه حمر. خطابه احمر الانتشاب والزمار الاول، اسود الباقي. اصحابه تشمل معظم مجامح البلاد الاستوائية من المالم القديم. ياتل المتراكب الصغرية التالية. قوته الاسماك ينغص عليها. كالمس وينطس في طلبها على غرق الصغرى وقد يندث ايضا في الاشجار الخشبية. اثناء قنص بيضة واحدة تحضنها بمناوبة الذكر نحو اربعة اسابيع.



فجرة عذوة

* ٢١٢٧٨ - فِتَجَن *

Rue (F). هو الذباب، المطلب.

٢١٢٨٨ - **فَيْرُونُزُ وَفَيْرُونُزُج** (F). Turquoise (F).

حجر نعين أزرق اللون .

٢١٢٨٩ - **فَيْرُونُز** (F). Virus

هو الفيروس ، اطلبه .

٢١٢٩٠ - **فَيْرُونِيَّة** ، **مَيْرُول** .

Férolite, Mésolo (F).

سيليكا مركب من الالومنيوم والكليسيوم والصوديوم ونحو ٤٤٪ من السيليوس .

٢١٢٩١ - **فَيْرُونِيَّة** ، **نُفَاحُ الْفِيل**

Feronia (S), Féronie, F. de l'Inde (F). Wood apple, Elephant apple tree (E). Elephananapfel (D). Feronia, Pomo d'elefante (I).

جنس اشجار برية مشرة من فصيلة البرقاليات . انواعه قليلة العدد جميعها شجيرات شائكة . اصطناعا الهند وسريديب والاندلس . ثمارها كروية الشكل حجمها حجم البرتقال . قشورها غليظة ليفية جامدة . لباها وردي اللون ، طعمه مزيج من الحلاوة والحاموضة الحامضة .

٢١٢٩٢ - **فَيْرُونِيكَا** (F). Veronica (S).

جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الخنازيريات . انواعها عديدة منها العشبية الحولية والمعمرة ومنها الجنبات الليفية والحشوية ومنها الاشجار التي يبلغ قطرها نحو ١٠٠ سم . اوراقها وانهارها لاقابية الاشكال والارتيكار || اوراق انواعها واشهرها ما يلي .

٢١٢٩٣ - **فَيْرُونِيكَا اَنْثَى** ، **لِينَارِيَّة حَرْشَاء**

Veronica teucrium, V. chamaedrys (S). Véronique germanadrée, V. femelle, V. bâtarde (F). German-spedwell, Wild germander (E). Gamander-Ehrenpreis (D). Veronica piccola quercia, V. femina (I).

نوع من الفيرونيكاه وهي عشبة ترابية معمرة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . ساقها منتصبة . اوراقها متفكة متقابلة ، نصلها سناني الشكل ، ضيق الصفحة الزباء . انهارها صفوية التجميع ، محورية الارتكاز ، زرقاء اللون || انهارها يستمر من حيزان الى تموز .

٢١٢٩٤ - **فَيْرُونِيكَا بَهْشِيَّةُ الْوَرَق** .

Veronica buxifolia (S). Véronique à feuilles de buis (F).

نوع من الفيرونيكاه وهي جنية ترابية معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها منتصبة ، فرونها دقيقة جالسة ، اوراقها بهشية الشكل ، نصلها جامد الصفحة الامة . انهارها سفلية التجميع ، تاجية الارتكاز ، يضاء اللون او وردية || انهارها يستمر طوال الصيف .

٢١٢٩٥ - **فَيْرُونِيكَا حَبِيقُ الْحَبَى** ، **فُونُتُج مصري**

Veronica anagalis aquatica (S). Véronique d'eau (F). Water speedwell (E). Wasser Ehrenpreis (D). Veronica aquatica (I).

نوع من الفيرونيكاه وهي عشبة برية طيبة معمرة تعيش في النعام وتل جوانب الاودية وبحاري الماء ، تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم . اوراقها متقابلة لسنة ، نصلها خلي البشرة متبادع التنين المستدير انهارها الى الزرقعة . القليكية .

٢١٢٧٩ - **فَيْجِن حَبِيقِي** Rue d'Alep (F).

هو السذاب السوري ، اطلبه .

٢١٢٨٠ - **فَيْجِن لَعْن** Rue officinale (F).

هو السذاب افريقي ، اطلبه .

٢١٢٨١ - **فَيْجِنِين** Rutine (F). Rutin (E).

الفينيتين او الحامض الفيني ، غلوكوزيد تربى اللون يوسد في القيقين اي السذاب وفي عدة نباتات اخرى انحصا الكبر والورد .

٢١٢٨٢ - **فَيْد** Feuilles de safran (F).

هو ورق الزعفران .

٢١٢٨٣ - **فَيْدُ الْبَلِيَّة**

هي بنت البلية الكردية ، اطلبه .

٢١٢٨٤ - **فَيْدُ الْبَلِيَّة كَرْدِيَّة**

Novius cardinal (F).

شجرة تسمى نفيوس كردية ، اطلبه .

٢١٢٨٥ - **فَيْدُ الْبَلِيَّة عَمْدِيَّة** ، **بِكْرُوه**

عَمْدِيَّة

Fidonia famula, Bichroma famula (S).

Fidonie servante (F). Bichroma famula (E).

شجرة من فصيلة الاذيات ودية شرفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا المعتدلة الحارة . فراشها واشنة قوتها مشر الاثمار . مرقها تعيش على اوراق الوزال وانهارها || جسمها نحيل ضيق بطول نحو ١٠ سم . يستمر نحو ٣١ م . رأسها اكعب اللون اصعب الملاج . حينها صيرت ان . زيانها شيطان عند الذكر ، عظيمات عند الانثى . جوشها وبطنها الى الكعبة || وراشها عند الثقبين الى الكعبة الصفراء الملاج يطولها في الزوج الاسامي ثقبين وتجميع وزرقة وزرقة كستية اللون . ويطولها في الزوج الخلفي شفة حنطية وضلع متفرعان مقوسان كستية اللون . اهدابها الى الحنطى الاشعث || لها جيل واحد في الجيل . تظهر للفراشة ابار وتبقى حتى اواخر حزيران . تشرح في الليل . تماثل ظهر ظهورها بستان اصابع وتحت الممكن ميساديا على الصفحات السفلى من نعال الازراق || السرقة تطول نحو ٢٤ م . جسمها مرجلي الشكل مستقيم الرأس والمقدم . ثوبا يمتد البنية التي تعيش فيها وهي يراوح بين الاخضر والاصفر . رأسها الى السرة . وراشها البنية الوسلي ماصة ما يحيطها تنقص عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في الجلالة اوبين فروع النباتات ضمن صلبة متدلة الحيك .

٢١٢٨٦ - **فَيْرُونُز** ، **فَيْرُونُز** ، **فَيْرُونُز** ، **فَيْرُونُز**

Virus ج . فيروس وراوس . هي اصول بعض الامراض او الاوصام الفيروسية التي لم يتسكن العلم ، حتى الآن ، من تحديد اشكالها الا بواسطة المجهر الالكتروني . وهي كانتات حية ميكروية الجسم اي متناهية الصغر ، عديدة الاشكال النفسية ، كثيرة الانى ، مستصبة على كل علاج .

٢١٢٨٧ - **فَيْرُونُز** Viral (F).

نعت تعريفي يطلق على كل ما هو-مفروب الى الفيروس .



فيرونيه عذبة



فيرونيه



فيرونيكاه انثى



فيرونيكاه بهشية الورق



فيرونيكاه حيق الحبي

٢١٣٠٣ - **فيرونيكا مسعّرة ندية** * **تيلاب التيجوس**
Veronica officinalis (S). *Véronique officinale*, *V. mla*, *Thé d'Europe* (F). Common speedwell, *Medicinal tea speedwell* (E). *Echter Ehrenpreis*, *Speedwell* (D). *Veronica officinale*, *Thé d'Europe*, *Quedernuz* (I).

نوع من الفيرونيكا وهي عشبة برية معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. تألف الإبراج والمواعق الظليلة الزرقية. أوفاتها لينة مستحبة المذاق تستعمل أكل الشاي وهي عذبة للمضغ الصحية، تقيء الصدر والقلب || أثمارها سبيلة التيجوس || زرقاء اللون. ساقها منتفخة اللحم، كثيفة الأجزاء.

٢١٣٠٤ - **الفيرونيكا التيج** * * **فيز وبود التيج** *
Physopoda nicotiana (S). *Physopode du tabac* (F). نوع من الفريسي، حشرته تملو نحو ٣ م. لها ألسنة البصرة الخشنة السوداء المنيح. تركب التيج تنفس الحشيب ويمتنع التيج وعصارة الخلايا وتسبب ما يعرف مرض المرق الأبيض || الذكر حامد للإنجينة. البرقة صفراء اللون تملو من ١ إلى ٢ م. راجع فريسي وقرق أبيض.

٢١٣٠٥ - **فيزوك** *
Physa (S). *Physa* (F). *Physa* (E).

جنس حيوانات مائية من الرضويات مملات الإبريل وفضيلة الفريزيات. أنواعها الممرضة المعاصرة قليلة العدد منتشرة في سائر انهر العالم وينتجها وينتقمه. فتيها النباتات المائية || أصدافها حلزونية و صغرة و رقيقة و مائلة، شاذة و شفافة الوب. أجسامها أحليبية زلينة و زوسها واضعة. لوامها مستطيلة مبطنة. أرجلها وحيدة، مستديرة المقدم و ذلقة المؤخر، حادة السطاف.

٢١٣٠٦ - **فيزوك** *
Imperméable (F). *Impermable, Impervious* (E). أرض فزلة؛ سريمة البليل إذا أصابها كليلث.

٢١٣٠٧ - **فيزكوس** *
Physalus (S). *Physala, Physalis* (F). جنس هضاه من المشعيات وفضيلة الفيزولويات. أنواعها المعروفة ثلاثة منتشرة في معظم مجار العالم || مستمراتها تبعو شكله من الألياف وفضيلة اللون ويتبعها خلاف قابل التشديد و أروسي الشكل عند الانتفاخ فوق سطح الماء حيث يتوسع مع الريح أبنا يشاه.

٢١٣٠٨ - **فيزكوسيات** *
Physalides (S). *Physalides* (F). *Physalides* (E). فضيلة من المضاعيات المشعيات البسوة. أثمارها الممرضة خسة تجتمع إلى جنسين الفيزولوس والفيزوكوس.

٢١٣٠٩ - **فيزوكرب** *
Physocarpus (S). *Physocarpus* (F). *Physocarpus* (E). جنس شجيرات معمرة من فضيلة الورديات. ساقها متصبغة تملو من متر إلى ثلاثة أمتار. أوفاتها متعاقبة، معتقة، عابدة، مفصصة ومنسدة الأطراف. أثمارها عذبة التيج، مخففة الألوان || تزود الفريزين في الخلاق. ترطب في الأثرية المتعددة الانتماع، للمسوية التركيب المتعصر، للفرارة المواد الفلزية || أنواعها الممرضة قليلة العدد، أشهرها التالية:

٢١٣١٠ - **فيرونيكا سرّوية**

Veronica cupressoides (S). *Véronique cyprès* (F). نوع من الفيرونيكا وهي جنبة سرّوية معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها متصبغة. فرونها دقيقة. أوفاتها حشرية تملو نحو ٢ م. أثمارها سبيلة التيجوس، حادة الزركاز، صفيرة اللند، ليلكية اللون || أثمارها يستمر طوال الصيف.

٢١٣١١ - **فيرونيكا سبيلة** *
Veronica spicata (S). *Véronique en épi* (F). نوع من الفيرونيكا وهي بجملة ثريينية معمرة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوفاتها منتفخة متعاقبة، نصلها أحليبي الشكل، مسن الحافة، حديب المقصعة. نورها سبيلة التيجوس مستطيلة السبلة الوسيطة. أثمارها كبيرة اللند وردية اللون || أثمارها يستمر من سزيان إلى آب.

٢١٣١٢ - **فيرونيكا شرقية** *
Veronica orientalis (F). *Véronique orientale* (F). نوع من الفيرونيكا وهي عشبة ثريينية معمرة تملو نحو ٢٠ سم. ساقها ملتوية الطرف. أوفاتها خفيفة النصل المفروض والمسن. أثمارها ليلكية أو وردية اللون، صفودية التيجوس، عذوية الأركاز، كوكوسها خاصة الفصل. أثمارها يستمر من تموز إلى آب.

٢١٣١٣ - **فيرونيكا صفراء** *
Veronica lutea (S). *Véronique jaune* (F). نوع من الفيرونيكا وهي عشبة ثريينية معمرة تملو نحو ٢٠ سم. أوفاتها بيضية الشكل. نصلها مسن الحافة ذات الزام الأيسر. أثمارها صفودية التيجوس، صفراء اللون، مسنخة البتلات العليا || أثمارها يستمر من أيار إلى سزيان.

٢١٣١٤ - **فيرونيكا عيش القط** *
Veronica anagallodes (S). *Véronique des sables* (F). *Speedwell* (E). *Ehrenpreis* (D). *Veronica mucronata* (I). نوع من الفيرونيكا وهي عشبة برية طيبة منبها الأثرية الزولية. ساقها خشوية نخيلة. أوفاتها صفيرة اللند، أحليبية الشكل، زباد النصل. أثمارها صفودية التيجوس || زرقاء اللون، بحرية اللواج.

٢١٣١٥ - **فيرونيكا شجرة** *
Veronica incana (S). *Véronique blanchâtre* (F). نوع من الفيرونيكا وهي بجملة ثريينية معمرة تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. فرونها مزينة اللوام. أوفاتها منتفخة متعاقبة، نصلها سناني الشكل، مسن الحافة، خلي البشرة حل صفحتها، يبدو كأنه أغبر اللون || أثمارها سبيلة التيجوس، زرقاء اللون. أثمارها وحيدة السبلة يستمر من سزيان إلى تموز.

٢١٣١٦ - **فيرونيكا قرّة العين** *
Veronica beccabunga (S). *Véronique cressonnée*, *Beccabunga*, *Cressonnière*, *Cresson de cheval* (F). *Brooklime*, *Water pimpernel* (E). *Bachjung*, *Ehrenpreis* (D). *Baccabunga*, *Veronica cressone* (I). نوع من الفيرونيكا وهي عشبة برية معمرة تملو نحو ٢٠ سم. تعيش في المناطق وعلى جوانب مجاري الماء. أوفاتها صفيرة اللند، بيضية الشكل، نصلها مائل البشرة، شديد الحفران. أثمارها صفيرة اللند ليلكية اللون، سبيلة التيجوس || أوفاتها مأكولة غشراء ويطبوخة.



فيرونيكا سبيلة فيرونيكا عيش القط



فيرونيكا قرّة العين فيرونيكا محزنية



فيز بود التيج



فيزة



فيزولوس

٢١٣١٠ - فيزوكرب الغلومي الورق

Physocarpus opulifolia (S).

Physocarpus à feuilles d'obier (F).

خسة خطوط جزوية قاطبة ، رأسها أسود ، مدها وواجبها الى الخلف في طور الاكمال الذي يستمر من اسيوعين الى ثلاثة أسابيع ينقضي ضمن صلبة تنسجها السرة بين قشور الصنوبر .

Fischæria (S).

٢١٣١٧ - فيشيرة

Fischérie (F). Fischæria (E).

جنس حيوانات مائية من الرغويات صديقيات الخياشيم والاريل ومن فصيلة البيرينيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطاهما جميع بحيرات وأهر افريقية الشمالية || اصداها صغيرة القد ، شبه فلسوية الشكل ، مساوية المصاريخ ، لاششافية الاغسل ، متاعها ثنائية ، طبقة صغرة || تعيش في الاسفل ، طومها مأكولة مبتلة الصنف .

Gul (F).

٢١٣١٨ - غول

في الحدال ، ج. فيائل .

Sporobolus (S). Sporobola (F).

٢١٣١٩ - سبوروبول

جنس نباتات عشبية ، برية ، مرغوبة ، معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة .

Nemestrina (S).

٢١٣٢٠ - نيمستري

Némestrine (F). Nemestrina (E).

جنس حشرات من فصيلة النيمستريات ورثة ذوات الناجحين انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق الانريقية || اجسامها كبيرة تطول من ٢٠ الى ٣٦ م. رؤوسها مستديرة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية صغرة ، ثلاثية الفصل . ملابسها نحيلة . اعطاهما شديدة الطول . كواسلها كثيفة انسل . بطونها بارزة الحيد السكبي . الاطراف مبرقة . وراشها شفافة . قوامها نحيلة || جميعها واثمة تألفت الغابات والمواقع التي تكثر فيها الازهار ، يرقاتها واثمة او طفيلية || تتغلف على المفصليات .

Nemestrinidae (S).

٢١٣٢١ - نيمستريات

Némestrinidés (F). Nemestrinidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الناجحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألفت النباتات والرياض والمروج في زمن الازهار || اجسامها ضخمة ، شبه يفسية الشكل ، تطول من ٧ الى ٣٦ م. رؤوسها مستديرة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية صغرة ، ثلاثية الفصل . اعطاهما متباينة الحجم منها الصغيرة ومنها الكبيرة المستطيلة . ملابسها نحيلة او خامرة . كواسلها كثيفة الملب . بطونها بارزة اسطوانية ، مقلوبة المخسر . وراشها شفافة || يرقاتها غامضة ، دودية الشكل || اشهر اجناسها النيمسة والولانة .

Plus-value (F).

٢١٣٢٢ - فيش

Increase in value, Increment (E).

هو الفرق الناتج عن ارتفاع ثمن الشيء بين تقديرين مختلف زمانها . وهو ايضا زيادة ما يتصفه الشيء من الثمن فيما او تقديراً .

Débordement, Crue (F). Overflowing, Rising (E).

٢١٣٢٣ - فيش ، طغش

هو ازدياد المياه في الأنهر وارتفاعها عن مستواها المألوف .

نوع من الفيزوكرب . موطنه بعض مناطق أمريكا الشمالية . ساقه تملو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقه ثلاثية او خاسية القصوص ، خلية الصفحات العليا ، مرطبة السفلى . ازهارها على التجميع . ازهارها بيضاء اللون او وردية || تنموه يستمر من حزيران الى تموز

Physique (F). Physica (E).

٢١٣١١ - فيزيك

علم الطبيعة او الفيزياء .

Physidae (S).

٢١٣١٢ - فيزيديات

Physidés (F). Physidae (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرغويات ممديات الاريل ورثة الرغويات المائية . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد معظمها من متحجرات الطبقة الجبورية . اما الانواع المعاصرة فنشرة في معظم انهر العالم وبحيراته وساقه . قربها النباتات المائية || اصداها صغرة ، رقيقة ، لامة ، شفافة ، حلزونة . شفافه القلب || اعرف اجناسها المعاصرة الفيزية .

Biophysique (F).

٢١٣١٣ - فيزيياحية

علم يبحث في علاقة الفيزياء بالحياة . راجع فيزيويات .

Physiologie (F).

٢١٣١٤ - فيزيولوجية

هي الفيزيولوجية ، الملبها .

Fistulina hepatica (S). Fistuline, Fistule hépatique,

Fole de bœuf (F).

٢١٣١٥ - فيستولينا ، فطر الكبد

نظر مأكول من فصيلة السميات يركب جلوع بعض الاشجار الحرجية في المواقع الظليلة الرطبة . وهو كبير القد ، كبدى الشكل والحمى ، حنطى اللون ، اسمر القاعدة ، باق الركيزة المتبقية . ازهارها زهيدة لا تستحق الاهتمام .

Phycita splendida (S).

٢١٣١٦ - فيسيتة باهرة

Phycita splendide (F). Phycita splendida (E).

حشرة من فصيلة التارايات ورثة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى معظم مناطق اوروبية المعتدلة الحرارة . فراشها واثمة قربها رقيق الازهار وطلوها . سرها قرصية تمسح تحت طاء الصنوبر وتخلج الشكير تنسب سيلان الراتنج || جسمها يطول نحو ١٢ م. بسطها تراوح من ٣٠ الى ٣٢ م. رأسها صغير الحجم والحلم . عيناها عتيقة ، ماصتة . زبائنها غطيطان . ملابسها دقيقة . مرشفها متدل الطول . جوشها وبطنها الى الكسني الاشقر المزاج || وراشها الامايبان الى السرة الكنتية يطولها تقيح ابيض وراشها غبراء . وراشها الخلفيان الى الطلحة يطولها تمسح كسني يتكثف الاصاب وقاعدة الحنجر الخارجي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفرائشة في اواسط نيسان تسرح في الليل وتستن في النهار || الانثى تلقي المكن مباحدا بين شقوق اللحاء وتحت القشور . الطور الاسروي يستمر نحو عشرة اشهر والسرة منه بلونها الادراك تطول نحو ١٥ م. جسمها بين التقسيم السكبي ، بني اللون تملو



فيزولينا



فيسيتة

٢١٣٢١ - فَيْصَان

Inondation (F).

Inundation, Flood (E).

غمر المياه الطافية لبلاد أو مكان ما .

٢١٣٢٥ - فَيْصَرَج

Leptodermis (S).

Leptoderme (F).

جنس نباتات جنية ممرمة من فصيلة الفقيويات ، انواعه المروقة قليلة ، سوقها منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. فروصها مفصلة متقابلة الارزكاز . اوراقها ابيدة معتقة متقابلة ، نصلها سائلي الشكل غلي البشرة على سطحه. اضرارها انبوية التبرج ، ورميصة التجميع ، يسهل الوب او زرقاء او بنفسجية .

٢١٣٢٦ - فَيْقَنْ - قَرْقُ

Gloussment (F).

Clucking, Cluck (of hen) (E).

القيق : صوت الدجاج .

٢١٣٢٧ - فَيْقَلْ *

Figulus (S). Figule (F).

جنس خنافس من هديات الاجنحة صفيحيات القرن وصليقة المتظليات . انواعه المروقة نحو ٢٠ اصنافها البلاد الحارة والاعتوائية من العالم القديم || جميعها حربية تعيش في الغابات على الاشجار تنشره انواعها الى الشجيرة السهام او الكهبة السهام السهام . يرقاتها صغيرة ، اسطوانية الشكل ، صلبة ، كستنية اللون . قوتها المواد الخشبية السائرة الى الاخلال .

٢١٣٢٨ - فَيْكوريا رَجِيَا * ذُرَّةُ الْمَاءِ

Victoria regia (S). Victoria (F). Giant water lily (E).

Seekönigin (D). Victoria (I).

جنس نباتات مائية من فصيلة النيلوفاريات . اصنافها مياه عذبات البلاد الحارة والاستوائية || اوراقها مستديرة ، نصلها جلد الصفيحة ، صافي الشكل ، مكشوف الخانة ، قطر يراوح من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. وهو يطفو على وجه الماء ورائه زناد ليبي التسج اسطواني الشكل يطول من ٤٠٠ الى ١٠٠ سم. || اضرارها كبيرة الحزم ، عديدة البتلات . يتلاها بنفسجية القاعدة - قرمزية الزام الاول ، برقالية الثاني ، بيض الثالث والرابع . اضرارها كروية ضخمة شائعة . بزورها ثشوية مأكولة ولذا يصونها ذرة الماء .

٢١٣٢٩ - فَيْكُس ، فَيْكُون

Ficus

هو البهب ، اطبله .

٢١٣٣٠ - فَيْلْ

Elephas (S).

Elephant (F). Elephante (E).

ج. افيال وفيل وفيلة . كنيته ابو الحجاج وابو الحريان وابو فغل وابو كلثوم وابو مزاح . الافيلة فيلة ويصوم كنيته ام شبل || الفيل جنس سيوانات ضخمة لبونة من فصيلة الفيليات وربة الخرطوميات || جسمه معتدل الطول مفرط البدانة يرتكز على اربع قوائم خفيفة عمودية الشكل . راسه كبير ضخم . عيناه صغيرتان . اذنان كبيرتان مرسيتان . خرطومه جرم اللد ، بالغ الطول والى البرية . ناباه مستطيلتان لختتان مقوستان || والفيل يمشي نحو ١٥٠ سنة وهو يبلغ كامل نضاضه بمر ٢٥ سنة . محبل الاثني يدم ٢٢ شهراً تقص في نهاية دفتلا واسبدا وزنه نحو ١٠٠ كيلو . قوته اصطناع البلاد الحارة يالف الاحراج والمناطق الرطبة . قوته الاشجار والجذور واليابس لتغلقها بخرطومه ويدخلها الى

فه تفسنها ويصلها || والفيل يسرح في طلب القوت من الساعة الثالثة صباحا الى الساعة التاسعة ثم يرقد على الخفيض كسائر الحيوانات حتى الساعة الثالثة بعد الظهر فيقوم ويهرع عن جديد حتى انتصاف الليل حيث يرقد من جديد الى الساعة الثالثة صباحا . وهو يتررب مرتين في اليوم ، الاول عند شروق الشمس والثانية قبل الغيب اما وبيته اليومية من القوت فتراوح من ٣٠٠ الى ٣٥٠ كيلو || انواعه الثتان الافريقي والاسي .

٢١٣٣١ - فَيْلْ اَفْرِيقِي *

Elephas africanus (S).

Eléphant d'Afrique (F). African elephant (E).

نوع من الفيل موطنه يمتد من غربي وجنوبي الصحراء الكبرى الى بلاد الحبشة . وهو اكبر واخضر حيوان ارضي يعيش الآن . يطول من ٣ الى ٤ امتار . محيط بطنه يراوح بين ٦ و ٧ امتار وطول جثته نحو الخرطوم والذنب يراوح بين ٨ و ١٠ امتار . وزنه يراوح بين ٤٥٠٠ و ٥٥٠٠ كيلو اما ناباه فترتان من ٧٠ الى ٩٠ كيلو .

٢١٣٣٢ - فَيْلْ الْبَحْرُ

Eléphant de mer (F).

هو الفقل ، اطبله .

٢١٣٣٣ - فَيْلْ هِنْدِي *

Elephas indicus (S).

Eléphant d'Asie, E.de l'Inde (F). Indian elephant (E).

نوع من الفيل موطنه اسراج الهند والاصام وبرمانيه والسيام والكوشتين وبلقو ... وهو حليج الجلة جسمها يطول من ٢٧ الى ٣٦٠ سم. طوله يراوح من ٧ الى ٨ امتار بما فيه الخرطوم والذنب . وزنه يراوح من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ كيلو وكل واحدة من نابيه ترت من ٢٥ الى ٤٠ كيلو . والفيل الهندي مشهور بحسن الخلق وانقياس العلم . وهو يستعمل في الشق الاعمال واصنعها فيقوم ما غير قيام . اما الفيل الايش فهو من ذات النوع انما اصيب بالاحساب اي باتدلم المادة الملوقة في الجله .

٢١٣٣٤ - فَيْلَادِلْفُوسْ

Philadelphus

نبات من السرفسيات يعرف بالسرجية ، اطبله .

٢١٣٣٥ - فَيْلَارِيَّة

Filaria (F).

هي الهادية ، اطبله .

٢١٣٣٦ - فَيْلَارِيُوزْ

Filariose (F). Filariasis (E).

دويدات تصيب نسيج الانسان والحريان سببا وصول

بويضات الهاد الى الجسم اما بطريق الفم او عن طريق

الجرح وما اشبه .

٢١٣٣٧ - فَيْلَكَةُ الْبَحْرِ

في الفليات ، اطبله .

٢١٣٣٨ - فَيْلَكَمَة

Cocon (F).

هي الصليقة ، اطبله .

٢١٣٣٩ - فَيْلَكُجُوسْ

Arum (F).

هو الترياك الايش ، اطبله .

٢١٣٤٠ - فَيْلَكُورْ

Phyllachora (F).

هي التبيكة ، اطبله .

٢١٣٤١ - فَيْلُو قَرَاة

Altis des crucifères (F).

هي الخنوض ، اطبله .

٢١٣٤٢ - فَيْلُولُكَيْتْ

هو كهبد الزيتون ، اطبله .



فيل



فيكوريا ريجيا



فيل افريقي



فيل هندي

٢١٢٤٨ - فيلوكسيرة الوردان * *Phylus genistae* (S).

Phylus des genêts (F).

حشرة غاشلة من فصيلة الفصيفيات . جسمها صغير يطول نحو ٥ م. ثوبها كثيف اللون يطولو تمسحج أبيض وتقطيع اسمر . رأسها عرجس ، صغير غطتها مستدل الطول . عيناها صغيرتان ، بارزتان . زبابها دقيقان . كسيتان . كسلها يرمي الشكل . حبيبتها صغيرة . ظهراتها لاحف ، مستطيلة الخنجية الدققة . بطنها ومذنها الى الخلف الاسمر || تألف البراري والمواقع الدققة . يكثر وجودها على الوردان .

٢١٢٤٩ - فيلوكسيرة ، فيلوكسيرة *Phylloxera* (S).

Phylloxera (F). *Phylloxera* (E).

جنس حشرات صغيرة القد وبمسها بجرية من فصيلة الاقريات ورتبة متجانسات الاجنحة || انواعها عديدة جميعها مؤذية انما اضرها واشدها اذى فيلوكسيرة الكرمة .

٢١٢٥٠ - فيلوكسيرة السندبان *Phylloxera quercus*, *Ph. coccinea* (S).

Phylloxéra du chêne (F).

نوع من الفيلوكسيرة هراء اللون صغيرة القد طولها نحو ١ م. تركب اوراق السندبان فتؤذيها . مظهرها الخارجي بقع صفر لياقية الانتظام تملو نصل الوراق فتذبلها وتقصي عليها .

٢١٢٥١ - فيلوكسيرة الصمصاف *Phylloxera salicis* (S).

Phylloxéra des saules (F).

نوع من الفيلوكسيرة صغيرة القد طولها نحو ١ م. لونها الى السرة تمسحج فسن جوالج شبيهة المادة ندية الشكل كالغسل وتكثر عند ابط الانفان والبرام والارواق . تنصص اللسع من الاروية الشبكية وتؤذي النبات وتضيقه .

٢١٢٥٢ - فيلوكسيرة الكرمة * *Phylloxera vastatrix*, *Rhizaphis vastatrix*, *Peritymbia vitifolia*, *Pemphigus vitifolia*, *Xerampelus vastator*, *Dactylospheira vitifolia* (S).

Phylloxéra de la vigne (F).

نوع من الفيلوكسيرة وهي حشرة صغيرة القد ، رباعية الاشكال تتميز بالفوارق التالية : الشكل الاول يشمل الفيلوكسيرة الفصية وهي معارة ، لاشقية ، مستطيلة المنك التائب تمسحج على الوراق || الشكل الثاني يشمل الفيلوكسيرة الجردية وهي معارة ، لاشقية ، مستطيلة المنك التائب تمسحج على الجذور || الشكل الثالث يشمل الفيلوكسيرة المجتعة وهي لاشقية مستطيلة المنك التائب تمسحج على الوراق وفي التربة حتى اسلخها الاخير ثم تخرج وتطير || الشكل الرابع يشمل الفيلوكسيرة الشقية ذات الاعضاء التناسلية الكاملة وهي عارمة الجناح والمنك .

كيفية تطور الحشرة - ينبت بالانثى الشقية التي تمتع مكنة واحدة في ايلول تدمي مكنة التفت . تمتع في افرها . وكتبها هذه اسطوانية الشكل زيتونية اللون ، تكاد لاتكون منظورة ، طولها ٢٥٠ م. وعرضها ١٢٠ م. تلتقيها من عقبا في احدى طيات الثشرة تنبت على حافها حتى الربيع حيث يتحول لونها الى الاصفر ثم يعقبه التفت الذي يتم في نيسان . فالشرة اذا تقضي الشتاء ككتنه ثم تنبت في الربيع لينبت منها اما الفصية التي تتسلق الساق والفروع الى ان تستقر على الوراق او المجفورة التي تدور في التربة حتى تسوى الجذور والجذيرات .

٢١٢٤٧ - فيلوكسيرة الوردان * *Philaenus spumarius* (S).

Philaenus des buissons (F).

حشرة من فصيلة السركويات . جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٨ م. ثوبها غطلل السرة السوداء والصفرة || رأسها نصف دائري الشكل ، اصفر اللون . غطلها ثلاثي الاجزاء . عيناها كبيرتان . زبابها قصيران . كسلها اصفر اللون ، اسوده في الزايم الاخير . حبيبتها مزوانية . ظهراتها كامل الخنجية ، لاحف ، اسود اللون ، اصفر الحمار . وريثها عشائين ، شفافان ، بطنها شديد السرة ، اصفر الحيد . قوتائها الى السرة || يكثر وجودها في البراري الدققة وعلى السياجات الحية . قوتها نزع الوراق .



فيلوكسيرة السندبان

٢١٢٤٨ - فيلوكسيرة *Phyllanthus* (S).

Phyllanthus (F). *Phyllanthus*, *Topsy-wood* (E). *Blattblume* (D). *Filanto* (I).

جنس اشجار وجنيات برية وزيتية من فصيلة السويديات . لورائها معقنة متعاقبة ، نصلها يبيض الشكل جامد الصفرة . اظفارها صغيرة القد ، فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ، سداسية الثلاث ، ثلاثية الفصل والامدية || انواعها المعروفة نحو ٤٠٠ جميعها استوائية المنبت ، مظهرها بري وبمسها تزيين وبسها انواع طيبة تليد السيلان وبغيرها تغمر الاصباح لتستعمل في تدوين السلك لاصلياده .

٢١٢٤٩ - فيلوكسيرة السندبان * *Phyllanthus emblica* (S).

Emblie officinale, *Emblie myrobalan* (F). *Emblie-myrobalan* (E). *Grane myrobalan*, *Myrobalanbaum* (D). *Mirobalano emblica* (I).

شجرة برية من التيجويات قريبة الشبه من الفيلوكسيرة متنبية لشد ، تستعمل في الطب لمعالجة الزنقة .



فيلوكسيرة

٢١٢٤٦ - فيلوكسيرة الكرمة * *Philopotamidae* (S).

Philopotamidae (F). *Philopotamidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة اخصها الجبال حيث الغابات وجداول الماء . اجسامها متباينة الحجم و منها الصغيرة والوسطى والكبيرة . بسطة اجنسها اقارب من ١٥ الى ٣٦ م. اجنسها شديدة السرة يطولو تقطيع ملعب . جميعها سدوانة اللون . وريثها صفوهرها مشافة جلب اصفر || تطير في لهار . طيارتها قصير الشوط ، سريع الحركة || اساريها مفترسة ، طليقة ، تمسحج في المياه الجارية . تصنع شبكا قمية الشكل تلتقط فيها فرائسها . اشهر اجناسها :


Philopotamus (S).

Chimarra (S).

Phyllonirnis (S).

Phyllonirnis (F).

جنس طير من الجرام شرويات المتاخر وفصيلة الكيكيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اصطلحا تمتد من الهند الى جزر الزايج . اجسامها تشبه البليل بهامته وشكله . اثنائها ملونة زاهرة الخضاب || جميعها غريبة ، تألف حياة الاسر وتقتبس الاغان وتزودها .



فيلوكسيرة الكرمة



فيلمون

٢١٣٥٤ - فيليمون * Philémon, Phylédon (F).

جنس طير من الجوارثم ربيقات المناقير وفضيلة المقرنات . انواعه المعروفة قليلة العدد اصطلحنا جزر الزانج وبرتديب || اجسامها مستطحة الحجم قدما قد الشصرد . رؤوسها صغيرة . مناقيرها قوية مطلقة القواعد . اذنانها مستطيلة ، مقطوعة الاطراف . اثوابها متباينة الالوان يسود فيها الاخضر الاملس اما بطنها فبنية اللون ابيضاء || تدنن في الانجرار الرقيقة . حشمتها من ٤ الى ٦ يمشات ترزها وحدا دون الذكر الذي يثنى لها الفناء .

٢١٣٥٥ - فياتوريك * Phymatostichum (S).

هو النسيجة جنس ظفور مجهرية ، اطليه .

٢١٣٥٦ - فيكة * Gyps de Ruppell (F).

هي لشعاع الارض ، اطليه .

٢١٣٥٧ - فينولوجية * Phénologie (F).

هي علم الظواهر ، علم يبحث في الوقت الذي تحصل فيه دورياً الظواهر الخاصة بالدورة الحياتية النباتية وتأثير عوامل البيئة في هذه الظواهر انحصار البردة والارتفاع وانحرار وادراك اثر الاوجال .

٢١٣٥٨ - فينج * Vin (vieux) (F).

هو الخمر العتيقة الصافية .

٢١٣٥٩ - فيم * Sigle (F), Sigla, Outline (E).

الفهم الطرف الرئيسي المفتاح المتصل بتصوير عن كلمة . وهو ايضاً مجموعة من الحرف وائسمة تستعمل لتصوير عن مجموعة كلمات . ج . فيام .

٢١٣٦٠ - فيكة * Spizæus bellicus (S).

Spizæus belliqueux, Grifard (F).

طائر من الاتيه ينتمي الى عمارة العقبان وفضيلة الصقريات . اصطلحنا البلاد الحارة الافريقية اخصها جبال الحبشة . طوله نحو ١٠٥ سم . وهو ابيض القوام ، عنق الرأس ، قصير السقط ، مستطيل الذنب . ظهره ورأسه الى الكهبة تتخللها سمة ضمنية . سقاطه الى السرة المنسقة المرفوعة يتفرغها خط اخضر . بطنه وبخلافه الى البياض الزروق المزاج . ذنبه الى الكهبة الرمادية تتفرغ ٦ خطوط عابقة شديدة السرة || وهو من الارباب يعيش ذكراً واثني لا يفرغها سوى الموت . قوته الطياء والقنار والطير . يثنى ذكره في قنة الشجرة الرقيقة او في بعض اوقاب الصخور النائية الشابة || انشاء تضع وفتين مستطيرتين قطر الواحدة يراوح بين ٨ و ٩ سم . تحضنها وسدا نحو ٥ اسابيع .



فينة

القصية - تبلغ كامل نموها بعد الانسلاخ الثالث فيكون طولها اذا ذاك نحو ١٢٥٠ مي . فتختر فصل الورقة الذي يرتفع كالقصية ثم تستقر فيه ، اي داخل القصية ، ويخرج من ٤٠٠ الى ٥٠٠ مكنة تنقف بعد متنها بيضنة واما . ثم يخرج الجبل الجديد من مخضنه سماً وراء القوت واستمرار السلق فيبلغ كامل نمو بعد الانسلاخ الثالث ويبيد عمل امه كما سبق ذكرنا . اجسامها الموصية الرقيقة والصيفية تراوح بين ٥ و ٦ .

الجولة - اصغر قدماً من القصية طولها نحو ١٠٠٠ مي . لونها الى الصفار الكبيرتي وهي شديدة الاندى . اجسامها الموصية تراوح بين ٦ و ٨ ويظهر شحرات الجبل الاخير بقضي يالته الشترية تحت قشور الجذور || ضررها محصور بنشاط تناسلها لان وغزها الجذوات والجذور ، التي تعيش عليها وفيها ، قد يبلغ بعض الرويات .

المنجسة - هي من حيث الاصل حشرة مقصية دخلت الثرة بعد انسلاخها الثالث فتحوورت لنها بعد انسلاخ تكميل رابع الى عذراء ثم الى حشرة بمنجمة طولها نحو ٢ سم . اي ٢٠٠٠ مي . وهي لا شقة الجنس ، صفراء اللون . رباعية الاجنحة الشفافة . تضع من ٤ الى ٨ مكناات مختلفة الاحجام تدعى مكن الصيف . الصغرى منها وقد تطول نحو ٢٦٠ مي . تنقف من الذكور . والكبرى تطول نحو ٤٠٠ مي . تنقف من الاناث .

الشفقة - هي الكاملة الاعضاء التناسلية تنقف من مكن الصيف المائدة الى الحشرة المنجسة . وهي صفراء اللون حادة الملك والابنسة والاذى . الذكر منها يطول من ٢٦٠ الى ٢٨٠ مي . والاثنى من ٤٠٠ الى ٤٦٠ مي . || سفادها يبتدىء بعد النقف بيوم أو يومين تضع الاثنى بعده مكنة واحدة تعرف بمكنة الشتاء التي جنبنا على ذكرها في اول هذا الجث .

اضرارها الحشرة - اضرارها حسيمة لانها تميت الكومة بعد ان تقضي على الجذور والاوراق .

مكافحتها - طرق مكافحتها متعددة منها القصر بالماء نحو ٢٥ يوماً او استعمال الموشير النشطة القمالة السامة التي يصعب القيام بها نظراً لبطالة اكلافها وبا قد تسببه من عوالب . لذلك يحسن استعمال التلصم على كومة امريكية منية وهو ما مكن اوروبية من تجديد كرومها بعد ان قصت عليها الفيلوكسرة .

٢١٣٥٣ - فيليديات * Elephantidae (S).

Elephantidae (E), Elephantidae (E).

فصيلة الفيلة من رتبة الخرطوميات .

أنجزت « المطبعة الكاثوليكية ش.م.ل »
في عاريا - لبنان
طباعة الجزء الثاني من « الموسوعة في علوم الطبيعة »
في العام ١٩٨٨

*L'Encyclopédie des Sciences de la Nature
se compose de quatre volumes, dont le dernier
comprend les lexiques des termes
allemands,
anglais,
français,
grecs,
italiens et
latins.*

Edouard Ghaleb
Ingénieur agronome

ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE

ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES

Agriculture, Botanique, Zoologie, Ornithologie,
Ichtyologie, Entomologie, Parasitologie, Bactériologie,
Microbiologie, Affections animales et végétales.

Termes techniques:

(Physique, Chimie, Mathématiques, Géologie, Astronomie, Droit)

Volume II
2ème ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE



Dar el-Machreq sarl
Beyrouth

**ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**



Dar el-Machreq sari
Boite Postale 946 Beyrouth, Liban

Distribution :



Librairie Orientale - Boite Postale 1986
Beyrouth, Liban



ARTICLES ET INDEX
en arabe, anglais, français
allemand, italien, latin et grec

Edouard Ghaleb **ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

Agriculture • Botanique • Zoologie • Géologie

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**

2420 pages • 31464 articles
6962 illustrations • 24 planches en couleurs

Agriculture • Botany • Zoology • Geology



DAR EL-MACHREQ
BEYROUTH